

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU BUỔI HỌC

BUỔI 6 — DÃY SỐ

数列

Module M2 · Tỷ trọng đề thi ~13% · khoảng 5–8 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. TỪ KHÓA NHẬN DẠNG ĐỀ

Độc được từ khóa là xác định được dạng bài mà không cần dịch cả đề. Bảng dưới đây gom những từ khóa quyết định của chuyên đề này.

Từ khóa	Nghĩa	Dạng bài tương ứng
等差数列	cấp số cộng	Xác định a_1, d , tính a_n hoặc S_n
等比数列	cấp số nhân	Xác định a_1, q , tính a_n hoặc S_n
公差	công sai	Hiệu hai số hạng liên tiếp $d = a_{n+1} - a_n$
公比	công bội	Tỉ hai số hạng liên tiếp $q = \frac{a_{n+1}}{a_n}$
首项	số hạng đầu	Giá trị a_1
通项公式	công thức số hạng tổng quát	Biểu thức của a_n theo n
前 n 项和	tổng n số hạng đầu	Tính S_n
递推公式	công thức truy hồi	Tính lần lượt từng số hạng
无穷等比数列	cấp số nhân lùi vô hạn	Điều kiện $ q < 1$ và tổng vô hạn
各项之和	tổng các số hạng	Tính S của cấp số nhân lùi vô hạn
等差中项	trung bình cộng	Ba số lập thành cấp số cộng
等比中项	trung bình nhân	Ba số lập thành cấp số nhân
递增数列	dãy số tăng	Xét dấu của d hoặc q
斐波那契数列	dãy Fibonacci	Nhận dạng dãy 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...

Chú ý. Hai cặp từ khóa quyết định cách xử lý là 等差数列 / 等比数列 và 公差 / 公比. Cấp số cộng dùng **phép trừ** để tìm công sai, cấp số nhân dùng **phép chia** để tìm công bội. Đọc nhầm loại cấp số là mất điểm ngay từ bước đầu.

2. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

2.1 Cấp số cộng

Định nghĩa 1 —Cấp số cộng

Dãy số $\{a_n\}$ là *cấp số cộng* khi kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một hằng số d không đổi:

$$a_{n+1} = a_n + d$$

Hằng số d gọi là *công sai*.

Tính chất 1 —Số hạng tổng quát

Với cấp số cộng có số hạng đầu a_1 và công sai d :

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

Tính chất 2 —Tổng n số hạng đầu

Hai dạng tương đương:

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

Chú ý. Dạng thứ nhất dùng khi biết số hạng cuối a_n , dạng thứ hai dùng khi chỉ biết a_1 và d . Nhìn đề để chọn dạng cho nhanh: có a_n thì dùng dạng một.

Tính chất 3 —Tính chất đối xứng

Trong cấp số cộng, tổng hai số hạng có tổng chỉ số bằng nhau thì bằng nhau:

$$a_m + a_n = a_p + a_q \quad \text{khi} \quad m + n = p + q$$

Hệ quả. Số hạng giữa là trung bình cộng của hai số hạng cách đều nó: $a_k = \frac{a_{k-1} + a_{k+1}}{2}$.

Cách nhanh. Đề cho $a_2 + a_5 + a_8 = 21$ và hỏi S_9 thì ghép $a_2 + a_8 = 2a_5$, suy ra $3a_5 = 21$ tức $a_5 = 7$, rồi $S_9 = 9a_5 = 63$. Không cần tìm a_1 và d .

Tính chất 4 —Ba số lập thành cấp số cộng

Ba số x, y, z lập thành cấp số cộng khi và chỉ khi

$$2y = x + z$$

Chú ý. Ở dạng này số hạng giữa là trung bình cộng, không phải trung bình nhân. Đây là chỗ đề hay gài bẫy với hai đáp án $\pm$ của căn bậc hai.

2.2 Cấp số nhân

Định nghĩa 2 —Cấp số nhân

Dãy số $\{a_n\}$ là *cấp số nhân* khi kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng bằng số hạng đứng ngay trước nó nhân với một hằng số q không đổi:

$$a_{n+1} = a_n \cdot q$$

Hằng số q gọi là *công bội*.

Tính chất 5 —Số hạng tổng quát

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

Tính chất 6 —Tổng n số hạng đầu

$$S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} \quad (q \neq 1)$$

Khi $q = 1$ thì $S_n = na_1$.

Chú ý. Mẫu số $1 - q$ chứ không phải $q - 1$. Viết nhầm mẫu sẽ ra sai dấu toàn bộ đáp án. Có thể dùng dạng tương đương $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$ để tránh nhầm.

Tính chất 7 —Tính chất đối xứng

Trong cấp số nhân, tích hai số hạng có tổng chỉ số bằng nhau thì bằng nhau:

$$a_m \cdot a_n = a_p \cdot a_q \quad \text{khi} \quad m + n = p + q$$

Cách nhanh. Đề cho $a_3 = 4$ và $a_5 a_7 = 36$ rồi hỏi a_9 : vì $5 + 7 = 3 + 9$ nên $a_5 a_7 = a_3 a_9$, suy ra $a_9 = \frac{36}{4} = 9$. Không cần tìm a_1 và q .

Tính chất 8 —Ba số lập thành cấp số nhân

Ba số x, y, z lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi

$$y^2 = xz$$

Chú ý. Trung bình nhân $y = \pm \sqrt{xz}$ có hai giá trị. Nếu đề thêm điều kiện 各项都是正数 (các số hạng đều dương) thì chỉ lấy giá trị dương.

Tính chất 9 —Cấp số nhân lùi vô hạn

Cấp số nhân lùi vô hạn hội tụ khi và chỉ khi $|q| < 1$. Khi đó tổng của mọi số hạng là

$$S = \frac{a_1}{1 - q}$$

Chú ý. Điều kiện hội tụ là $|q| < 1$, tức $-1 < q < 1$. Đáp án $q \leq 1$ sai vì bỏ sót trường hợp $q \leq -1$ không hội tụ.

2.3 Dãy số cho bởi công thức truy hồi

Định nghĩa 3 — Công thức truy hồi

Dãy số cho bởi công thức truy hồi là dãy mà mỗi số hạng được tính từ một hay nhiều số hạng đứng trước, kèm theo giá trị của số hạng đầu.

Tính chất 10 — Quan hệ giữa số hạng và tổng

Với mọi dãy số, kể từ $n \geq 2$:

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

Chú ý. Công thức này biến đề cho S_n thành bài toán tìm a_n . Đây là dạng bài phổ biến của chuyên đề: đề cho công thức tổng S_n và hỏi một số hạng cụ thể.

Cách nhanh. Với $S_n = an^2 + bn$ thì $a_n = S_n - S_{n-1} = a(2n-1) + b$, tức dãy là cấp số cộng với công sai $2a$.

3. CÁC DẠNG BÀI

3.1 Dạng 1 — Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng

Cách nhận dạng. Đề cho hai điều kiện liên quan tới các số hạng cụ thể và yêu cầu tìm a_1 , d , a_n hoặc S_n .

Cách làm. Viết mỗi điều kiện thành phương trình theo a_1 và d bằng công thức $a_n = a_1 + (n-1)d$, rồi giải hệ hai phương trình.

Ví dụ 1

Cho cấp số cộng có $a_1 = 3$ và $a_5 = 11$. Tìm S_7 .

Từ $a_5 = a_1 + 4d$ suy ra $4d = 11 - 3 = 8$, vậy $d = 2$.

Với S_7 dùng dạng $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$:

$$S_7 = 7 \cdot 3 + \frac{7 \cdot 6}{2} \cdot 2 = 21 + 42 = 63$$

3.2 Dạng 2 — Xác định số hạng đầu và công bội của cấp số nhân

Cách nhận dạng. Đề cho hai điều kiện về các số hạng của cấp số nhân và yêu cầu tìm a_1 , q , a_n hoặc S_n .

Cách làm. Viết mỗi điều kiện theo a_1 và q bằng $a_n = a_1 q^{n-1}$. Khi đề cho tỉ số của hai tổng liên tiếp, chia hai phương trình để triệt tiêu a_1 và tìm q trước.

Ví dụ 2

Cho cấp số nhân có $a_1 = 2$, $q = 3$. Tìm a_4 và S_3 .

Số hạng tổng quát: $a_4 = a_1 q^3 = 2 \cdot 27 = 54$.

Tổng ba số hạng đầu:

$$S_3 = \frac{a_1(1-q^3)}{1-q} = \frac{2(1-27)}{1-3} = \frac{2 \cdot (-26)}{-2} = 26$$

3.3 Dạng 3 — Cho tổng n số hạng đầu, tìm số hạng và công sai

Cách nhận dạng. Đề cho công thức của S_n theo n và hỏi một số hạng cụ thể, hoặc hỏi công sai.

Cách làm. Dùng $a_n = S_n - S_{n-1}$ cho $n \geq 2$, còn $a_1 = S_1$. Nếu đề hỏi công sai, tính $d = a_2 - a_1$.

Ví dụ 3

Cho $S_n = n^2 + 4n$. Tìm a_3 .

Áp dụng $a_n = S_n - S_{n-1}$:

$$S_3 = 9 + 12 = 21, \quad S_2 = 4 + 8 = 12$$

$$a_3 = S_3 - S_2 = 21 - 12 = 9$$

Cách nhanh. $S_n = n^2 + 4n$ có dạng $an^2 + bn$ với $a = 1, b = 4$, nên đây là cấp số cộng với $d = 2a = 2$ và $a_1 = S_1 = 5$. Suy ra $a_3 = a_1 + 2d = 9$.

3.4 Dạng 4 — Vận dụng tính chất đặc trưng của cấp số cộng

Cách nhận dạng. Đề cho tổng của vài số hạng đối xứng qua một số hạng giữa, hoặc cho ba số lập thành cấp số cộng, và yêu cầu tính giá trị biểu thức mà không cho a_1, d .

Cách làm. Dùng $a_m + a_n = a_p + a_q$ khi $m + n = p + q$. Với ba số hạng liên tiếp hoặc cách đều, ghép thành bội của số hạng giữa.

Ví dụ 4

Cho cấp số cộng thỏa mãn $a_3 + a_6 + a_8 + a_{11} = 12$. Tính $2a_9 - a_{11}$.

Ghép $a_3 + a_{11} = a_6 + a_8 = 2a_7$ nên tổng đã cho bằng $4a_7 = 12$, suy ra $a_7 = 3$.

Biến đổi biểu thức cần tính theo a_7 và d :

$$2a_9 - a_{11} = 2(a_7 + 2d) - (a_7 + 4d) = a_7 = 3$$

3.5 Dạng 5 — Cấp số nhân lùi vô hạn

Cách nhận dạng. Đề có cụm 无穷等比数列 (cấp số nhân lùi vô hạn) hoặc 各项之和 (tổng các số hạng), kèm câu hỏi về điều kiện hội tụ hoặc tổng vô hạn.

Cách làm. Kiểm tra $|q| < 1$, sau đó áp dụng $S = \frac{a_1}{1-q}$.

Ví dụ 5

Cho cấp số nhân lùi vô hạn có $a_1 = 8, q = \frac{1}{2}$. Tính tổng mọi số hạng.

Vì $|q| = \frac{1}{2} < 1$ nên chuỗi hội tụ. Áp dụng công thức:

$$S = \frac{a_1}{1-q} = \frac{8}{1-\frac{1}{2}} = 16$$

3.6 Dạng 6 —Dãy số cho bởi công thức truy hồi

Cách nhận dạng. Đề có 递推公式 hoặc hệ thức liên hệ a_{n+1} với a_n , kèm giá trị a_1 . Đề thường hỏi một số hạng cụ thể với chỉ số nhỏ.

Cách làm. Thay lần lượt từng bước từ a_1 lên số hạng cần tìm. Không cần tìm công thức tổng quát khi chỉ số được hỏi nhỏ.

Ví dụ 6

Cho $a_1 = 1$ và $a_{n+1} = a_n + 2n$. Tìm a_3 .

Thay $n = 1$: $a_2 = a_1 + 2 \cdot 1 = 1 + 2 = 3$.

Thay $n = 2$: $a_3 = a_2 + 2 \cdot 2 = 3 + 4 = 7$.

Chú ý. Số hạng n trong hệ thức là chỉ số của số hạng đang tính, không phải của số hạng đã biết. Nhầm chỗ này cho kết quả sai.

3.7 Dạng 7 —Bài toán thực tế vận dụng cấp số cộng và cấp số nhân

Cách nhận dạng. Đề mô tả một quá trình thay đổi đều theo bước: tăng đều một lượng không đổi (cấp số cộng) hoặc tăng theo tỉ lệ phần trăm không đổi (cấp số nhân).

Cách làm. Xác định số hạng đầu và công sai (hoặc công bội) từ lời văn, rồi áp dụng công thức số hạng tổng quát hoặc công thức tổng. Tăng đều theo phần trăm thì công bội là $q = 1 + r$, giảm theo phần trăm thì $q = 1 - r$.

Ví dụ 7

Một công ty có doanh thu năm đầu là 400 vạn, mỗi năm sau tăng 50% so với năm trước. Tính tổng doanh thu ba năm đầu.

Doanh thu lập thành cấp số nhân với $a_1 = 400$ và $q = 1 + 0,5 = 1,5$.

Tổng ba năm đầu:

$$S_3 = \frac{a_1(1 - q^3)}{1 - q} = \frac{400(1 - 3,375)}{1 - 1,5} = \frac{400 \cdot (-2,375)}{-0,5} = 1900$$

Vậy tổng doanh thu ba năm đầu là 1900 vạn.

Chú ý. Tăng 50% nghĩa là nhân với 1,5, không phải nhân với 0,5. Đây là lỗi phổ biến nhất ở dạng bài thực tế.

4. PHỤ LỤC —BỐI CẢNH KỲ THI

4.1 Cấu trúc đề thi CSCA môn Toán

Đặc điểm	Thông số
Số câu	48 câu trắc nghiệm
Thời gian	60 phút
Thang điểm	100 điểm
Ngôn ngữ	Tiếng Trung hoặc tiếng Anh (thí sinh chọn)
Máy tính	Không được dùng

Thời gian trung bình mỗi câu là **1 phút 15 giây**. Mục tiêu của khóa học không phải giải được bài khó, mà là **nhận ra dạng bài trong vài giây và chọn đúng đáp án trong khoảng 40 giây**.

4.2 Trọng số các nhóm nội dung

Nhóm nội dung	Số câu	Tỉ trọng
Lượng giác	8–11	20%
Hình học giải tích	8–10	19%
Dãy số	5–8	13%
Hàm số	5–7	13%
Tập hợp & bất đẳng thức	4–6	10%
Mũ & logarit	3–5	8%
Vector & số phức	2–4	6%
Xác suất & thống kê	1–2	3%

Chuyên đề hôm nay chiếm khoảng 13% đề thi. Đây là chuyên đề có **công thức ít nhất** trong toàn bộ chương trình: chỉ bốn công thức cho cấp số cộng và bốn công thức cho cấp số nhân. Nhưng chính vì ít công thức nên đề khai thác rất sâu vào **tính chất đối xứng của các chỉ số**, đòi hỏi nhận ra quy luật thay vì thay số trực tiếp.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI