

ForestMol

INGREDIENT PROPOSAL

항균클린징폼

산림 공공데이터 7종 및 특허 분석 기반 천연 화장품 소재 제안서

제출처 (고객사)	인디
보고서 구분	고객사 제출용
생성 일자	2026년 5월 26일
작성 담당자	test@forestmol.com

천연 소재 요약 목록

소재명 (학명)	출처 기관	주요 효능 및 생리활성	특허 상태
오동나무 Paulownia coreana Uyeki	국립산림과학원	연구 진행 중	0건
살구나무 Prunus armeniaca var. ansu Maxim.	산림청	각기. 결막염, 골수암, 광견병, 구내염, 기관지염, 난관난소염, 뇌암, 방광암, 요결석, 위경련, 인두염, 자궁근종, 전립선비대증, 종독, 중이염, 중풍, 진경, 진정, 척추질환, 충치, 치통, 편도선염, 폐결핵, 폐부종, 폐암, 피부윤탁, 혈압조절, 호흡기질환, 환각치료, 후두암 등, 과실 성숙기에 채취, 과육을 제거하고 종인을 햇볕에 말린다.	0건
오미자 Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.	산림청	간염, 강근골, 강정제, 경신익지, 목마름, 권태증, 급성간염, 기관지염, 만성피로, 소아천식, 수감, 양위, 열질, 월경이상, 유정증, 윤��피부, 음경, 음극사양, 이명, 자양, 조루증, 주독, 축농증, 탈모증, 폐기천식, 폐렴, 풍, 해소, 해수, 허로, 혈압, 흥부냉증, 흥부담, 흥분제 등, 성숙한 과실을 채취하여 햇볕에 말린다.	0건
민백미꽃 Cynanchum ascyrifolium (Franch & Sav.) Matsum.	산림청	강기, 거담, 건위, 금창, 이뇨, 익정, 부인병, 부종, 중풍, 지해, 출혈, 폐기천식, 한열, 해소, 해수, 해열, 뿌리를 채취하여 줄기를 제거하고 햇볕에 말린다.	0건

오동나무

Paulownia coreana Uyeki

제공 출처

산림바이오소재

수집 기관

국립산림과학원

특허 선행 조사

0건

주요 생리활성 및 연구 효능

수집된 생리활성 정보가 없습니다.

KNAPSAck 함유 지표 성분 (상위 5개)

- Syringin (C17H24O9)
- Syringin (C17H24O9)
- (+)-Sesamin (C20H18O6)
- (+)-Sesamin (C20H18O6)
- Sinapyl alcohol (C11H14O4)

§ 2-C 대사 경로 및 효소 (KEGG)

- 대사 경로: Phenylpropanoid biosynthesis
- 관련 효소: EC 2.4.1.111 (coniferyl-alcohol glucosyltransferase) 외 1개
- 출처: KEGG Database

살구나무

Prunus armeniaca var. ansu Maxim.

제공 출처	수집 기관
산림청_약용식물	산림청

특허 선행 조사
0건

주요 생리활성 및 연구 효능

- 각기, 결막염, 골수암, 광견병, 구내염, 기관지염, 난관난소염, 뇌암, 방광암, 요결석, 위경련, 인두염, 자궁근종, 전립선비대증, 중독, 중이염, 중풍, 진경, 진정, 척추질환, 충치, 치통, 편도선염, 폐결핵, 폐부종, 폐암, 피부윤탁, 혈압조절, 호흡기질환, 환각치료, 후두암 등
- 과실 성숙기에 채취, 과육을 제거하고 종인을 햇볕에 말린다.
- (내복): 탕전(湯煎)하거나 환제 또는 가루약으로 복용한다. (외용): 짓찧어 상처 부위에 붙인다.

KNAPsACK 함유 지표 성분 (상위 5개)

- Gibberellin A1 (C19H24O6)
- Gibberellin A5 (C19H22O5)
- Gibberellin A29 (C19H24O6)
- Gibberellin A32 (C19H22O8)
- Dihydroactinidiolide (C11H16O2)

§ 2-C 대사 경로 및 효소 (KEGG)

- 대사 경로: Diterpenoid biosynthesis 외 5개
- 관련 효소: EC 1.14.11.13 (gibberellin 2beta-dioxygenase) 외 1개
- 출처: KEGG Database

오미자

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.

제공 출처

산림청_약용식물

수집 기관

산림청

특허 선행 조사

0건

주요 생리활성 및 연구 효능

- 간염, 강근골, 강정제, 경신익지, 목마름, 권태증, 급성간염, 기관지염, 만성피로, 소아천식, 수감, 양위, 열질, 월경이상, 유정증, 윤피부, 음경, 음극사양, 이명, 자양, 조루증, 주독, 축농증, 탈모증, 폐기천식, 폐렴, 풍, 해소, 해수, 허로, 혈압, 흥부냉증, 흥부담, 흥분제 등
- 성숙한 과실을 채취하여 햇볕에 말린다.
- (내복): 탕전(湯煎)하거나, 환제 또는 가루약으로 복용하거나, 주침하여 복용한다.

KNAPsack 함유 지표 성분 (상위 5개)

- Nordihydroguaiairetic acid (C18H22O4)
- (-)-Gomisin J (C22H28O6)
- Schisantherin D (C29H28O9)
- alpha-Pinene (C10H16)
- Citronellol (C10H20O)

민백미꽃

Cynanchum ascyrifolium (Franch & Sav.) Matsum.

제공 출처

산림청_약용식물

수집 기관

산림청

특허 선행 조사

0건

주요 생리활성 및 연구 효능

- 강기, 거담, 건위, 금창, 이뇨, 익정, 부인병, 부종, 중풍, 지해, 출혈, 폐기천식, 한열, 해소, 해수, 해열
- 뿌리를 채취하여 줄기를 제거하고 햇볕에 말린다.
- (내복): 탕전(湯煎)하여 복용한다.

KNAPSAck 함유 지표 성분 (상위 5개)

- Cynascyroside D (C40H60O13)
- Cynascyroside E (C46H70O18)
- Cynascyroside A (C40H60O13)
- Cynascyroside B (C47H72O18)
- Cynascyroside C (C46H70O18)

데이터 출처 안내

- ✓ 본 리포트의 천연 소재 정보는 산림청 및 국립산림과학원(NIFoS)이 개방하는 7종 산림 공공데이터를 근간으로 추출되었습니다.
- ✓ 지표 성분 정보는 글로벌 대사체 데이터베이스인 KNApSack을 매핑하여 신뢰성 있는 화학 성분을 도출하였습니다.
- ✓ 특허 정보는 특허정보원(KIPRIS) OpenAPI 연동을 통하여 추출된 실시간 지식재산권 정보를 기반으로 작성되었습니다.

※ 법적 면책고지 (Legal Disclaimer)

본 보고서에 포함된 데이터 및 AI 추출 제안 내용은 화장품 R&D R&I 연구팀의 소재 탐색 및 기획을 돕기 위해 학술적 참고용으로 가공 및 정렬된 결과입니다. 소재의 실제 배합 한도, 안전성, 화장품법상 광고 표시 위반 여부, 그리고 최종 특허권 침해에 관한 법적 책임은 사용 당사자에게 있으며, 제조 및 유통 전에 정식 임상실험 및 변리사의 검토를 거쳐야 함을 명시합니다.