


Praxis
Dr. med. Peter Löffler
Praktischer Arzt

Dieselstr.1
61184 Karben

Laborärztlicher Befundbericht Endbefund, Seite 1 von 4

Benötigtes Untersuchungsmaterial: Lithium-Heparin-Blut. Serum



Untersuchung	Ergebnis	Vorwert	Referenzbereich
Immunologie			
ATP in Granulozyten	0,37 nmol/10 ⁶ Zellen		> 0,4 > 1,0 sehr gute Energiebereitstellung
ATP in Granulozyten (%)	100,0 %		100
ATP während Blockade (%)	37,1 %		
ATP nach Blockade (%)	22,6 %		

Gesamtbeurteilung

Übersicht Immunologie:

- verminderter ATP-Gehalt bei Verdacht auf **mitochondriale Dysfunktion**.

Immunologische Diagnostik - Befundinterpretation

ATP in Granulozyten

Das Untersuchungsergebnis zeigt einen **reduzierten intrazellulären ATP-Gehalt**, was auf eine eingeschränkte mitochondriale Energieversorgung hinweist.

Eine verminderte ATP-Bildung im Sinne einer mitochondrialen Dysfunktion kann auftreten bei

- unzureichender Sauerstoffversorgung der Gewebe,
- CFS (Chronic Fatigue Syndrom)
- Fibromyalgie,
- nitrosativem und oxidativem Stress
- chronisch degenerativ-entzündlichen Erkrankungen
- aktiver EBV-Infektion
- Alterungsprozessen
- Mangel an Cofaktoren

Eine **verminderte ATP-Bildung** im Sinne einer mitochondrialen Dysfunktion kann primär im Rahmen von Alterungsprozessen, sowie sekundär durch Schädigung der Mitochondrienmembranen oder durch eine unzureichende Versorgung mit supportiven Nährstoffen auftreten.