

A NEW STATISTICAL TEST FOR TOBIT MODEL AND ZMP MODEL

杜兴兴 魏雅慧

数学与统计学院

January 16, 2021

目录

模型设定

- ZIP统计模型:

$$\begin{cases} P(Y_i = 0) = \omega + (1 - \omega)e^{-\lambda_i} \\ P(Y_i = y_i) = (1 - \omega)\frac{e^{-\lambda_i}\lambda_i^{y_i}}{y_i!} \quad (y_i > 0) \end{cases} \quad (1.1)$$

- 令:

- $\theta = \frac{\omega}{1-\omega} = \text{常数} \quad (-f(0) \leq \theta < \inf)$
- $\ln(\lambda_i) = X_i\beta$

● 示性函数:

$$I_{(condition)} = \begin{cases} 1 & \text{if condition is True} \\ 0 & \text{if condition is False} \end{cases} \quad (1.2)$$

● 对数似然:

$$l(\lambda, \theta; y) = \sum_i \left\{ -\log(1 + \theta) + I_{y_i=0} \log(\theta + e^{-\lambda_i}) + I_{y_i>0} [-\lambda_i + y_i \log(\lambda_i) - \log(y_i!)] \right\} \quad (1.3)$$

● 偏导方程:

$$\frac{dl}{d\beta_r} = \sum_i \left\{ I_{(y_i=0)} \left(\frac{-e^{-\lambda_i}}{\theta + e^{-\lambda_i}} \right) \lambda_i x_{ir} + I_{y_i>0} (y_i - \lambda_i) x_{ir} \right\} \quad r = 1, 2, \dots, p$$

$$\frac{dl}{d\theta} = \sum_i \left\{ \frac{-1}{(1 + \theta)} + I_{y_i=0} \left(\frac{1}{\theta + e^{-\lambda_i}} \right) \right\}$$

- ZIP的对数似然函数基础上构建得分向量:

$$U(\beta, \theta) = \begin{bmatrix} \frac{\partial l}{\partial \beta} \\ \frac{\partial l}{\partial \theta} \end{bmatrix}$$

- Fisher信息矩阵:

$$J(\beta, \theta) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 l}{\partial \beta \partial \beta'} & \frac{\partial^2 l}{\partial \beta \partial \theta} \\ \frac{\partial^2 l}{\partial \beta' \partial \theta} & \frac{\partial^2 l}{\partial \theta \partial \theta} \end{bmatrix}$$

- 在原假设成立下,根据Fisher信息矩阵构建Score检验统计量:

$$S(\hat{\beta}) = S(\hat{\beta}, 0) = U^T(\hat{\beta}, 0)[J(\hat{\beta}, 0)]^{-1}U(\hat{\beta}, 0) \sim \chi^2_{(1)}$$

- 所以在原假设条件下, $\theta = 0$:

$$\frac{dl}{d\theta}|_{\theta=0} = \sum_i \left\{ \frac{I_{(y_i=0)}}{e^{-\hat{\lambda}_i}} - 1 \right\}$$

- 计算得分向量得:

$$U^T(\beta, 0) = \left(0, \dots, 0, \sum_i \left\{ \frac{I_{(y_i=0)}}{e^{-\hat{\lambda}_i}} - 1 \right\} \right)$$

● 计算二阶偏导:

$$\begin{aligned}\frac{d^2 l(\cdot)}{d\beta_r d\beta_s} &= \sum_i \left\{ I_{y_i=0} \left(\frac{-e^{-\lambda_i} [(1-\lambda_i)\theta + e^{-\lambda_i}]}{[\theta + e^{-\lambda_i}]^2} \right) \lambda_i x_{ir} x_{is} - I_{(y_i>0)} \lambda_i x_{ir} x_{is} \right\} \quad r = 1 \dots p, s = 1 \dots p \\ \frac{d^2 l(\cdot)}{d\beta_r d\theta} &= \sum_i \left\{ I_{y_i=0} \left(\frac{-e^{-\lambda_i}}{[\theta + e^{-\lambda_i}]^2} \right) \lambda_i x_{ir} \right\} \quad r = 1 \dots p \\ \frac{d^2 l(\cdot)}{d\theta^2} &= \sum_i \left\{ \frac{1}{(1+\theta)^2} - I_{y_i=0} \left(\frac{1}{[\theta + e^{-\lambda_i}]^2} \right) \right\}\end{aligned}\tag{1.4}$$

● 可以得到 $J(\hat{\beta}, 0)$:

$$\begin{aligned}\bullet \quad \hat{J}_{r,s} &= \sum_i \hat{\lambda}_i x_{ir} x_{is} \quad r = 1 \dots p, s = 1 \dots p \\ \bullet \quad \hat{J}_{r,p+1} &= - \sum_i \hat{\lambda}_i x_{ir} \quad r = 1 \dots p \\ \bullet \quad \hat{J}_{p+1,p+1} &= \sum_i \frac{1 - e^{-\hat{\lambda}_i}}{e^{-\hat{\lambda}_i}}\end{aligned}$$

- $J(\hat{\beta}, 0)$ 矩阵分块得:

$$J(\hat{\beta}, 0) = \begin{bmatrix} \hat{J}_{11} & \hat{J}_{12} \\ \hat{J}_{21} & \hat{J}_{22} \end{bmatrix}$$

- $\hat{J}_{11} = X^T \text{diag}(\hat{\lambda}X)$
- $\hat{J}_{12} = -X^T \hat{\lambda}$
- $\hat{J}_{21} = -\hat{\lambda}^T X^T$
- $\hat{J}_{22} = \sum_i \left(\frac{1}{e^{-\hat{\lambda}_i}} - 1 \right)$

- $J(\hat{\beta}, 0)^{-1}$ 定义为 C :

$$J(\hat{\beta}, 0)^{-1} = C(\hat{\beta}, 0) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix}$$

- 由于得分向量 $U(\hat{\beta}, 0)$ 的结构只需要 C_{22} 即可:

$$C_{22}^{-1} = \hat{J}_{22} - \hat{J}_{21} \hat{J}_{11}^{-1} \hat{J}_{12}$$

$$C_{22}^{-1} = \sum_i \left(\frac{1}{e^{-\hat{\lambda}_i}} - 1 \right) - \hat{\lambda}^T X [X^T \text{diag}(\hat{\lambda}) X]^{-1} X^T \hat{\lambda}$$

- Score统计量最终形式为:

$$S(\hat{\beta}) = S(\hat{\beta}, 0) = U^T(\hat{\beta}, 0)[J(\hat{\beta}, 0)]^{-1}U(\hat{\beta}, 0) \sim \chi^2_{(1)}$$

$$S(\hat{\beta}, 0) = \frac{\left\{ \sum_{i=1}^n \left(\frac{I_{y_i=0}}{e^{-\hat{\lambda}_i}} - 1 \right) \right\}^2}{\sum_i \left(\frac{1}{e^{-\hat{\lambda}_i}} - 1 \right) - \hat{\lambda}^T X [X^T \text{diag}(\hat{\lambda}) X]^{-1} X^T \hat{\lambda}}$$

- 可得:

$$S_{score} = \frac{\left\{ \sum_{i=1}^n \left(\frac{I_{y_i=0}}{e^{-\hat{\lambda}_i}} - 1 \right) \right\}}{\left\{ \sum_i \left(\frac{1}{e^{-\hat{\lambda}_i}} - 1 \right) - \hat{\lambda}^T X [X^T \text{diag}(\hat{\lambda}) X]^{-1} X^T \hat{\lambda} \right\}^{1/2}}$$

$$S_{score} \sim N(0, 1)$$