AVERAGE

Cho dãy số x_1, x_2, \ldots, x_n . Hãy đếm số lượng dãy con (có ít nhất một phần tử, có thể không liên tiếp) có trung bình cộng (tổng giá trị các phần tử chia cho số lượng phần tử) đúng bằng a.

Vì đáp án có thể rất lớn nên bạn được yêu cầu đưa ra phần dư của số lượng dãy con sao khi chia cho $10^9 + 7$.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương T – số bộ dữ liệu vào. Mỗi bộ dữ liệu vào có định dạng như sau:

- Dòng thứ nhất ghi hai số nguyên n, a $(1 \le n, a \le 200)$ số phần tử của dãy số và giá trị a trên đề bài.
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương x_1, x_2, \ldots, x_n ($x_i \leq 200$) mô tả dãy số.

Kết quả

Một số nguyên duy nhất là số dãy con khi chia lấy dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ

Sample Input	Sample Output
3	5
4 6	0
5 7 6 7	1
5 100	
4 2 5 10 5	
6 100	
77 97 114 105 115 97	

Giải thích

- Ở ví dụ thứ nhất, các dãy con cần đếm là
 - $-[x_3] = [6]$
 - $[x_1, x_2] = [5, 7]$
 - $[x_1, x_4] = [5, 7]$
 - $[x_1, x_2, x_3] = [5, 7, 6]$
 - $[x_1, x_3, x_4] = [5, 6, 7].$
- Ở ví dụ thứ hai, các dãy con đều có trung bình cộng nhỏ hơn 100.

Testing Round 19

• Ở ví dụ thứ ba, dãy con duy nhất cần đếm là: $[x_1, x_2, x_3, x_5, x_6] = [77, 97, 114, 115, 97].$

Chấm điểm

- Subtask 1 (20% số test): $n \le 16$; $a, x_i \le 50$
- Subtask 2 (40% số test): $n \leq 50;\, a,x_i \leq 50$
- \bullet Subtask 3 (40% số test): Không có ràng buộc gì thêm