
Allegato 3:
"Misure di controllo per la gestione del paziente con scabbia in comunità"

MISURE DI CONTROLLO PER SCABBIA NELLA COMUNITA'			
AZIONE DI PREVENZIONE		**DESCRIZIONE**	
1	**ISOLAMENTO TEMPORANEO DELLE PERSONE INFETTE**	Le persone che hanno ricevuto diagnosi di sospetta o accertata scabbia devono allontanarsi dalle collettività frequentate le 24 h successive al primo trattamento.	
2	**TRATTAMENTO DEI CONTATTI CONVIVENTI**	I contatti familiari e conviventi, o i contatti stretti sottoposti a sorveglianza sanitaria, in presenza di sintomi relativi a scabbia devono rivolgersi al proprio medico curante o uno specialista. E' importante che il trattamento avvenga contemporaneamente in tutto il nucleo familiare.	
3	**CAMBIO E LAVAGGIO FREQUENTE DELLA BIANCHERIA PERSONALE**	Cambiare quotidianamente biancheria, lenzuola, federe, asciugamani fino al termine del trattamento. Lavare separatamente la biancheria intima, lenzuola e altri indumenti venuti a contatto con la pelle lavandoli a temperatura maggiore di 60°C per 20' in lavatrice con un comune detersivo. Le coperte, cuscini e altri effetti non trattabili con acqua ad alta temperatura è consigliabile chiuderli in un sacco di plastica scuro impermeabile. Tutti gli articoli (*coperte, materassi, ecc.*) che non possono essere lavati a caldo devono essere lavati a secco oppure chiusi in un sacchetto di plastica sigillato per almeno 72 ore/una settimana.	

MISURE DI CONTROLLO PER SCABBIA NELLA COMUNITA'			
AZIONE DI PREVENZIONE		**DESCRIZIONE**	
4	**DISINFEZIONE DEGLI OGGETTI PERSONALI E DELLE SUPERFICI**	Utilizzare apparecchi a getto di vapore ad alta temperatura (*almeno 100C°*) per la disinfestazione di divani, cuscini, poltrone e pavimenti. Pulire gli ambienti utilizzando i comuni prodotti in commercio; sanificare gli ambienti utilizzando i comuni detergenti in commercio. Passare se possibile l'aspirapolvere dopo che una persona infestata è stata trattata, soprattutto per le persone con scabbia norvegese (*il sacchetto dell'aspirapolvere va immediatamente gettato*).	
5	**EVITARE IL CONTATTO DIRETTO CON PERSONE INFETTE**	È opportuno che il paziente eviti contatti prolungati pelle-pelle (*es. rapporti sessuali*) fino a 24 ore dopo l'effettuazione del primo idoneo trattamento. Gli asciugamani devono essere di uso personale e non devono essere condivisi con altre persone. Il paziente deve utilizzare spazzole/pettini personali, evitando lo scambio con altri; tali strumenti dovranno essere disinfettati termicamente o con soluzioni disinfettanti.	