Allegato 2

Protocollo osservazione domiciliare TRAUMA CRANICO per pazienti inviati al proprio domicilio dopo valutazione al Pronto Soccorso

Lei è stato valutato oggi in seguito ad un trauma cranico; usi questo foglio informativo per monitorare il suo stato di salute e per avere indicazioni su come recuperare.

E' molto importante che si assicuri che un familiare o un amico sia a conoscenza di quanto accaduto, in modo che per almeno 24 ore i suoi sintomi e le sue condizioni di salute vengano tenuti sotto controllo.

RARAMENTE, alcuni sintomi meritano una RIVALUTAZIONE MEDICA URGENTE:

- Cefalea ingravescente che non migliora dopo assunzione di antidolorifici (paracetamolo o ibuprofene)
- Nausea importante o ripetuti episodi di vomito
- Comportamenti non abituali, confusione significativa, irrequietezza o franca agitazione, aggressività
- Sonnolenza, incapacità a restare svegli
- Difficoltà a parlare, difficoltà nella coordinazione, debolezza o impossibilità a muovere un braccio e/o una gamba
- Convulsioni
- Perdita di coscienza (svenimento)

IN CASO DI COMPARSA DI UNO O Più DI QUESTI SINTOMI E' INDICATA UNA RIVALUTAZIONE MEDICA URGENTE

NOTA BENE: i sintomi sopra elencati possono comparire anche a distanza di alcune settimane dal trauma, specialmente nelle persone anziane o che assumono terapia con antiaggreganti o anticoagulanti ("farmaci che sciolgono il sangue"). In caso di comparsa di questi sintomi è necessaria una rivalutazione medica urgente, ricordando di specificare al medico che si è verificato di recente un trauma cranico.

Altri segni e sintomi (elencati sotto) fanno parte del normale processo di guarigione dopo un trauma cranico lieve.

SINTOMI FISICI

- fastidio per luci o rumori intensi
- sensazione di instabilità o vertigine
- stanchezza, mancanza di energie
- cefalea
- nausea o rari episodi di vomito (subito dopo il trauma)
- disturbi della vista

SINTOMI MNESICI

- difficoltà a concentrarsi
- sentirsi rallentati o lievemente annebbiati

- difficoltà transitorie nella memoria a breve e lungo termine

SINTOMI EMOTIVI

- Ansia, irritabilità
- Tristezza

SONNO

- Dormire più o meno dell'abituale
- Difficoltà nell'addormentamento

Alcuni di questi sintomi possono apparire subito dopo il trauma, oppure nelle ore o nei giorni successivi, e tendono a migliorare nel corso di alcuni giorni. In alcuni casi i sintomi possono variare nel tempo: ad esempio poco dopo il trauma potrebbe avvertire cefalea e nausea, mentre a distanza di una settimana potrebbe notare che si sente più irritabile o che ha problemi nel sonno.

Nel caso i sintomi suddetti non migliorino o la preoccupino, contatti il suo Medico di Medicina Generale.

INDICAZIONI PER LA GUARIGIONE

E' necessario riprendere gradualmente le normali attività. Il recupero può essere più lento per le persone più anziane, o per chi in passato ha già riportato un trauma cranico.

In particolare, soprattutto nei primi giorni dopo il trauma,

- mangi alimenti semplici e digeribili senza eccedere, eviti gli alcolici
- eviti attività che possono causare un nuovo trauma cranico
- assuma terapia antidolorifica (ad esempio paracetamolo 1000 mg 1 compressa ogni 8 ore, o ibuprofene 400 mg 1 compressa ogni 8 ore a stomaco pieno se non controindicati)
- mantenga un buon igiene del sonno
- eviti una prolungata esposizione agli schermi (cellulare, computer, televisione) o a rumori molto intensi

A causa del trauma, potrebbe avere bisogno di alcuni giorni di riposo da scuola o dal lavoro (solitamente non più di 2-3 giorni). Programmi una visita di controllo presso il suo Medico di Medicina Generale, in modo che possa darle indicazioni su quando tornare al lavoro, a scuola, a fare attività fisica.