

FORL (고양이 파치세포 흡수성 병변)

Feline Odontoclastic Resorptive Lesion



여의도 동물병원
YEUIDO ANIMAL CLINIC

FORL



여의도 동물병원
YEOUIDO ANIMAL CLINIC


FORL ?

고양이에만 있는 파치세포 흡수성 병변
은 파치세포(Odontoclast)가 문제를 일
으켜 치아가 녹는 질환입니다.

6살 이상 고양이의 반 이상이 최소한 한
개 정도의 FORL 치아를 가지고 있습니다.

FORL로 인해 치아 뿌리가 녹은 방사선 사진

여의도동물병원
실제 케이스 사진






여의도 동물병원
YEOUIDO ANIMAL CLINIC

FORL 원인

칼리시 바이러스(CaliciVirus)를 6개월 이상 앓았거나, 칼슘이 너무 적거나, Vit D가 사료에 너무 많을 경우가 가능한 원인으로 추정 중이지만, 아직까지도 정확한 원인은 밝혀지지 않았습니다.

유기물이 많은 정수기물이나 수돗물을 먹을수록 더 심하다는 통계가 있습니다.

칼리시 바이러스의 감염부위





여의도 동물병원
YEOUIDO ANIMAL CLINIC

FORL 증상

FORL 치아를 가진 고양이는 침을 흘리거나, 머리를 흔들거나, 재채기를 하거나, 구강 출혈이 생길 수 있으며, 음식을 먹는데 어려움을 겪을 수도 있습니다. 하지만 어떤 고양이들은 증상을 나타내지 않고 조용하게 앓기도 합니다. 보이지 않는 뿌리 부분이 녹는 경우가 많아, 집에서 눈으로 보아 알기는 힘듭니다. 작은 치아는 보호자분 모르게 녹아서 빠져 없어지기도 하지만, 큰 치아는 녹는데 시간이 오래 걸리며 통증을 일으키게 됩니다. 치아가 녹은 부위를 채우기 위하여 잇몸이 과도하게 증식됩니다. 잇몸이 두꺼워진 부분이 있다면 FORL을 의심해 볼 수 있습니다.

FORL 증상을 보인 길냥이 구조 후 모습

여의도동물병원
실제 케이스 사진



LPGS 치료

통증이 있다면 치과 방사선(덴탈 엑스레이) 검사를 확인합니다. 질병이 초기에 발견 되면 수복재를 적용하거나 근관치료를 시도를 해 볼 수 있으나, 대부분 2년도 버티지 못하고 실패하게 됩니다. 현실적이고 가장 성공적인 추천 치료는 발치입니다. 녹기 시작한 치아는 통증을 일으키기 전에 발치 해 주어야 합니다.


오래되어 거의 다 흡수 된 치아는 마지막 단계로 가면 잇몸이 덮어버리기도 합니다. 이런 경우는 잇몸 덮은 부분에 통증이 있으면 그 잇몸 아래 부분을 치료 해 주어야 합니다. 녹고 난 부분을 채우는 두꺼운 잇몸은 심한 경우 같이 제거하게 됩니다.



치태 제거를 위한
스케일링



바이러스 억제를 위한
인터페론



문제 치아 및 잇몸 속 남은 치아
발치



염증완화 및 면역증강을 위한
영양제

치료 예후

문제 치아를 발치 한 후에는 통증 없이 잘 지내게 됩니다.

하지만 다른 치아에도 추후 같은 병변이 생길 수 있으므로, 지속적으로 관찰 해주시는 것이 필요합니다.

추정되는 원인 중 하나인 칼리시 바이러스에 대한 항체를 높이기 위하여 매년 1회 예방접종을 해 주시는 것이 권장됩니다.

칼리시 바이러스 양성인 고양이는 인터페론이 도움 됩니다. 인터페론은 초기 발병 단계에서부터 적극적으로 치료 해 주시면 성공적인 반응을 기대 할 수 있습니다.

