

LPGS (림프구성 형질세포성 치은구내염)

Lymphoplasmocytic Gingivitis Stomatitis



여의도 동물병원
YEUIDO ANIMAL CLINIC

LPGS



여의도 동물병원
YEOUIDO ANIMAL CLINIC

LPGS ?

LPGS는 치은, 치주 및 목구멍을 비롯한 입안의 염증을 말합니다.

LPGS 명칭 내에 포함되지 않더라도 목구멍까지 염증이 있는 경우가 대부분입니다.



LPGS로 인해 잇몸에 발적 및 부종 발생

여의도동물병원
실제 케이스 사진



여의도 동물병원
YEOUIDO ANIMAL CLINIC

LPGS 원인

치아에 붙은 세균(치태)과 고양이 백혈병 바이러스 (Feline Leukemia Virus, FeLV)나 고양이 면역결핍 바이러스(Feline Immunodeficiency Virus, FIV)와 칼리시 바이러스(CaliciVirus)와 같은 바이러스에 대한 면역 과민반응이 원인입니다. 따라서 치석이 전혀 없는 어린 6개월령 된 아기 고양이도 걸릴 수 있습니다.



FeLV와 FIV 바이러스 검사 키트



여의도 동물병원
YEOUIDO ANIMAL CLINIC

LPGS 증상

초기에는 통증을 참고 밥도 잘 먹기 때문에 알기 어렵습니다. 심해질 경우, 입 주변이 지저분해지고 침을 흘리며 이를 갈기도 합니다. 통증으로 얼굴을 긁기도 하며, 그루밍을 하지 못하여 털이 고르지 못하게 됩니다. 이러한 단계까지 가게 된다면 내복약보다 발치가 필요하게 됩니다.



치통으로 인해 그루밍을 못하고 있는 모습

여의도동물병원
실제 케이스 사진

LPGS 치료

LPGS는 치태에 대한 면역 반응이 원인이므로, 치태 조절을 해주는 양치 및 구강소독과 바이러스 증식을 방해하여 면역을 높여주는 물질인 인터페론 등의 치료가 필요합니다. 치태는 평생 생기므로 평생 관리를 해 주셔야 하나, 장기간동안 홈케어로만 유지하시기 무척 힘듭니다. 그렇기 때문에 발치가 필요한 경우가 많습니다.

당시 문제 치아만 최소로 발치 하게되면 추후 그 외의 이빨도 진행될 확률이 매우 높습니다. 문제 치아 뿐 아니라 송곳니 뒤쪽의 이빨까지 미리 예방차 발치한다면 추가적인 마취와 수술을 줄일 수 있게 됩니다. 발치 후에도 2-4주 정도는 내복약이나 구강 소독이 필요할 수 있습니다.


대부분 3개월 내에는 약을 먹지 않아도 되며, 침흘림 증상도 사라지고, 목구멍염까지 좋아지게 됩니다. 만약 3개월까지 기다려도 낫지 않는다면, 남은 치아까지 전발치가 필요할 수 있습니다. 질환이 많이 진행된 경우 마취와 수술을 많이 줄이기 위해 처음부터 전발치를 진행하는 경우도 많습니다.



치태 제거를 위한
스케일링



바이러스 억제를 위한
인터페론



문제 치아 및 예방을 위한
발치



염증완화 및 면역증강을 위한
영양제

치료 예후

발치 과정 중 뿌리까지 제대로 발치하였느냐는 매우 중요합니다.

뿌리를 남긴 채 치아의 보이는 윗부분만 부순 경우나, 심한 일부 몇개만 발치 치료 한 경우에는 치료 후에도 증상이 좋아지지 않습니다.

전체 발치를 하더라도 식사는 문제 없이 잘 합니다.

통증이 없어지면 일주일 내로 예전보다 더 잘 먹는 모습을 보실 수 있습니다.

13%정도는 전발치 하더라도 평생 면역조절을 위한 내복약과 구강 소독이 필요합니다. 개선되었다가 몇 년 후 다시 재발하기도 합니다. 30%정도는 약 이 간헐적으로 필요하지만, 삶의 질이 매우 개선되며, 훨씬 적은 용량으로도 좋은 효과를 보게 됩니다. 나머지는 투약이 전혀 필요 없이 아프지 않게 잘 지내게 됩니다.

