

# Жорданова нормална форма на линеен оператор и матрица

**Определение 1.** *Триъгълна матрица*

$$J_1(\lambda_1) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} \in M_{n_1 \times n_1}(F),$$

в която диагоналните елементи

$$J_1(\lambda_1)_{i,i} = \lambda_1 \quad \text{за} \quad \forall 1 \leq i \leq n_1$$

са равни на  $\lambda_1 \in F$ , а върху правата, успоредна на главния диагонал и намираща се непосредствено над него стоят единици

$$J_1(\lambda_1)_{i,i+1} = 1 \quad \text{за} \quad \forall 1 \leq i \leq n_1 - 1$$

се нарича *Жорданова клетка*.

*Блочно-диагонална матрица*

$$J = \begin{pmatrix} J_1(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & J_2(\lambda_2) & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & J_{k-1}(\lambda_{k-1}) & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & J_k(\lambda_k) \end{pmatrix} \in M_{n \times n}(F),$$

$n = n_1 + \dots + n_k$ , чиито диагонални блокове  $J_i(\lambda_i)$  са Жорданови клетки се нарича *Жорданова матрица*.

Ще докажем, че ако всички характеристични корени  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  на линеен оператор  $\varphi : V \rightarrow V$  в крайномерно пространство  $V$  над поле  $F$  принадлежат на  $F$ , то съществува базис  $v_1, \dots, v_n$  на  $V$ , в който матрицата на  $\varphi$  е Жорданова. Ще казваме, че  $v_1, \dots, v_n$  е Жорданов базис за  $\varphi : V \rightarrow V$ .

Нека  $A \in M_{n \times n}(F)$  е матрица, чиито всички характеристични корени  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  принадлежат на  $F$ . Тогава съществува обратима матрица  $T \in M_{n \times n}(F)$ , така че  $J = T^{-1}AT$  е Жорданова. По-точно, фиксираме базис  $e = (e_1, \dots, e_n)$  на  $n$ -мерно пространство  $V$  над  $F$  и разглеждаме оператора  $\varphi : V \rightarrow V$  с матрица  $A$  спрямо  $e$ . Тогава всички характеристични корени  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  на  $\varphi$  принадлежат на  $F$  и съществува Жорданов базис  $v = (v_1, \dots, v_n)$  на  $V$ , в който матрицата  $J$  на  $\varphi$  е Жорданова. Ако  $T \in M_{n \times n}(F)$  е матрицата на прехода от базиса  $e$  към базиса  $v = eT$  на  $V$ , то  $J = T^{-1}AT$  и матрицата  $A$  е подобна на Жордановата матрица  $J$ .

Ще установим, че Жордановата матрица  $J$  на  $\varphi : V \rightarrow V$  е еднозначно определена с точност до реда на Жордановите си клетки, доказвайки че броят  $N_r(\lambda_i)$  на Жордановите клетки  $J_r(\lambda_i) \in M_{r \times r}(F)$  с размер  $r \in \mathbb{N}$  и диагонален елемент  $\lambda_i$  не зависи от избора на Жорданов базис на  $V$ .

**Твърдение 2.** За произволен линеен оператор  $\varphi : V \rightarrow V$  в крайномерно пространство  $V$  над поле  $F$  съществува  $m \in \mathbb{N}$ , така че

$$V = \ker(\varphi^m) \oplus \operatorname{im}(\varphi^m)$$

е директна сума на ядрото и образа на  $\varphi^m : V \rightarrow V$ .

*Доказателство.* Да забележим, че образите на  $\varphi^s : V \rightarrow V$ ,  $s \in \mathbb{N}$  образуват нарастваща редица

$$V \supseteq \operatorname{im}(\varphi) \supseteq \operatorname{im}(\varphi^2) \supseteq \dots \supseteq \operatorname{im}(\varphi^s) \supseteq \operatorname{im}(\varphi^{s+1}) \supseteq \dots,$$

защото за произволен вектор  $v \in V$  можем да представим  $\varphi^{s+1}(v) = \varphi^s \varphi(v) \in \operatorname{im}(\varphi^s)$ . Съответната редица от размерности

$$\dim(V) \geq \operatorname{rk}(\varphi) \geq \operatorname{rk}(\varphi^2) \geq \dots \geq \operatorname{rk}(\varphi^s) \geq \operatorname{rk}(\varphi^{s+1}) \geq \dots$$

е нарастваща и съществува  $m \in \mathbb{Z}^{\geq 0}$  с  $\operatorname{rk}(\varphi^m) = \operatorname{rk}(\varphi^{m+1})$ . Подпространството  $\operatorname{im}(\varphi^{m+1})$  съвпада с  $\operatorname{im}(\varphi^m)$ , защото  $\operatorname{im}(\varphi^{m+1})$  и  $\operatorname{im}(\varphi^m)$  имат равни размерности

$$\dim \operatorname{im}(\varphi^m) = \operatorname{rk}(\varphi^m) = \operatorname{rk}(\varphi^{m+1}) = \dim \operatorname{im}(\varphi^{m+1}).$$

Без ограничение на общността ще считаме, че  $m \in \mathbb{Z}^{\geq 0}$  е минималното неотрицателно цяло с  $\operatorname{im}(\varphi^m) = \operatorname{im}(\varphi^{m+1})$ . С индукция по  $k \in \mathbb{N}$ , оттук следва

$$\operatorname{im}(\varphi^m) = \operatorname{im}(\varphi^{m+k}),$$

защото прилагането на  $\varphi^{k-1}$  към  $\operatorname{im}(\varphi^m) = \varphi^m(V) = \varphi^{m+1}(V) = \operatorname{im}(\varphi^{m+1})$  дава  $\operatorname{im}(\varphi^{m+k-1}) = \varphi^{m+k-1}(V) = \varphi^{m+k}(V) = \operatorname{im}(\varphi^{m+k})$ . Комбинирайки с индукционното предположение  $\operatorname{im}(\varphi^m) = \operatorname{im}(\varphi^{m+k-1})$  получаваме  $\operatorname{im}(\varphi^m) = \operatorname{im}(\varphi^{m+k})$ .

В частност,  $\operatorname{im}(\varphi^m) = \operatorname{im}(\varphi^{2m})$  и за произволен вектор  $v \in V$  съществува  $w \in V$ , така че  $\varphi^m(v) = \varphi^{2m}(w)$ . В резултат,  $\varphi^m(v - \varphi^m(w)) = \vec{0}$ , откъдето  $v - \varphi^m(w) \in \ker(\varphi^m)$ . Представянето

$$v = [v - \varphi^m(w)] + \varphi^m(w) \in \ker(\varphi^m) + \operatorname{im}(\varphi^m)$$

за произволен вектор  $v \in V$  доказва, че

$$V = \ker(\varphi^m) + \operatorname{im}(\varphi^m)$$

е сума на ядрото и образа на  $\varphi^m : V \rightarrow V$ .

По Теоремата за размерността на сума и сечение,

$$\begin{aligned} \dim V &= \dim \ker(\varphi^m) + \dim \operatorname{im}(\varphi^m) - \dim(\ker(\varphi^m) \cap \operatorname{im}(\varphi^m)) = \\ &= d(\varphi^m) + \operatorname{rk}(\varphi^m) - \dim(\ker(\varphi^m) \cap \operatorname{im}(\varphi^m)), \end{aligned}$$

където  $d(\varphi^m) := \dim \ker(\varphi^m)$  е дефектът на  $\varphi^m$ , а  $\operatorname{rk}(\varphi^m) := \dim \operatorname{im}(\varphi^m)$  е рангът на  $\varphi^m$ . От друга страна, Теоремата за ранга и дефекта на  $\varphi^m : V \rightarrow V$  изисква

$$d(\varphi^m) + \operatorname{rk}(\varphi^m) = \dim V,$$

така че

$$\dim(\ker(\varphi^m) \cap \operatorname{im}(\varphi^m)) = 0 \quad \text{и} \quad \ker(\varphi^m) \cap \operatorname{im}(\varphi^m) = \{\vec{0}\}.$$

Това доказва, че сумата

$$V = \ker(\varphi^m) \oplus \operatorname{im}(\varphi^m)$$

е директна и завършва доказателството на твърдението. □

**Твърдение 3.** Нека  $\varphi : V \rightarrow V$  е линеен оператор в крайномерно пространство  $V$  над поле  $F$ , чиито всички характеристични корени  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ ,  $k \leq n$  принадлежат на  $F$  и  $\psi_i := \varphi - \lambda_i \text{Id}$  за  $1 \leq i \leq k$ . Тогава съществуват  $m_i \in \mathbb{N}$ , така че

$$V = \ker(\psi_1^{m_1}) \oplus \dots \oplus \ker(\psi_k^{m_k})$$

е директна сума на  $\varphi$ -инвариантните подпространства  $\ker(\psi_i^{m_i})$ , върху които операторът  $\varphi : \ker(\psi_i^{m_i}) \rightarrow \ker(\psi_i^{m_i})$  има единствена собствена стойност  $\lambda_i$ .

*Доказателство.* По Лемата на Фитинг съществува  $m_1 \in \mathbb{N}$ , така че

$$V = \ker(\psi_1^{m_1}) \oplus \text{im}(\psi_1^{m_1}).$$

Твърдим, че подпространствата  $\ker(\psi_1^{m_1})$  и  $\text{im}(\psi_1^{m_1})$  са  $\varphi$ -инвариантни. Наистина, от

$$\varphi\psi_1 = \varphi(\varphi - \lambda_1 \text{Id}) = \varphi^2 - \lambda_1 \varphi = (\varphi - \lambda_1 \text{Id})\varphi = \psi_1 \varphi$$

следва

$$\varphi\psi_1^{m_1} = \psi_1^{m_1}\varphi.$$

Ако  $v \in \ker(\psi_1^{m_1})$ , то  $\psi_1^{m_1}(\varphi(v)) = \varphi(\psi_1^{m_1}(v)) = \varphi(\vec{0}) = \vec{0}$ , така че  $\varphi(\ker(\psi_1^{m_1})) \subseteq \ker(\psi_1^{m_1})$  и  $\ker(\psi_1^{m_1})$  е  $\varphi$ -инвариантно подпространство на  $V$ . Аналогично, за всяко  $\psi_1^{m_1}(u) \in \text{im}(\psi_1^{m_1})$  е в сила  $\varphi(\psi_1^{m_1}(u)) = \psi_1^{m_1}\varphi(u) \in \text{im}(\psi_1^{m_1})$ , откъдето  $\varphi(\text{im}(\psi_1^{m_1})) \subseteq \text{im}(\psi_1^{m_1})$  и  $\text{im}(\psi_1^{m_1})$  е  $\varphi$ -инвариантно подпространство на  $V$ .

По предположение, всички характеристични корени  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  на  $\varphi : V \rightarrow V$  принадлежат на  $F$ , така че  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  са собствените стойности на  $\varphi : V \rightarrow V$ . Ако  $v_1 \in V$  е собствен вектор на  $\varphi : V \rightarrow V$ , отговарящ на собствената стойност  $\lambda_1$ , то твърдим че  $v_1 \in \ker(\psi_1^{m_1})$  и  $v_1$  е собствен вектор на  $\varphi : \ker(\psi_1^{m_1}) \rightarrow \ker(\psi_1^{m_1})$ . Наистина, от  $\varphi(v_1) = \lambda_1 v_1$  следва  $\psi_1(v_1) = \varphi(v_1) - \lambda_1 v_1 = \vec{0}$ , така че  $v_1 \in \ker(\psi_1) \subseteq \ker(\psi_1^{m_1})$ . Ако  $v \in \ker(\psi_1^{m_1}) \setminus \{\vec{0}\}$  е собствен вектор на  $\varphi : \ker(\psi_1^{m_1}) \rightarrow \ker(\psi_1^{m_1})$ , отговарящ на собствена стойност  $\lambda \in F$ , то твърдим, че  $\lambda = \lambda_1$ . По-точно, от  $\varphi(v) = \lambda v$  следва  $\psi_1(v) = (\lambda - \lambda_1)v$ , така че  $\vec{0} = \psi_1^{m_1}(v) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1}v$  за ненулевия вектор  $v$  изисква  $\lambda = \lambda_1$ .

Нека  $v_i \in V \setminus \{\vec{0}\}$  е собствен вектор на  $\varphi : V \rightarrow V$ , отговарящ на собствена стойност  $\lambda_i$  за някое  $2 \leq i \leq k$ . Твърдим, че  $v_i \in \text{im}(\psi_1^{m_1})$ . За целта да забележим, че от  $\varphi(v_i) = \lambda_i v_i$  следва  $\psi_1(v_i) = (\lambda_i - \lambda_1)v_i$ . Следователно

$$(\lambda_i - \lambda_1)^{m_1} v_i = \psi_1^{m_1}(v_i) \in \text{im}(\psi_1^{m_1})$$

с  $(\lambda_i - \lambda_1)^{m_1} \neq 0$  и понеже  $\text{im}(\psi_1^{m_1})$  е подпространство на  $V$ , получаваме

$$v_i = \frac{1}{(\lambda_i - \lambda_1)^{m_1}} \psi_1^{m_1}(v_i) \in \text{im}(\psi_1^{m_1}).$$

Ако  $v \in \text{im}(\psi_1^{m_1}) \setminus \{\vec{0}\}$  е собствен вектор на  $\varphi : \text{im}(\psi_1^{m_1}) \rightarrow \text{im}(\psi_1^{m_1})$ , отговарящ на собствена стойност  $\lambda$ , то от  $v \in V$  следва, че  $\lambda$  е собствена стойност на  $\varphi : V \rightarrow V$  и  $\lambda \in \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ . Ако  $\lambda = \lambda_1$ , то съгласно доказаното по-горе  $v \in \ker(\psi_1^{m_1})$ , откъдето  $v \in \text{im}(\psi_1^{m_1}) \cap \ker(\psi_1^{m_1}) = \{\vec{0}\}$ . Противоречието доказва, че собствените стойности на  $\varphi : \text{im}(\psi_1^{m_1}) \rightarrow \text{im}(\psi_1^{m_1})$  са  $\lambda_2, \dots, \lambda_k$ .

С индукция по  $k$ , от разлагането  $V = \ker(\psi_1^{m_1}) \oplus \text{im}(\psi_1^{m_1})$  в директна сума на  $\varphi$ -инвариантни подпространства  $\ker(\psi_1^{m_1})$ ,  $\text{im}(\psi_1^{m_1})$  с единствена собствена стойност  $\lambda_1$  на  $\varphi : \ker(\psi_1^{m_1}) \rightarrow \ker(\psi_1^{m_1})$  и собствени стойности  $\lambda_2, \dots, \lambda_k$  на  $\varphi : \text{im}(\psi_1^{m_1}) \rightarrow \text{im}(\psi_1^{m_1})$

следва доказаното твърдение, стига да установим, че ако  $\varphi : V \rightarrow V$  има единствена собствена стойност  $\lambda_1$ , то

$$V = \ker(\psi_1^{m_1}) \quad \text{за някое } m_1 \in \mathbb{N}.$$

Допускаме противното. Тогава в разлагането  $V = \ker(\psi_1^{m_1}) \oplus \text{im}(\psi_1^{m_1})$  от Лемата на Фитинг имаме  $\text{im}(\psi_1^{m_1}) \neq \{\vec{0}\}$ . Произволен собствен вектор  $v_1 \in V \setminus \{\vec{0}\}$  на  $\varphi : V \rightarrow V$ , отговарящ на собствена стойност  $\lambda_1$  принадлежи на  $\ker(\psi_1) \subseteq \ker(\psi_1^{m_1})$ , така че и  $\ker(\psi_1^{m_1}) \neq \{\vec{0}\}$ . Ако  $e_1, \dots, e_s$  е базис на  $\ker(\psi_1^{m_1})$  и  $e_{s+1}, \dots, e_n$  е базис на  $\text{im}(\psi_1^{m_1})$ , то матрицата  $A \in M_{n \times n}(F)$  на  $\varphi : V \rightarrow V$  спрямо базиса  $e_1, \dots, e_s, e_{s+1}, \dots, e_n$  на  $V$  е

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbb{O}_{s \times (n-s)} \\ \mathbb{O}_{(n-s) \times s} & A_2 \end{pmatrix},$$

където  $A_1 \in M_{s \times s}(F)$  е матрицата на  $\varphi : \ker(\psi_1^{m_1}) \rightarrow \ker(\psi_1^{m_1})$  спрямо базиса  $e_1, \dots, e_s$  на  $\ker(\psi_1^{m_1})$ , а  $A_2 \in M_{(n-s) \times (n-s)}(F)$ , е матрицата на  $\varphi : \text{im}(\psi_1^{m_1}) \rightarrow \text{im}(\psi_1^{m_1})$  спрямо базиса  $e_{s+1}, \dots, e_n$ . Характеристичният полином

$$(x - \lambda_1)^n = f_A(x) = f_{A_1}(x)f_{A_2}(x)$$

на  $A$  е произведение на характеристичните полиноми  $f_{A_1}(x)$ ,  $f_{A_2}(x)$  на  $A_1$  и  $A_2$  от степен  $\deg f_{A_1}(x) = s \geq 1$ ,  $\deg f_{A_2}(x) = n - s \geq 1$ . Следователно  $\lambda_1 \in F$  е корен на  $f_{A_2}(x) = 0$ , а оттам и характеристичен корен на  $\varphi : \text{im}(\psi_1^{m_1}) \rightarrow \text{im}(\psi_1^{m_1})$ . Оттук,  $\lambda_1$  е собствена стойност на  $\varphi : \text{im}(\psi_1^{m_1}) \rightarrow \text{im}(\psi_1^{m_1})$  и съществува собствен вектор  $v_1 \in \text{im}(\psi_1^{m_1}) \setminus \{\vec{0}\}$  на  $\varphi : \text{im}(\psi_1^{m_1}) \rightarrow \text{im}(\psi_1^{m_1})$ . Но тогава  $v_1 \in V \setminus \{\vec{0}\}$  е собствен вектор на  $\varphi : V \rightarrow V$ , отговарящ на единствената собствена стойност  $\lambda_1$  и  $v_1 \in \ker(\psi_1^{m_1})$  съгласно доказаното по-горе. В резултат,  $v_1 \in \text{im}(\psi_1^{m_1}) \cap \ker(\psi_1^{m_1}) = \{\vec{0}\}$  е противоречие, доказващо  $\text{im}(\psi_1^{m_1}) = \{\vec{0}\}$  и  $V = \ker(\psi_1^{m_1})$ , ако  $\varphi : V \rightarrow V$  има единствена собствена стойност  $\lambda_1$ .  $\square$

Поради  $\varphi$ -инвариантността на подпространствата  $V_i = \ker(\psi_i^{m_i})$  за  $\psi_i := \varphi - \lambda_i \text{Id}$ ,  $1 \leq i \leq k$ , матрицата  $A \in M_{n \times n}(F)$  на  $\varphi : V \rightarrow V$  спрямо обединение на базиси на  $V_i$  е от вида

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & A_k \end{pmatrix},$$

където  $A_i$  е матрицата на  $\varphi : V_i \rightarrow V_i$  спрямо избрания базис. Достатъчно е докажем съществуването на Жорданов базис за линеен оператор  $\psi_o : W \rightarrow W$  с единствена собствена стойност  $\lambda$  в крайномерно пространство  $W$ , за да получим съществуването на Жорданов базис за линеен оператор  $\varphi : V \rightarrow V$  в крайномерно пространство  $V$ , чиито всички характеристични корени принадлежат на основното поле  $F$ . Разглежданията за  $\psi_o$  се свеждат до разсъжденията за линейния оператор  $\psi := \psi_o - \lambda \text{Id} : W \rightarrow W$  с единствена собствена стойност  $0$ , защото матриците  $\mathcal{A}_\psi$  и  $\mathcal{A}_{\psi_o}$  на  $\psi$  и  $\psi_o$  спрямо произволен базис на  $W$  са свързани с равенството  $\mathcal{A}_\psi = \mathcal{A}_{\psi_o} - \lambda E_n$  за  $n = \dim(W)$ . По този начин, съществуването на Жорданов базис се свежда до следното

**Твърдение 4.** *Ако  $\psi : W \rightarrow W$  е линеен оператор с единствена собствена стойност  $0$  в  $n$ -мерно пространство  $W$  над поле  $F$ , то съществува базис на  $W$ , в който матрицата  $J$  на  $\psi : W \rightarrow W$  е Жорданова.*

*Доказателство.* Жордановата матрица  $J$  се състои от Жорданови клетки с нулеви елементи по диагонала. Всяка такава клетка

$$J_i(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{n_i \times n_i}(F)$$

отговаря на линейно независими вектори  $v_i^{(n_i)}, v_i^{(n_i-1)}, \dots, v_i^{(1)}$ , върху които  $\psi$  действа по правилото

$$\psi(v_i^{(j)}) = v_i^{(j-1)} \quad \text{за} \quad \forall 1 \leq j \leq n_i \quad \text{и} \quad v_i^{(0)} := \vec{\mathcal{O}}_W.$$

Подреждаме тези вектори в редица

$$\begin{array}{c} \vec{\mathcal{O}}_W \\ \uparrow \\ v_i^{(1)} \\ \uparrow \\ v_i^{(2)} \\ \uparrow \\ \vdots \\ \uparrow \\ v_i^{(n_i-1)} \\ \uparrow \\ v_i^{(n_i)} \end{array}$$

Ако

$$J = \begin{pmatrix} J_1(0) & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & J_2(0) & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & J_{t-1}(0) & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & J_t(0) \end{pmatrix}$$

за някое  $t \in \mathbb{N}$ , то търсеният Жорданов базис на  $W$  е от вида

$$\begin{array}{ccc}
 \vec{\mathcal{O}}_W & \cdots & \vec{\mathcal{O}} \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 v_1^{(1)} & \cdots & v_t^{(1)} \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 \vdots & \cdots & \vdots \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 v_1^{(n_1-1)} & \cdots & \vdots \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 v_1^{(n_1)} & \cdots & v_t^{(n_t-1)} \\
 & & \uparrow \\
 & & v_t^{(n_t)}
 \end{array} \tag{1}$$

Ще докажем съществуването на Жорданов базис с индукция по  $\dim(W) = n_1 + \dots + n_t = n$ . Ако  $\dim(W) = 1$ , то произволен ненулев вектор  $w_1 \in W \setminus \{\vec{\mathcal{O}}_W\}$  е собствен и образува Жорданов базис на  $W$ . В общия случай, съществуването на собствен вектор  $w_1 \in W \setminus \{\vec{\mathcal{O}}_W\}$ , отговарящ на единствената собствена стойност 0 на  $\psi : W \rightarrow W$  дава  $w_1 \in \ker(\psi)$ , така че  $\ker(\psi) \neq \{\vec{\mathcal{O}}_W\}$  и  $\text{im}(\psi) \subset W$ ,  $\text{im}(\psi) \neq W$  е собствено  $\psi$ -инвариантно подпространство на  $W$ . Следователно  $\dim \text{im}(\psi) < \dim(W) = n$  и по индукционно предположение съществува Жорданов базис на  $\text{im}(\psi)$  от вида (1). За всеки от векторите  $v_i^{(n_i)} \in \text{im}(\psi)$ ,  $1 \leq i \leq t$  избираме  $v_i^{(n_i+1)} \in W$  с  $\psi(v_i^{(n_i+1)}) = v_i^{(n_i)}$ .

Ако е нужно, допълваме линейно независимите вектори  $v_1^{(1)}, \dots, v_t^{(1)} \in \ker(\psi)$  до базис  $v_1^{(1)}, \dots, v_t^{(1)}, v_{t+1}^{(1)}, \dots, v_s^{(1)}$  на  $\ker(\psi)$ . Твърдим, че

$$B = \left\{ v_i^{(j)} \mid 1 \leq i \leq t, \quad 1 \leq j \leq n_i + 1 \right\} \cup \left\{ v_{t+1}^{(1)}, \dots, v_s^{(1)} \right\}$$

е Жорданов базис на  $W$ . Броят на тези вектори е

$$\dim \text{im}(\psi) + t + [\dim \ker(\psi) - t] = \text{rk}(\psi) + d(\psi) = n,$$

така че е достатъчно да установим линейната независимост на  $B$ , за да получим че  $B$  е Жорданов базис и да докажем твърдението. За целта разглеждаме линейна комбинация

$$\sum_{i=1}^t \sum_{j=2}^{n_i+1} \mu_{i,j} v_i^{(j)} + \sum_{i=1}^s \mu_{i,1} v_i^{(1)} = \vec{\mathcal{O}}_W \tag{2}$$

на векторите от  $B$ , която е равна на нулевия вектор  $\vec{\mathcal{O}}_W$  на  $W$ . Отделяме от тази линейна комбинация събираемите  $\mu_{i,1} v_i^{(1)} \in \ker(\psi)$  от ядрото на  $\psi$  и действаме с  $\psi$  върху нея. Получаваме

$$\vec{\mathcal{O}}_W = \sum_{i=1}^t \sum_{j=2}^{n_i+1} \mu_{i,j} v_i^{(j-1)} = \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^{n_i} \mu_{i,j+1} v_i^{(j)} \in \text{im}(\psi).$$

По предположение, векторите  $v_i^{(j)}$  за  $1 \leq i \leq t$ ,  $1 \leq j \leq n_i$  са линейно независими, така че  $\mu_{i,j+1} = 0$  за всички  $1 \leq i \leq t$ ,  $1 \leq j \leq n_i$  и (2) приема вида

$$\sum_{i=1}^s \mu_{i,1} v_i^{(1)} = \vec{0}_W.$$

Понеже  $v_1^{(1)}, \dots, v_s^{(1)}$  е базис на  $\ker(\psi)$ , оттук следва  $\mu_{i,1} = 0$  за всички  $1 \leq i \leq s$ , така че  $B$  е линейно независима система вектори, а оттам и Жорданов базис на  $W$ .  $\square$

Горните разглеждания доказват следната

**Теорема 5.** *Ако всички характеристични корени на линейен оператор  $\varphi : V \rightarrow V$  в крайномерно пространство  $V$  над поле  $F$  принадлежат на основното поле  $F$ , то съществува Жорданов базис на  $V$  за  $\varphi$ , в който матрицата на  $\varphi$  е*

$$J = \begin{pmatrix} J_1(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & J_2(\lambda_2) & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & J_{m-1}(\lambda_{m-1}) & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & J_m(\lambda_m) \end{pmatrix}$$

с Жорданови клетки

$$J_i(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_i \end{pmatrix} \in M_{n_i \times n_i}(F), \quad n_1 + \dots + n_m = n.$$

За да установим, че Жордановата матрица на  $\varphi : V \rightarrow V$  е единствена с точност до реда на Жордановите клетки  $J_i(\lambda_i)$  ще докажем, че броят  $N_r(\lambda_i)$  на Жордановите клетки с размер  $r$  и диагонален елемент  $\lambda_i$  не зависи от избора на Жорданов базис на  $V$ . Да напомним, че Жордановите клетки  $J_i(\lambda_i)$  задават действието на оператора  $\varphi : \ker(\psi_i^{m_i}) \rightarrow \ker(\psi_i^{m_i})$ . Затова можем да считаме, че  $\varphi : W \rightarrow W$  има единствена собствена стойност  $\lambda_i$  в  $W$ . Заменяйки  $\varphi$  и  $\psi := \varphi - \lambda_i \text{Id}$ , свеждаме разглежданията към следното

**Твърдение 6.** *Нека  $\psi : W \rightarrow W$  е линейен оператор с единствена собствена стойност 0 в  $n$ -мерно пространство  $W$  над поле  $F$ . Тогава за всяко  $r \in \mathbb{N}$  броят  $N_r = N_r(0)$  на Жордановите клетки с размер  $r$  и диагонален елемент 0 в Жорданова матрица на  $\psi : W \rightarrow W$  е*

$$N_r = \text{rk}(\psi^{r+1}) - 2\text{rk}(\psi^r) + \text{rk}(\psi^{r-1}).$$

*Доказателство.* Съгласно Теоремата за ранга и дефекта на линейно изображение на крайномерно пространство,

$$\begin{aligned} & \text{rk}(\psi^{r+1}) - 2\text{rk}(\psi^r) + \text{rk}(\psi^{r-1}) = \\ & = [n - d(\psi^{r+1})] - 2[n - d(\psi^r)] + [n - d(\psi^{r-1})] = 2d(\psi^r) - d(\psi^{r+1}) - d(\psi^{r-1}). \end{aligned}$$

Твърдим, че първите  $r$  реда  $\{v_i^{(j)} \mid 1 \leq i \leq t, \quad 1 \leq j \leq r\}$  на Жордановия базис (1) образуват базис на  $\ker(\psi^r)$ . От една страна,  $\psi(v_i^{(j)}) = v_i^{(j-1)}$  дава  $\psi^r(v_i^{(j)}) = v_i^{(j-r)}$ ,

откъдето  $\psi^r(v_i^{(j)}) = \vec{0}_W$  за  $\forall 1 \leq j \leq r, \forall 1 \leq i \leq t$ . Това доказва, че първите  $r$  реда на (1) и тяхната линейна обвивка се съдържат в  $\ker(\psi^r)$ . Обратно, ако  $w \in \ker(\psi^r)$ , то

$$w = \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^{n_i} x_{i,j} v_i^{(j)} = \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^r x_{i,j} v_i^{(j)} + \sum_{i=1}^t \sum_{j=r+1}^{n_i} x_{i,j} v_i^{(j)}$$

за координатите  $x_{i,j} \in F$  на  $w$  спрямо Жордановия базис (1). По предположение,

$$\vec{0}_W = \psi^r(w) = \sum_{i=1}^t \sum_{j=r+1}^{n_i} x_{i,j} v_i^{(j-r)}.$$

Векторите  $\{v_i^{(j-r)} \mid 1 \leq i \leq t, r+1 \leq j \leq n_i\}$  са линейно независими като част от Жордановия базис (1), откъдето  $x_{i,j} = 0$  за всички  $1 \leq i \leq t$  и  $r+1 \leq j \leq n_i$ . Следователно

$$w = \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^r x_{i,j} v_i^{(j)} \in l(v_i^{(j)} \mid 1 \leq i \leq t, 1 \leq j \leq r),$$

така че  $\ker(\psi^r)$  се съдържа, а оттам и съвпада с линейната обвивка на първите  $r$  реда на (1). Оттук следва, че дефектът  $d(\psi^r) := \dim \ker(\psi^r)$  на  $\psi^r : W \rightarrow W$  е равен на броя на векторите от Жордановия базис, които се намират в първите  $r$  реда. Разликата  $d(\psi^r) - d(\psi^{r-1})$  е точно броят на векторите от Жордановия базис, които се намират в  $r$ -тия ред на (1) или броят на Жордановите клетки с размер  $\geq r$  в Жорданова матрица на  $\psi : W \rightarrow W$ . Аналогично,  $d(\psi^{r+1}) - d(\psi^r)$  е броят на Жордановите клетки с размер  $\geq r+1$  в Жорданова матрица на  $\psi : W \rightarrow W$ . Следователно

$$[d(\psi^r) - d(\psi^{r-1})] - [d(\psi^{r+1}) - d(\psi^r)] = 2d(\psi^r) - d(\psi^{r-1}) - d(\psi^{r+1})$$

съвпада с броя  $N_r$  на Жордановите клетки с размер  $r$  в Жорданова матрица на оператора  $\psi : W \rightarrow W$ .

□

АЛГОРИТЪМ ЗА НАМИРАНЕ НА ЖОРДАНОВ БАЗИС ЗА ЛИНЕЕН ОПЕРАТОР  $\varphi$  В КРАЙНОМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НАД ПОЛЕ  $F$ , АКО ВСИЧКИ ХАРАКТЕРИСТИЧНИ КОРЕНИ НА  $\varphi$  СА ОТ ОСНОВНОТО ПОЛЕ  $F$ :

Съгласно Твърдение 3, ако  $\psi_i := \varphi - \lambda_i \text{Id}$ , то съществуват  $m_i \in \mathbb{N}$ , така че  $V = \ker(\psi_1^{m_1}) \oplus \dots \oplus \ker(\psi_k^{m_k})$  е директна сума на своите  $\varphi$ -инвариантни подпространства  $V_i := \ker(\psi_i^{m_i})$ , в които  $\varphi : \ker(\psi_i^{m_i}) \rightarrow \ker(\psi_i^{m_i})$  има единствена собствена стойност  $\lambda_i$ . Нека  $A \in M_{n \times n}(F)$  е матрицата на  $\varphi : V \rightarrow V$  спрямо някакъв базис на  $V$ . Тогава  $B_i := A - \lambda_i E_n$ ,  $1 \leq i \leq k$  са матриците на  $\psi_i$  спрямо този базис и  $\dim(V_i)$  е алгебричната кратност на корена  $\lambda_i$  на характеристичния полином  $f_\varphi(x) = f_A(x) = \det(A - xE_n)$  на  $\varphi : V \rightarrow V$ . Това следва от Твърдение 4, в което операторът  $\psi : W \rightarrow W$  с единствена собствена стойност 0 и Жорданова матрица

$$J = \begin{pmatrix} J_1(0) & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & J_2(0) & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & J_{r-1}(0) & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & J_r(0) \end{pmatrix}$$



в  $m$ -мерно пространство  $W$  има характеристичен полином

$$f_\psi(x) = f_J(x) = \det(J - xE_m) = (-1)^m x^m$$

с единствен характеристичен корен  $x_0 = 0$ , чиято алгебрична кратност е равна на размерността  $m$  на  $W$ .

Да напомним, че  $V = \ker(\psi_i^{m_i}) \oplus \text{im}(\psi_i^{m_i})$  за минималните естествени  $m_i$ , за които  $\text{rk}(\psi_i^{m_i}) = \text{rk}(\psi_i^{m_i+1})$ . Вземайки предвид  $\text{rk}(\psi_i^s) = \text{rk}(B_i^s)$  за  $\forall s \in \mathbb{N}$ , избираме  $m_i \in \mathbb{N}$  като минималното естествено число, за което  $\text{rk}(B_i^{m_i}) = \text{rk}(B_i^{m_i+1})$ . След това описваме подпространството  $V_i = \ker(\psi_i^{m_i})$  като множеството от решения на хомогенната система линейни уравнения с матрица  $B_i^{m_i}$ .

Във всяко  $V_i$  разглеждаме редицата от подпространства

$$V_i \supset (V_i \cap \text{im}(\psi)) \supset (V_i \cap \text{im}(\psi_i^2)) \supset \dots \supset (V_i \cap \text{im}(\psi_i^{m_i-1})).$$

Тогава  $V_i \cap \text{im}(\psi_i^{m_i-1}) \subseteq \ker(\psi_i)$ , защото за произволен вектор  $\psi_i^{m_i-1}(v) \in V_i = \ker(\psi_i^{m_i})$ ,  $v \in V$  имаме

$$\psi_i(\psi_i^{m_i-1}(v)) = \psi_i^{m_i}(v) \in \text{im}(\psi_i^{m_i}) \cap \ker(\psi_i^{m_i}) = \{\vec{0}_V\},$$

съгласно инвариантността на  $V_i = \ker(\psi_i^{m_i})$  относно  $\psi_i$ .

Започваме с избор на базис на  $V_i \cap \text{im}(\psi_i^{m_i-1})$ .

За всяко  $1 \leq l \leq m_i$ , ако сме избрали Жорданов базис

$$\{v_i^{(j)} \mid 1 \leq i \leq s, \quad 1 \leq j \leq n_i\}$$

на  $V_i \cap \text{im}(\psi_i^l)$ , то намираме вектори  $v_i^{(n_i+1)} \in V_i$  с  $\psi_i(v_i^{(n_i+1)}) = v_i^{(n_i)}$  за всички  $1 \leq i \leq s$ . Ако е необходимо, допълваме базиса на подпространството  $\ker(\psi_i) \cap V_i \cap \text{im}(\psi_i^l)$  до базис на подпространството  $\ker(\psi_i) \cap V_i \cap \text{im}(\psi_i^{l-1})$  на  $V_i$ . С избора на единствен вектор  $v_i^{(n_i+1)} \in V_i$  с  $\psi_i(v_i^{(n_i+1)}) = v_i^{(n_i)}$  не губим "степен на свобода", защото множеството от решения на  $B_i x = v_i^{(n_i)}$  е във взаимно еднозначно съответствие с множеството от решения на  $B_i x = \vec{0}$  и допълваме векторите  $v_i^{(n_i+1)} \in V_i \cap \text{im}(\psi_i^{l-1})$  до базис на  $\ker(\psi_i) \cap V_i \cap \text{im}(\psi_i^{l-1})$ .

**Задача 7.** *Спрямо някакъв базис на линейното пространство  $V$  над числово поле  $F$ , операторът  $\varphi : V \rightarrow V$  има матрица*

$$(i) \quad A_1 = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 5 & -1 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad (ii) \quad A_2 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \\ 6 & 1 & -1 & 1 \\ -6 & -1 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Да се намери базис на  $V$ , в който матрицата  $J$  на  $\varphi$  е Жорданова, както и тази матрица  $J$ .

*Решение:* (i) Характеристичният полином на  $A_1$  е

$$\begin{aligned} f_{A_1}(x) &= \begin{vmatrix} -2-x & -1 & 1 \\ 5 & -1-x & 4 \\ 5 & 1 & 2-x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2-x & -1 & 1 \\ x^2+3x+7 & 0 & 3-x \\ 3-x & 0 & 3-x \end{vmatrix} = \\ &= (3-x) \begin{vmatrix} x^2+3x+7 & 1 \\ 3-x & 1 \end{vmatrix} = (3-x)(x^2+4x+4) = -(x+2)^2(x-3). \end{aligned}$$

Характеристичният корен  $\lambda_1 = -2 \in \mathbb{Q} \subseteq F$  е с алгебрична кратност 2, а характеристичният корен  $\lambda_2 = 3 \in \mathbb{Q} \subseteq F$  е с алгебрична кратност 1. Операторът  $\psi_1 := \varphi - \lambda_1 \text{Id} = \varphi + 2\text{Id}$  има матрица

$$B_1 = A + 2E_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 4 \\ 5 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

спрямо дадения базис. Забелязваме, че матрицата

$$B_1^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & 25 \\ 25 & 0 & 25 \end{pmatrix} = 25 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

е от ранг  $\text{rk}(B_1^2) = 1$ , както и матрицата

$$B_1^3 = 25 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 5 \\ 5 & 0 & 5 \end{pmatrix} = 125 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 5B_1^2.$$

Следователно първата стъпка към намиране на Жорданов базис на  $\varphi : V \rightarrow V$  е намирането на Жорданов базис на  $\varphi : V_1 \rightarrow V_1$  за  $V_1 := \ker(\psi_1^2)$ . Описваме  $V_1 := \ker(\psi_1^2)$  като пространството от решения на хомогенната линейна система с матрица  $B_1^2$  и разглеждаме редицата от подпространства

$$V_1 \supset V_1 \cap \text{im}(\psi_1).$$

Непосредствено се вижда, че

$$V_1 = \{(x_1, x_2, x_3)^t \in M_{3 \times 1}(F) \mid x_1 + x_3 = 0\},$$

а образът  $\text{im}(\psi_1)$  на  $\psi_1$  се поражда от вектор стълбовете на  $B_1$ , така че  $\text{im}(\psi_1)$  има базис

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Хомогенната система линейни уравнения

$$\begin{cases} x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases}$$

има фундаментална система решения  $(0, -1, 1)^t$ , така че

$$\text{im}(\psi_1) = \{(x_1, x_2, x_3)^t \in M_{3 \times 1}(F) \mid -x_2 + x_3 = 0\} = \{(x_1, x_2, x_2)^t \mid x_1, x_2 \in F\}.$$

Сечението

$$\begin{aligned} V_1 \cap \text{im}(\psi_1) &= \{(x_1, x_2, x_3)^t \in M_{3 \times 1}(F) \mid x_1 + x_3 = 0, -x_2 + x_3 = 0\} = \\ &= \{x_2(-1, 1, 1)^t \mid x_2 \in F\} \end{aligned}$$

е 1-мерно и се поражда от вектора

$$v_1^{(1)} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in V_1 \cap \text{im}(\psi_1).$$

Търсим  $v_1^{(2)} \in V_1 = \ker(\psi_1^2)$ , така че  $\psi_1(v_1^{(2)}) = v_1^{(1)}$ . Координатите на  $v_1^{(2)} = (x_1, x_2, x_3)^t$  спрямо дадения базис са решение на системата линейни уравнения

$$B_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

По-точно,

$$\begin{vmatrix} & -x_2 & +x_3 & = 0 \\ 5x_1 & +x_2 & +4x_3 & = 0 \end{vmatrix},$$

откъдето

$$v_1^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 - x_2 \\ x_2 \\ x_2 - 1 \end{pmatrix} \quad \text{за произволно } x_2 \in F.$$

Избираме  $x_2 = 0$  и получаваме

$$v_1^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Алгебричната кратност на характеристичния корен  $\lambda_1 = -2$  е 2, така че  $\dim V_1 = 2$  и  $v_1^{(1)}, v_1^{(2)}$  е Жорданов базис на  $V_1$ , в който  $\varphi$  има матрица

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Собствените вектори, отговарящи на собствената стойност  $\lambda_2 = 3$  са ненулевите решения на хомогенната система линейни уравнения с матрица

$$B_2 := A - 3E_3 = \begin{pmatrix} -5 & -1 & 1 \\ 5 & -4 & 4 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Това са векторите

$$v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \text{за произволно } x_3 \in F \setminus \{0\}.$$

Следователно

$$v_1^{(1)} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_1^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

е Жорданов базис на  $V$ , в който  $\varphi$  има матрица

$$J = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(ii) Характеристичният полином на  $A_2$  е

$$f_{A_2}(x) = \begin{vmatrix} 4-x & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2-x & -1 & -1 \\ 6 & 1 & -1-x & 1 \\ -6 & -1 & 4 & 2-x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4-x & 1 & 1 & 1 \\ -x^2+6x-9 & 0 & x-3 & x-3 \\ 2+x & 0 & -2-x & 0 \\ -2-x & 0 & 5 & 3-x \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned}
&= - \begin{vmatrix} -(x-3)^2 & x-3 & x-3 \\ 2+x & -2-x & 0 \\ -2-x & 5 & 3-x \end{vmatrix} = -(x-3)(x+2) \begin{vmatrix} -x+3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -x-2 & 5 & 3-x \end{vmatrix} = \\
&= -(x-3)(x+2) \begin{vmatrix} 4-x & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3-x & 0 & 3-x \end{vmatrix} = (x-3)(x+2) \begin{vmatrix} 4-x & 1 \\ 3-x & 3-x \end{vmatrix} = \\
&= -(x-3)^2(x+2) \begin{vmatrix} 4-x & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(x-3)^2(x+2)(3-x) = (x-3)^3(x+2).
\end{aligned}$$

Характеристичните корени  $\lambda_1 = 3$  и  $\lambda_2 = -2$  са рационални числа и принадлежат на числовото поле  $F$ . Операторът  $\psi_1 := \varphi - \lambda_1 \text{Id} = \varphi - 3\text{Id}$  има матрица

$$B_1 := A - 3E_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ 6 & 1 & -4 & 1 \\ -6 & -1 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

спрямо дадения базис. Образът  $\text{im}(\psi_1)$  съвпада с линейната обвивка на вектор стълбовете на  $B_1$  и има базис

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Хомогенната система линейни уравнения

$$\begin{vmatrix} x_1 & -x_2 & & \\ & & x_3 & -x_4 \end{vmatrix} = 0$$

има фундаментална система решения

$$(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1),$$

така че  $\text{im}(\psi_1)$  е пространството от решения на

$$\begin{vmatrix} x_1 & +x_2 & & \\ & & x_3 & +x_4 \end{vmatrix} = 0$$

или

$$\text{im}(\psi_1) = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1 + x_2 = 0, \ x_3 + x_4 = 0\} = \{(-x_2, x_2, -x_4, x_4)^t \mid x_2, x_4 \in F\}.$$

Матрицата

$$B_1^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -25 & 0 & 25 & 0 \\ 25 & 0 & -25 & 0 \end{pmatrix} = 25 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

има ранг 2, както и матрицата

$$B_1^3 = 25 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & -5 & 0 \\ -5 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} = 125 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = -5B_1^2.$$

Следователно трябва да намерим Жорданов базис на  $\varphi$ -инвариантното подпространство  $V_1 := \ker(\psi_1^2)$  на  $V$ , което е пространството от решения на хомогенната линейна система с матрица  $B_1^2$  или

$$V_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4)^t \in M_{4 \times 1}(F) \mid x_1 - x_3 = 0\} = \{(x_1, x_2, x_1, x_4)^t \mid x_1, x_2, x_4 \in F\}$$

Подпространството

$$\begin{aligned} V_1 \cap \operatorname{im}(\psi_1) &= \{(x_1, x_2, x_3, x_4)^t \in M_{4 \times 1}(F) \mid x_1 - x_3 = 0, x_1 + x_2 = 0, x_3 + x_4 = 0\} = \\ &= \{(-x_2, x_2, -x_2, x_2)^t \mid x_2 \in F\} \end{aligned}$$

има базис

$$v_1^{(1)} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Търсим вектор  $v_1^{(2)} \in V_1$  с  $\psi_1(v_1^{(2)}) = v_1^{(1)}$ . По-точно,

$$v_1^{(2)} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

е решение на системата линейни уравнения

$$B_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Пресмятаме, че

$$v_1^{(2)} = \begin{pmatrix} x_3 \\ -2x_3 - x_4 - 1 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad \text{за произволни } x_3, x_4 \in F.$$

Избираме  $x_3 = x_4 = 0$  и фиксираме

$$v_1^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Алгебричната кратност на характеристичния корен  $\lambda_1 = 3$  е 3, така че  $\dim V_1 = 3$  и трябва да допълним вектора  $v_1^{(1)} \in \ker(\psi_1)$  до базис на  $\ker(\psi_1)$ . Ядрото на  $\psi_1$  е

пространството от решения на хомогенната система линейни уравнения  $B_1x = \mathbb{O}_{4 \times 1}$ . По-точно,

$$\ker(\psi_1) = \{(x_3, -2x_3 - x_4, x_3, x_4)^t \mid x_3, x_4 \in F\}.$$

Векторът  $v_1^{(1)}$  се получава за  $x_3 = -1, x_4 = 1$ . Полагането  $x_3 = 1, x_4 = 0$  дава вектор

$$v_2^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

който заедно с  $v_1^{(1)}$  образува базис на  $\ker(\psi_1)$ . Следователно  $v_1^{(1)}, v_1^{(2)}, v_2^{(1)}$  е Жорданов базис на  $\varphi : V_1 \rightarrow V_1$ , в който  $\varphi$  има матрица

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Собствените вектори на  $\varphi : V \rightarrow V$ , отговарящи на собствената стойност  $\lambda_2 = -2$  са ненулевите решения на хомогенната система линейни уравнения с матрица

$$B_2 = A - (-2)E_4 = A + 2E_4 = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 4 & -1 & -1 \\ 6 & 1 & 1 & 1 \\ -6 & -1 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

Тези вектори са от вида  $(0, 0, -x_4, x_4)^t$  и принадлежат на правата, породена от

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

С това пресметнахме, че спрямо базиса

$$v_1^{(1)} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_1^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

на  $V$ , операторът  $\varphi : V \rightarrow V$  има Жорданова матрица

$$J = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$