

Teorija zvezdanih spektara -8-

1. Odrediti opšte rešenje (u proizvoljnoj n -toj aproksimaciji) jednačine prenosa zračenja za sivu (polubeskonačnu) atmosferu u ravnoteži zračenja metodom diskretnih ordinata.

Jednačina prenosa zračenja (konkretno, Milneova jednačina) se svodi na sledeći sistem:

$$\mu_i \frac{dI_i}{d\tau} = I_i - \frac{1}{2} \sum_{j=-n}^n C_j I_j, \quad i = \pm 1, \dots, \pm n, \quad I_i \equiv I(\tau, \mu_i). \quad (*)$$

Uzimajući u obzir da je sistem linearan i prvog reda pretpostavljamo rešenje u sledećem obliku:

$$I_i = g_i e^{-k\tau},$$

gde je g_i i k potrebno odrediti. Zamenom ovog, probnog rešenja u $(*)$ dobijamo:

$$g_i(1 + k\mu_i) = \frac{1}{2} \sum_{j=-n}^n C_j g_j = c \Rightarrow g_i = \frac{c}{1 + k\mu_i}.$$

Ako probno rešenje, sa ovakvom formom g_i ponovo zamenimo u $(*)$ nalazimo:

$$\frac{1}{2} \sum_{j=-n}^n \frac{C_j}{1 + k\mu_j} = 1.$$

Dobili smo tzv. karakterističnu jednačinu koja je zadovoljena za određene vrednosti parametra k (tzv. svojstvene vrednosti). Izbegavajući $\mu = 0$ odnosno ako koristimo parne stepene $m = 2n$ onda će važiti uslovi simetričnosti $C_{-j} = C_j$ i $\mu_{-j} = -\mu_j$. Sada se karakteristična jednačina može napisati kao:

$$1 - \sum_{j=1}^n \frac{C_j}{1 - k^2 \mu_j^2} \equiv T(k^2) = 0, \quad (**)$$

gde smo uveli tzv. karakterističnu funkciju $T(k^2)$. Gornja jednačina $(**)$ prirodno sledi ako spojimo simetrične članove:

$$\frac{1}{2} \frac{C_{-n}}{1 + k\mu_{-n}} + \frac{1}{2} \frac{C_n}{1 + k\mu_n} = \frac{C_n}{1 - k^2 \mu_n^2} \quad \text{itd.}$$

Dakle, svojstvene vrednosti k (koje želimo da odredimo) se nalaze rešavanjem $(**)$ odnosno $T(k^2) = 0$. Ako pak krenemo od:

$$\frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(\mu) d\mu \approx \frac{1}{2} \sum_{j=-n}^n C_j f(\mu_j),$$

za $f(\mu) = 1$ dobijamo:

$$\frac{1}{2} \sum_{j=-n}^n C_j = \sum_{j=1}^n C_j = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 d\mu = 1.$$


Sada je jasno da je jedno rešenje karakteristične jednačine $k^2 = 0$ odnosno $T(k^2 = 0) = 0$. Potrebno je još odrediti preostalih $n - 1$ nenultih rešenja karakteristične jednačine. Razmatranjem izraza (**) jasno je da su $k^2 = \mu_j^{-2}$ polovi odnosno da T divergira u tim tačkama (vidi sliku 1). Razmotrimo sada šta se dešava sa T levo i desno od μ_j^{-2} .

- $k^2 = \mu_j^{-2} - \varepsilon$, gde je $\varepsilon > 0$: ako pomnožimo prethoni izraz sa μ_j^2 dobićemo da je $k^2 \mu_j^2 = 1 - \varepsilon \mu_j^2$, što možemo da zamenimo u izraz (**). Tada onda imamo u sumi izraz $C_j/(\varepsilon \mu_j^2)$. Ukoliko sada pustimo da $\varepsilon \rightarrow 0$ član pod sumom je pozitivan i divergira, teži beskonačnosti, što znači da onda polinom teži $T(k^2) \rightarrow -\infty$.
- $k^2 = \mu_j^{-2} + \varepsilon$, gde je $\varepsilon > 0$: primenom sličnih manipulacija izrazom kao i u prethodnom slučaju, član pod sumom u izrazu (**) je $C_j/(-\varepsilon \mu_j^2)$. Ako sada pustimo da $\varepsilon \rightarrow 0$ onda je član u sumi negativno divergentan, što zajedno sa znakom minus ispred sume daje da $T(k^2) \rightarrow \infty$.

Zaključujemo da T ima nule između sukcesivnih polova te traženih $n-1$ nula mora zadovoljavati:

$$\mu_1^{-2} < k_1^2 < \mu_2^{-2} < \dots < k_{n-1}^2 < \mu_n^{-2},$$

gde smo uredili $\{\mu_j\}$ uredili u opadajući niz tako da važi $\mu_j > \mu_{j+1}$. Najveće μ_j mora biti manje od jedinice odnosno najmanje nenulto k^2 mora biti veće od jedinice. Imamo $2n - 2$ nenultih k parova: $\pm k_j$, ($j = 1, \dots, n - 1$).



Slika 1: Funkcija ima nulu ako na krajevima konačnog intervala teži ∞ odnosno $-\infty$.

Sada možemo da napišemo opšte rešenje sistema (*) u obliku:

$$I_i(\tau, \mu_i) \equiv I_i(\tau) = b \left[\sum_{\alpha=1}^{n-1} \frac{L_{\alpha}}{1 + k_{\alpha} \mu_i} e^{-k_{\alpha} \tau} + \sum_{\alpha=1}^{n-1} \frac{L_{-\alpha}}{1 - k_{\alpha} \mu_i} e^{k_{\alpha} \tau} \right],$$

gde je b i $L_{\pm\alpha}$ potrebno odrediti.

Sada tražimo partikularno rešenje koje odgovara $k^2 = 0$. Znajući da $J(\tau) \rightarrow \frac{3}{4}F\tau$ za $\tau \gg 1$ to zapravo ukazuje da se srednji intenzitet asimptotski ponaša kao linearna funkcija optičke dubine tako da je prihvatljivo razmotriti opštu formu partikularnog rešenja oblika: $I_i = b(\tau + q_i)$ koju onda možemo zameniti u (*) i dobiti:

$$q_i = \mu_i + \frac{1}{2} \sum_{j=-n}^n C_j q_j,$$

kako je $\frac{1}{2} \sum_{j=-n}^n C_j = 1$. Sa druge strane, za $f(\mu) = \mu$ imamo:

$$\frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(\mu) d\mu \approx \frac{1}{2} \sum_{j=-n}^n C_j f(\mu_j) = \frac{1}{2} \sum_{j=-n}^n C_j \mu_j = 0,$$

pa možemo pisati da je $q_i = \mu_i + Q$, gde je $Q = \text{const.}$ Dakle, imamo $I_i = b(\tau + Q + \mu_i)$, odnosno, za opšte rešenje jednačine prenosa zračenja u zadatom problemu:

$$I_i(\tau) = b \left[\tau + Q + \mu_i + \sum_{\alpha=1}^{n-1} \frac{L_\alpha}{1 + k_\alpha \mu_i} e^{-k_\alpha \tau} + \sum_{\alpha=1}^{n-1} \frac{L_{-\alpha}}{1 - k_\alpha \mu_i} e^{k_\alpha \tau} \right]. \quad (***)$$

Za određeni stepen aproksimacije n ($m = 2n$, μ_i su nule iz $P_m(\mu) = 0$) iz (**) nalazimo k pa ostaje još da se odrede ($2n$ nepoznate) b , Q i $L_{\pm\alpha}$. To se postiže odgovarajućim graničnim uslovima odnosno definisanjem konkretnog problema (konačni sloj, polubeskonačna atmosfera).

Razmotrimo sada polubeskonačnu (sivu) atmosferu (u ravnoteži zračenja). Uslov na površini je $I_{-i} \equiv I(0, -\mu_i) = 0$, dok za $\tau \rightarrow \infty$, $I(\tau)$ ne sme divergirati eksponencijalno (očekujemo linearnu zavisnost). Iz (**) je sada jasno da važi $L_{-\alpha} = 0$ dok iz uslova na površini i $\mu_{-j} = -\mu_j$ sledi:

$$Q - \mu_i + \sum_{\alpha=1}^{n-1} \frac{L_\alpha}{1 - k_\alpha \mu_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (\dagger)$$

Gornja jednačina (\dagger) omogućava nalaženje (n vrednosti) Q i L_α . Naravno, za fluks možemo pisati:

$$F = 2 \int_{-1}^1 I(\mu) \mu d\mu = 2 \sum_{j=-n}^n C_j \mu_j I_j,$$

pa zamenom (**) u gornju jednačinu uz granični uslov na površini koji daje $L_{-\alpha} = 0$ imamo:

$$F = 2b \left((\tau + Q) \sum_{j=-n}^n C_j \mu_j + \sum_{j=-n}^n C_j \mu_j^2 + \sum_{\alpha=1}^{n-1} L_\alpha e^{-k_\alpha \tau} \sum_{j=-n}^n \frac{C_j \mu_j}{1 + k_\alpha \mu_i} \right).$$

Već je bilo pokazano da za $f(\mu) = \mu$ sledi:

$$\sum_{j=-n}^n C_j \mu_j = 0,$$

dok za $f(\mu) = \mu^2$ jednostavno sledi:

$$\sum_{j=-n}^n C_j \mu_j^2 = \frac{2}{3}.$$

Iz karakteristične jednačine (**) i $\frac{1}{2} \sum_{j=-n}^n C_j = 1$ jasno sledi:

$$\sum_{j=-n}^n \frac{C_j \mu_j}{1 + k_\alpha \mu_i} = 0.$$

te imamo da je $b = \frac{3}{4}F$. Fluks je konstantan što je i očekivano za zadati problem. Dakle, za opšte rešenje u slučaju polubeskonačne atmosfere imamo:

$$I_i(\tau) = \frac{3}{4}F \left[\tau + Q + \mu_i + \sum_{\alpha=1}^{n-1} \frac{L_\alpha}{1 + k_\alpha \mu_i} e^{-k_\alpha \tau} \right], \quad i = 1, \dots, n.$$

Vrednosti μ_i i C_i se nalaze za zadatu aproksimaciju n iz $P_{2n}(\mu) = 0$, odnosno, preko $C_j = \frac{1}{P'_m(\mu_j)} \int_{-1}^1 \frac{P_m(\mu)}{\mu - \mu_j} d\mu$. Vrednosti k se onda nalaze rešavanjem (**) dok se Q i L_α računaju iz (†). Srednji intenzitet je konačno:

$$J(\tau) = \frac{1}{2} \sum_{j=-n}^n C_j I_j = \frac{3}{4}F \left(\tau + Q + \sum_{\alpha=1}^{n-1} L_\alpha e^{-k_\alpha \tau} \right) = \frac{3}{4}F(\tau + q(\tau)),$$

$$q(\tau) = Q + \sum_{\alpha=1}^{n-1} L_\alpha e^{-k_\alpha \tau}.$$

Odredimo sada $q(\tau)$ u prvo aproksimaciji $n = 1$ ($m = 2$). Imamo $\mu_{\pm 1} = \pm 1/\sqrt{3}$, $C_{\pm 1} = 1$. Iz (**) je jasno da imamo $k^2 = 0$ te iz (†) sledi: $Q = 1/\sqrt{3}$ pa je konačno rešenje u prvoj aproksimaciji $J(\tau) = \frac{3}{4}F(\tau + 1/\sqrt{3})$ odnosno $q(\tau) = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Slično, možemo naći rešenje u drugoj aproksimaciji¹ $n = 2$ ($m = 4$). Sada imamo: $\mu_{\pm 2} = \pm 0.8611363115940526$, $\mu_{\pm 1} = \pm 0.3399810435848563$, $C_{\pm 2} = 0.3478548451374538$, $C_{\pm 1} = 0.6521451548625461$. Rešavanjem (**) i (†) dobijamo:

$$q(\tau) = 0.694025 - 0.116675e^{-1.97203\tau}.$$

Za $n = 3$ i $n = 4$ imamo, respektivno:

$$q(\tau) = 0.703899 - 0.1012455e^{-3.20295\tau} - 0.02530e^{-1.22521\tau},$$

$$q(\tau) = 0.70692 - 0.08392e^{-4.45808\tau} - 0.03619e^{-1.59178\tau} - 0.00946e^{-1.10319\tau}.$$

Kada $n \rightarrow \infty$ rešenje teži tačnom (Hopfovom) koje na ovom mestu nećemo izvoditi. Tačno rešenje ($n \rightarrow \infty$) za $q(\tau = \infty)$ je $q(\tau = \infty) = Q = 0.710446$ dok je na površini $q(\tau = 0) = 1/\sqrt{3}$.

2. Razmotriti rešavanje (u proizvoljnoj n -toj aproksimaciji) jednačine prenosa zračenja za sloj konačne debljine za sivi slučaj i ravnotežu zračenja.

U ovom slučaju granični uslovi su $I_{-i}^- \equiv I(0, -\mu_i)$ i $I_i^+ \equiv I(T, +\mu_i)$, gde je T ukupna optička debljina sloja. Dakle, dobijamo $2n$ jednačina sa $2n$ nepoznatih:

$$I_{-i}^- \equiv I(0, -\mu_i) = b \left(Q - \mu_i + \sum_{\alpha=1}^{n-1} \frac{L_\alpha}{1 - k_\alpha \mu_i} + \sum_{\alpha=1}^{n-1} \frac{M_\alpha e^{-k_\alpha T}}{1 + k_\alpha \mu_i} \right),$$

$$I_i^+ \equiv I(T, +\mu_i) = b \left(Q + T + \mu_i + \sum_{\alpha=1}^{n-1} \frac{L_\alpha e^{-k_\alpha T}}{1 + k_\alpha \mu_i} + \sum_{\alpha=1}^{n-1} \frac{M_\alpha}{1 - k_\alpha \mu_i} \right),$$

$$M_\alpha = L_{-\alpha} e^{k_\alpha T}.$$

Zadatak za vežbu: Uveriti se u korektnost rešenja $q(\tau)$ pri $n = 2, 3, 4$ za slučaj polubeskonačne atmosfere.

¹Pogodno je koristiti IDL funkcije FZ_ROOTS, ZBRENT i GAUSS_LEG_QUADR.