

7.4

$$1) \quad h(x^2) = x^2 = 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 0 \cdot 1$$

$$h(x) = 0 = 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 0 \cdot 1$$

$$h(1) = 0 = 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 0 \cdot 1$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2) \quad h(x^2) = 1 = 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 1 \cdot 1$$

$$h(x) = x = 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x + 0 \cdot 1$$

$$h(1) = x^2 = 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 0 \cdot 1$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3) \quad h(x^2) = x(2x + 0) + 2 = 2x^2 + 2 = 2 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 2 \cdot 1$$

$$h(x) = x(2 \cdot 0 \cdot x + 1) + 2 \cdot 0 = x = 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x + 0 \cdot 1$$

$$h(1) = x(2 \cdot 0 \cdot x + 0) + 2 \cdot 0 = 0 = 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 0 \cdot 1$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$