


序号	页码	原文	更正										
1	3	14. 现有 A、B、C 三种化合物，各取 40 g 相混合，完全反应后，得 18 g B、49 g C 还有 D 生成。现将 20 g A 和 22 g B 反应，能生成 0.25 mol D，则 D 的相对分子质量为（ ） A. 424 B. 212 C. 116.6 D. 106 整题删除	答案中只到第 13 题就结束了，删除多出来的第 14 题										
2	5	9. $5\text{KI}+\text{KIO}_3+3\text{H}_2\text{SO}_4=3\text{K}_2\text{SO}_4+3\text{I}_2+3\text{H}_2\text{O}$ 中，被氧化的碘元素和被还原的碘元素的物质的量比之（ ）	“物质的量”后面加“之”										
3	5	12. 已知 Fe_3O_4 可以表示成 $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ ，水热法制备 Fe_3O_4 纳米颗粒的反应为： $3\text{Fe}^{2+}+2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}+\text{O}_2+\text{xOH}^-=\text{Fe}_3\text{O}_4+\text{S}_4\text{O}_6^{2-}+\text{yH}_2\text{O}$ ，下列说法正确的是（ ）	N 应为斜体										
		A. 反应中的还原剂是 Fe^{2+} 和 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$											
		B. $\text{x}=4$											
		C. $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ 为氧化产物											
		D. 生成 1mol Fe_3O_4 时，转移的电子数为 2N_A											
4	6	14. 已知 $(\text{CN})_2$ 的氧化性比 Br_2 弱而比 I_2 强，NaCN 的水溶液呈碱性，则下列有关变化一般不能发生的是（ ）	应该用英文括号										
		A. $\text{CH}_2=\text{CH}_2+\text{[CN]}_2\rightarrow\text{NC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CN}$											
		B. $(\text{CN})_2+2\text{Br}^-\rightarrow 2\text{CN}^-+\text{Br}_2$											
		C. $(\text{CN})_2+2\text{OH}^-\rightarrow\text{CN}^-+\text{CNO}^-+\text{H}_2\text{O}$											
		D. $\text{HCN}\rightleftharpoons\text{H}^++\text{CN}^-$											
5	8	(g) (1) (s) 中文括号全部错误	6、7、8 题的（ ）都改成英文括号()										
6	9	11. 固态或气态碘分别与氢气反应的热化学方程式如下：	H 后面加上下标 2										
		① $\text{H}_2(\text{g})+\text{I}_2(?)\rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g}) \quad \Delta H=-9.48\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$											
		② $\text{H}_2(\text{g})+\text{I}_2(?)\rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g}) \quad \Delta H=+26.48\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$											
		下列判断不正确的是（ ）											
7	10	(g) 中文括号全部错误	13、14 题的（ ）都改成英文括号()										
8	11	2. 在一密闭容器中进行如下反应： $2\text{SO}_2(\text{g})+\text{O}_2(\text{g})\rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ，已知反应过程中某一时刻 SO_2 、 O_2 、 SO_3 的浓度分别为 0.2 mol/L、0.1 mol/L、0.2 mol/L，当反应达平衡时，可能存在的数据是（ ）	SO_3 后面加(g)										
9	20	29. 在多电子原子中，具有下列各电子数的电子中能量最高的是（ ）	“组”后面加量										
		20											
10	21	30. 短周期元素 X、Y、Z、W 在元素周期表中的相对位置如图所示。已知 X 的最低负价与 Y 的最高正价代数和为零，下列说法正确的是（ ） <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>Y</td><td></td><td>Z</td><td>W</td><td></td></tr></table> A. X 分别与 Y、Z 形成的化合物中化学键类型相同 B. Z 的最高价氧化物的对应水化物酸性比 W 的强 C. 原子半径 (r): $r(\text{W}) > r(\text{Z}) > r(\text{Y}) > r(\text{X})$ D. Y 是第三周期第ⅡA 族元素 整题删除					X	Y		Z	W		答案中只到第 29 题就结束了，删除多出来的第 30 题
				X									
Y		Z	W										

11	22	磷酸的结构式如图所示，三分子磷酸可脱去两分子水生成三聚磷酸。含磷洗衣粉中含有三聚磷酸，则该钠盐的化学式及 1mol 此钠盐中 P—O 单键的物质的量分别是 () A. $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ 7mol B. $\text{Na}_3\text{H}_2\text{P}_3\text{O}_{10}$ 8mol C. $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ 9mol D. $\text{Na}_2\text{H}_3\text{P}_3\text{O}_{10}$ 12mol	答案中没有第 1 题，整个删除，分子结构这一部分的其他题号要整体修改
12	22	白磷分子如图所示，则 31g 白磷分子中存在的共价键数目是 () (N_A 表示阿伏加德罗常数的值，磷的相对原子质量 P—31)	“佛”改为“伏”
13	26	32. 下列中心原子的杂化轨道类型和分子几何构型不正确的是 A. PCl_3 中 P 原子 sp^3 杂化，为三角锥型 B. PH_4^+ 中 P 原子 sp^3 杂化，为正四面体型 C. OF_2 中 O 原子 sp 杂化，为直线形 D. SO_2 中 S 原子 sp^2 杂化，为 V 形	+应该上标
14	27	42. 下列物质难溶于水的是 () A. MgSO_4 B. NaCl C. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ D. S	答案中没有第 42 题，整个删除，后续题号也要整体修改
15	28	44. 下列物质内存在分子间作用力的是 () A. CaCl_2 B. NaOH C. SO_2 D. Na_2O	答案中没有第 44 题，整个删除，后续题号也要整体修改
16	28	48. 下列说法中正确的是 () A. NaHSO_4 在熔融状态下电离与在水中电离时，破坏的化学键完全相同 B. H_2O 比 H_2S 分子稳定，是因为 H_2O 分子间能形成氢键 C. NaCl 和 HCl 气化时，克服的作用力不相同，故沸点不同 D. 碘沸点低、易升华，是因为分子中的 I—I 键能较小	答案中没有第 48 题，整个删除，后续题号也要整体修改
17	29	50. 下列说法不正确的是 () A. CO_2、SiO_2 的晶体结构类型不同 B. 加热硅、硫晶体使之熔化，克服的作用力不同 C. HCl、NaCl 溶于水，破坏的化学键类型相同 D. NaOH、NH_4Cl 晶体中既有离子键又有共价键	答案中没有第 50 题，整个删除
18	33	4. 在一密闭容器中充入一定量的 N_2 和 O_2，在电火花作用下发生反应 $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}$，经测定前 3s 用 N_2 表示的反应速率为 $0.1\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$，则 6s 末 NO 的浓度为 () A. $1.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ B. 大于 $1.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ C. 小于 $1.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ D. 不能确定	保留 1 个=即可；中文括号改成英文括号()

19	34	8. 氨能跟氧气在铂催化下反应生成硝酸和水，其中第一步反应为： $4\text{NH}_3+5\text{O}_2=4\text{NO}+6\text{H}_2\text{O}$ ，若反应速率分别用 $v(\text{NH}_3)$ 、 $v(\text{O}_2)$ 、 $v(\text{H}_2\text{O})$ [$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$]表示，则正确的关系是（ ）	保留 1 个=即可
20	34	10. 两只敞口烧杯中分别发生如下反应：一只烧杯中反应为 $\text{A}+\text{B}= \text{C}+\text{D}$ ，反应温度为 T_1 ，另一只烧杯中反应为 $\text{M}+\text{N}= \text{P}+\text{Q}$ ，反应温度为 T_2 ， $T_1>T_2$ ，则两只烧杯中反应速率快慢为（ ） A. 前者快 B. 后者快 C. 一样快 D. 无法确定 11. 在 2L 密闭容器中，发生反应 $2\text{A}+\text{B}= 2\text{C}+\text{D}$ ，若最初 A、B 都是 8 mol，在前 10 s 内 A 的平均速率为 $0.24\text{ mol}/(\text{s})$ ，则 10 s 时 B 的物质的量是（ ） A. 2.4 mol B. 3.2 mol C. 4.8 mol D. 5.6 mol 12. 已知反应 $\text{A}+3\text{B}= 2\text{C}+\text{D}$ 在 1s 内 A 的物质的量浓度由 2 mol/L 降为 1 mol/L ，C 的平均反应速率为（ ）	保留 1 个=即可
21	37	7. 分子式为 $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{Cl}_2$ 的有机物，含有两个甲基的同分异构体有（ ）种： A. 4 B. 6 C. 8 D. 11	答案中没有第 7 题，整个删除，后续题号也要整体修改
22	38	16. 人造象牙的结构可表示为 $\left[\text{CH}_2-\text{O} \right]_n$ ，它的单体是（ ） A. HCHO B. CH_3CHO C. $(\text{CH}_3)_2\text{O}$ D. CH_3CHO	中文括号改成英文括号()
23	39	21. 下列各组烃一定是同系物的是（ ） A. C_6H_6 和 C_7H_8 B. C_2H_2 和 C_6H_6 C. C_2H_6 和 C_8H_{18} D. C_3H_6 和 C_5H_{10}	答案中没有第 21 题，整个删除，后续题号也要整体修改
24	40	26. 下列化合物中，既能发生水解反应，又能发生消去反应，且消去反应生成的烯烃不存在同分异构体的是（ ） A. CH_3Cl B. C. D.	D 选项中最左侧的下标 2 改为 3
25	41	27. 松节油 在浓硫酸、加热条件下反应消去反应，最多可有（ ）种有机产物。 A. 3 种 B. 4 种 C. 8 种 D. 11 种 29. 以溴乙烷为原料制备乙二醇，下列方案合理的是（ ） A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \xrightarrow[\Delta]{\text{NaOH水溶液}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{170^\circ\text{C}, \text{H}_2\text{SO}_4} \text{CH}_2=\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{Br}_2} \text{CH}_2\text{BrCH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{水解}} \text{乙二醇}$ B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{Br}_2} \text{CH}_2\text{BrCH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{水解}} \text{乙二醇}$ C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{NaOH醇溶液}} \text{CH}_2=\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{HBr}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{Br}_2} \text{CH}_2\text{BrCH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{水解}} \text{乙二醇}$ D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{NaOH醇溶液}} \text{CH}_2=\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{HBr}} \text{CH}_2\text{BrCH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{水解}} \text{乙二醇}$	答案中没有第 27 题以及第 29 题，整个删除，后续题号也要整体修改

26	41	28. 下列卤代烃不能通过烯烃与相应卤化氢加成得到的是 () A. $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—Br}$ B. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{H}_3\text{C—C—CH}_2\text{Cl} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ C. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{—CH}_2\text{—C—Br} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ D. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{H}_3\text{C—C—CH}_2\text{—CH}_2\text{—Br} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	第 28 题 C 选项中最左侧的下标 2 改为 3
27	42	34. 能证明苯酚具有弱酸性的实验是 () A. 加入浓溴水生成白色沉淀 整题删除 B. 苯酚钠溶液中通入 CO_2 后, 溶液由澄清变浑浊 C. 浑浊的苯酚加热后变澄清 D. 苯酚的水溶液中加入 NaOH 溶液, 生成苯酚钠 37. 一定量的某饱和一元醛发生银镜反应, 析出银 21.6g. 等量的此醛完全燃烧时, 生成的水为 5.4g. 则该醛可能是 () 整题删除 A. 丙醛 B. 乙醛 C. 丁醛 D. 甲醛	答案中没有第 34 题以及第 37 题, 整个删除, 后续题号也要整体修改
28	44	43. 某酯 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$ 经水解后得到相同碳原子数的羧酸和醇, 再把醇氧化得到丙酮 ($\text{CH}_3\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{—CH}_3$), 该酯是 () 整题删除 A. $\text{C}_3\text{H}_7\text{COO C}_2\text{H}_5$ B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}(\text{CH}_3)_2$ C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ D. $\text{HCOOCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$ 46. 某芳香族酯类化合物甲的分子式为 $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{O}_5$, 1mol 甲水解后只生成一种产物乙, 其物质的量为 2mol, 下列说法不正确的是 () 整题删除 A. 甲能和浓溴水发生反应 B. 1mol 甲最多可以和 4mol NaOH 反应 C. 1mol 甲最多与 4mol H_2 反应 D. 符合上述条件的甲共有 3 种	答案中没有第 43 题以及第 46 题, 整个删除, 后续题号也要整体修改
29	45	48. 两个环共用两个不直接相连的碳原子的化合物称为桥环化合物, 某桥环化合物的结构简式如图所示, 下列关于该化合物的说法错误的是 ()  A. 该有机物能发生取代反应和加成反应 B. 该有机物分子中含有两个官能团 C. 该有机物分子的一氯代物有 7 种 D. 该有机物能使酸性 KMnO_4 溶液褪色 49. 某种可用于治疗心脏病的药物 X 的结构简式为 $\text{CH}_3\text{—}\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}\text{—CH}_2\text{—C(=O)—O—}$ , 下列有关 X 的说法错误的是 () 整题删除 A. X 可能有香味, 是乙酸乙酯的同系物 B. X 不溶于水, 密度可能比水的小 C. 遇碱溶液或酸溶液均易变质 D. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COO—}$  $\text{—C}_3\text{H}_7$ 与 X 互为同分异构体	答案中没有第 48 题以及第 49 题, 整个删除, 后续题号也要整体修改
30	46	第 46 页是空白页	删除空白页
31	73-78	73-78 页全部删除	解析中 16-25 题删除, 与前文不对应