

页码	位置	原文	勘误
1	正文倒数第 6 行	赫喇帕斯	赫拉帕斯（注：与上文统一）
17	(1)式下一行	将方程(1.3.10)和(1.3.11)合并之后	将方程(1.3.9)和(1.3.10)合并之后
19	(14)式	$\lim_{\varepsilon^* \rightarrow \infty} \frac{\Sigma_1(\varepsilon^*)}{(\pi/6)\varepsilon^{*3/2}} = 1$	$\lim_{\varepsilon^* \rightarrow \infty} \frac{\Sigma_1(\varepsilon^*)}{(\pi/6)\varepsilon^{*3/2}} = 1$
22	脚注 1	$\Delta/E = 0(E^{-1/2})$	$\Delta/E = O(E^{-1/2})$
26	(1.4.22a)式	$\cdots \exp\left(\frac{3S}{3Nk} - \frac{5}{3}\right)$	$\cdots \exp\left(\frac{2S}{3Nk} - \frac{5}{3}\right)$
30	习题 1.9	$\cdots + V\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{V,E} + \cdots$	$\cdots + V\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{N,E} + \cdots$
30	习题 1.15	考虑物质的量为 f_1 、 f_2 和……	考虑摩尔分数为 f_1 、 f_2 和……
35	(14)式下一行	“来达到”后无换行。	
36	(2)式	$\omega \int' d\omega = \int' (d^{3N}q d^{3N}p)$	$\omega = \int' d\omega \equiv \int' (d^{3N}q d^{3N}p)$
39	(7)式	最左边的 a 不加粗。	
50	(14)式	$\langle n_r \rangle = \omega_r \frac{\partial}{\partial \omega_r} (\ln \Gamma) \Big _{\text{所有的 } \omega=1}$	$\langle n_r \rangle = \omega_r \frac{\partial}{\partial \omega_r} (\ln \Gamma) \Big _{\text{所有的 } \omega_r=1}$
53	(27)式	第二个约等号应为等号。	
54	(36)式	$\langle (\Delta n_r) \rangle^2 \equiv \cdots$	$\langle (\Delta n_r)^2 \rangle \equiv \cdots$

59	(8)式	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{(\beta' + i\beta'')^E} Q(\beta' + i\beta'') d\beta''$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{(\beta' + i\beta'')^E} Q(\beta' + i\beta'') d\beta''$
61	(7)式下一行	对于这些积分的任一个，我们都得到一个因子	我们得到因子
65	(8)式	$P(E) = e^{-\beta E} g(E) \dots$	$P(E) \propto e^{-\beta E} g(E) \dots$
70	(2)式下一行	“这里 $\hbar = h/2\pi$ ”后漏译一句。	这表示对平均可及微观态数的经典计数——即 kT 除以量子谐振子的能量间隔。
71	第2行	它们本身就分布在各种不可分辨的振子能级上！	这些粒子自身分布在各个振子能级上，它们是不可分辨的！
97	(6)式	$\ln \Omega'(N^{(0)}, E^{(0)}) - \frac{\mu'}{kT'} N_r - \frac{1}{kT'} E_s$	$\ln \Omega'(N^{(0)}, E^{(0)}) + \frac{\mu'}{kT'} N_r - \frac{1}{kT'} E_s$
266	图9.1中	$V > 5000 \text{ km/s}$	$v > 5000 \text{ km/s}$
329	(2b)式	$\{\psi(\mathbf{r}), \psi(\mathbf{r}')\} = \{\psi^\dagger(\mathbf{r}), \psi^\dagger(\mathbf{r}')\} = 0$	$\{\psi(\mathbf{r}), \psi(\mathbf{r}')\} = \{\psi^\dagger(\mathbf{r}), \psi^\dagger(\mathbf{r}')\} = 0$
330	(10)式	$\hat{N}_{\psi}(\mathbf{r}) \Psi_{NE}\rangle$	$\hat{N}\psi(\mathbf{r}) \Psi_{NE}\rangle$
393	(17)式	$N_- = N_- N_+$	$N_- = N - N_+$
602	(3)式	$\sum_{q'} P_{\text{平衡}}(q') W(q' \rightarrow q) = P_{\text{eq}}(q) \sum_{q'} W(q' \rightarrow q)$	$\sum_{q'} P_{\text{平衡}}(q') W(q' \rightarrow q) = P_{\text{平衡}}(q) \sum_{q'} W(q' \rightarrow q)$
615	(3)式	等号左边的 k 不应加粗。	