

GEBELİKTE TERATOJENİTE VE İLAÇ KULLANIMI

20 SORULUK TUS TARZI MİNİ SINAV

- Gebeliğin 7. haftasında teratojenik bir ajana maruziyet sonucunda aşağıdaki etkilerden hangisinin ortaya çıkma olasılığı en yüksektir?**
 - Neonatal yoksunluk
 - Majör yapısal malformasyon
 - İzole fetal büyüme kısıtlılığı
 - Duktus arteriozus konstriksiyonu
 - Neonatal renal yetmezlik
- Gebeliğinin ilk 3 haftasında, henüz gebe olduğunu bilmeyen bir kadının embriyotoksik bir ajana kısa süreli maruz kaldığı öğreniliyor.**

Bu dönemdeki maruziyetin etkisini en iyi açıklayan temel prensip hangisidir?

 - Fetal büyüme geriliği
 - Nörogelişimsel bozukluk
 - Hep ya da hiç etkisi
 - Duktus kapanması
 - Renal disgenez
- Aşağıdaki antiepileptiklerden hangisi nöral tüp defekti açısından en güçlü klasik ilişkiye sahiptir?**
 - Levetirasetam
 - Lamotrijin
 - Valproik asit
 - Gabapentin
 - Etosüksimid
- Gebelikte fenitoin kullanan annenin bebeğinde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir?**
 - Fetal hidantoin sendromu
 - Fetal warfarin sendromu
 - Ebstein anomalisi
 - Fokomeli
 - Renal disgenez
- Aşağıdaki ilaç-malformasyon eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?**
 - Talidomid – spina bifida
 - Valproat – fokomeli
 - Lityum – Ebstein anomalisi
 - Warfarin – renal agenezi
 - Tetrasiklin – PDA

6. **Gebelikte oral izotretinoin maruziyetinde en çok hangi organ sistemlerinin anomalileri beklenir?**
- A) Yalnızca gastrointestinal sistem
 - B) MSS, kraniofasiyal/kulak, kalp ve timus
 - C) Yalnızca renal sistem
 - D) Yalnızca ekstremiteler
 - E) Yalnızca kemik iliği
7. **Gebeliğin 28. haftasında ACE inhibitörü kullanmaya devam eden bir hastanın fetüsünde aşağıdakilerden hangisi en olasıdır?**
- A) Polihidramnios
 - B) Makrozomi
 - C) Oligohidramnios
 - D) Hidrops fetalis
 - E) Duodenal atrezi
8. **Gebelikte antikoagülan tedavi gereken bir hastada aşağıdaki ilaçlardan hangisinin plasentayı geçmemesi önemli bir avantajdır?**
- A) Warfarin
 - B) Apiksaban
 - C) Rivaroksaban
 - D) Düşük molekül ağırlıklı heparin
 - E) Dabigatran
9. **Fetal warfarin sendromunun klasik bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?**
- A) Fokomeli
 - B) Nazal hipoplazi ve epifizlerde stippling
 - C) Spina bifida
 - D) Ebstein anomalisi
 - E) Renal agenezi
10. **Gebeliğin 24. haftasında birkaç gün NSAİİ kullanan hastada en önemli fetal komplikasyon hangisidir?**
- A) Nöral tüp defekti
 - B) Fetal renal disfonksiyona bağlı oligohidramnios
 - C) Fokomeli
 - D) Fetal hidantoin sendromu
 - E) Katarakt
11. **Gebeliğin 34. haftasında uzun süreli NSAİİ kullanımına bağlı olarak fetüste aşağıdakilerden hangisi özellikle beklenir?**
- A) Duktus arteriozusun prematür konstriksiyonu
 - B) ASD
 - C) VSD
 - D) Nöral tüp defekti
 - E) Fallot tetralojisi

- 12. Gebeliğin 14. haftasında vulvovajinal kandidiyazis tanısı konan hastada en uygun tedavi hangisidir?**
- A) Tek doz oral flukonazol
 - B) 7 gün topikal azol
 - C) Oral ketokonazol
 - D) Rutin olarak sistemik amfoterisin
 - E) Tedavisiz takip
- 13. Gebelikte alkol kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?**
- A) İlk trimesterden sonra güvenlidir.
 - B) Günde bir kadeh güvenlidir.
 - C) Şarap ve bira, distile içkilere göre daha güvenlidir.
 - D) Bilinen güvenli bir doz veya güvenli bir dönem yoktur.
 - E) Yalnızca binge drinking teratojeniktir.
- 14. Fetal alkol sendromunun temel bulgu üçlüsü aşağıdakilerden hangisidir?**
- A) Makrozomi + renal anomaliler + trombositopeni
 - B) Büyüme geriliği + karakteristik yüz + MSS disfonksiyonu
 - C) Mikrosefali + katarakt + PDA
 - D) Hepatosplenomegali + sarılık + anemi
 - E) Ekstremitte hipoplazisi + cilt skarı + koryoretinit
- 15. Kokain kullanan gebede aşağıdaki obstetrik komplikasyonlardan hangisi özellikle düşünülmelidir?**
- A) Plasenta akreta
 - B) Plasenta dekolmanı
 - C) Postterm gebelik
 - D) Polihidramnios
 - E) Uterin atoni
- 16. Gebelikte kronik opioid kullanımının yenidoğan açısından en karakteristik komplikasyonu hangisidir?**
- A) Fokomeli
 - B) Neonatal yoksunluk sendromu
 - C) Ebstein anomalisi
 - D) Fetal warfarin sendromu
 - E) Katarakt
- 17. Gebelikte iyonizan radyasyona ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğrudur?**
- A) Her radyasyon maruziyeti gebelik terminasyonu endikasyonudur.
 - B) BT gebelerde mutlak kontrendikedir.
 - C) 50 mGy altındaki maruziyetlerde fetal anomali, büyüme kısıtlılığı veya gebelik kaybında artış gösterilmemiştir.
 - D) Akciğer grafisi fetüste sık malformasyon yapar.
 - E) MRG iyonizan radyasyon kullanır.

- 18.** 26 haftalık gebe ani dispne, taşikardi ve plöritik göğüs ağrısıyla başvuruyor. Pulmoner emboli olasılığı yüksektir ve görüntüleme gerekmektedir.

Bu hastada en uygun yaklaşım hangisidir?

- A)** Fetal radyasyon nedeniyle hiçbir görüntüleme yapılmaması
- B)** Gebelik sonuna kadar beklenmesi
- C)** Klinik olarak gerekli tanısal görüntülemenin gebelik nedeniyle engellenmemesi
- D)** Gebeliğin sonlandırılması
- E)** Yalnızca akciğer grafisinin yeterli kabul edilmesi

- 19. Aşağıdaki aşılarından hangisi gebelikte kontrendikedir?**

- A)** İnaktif influenza
- B)** Tdap
- C)** Hepatit B
- D)** MMR
- E)** Tetanoz

- 20. FDA'nın gebelikte ilaç risk sınıflandırmasına ilişkin güncel yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?**

- A)** A en güvenli, X en risklidir.
- B)** Yalnızca A ve B kategorileri kullanılmaktadır.
- C)** C kategorisi tüm yeni ilaçlar için kullanılmaktadır.
- D)** A-B-C-D-X sistemi kaldırılmış, PLLR ile anlatsal risk değerlendirmesine geçilmiştir.
- E)** İlaçların gebelik risk sınıflandırması tamamen kaldırılmıştır.

CEVAP ANAHTARI

1 B	2 C	3 C	4 A	5 C	6 B	7 C	8 D	9 B	10 B
11 A	12 B	13 D	14 B	15 B	16 B	17 C	18 C	19 D	20 D