

Sztochasztikus folyamatok 2015-01-23 vizsga

2015. június 19.

Figyelem! Természetesen a kidolgozás elolvasása nem ment fel a készülés alól. Csak azoknak tud érdemben segítséget nyújtani, akik egyébként is készültek. A feladatok helyességére semmilyen garanciát nem vállalok! Ha hibát találsz benne, akkor jelezd, vagy javítsd ki. A \LaTeX forrás elérhető az <https://github.com/dyj216/msc-sze-vill> címen.

A felkészüléshez ajánlom a tanár úr honlapján megtalálható `sztocha_01.pdf-sztocha_08.pdf`-eket. Ezekre vannak hivatkozások ebben a kidolgozásban is. Ezek elérhetőek a <http://www.sze.hu/~harmati/sztocha2.html> címen.

1. feladat

Szerencsejátékot játszunk, minden egyes játszmában 0,49 valószínűséggel nyerünk 100 Ft-ot, 0,51 valószínűséggel pedig veszítünk ugyanennyit. Kezdetben nekünk 1000 Ft-unk van, ellenfelünknek pedig 500. A játék addig tart, amíg valaki el nem veszíti az összes pénzét.

- (a) Mi a valószínűsége annak, hogy nyerünk, illetve veszítünk? (4 pont)
- (b) Ha több pénzzel kezdünk játszani, akkor nyilvánvalóan nagyobb valószínűséggel nyerünk. Legfeljebb mekkora lehet a nyerésünk valószínűsége? (4 pont)

a)

Egy játék nyerési valószínűsége p , a veszítési valószínűség $1 - p = q$.

$$p = 0,49$$

$$1 - p = q = 0,51$$

A tét mértéke: 100 Ft. A saját pénzünk 1000 Ft. Ebből $n_1 = 1000/100 = 10$ a játékaink száma. Az ellenfél pénze: 500 Ft. Ebből $n_2 = 500/100 = 5$.
 $n_1 + n_2 = 15$.

A nyerés valószínűsége:

$$P(\text{nyerünk}) = \frac{1 - \left(\frac{1-p}{p}\right)^{n_1}}{1 - \left(\frac{1-p}{p}\right)^{n_1+n_2}} = \frac{1 - \left(\frac{0,51}{1,49}\right)^{10}}{1 - \left(\frac{0,51}{0,49}\right)^{15}} \approx 0,4045$$

$$P(\text{vesztünk}) = 1 - P(\text{nyerünk}) = 1 - 0,4045 = 0,5955$$

b)

1 kört inkább elvesztünk, mint megnyerünk ($p < q$), ellenfelünk pénze konstans ($n_2 = 5$), így alkalmazhatjuk a következő határérték számítást:

$$\begin{aligned} P(\text{nyerünk}) &= \lim_{n_1 \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(\frac{1-p}{p}\right)^{n_1}}{1 - \left(\frac{1-p}{p}\right)^{n_1+n_2}} = \lim_{n_1 \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(\frac{1-p}{p}\right)^{n_1}}{1 - \left(\frac{1-p}{p}\right)^{n_1} \left(\frac{1-p}{p}\right)^{n_2}} = \\ &= \lim_{n_1 \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1-p}{p}\right)^{n_1}}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^{n_1}} \cdot \frac{\frac{1}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^{n_1}} - 1}{\frac{1}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^{n_1}} - \left(\frac{1-p}{p}\right)^{n_2}} = \frac{-1}{-\left(\frac{1-p}{p}\right)^{n_2}} = \\ &= \left(\frac{p}{1-p}\right)^{n_2} = \left(\frac{0,49}{0,51}\right)^5 \approx 0,8187 \end{aligned}$$

2. feladat

Egy Markov-lánc állapottere legyen $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, átmenetvalószínűségi mátrixa pedig:

$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- (a) Irreducibilis-e a Markov-lánc? (3 pont)
- (b) Határozzuk meg az invariáns eloszlást! (5 pont)
- (c) Tegyük fel, hogy az 1-esből indulunk. Átlagosan hány lépéssel érünk vissza? (3 pont)
- (d) Tegyük fel, hogy a 2-esből indulunk. Átlagosan hány lépéssel érünk az 5-ösbe? (5 pont)

a)

Szerintem sokat segít, ha felrajzoljuk a mátrix állapotokat is a mátrix széleire.

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array} & \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \end{array}$$

Az irreducibilis azt jelenti hogy nem felbontható, tehát mindegyik állapot kapcsolódó. Megint másképpen megfogalmazva: bármely állapotból kiindulva elérhető bármely másik állapot. Ezt nagyon jól lehet látni, amennyiben felrajzoljuk az állapotátmeneti gráfot. Azon egyértelműen látható, hogy egy rekurrens osztály van: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.

b)

Itt a mátrix oszlopait tekintve lehet felírni az alábbi egyenleteket:

$$\begin{aligned}
\pi_1 &= 0,5\pi_1 + \pi_5 \\
\pi_2 &= 0,5\pi_1 + 0,5\pi_2 \\
\pi_3 &= 0,5\pi_2 + 0,5\pi_3 \\
\pi_4 &= 0,5\pi_3 + 0,5\pi_4 \\
\pi_5 &= 0,5\pi_4
\end{aligned}$$

Ezt meg tudjuk a tanulmányainkból:

$$\sum_i \pi_i = 1 = \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5$$

Ezt az egyenletrendszert végig kell oldani, és akkor megkapjuk a megoldást erre kérdésre:

$$\pi_1 = \frac{2}{9}, \pi_2 = \frac{2}{9}, \pi_3 = \frac{2}{9}, \pi_4 = \frac{2}{9}, \pi_5 = \frac{1}{9},$$

c)

Ez nagyon egyszerű, ha már meghatároztuk az invariáns eloszlást:

$$E(T_{1 \rightarrow 1}) = \frac{1}{\pi_1} = \frac{9}{2} = 4,5$$

d)

A feltételt úgy valósíthatjuk meg, hogy létrehozunk egy új h állapotot, amely a kiindulási állapot lesz és ahonnan a kettes állapotba fogunk átlépni. Az ötös állapotból pedig a h állapotba lépünk. Az új \mathbf{P} mátrix:

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & h \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ h \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Viszont ez a mátrix már nem irreducibilis, hiszen nem csak rekurrens osztályokból áll, hanem tranziens állapot (tranziens állapot = ha elhagytuk

az állapotot, akkor már nem térünk bele vissza) is található benne. Ez szintén jól látható az állapotátmeneti gráfon.

Tehát az 1 tranziens osztályt eltávolítva a \mathbf{P} mátrixból megkapjuk az egyetlen 2, 3, 4, 5, h rekurrens osztályból álló \mathbf{P}' mátrixot.

$$\mathbf{P}' = \begin{matrix} & \begin{matrix} 2 & 3 & 4 & 5 & h \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ h \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Ennek is fel kell írni és ki kell számolni az invariáns eloszlását:

$$\begin{aligned} \pi_2 &= 0,5\pi_1 + \pi_h \\ \pi_3 &= 0,5\pi_2 + 0,5\pi_3 \\ \pi_4 &= 0,5\pi_3 + 0,5\pi_4 \\ \pi_5 &= 0,5\pi_4 \\ \pi_h &= \pi_5 \\ 1 &= \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5 + \pi_h \end{aligned}$$

Ezekből kiszámolva:

$$\pi_h = \frac{1}{8}$$

A többi nem érdekes, hiszen ebből kiszámolható a 2-ből 5-be jutás várható értéke. Azért kell levonni 2-t, mert jelenleg a h -ból h -ba megyünk, és nem az a kérdés.

$$E(T_{2 \rightarrow 5}) = E(T_{h \rightarrow h}) - 2 = \frac{1}{\pi_h} - 2 = 8 - 2 = 6$$

3. feladat

Két urnában (A és B) összesen két golyó van. Egy szabályos dobókockával dobunk. Ha a dobott szám hatos vagy egyes, akkor egy golyót átrakunk A -ból B -be, a többi esetben egy golyót teszünk át B -ből A -ba. Ha üres urnából kellene golyót áttenni a másikba, akkor nem csinálunk semmit, de azt is egy lépésnek tekintjük. Tekintsük állapotnak a golyók számát az A urnában!

- (a) Adjuk meg az átmeneti valószínűségi mátrixot! (5 pont)
- (b) Adjuk meg az invariáns eloszlást! (5 pont)

4. feladat

Egy üzletbe Poisson-folyamat szerint érkeznek a vevők, óránként átlagosan 10.

- (a) Mi a valószínűsége annak, hogy 5 perc alatt jön vevő? (3 pont)
- (b) Feltéve, hogy 10 percig nem jött senki, mi a valószínűsége, hogy a következő 20 percben legalább ketten jönnek? (3 pont)
- (c) Feltéve, hogy az első félórán 4 vevő jött, mi a valószínűsége, hogy összesen 10 vevő jön az első órában? (4 pont)

a)

Szerintem az alapötleted jó, tehát a keresett valószínűség:

$$P(\text{keresett}) = 1 - P(X = 0)$$

de, a paraméter az megváltozik: $10 \cdot 5/60 = 5/6$ lesz (10 volt kezdetben, és az 1 órára adott ennyit, most 5 percre kell, így jön ki a `sztocha6.pdf` példája alapján, amit a honlapról <http://www.sze.hu/~harmati/sztocha2.html> le lehet tölteni). Így a képlet:

$$P(X) = 1 - P(X_{\frac{5}{60}} = 0) = 1 - \frac{5^0}{0!} e^{-\frac{5}{6}} \approx 0,5654$$

b)

Hasonlóan itt is a paraméter megválasztása szerintem helytelen. A helyes paraméter szerintem: $10 \cdot 20/60 = 10/3$.

$$P(X_{1/3} \geq 2) = P(X_{1/2} - X_{1/6} \mid X_{1/6} = 0)$$

Valóban diszjunktak az időtartamok, tehát a feltétel lényegtelen.

$$P(X_{20/60} \geq 2) = 1 - (P(X_{20/60} = 0) + P(X_{20/60} = 1))$$

$$P(X_{20/60} \geq 2) = 1 - \frac{\left(\frac{10}{3}\right)^0}{0!} e^{-\frac{10}{3}} - \frac{\left(\frac{10}{3}\right)^1}{1!} e^{-\frac{10}{3}} \approx 0,8454$$

c)

Itt ugye az a nehézség, hogy nem diszjunktak az időpillanatok így nem hagyhatóak el a feltételek.

$$\begin{aligned} P(X_{60/60} = 10 \mid X_{30/60} = 4) &= \frac{P(X_1 = 10 \cap X_{1/2} = 4)}{P(X_{1/2} = 4)} \\ &= \frac{P(X_1 - X_{1/2} = 6 \cap X_{1/2} = 4)}{P(X_{1/2} = 4)} \end{aligned}$$

A paraméter alakulása fél órára: $10 \cdot 30/60 = 5$

$$\frac{P(X_{1/2} = 6 \cap X_{1/2} = 4)}{P(X_{1/2} = 4)} = \frac{\frac{5^6}{6!} e^{-5} \cdot \frac{5^4}{4!} e^{-5}}{\frac{5^4}{4!} e^{-5}}$$

Egyszerűsítve:

$$\frac{P(X_{1/2} = 6 \cap X_{1/2} = 4)}{P(X_{1/2} = 4)} = \frac{5^4}{4!} e^{-5} \approx 0,1462$$

5. feladat

Egy üzletben egyetlen eladó dolgozik, aki exponenciális eloszlású idő alatt szolgál ki egy vevőt (az átlagos kiszolgálási idő 5 perc). A vevők érkezése között eltelt idő szintén exponenciális eloszlású, továbbá tudjuk azt is, hogy egy óra alatt átlagosan 8 vevő érkezik. Az üzlet befogadóképessége végtelen.

- (a) Mi a valószínűsége, hogy van vevő a boltban? (4 pont)
- (b) Mi a valószínűsége annak, hogy pontosan annyi vevő van a boltban, amennyi a boltban tartózkodó vevők számának várható értéke? (4 pont)
- (c) Átlagosan mennyi időt tölt el egy vevő a boltban? (4 pont)
- (d) Átlagosan hányan várják azt, hogy végre sorra kerüljenek? (4 pont)