Quản lý dịch bệnh hại lúa – Sâu hại lúa

Sâu năn hại lúa

Sâu trưởng thành (muỗi năn)



Trứng muỗi năn

Dảnh lúa bị hại, biến thành những dạng "cọng hành"

Pachydiplosis oryzae Wood- Mason

Sâu năn thường phát sinh thành dịch Khi trời âm u, mưa nhiều, nhiệt độ từ 22-250C, ẩm độ từ 80-90%. Muỗi năn phá hại chủ yếu thời kỳ mạ đã lớn và lúa cấy mới bén chân. Lúa mùa bị hại nặng hơn lúa xuân;mùa sớm bị hại nặng hơn mùa chính vụ

*** PHÒNG TRỪ**

- Sử dụng các giống kháng sâu năn.

- Vệ sinh đồng ruộng, diệt trừ cỏ dại.

- Điều chỉnh thời vụ lệch pha với thời gian phát sinh gây hại của sâu năn.

- Bón phân cân đối, đặc biệt tăng lượng phân lân để hạn chế sâu năn.

- Dùng bẫy đèn diệt muỗi

- Bảo vệ ong ký sinh là thiên địch của sâu năn

-Ruộng chớm bị sâu năn cần kịp thời tháo nước phơi ruộng hạn chế sự lây lan phát triển của sâu.

- Dùng thuốc dạng hạt như Vibasu 10H, Basudin 10H hoặc Furadan 3G trộn với đất bột rắc theo từng ổ để diệt sâu non

Sâu phao

Nymphula depunctatus Guenee

Trưởng thành sâu phao | Sâu cuộn lá lúa thành những "phao" nhỏ | Sâu phao hại trên lá lúa

Tên khác- Nymphula staynalis; Zebronia decassalis (Guenee); Hydrocaupa depunctalis (Guenee)

- Sâu phao chỉ hại trên ruộng lúa nước, không hại trên lúa cạn.
- Nếu trong ruộng lúa cùng có sự xuất hiện gây hại của ruồi và sâu đục thân thì tác hại của chúng gây ra sẽ làm năng suất lúa giảm đáng kể.

*** PHÒNG TRỪ**

- Rút nước để ruộng cạn vài giờ sâu có thể chết vì không thể bơi đi kiếm ăn được.
- Khi sâu có mật độ cao phun các loại thuốc Regent 800WP, Padan 95SP, Actara 25WG để diệt sâu non.

Sâu gai

Dicladispa armigera (Olivier)

Dicladispa armigera boutani Weise

Trưởng thành có nhiều gai trên mình, thường qua đông trên cỏ dại, thích ăn và đẻ trứng ở những trà lúa non, bón nhiều đạm. Sâu non gặm chất xanh giữa 2 lớp biểu bì tạo thành vết sọc màu trắng trên lá. Thời tiết nóng, ẩm độ cao, nắng mưa xen kẽ thích hợp cho sâu gai phát triển. Ruộng cao ít bị hại hơn ruộng nước.



*** PHÒNG TRỪ**

- Vệ sinh đồng ruộng, diệt sạch cỏ dại. Khi mật độ trứng cao ngắt phần ngọn lá có trứng và vợt bắt trưởng thành.

- Phun các loại thuốc Regent 800WG, Padan 95SP hoặc Actara 25WG khi sâu phát sinh rộ.

Bọ xít

BỌ XÍT DÀI - Leptocorisa acuta Thunberg
BỌ XÍT XANH - Nezara viridula Linnaeus
BỌ XÍT ĐEN - Scotinophara spp

Bọ xít thường gây hại nặng ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, quan trọng nhất là thời kỳ trỗ, bông lúa bị hại lửng lép hoặc bạc trắng, giảm năng suất. Ruộng lúa gần bìa rừng, gần ruộng rau màu và có nhiều cỏ dại thường bị hại nặng.

Từ trái qua phải: Hạt lúa bị hại; Bọ xít dài trưởng thành; Trứng bọ xít dài.

Từ trái qua phải: Bọ xít xanh hại bông lúa; ổ trứng; Trưởng thành (trên); bọ xít non (dưới)

*** PHÒNG TRỪ**

- Vệ sinh đồng ruộng, diệt trừ cỏ dại và ký chủ phụ.

- Cấy gọn thời vụ. Phát hiện sớm thu gom ổ trứng để diệt, vợt bắt trưởng thành.

- Dùng bả lá xoan tẩm nước giải một ngày, bó vào cọc cắm nhử bọ xít dài đến để tiêu diệt.

- Dùng các loại thuốc Ofatox 400EC, Fastac 5EC, Dimenat 40EC hoặc Actara 25WG. phun khi bọ xít phát sinh rộ.

Bọ xít đen hại lúa

Bệnh bọ trĩ

Bọ trĩ trưởng thành

Bọ trĩ non

Ruộng lúa gieo sạ bị trĩ hại nặng

Stenchaetothrips biformis Bagnall

Bọ xít thường gây hại khi lúa còn non ở giai đoạn mạ, lúa lúa hồi xanh và đang đẻ nhánh.

Lúa xuân muộn (tháng 3,4) thường bị hại nặng hơn cả. Lúa gieo thẳng bị hại nặng hơn lúa cấy. Những năm khô hạn thích hợp cho bọ trĩ phát sinh rộ. Ruộng lúa càng khô hạn thì thiệt hại do bọ trĩ gây ra càng lớn.

*** PHÒNG TRỪ**

Bọ trĩ rất dễ trừ nhưng tại những vùng thường xuyên bị bọ trĩ phải áp dụng các biện pháp tổng hợp:

- Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, nhất là cỏ môi cũng là ký chủ chính của bọ trĩ.
- Gieo cấy mật độ vừa phải, giữ nước không để ruộng khô.
- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện và phun tuốc kịp thời.
- Dùng các loại thuốc Regent 800WG, Hopsan 75ND, Selecron 500EC hoặc Actara 25WP phun khi bọ trĩ phát sinh rộ.