

TAMAÑO DE VACAS DE CRÍA.

La observación durante años de un rodeo de cría nos llevó a la selección del tamaño más adecuado para las madres del rodeo.

Nuestro objetivo es que las hembras de los rodeos tengan un peso adulto entre los 400 y 430 kilos. Si bien el grupo de vacas seleccionadas como “plantel” está dentro de los pesos citados, vemos que la dispersión de pesos al nacer es muy grande como consecuencia de los toros usados (seleccionados precisamente por peso al nacer). Algunos padres dejan terneros con un peso al nacer entre 25 y 30 kg.; otros entre 30 y 35; y algunos pesos mayores todavía.

PESO AL NACER

Teniendo como objetivo un determinado tamaño adulto para toros y vacas de rodeo, y siendo este carácter imposible de seleccionar en forma directa por el tiempo que requiere, utilizamos el peso al nacer como una referencia básica, partiendo del concepto biológico global que la correlación entre peso al nacer y el peso adulto, es positiva. Contando con el dato del peso al nacer, podemos seleccionar aquellos que tengan mayores posibilidades de generar los pesos adultos que pretendemos tener en nuestros rodeos; pero que a su vez no sean generadores de distocias.

RELACIÓN ENTRE EL PESO DEL TERNERO Y SU MADRE

Como información básica tomo un gráfico enviado por Rodolfo Peralta al grupo veterinario GREVET (al cual pertenezco)

GRÁFICO



En dicho gráfico se observa que a medida que aumenta el porcentaje del peso al nacer respecto al peso de la madre, aumentan las distocias. Se ve claramente que el problema de las distocias se agudiza cuando el peso al nacer (como porcentaje del peso de la madre) es superior al 7%

En base al gráfico anterior se construyó una tabla que simula una correlación positiva teórica (1) entre el peso al nacer y el peso posparto de la madre; que no genere distocias (o cuya probabilidad sea baja).

TABLA

Correspondencia entre el Peso al Nacer y otras etapas del crecimiento					
Peso al Nacer	Peso Vc Adulta para un ternero del 7 % PN	Vq. 1° servicio 75% Adulta	Vq. 1° servicio 80% Adulta	Vq. 1ª Parición 90% Adulta	TORO Adulto = Vc. X 1,5
25	357	268	286	321	536
26	371	279	297	334	557
27	386	289	309	347	579
28	400	300	320	360	600
29	414	311	331	373	621
30	429	321	343	386	643
31	443	332	354	399	664
32	457	343	366	411	686
33	471	354	377	424	707
34	486	364	389	437	729
35	500	375	400	450	750
36	514	386	411	463	771
37	529	396	423	476	793
38	543	407	434	489	814
39	557	418	446	501	836
40	571	429	457	514	857
41	586	439	469	527	879
42	600	450	480	540	900
43	614	461	491	553	921

APLICACIÓN DE LA TABLA

Los datos de la primera columna son los pesos al nacer y la segunda el peso posparto que debe tener la madre para que el ternero sea el 7% del peso de la misma. Conceptualmente podríamos pensar que si el peso de la madre (en cada uno de los casos) es inferior al que figura en la tabla estaríamos entrando en “la zona donde podrían aumentar las distocias”, y si fuera

mayor “disminuiría la eficiencia energética” del sistema. En las columnas restantes, los pesos correspondientes a distintas etapas del crecimiento tomados de distintas fuentes.

La tabla es una abstracción racional “fisiológica” basada en una sola variable. En la realidad seguramente hay diferencias en distintas razas y aún en distintos biotipos dentro de las razas. Además se darán variaciones debidas a efectos climáticos, nutricionales, comerciales, etc.; que siempre forman parte de cada sistema de producción en particular. Es por estas razones que los valores de la tabla en sí mismos no sean importantes; pero si los desvíos respecto a los mismos; y si estos se repiten en el tiempo.