


Završni ispit iz Fizike (24. lipanj 2024.)

1. Pitanja višestrukog izbora

Upute: Na pitanja višestrukog izbora 1.1 do 1.8 odgovorite zaokruživanjem jednog točnog odgovora na obrascu za odgovore. Točan odgovor nosi 1 bod, netočan odgovor -0.25 bodova, a neodgovoreno pitanje nula bodova.

- 1.1 Kada bi se čestica mase $m > 0$ gibala brzinom svjetlosti c (što ne može), njezina (linearna) količina gibanja p iznosila bi:
- (a) 0,
 - (b) mc ,
 - (c) $2mc$,
 - (d) mc^2
 - (e) ∞ . **točno**
- 1.2 Vrlo dugi valjak od izolatora jednoliko je volumno nabijen pozitivnim nabojem. Koja je od sljedećih tvrdnji točna o iznosu električnog polja **unutar** valjka?
- (a) Prema Gaussovom zakonu, iznos električnog polja obrnuto je proporcionalan udaljenosti od središta valjka.
 - (b) Prema Biot-Savartovom zakonu, iznos električnog polja obrnuto je proporcionalan udaljenosti od središta valjka.
 - (c) Prema Ampèreovom zakonu, iznos električnog polja obrnuto je proporcionalan udaljenosti od središta valjka.
 - (d) Prema Gaussovom zakonu, iznos električnog polja proporcionalan je udaljenosti od središta valjka. **točno**
 - (e) Prema Ampèreovom zakonu, iznos električnog polja ne ovisi o udaljenosti od središta valjka.
- 1.3 Potencijal u nekom prostoru je ovisan o koordinatama kao $U(\mathbf{r}) = Ayz^2$, gdje je A konstanta. Kakvo je električno polje u tom prostoru koje odgovara tom potencijalu?
- (a) $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = 2Ayz\hat{\mathbf{x}}$,
 - (b) $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = Ayz\hat{\mathbf{y}}$,
 - (c) $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -Az\hat{\mathbf{y}} + 2Ay\hat{\mathbf{z}}$,
 - (d) $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -2Ay\hat{\mathbf{y}} - Az^2\hat{\mathbf{z}}$,
 - (e) $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -Az^2\hat{\mathbf{y}} - 2Ayz\hat{\mathbf{z}}$. **točno**
- 1.4 Prema Gaussovom zakonu za magnetsko polje, tok magnetskog polja \mathbf{B} kroz bilo koju zatvorenu plohu jednak je nuli. Diferencijalni oblik te tvrdnje jest:
- (a) $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$.
 - (b) $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t$.
 - (c) $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. **točno**
 - (d) $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \int \nabla \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$.
 - (e) $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0$.

- 1.5 Na slici je prikazana žica kroz koju teče struja te su označeni smjer struje i smjer magnetske sile na žicu. Ako je žica orijentirana tako da na nju djeluje maksimalna sila, a magnetsko polje je homogeno, koji je smjer magnetskog polja?



- (a) \hat{x} ,
 (b) \hat{y} ,
 (c) $-\hat{y}$, **točno**
 (d) \hat{z} ,
 (e) $-\hat{z}$
- 1.6 Električno polje ravnog elektromagnetskog vala koji ima valni broj k i kružnu frekvenciju ω je dano s $\mathbf{E} = E_0 \sin(kz - \omega t)(\hat{x} + \hat{y})$. Koji od sljedećih izraza daje smjer pridruženog magnetskog polja \mathbf{B} ?
- (a) \hat{z} .
 (b) $-\hat{x} + \hat{y}$. **točno**
 (c) $-\hat{x} - \hat{y}$.
 (d) $\hat{x} - \hat{z}$.
 (e) $\hat{y} - \hat{z}$.
- 1.7 U ravnom linearno polariziranom elektromagnetskom valu kružne frekvencije ω u vakuumu
- (a) električno i magnetsko polje imaju stalan iznos.
 (b) vektori električnog i magnetskog polje su međusobno paralelni.
 (c) vektori električnog i magnetskog polja gledaju u smjeru širenja vala.
 (d) Poyntingov vektor ima iznos koji se ne mijenja u vremenu.
 (e) Ništa od gore navedenog nije istinito. **točno**
- 1.8 Laserski snop prolazi kroz dvije pukotinu i na zastoru se vidi interferencijski uzorak. Ako pokrijemo jednu pukotinu staklenom pločom, faza vala koji prolazi kroz staklo promijeni se za π u odnosu na početnu situaciju. Kako se promijeni interferencijski uzorak?
- (a) Nestaje interferencijski uzorak i ostaje samo svijetla točka.
 (b) Nestaje interferencijski uzorak i ostaje samo tamni zastor.
 (c) Maksimumi u interferencijskom uzorku se udalje.
 (d) Maksimumi u interferencijskom uzorku se približe.
 (e) Maksimumi i minimumi u interferencijskom uzorku se zamijene. **točno**

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4 napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

Udaljenost neke određene zvijezde, mjereno iz Zemljina referentnog sustava, je 7.11 svjetlosnih godina. Promatrano iz sustava putnika u svemirskoj letjelici, vrijeme potrebno da bi se stiglo od Zemlje do zvijezde je 3.35 godina. Koliko traje putovanje promatrano sa Zemlje te kolika je prijeđena udaljenost koju bilježe putnici u svemirskoj letjelici? Upute: Jedna svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe tokom jedne godine.

Rješenje: Krećemo od izraza za dilataciju vremena

$$\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}, \quad (1)$$

gdje je $\Delta t'$ vrijeme mjereno od strane putnika u letjelici, Δt vrijeme mjereno na Zemlji, a v brzina kojom se letjelica giba u odnosu na Zemlju. U tom izrazu nam nedostaju vrijeme puta mjereno sa Zemlje i brzina gibanja svjetlosti. Vrijeme mjereno sa Zemlje jednostavno možemo izračunati kao

$$\Delta t = \frac{D}{v}, \quad (2)$$

gdje je D udaljenost zvijezde od Zemlje. Kombiniranjem dvaju gornjih izraza dobijemo:

$$\Delta t' = \frac{D}{v} \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} \quad (3)$$

odakle možemo izraziti i izračunati

$$v = \frac{c}{\sqrt{1 + \left(\frac{c\Delta t'}{D}\right)^2}} = 0.905 \ c. \quad (4)$$

Dalje izračunavamo vrijeme mjereno sa Zemlje:


$$\Delta t = 7.86 \text{ godina}. \quad (5)$$

U smjeru gibanja, za putnike u svemirskoj letjelici dolazi do kontrakcije duljine pa će oni mjeriti udaljenost od Zemlje do zvijezde

$$D' = D \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} = 3.03 \text{ svjetlosne godine}. \quad (6)$$

Računski zadatak 2.2

Petljom na slici teče struja jakosti I . Izračunajte iznos magnetskog polja u točki O . Polumjeri dijelova petlje su a i b , a kut je $\phi = 90^\circ$.



Rješenje: Ukupno magnetsko polje u točki O ćemo izračunati kao sumu doprinosa pojedinih dijelova petlje:

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2 + \mathbf{B}_3 + \mathbf{B}_4, \quad (7)$$

gdje možemo segmentom 1 nazvati kružni luk polumjera a , segmentom 3 kružni luk polumjera b , a segmenti 2 i 4 dijelovi petlje koji povezuju veći i manji kružni luk. Magnetsko polje svakog od segmenata ćemo izračunati koristeći Biot-Savartov zakon. Prema tome, magnetsko polje koje stvara prvi segment je

$$\mathbf{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\mathbf{s}_1 \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}, \quad (8)$$

odnosno, iznos tog magnetskog polja

$$|\mathbf{B}_1| = B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{|d\mathbf{s}_1 \times \hat{\mathbf{r}}|}{r^2}. \quad (9)$$

Izrazit ćemo

$$|d\mathbf{s}_1 \times \hat{\mathbf{r}}| = |d\mathbf{s}_1| |\hat{\mathbf{r}}| \sin \theta, \quad (10)$$

gdje je θ kut između vektora $d\mathbf{s}_1$ i $\hat{\mathbf{r}}$. Pošto su ova dva vektora u svakom dijelu ovog segmenta petlje okomiti jedan na drugi, $\sin \theta = 1$. Onda je magnetsko polje dano izrazom

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{ds_1}{r^2}. \quad (11)$$

Sve ćemo izraziti u cilindričnom koordinatnom sustavu u kojem je $ds_1 = r d\phi$. Pošto ovaj dio petlje ima konstantni polumjer koristimo $r = a$. Konačno izračunavamo magnetsko polje segmenta 1:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} d\phi = \frac{3\mu_0 I}{8a}. \quad (12)$$

Analogno, raspisujemo Biot-Savartov zakon za svaki od preostalih segmenata. Za segment 2 vrijedi

$$|\mathbf{B}_2| = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{|d\mathbf{s}_2 \times \hat{\mathbf{r}}|}{r^2}. \quad (13)$$

Pošto su za segment 2 vektori $d\mathbf{s}_2$ i $\hat{\mathbf{r}}$ paralelni na cijelom segmentu, onda je

$$|d\mathbf{s}_2 \times \hat{\mathbf{r}}| = 0, \quad (14)$$

odnosno

$$B_2 = 0. \quad (15)$$

Slična situacija je za segment 4 pa je

$$B_4 = 0. \quad (16)$$

Raspisujemo Biot-Savartov zakon za segment 3

$$|\mathbf{B}_3| = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{|\mathrm{d}\mathbf{s}_3 \times \hat{\mathbf{r}}|}{r^2}. \quad (17)$$

Način raspisivanja je identičan onom kod segmenta 1 i na kraju dobijemo

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\phi = \frac{\mu_0 I}{8b}. \quad (18)$$

Ukupno magnetsko polje je onda

$$B = \frac{\mu_0 I}{8} \left(\frac{3}{a} + \frac{1}{b} \right). \quad (19)$$

Računski zadatak 2.3

Kružna petlja polumjera 2 cm i otpora 0.6Ω nalazi se u prostoru homogenog magnetskog polja \mathbf{B} čiji je smjer okomit na ravninu petlje. Magnetsko polje mijenja se u vremenu za $t > 0$ prema izrazu $B(t) = \beta t e^{-\frac{t}{\tau}}$, gdje je $\tau = 0.5 \text{ s}$ i $\beta = 3 \text{ T/s}$. Kolika je maksimalna jakost struje koja se inducira u petlji?

Rješenje:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(r^2 \pi \beta t e^{-\frac{t}{\tau}} \right), \quad (20)$$

$$\mathcal{E} = -r^2 \pi \beta \frac{d}{dt} \left(t e^{-\frac{t}{\tau}} \right), \quad (21)$$

$$\mathcal{E} = r^2 \pi \beta e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{t}{\tau} - 1 \right), \quad (22)$$

$$\mathcal{E}_{max} = ? \quad (23)$$

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = 0, \quad (24)$$

$$r^2 \pi \beta \frac{d}{dt} \left(e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{t}{\tau} - 1 \right) \right) = 0, \quad (25)$$

$$r^2 \pi \beta \left(-\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{t}{\tau} - 1 \right) + e^{-\frac{t}{\tau}} \frac{1}{\tau} \right) = 0, \quad (26)$$

$$\frac{r^2 \pi \beta e^{-\frac{t}{\tau}}}{\tau^2} (2\tau - t) = 0, \quad (27)$$

$$2\tau - t = 0, \Rightarrow t = 2\tau, \Rightarrow t_{\mathcal{E}_{max}} = 1 \text{ s}. \quad (28)$$

$$\mathcal{E}_{max} = r^2 \pi \beta e^{-\frac{1}{\tau}} \left(\frac{1}{\tau} - 1 \right) = 5.1 \cdot 10^{-4} \text{ V}, \quad (29)$$

$$I_{max} = \frac{\mathcal{E}_{max}}{R} = 8.5 \cdot 10^{-4} \text{ A}. \quad (30)$$

Računski zadatak 2.4

Električna komponenta elektromagnetskog vala u vakuumu jednaka je

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}. \quad (31)$$

Izračunajte intenzitet, tj. iznos vremenski uprosječenog Poyntingovog vektora zadanog EM vala.

Rješenje: Magnetska komponenta zadanog vala dana je s

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{k}}{|\mathbf{k}|} \times (\mathbf{E}/c) = \hat{z} \times (\mathbf{E}/c) = E_0/c \cdot \cos(kz - \omega t) \hat{y} - E_1/c \cdot \cos(kz - \omega t) \hat{x}. \quad (32)$$

Poyntingov vektor \mathbf{S} predstavlja snagu po jedinici površine koju nosi val i definiran je kao

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}). \quad (33)$$

Uz električno polje $\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}$ i magnetsko polje $\mathbf{B}(z, t) = B_0 \cos(kz - \omega t) \hat{y} - B_1 \cos(kz - \omega t) \hat{x}$:

$$\mathbf{E} \times \mathbf{B} = (E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x} + E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{y}) \quad (34)$$

$$\times (B_0 \cos(kz - \omega t) \hat{y} - B_1 \cos(kz - \omega t) \hat{x}) \quad (35)$$

$$= E_0 B_0 \cos^2(kz - \omega t) \hat{z} + E_1 B_1 \cos^2(kz - \omega t) \hat{z} \quad (36)$$

Koristeći $E_0 = cB_0$ i $E_1 = cB_1$ i $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$, dobivamo

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} [E_0 B_0 \cos^2(kz - \omega t) + E_1 B_1 \cos^2(kz - \omega t)] \hat{z} \quad (37)$$

$$= \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} [E_0^2 \cos^2(kz - \omega t) + E_1^2 \cos^2(kz - \omega t)] \hat{z}. \quad (38)$$

Vremenski uprosječen Poyntingov vektor jednak je

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S} dt, \quad (39)$$

dok je prosječna vrijednost $\langle \cos^2(kz - \omega t) \rangle$ jednaka $\frac{1}{2}$.

$$|\langle \mathbf{S} \rangle| = \left| \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} [E_0^2 \langle \cos^2(kz - \omega t) \rangle + E_1^2 \langle \cos^2(kz - \omega t) \rangle] \hat{z} \right| \quad (40)$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} (E_0^2 + E_1^2). \quad (41)$$