



على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (04) صفحات (من الصفحة 1 من 7 إلى الصفحة 4 من 7)



التمرين الأول: (07 نقاط)

- I- فحم هيدروجيني أو كسجيني (A) كثافته البخارية بالنسبة للهواء  $d=1,52$ ، من خصائصه أنه يتفاعل مع DNPH.  
(1) جد الصيغة المجملة للمركب (A).  
(2) اكتب الصيغة نصف المفصلة للمركب (A).

يعطى:  $M_C = 12 \text{g.mol}^{-1}$  ,  $M_H = 1 \text{g.mol}^{-1}$  ,  $M_O = 16 \text{g.mol}^{-1}$

- II- من أجل تحضير مركب عضوي (N) يدخل في تركيب مادة صيدلانية تستعمل كمضاد للالتهابات، انطلاقا من المركب (A) نجري سلسلة التفاعلات التالية:

- 1)  $(A) + \text{CH}_3\text{MgCl} \longrightarrow (B)$
- 2)  $(B) + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow (C) + \text{MgClOH}$
- 3)  $(C) + \text{SOCl}_2 \longrightarrow (D) + \text{SO}_2 + \text{HCl}$
- 4)  $(D) + \text{Mg} \xrightarrow{\text{الإيثر}} (E)$
- 5)  $(E) + \text{CO}_2 \longrightarrow (F)$
- 6)  $(F) + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow (G) + \text{MgClOH}$
- 7)  $(G) + \text{PCl}_5 \longrightarrow (H) + \text{POCl}_3 + \text{HCl}$
- 8)  $(H) + \text{C}_6\text{H}_6 \xrightarrow{?} (I) + \text{HCl}$
- 9)  $(I) \xrightarrow{\text{Zn} / \text{H}_3\text{O}^+} (J) + \text{H}_2\text{O}$
- 10)  $(A) \xrightarrow[\text{H}_2\text{SO}_4]{\text{KMnO}_4} (K)$
- 11)  $(K) + \text{PCl}_5 \longrightarrow (L) + \text{POCl}_3 + \text{HCl}$



(1) جد الصيغ نصف المفصلة للمركبات (L) ، (K) ، (J) ، (I) ، (H) ، (G) ، (F) ، (E) ، (D) ، (C) ، (B) ، (M) و (N) .

(2) اذكر الوسيط المستعمل في التفاعلين رقم 8 و 12.

(3) يتميز المركب (N) بتماكب ضوئي. مثل مماكباته حسب إسقاط فيشر.

(4) نزع الماء من المركب (C) في وجود  $\text{H}_2\text{SO}_4$  عند  $170^\circ\text{C}$  ينتج المركب (Q) و بلمرة المركب (Q) تعطي البوليمير (P).

أ- اكتب معادلات التفاعل المؤدية للمركب (Q) و البوليمير (P).

ب- أعط مقطع من البوليمير (P) يتكون من ثلاثة وحدات بنائية.

### التمرين الثاني: (07 نقاط)

I- ثنائي غليسريد (A) له قرينة تصبن  $I_s = 209,3$  ، يتكون من الحمض الدهني المشبع (B) والحمض الدهني (C).  
(1) احسب الكتلة المولية لثنائي الغليسريد (A).

يعطى:  $M_C = 12\text{g.mol}^{-1}$  ،  $M_H = 1\text{g.mol}^{-1}$  ،  $M_O = 16\text{g.mol}^{-1}$  ،  $M_K = 39,1\text{g.mol}^{-1}$

(2) تُعَدَّل كتلة 1g من الحمض الدهني المشبع (B) بـ 10 mL من (0,5N) NaOH .

أ- احسب الكتلة المولية للحمض الدهني (B).

ب- استنتج الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني (B).

(3) الحمض الدهني (C) يرمز له بـ  $\text{Cn:}2\Delta^{9,12}$ .

أ- أعط عدد ذرات الكربون في الحمض الدهني (C).

ب- استنتج الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني (C).

ج- اكتب تفاعل أكسدة للحمض الدهني (C) بيرمنغنات البوتاسيوم المركزة و في وسط حمضي.


(4) اكتب الصيغ نصف المفصلة الممكنة لثنائي الغليسريد (A).

(5) احسب قرينة اليود  $I_i$  لثنائي الغليسريد (A).

يعطى:  $M_I = 127\text{g.mol}^{-1}$




## II- لديك الأحماض الأمينية التالية:

الحمض الأميني	Ala	Tyr	Asp
الصيغة	$\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{COOH}$	$\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ 	$\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$

(1) صنف الأحماض الأمينية السابقة.

(2) يتأين الحمض الأميني التيروسين Tyr عند تغير الـ pH وفق المخطط التالي:



أ- اكتب صيغ المركبات (A) ، (B) ، (C) .

ب- احسب قيمة الـ  $\text{pH}_i$  للحمض الأميني التيروسين Tyr .

(3) لديك ثلاثي الببتيد Ala-Asp-Tyr

أ- اكتب الصيغة نصف المفصلة لثلاثي الببتيد

ب- أعط صيغته الأيونية عند  $\text{pH} = 1$  و عند  $\text{pH} = 13$

## التمرين الثالث: (06 نقاط)

(1) يحترق 1,32g من البروبان  $\text{C}_3\text{H}_{8(g)}$  في مسعر حراري (نهمل السعة الحرارية للمسعر) يحتوي

على 723 g من الماء، فترتفع درجة حرارة الماء بمقدار  $\Delta T = 22 \text{ K}$  .

علماً أن السعة الحرارية الكتلية للماء  $c_{\text{H}_2\text{O}} = 4,185 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$  .

أ- احسب كمية الحرارة Q الناتجة عن احتراق كتلة البروبان.

ب- ماهي قيمة أنطالبي احتراق البروبان الغازي  $\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{C}_3\text{H}_{8(g)})$  ؟

يعطى:  $M_C = 12 \text{ g.mol}^{-1}$  ,  $M_H = 1 \text{ g.mol}^{-1}$



ج- اكتب معادلة الإحتراق التام للبروبان الغازي  $C_3H_{8(g)}$ .

د- جد أنطالبي تشكل البروبان الغازي  $\Delta H_f^\circ(C_3H_{8(g)})$ .



يعطى:  $\Delta H_f^\circ(H_2O_{(l)}) = -286 \text{ kJ.mol}^{-1}$  ,  $\Delta H_f^\circ(CO_{2(g)}) = -393 \text{ kJ.mol}^{-1}$

(2) احسب أنطالبي تشكل البروبان الغازي  $\Delta H_f^\circ(C_3H_{8(g)})$  من خلال طاقات الروابط ثم قارن بين النتيجة.


يعطى: أنطالبي تصعيد الكربون عند  $25^\circ\text{C}$   $\Delta H_{\text{sub}}^\circ(C_{(s)}) = 717 \text{ kJ.mol}^{-1}$

الرابطة	H-H	C-H	C-C
$\Delta H_d^\circ(\text{kJ.mol}^{-1})$	436	413	348

(3) لديك التفاعلين التاليين:



أ- استنتج أنطالبي هدرجة البروبن الغازي  $\Delta H_3^\circ$ .



ب- احسب أنطالبي تشكل كلور البروبان السائل  $\Delta H_f^\circ(C_3H_7Cl_{(l)})$ .

يعطى:  $\Delta H_f^\circ(HCl_{(g)}) = -92 \text{ kJ.mol}^{-1}$

ج- جد أنطالبي تفكك الرابطة C-Cl  $\Delta H_d^\circ(C-Cl)$ .

يعطى:  $\Delta H_{\text{vap}}^\circ(C_3H_7Cl_{(l)}) = 27 \text{ kJ.mol}^{-1}$  ,  $\Delta H_d^\circ(Cl-Cl) = 242 \text{ kJ.mol}^{-1}$




## الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 5 من 7 إلى الصفحة 7 من 7)

### التمرين الأول: (07 نقاط)

بوليمير (P) مقاوم ممتاز للحرارة والمواد الكيميائية يدخل في مكونات بذلة رجال الحماية المدنية.  
من أجل تحضير البوليمير (P) نمر بالمراحل التالية:

#### I- المرحلة الأولى:

- 1)  $\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{H} + \text{CH}_3-\text{MgCl} \longrightarrow (\text{A})$
- 2)  $(\text{A}) + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow (\text{B}) + \text{MgClOH}$
- 3)  + (B)  $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} (\text{C}) + \text{H}_2\text{O}$
- 4)  $(\text{C}) \xrightarrow[\text{H}_2\text{SO}_4]{\text{KMnO}_4} (\text{D}) + 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$
- 5)  $(\text{D}) + \text{CH}_3-\text{Cl} \xrightarrow{\text{AlCl}_3} (\text{E}) (\text{موقع ميتا}) + \text{HCl}$
- 6)  $(\text{E}) \xrightarrow[\text{H}_2\text{SO}_4]{\text{KMnO}_4} (\text{F}) + \text{H}_2\text{O}$

- جد الصيغ نصف المفصلة للمركبات (A) ، (B) ، (C) ، (D) ، (E) و (F).

#### II- المرحلة الثانية:

- 1)  $(\text{G}) + \text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} (\text{H}) + \text{H}_2\text{O}$
- 2)  $(\text{H}) + \text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} (\text{I}) (\text{موقع ميتا}) + \text{H}_2\text{O}$
- 3)  $(\text{I}) \xrightarrow[\text{HCl}]{\text{Fe}} \text{NH}_2 \text{---} \text{C}_6\text{H}_4 \text{---} \text{NH}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$   
(K)

- جد الصيغ نصف المفصلة للمركبات (G) ، (H) و (I) .

#### III- المرحلة الثالثة:

بلمرة المركب (F) مع المركب (K) تعطي البوليمير (P).

أ- ما نوع هذه البلمرة ؟



ب- مثل مقطعا لهذا البوليمير يتكون من وحدتين بنائيتين.

ج- إذا كانت درجة البلمرة تساوي 800 .

- احسب الكتلة المولية المتوسطة للبوليمير (P).

علماً أن:  $M_H = 1 \text{ g.mol}^{-1}$  ,  $M_C = 12 \text{ g.mol}^{-1}$  ,  $M_O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$  ,  $M_N = 14 \text{ g.mol}^{-1}$

### التمرين الثاني: (06 نقاط)

I- ثنائي غليسيريد (A) يدخل في تركيبه الأحماض الدهنية التالية:

- حمض الأراشيدونيك :  $C_{20}:4\Delta^{5,8,11,14}$

- حمض البالمتيك :  $CH_3-(CH_2)_{14}-COOH$

(1) اكتب معادلة تفاعل أكسدة حمض الأراشيدونيك بواسطة  $KMnO_4$  في وسط من حمض  $H_2SO_4$ .

(2) جد الصيغ نصف المفصلة الممكنة لثنائي الغليسيريد (A).

(3) احسب قرينة اليود  $I_i$  لثنائي الغليسيريد (A).

(4) ما هي قيمة قرينة التصبن  $I_s$  لثنائي الغليسيريد (A) ؟

علماً أن:  $M_H = 1 \text{ g.mol}^{-1}$  ,  $M_C = 12 \text{ g.mol}^{-1}$  ,  $M_O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$  ,  $M_I = 127 \text{ g.mol}^{-1}$  ,  $M_K = 39,1 \text{ g.mol}^{-1}$

II- التحليل المائي لثلاثي بيبتيدي يعطي الأحماض الأمينية التالية: Asn , Ser , Glu


(1) أ- صنف الأحماض الأمينية السابقة.

ب- اكتب الصيغة نصف المفصلة لثلاثي الببتيدي التالي: Ser-Asn-Glu

علماً أن:

$\begin{array}{c} O=C-CH_2-CH-COOH \\   \quad \quad   \\ NH_2 \quad NH_2 \end{array}$ <p>Asn</p>	$\begin{array}{c} HOOC-(CH_2)_2-CH-COOH \\   \\ NH_2 \end{array}$ <p>Glu</p>	$\begin{array}{c} HO-CH_2-CH-COOH \\   \\ NH_2 \end{array}$ <p>Ser</p>
--	--	--

(2) يتأين الأسبارجين Asn عند تغير الـ pH وفق المخطط التالي:



أ- اكتب الصيغ الأيونية لـ (A) ، (B) ، (C).


ب- احسب قيمة  $pH_i$  .

ج- جد الصيغ الأيونية المتواجدة عند  $pH=8$  .



### التمرين الثالث: (07 نقاط)

1) يحترق الحمض الأميني الغليسين الصلب (Gly)<sub>(s)</sub> عند 25°C و ضغط 1atm وفق التفاعل التالي:



أ- وازن معادلة تفاعل إحترق الغليسين (Gly)<sub>(s)</sub>.

ب- احسب أنطالبي الاحتراق ( $\Delta H_{\text{comb}}^{\circ}$ ) للتفاعل السابق عند 25°C.

علماً أن:

المركب	Gly <sub>(s)</sub>	CO <sub>2(g)</sub>	H <sub>2</sub> O <sub>(l)</sub>
$\Delta H_f^{\circ} (\text{kJ.mol}^{-1})$	-527,5	-393	-286


ج- أوجد كمية الحرارة الناتجة عن الاحتراق التام لـ 7,5g من الغليسين الصلب عند 25°C.

علماً أن:  $M_H = 1 \text{g.mol}^{-1}$ ,  $M_C = 12 \text{g.mol}^{-1}$ ,  $M_O = 16 \text{g.mol}^{-1}$ ,  $M_N = 14 \text{g.mol}^{-1}$

2) جد أنطالبي الاحتراق ( $\Delta H_{\text{comb}}^{\circ}$ ) للتفاعل السابق عند 60°C.


المركب	Gly <sub>(s)</sub>	O <sub>2(g)</sub>	N <sub>2(g)</sub>	CO <sub>2(g)</sub>	H <sub>2</sub> O <sub>(l)</sub>
$C_p (\text{J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1})$	99,20	29,37	29,12	37,45	75,24

3) ليكن تحول الغليسين من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية وفق ما يلي:



- ماهي قيمة أنطالبي تشكل الغليسين الغازي  $\Delta H_f^{\circ}(\text{Gly})_g$  ؟

4) ليكن تفاعل تشكل الغليسين الغازي:



- احسب أنطالبي تفكك الرابطة (C-N) في الغليسين الغازي  $\Delta H_d^{\circ}(\text{C-N})$ .

يعطى:  $\Delta H_{\text{sub}}^{\circ}(\text{C}) = 717 \text{ kJ.mol}^{-1}$

الرابطة	O=O	H-H	C-C	O-H	C-H	C-O
$\Delta H_d^{\circ} (\text{kJ.mol}^{-1})$	498	436	348	463	413	351


الرابطة	N≡N	C=O	N-H
$\Delta H_d^{\circ} (\text{kJ.mol}^{-1})$	940	810	391

انتهى الموضوع الثاني



العلامة		عناصر الإجابة: (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
01,00	0,25	<p>التمرين الأول: (07 نقاط)</p> <p><b>-I</b></p> <p>(1) إيجاد الصيغة المجملة للمركب A:</p> <p>A: <math>C_nH_{2n}O</math></p> <p><math>M_A = d \times 29 = 1,52 \times 29 = 44,08 \text{ g.mol}^{-1}</math></p> <p><math>12n + 2n + 16 = 44 \Rightarrow n = \frac{44-16}{14} = 2</math></p> <p>A : <math>C_2H_4O</math></p> <p>(2) الصيغة نصف المفصلة للمركب A.</p> <p>A : <math>CH_3-C(=O)H</math></p>
	0,25	
	0,25	
	0,25	
00,50	0,50	<p><b>-II</b></p> <p>(1) إيجاد الصيغ نصف المفصلة للمركبات: من B إلى المركب N</p> <p>B <math>CH_3-CH(CH_3)-OMgCl</math>    C <math>CH_3-CH(CH_3)-OH</math>    D <math>CH_3-CH(CH_3)-Cl</math></p> <p>E <math>CH_3-CH(CH_3)-MgCl</math>    F <math>CH_3-CH(CH_3)-C(=O)OMgCl</math>    G <math>CH_3-CH(CH_3)-C(=O)OH</math></p> <p>H <math>CH_3-CH(CH_3)-C(=O)Cl</math>    I <math>CH_3-CH(CH_3)-C(=O)C_6H_5</math>    J <math>CH_3-CH(CH_3)-CH_2-C_6H_5</math></p> <p>K <math>CH_3-C(=O)OH</math>    L <math>CH_3-C(=O)Cl</math></p> <p>M <math>CH_3-CH(CH_3)-CH_2-C_6H_4-C(=O)CH_3</math>    N <math>CH_3-CH(CH_3)-CH_2-C_6H_4-CH(OH)CH_3</math></p>
03,25	13 x 0,25	
00,25	0,25	<p>(2) الوسيط المستعمل في التفاعلين رقم 8 و 12: <math>AlCl_3</math></p>




(3) مماكبات الضوئية للمركب N بإسقاط فيشر :



(4) أ- معادلات التفاعل المؤدية للمركب Q و البوليمير P:



ب- مقطع من البوليمير P يتكون من ثلاث وحدات بنائية:



التمرين الثاني: (07 نقاط)

ملاحظة: يمكن كتابة ثنائي الغليسريد A بالرمز DG

I-

(1) حساب الكتلة المولية لثنائي الغليسريد A:



$$\left. \begin{array}{l} M_A \longrightarrow 2 \times 56,1 \text{ de KOH} \\ 1 \text{ g} \longrightarrow I_s \times 10^{-3} \end{array} \right\} \Rightarrow M_A = \frac{2 \times 56,1}{209,3 \times 10^{-3}} = \boxed{536 \text{ g.mol}^{-1}}$$


(2) أ- حساب الكتلة المولية للحمض الدهني المشبع B:

$$n_B = n_{\text{NaOH}}$$


$$n_{\text{NaOH}} = C_{\text{NaOH}} \times V_{\text{NaOH}} = 0,5 \times 10 \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_B = \frac{m_B}{M_B} \Rightarrow M_B = \frac{m_B}{n_B} = \frac{1}{5 \times 10^{-3}} = \boxed{200 \text{ g.mol}^{-1}}$$

ب- استنتج الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني المشبع B:



$$15 + 14x + 45 = 200 \Rightarrow x = \frac{200 - 60}{14} = 10$$




كما تقبل الإجابة:




$$M_B = 12n + 2n + 32 = 200$$

$$n = \frac{200 - 32}{14} = 12$$



(3) الحمض الدهني C يرمز له بـ  $Cn:2\Delta^{9,12}$

أ- عدد ذرات الكربون في الحمض الدهني C :



$$M_A = 536 \text{ g.mol}^{-1}$$


$$M_{\text{Glycérol}} = (3 \times 12) + (8 \times 1) + (3 \times 16) = 92 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$M_B = 200 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$M_A + 2M_{H_2O} = M_{\text{Glycérol}} + M_B + M_C$$

$$M_C = M_A + 2M_{H_2O} - M_{\text{Glycérol}} - M_B$$

$$M_C = 536 + (2 \times 18) - 92 - 200 = 280 \text{ g.mol}^{-1}$$




$$12n + 2n - 4 + 32 = 280$$






$$n = \frac{280 - 28}{14} = 18$$

$$\boxed{n = 18}$$

ب- استنتاج الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني C:



ج- كتابة تفاعل أكسدة الحمض الدهني C بـ  $KMnO_4$  المركزة و في وسط  $H_2SO_4$ :






01,25

0,25


0,25

3  
x  
0,25

<p>00,75</p>	<p>3 x 0,25</p>	<p>(4) كتابة الصيغ نصف المفصلة الممكنة لثنائي الغليسيريد A:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-O-C(=O)} \\   \\ \text{CH-O-C(=O)} \\   \\ \text{CH}_2\text{-OH} \end{array} \begin{array}{c} \text{(CH}_2\text{)}_7\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH=CH-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH}_3 \\ \text{(CH}_2\text{)}_{10}\text{-CH}_3 \end{array}</math> </div> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-O-C(=O)} \\   \\ \text{CH-O-C(=O)} \\   \\ \text{CH}_2\text{-OH} \end{array} \begin{array}{c} \text{(CH}_2\text{)}_{10}\text{-CH}_3 \\ \text{(CH}_2\text{)}_7\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH=CH-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH}_3 \end{array}</math> </div> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-O-C(=O)} \\   \\ \text{CH-O-C(=O)} \\   \\ \text{CH}_2\text{-O-C(=O)} \end{array} \begin{array}{c} \text{(CH}_2\text{)}_{10}\text{-CH}_3 \\ \text{(CH}_2\text{)}_7\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH=CH-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH}_3 \\ \text{(CH}_2\text{)}_7\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH=CH-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH}_3 \end{array}</math> </div> </div>
<p>00,25</p>	<p>0,25</p>	<p>(5) حساب قرينة اليود <math>I_i</math> لثنائي الغليسيريد A:</p> $\begin{array}{l} 1 \text{ mol de A} \longrightarrow 2 \text{ mol de I}_2 \\ M_A \longrightarrow 2 M_{I_2} \\ 100 \text{ g} \longrightarrow I_i \end{array} \Rightarrow I_i = \frac{2 \times 254 \times 100}{536} = \boxed{94,77}$
<p>01,50</p>	<p>3 x 0,50</p>	<p>-II</p> <p>(1) تصنيف الأحماض الأمينية:</p> <p>Ala حمض أميني خطي بسيط</p> <p>Asp حمض أميني خطي حامضي</p> <p>Tyr حمض أميني عطري</p> <p>(2) أ- كتابة صيغ المركبات A, B, C:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\begin{array}{c} \text{COOH} \\   \\ \text{H}_3\text{N}^+\text{-CH} \\   \\ \text{CH}_2 \\   \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\   \\ \text{OH} \end{array}</math> <p>A</p> </div> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\begin{array}{c} \text{COO}^- \\   \\ \text{H}_3\text{N}^+\text{-CH} \\   \\ \text{CH}_2 \\   \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\   \\ \text{OH} \end{array}</math> <p>B</p> </div> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\begin{array}{c} \text{COO}^- \\   \\ \text{H}_2\text{N-CH} \\   \\ \text{CH}_2 \\   \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\   \\ \text{OH} \end{array}</math> <p>C</p> </div> </div>
<p>01,25</p>	<p>2 x 0,25</p>	<p>ب- حساب قيمة الـ pH للحمض الأميني التيروسين:</p> $\text{pH}_i = \frac{\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2}}{2} = \frac{2,2 + 9,11}{2} \Rightarrow \boxed{\text{pH}_i = 5,65}$

		<p>(3) أ- كتابة الصيغة نصف المفصلة لثلاثي الببتيد Ala-Asp-Tyr</p> $\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{NH}-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{NH}-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: right;">ب -</p>
00,75	0,25	<p style="text-align: center;">- صيغة Ala-Asp-Tyr عند pH= 1</p> $\text{H}_3\text{N}^+-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{NH}-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{NH}-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">- صيغة Ala-Asp-Tyr عند pH= 13</p> $\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{NH}-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{NH}-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\text{COO}^-$ <p style="text-align: center;">  </p>
		<p style="text-align: right;">التمرين الثالث: (06 نقاط)</p> <p>(1) أ- حساب كمية الحرارة Q الناتجة عن احتراق كتلة البروبان الغازي:</p> $\sum Q = Q_{\text{comb}} + Q_{\text{eau}} = 0$ $\sum Q = Q_{\text{comb}} + mc_e \Delta T = 0 \Rightarrow Q_{\text{comb}} = -mc_e \Delta T$ $Q_{\text{comb}} = -723 \times 4,185 \times 22$ $Q_{\text{comb}} = -66566,6 \text{ J}$ <p style="text-align: right;">ب- قيمة أنطالبي احتراق البروبان الغازي:</p> $n = \frac{m}{M} = \frac{1,32}{44} = 0,03 \text{ mol}$ $\Delta H_{\text{comb}}^\circ = \frac{Q_{\text{comb}}}{n} = -\frac{66566,6}{0,03} = -2218,88 \text{ kJ.mol}^{-1}$

ج- كتابة معادلة الإحتراق التام للبروبان الغازي:



د- حساب أنطالبي تشكل البروبان الغازي:

$$\Delta H_{\text{comb}}^{\circ} = \sum \Delta H_{\text{produits}}^{\circ} - \sum \Delta H_{\text{reactifs}}^{\circ}$$

$$\Delta H_{\text{comb}}^{\circ} = 3\Delta H_f^{\circ}(\text{CO}_{2(g)}) + 4\Delta H_f^{\circ}(\text{H}_2\text{O}_{(l)}) - \Delta H_f^{\circ}(\text{C}_3\text{H}_{8(g)}) - 5\Delta H_f^{\circ}(\text{O}_{2(g)})$$


$$\Delta H_f^{\circ}(\text{C}_3\text{H}_{8(g)}) = 3\Delta H_f^{\circ}(\text{CO}_{2(g)}) + 4\Delta H_f^{\circ}(\text{H}_2\text{O}_{(l)}) - \Delta H_{\text{comb}}^{\circ} - 5\Delta H_f^{\circ}(\text{O}_{2(g)})$$

$$\Delta H_f^{\circ}(\text{C}_3\text{H}_{8(g)}) = 3(-393) + 4(-286) - (-2218,8) - (5 \times 0)$$

$$\Delta H_f^{\circ}(\text{C}_3\text{H}_{8(g)}) = -1179 - 1144 + 2218,8$$

$$\Delta H_f^{\circ}(\text{C}_3\text{H}_{8(g)}) = -104,2 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

(2) حساب أنطالبي تشكل البروبان الغازي من خلال طاقات الروابط:



$$\Delta H_f^{\circ}(\text{C}_3\text{H}_{8(g)}) = 3\Delta H_{\text{sub}}^{\circ}(\text{C}) + 4\Delta H_{\text{d}}^{\circ}(\text{H-H}) - 2\Delta H_{\text{d}}^{\circ}(\text{C-C}) - 8\Delta H_{\text{d}}^{\circ}(\text{C-H})$$

$$\Delta H_f^{\circ}(\text{C}_3\text{H}_{8(g)}) = (3 \times 717) + (4 \times 436) - (2 \times 348) - (8 \times 413)$$

$$\Delta H_f^{\circ}(\text{C}_3\text{H}_{8(g)}) = 2151 + 1744 - 696 - 3304$$

$$\Delta H_f^{\circ}(\text{C}_3\text{H}_{8(g)}) = -105 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

القيمتان  $-105 \text{ kJ.mol}^{-1}$  و  $-104,2 \text{ kJ.mol}^{-1}$   $\Delta H_f^{\circ}(\text{C}_3\text{H}_{8(g)})$  متقاربتان

02,25		<p>(3) أ- استنتاج أنطالبي هدرجة البروبين الغازي : <math>\Delta H_3^0</math></p> <p>0,25 <math>C_3H_7Cl_{(l)} + H_{2(g)} \longrightarrow C_3H_{8(g)} + HCl_{(g)} \quad \Delta H_1^0 = -52 \text{ kJ.mol}^{-1}</math></p> <p><math>C_3H_6_{(g)} + HCl_{(g)} \longrightarrow C_3H_7Cl_{(l)} \quad \Delta H_2^0 = -72 \text{ kJ.mol}^{-1}</math></p> <p>0,25 <math>C_3H_6_{(g)} + H_{2(g)} \longrightarrow C_3H_{8(g)} \quad \Delta H_3^0 = \Delta H_1^0 + \Delta H_2^0</math></p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><math>\Delta H_3^0 = -124 \text{ kJ.mol}^{-1}</math></p> <p>ب- حساب أنطالبي تشكل كلور البروبان السائل <math>\Delta H_f^0(C_3H_7Cl_{(l)})</math></p> <p>0,25 <math>\Delta H_r^0 = \sum \Delta H_{\text{produits}}^0 - \sum \Delta H_{\text{reactifs}}^0</math></p> <p>0,25 <math>\Delta H_1^0 = \Delta H_f^0(C_3H_{8(g)}) + \Delta H_f^0(HCl_{(g)}) - \Delta H_f^0(C_3H_7Cl_{(l)}) - \Delta H_f^0(H_{2(g)})</math></p> <p>0,25 <math>\Delta H_f^0(C_3H_7Cl_{(l)}) = \Delta H_f^0(C_3H_{8(g)}) + \Delta H_f^0(HCl_{(g)}) - \Delta H_1^0 - \Delta H_f^0(H_{2(g)})</math></p> <p>0,25 <math>\Delta H_f^0(C_3H_7Cl_{(l)}) = -104,1 - 92 + 52 \Rightarrow \Delta H_f^0(C_3H_7Cl_{(l)}) = -144,1 \text{ kJ.mol}^{-1}</math></p> <p>ملاحظة: تقبل الإجابة في حالة إستعمال <math>\Delta H_f^0(C_3H_{8(g)}) = -105 \text{ kJ.mol}^{-1}</math></p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><math>\Delta H_f^0(C_3H_7Cl_{(l)}) = -145 \text{ kJ.mol}^{-1}</math></p> <p>وتكون النتيجة</p> <p>ج- حساب أنطالبي تفكك الرابطة C-Cl : <math>(\Delta H_d^0(C-Cl))</math></p> <p>0,50</p> <div style="text-align: center;"> <math display="block">  \begin{array}{c}  3C_{(s)} + \frac{7}{2}H_{2(g)} + \frac{1}{2}Cl_{2(g)} \xrightarrow{\Delta H_f^0(C_3H_7Cl_{(l)})} C_3H_7Cl_{(l)} \\  \downarrow 3\Delta H_{\text{sub}}^0(C) \quad \downarrow \frac{7}{2}\Delta H_d^0(H-H) \quad \downarrow \frac{1}{2}\Delta H_d^0(Cl-Cl) \quad \uparrow -\Delta H_{\text{vap}}^0(C_3H_7Cl) \\  3C_{(g)} + 7H_{(g)} + Cl_{(g)} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} -7\Delta H_d^0(C-H) &amp; -\Delta H_d^0(C-Cl) \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} -2\Delta H_d^0(C-C) \end{smallmatrix}} C_3H_7Cl_{(g)}  \end{array}  </math> </div> <p>0,25</p> $  \Delta H_f^0(C_3H_7Cl_{(l)}) = \left[ 3\Delta H_{\text{sub}}^0(C) + \frac{7}{2}\Delta H_d^0(H-H) + \frac{1}{2}\Delta H_d^0(Cl-Cl) \right] - \left[ 2\Delta H_d^0(C-C) + 7\Delta H_d^0(C-H) + \Delta H_d^0(C-Cl) + \Delta H_{\text{vap}}^0(C_3H_7Cl) \right]  $ $  \Delta H_f^0(C_3H_7Cl_{(l)}) = 3\Delta H_{\text{sub}}^0(C) + \frac{7}{2}\Delta H_d^0(H-H) + \frac{1}{2}\Delta H_d^0(Cl-Cl) - 2\Delta H_d^0(C-C) - 7\Delta H_d^0(C-H) - \Delta H_d^0(C-Cl) - \Delta H_{\text{vap}}^0(C_3H_7Cl)  $
-------	--	---

$$0,25 \quad -144,1 = (3 \times 717) + \left(\frac{7}{2} \times 436\right) + \left(\frac{1}{2} \times 242\right) - (2 \times 348) - (7 \times 413) - \Delta H_{d(C-Cl)}^{\circ} - 27$$

$$\Delta H_{d(C-Cl)}^{\circ} = 2151 + 1526 + 121 - 696 - 2891 + 144,1 - 27$$

$$0,25 \quad \boxed{\Delta H_{d(C-Cl)}^{\circ} = 328,1 \text{ kJ.mol}^{-1}}$$

وتقبل أيضا:

$$-144,1 = (3 \times 717) + \left(\frac{7}{2} \times 436\right) + \left(\frac{1}{2} \times 242\right) - (2 \times 348) - (7 \times 413) - \Delta H_{d(C-Cl)}^{\circ} - 27$$

$$\Delta H_{d(C-Cl)}^{\circ} = 2151 + 1526 + 121 - 696 - 2891 + 145 - 27$$

$$\boxed{\Delta H_{d(C-Cl)}^{\circ} = 329 \text{ kJ.mol}^{-1}}$$

انتهى تصحيح الموضوع الأول


العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
03,00	6 x 0,50	<p><b>التمرين الأول ( 07 نقاط):</b></p> <p><b>I- ايجاد الصيغ نصف المفصلة للمركبات A ، B ، C ، D ، E ، F :</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_3 \\   \\ \text{OMgCl} \end{array}</math> <p>(A)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_3 \\   \\ \text{OH} \end{array}</math> <p>(B)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_3 \\   \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array}</math> <p>(C)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\begin{array}{c} \text{COOH} \\   \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array}</math> <p>(D)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\begin{array}{c} \text{COOH} \\   \\ \text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3 \end{array}</math> <p>(F)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\begin{array}{c} \text{COOH} \\   \\ \text{C}_6\text{H}_3-\text{COOH} \end{array}</math> <p>(F)</p> </div> </div>
		<p><b>II- إيجاد الصيغ نصف المفصلة للمركبات (G)، (H)، (I)، (J):</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\text{C}_6\text{H}_6</math> <p>(G)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\begin{array}{c} \text{NO}_2 \\   \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array}</math> <p>(H)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <math display="block">\begin{array}{c} \text{NO}_2 \\   \\ \text{C}_6\text{H}_3-\text{NO}_2 \end{array}</math> <p>(I)</p> </div> </div>
		<p><b>III- أ- نوع البلمرة : بلمرة بالتكاثف.</b></p> <p><b>ب- مقطع من وحدتين بنائيتين للبوليمير:</b></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <math display="block">\dots-\text{NH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}-\text{C}(=\text{O})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}-\text{C}(=\text{O})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})-\dots</math> </div>
		<p><b>ج- حساب الكتلة المولية المتوسطة للبوليمير:</b></p> <div style="margin-top: 20px;"> <math display="block">M_p = n \times M_m</math> <math display="block">M_m = M(\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2)</math> <math display="block">M_m = 12 \times 14 + 10 + 32 + 28 = 238\text{g.mol}^{-1}</math> <math display="block">M_p = 800 \times 238 = \boxed{190400\text{g.mol}^{-1}}</math> </div>






**التمرين الثاني ( 06 نقاط):**

**-I** ملاحظة: يمكن كتابة ثنائي الغليسريد A بالرمز DG

(1) معادلة تفاعل أكسدة حمض الأراشيدونيك:



(2) الصيغ نصف المفصلة الممكنة لثنائي الغليسريد:



(3) حساب قرينة اليود (I<sub>i</sub>) لثنائي الغليسريد A:



$$M_A + 2M_{H_2O} = M_{\text{Glycérol}} + M_{(C_{20:4\Delta^{5,8,11,14}})} + M_{(C_{16:0})}$$

$$M_{C_{16:0}} = 15 + (14 \times 14) + 45 = 256 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$M_{(C_{20:4\Delta^{5,8,11,14}})} = (12 \times 20) + 32 + 32 = 304 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$M_A = M_{\text{Glycérol}} + M_{(C_{20:4\Delta^{5,8,11,14}})} + M_{(C_{16:0})} - 2M_{H_2O}$$


$$M_A = 92 + 304 + 256 - (2 \times 18) \quad \boxed{M_A = 616 \text{ g.mol}^{-1}}$$

- ملاحظة: تقبل الإجابة التالية لحساب M<sub>A</sub>

$$\begin{aligned} A : C_{39}H_{68}O_5 \\ M_A = 39 \times 12 + 16 \times 5 + 68 = 616 \text{ g.mol}^{-1} \end{aligned}$$

$$\left. \begin{array}{l} A \longrightarrow 4 \times I_2 \\ 616 \longrightarrow 4 \times 254 \\ 100 \text{ g} \longrightarrow I_i \end{array} \right\} \Rightarrow I_i = \frac{4 \times 254 \times 100}{616} = \boxed{164,93}$$

(4) قيمة قرينة التصبن I<sub>s</sub> لثنائي الغليسريد A .



$$\left. \begin{array}{l} 616 \longrightarrow 2 \times 56,1 \text{ de KOH} \\ 1 \text{ g} \longrightarrow I_s \times 10^{-3} \end{array} \right\} \Rightarrow I_s = \frac{1 \times 2 \times 56,1}{616 \times 10^{-3}} = \boxed{182,14}$$

-II


(1) أ- تصنيف الأحماض الأمينية :

Glu: حمض أميني خطي حامضي.

Ser: حمض أميني خطي هيدروكسيلي.




Asn: حمض أميني خطي أميدي.

ب- كتابة الصيغة نصف المفصلة لثلاثي الببتيد Ser-Asn-Glu:



(2) أ- كتابة الصيغ الأيونية لـ A , B , C :

3  
x  
0,25



ب- حساب قيمة الـ pH :

01,75



2  
x  
0,25

$$\text{pH}_i = \frac{\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2}}{2}$$

$$\text{pH}_i = \frac{2,02 + 8,8}{2} = \boxed{5,41}$$

ج- الصيغ الأيونية المتواجدة عند pH=8 هي :


2  
x  
0,25



التمرين الثالث ( 07 نقاط) :

(1) أ- موازنة معادلة تفاعل احتراق الغليسين الصلب (Gly)<sub>s</sub> :

4  
x  
0,25



ب- حساب  $\Delta H_{\text{comb}}^\circ$  أنطالبي تفاعل الاحتراق عند 25°C :

بتطبيق قانون هيس :

0,25

$$\Delta H_{\text{comb}}^\circ = \sum \Delta H_f^\circ(\text{produits}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{reactifs})$$

0,25

$$\Delta H_{\text{comb}}^\circ = \left[ 2 \times \Delta H_f^\circ(\text{CO}_{2(g)}) + \frac{5}{2} \times \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}) + \frac{1}{2} \times \Delta H_f^\circ(\text{N}_{2(g)}) \right] - \left[ \Delta H_f^\circ(\text{Gly}_{(s)}) + \frac{9}{4} \times \Delta H_f^\circ(\text{O}_{2(g)}) \right]$$

0,25

$$\Delta H_{\text{comb}}^\circ = \left[ 2 \times (-393) + \frac{5}{2} \times (-286) \right] - (-527,5)$$

0,25

$$\Delta H_{\text{comb}}^\circ = \boxed{-973,5 \text{ kJ.mol}^{-1}}$$

ج- إيجاد كمية الحرارة الناتجة عن احتراق 7,5g من الغليسين احتراق تام عند 25°C:

0,25

$$M_{\text{Gly}} = 16 + 14 + 32 + 13 = 75 \text{ g.mol}^{-1}$$

0,25

$$\begin{cases} M_{\text{Gly}} = 75 \longrightarrow \Delta H_{\text{comb}} = -973,5 \text{ kJ} \\ m = 7,5 \longrightarrow Q = ? \end{cases}$$

0,25

$$Q = \frac{7,5 \times (-973,5)}{75} = \boxed{-97,35 \text{ kJ}}$$

ملاحظة: تقبل الإجابة التالية:

$$\begin{aligned} M_{\text{Gly}} &= 16 + 14 + 32 + 13 = 75 \text{ g.mol}^{-1} \\ \Delta H_{\text{comb}}^{\circ} &= \frac{Q}{n} \Rightarrow n = \frac{m_{\text{(Gly)}}}{M_{\text{(Gly)}}} = \frac{7,5}{75} = 0,1 \text{ mol} \\ Q &= \Delta H_{\text{comb}}^{\circ} \times n = -973,5 \times 0,1 = -97,35 \text{ kJ} \end{aligned}$$

(2) حساب أنطالبي التفاعل السابق عند 60°C بتطبيق قانون كيرشوف:

0,50

$$\Delta H_T^{\circ} = \Delta H_{T_0}^{\circ} + \int_{T_0}^T \Delta C_p dT, \quad \Delta H_{333}^{\circ} = \Delta H_{298}^{\circ} + \int_{298}^{333} \Delta C_p dT$$

01,75

0,25

$$\Delta H_{333}^{\circ} = \Delta H_{298}^{\circ} + \Delta C_p (333 - 298)$$

0,25

$$\Delta C_p = 2C_p(\text{CO}_{2(g)}) + \frac{5}{2}C_p(\text{H}_2\text{O}_{(l)}) + \frac{1}{2}C_p(\text{N}_{2(g)}) - \frac{9}{4}C_p(\text{O}_{2(g)}) - C_p(\text{Gly}_{(s)})$$

0,25

$$\Delta C_p = (2 \times 37,45) + \left(\frac{5}{2} \times 75,24\right) + \left(\frac{1}{2} \times 29,12\right) - \left(\frac{9}{4} \times 29,37\right) - (99,20)$$

0,25

$$\Delta C_p = 112,27 \text{ J.mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

0,25

$$\Delta H_{333}^{\circ} = -973,5 + (112,27 \times 10^{-3})(333 - 298) = -969,58 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

(3) إيجاد أنطالبي تشكل الغليسين الغازي  $\Delta H_f^{\circ}(\text{Gly})_g$ :

$$\text{Gly}_{(s)} \longrightarrow \text{Gly}_{(g)} \quad \Delta H_{\text{sub}}^{\circ}(\text{Gly}) = 147 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$\Delta H_{\text{sub}}^{\circ}(\text{Gly}) = \Delta H_f^{\circ}(\text{Gly})_{(g)} - \Delta H_f^{\circ}(\text{Gly})_{(s)}$$

$$\Delta H_f^{\circ}(\text{Gly})_{(g)} = \Delta H_f^{\circ}(\text{Gly})_{(s)} + \Delta H_{\text{sub}}^{\circ}(\text{Gly})$$

0,25

$$\Delta H_f^{\circ}(\text{Gly})_{(g)} = -527,5 + 147 = \boxed{-380,5 \text{ kJ.mol}^{-1}}$$

00,50

02,00		<p>(4) حساب أنطالبي تفكك الرابطة (C-N) في الغليسين : <math>\Delta H_d^\circ(\text{C-N})</math></p> $  \begin{array}{c}  2 \text{C}_{(s)} + 5/2 \text{H}_{2(g)} + 1/2 \text{N}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \xrightarrow{\Delta H_f^\circ(\text{Gly})g} \text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2(g) \\  \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \quad \quad \quad \nearrow \\  2\Delta H_{\text{sub}}^\circ(\text{C}) \quad \quad \quad \frac{5}{2}\Delta H_d^\circ(\text{H-H}) \quad \quad \quad \frac{1}{2}\Delta H_d^\circ(\text{N}\equiv\text{N}) \quad \dots \quad \Delta H_d^\circ(\text{O=O}) \quad \quad \quad -\sum \Delta H_d^\circ  \end{array}  $ <p>0,50</p> <p>0,25 <math>\sum \Delta H_d^\circ = \Delta H_d^\circ(\text{C-C}) + 2\Delta H_d^\circ(\text{C-H}) + 2\Delta H_d^\circ(\text{N-H}) + \Delta H_d^\circ(\text{C-N})</math></p> <p>0,25 <math>\Delta H_d^\circ(\text{C-N}) = \sum \Delta H_d^\circ - (\Delta H_d^\circ(\text{C-C}) + 2\Delta H_d^\circ(\text{C-H}) + 2\Delta H_d^\circ(\text{N-H}))</math></p> <p>0,25 <math>\Delta H_f^\circ(\text{Gly})g = 2\Delta H_{\text{sub}}^\circ(\text{C}_{(s)}) + \frac{5}{2}\Delta H_d^\circ(\text{H-H})</math></p> <p>0,25 <math>\Delta H_f^\circ(\text{Gly})g = 2\Delta H_{\text{sub}}^\circ(\text{C}_{(s)}) + \frac{5}{2}\Delta H_d^\circ(\text{H-H}) + \Delta H_d^\circ(\text{O=O}) + \frac{1}{2}\Delta H_d^\circ(\text{N}\equiv\text{N}) - \sum \Delta H_d^\circ</math></p> <p>0,25 <math>\sum \Delta H_d^\circ = \left( 2\Delta H_{\text{sub}}^\circ(\text{C}_{(s)}) + \frac{5}{2}\Delta H_d^\circ(\text{H-H}) + \Delta H_d^\circ(\text{O=O}) + \frac{1}{2}\Delta H_d^\circ(\text{N}\equiv\text{N}) \right) - \Delta H_f^\circ(\text{Gly})g</math></p> <p>0,25 <math>\sum \Delta H_d^\circ = \left( 2 \times 717 + \frac{5}{2} \times (436) + (498) + \frac{1}{2}(940) \right) - (-380,5)</math></p> <p><math>\sum \Delta H_d^\circ = 3872,5 \text{ kJ.mol}^{-1}</math></p> <p><math>\Delta H_d^\circ(\text{C-N}) = 3872,5 - ((348) + 2(413) + 2(391)) - ((810) + (351) + (463))</math></p> <p>0,25 <math>\Delta H_d^\circ(\text{C-N}) = 292,5 \text{ kJ.mol}^{-1}</math></p> <p>انتهى تصحيح الموضوع الثاني</p>
-------	--	---