

# Algebra

MICHAŁ DOBRANOWSKI

semestr zimowy 2022  
v0.10

Poniższy skrypt zawiera materiał obejmujący wykłady z Algebry prowadzone przez dr hab. Jakuba Przybyło na I semestrze Informatyki na AGH oraz tematy, które uznałem za warte uwagi podczas własnych studiów nad tematem.

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Liczy zespolone</b>	<b>2</b>
1.1	Działania na liczbach zespolonych . . . . .	2
1.2	Interpretacja geometryczna liczb zespolonych . . . . .	3
1.3	Pierwiastkowanie liczb zespolonych . . . . .	4
1.4	Postać wykładnicza . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Relacje</b>	<b>5</b>
2.1	Porządki . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Struktury algebraiczne</b>	<b>9</b>
3.1	Grupy . . . . .	10
3.2	Pierścienie i ciała . . . . .	11
3.3	Morfizmy . . . . .	13
3.4	Przestrzenie wektorowe . . . . .	14
<b>4</b>	<b>Macierze</b>	<b>20</b>
4.1	Działania na macierzach . . . . .	20
4.2	Wyznacznik macierzy . . . . .	21
4.3	Rząd macierzy . . . . .	24
4.4	Macierz odwrotna . . . . .	26
<b>5</b>	<b>Układy równań liniowych</b>	<b>28</b>
<b>6</b>	<b>Geometria analityczna</b>	<b>31</b>
6.1	Przestrzeń trójwymiarowa . . . . .	33
6.1.1	Równanie płaszczyzny w przestrzeni . . . . .	34
6.1.2	Równanie prostej w przestrzeni . . . . .	35
6.2	Odległości . . . . .	36
6.3	Przykłady . . . . .	37
<b>7</b>	<b>Odwzorowania liniowe</b>	<b>39</b>

## §1 Liczy zespolone

**Definicja 1.1.** Liczba zespolona  $z$  to uporządkowana para liczb rzeczywistych. Pierwszy element tej pary to **część rzeczywista**, oznaczana symbolem  $\operatorname{Re}(z)$ , a drugi to **część urojona**, oznaczana symbolem  $\operatorname{Im}(z)$ . Zbiór liczb zespolonych oznaczamy przez  $\mathbb{C}$ .

Liczy zespolone można reprezentować w kilku postaciach, jedna z nich to **postać algebraiczna**. Używając jej, liczba  $z = (x, y)$  jest zapisywana jako

$$z = x + iy,$$

gdzie  $i$  nazywamy **jednostką urojoną**, która spełnia

$$i^2 = -1.$$

### §1.1 Działania na liczbach zespolonych

Niech  $z_1 = x_1 + iy_1$  oraz  $z_2 = x_2 + iy_2$ . Określamy:

- dodawanie  $z_1 + z_2 = x_1 + x_2 + i(y_1 + y_2)$
- mnożenie  $z_1 z_2 = x_1 x_2 + ix_1 y_2 + ix_2 y_1 + i^2 y_1 y_2$   
 $= x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$

#### Wniosek 1.2

Dodawanie i mnożenie liczb zespolonych jest przemienne i łączne. Mnożenie jest rozdzielne względem dodawania.

**Definicja 1.3.** Sprzężenie liczby zespolonej  $z = x + iy$  to liczba  $\bar{z} = x - iy$ .

**Definicja 1.4.** Moduł liczby zespolonej  $z = x + iy$  to liczba  $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ .

Zachodzi pewna własność, wynikająca ze wzoru skróconego mnożenia:

$$\begin{aligned} z\bar{z} &= (x + iy)(x - iy) = x^2 - i^2 y^2 = x^2 + y^2 \\ z\bar{z} &= |z|^2 \end{aligned} \tag{1}$$

Powyższa liczba jest liczbą rzeczywistą, więc znaleźliśmy prosty sposób na dzielenie liczb zespolonych przez siebie, mnożąc licznik i mianownik przez sprzężenie mianownika. Na przykład:

$$\frac{1 + 2i}{-1 - i} = \frac{(1 + 2i)(-1 + i)}{(-1 - i)(-1 + i)} = \frac{-3 - i}{2} = -\frac{3}{2} - \frac{i}{2}.$$

#### Lemat 1.5


Oprócz  $z\bar{z} = |z|^2$ , zachodzą również równości:

- $|\bar{z}| = |z|$
- $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$
- $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$
- $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$

Ich dowody można w łatwy sposób przeprowadzić z definicji poszczególnych działań.

## §1.2 Interpretacja geometryczna liczb zespolonych

Liczyby zespolone można interpretować jako punkty na **płaszczyźnie zespolonej**. Dla przykładu liczba  $z = 3 + 2i$ .



**Fakt 1.6.** Moduł liczby zespolonej  $z$  to długość wektora wodzącego tej liczby na płaszczyźnie zespolonej.


*Dowód.* Wynika to z twierdzenia Pitagorasa oraz definicji modułu (1.4).  $\square$

Możemy wyprowadzić **postać trygonometryczną** liczby zespolonej, która, zamiast dwóch współrzędnych, będzie operować na długości wektora wodzącego oraz kącie skierowanym. Mamy więc

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

gdzie  $\varphi$  to miara kąta skierowanego między wektorem wodzącym liczby zespolonej  $z$  a osią liczb rzeczywistych. Ten kąt nazywany jest **argumentem** i oznaczany przez  $\text{Arg}(z)$ . Argument nie jest określony jednoznacznie – dowolne dwa argumenty jednej liczby różnią się o wielokrotność  $2\pi$ . Jeśli argument jest w przedziale  $[0, 2\pi)$ , to mówimy, że jest to **argument główny** liczby  $z$  i oznaczamy  $\arg(z)$ .

Za pomocą podstawowej trygonometrii możemy łatwo zamieniać postać algebraiczną i trygonometryczną między sobą.



$$\text{Re } z = |z| \cos \varphi, \quad \text{Im } z = |z| \sin \varphi \quad (2)$$

Na potrzeby dalszych rozważań przyjmujemy, że  $\arg(0) = 0$ .

**Fakt 1.7.** Odległość między liczbami  $z_1$  i  $z_2$  na płaszczyźnie zespolonej wynosi  $|z_1 - z_2|$ .

### Lemat 1.8

Zachodzą następujące nierówności:

- $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$
- $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2|$

Możemy łatwo mnożyć dwie liczby zespolone w postaci trygonometrycznej przez siebie za pomocą poniższego wzoru.

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= |z_1|(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)|z_2|(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) \\ &= |z_1||z_2|(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + i(\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cos \varphi_2)) \quad (3) \\ &= |z_1||z_2|(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)) \end{aligned}$$

Stosując wzór 3  $n$  razy otrzymujemy dowód następującego twierdzenia.

### Twierdzenie 1.9 (Wzór de Moivre'a)

Dla  $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$  oraz  $n \in \mathbb{Z}$  zachodzi równość

$$z^n = |z|^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

Wzór de Moivre'a zapewnia prosty sposób na potęgowanie liczb zespolonych. Dlatego, mając za zadanie obliczyć

$$(-2\sqrt{3} - 2i)^{16}$$

najłatwiej będzie zmienić postać liczby do postaci trygonometrycznej, a następnie skorzystać z twierdzenia 1.9.

## §1.3 Pierwiastkowanie liczb zespolonych

**Definicja 1.10** (Pierwiastek liczby zespolonej). Jeśli  $z$  jest liczbą zespoloną, to  $\sqrt[n]{z}$  jest zbiorem wszystkich takich  $w \in \mathbb{C}$ , że  $w^n = z$ .

Korzystając ze wzoru de Moivre'a (twierdzenie 1.9) łatwo wyprowadzić wzór

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \left( \cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right), k \in \mathbb{Z} \quad (4)$$

**Fakt 1.11.** Pierwiastków  $n$ -tego stopnia z  $z \neq 0$  jest dokładnie  $n$  i leżą one w równych odstępach na okręgu o środku w 0 i promieniu  $\sqrt[n]{|z|}$ .

*Dowód.* Dla  $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$  liczba z równości 4 będzie przyjmować różne wartości (wynika to z okresowości funkcji trygonometrycznych). Liczby te będą na wspomnianym okręgu (to wynika wprost z postaci trygonometrycznej), a ich argumenty główne różnić będzie wielokrotność  $\frac{2\pi}{n}$ .  $\square$

## §1.4 Postać wykładnicza

Postać  $z = |z|e^{i\varphi}$  liczby zespolonej będziemy nazywać **postacią wykładniczą** tej liczby.

**Twierdzenie 1.12 (Wzór Eulera)**

Dla każdego  $\varphi \in \mathbb{R}$  zachodzi

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi.$$

*Dowód.* Weźmy  $z = \cos \varphi + i \sin \varphi$ . Różniczkując po zmiennej  $\varphi$  otrzymujemy

$$\frac{dz}{d\varphi} = -\sin \varphi + i \cos \varphi = iz$$

$$\therefore \frac{dz}{z} = id\varphi.$$

Po obustronnym całkowaniu mamy

$$\int \frac{dz}{z} = \int id\varphi$$

$$\ln z = i\varphi + c$$

$$e^{\ln z} = e^{i\varphi+c}$$

$$z = e^{i\varphi+c}.$$

Podstawiając  $\varphi = 0$  otrzymujemy  $1 = e^c$ , skąd mamy  $c = 0$ , co kończy dowód.  $\square$

## §2 Relacje

**Definicja 2.1.** Relacja to trójka  $\mathcal{R} = (X, \text{gr}\mathcal{R}, Y)$ , gdzie  $X$  i  $Y$  są zbiorami, a  $\text{gr}\mathcal{R} \subset X \times Y$ .

Zbiór  $X$  nazywamy **naddziedzina**,  $Y$  **zapasem**,  $\text{gr}\mathcal{R}$  to **wykres** relacji. Piszemy, że  $x\mathcal{R}y$ , jeśli  $(x, y) \in \text{gr}\mathcal{R}$ . **Dziedzina** relacji  $\mathcal{R}$  to zbiór

$$D_{\mathcal{R}} = \{x \in X : \exists y \in Y : x\mathcal{R}y\},$$

a jej **przeciwdziedzina** to zbiór

$$C_{\mathcal{R}} = \{y \in Y : \exists x \in X : x\mathcal{R}y\}.$$

**Definicja 2.2.** Relacja odwrotna do relacji  $\mathcal{R} = (X, \text{gr}\mathcal{R}, Y)$  to taka relacja  $\mathcal{R}^{-1} = (Y, \text{gr}\mathcal{R}^{-1}, X)$ , że

$$\text{gr}\mathcal{R}^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X : (x, y) \in \text{gr}\mathcal{R}\}.$$

**Definicja 2.3.** Złożeniem relacji  $\mathcal{R} = (X, \text{gr}\mathcal{R}, Y)$  z relacją  $\mathcal{S} = (Y, \text{gr}\mathcal{S}, Z)$  nazywamy relację

$$\mathcal{R} \circ \mathcal{S} = (X, \text{gr}(\mathcal{R} \circ \mathcal{S}), Z),$$

gdzie

$$\text{gr}(\mathcal{R} \circ \mathcal{S}) = \{(x, z) \in X \times Z : \exists y \in Y : x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{S}z\}.$$

**Definicja 2.4** (rodzaje relacji). Relacja  $\mathcal{R} = (X, \text{gr}\mathcal{R}, X)$  jest:

- **zwrotna**  $\Leftrightarrow \forall x \in X : x\mathcal{R}x$ ,
- **symetryczna**  $\Leftrightarrow \forall x, y \in X : x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x$ ,

- **antysymetryczna**  $\Leftrightarrow \forall x, y \in X : x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}x \Rightarrow x = y$ ,
- **asymetryczna**  $\Leftrightarrow \forall x, y \in X : x\mathcal{R}y \Rightarrow \neg y\mathcal{R}x$ ,
- **przechodnia**  $\Leftrightarrow \forall x, y, z \in X : x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z$ ,
- **spójna**  $\Leftrightarrow \forall x, y \in X : x\mathcal{R}y \vee y\mathcal{R}x \vee x = y$ .

**Definicja 2.5.** Relacja równoważności to relacja  $\mathcal{R} = (X, \text{gr}\mathcal{R}, X)$ , która jest zwrotna, przechodnia i symetryczna.

**Definicja 2.6.** Jeżeli  $(X, \mathcal{R})$  zbiorem z relacją równoważności, to dla każdego  $x \in X$  klasą abstrakcji (klasą równoważności) tego elementu nazywamy zbiór

$$[x] = \{y \in X : x\mathcal{R}y\}.$$

**Definicja 2.7.** Zbiór ilorazowy relacji  $\mathcal{R}$  to zbiór klas abstrakcji tej relacji; przyjmujemy oznaczenie

$$X/\mathcal{R} = \{[x] : x \in X\}.$$

### Twierdzenie 2.8

Niech  $(X, \mathcal{R})$  będzie zbiorem z relacją równoważności. Wtedy

$$\forall x, y \in X : [x] \neq [y] \Leftrightarrow [x] \cap [y] = \emptyset.$$

*Dowód wystarczalności.* Załóżmy przez sprzeczność, że  $[x] \cap [y] \neq \emptyset$ , a więc  $\exists z \in X : x\mathcal{R}z \wedge y\mathcal{R}z$ . Teraz weźmy dowolny element  $a \in [x]$ . Mamy więc  $x\mathcal{R}a$ . Korzystając z symetryczności i przechodniości relacji  $\mathcal{R}$  mamy

$$\begin{aligned} a\mathcal{R}x \wedge x\mathcal{R}z \wedge z\mathcal{R}y, \\ \therefore y\mathcal{R}a. \end{aligned}$$

Z tego wynika, że  $[x] \subset [y]$ . Analogicznie (przyjmując na początku  $a \in [y]$ ) dostaniemy, że  $[y] \subset [x]$ , więc  $[x] = [y]$ , co jest sprzeczne z założeniem.

*Dowód konieczności.* Załóżmy przez sprzeczność, że  $[x] = [y]$ . Wtedy  $[x] \cap [y] = [x] \cap [x] = [x]$  nie może być zbiorem pustym, ponieważ ze zwrotności relacji  $\mathcal{R}$  wynika, że  $x\mathcal{R}x$ , więc  $[x]$  to zbiór przynajmniej jednoelementowy.  $\square$

Z powyższego twierdzenia wynika, że relacja równoważności w danym zbiorze  $X$  dzieli ten zbiór na niepuste i rozłączne podzbiory, których suma daje cały zbiór  $X$ .

## §2.1 Porządki

**Definicja 2.9.** Porządek (częściowy) to relacja  $\mathcal{R} = (X, \text{gr}\mathcal{R}, X)$ , która jest zwrotna, przechodnia i antysymetryczna. Zbiór  $X$  nazywamy zbiorem (częściowo) uporządkowanym.

**Definicja 2.10.** Porządek liniowy (totalny) to porządek, który jest spójny.

Niech  $(X, \preceq)$  będzie zbiorem z porządkiem częściowym. Wtedy **element największy**  $\overline{M} \in X$  zbioru  $X$  to taki element, że

$$\forall x \in X : x \preceq \overline{M},$$

a **element maksymalny**  $M_{\max} \in X$  to taki element, że

$$\forall x \in X : (M_{\max} \preceq x) \Rightarrow (M_{\max} = x).$$

**Uwaga 2.11.** Analogicznie można zdefiniować **element najmniejszy**  $\bar{m}$ :

$$\forall x \in X : \bar{m} \preceq x$$

oraz **element minimalny**  $m_{\min}$ :

$$\forall x \in X : x \preceq m_{\min} \Rightarrow (x = m_{\min})$$

### Twierdzenie 2.12

Niech  $(X, \preceq)$  będzie zbiorem z porządkiem częściowym. Jeśli w zbiorze  $X$  istnieje element największy, to jest on jedyny.

*Dowód.* Załóżmy przeciwnie, że istnieją dwa elementy największe  $M_1, M_2$ . Z definicji zachodzi

$$M_1 \preceq M_2$$

oraz

$$M_2 \preceq M_1,$$

co jest sprzeczne z antysymetrycznością porządków.  $\square$

### Twierdzenie 2.13

Niech  $(X, \preceq)$  będzie zbiorem z porządkiem częściowym. Jeśli  $M \in X$  jest elementem największym zbioru  $X$ , to jest on jedynym elementem maksymalnym tego zbioru.

*Dowód.* Skoro  $M$  jest elementem największym, to poprzednik implikacji w definicji elementu maksymalnego będzie prawdziwy tylko dla  $x = M$ , więc sama implikacja zawsze będzie prawdziwa.  $\square$

**Fakt 2.14.** W zbiorach z porządkiem totalnym pojęcia elementu największego i maksymalnego oraz najmniejszego i minimalnego są tożsame ze sobą. Wynika to ze spójności porządków totalnych.

Niech  $(X, \preceq)$  będzie zbiorem uporządkowanym, a zbiór  $A \subset X$  jego podzbiorem. Element  $M \in X$  jest **majorantą** (ograniczeniem górnym) zbioru  $A$  jeśli

$$\forall x \in A : x \preceq M.$$

**Kresem górnym** (supremum) zbioru  $A$  (w zbiorze  $X$ ) jest element najmniejszy zbioru majorant. Oznaczamy go symbolem

$$\sup A.$$

**Uwaga 2.15.** Analogicznie można zdefiniować **minorantę** (ograniczenie dolne)  $m \in X$  zbioru  $A \subset X$ :

$$\forall x \in A : m \preceq x$$

oraz **kres dolny** (infimum) tego zbioru (jest nim element największy zbioru minorant), który oznaczamy symbolem

$$\inf A.$$

### Twierdzenie 2.16

Niech  $(X, \preceq)$  będzie zbiorem z porządkiem częściowym oraz  $A \subset X$ . Jeśli  $A$  ma element największy, to jest on również supremum tego zbioru.

*Dowód.* Z definicji majoranty wynika, że element największy zbioru  $A$  jest również jego majorantą. Każda majoranta  $M \in X$  zbioru  $A$  oczywiście jest „większa” niż dowolny element zbioru  $A$  (w tym również jego element największy  $\overline{M}$ ), to znaczy

$$\forall M : \overline{M} \preceq M,$$

z czego wynika, że  $\overline{M}$  jest elementem najmniejszym zbioru majorant zbioru  $A$ , a więc supremum tego zbioru.  $\square$

### Wniosek 2.17

Jeśli zbiór częściowo uporządkowany  $X$  ma supremum, które nie należy do tego zbioru, to zbiór  $X$  nie ma elementu największego.

*Dowód.* Ponieważ dowolny zbiór (na mocy twierdzenia 2.12) ma co najwyżej jedno supremum, to gdyby zbiór  $X$  miał element największy, to na mocy twierdzenia 2.16 byłoby ono również supremum, które należy do zbioru  $X$ .  $\square$

### Przykład 2.18

Weźmy zbiór liniowo uporządkowany  $(\mathbb{R}, \leq)$  oraz jego podzbiór  $A = [0, 1) \subset \mathbb{R}$ . Zbiór majorant zbioru  $A$  to przedział  $[1, \infty)$ , a jego najmniejszy element (a zarazem supremum zbioru  $A$ ) to liczba 1. Mamy więc

$$\sup A = 1.$$

Liczba 1 nie należy jednak do zbioru  $A$ , więc, na mocy wniosku 2.17, element największy (a z faktu 2.14 również maksymalny) nie istnieje.



### Przykład 2.19

Weźmy zbiór częściowo uporządkowany  $(\mathbb{C}, \preceq)$ , gdzie zdefiniujemy


$$x \preceq y \Leftrightarrow \operatorname{Re} x \leq \operatorname{Re} y \wedge \operatorname{Im} x \leq \operatorname{Im} y.$$

Oczywiście niektóre elementy nie będą w tym porządku porównywalne, na przykład 1 oraz  $i$ .

Weźmy również podzbiór  $A \subset \mathbb{C}$  taki, że

$$A = \{z : |z| \leq 1\}.$$

Na rysunku zaznaczono **zbiór  $A$** , **zbiór majorant  $M$  zbioru  $A$** , supremum zbioru  $A$  oraz **zbiór elementów maksymalnych** (jako ćwierćokrąg). Na mocy wniosku 2.17 element największy nie istnieje.



**Definicja 2.20.** Łańcuch to taki podzbiór  $C \subset X$ , że  $(X, \preceq)$  jest zbiorem z porządkiem częściowym, a  $(C, \preceq)$  jest zbiorem z porządkiem liniowym.

**Definicja 2.21.** Silny porządek to relacja, która jest przechodnia i asymetryczna. Silnie uporządkowany zbiór  $X$  oznaczamy przez  $(X, <)$ .

## §3 Struktury algebraiczne

**Działaniem** (wewnętrznym) w zbiorze  $A$  nazwiemy każde odwzorowanie  $h$  takie, że

$$h : A \times A \rightarrow A.$$

**Działaniem zewnętrznym** w zbiorze  $A$  jest odwzorowanie

$$h : F \times A \rightarrow A.$$

Jeśli zamiast  $h$  weźmiemy jakiś symbol, na przykład  $\circ$ , to zamiast  $h(a, b)$  będziemy pisać  $a \circ b$ .

**Definicja 3.1** (rodzaje działań). W zbiorze z działaniem  $(A, \circ)$  działanie  $\circ$  jest:

- **łączne**  $\Leftrightarrow \forall x, y, z \in A : (x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$ ,
- **przemienne**  $\Leftrightarrow \forall x, y \in A : x \circ y = y \circ x$ .

Jeśli dla pewnego elementu  $e \in A$  zachodzi

$$\forall x \in A : x \circ e = e \circ x = x,$$

to  $e$  jest **elementem neutralnym**.

**Fakt 3.2.** Jeżeli w zbiorze  $A$  z działaniem  $\circ$  istnieje element neutralny, to jest on jedyny.

*Dowód.* Jeśli mielibyśmy dwa elementy neutralne  $e_1, e_2$  to mamy

$$e_1 \circ e_2 = e_1 = e_2.$$

□

Jeżeli istnieje element neutralny  $e \in A$  działania  $\circ$ , to **elementem symetrycznym** do  $x \in A$  jest taki element  $x' \in A$ , że

$$x \circ x' = e = x' \circ x.$$

### Lemat 3.3

Jeśli działanie  $\circ$  jest łączne w zbiorze  $A$  i istnieje element neutralny  $e \in A$ , to jeśli dany element  $x \in A$  ma element symetryczny, to jest on jedyny oraz zachodzi  $(x')' = x$ .

*Dowód.* Jeśli mielibyśmy dwa elementy symetryczne  $x'_1, x'_2$ , to mamy

$$x'_1 = x'_1 \circ e = x'_1 \circ (x \circ x'_2) = (x'_1 \circ x) \circ x'_2 = e \circ x'_2 = x'_2.$$

Ponadto z definicji elementu symetrycznego mamy

$$x' \circ x = e$$

oraz

$$x' \circ (x')' = e,$$

a więc  $x$  jest elementem symetrycznym  $x'$ , ergo  $(x')' = x$ .

□

## §3.1 Grupy

**Definicja 3.4.** Grupa to para  $(A, \circ)$ , gdzie  $A$  jest zbiorem, a działanie  $\circ$  jest:

1. wewnętrzne,
2. łączne,
3. ma element neutralny,
4. a każdy element  $x \in A$  ma element symetryczny.

**Definicja 3.5.** Grupa abelowa (przemienna) to grupa, w której działanie  $\circ$  jest przemienne.

### Przykład 3.6

Przykłady grup:

1.  $(\mathbb{Z}, +)$  – grupa abelowa,
2.  $(\mathbb{Z}_n, +_n)$  – grupa abelowa<sup>a</sup>,
3.  $(\mathbb{Q}_+, \cdot)$  – grupa abelowa,
4. grupą nieabelową jest grupa obrotów danego obiektu o  $90^\circ$  względem dowolnej z trzech osi.

<sup>a</sup>gdzie  $\mathbb{Z}_n$  oznacza zbiór  $\{0, 1, \dots, n-1\}$ , a  $+_n$  operację dodawania modulo  $n$

### Twierdzenie 3.7

$(\mathbb{Z}_n \setminus \{0\}, \cdot_n)$  jest grupą wtedy i tylko wtedy, gdy  $n \geq 2$  jest liczbą pierwszą.

Łatwo sprawdzić, że mnożenie modulo  $n$  w zbiorze  $\mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$  jest wewnętrzne i łączne. Ma również element neutralny 1. Będziemy więc dowodzić jedynie istnienia elementu symetrycznego dla każdego elementu.

*Dowód wystarczalności.* Załóżmy przeciwnie, że istnieje  $k \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0, 1\}$  takie, że  $k \mid n$ . Skoro  $(\mathbb{Z}_n \setminus \{0\}, \cdot_n)$  jest grupą, to  $k$  ma element symetryczny  $k^{-1}$ . Zachodzi więc

$$kk^{-1} \equiv 1 \pmod{n},$$

czyli inaczej

$$\exists m \in \mathbb{Z} : kk^{-1} - 1 = mn.$$

Co jednak prowadzi do sprzeczności, ponieważ

$$kk^{-1} - 1 \not\equiv mn \pmod{k}$$

$$-1 \not\equiv 0 \pmod{k}.$$

*Dowód dostateczności.* Skoro  $n$  jest liczbą pierwszą, to z małego twierdzenia Fermata mamy

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

dla każdego  $a \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$ . Z tego wynika, że dla dowolnego elementu  $a$  jego elementem symetrycznym będzie  $a^{n-2}$ .  $\square$

## §3.2 Pierścień i ciało

**Definicja 3.8.** Pierścień to trójka  $(P, \circ, *)$ , gdzie  $P$  jest zbiorem,  $\circ, *$  to działania wewnętrzne oraz

1.  $(P, \circ)$  jest grupą abelową
2. działanie  $*$  jest łączne
3. działanie  $*$  jest rozdzielne względem  $\circ$ , czyli

$$\forall x, y, z \in P : \begin{aligned} (x \circ y) * z &= (x * z) \circ (y * z), \\ x * (y \circ z) &= (x * y) \circ (x * z). \end{aligned}$$

**Definicja 3.9.** Pierścień przemienny to pierścień  $(P, \circ, *)$ , w którym  $*$  jest działaniem przemiennym<sup>1</sup>.

Pierwsze działanie w pierścieniu nazywamy **działaniem addytywnym** i oznaczamy przez  $+$ . Element neutralny tego działania nazywamy zerem ( $\mathbf{0}$ ), a element symetryczny do elementu  $x$  nazywamy elementem przeciwnym i oznaczamy  $-x$ .

Drugie działanie nazywamy **działaniem multiplikatywnym** i oznaczamy przez  $\cdot$ . Jeśli w  $P$  dodatkowo istnieje element neutralny tego działania, to ten element nazywamy jedyneką ( $\mathbf{1}$ ), a pierścień nazywamy **pierścieniem z jedyneką**. Element symetryczny do elementu  $x$  nazywamy elementem odwrotnym i oznaczamy  $x^{-1}$ .

<sup>1</sup>wtedy też rozdzielność prawo- i lewostronna stają się tożsame

**Definicja 3.10.** Dzielnikiem zera jest taki element pierścienia  $a \neq 0$ , że istnieje niezzerowy element  $b$ , dla którego zachodzi  $a \cdot b = 0$ .

**Definicja 3.11.** Pierścień całkowity to pierścień przemienny z jedyneką, w którym nie ma dzielników zera.

**Lemat 3.12**

W pierścieniach całkowitych zachodzi **własność skracania**, to znaczy, że dla elementów pierścienia  $a, b, c$  przy  $c \neq 0$  zachodzi

$$ac = bc \Rightarrow a = b.$$

*Dowód.* Jeśli  $ac = bc$ , to  $ac - bc = 0$ . Z rozdzielności dostajemy

$$(a - b)c = 0.$$

W pierścieniu całkowitym nie ma jednak dzielników zera, więc  $a - b = 0$ , co dowodzi tezy.  $\square$

**Definicja 3.13.** Ciało to pierścień z jedyneką, w którym dla każdego elementu  $x \neq 0$  istnieje element odwrotny  $x^{-1}$ .

Ciałem przemiennym będzie ciało, w którym działanie  $\cdot$  jest przemienne. Niektórzy autorzy utożsamiają pojęcie ciała z ciałem przemiennym.

Można zauważyć, że struktura  $(K, +, \cdot)$  jest ciałem (przemiennym) jeżeli:

1.  $(K, +)$  jest grupą abelową,
2.  $(K \setminus \{0\}, \cdot)$  jest grupą (przemienną),
3. zachodzi warunek rozdzielności  $\cdot$  względem  $+$ .

**Lemat 3.14**

Dla każdego elementu ciała  $a$  zachodzi  $a \cdot 0 = 0$ .

*Dowód.*

$$\begin{aligned} a \cdot 0 &= a \cdot (0 + 0) \\ a \cdot 0 &= a \cdot 0 + a \cdot 0 \\ a \cdot 0 + -a \cdot 0 &= a \cdot 0 + a \cdot 0 + -a \cdot 0 \\ 0 &= a \cdot 0 + 0 \\ 0 &= a \cdot 0 \end{aligned}$$

$\square$

**Twierdzenie 3.15**

Każde ciało przemienne jest pierścieniem całkowitym.

*Dowód.* Załóżmy przeciwnie, że istnieją dzielniki zera, czyli takie dwa elementy ciała  $x, y$ , że  $x, y \neq \mathbf{0}$  oraz  $x \cdot y = \mathbf{0}$ . Mamy

$$\begin{aligned}x \cdot y &= \mathbf{0} \\x^{-1} \cdot x \cdot y &= x^{-1} \cdot \mathbf{0} \\y &= x^{-1} \cdot \mathbf{0},\end{aligned}$$

co, na mocy lematu 3.14, jest sprzecznością z założeniem.  $\square$

### Twierdzenie 3.16

Każdy skończony pierścień całkowity jest ciałem przemiennym.

*Dowód.* Załóżmy przeciwnie, że istnieje element pierścienia  $a \neq \mathbf{0}$ , który nie ma elementu odwrotnego. Rozważmy iloczyny  $aa_1, aa_2, aa_3, \dots$  elementu  $a$  ze wszystkimi innymi elementami pierścienia (w tym z  $\mathbf{1}$ ). Z założenia nie ma wśród nich jedynki, więc, skoro  $\cdot$  jest działaniem wewnętrznym, to z zasady szufladkowej istnieją takie  $a_k \neq a_l$ , że  $aa_k = aa_l$ . To stwierdzenie jest jednak sprzecznością na mocy lematu 3.12, ponieważ rozważamy pierścienie całkowite, w których nie ma dzielników zera.  $\square$

### Przykład 3.17

Przykłady pierścieni i ciał:

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  – pierścień całkowity, który nie jest ciałem (nie ma dzielników zera, ale często elementy odwrotne nie zawierają się w zbiorze  $\mathbb{Z}$ ),
- $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$  – ciało liczb wymiernych,
- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  – ciało liczb rzeczywistych,
- $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  – ciało liczb zespolonych,
- $(\mathbb{Z}_n, +_n, \cdot_n)$  – pierścień przemienny z jedynką.

### Wniosek 3.18 (z twierdzenia 3.7)

Pierścień  $(\mathbb{Z}_n, +_n, \cdot_n)$  jest ciałem wtedy i tylko wtedy, gdy  $n$  jest liczbą pierwszą.

## §3.3 Morfizmy

**Definicja 3.19.** Homomorfizmem grupy  $(A_1, +)$  w grupę  $(A_2, \oplus)$  jest takie odwzorowanie  $h : A_1 \rightarrow A_2$ , że

$$\forall x, y \in A_1 : h(x + y) = h(x) \oplus h(y).$$

**Fakt 3.20.** Jeśli  $h : A_1 \rightarrow A_2$  jest homomorfizmem grupy  $(A_1, +)$  w  $(A_2, \oplus)$ , to

1.  $e \in A_1$  jest elementem neutralnym w  $(A_1, +) \implies h(e) \in A_2$  jest elementem neutralnym w  $(A_2, \oplus)$ ,
2.  $\forall x \in A_1 : h(x') = h(x)'$ .

**Definicja 3.21.** Izomorfizm między grupami  $(A_1, +), (A_2, \oplus)$  jest homomorfizmem bi-jektywnym. Jeśli taki izomorfizm istnieje, to dwie grupy nazywamy izomorficznymi.

**Definicja 3.22.** Automorfizm to izomorfizm struktury na samą siebie.

Analogicznie definiujemy morfizmy między pierścieniami i ciałami (wtedy równość z definicji 3.19 musi zachodzić dla obydwu działań).

### Przykład 3.23

Przykłady morfizmów:

- $h(x) = x^2$  jest homomorfizmem grupy  $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$  w  $(\mathbb{R}_+, \cdot)$ ,
- $h(x) = e^x$  jest izomorfizmem grupy  $(\mathbb{R}, +)$  w  $(\mathbb{R}_+, \cdot)$ , ponieważ

$$h(x + y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = h(x) \cdot g(y),$$

- $h(z) = \bar{z}$  jest automorfizmem grupy  $(\mathbb{C}, +)$ .

Na podobnej zasadzie jak w przykładzie drugim, można pokazać izomorfizm grupy  $(\mathbb{Z}_n, +_n)$  z grupą pierwiastków  $n$ -tego stopnia z jedności względem mnożenia  $(\mu_n(\mathbb{C}), \cdot)$ . Biorąc funkcję  $h(x) = \cos(\frac{2\pi}{n}x) + i \sin(\frac{2\pi}{n}x)$ , mamy

$$\begin{aligned} h(x + y) &= \cos(\frac{2\pi}{n}(x + y)) + i \sin(\frac{2\pi}{n}(x + y)) \\ &= (\cos(\frac{2\pi}{n}x) + i \sin(\frac{2\pi}{n}x)) \cdot (\cos(\frac{2\pi}{n}y) + i \sin(\frac{2\pi}{n}y)) = h(x) \cdot h(y) \end{aligned}$$

## §3.4 Przestrzenie wektorowe

**Definicja 3.24.** Przestrzeń wektorowa (liniowa) nad ciałem  $(K, \oplus, \otimes)$  to struktura  $(V, K, +, \cdot)$ , gdzie

1.  $(V, +)$  jest grupą abelową,
2. działanie  $\cdot : K \times V \rightarrow V$  jest zewnętrzne
3. działanie  $\cdot$  jest rozdzielne względem działania  $+$ , to znaczy

$$\forall_{u,v \in V} \quad \forall_{\alpha \in K} \quad \alpha \cdot (u + v) = (\alpha \cdot u) + (\alpha \cdot v),$$

4. zachodzi „rozdzielność” działania  $\cdot$  względem  $+$  i  $\oplus$ , to znaczy

$$\forall_{v \in V} \quad \forall_{\alpha, \beta \in K} \quad (\alpha \oplus \beta) \cdot v = (\alpha \cdot v) + (\beta \cdot v),$$

5. zachodzi „łączność” działań  $\cdot$  i  $\otimes$ , to znaczy

$$\forall_{v \in V} \quad \forall_{\alpha, \beta \in K} \quad (\alpha \otimes \beta) \cdot v = \alpha \cdot (\beta \cdot v),$$

6. jedynka z ciała  $(K, \oplus, \otimes)$  jest elementem neutralnym również dla działania  $\cdot$ , to znaczy

$$\forall_{v \in V} \quad \mathbf{1} \cdot v = v.$$

Elementy zbioru  $V$  nazywamy **wektorami**, a zbioru  $K$  – **skalarami**. Często zamiast przestrzeni  $(V, K, +, \cdot)$  piszemy o przestrzeni  $V$ , a zamiast symboli  $\oplus, \otimes$  piszemy po prostu  $+, \cdot$ . Element neutralny dodawania wektorów to wektor zerowy  $\vec{0}$ .

### Przykład 3.25

Przestrzenią wektorową nad ciałem liczb rzeczywistych jest struktura  $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$ , często oznaczana jako  $\mathbb{R}^n(\mathbb{R})$ , gdzie

- $(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$ ,
- $\alpha \cdot (x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$ .

### Przykład 3.26

Jeśli przez  $\mathbb{R}[x]_n$  oznaczymy zbiór wielomianów rzeczywistych o stopniu równym co najwyżej  $n$ , to struktura

$$(\mathbb{R}[x]_n, \mathbb{R}, +, \cdot)$$

będzie przestrzenią liniową.

### Twierdzenie 3.27

W przestrzeni liniowej  $(V, K, +, \cdot)$  dla każdych  $u, v \in V$  oraz  $\alpha, \beta \in K$  zachodzą następujące własności:

1.  $\mathbf{0} \cdot v = \bar{0}$ ,
2.  $\alpha \cdot \bar{0} = \bar{0}$ ,
3.  $(-\alpha) \cdot v = -(\alpha \cdot v)$ ,
4.  $\alpha \cdot (-v) = -(\alpha \cdot v)$ ,
5.  $\alpha \cdot v = \bar{0} \Leftrightarrow (\alpha = \mathbf{0} \vee v = \bar{0})$ ,
6.  $\alpha \cdot u = \alpha \cdot v \Rightarrow u = v$ , dla  $\alpha \neq \mathbf{0}$ ,
7.  $\alpha \cdot v = \beta \cdot v \Rightarrow \alpha = \beta$ , dla  $v \neq \bar{0}$ .

*Dowód.* W dowodach wszystkich własności posługujemy się wyłącznie definicją przestrzeni wektorowej (3.24), wektora zerowego oraz poprzednimi w kolejności udowodnionymi własnościami.

1.  $v + \mathbf{0} \cdot v = \mathbf{1} \cdot v + \mathbf{0} \cdot v = (\mathbf{1} + \mathbf{0}) \cdot v = v = v + \bar{0}$   
 $\therefore \mathbf{0} \cdot v = \bar{0}$
2.  $\alpha \cdot \bar{0} = \alpha \cdot (\bar{0} + \bar{0}) = \alpha \cdot \bar{0} + \alpha \cdot \bar{0}$   
 $\therefore \bar{0} = \alpha \cdot \bar{0}$
3.  $\bar{0} = \alpha \cdot v - (\alpha \cdot v)$  oraz  $\bar{0} = \mathbf{0} \cdot v = (\alpha - \alpha) \cdot v = \alpha \cdot v + (-\alpha) \cdot v$   
 $\therefore -(\alpha \cdot v) = (-\alpha) \cdot v$
4.  $\bar{0} = \alpha \cdot v - (\alpha \cdot v)$  oraz  $\bar{0} = \alpha \cdot \bar{0} = \alpha \cdot (v - v) = \alpha \cdot v + \alpha \cdot (-v)$   
 $\therefore -(\alpha \cdot v) = \alpha \cdot (-v)$
5. implikacja  $\Leftarrow$  (konieczność) trywialna; implikacja  $\Rightarrow$  (dostateczność) wynika z tego, że jeśli założymy, że  $\alpha \neq \mathbf{0}, v \neq \bar{0}$ , to mamy

$$\alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v = \alpha \cdot u.$$

Mnożąc przez  $a^{-1}$  (które istnieje, bo  $(K, +, \cdot)$  jest ciałem) otrzymujemy

$$u + v = u,$$

a dodając obustronnie  $-u$  (które istnieje z definicji 3.24) dochodzimy do sprzeczności z założeniem

$$v = \bar{0}.$$

6. dowód analogiczny do dowodu lematu 3.12,
7. dowód analogiczny do dowodu lematu 3.12.

□

**Definicja 3.28.** Podprzestrzeń liniowa  $(U, K, +, \cdot)$  to taka struktura, że

1.  $(V, K, +, \cdot)$  jest przestrzenią liniową oraz  $U \subset V, U \neq \emptyset$ ,
2.  $\forall_{u,v \in U} (u + v) \in U$ ,
3.  $\forall_{\alpha \in K} \forall_{u \in U} (\alpha \cdot u) \in U$ .

**Fakt 3.29** (Równoważna charakterystyka podprzestrzeni). Dwa ostatnie warunki z powyższej definicji są równoważne warunkowi:

$$\forall_{\alpha, \beta \in K} \forall_{u, v \in V} \alpha \cdot u + \beta \cdot v \in U.$$

*Dowód.* Implikacja w jedną stronę jest trywialna, w drugą stronę można ją udowodnić przez stwierdzenie, że każdy wektor ma wektor przeciwny (bo z definicji 3.24  $(V, +)$  jest grupą abelową) oraz że pod  $\alpha, \beta$  można podstawić  $\mathbf{1}$  (i znowu użyć definicji 3.24). □

**Definicja 3.30.** Kombinacja liniowa wektorów  $v_1, v_2, \dots, v_n$  to wektor

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n,$$

gdzie skalary  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  nazywamy współczynnikami tej kombinacji.

**Definicja 3.31.** Wektory  $v_1, v_2, \dots, v_n$  są liniowo niezależne, jeśli dla każdego ciągu współczynników  $\alpha$  zachodzi implikacja

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = \bar{0} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n = 0.$$

Mówimy również, że wektory są liniowo zależne, jeśli nie są liniowo niezależne.

### Przykład 3.32

W przestrzeni wektorowej  $\mathbb{R}^3(\mathbb{R})$  weźmy wektory

$$u = (3, 2, -1), v = (1, -2, 1), w = (1, 1, 1).$$

Rozwiązujemy układ równań  $\alpha u + \beta v + \gamma w = \bar{0} \Rightarrow$

$$\begin{cases} 3\alpha + \beta + \gamma = 0 \\ 2\alpha - 2\beta + \gamma = 0 \\ -\alpha + \beta + \gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4\alpha = 0 \\ 2\alpha - 2\beta + \gamma = 0 \\ -\alpha + \beta + \gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ -2\beta + \gamma = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

pokazując, że wektory  $u, v, w$  są liniowo niezależne.

### Twierdzenie 3.33

Wektory  $v_1, \dots, v_n$  są liniowo zależne wtedy i tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden jest kombinacją liniową pozostałych.



*Dowód.* Jeśli istnieje taki ciąg  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , że  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \neq \{0\}$  oraz

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = \bar{0},$$

to bez straty ogólności możemy przyjąć, że  $\alpha_n \neq 0$ . Równoważnie przekształcamy równość do postaci

$$\begin{aligned} \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_{n-1} v_{n-1} &= -\alpha_n v_n \\ \frac{-\alpha_1}{\alpha_n} v_1 + \frac{-\alpha_2}{\alpha_n} v_2 + \dots + \frac{-\alpha_{n-1}}{\alpha_n} v_{n-1} &= v_n, \end{aligned}$$

więc otrzymujemy równoważność między założeniem i stwierdzeniem, że  $v_n$  jest kombinacją liniową wektorów  $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ .  $\square$

### Twierdzenie 3.34

Jeśli wektory  $v_1, v_2, \dots, v_n$  są liniowo niezależne oraz wektor  $u$  jest kombinacją liniową tych wektorów, to współczynniki tej kombinacji są wyznaczone jednoznacznie.

*Dowód.* Weźmy takie ciągi  $(\alpha_n)$  i  $(\beta_n)$ , że

$$\begin{aligned} u &= \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n \\ u &= \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n \end{aligned}$$

Mamy

$$u - u = \bar{0} = (\alpha_1 - \beta_1) v_1 + (\alpha_2 - \beta_2) v_2 + \dots + (\alpha_n - \beta_n) v_n$$

co, skoro  $v_1, v_2, \dots, v_n$  są liniowo niezależne, dowodzi, że dla każdego  $i$  zachodzi  $\alpha_i - \beta_i = 0$ , więc ciągi  $(\alpha_n)$  i  $(\beta_n)$  są równe.  $\square$

**Definicja 3.35.** Powłoka liniowa zbioru  $A \subset V$ ,  $A \neq \emptyset$ , gdzie  $V$  jest przestrzenią wektorową nad ciałem  $K$  to zbiór

$$\text{Lin } A = \{v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k : \alpha_i \in K, v_i \in A\}$$

$\text{Lin } A$  jest podprzestrzenią przestrzeni  $A$  nazywaną podprzestrzenią generowaną przez zbiór  $A$ . Dla danego zbioru  $A$  mówimy, że **rozpin**a on przestrzeń wektorową  $V$ , jeśli  $\text{Lin } A = V$ .

**Definicja 3.36.** Baza  $B$  przestrzeni wektorowej  $V$  to taki zbiór, że  $\text{Lin } B = V$  oraz wszystkie wektory w  $B$  są liniowo niezależne.

$B$  jest bazą danej przestrzeni liniowej wtedy i tylko wtedy, gdy  $B$  jest maksymalnym (w sensie inkluzji) zbiorem wektorów liniowo niezależnych oraz wtedy i tylko wtedy, gdy  $B$  jest minimalnym (w sensie inkluzji) zbiorem wektorów rozpinających. Przestrzeń  $\{\bar{0}\}$  nie ma bazy.

### Twierdzenie 3.37

Każde dwie bazy danej przestrzeni wektorowej są równoliczne.

*Dowód.* Weźmy dwie bazy  $A, B$  przestrzeni liniowej  $V$  oraz niech  $|A| = k$ . Załóżmy przeciwnie, że  $|B| > k, B = \{b_1, b_2, \dots, b_k, \dots\}$ . Skoro  $A$  jest bazą przestrzeni  $V$ , to każdy wektor ze zbioru  $B$  jest kombinacją liniową wektorów ze zbioru  $A$ , czyli

$$b_1 = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \dots + \alpha_k a_k.$$

Bez straty ogólności możemy założyć, że  $\alpha_1 \neq 0$  (ponieważ wszystkie nie mogą być zerowe). Wtedy

$$a_1 = \frac{1}{\alpha_1} b_1 + \frac{-\alpha_2}{\alpha_1} a_2 + \dots + \frac{-\alpha_k}{\alpha_1} a_k,$$

a więc  $a_1$  jest kombinacją liniową wektorów ze zbioru  $A \cup \{b_1\} \setminus \{a_1\}$ . Wektory z tego zbioru oczywiście rozpinają całą przestrzeń liniową  $V$  oraz są liniowo niezależne (wszystkie  $a_2, a_3, \dots, a_k$  są liniowo niezależne, a  $b_1$  jest liniowo niezależny od nich, ponieważ założyliśmy, że  $\alpha_1 \neq 0$ ). Z tego powodu zbiór  $A \cup \{b_1\} \setminus \{a_1\}$  jest bazą. Kontynuujemy rozumowanie, pokazując, że zbiór

$$A \cup \{b_1, b_2, \dots, b_k\} \setminus \{a_1, a_2, \dots, a_k\} = \{b_1, b_2, \dots, b_k\}$$

jest bazą. Z tego powodu każdy wektor  $b_{k+1}, b_{k+2}, \dots$  jest liniowo zależny od  $\{b_1, \dots, b_k\}$ , więc dochodzimy do sprzeczności z założeniem, że  $B$  jest bazą.  $\square$

**Definicja 3.38.** Wymiar  $\dim V$  przestrzeni wektorowej  $V$  to liczność bazy tej przestrzeni. Jeśli  $V = \{\vec{0}\}$ , to  $\dim V = 0$ .

### Przykład 3.39

Przestrzeń  $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$  jest przestrzenią skończenie wymiarową z

$$\dim \mathbb{R}^n = n,$$

natomiast  $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \mathbb{R}, +, \cdot)$  jest przestrzenią nieskończenie wymiarową, więc

$$\dim(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})) = \infty.$$

**Definicja 3.40.** Reper bazowy to baza, w której ustaliliśmy kolejność wektorów.

Jeśli  $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  jest reperem bazowym przestrzeni wektorowej  $V$ , to dla dowolnego wektora

$$v = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$$

skalary  $\alpha_i$  nazwiemy **współrzednymi** wektora  $v$  w bazie  $B$  i zapiszemy

$$v = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]_B.$$

**Definicja 3.41.** Baza kanoniczna to reper bazowy przestrzeni  $\mathbb{R}^n(\mathbb{R})$ , w którym

$$B_k = ((1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), (0, 0, 0, \dots, 1)).$$

Łatwo uzasadnić, że jeśli  $\dim V = n$ , to każdy zbiór  $n + 1$  wektorów jest liniowo zależny, a każdy zbiór  $n$  wektorów jest liniowo niezależny wtedy i tylko wtedy, gdy generuje przestrzeń  $V$ .

### Twierdzenie 3.42

Niech  $V$  będzie przestrzenią skończenie wymiarową, a  $U$  jej podprzestrzenią. Wówczas

$$\dim U = \dim V \iff U = V.$$

Implikacja w lewą stronę jest trywialna, pokażemy implikację w prawo.

*Dowód.* Jeśli weźmiemy pewną bazę  $B$  przestrzeni  $U$  i zachodzi warunek  $\dim U = \dim V$ , to, zgodnie z tym co powiedzieliśmy wcześniej, jest ona również bazą przestrzeni  $V$ , ponieważ  $U \subset V$ , z czego wynika teza.  $\square$

### Przykład 3.43

Przykłady przestrzeni wektorowych wraz z wymiarami:

- dla  $(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}, +, \cdot)$  przy  $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \dots$  mamy  $\dim \mathbb{K}^n = n$ ,
- dla  $(\mathbb{C}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$  mamy  $\dim \mathbb{C}^n = 2n$ .

**Definicja 3.44.** Suma podprzestrzeni  $V_1, V_2$  przestrzeni  $V$  to zbiór

$$V_1 + V_2 = \{v = v_1 + v_2 : v_1 \in V_1, v_2 \in V_2\}.$$

**Fakt 3.45.** Jeśli  $V_1, V_2$  są podprzestrzeniami przestrzeni  $V$ , to  $V_1 \cap V_2$  jest podprzestrzenią przestrzeni  $V$ .

**Uwaga 3.46.** O ile  $V_1 \cap V_2$  oraz  $V_1 + V_2$  (z definicji) są przestrzeniami, o tyle już  $V_1 \cup V_2$  na ogół nią nie jest, więc nie będziemy raczej używać tego zapisu.

**Definicja 3.47.** Suma prosta  $V_1 \oplus V_2$  dwóch podprzestrzeni przestrzeni  $V$  to taka suma  $V_1 + V_2$ , że zachodzi warunek

$$\forall_{v \in V_1 + V_2} \exists!_{v_1 \in V_1} \exists!_{v_2 \in V_2} v = v_1 + v_2.$$

### Twierdzenie 3.48

Suma dwóch podprzestrzeni jest sumą prostą wtedy i tylko wtedy, gdy ich częścią wspólną jest zbiór  $\{\bar{0}\}$ .

*Dowód.* Jeśli część wspólna dwóch podprzestrzeni jest równa  $\{\bar{0}\}$ , to ich bazy są rozłączne, a więc teza wynika z twierdzenia 3.34.  $\square$

**Definicja 3.49.** Przestrzeń uzupełniająca  $V_2$  podprzestrzeni  $V_1$  przestrzeni  $V$  to taka przestrzeń, że

$$V_1 \oplus V_2 = V.$$

**Fakt 3.50.** Dla każdej podprzestrzeni dowolnej przestrzeni istnieje przestrzeń uzupełniająca.

**Twierdzenie 3.51 (Grassmana)**

Dla skończone wymiarowych podprzestrzeni  $V_1, V_2$  przestrzeni wektorowej  $V$  zachodzi

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2),$$

a w szczególności

$$V = V_1 \oplus V_2 \Rightarrow \dim V = \dim V_1 + \dim V_2.$$

*Dowód.* Możemy wziąć bazę  $B$  przestrzeni  $V$  oraz bazy  $B_1, B_2$  odpowiednio podprzestrzeni  $V_1, V_2$  takie, że  $B_1, B_2 \subset B$ . Oczywiście jest, że

$$|B_1 \cup B_2| = |B_1| + |B_2| - |B_1 \cap B_2|,$$

więc z definicji sumy podprzestrzeni (3.44) i twierdzenia 3.37 wynika teza.  $\square$

## §4 Macierze

**Definicja 4.1.** Macierz o wymiarach  $m \times n$  i elementach ze zbioru  $K$  to odwzorowanie

$$\{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \ni (i, j) \rightarrow a_{ij} \in K,$$

które reprezentujemy w następujący sposób:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

**Definicja 4.2.** Macierz transponowana do macierzy  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$  to macierz

$$A^T = [a_{ji}]_{n \times m}.$$

Jeśli  $A = A^T$ , to macierz jest **symetryczna**.

**Macierz zerowa**  $\mathbf{0}_{m \times n}$  to taka macierz, że wszystkie jej elementy są zerowe. **Macierz kwadratowa** to macierz o wymiarach  $n \times n$ . **Przekątną główną** macierzy kwadratowej tworzą elementy  $a_{ii}$ .

**Definicja 4.3.** Macierz diagonalna to macierz kwadratowa, w której wszystkie elementy poza jej główną przekątną są zerowe.

**Definicja 4.4.** Macierz jednostkowa to macierz kwadratowa, w której wszystkie elementy na głównej przekątnej są jedynkami. Oznaczamy ją często  $I_n$ , gdzie  $n \times n$  to wymiary tej macierzy.

**Definicja 4.5.** Macierz jest trójkątna górna/dolna, jeśli wszystkie elementy poniżej/powyżej głównej przekątnej są równe 0.

### §4.1 Działania na macierzach

Zdefiniowane są pewne działania na macierzach:

**Suma macierzy** dla macierzy  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$  i  $B = [b_{ij}]_{m \times n}$  tych samych wymiarach:


$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n},$$

**Mnożenie przez skalar** dla macierzy  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ :

$$\alpha A = [\alpha a_{ij}]_{m \times n},$$

**Mnożenie macierzy** jeśli liczba kolumn macierzy  $A = [a_{ij}]_{m \times p}$  jest równa liczbie wierszy macierzy  $B = [b_{ij}]_{p \times n}$ , to

$$A \cdot B = [c_{ij}]_{m \times n}, \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}.$$



Rysunek 1: Mnożenie macierzy, źródło: Wikipedia.

**Uwaga 4.6.** Mnożenie macierzy nie jest przemienne, jest za to łączne i obustronnie rozdzielne względem dodawania.

**Fakt 4.7.** Zbiór  $M_{m \times n}(\mathbb{K})$  macierzy o wymiarach  $m \times n$  i elementach z ciała przemiennego  $\mathbb{K}$ ,  $|\mathbb{K}| \geq 2$  tworzy przestrzeń wektorową nad ciałem  $\mathbb{K}$ .

**Fakt 4.8.** Elementem neutralnym mnożenia macierzy kwadratowych jest macierz jednostkowa<sup>2</sup>.

**Fakt 4.9.** Zachodzi równość

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

## §4.2 Wyznacznik macierzy

**Definicja 4.10.** Inwersja w permutacji  $\sigma \in S_n$  to taka para  $\sigma(i), \sigma(j)$ , że

$$i < j, \quad \sigma(i) > \sigma(j).$$

**Definicja 4.11.** Znak permutacji  $\sigma$  to

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{[\sigma]},$$

gdzie  $[\sigma]$  to liczba inwersji w permutacji  $\sigma$ .

<sup>2</sup>jeśli macierz  $A_{m \times n}$  nie jest kwadratowa, to również zachodzi  $I' M = M$  oraz  $M = I'' M$  dla pewnych macierzy jednostkowych  $I', I''$ , lecz  $I' \neq I''$  (są różnych wymiarów).

Jeśli  $\varepsilon(\sigma) = 1$ , to permutacja  $\sigma$  jest **parzysta**, a jeśli  $\varepsilon(\sigma) = -1$ , to jest **nieparzysta**.

**Fakt 4.12.** Każda transpozycja (zamiana miejscami) dwóch różnych elementów permutacji zmienia jej znak.

*Dowód.* Weźmy permutację

$$(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_i, \dots, \sigma_j, \dots, \sigma - n - 1, \sigma_n).$$

Zamieniając  $\sigma_i$  oraz  $\sigma_j$  nie zmieni się liczba inwersji zawierających elementy  $\sigma_k, k \in [1, i) \cup (j, n]$ . Nie zmieni się również liczba inwersji zawierających elementy  $\sigma_k, k \in (i, j)$  takie, że  $\sigma_k$  jest większe lub mniejsze jednocześnie od  $\sigma_i$  i  $\sigma_j$ .

Dla pozostałych elementów  $\sigma_k, k \in (i, j)$  jeśli istnieje inwersja  $(\sigma_i, \sigma_k)$  to istnieje również  $(\sigma_k, \sigma_j)$ , a jeśli istnieje inwersja  $(\sigma_j, \sigma_k)$ , to istnieje również  $(\sigma_k, \sigma_i)$ . Tak więc jedyną inwersją, która zmienia parzystość  $[\sigma]$  jest inwersja  $(\sigma_i, \sigma_j)$  — która istnieje przed transpozycją, albo po niej.  $\square$

**Definicja 4.13.** Wyznacznik macierzy kwadratowej  $A$  to taki element ciała, że

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}.$$

Oznaczamy  $\det \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{vmatrix}$ .

#### Twierdzenie 4.14 (własności wyznaczników)

Dla macierzy kwadratowej  $A = [a_{ij}] \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$  zachodzi:

1.  $\det A = \det A^T$ ,
2.  $\det I_n = 1$ ,
3. jeśli istnieje zerowy wiersz (lub kolumna) to  $\det A = 0$ ,
4. jeśli pomnożymy jeden wiersz (lub kolumnę) przez skalar  $\alpha$ , to wyznacznik również będzie  $\alpha$  razy większy,
5.  $\det \alpha A = (\det A)^\alpha$ ,
6. jeśli  $A = [k_1, \dots, k'_j + k''_j, \dots, k_n]$ , gdzie  $k_i$  są kolumnami lub wierszami, to

$$\det A = \det[k_1, \dots, k'_j, \dots, k_n] + \det[k_1, \dots, k''_j, \dots, k_n],$$

7. przestawienie dwóch wierszy macierzy zmienia znak wyznacznika na przeciwny,
8. jeśli macierz ma dwa jednakowe wiersze (lub kolumny) to  $\det A = 0$ ,
9. wyznacznik nie zmieni się, jeśli do wiersza (albo kolumny) dodamy kombinację liniową pozostałych wierszy (kolumn).

*Dowód.* 1. wszystkich par elementów w permutacji  $\sigma \in S_n$  jest  $n(n-1)$ . Jeśli  $(\sigma_i, \sigma_j)$  jest inwersją w  $\sigma$ , to w  $\sigma^{-1}$  nią nie jest, a skoro  $2 \mid n(n-1)$ , to  $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma^{-1})$ .

2. dla permutacji identycznościowej dany w definicji iloczyn jest równy 1, dla każdej innej permutacji jest równy 0.
3. w każdym z sumowanych iloczynów występuje 0 jako czynnik.
4. w każdym z sumowanych iloczynów występuje jeden dodatkowy skalar  $\alpha$ .
5. wniosek z poprzedniego.
6. dowód podobny do poprzednich dwóch.
7. wynika z faktu 4.12.
8. wniosek z poprzedniego.
9. TODO

□

#### Twierdzenie 4.15

Wyznacznik macierzy  $2 \times 2$  jest równy

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

*Dowód.* Prosty, z definicji.

□


#### Twierdzenie 4.16 (reguła Sarrusa)

Wyznacznik macierzy  $3 \times 3$  jest równy

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

*Dowód.* Prosty, z definicji.

□



Rysunek 2: Reguła Sarrusa, źródło: Wikipedia.

#### Twierdzenie 4.17 (Cauchy'ego)

Dla dowolnych macierzy  $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$  zachodzi

$$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B.$$

*Dowód.* TODO □

**Definicja 4.18.** Minor stopnia  $k$  macierzy  $A_{m \times n}$  to wyznacznik podmacierzy kwadratowej  $k \times k$  powstałej przez wykreślenie  $n - k$  kolumn oraz  $m - k$  wierszy.

Jeśli  $A_{n \times n}$  jest macierzą kwadratową, to wyznacznik macierzy powstałej przez wykreślenie  $i$ -tego wiersza i  $j$ -tej kolumny nazywamy **minorem odpowiadającym** elementowi  $a_{ij}$  macierzy  $A$  i oznaczamy  $M_{ij}$ .

**Definicja 4.19.** Dopelnienie algebraiczne elementu  $a_{ij}$  macierzy kwadratowej  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$  to skalar

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

**Twierdzenie 4.20 (Laplace'a)**

Niech  $A = [a_{ij}]_{n \times n}$  będzie macierzą kwadratową. Wtedy dla każdego  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}.$$

**Wniosek 4.21**

Wyznacznik macierzy trójkątnej jest równy iloczynowi elementów na jej przekątnej.

## §4.3 Rząd macierzy

**Twierdzenie 4.22**

Maksymalna liczba liniowo niezależnych kolumn (wektorów z  $\mathbb{K}^m$ ) dowolnej macierzy  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$  jest równa maksymalnej liczbie liniowo niezależnych wierszy (wektorów z  $\mathbb{K}^n$ ).

*Dowód.* TODO □

**Definicja 4.23.** Rząd macierzy to maksymalna liczba liniowo niezależnych kolumn (lub wierszy). Rząd macierzy  $A$  oznaczamy przez  $\text{rank}(A)$ .

Z twierdzenia 4.22 i definicji 4.23 wynika, że

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T).$$

**Definicja 4.24.** Macierz schodkowa to macierz, której pierwsze niezerowe elementy (schodki) kolejnych niezerowych wierszy znajdują się w coraz dalszych kolumnach, a wiersze zerowe umieszczone są najniżej.

**Fakt 4.25.** Rząd macierzy schodkowej jest równy liczbie jej schodków.

**Definicja 4.26.** Operacje elementarne na macierzach to:

- zamiana miejscami wierszy (kolumn) macierzy,
- dodanie do wiersza (kolumny) kombinacji liniowej pozostałych wierszy (kolumn),



- pomnożenie wiersza przez niezerowy skalar.

Jeśli macierz  $B$  można otrzymać z macierzy  $A$  za pomocą operacji elementarnych, to mówimy, że te macierze są **równoważne** i oznaczamy  $A \sim B$ .

**Fakt 4.27.** Rząd macierzy nie zmienia się pod wpływem operacji elementarnych.

*Dowód.* Wynika z twierdzenia 3.33. □

Każdą macierz można łatwo doprowadzić do postaci schodkowej, za pomocą metody **eliminacji Gaussa**, która polega na stosowaniu operacji elementarnych na wierszach, „pozbywając się” niezerowych elementów z dolnego trójkąta. W ten sposób można odczytać jej rząd oraz, za pomocą wniosku 4.21, obliczyć jej wyznacznik (jeśli jest kwadratowa)<sup>3</sup>.

#### Przykład 4.28

Obliczyć wyznacznik macierzy

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 11 & 6 \end{bmatrix}.$$

*Rozwiązanie.*

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 11 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

□

#### Twierdzenie 4.29

Rząd macierzy  $A$  jest równy największemu ze stopni niezerowych minorów tej macierzy.

*Dowód.* TODO □

#### Przykład 4.30

Obliczyć rząd macierzy

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 7 \\ 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}.$$

*Rozwiązanie.* Obliczmy minor

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \\ 3 & 5 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (-8) + 0 + 12 - 0 - 1 - (-18) = 21 \neq 0.$$

<sup>3</sup>warto jednak zwrócić uwagę, że przy obliczaniu wyznacznika lepiej nie mnożyć wierszy i nie zamieniać ich miejscami, bo te operacje wpływają na wyznacznik

Ten minor jest niezerowy i jednocześnie ma największy stopień (bo wykreśliliśmy tylko jeden wiersz), więc na mocy twierdzenia 4.29  $\text{rank } A = 3$ .

Dla pewności można pokazać również inną metodę — eliminację Gaussa:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 7 \\ 3 & 5 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & -5 & -11 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & -4 & -13 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -26 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -25 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{rank } A = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 3.$$

□

## §4.4 Macierz odwrotna

**Definicja 4.31.** Macierz odwrotna  $A^{-1}$  do macierzy kwadratowej  $A_{n \times n}$  to taka macierz, że

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n.$$

Jeśli taka macierz istnieje, to mówimy, że  $A$  jest macierzą **odwracalną**.

### Twierdzenie 4.32

Jeśli macierz  $A_{n \times n}$  jest odwracalna, to

1.  $\det A \neq 0$  oraz  $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$ ,
2.  $A^{-1} = \frac{1}{\det A}(A^D)^T$ , gdzie  $A^D$  jest macierzą dopełnień algebraicznych macierzy  $A$ .

*Dowód.* 1. Z definicji macierzy odwrotnej (4.31)

$$A \cdot A^{-1} = I$$

$$\det(A \cdot A^{-1}) = \det I = 1.$$

Na mocy twierdzenia Cauchy'ego (4.17) otrzymujemy

$$\det A \cdot \det(A^{-1}) = 1,$$

z czego wynika teza.

2. Weźmy macierz  $B$  taką, że

$$B = \det A^{-1} \cdot (A^D)^T,$$

to znaczy, że dla każdego  $i, j$  zachodzi

$$b_{ij} = \det A^{-1} \cdot A_{ji},$$

Obliczmy teraz macierz  $C = AB$ :

$$\begin{aligned} c_{ij} &= \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot \det A^{-1} \cdot A_{jk} \\ &= \det A^{-1} \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot A_{jk}. \end{aligned}$$

Z rozwinięcia Laplace'a (4.20) otrzymujemy, że  $c_{ij} = 1$  jeśli  $i = j$  oraz  $c_{ij} = 0$  w przeciwnym wypadku (TODO). W takim razie  $C = I$ , więc  $B = A^{i-1}$ .  $\square$

**Definicja 4.33.** Macierz osobliwa to macierz  $A$ , której wyznacznik jest zerowy. W innym wypadku  $A$  jest macierzą nieosobliwą.

Na podstawie twierdzenia 4.32 łatwo zauważyć, że pojęcie macierzy nieosobliwej jest równoznaczne macierzy odwracalnej, a macierzy osobliwej — nieodwracalnej. Ponadto, jeśli macierz  $A_{n \times n}$  jest nieosobliwa, to  $\text{rank } A = n$ , a  $A^{-1}, A^T, \alpha A, A^n$  również są macierzami nieosobliwymi.

Aby znaleźć macierz odwrotną, można oczywiście wykorzystać wzór

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} (A^D)^T$$

z twierdzenia 4.32, ale zwykle szybszą<sup>4</sup> metodą będzie eliminacja Gaussa, którą możemy wykorzystać wraz z poniższym faktem.

**Fakt 4.34.** Jeśli macierz kwadratowa  $A$  jest odwracalna, to

$$[A \mid I] \sim [I \mid B] \Rightarrow B = A^{-1}.$$

*Dowód.* TODO  $\square$

#### Przykład 4.35

Znaleźć macierz odwrotną do macierzy

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

*Rozwiązanie.*

$$\begin{aligned} & \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 6 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 6 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -9 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 6 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & \frac{2}{3} & \frac{-1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ & \sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 6 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & \frac{2}{3} & \frac{-1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-2}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -6 & \frac{-5}{3} & \frac{4}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 3 & \frac{2}{3} & \frac{-1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-2}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -6 & \frac{-5}{3} & \frac{4}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{8}{3} & \frac{-4}{3} & -3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-2}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{array} \right] \\ & \sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{-17}{3} & \frac{10}{3} & 6 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{8}{3} & \frac{-4}{3} & -3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-2}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{array} \right], \end{aligned}$$

a więc

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -17 & 10 & 18 \\ 8 & -4 & -9 \\ -2 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

<sup>4</sup>na pewno w sensie złożoności obliczeniowej, w zadaniach to kwestia preferencji

Możemy zwerefikować swoje obliczenia, znajdując macierz odwrotną metodą macierzy dopełnień algebraicznych.

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{5 \cdot 4 + 6 \cdot 2 - 4 \cdot 2 \cdot 4 - 3} \begin{bmatrix} 5 \cdot 4 - 3 & -(2 \cdot 4) & 2 \\ -(4 \cdot 4 - 6) & 4 & -(1) \\ 4 \cdot 3 - 6 \cdot 5 & -(3 - 6 \cdot 2) & 5 - 4 \cdot 2 \end{bmatrix}^T \\ &= \frac{1}{-3} \begin{bmatrix} 17 & -8 & 2 \\ -10 & 4 & -1 \\ -18 & 9 & -3 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -17 & 10 & 18 \\ 8 & 4 & 9 \\ -2 & 1 & 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

□

Macierz odwrotną można znaleźć również rozwiązując układ równań liniowych

$$A \cdot X = B,$$

wtedy  $A^{-1} \cdot B = X$  — o czym więcej w następnej sekcji.

## §5 Układy równań liniowych

Układ  $m$  równań liniowych z  $n$  niewiadomymi  $x_1, \dots, x_n$  w postaci

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \dots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{cases} \quad (5)$$

możemy reprezentować jako równanie macierzy. Macierz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

nazywamy **macierzą główną** (macierzą współczynników) układu 5, a macierze

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

nazywamy odpowiednio **kolumną wyrazów wolnych** oraz **kolumną niewiadomych**. Połączenie macierzy  $A$  i  $B$

$$[A \mid B] = \left[ \begin{array}{cccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

jest **macierzą uzupełnioną** tego układu. Wtedy układ 5 zapisujemy macierzowo jako

$$A \cdot X = B.$$

**Definicja 5.1.** Układ jednorodny to taki układ równań liniowych, że kolumna wyrazów wolnych jest zerowa.

**Definicja 5.2.** Układ jest:

- **oznaczony**, jeśli ma jedno rozwiązanie,
- **nieoznaczony**, jeśli ma więcej niż jedno rozwiązanie,
- **sprzeczny**, jeśli nie ma rozwiązań.

**Definicja 5.3.** Układ kwadratowy to układ równań liniowych, w którym liczba niewiadomych jest równa liczbie równań (czyli macierz główna jest kwadratowa).

**Definicja 5.4.** Układ Cramera to układ kwadratowy, w którym wyznacznik macierzy głównej jest niezerowy,  $\det A \neq 0$ .

#### Twierdzenie 5.5 (Cramera)

Jeśli dany układ jest układem Cramera, to jest oznaczony oraz

$$x_j = \frac{D_{x_j}}{\det A},$$

gdzie  $D_{x_j}$  jest wyznacznikiem macierzy powstałej przez zastąpienie  $j$ -tej kolumny macierzy głównej  $A$  kolumną wyrazów wolnych  $B$ .

*Dowód.* Pierwsze stwierdzenie jest prawdziwe, ponieważ jeśli  $\det A \neq 0$ , to kolumny tworzą bazę pewnej przestrzeni liniowej, do której należy kolumna  $B$ , więc na mocy twierdzenia 3.34 jest ona jednoznacznie wyznaczona przez kombinację liniową kolumn z  $A$  (a współczynniki tej kombinacji liniowej są właśnie kolumną niewiadomych  $X$ ).

Oznaczając  $j$ -tą kolumną  $A$  jako  $\mathbf{a}_j$  oraz  $B = \mathbf{b}$ , na mocy poprzedniego akapitu równanie

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \dots + x_n \mathbf{a}_n = \mathbf{b}$$

spełnia dokładnie jeden wektor  $\mathbf{x}$ . Zatem

$$D_{x_j} = \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{b}, \dots, \mathbf{a}_n) = \det(\mathbf{a}_1, \dots, \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n).$$

Z własności wyznaczników (4.14) wynika, że wyznacznika nie zmieni odjęcie od pewnej kolumny innej kolumny przemnożonej przez skalar (nawet zerowy), więc

$$D_{x_j} = \det(\mathbf{a}_1, \dots, x_j \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) = x_j \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) = x_j \det A,$$

$$\therefore x_j = \frac{D_{x_j}}{\det A}.$$

□

#### Twierdzenie 5.6 (Kroneckera-Capellego)

Układ  $AX = B$  ma co najmniej jedno rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid B]).$$

*Dowód.* Oznaczając  $j$ -tą kolumną  $A$  jako  $\mathbf{a}_j$  oraz  $B = \mathbf{b}$ , mamy

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \dots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b},$$

a więc  $X$  istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy kolumna  $B$  jest kombinacją liniową kolumn z  $A$  (a więc nie jest liniowo niezależna, ergo  $\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid B])$ ).  $\square$

### Twierdzenie 5.7

Układ  $AX = B$  ma dokładnie jedno rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid B]) = n,$$

gdzie  $n$  jest liczbą niewiadomych.

*Dowód.* Jak poprzednio, lecz z wykorzystaniem twierdzenia 3.34.  $\square$

Prosty wniosek z tego twierdzenia jest taki, że jeśli  $\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid B])$ , ale  $\text{rank}(A) \neq n$ , to układ jest nieoznaczony, a jego rozwiązania zależą od  $n - \text{rank}(A)$  parametrów<sup>5</sup>.

Układy równań liniowych można łatwo rozwiązać eliminacją Gaussa w podobny sposób, jak robiliśmy to szukając macierzy odwrotnej w przykładzie 4.35.

### Przykład 5.8

Rozwiązać układ równań

$$\begin{cases} x + 3y - z &= 2 \\ 2x - 3z &= -5 \\ 3x + 2y - 3z &= -1 \end{cases}.$$

*Rozwiązanie.*

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -3 & -5 \\ 3 & 2 & -3 & -1 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -6 & -1 & -9 \\ 0 & -7 & 0 & -7 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Rząd macierzy jest równy liczbie zmiennych, więc (na mocy twierdzenia 5.7) układ jest oznaczony. Teraz możemy kontynuować przekształcenia, aby otrzymać macierz  $[I \mid X]$ , ale w praktyce łatwiej będzie teraz wrócić do układu równań. Mamy więc

$$z = 3,$$

$$y - z = -2 \Rightarrow y = -2 + 3 = 1,$$

$$x + 3x - z = 2 \Rightarrow x = 2 - 3 + 3 = 2.$$

$\square$

<sup>5</sup>jeśli układ jest określony nad ciałem  $\mathbb{R}$  lub  $\mathbb{C}$ , to układ nieoznaczony ma nieskończenie wiele rozwiązań

## §6 Geometria analityczna

W tej sekcji skupimy się na przestrzeni  $\mathbb{R}^3(\mathbb{R})$ , w której wektory będziemy interpretować często jako punkty lub wektory zaczepione w środku układu współrzędnych. Przez  $\mathbb{R}^n$  oznaczmy zbiór punktów, a przez  $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$  zbiór wektorów. W przestrzeni  $\mathbb{R}^3$  osie **prawkretnego** układu współrzędnych  $(x, y, z)$  będą rozpięte przez **wersory** (wektory o jednostkowej długości):

$$\hat{\mathbf{i}} = (1, 0, 0), \quad \hat{\mathbf{j}} = (0, 1, 0), \quad \hat{\mathbf{k}} = (0, 0, 1).$$

**Definicja 6.1.** Metryka euklidesowa w  $\mathbb{R}^n$  to funkcja  $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , która dla punktów  $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,  $Q = (y_1, y_2, \dots, y_n)$  jest zdefiniowana jako

$$d(P, Q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2}.$$

Wartość tej funkcji dla punktów  $X, Y$  to **odległość euklidesowa** tych punktów.

**Definicja 6.2.** Norma euklidesowa w  $\mathbb{R}^n$  to funkcja  $\|\cdot\| : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ , która dla wektora  $v = [v_1, v_2, \dots, v_n]$  jest zdefiniowana jako

$$\|v\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2}.$$

Wartość normy wektora  $v$  to **długość** tego wektora.

Łatwo zauważyć korelację między tymi dwoma wzorami: dla dwóch punktów  $P, Q$ , wektor  $\overrightarrow{PQ}$  jest równy

$$\overrightarrow{PQ} = [y_1 - x_1, \dots, y_n - x_n],$$

więc

$$d(P, Q) = \|\overrightarrow{PQ}\|.$$

**Definicja 6.3.** Iloczyn skalarny wektorów  $u = [u_1, \dots, u_n]$  i  $v = [v_1, \dots, v_n]$  w przestrzeni  $\mathbb{R}^n$  to liczba

$$u \circ v = \sum_{i=1}^n u_i v_i.$$

**Fakt 6.4.** Jeśli  $U^T$  jest jednokolumnową macierzą powstałą z wektora  $u$ , a  $V$  to jednowierszową macierz powstałą w wektora  $v$ , to

$$u \circ v = U^T \cdot V.$$

**Fakt 6.5.** Dla każdego wektora  $v \in \mathbb{R}^n$  zachodzi

$$\sqrt{v \circ v} = \|v\|.$$

Jeśli dla przestrzeni wektorowej  $\mathbb{R}^n$  określimy iloczyn skalarny wektorów, to taka przestrzeń jest **przestrzenią euklidesową**, którą oznaczamy przez  $E_n$ . Warto zauważyć, że taki iloczyn skalarny jest łączny, przemienny, zgodny z mnożeniem przez skalar oraz rozdzielny względem dodawania.

**Twierdzenie 6.6 (Cauchy'ego-Schwarza)**

Dla dowolnych wektorów  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in E_n$  zachodzi nierówność

$$|\mathbf{u} \circ \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|,$$

przy czym równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy wektory są liniowo zależne.

*Dowód.* Twierdzenie jest trywialne, jeśli któryś z wektorów jest zerowy, dlatego przyjmijmy  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \bar{0}$ . Dla dowolnego  $\alpha \in \mathbb{R}$  mamy

$$0 \leq \|\mathbf{u} - \alpha \mathbf{v}\|^2 = (\mathbf{u} - \alpha \mathbf{v}) \circ (\mathbf{u} - \alpha \mathbf{v}) = \mathbf{u} \circ \mathbf{u} - 2\alpha(\mathbf{u} \circ \mathbf{v}) + \alpha^2(\mathbf{v} \circ \mathbf{v}).$$

Podstawiając  $\alpha = (\mathbf{u} \circ \mathbf{v})(\mathbf{v} \circ \mathbf{v})^{-1}$  otrzymamy

$$\begin{aligned} 0 &\leq (\mathbf{u} \circ \mathbf{u}) - (\mathbf{v} \circ \mathbf{v})^{-1}(\mathbf{u} \circ \mathbf{v})^2 \\ (\mathbf{v} \circ \mathbf{v})^{-1}(\mathbf{u} \circ \mathbf{v})^2 &\leq (\mathbf{u} \circ \mathbf{u}) \\ (\mathbf{u} \circ \mathbf{v})^2 &\leq (\mathbf{u} \circ \mathbf{u})(\mathbf{v} \circ \mathbf{v}) \\ (\mathbf{u} \circ \mathbf{v})^2 &\leq \|\mathbf{u}\|^2 \cdot \|\mathbf{v}\|^2 \\ |\mathbf{u} \circ \mathbf{v}| &\leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|. \end{aligned}$$

Równość zachodzi tylko w przypadku, gdy  $\alpha = 0$ , czyli gdy  $\mathbf{u}, \mathbf{v}$  są liniowo zależne.  $\square$

**Wniosek 6.7 (Nierówność trójkąta)**

Dla dowolnych wektorów  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in E_n$  zachodzi nierówność

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|,$$

*Dowód.* Z nierówności Cauchy'ego-Schwarza wynika, że

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \circ \mathbf{v} &\leq \sqrt{\mathbf{u} \circ \mathbf{u}} \cdot \sqrt{\mathbf{v} \circ \mathbf{v}} \\ \mathbf{u} \circ \mathbf{u} + 2 \cdot \mathbf{u} \circ \mathbf{v} + \mathbf{v} \circ \mathbf{v} &\leq \mathbf{u} \circ \mathbf{u} + 2 \cdot \sqrt{\mathbf{u} \circ \mathbf{u}} \cdot \sqrt{\mathbf{v} \circ \mathbf{v}} + \mathbf{v} \circ \mathbf{v} \\ (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \circ (\mathbf{u} + \mathbf{v}) &\leq (\sqrt{\mathbf{u} \circ \mathbf{u}} + \sqrt{\mathbf{v} \circ \mathbf{v}})^2 \\ \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 &\leq (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2 \\ \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| &\leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|. \end{aligned}$$

$\square$

**Definicja 6.8.** Kąt między niezerowymi wektorami  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in E_n$  to taka liczba  $\angle(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \varphi \in [0, \pi]$ , że

$$\cos \varphi = \frac{\mathbf{u} \circ \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|}.$$

Jeśli  $\angle(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\pi}{2}$ , to wektory są **prostopadłe**  $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ , a jeśli  $\angle(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0$  lub  $\pi$ , to są **równoległe**  $\mathbf{u} \parallel \mathbf{v}$ . Przyjmujemy, że wektor zerowy jest prostopadły i równoległy do wszystkich innych wektorów.

**Fakt 6.9.** Dla dowolnych wektorów  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in E_n$

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{u} \circ \mathbf{v} = 0$$

*Dowód.* Wynika z definicji.  $\square$

Oczywiście  $\mathbf{u} \parallel \mathbf{v}$  wtedy i tylko wtedy, gdy wektory  $\mathbf{u}, \mathbf{v}$  są liniowo zależne.



## §6.1 Przestrzeń trójwymiarowa

**Fakt 6.10.** Trójka liniowo niezależnych wektorów  $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in E_3$  tworzy układ prawoskrętny, jeśli

$$\begin{vmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \mathbf{u}_3 \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \\ \mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_2 & \mathbf{w}_3 \end{vmatrix} > 0.$$

*Dowód.* TODO □

**Definicja 6.11.** Iloczyn wektorowy to takie działanie  $\times : (\vec{E}_3)^2 \rightarrow \vec{E}_3$ , że:

1. jeśli  $\mathbf{u} \parallel \mathbf{v}$ , to  $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \vec{0}$ ,
2. w przeciwnym wypadku  $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{w}$ , gdzie
  - $\|\mathbf{w}\| = \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\| \cdot \sin \angle(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ ,
  - $\mathbf{w} \perp \mathbf{u}$  oraz  $\mathbf{w} \perp \mathbf{v}$ ,
  - wektory  $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$  tworzą układ prawoskrętny.

### Twierdzenie 6.12

Dla dowolnych wektorów  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in E_3$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \left[ \begin{vmatrix} \mathbf{u}_2 & \mathbf{u}_3 \\ \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} \mathbf{u}_3 & \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{v}_3 & \mathbf{v}_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 \end{vmatrix} \right]$$

*Dowód.* Żmudny, ale prosty; z definicji. □

W praktyce łatwiej stosować (zapamiętać) „wzór”

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \mathbf{u}_3 \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{vmatrix} = \hat{\mathbf{i}} \begin{vmatrix} \mathbf{u}_2 & \mathbf{u}_3 \\ \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{vmatrix} + \hat{\mathbf{j}} \begin{vmatrix} \mathbf{u}_3 & \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{v}_3 & \mathbf{v}_1 \end{vmatrix} + \hat{\mathbf{k}} \begin{vmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 \end{vmatrix} \quad (6)$$

Warto zauważyć, że iloczyn wektorowy jest antyprzemienny ( $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ ), zgodny z mnożeniem przez skalar oraz rozdzielny względem dodawania.

**Fakt 6.13.** Dla dowolnych wektorów  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in E_3$

$$\mathbf{u} \parallel \mathbf{v} \Leftrightarrow \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \vec{0}$$

*Dowód.* Wynika z definicji. □

### Twierdzenie 6.14

Dla dowolnych wektorów  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in E_3$  liczba  $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$  jest polem równoległoboku rozpiętego przez wektory  $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ .

*Dowód.* Z definicji iloczynu wektorowego (6.11) mamy

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\| \cdot \sin \angle(\mathbf{u}, \mathbf{v}),$$

czyli iloczyn długości obu boków oraz sinusa kąta między nimi, który istotnie jest równy polu równoległoboku. □

Prosty wniosek z tego twierdzenia jest taki, że pole trójkąta rozpiętego przez wektory  $\mathbf{u}, \mathbf{v}$  jest równe  $\frac{1}{2}\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ .

### Twierdzenie 6.15

Dla dowolnych wektorów  $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in E_3$  liczba  $|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \circ \mathbf{w}|$  jest objętością równoległościanu rozpiętego przez wektory  $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ .

Działanie  $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \circ \mathbf{w}$  nazywamy **iloczynem mieszanym**.

*Dowód.* TODO □

Prosty wniosek z tego twierdzenia jest taki, że objętość czworościanu rozpiętego przez wektory  $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$  jest równa  $\frac{1}{6}|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \circ \mathbf{w}|$ .

**Fakt 6.16.** Dla dowolnych wektorów  $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in E_3$

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \circ \mathbf{w} = \begin{vmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \mathbf{u}_3 \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \\ \mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_2 & \mathbf{w}_3 \end{vmatrix}.$$

Jest to prostrzy sposób na liczenie objętości równoległościanu.

*Dowód.* Łatwo zauważyć zależność między rozwinięciem Laplace'a (4.20) oraz wzorem 6. □

## §6.1.1 Równanie płaszczyzny w przestrzeni

Płaszczyznę jednoznacznie wyznaczają trzy niewspółliniowe punkty (lub wyznaczone przez nie dwa wektory). Płaszczyznę jednoznacznie wyznaczyć może również jeden niezerowy wektor, zwany **wektorem normalnym**; jest on prostopadły do wyznaczonej płaszczyzny.

**Równanie parametryczne płaszczyzny** Jeśli  $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \pi$  oraz  $\mathbf{u} = [\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3]$ ,  $\mathbf{v} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3] \in E_3$  są liniowo niezależne i równoległe do płaszczyzny  $\pi$ , to

$$\pi : \begin{cases} x = x_0 + s\mathbf{u}_1 + t\mathbf{v}_1 \\ y = y_0 + s\mathbf{u}_2 + t\mathbf{v}_2 \\ z = z_0 + s\mathbf{u}_3 + t\mathbf{v}_3 \end{cases} \quad s, t \in \mathbb{R} \quad (7)$$

jest równaniem parametrycznym płaszczyzny. Wtedy każdy punkt płaszczyzny jest po prostu punktem  $P_0$ , który został przesunięty o pewien wektor równoległy do płaszczyzny.

**Równanie normalne płaszczyzny** Jeśli  $n = [A, B, C]$  jest wektorem normalnym płaszczyzny  $\pi$  oraz  $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \pi$ , to

$$\pi : [x - x_0, y - y_0, z - z_0] \circ [A, B, C] = 0$$

czyli

$$\pi : A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (8)$$

nazywamy równaniem normalnym płaszczyzny  $\pi$ . Wtedy każdy punkt  $P_1 \in \pi$  jest taki, że wektor  $\overrightarrow{P_0 P_1}$  jest prostopadły do wektora normalnego, czyli równoległy do płaszczyzny.

**Równanie ogólne płaszczyzny** Równanie normalne można wymnożyć do równania ogólnego

$$\pi : Ax + By + Cz + D = 0. \quad (9)$$

**Równanie odcinkowe płaszczyzny** Jeśli  $a, b, c \in \mathbb{R}$  są niezerowe, to

$$\pi : \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (10)$$

jest równaniem odcinkowym płaszczyzny. Taka płaszczyzna przecina się z osiami układu współrzędnych w punktach  $(a, 0, 0)$ ,  $(0, b, 0)$ ,  $(0, 0, c)$ ; tak więc nie każda płaszczyzna ma równanie odcinkowe.

### §6.1.2 Równanie prostej w przestrzeni

Prostą jednoznacznie wyznaczają dwa punkty (lub jeden wyznaczony przez nie wektor). Prosta jest również jednoznacznie wyznaczona przez przecięcie dwóch nierównoległych płaszczyzn.

**Równanie parametryczne prostej** Jeśli  $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in l$  oraz  $\mathbf{v} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3] \in E_3$  jest niezerowym wektorem równoległym do prostej  $l$ , to

$$l : \begin{cases} x = x_0 + t\mathbf{v}_1 \\ y = y_0 + t\mathbf{v}_2 \\ z = z_0 + t\mathbf{v}_3 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad (11)$$

jest równaniem parametrycznym prostej. Wektor  $\mathbf{v}$  nazywamy wektorem **kierunkowym** (lub tworzącym, rozpinającym) prostej  $l$ .

**Równanie kierunkowe prostej** Jeśli  $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in l$  oraz  $\mathbf{v} = [a, b, c] \in E_3$  jest równoległy do prostej  $l$  i  $a, b, c \in \mathbb{R}$  są niezerowe, to

$$l : \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} \quad (12)$$

jest równaniem kierunkowym prostej.

**Równanie krawędziowe prostej** Niech

$$\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

Jeśli  $\pi_1$  nie jest równoległa z  $\pi_2$ , to równanie krawędziowe prostej ma postać

$$l : \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (13)$$

**Uwaga.** Jeśli chcemy łatwo przejść z równania krawędziowego do parametrycznego, to wystarczy zauważyć, że  $n_1 = [A_1, B_1, C_1], n_2 = [A_2, B_2, C_2]$  są wektorami normalnymi płaszczyzn. Chcemy znaleźć więc wektor (kierunkowy), który leży na obu tych płaszczyznach, a więc jest prostopadły do obu wektorów normalnych. Tę własność ma wektor  $\mathbf{v} = n_1 \times n_2$ .

## §6.2 Odległości

Zdefiniowaliśmy już odległość między dwoma punktami w definicji 6.1. Bez formalnego wyprowadzenia będziemy używać pojęcia odległości również w kontekście odległości między punktem a płaszczyzną, punktem a prostą, prostą a płaszczyzną czy między płaszczyznami lub prostymi. Taka odległość będzie najmniejszą odległością między pewnym punktem jednej figury oraz pewnym punktem drugiej figury.

$$d(\Phi, \Psi) = \min_{A \in \Phi, B \in \Psi} d(A, B)$$

Z nierówności trójkąta (6.7) wynika, że wektor między tymi dwoma punktami będzie prostopadły do obu danych figur.

### Twierdzenie 6.17 (Odległość punktu od płaszczyzny)

Odległość punktu  $Q = (x_1, y_1, z_1)$  od płaszczyzny  $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$  jest równa

$$d(Q, \pi) = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

*Dowód.* Niech prosta  $l$  będzie prostopadła do płaszczyzny  $\pi$  oraz niech  $Q \in l$ . Taka prosta jest równoległa do wektora normalnego  $n = [A, B, C]$ , więc

$$l : \begin{cases} x = x_1 + At \\ y = y_1 + Bt \\ z = z_1 + Ct \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Niech  $Q' = \pi \cap l$  będzie punktem przecięcia prostej  $l$  i płaszczyzny  $\pi$ . Podstawiamy równanie prostej do równania płaszczyzny:

$$\begin{aligned} Q' \in l : A(x_1 + tA) + B(y_1 + tB) + C(z_1 + tC) + D &= 0 \\ Q' \in l : t &= \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{-(A^2 + B^2 + C^2)} \end{aligned}$$

Mamy więc

$$d(Q, Q') = \sqrt{(tA)^2 + (tB)^2 + (tC)^2} = |t| \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

□

Jeśli szukamy odległości między dwoma płaszczyznami, to wystarczy sprawdzić, czy są one równoległe (to znaczy, czy ich wektory normalne są równoległe). Jeśli nie, to odległość jest oczywiście zerowa; w przeciwnym wypadku wystarczy wziąć dowolny punkt z jednej płaszczyzny i znaleźć odległość między tym punktem a drugą płaszczyzną.

### Twierdzenie 6.18 (Odległość punktu od prostej)


Odległość punktu  $Q$  od prostej  $l$  jest równa

$$d(Q, l) = \frac{\|\mathbf{v} \times \overrightarrow{LQ}\|}{\|\mathbf{v}\|},$$

gdzie  $\mathbf{v}$  jest wektorem kierunkowym prostej  $l$ , a  $L \in l$ .

*Dowód.* Mamy  $l : (x, y, z) = L + t\mathbf{v}$ . Na podstawie twierdzenia 6.14, pole równoległoboku rozpiętego przez wektory  $\mathbf{v}, \overrightarrow{LQ}$  jest równe

$$\|\mathbf{v} \times \overrightarrow{LQ}\|.$$



Ze standardowego wzoru na pole równoległoboku jest ono również równe

$$\|\mathbf{v}\| \cdot d(Q, l),$$

z czego wynika teza. □

Jeśli dwie proste są równoległe, to odległość między nimi można obliczyć przez wzięcie dowolnego punktu z jednej prostej i obliczenie jego odległości od drugiej prostej. Jeśli proste się przecinają, to odległość między nimi jest zerowa. Sytuacja się komplikuje, jeśli dane dwie proste nie są równoległe lub przecinające się (to znaczy są **skośne**).

#### Twierdzenie 6.19 (Odległość prostych skośnych)

Niech  $l_1, l_2$  są prostymi skośnymi. Odległość między nimi jest równa

$$d(l_1, l_2) = \frac{|(\mathbf{v} \times \mathbf{u}) \circ \overrightarrow{L_1 L_2}|}{\|\mathbf{v} \times \mathbf{u}\|},$$

gdzie  $\mathbf{v}, \mathbf{u}$  są odpowiednio wektorami kierunkowym prostych  $l_1, l_2$ , a  $L_1 \in l_1$  i  $L_2 \in l_2$ .

*Dowód.* Mamy  $l_1 : (x, y, z) = L_1 + t\mathbf{v}$  oraz  $l_2 : (x, y, z) = L_2 + t\mathbf{u}$ . Na podstawie twierdzenia 6.15 objętość równoległościanu rozpiętego przez wektory  $\mathbf{v}, \mathbf{u}, \overrightarrow{L_1 L_2}$  jest równa

$$|(\mathbf{v} \times \mathbf{u}) \circ \overrightarrow{L_1 L_2}|.$$

Ze standardowego wzoru na objętość (tzn. pole podstawy  $\cdot$  wysokość) jest ona również równa

$$\|\mathbf{v} \times \mathbf{u}\| \cdot d(l_1, l_2),$$

z czego wynika teza. □

## §6.3 Przykłady

### Przykład 6.20 (Współliniowość punktów)

Sprawdź, czy punkty  $A = (1, 0, 2), B = (3, 1, -1), C = (-1, -1, 5)$  są współliniowe.

*Rozwiązanie.* Punkty  $A, B, C$  są współliniowe wtedy i tylko wtedy, gdy wektory  $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$  są współliniowe, czyli rozpinają równoległobok o zerowym polu. Na podstawie twierdzenia 6.14 wystarczy obliczyć

$$\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\| = \|[2, 1, -3] \times [-2, -1, 3]\| = \|[3 - 3, 6 - 6, -2 + 2]\| = 0,$$

z czego wynika, że punkty  $A, B, C$  są współliniowe.  $\square$

**Przykład 6.21** (Współpłaszczyznowość punktów)

Sprawdź, czy punkty  $A = (0, 2, 2), B = (2, 1, 0), C = (3, -1, 2), D = (1, -2, 3)$  są współpłaszczyznowe.

*Rozwiązanie.* Punkty  $A, B, C, D$  są współpłaszczyznowe wtedy i tylko wtedy, gdy wektory  $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$  rozpinają równoległoscian o zerowej objętości. Na podstawie twierdzenia 6.15 i faktu 6.16 wystarczy obliczyć

$$\begin{vmatrix} \overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{AD} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 3 & -3 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \end{vmatrix} = -6 + 24 - 6 + 3 = 15 \neq 0,$$

z czego wynika, że punkty  $A, B, C, D$  nie są współpłaszczyznowe.  $\square$

**Przykład 6.22** (Wzajemne położenie prostych, odległość)

Zbadaj wzajemne położenie prostych

$$l_1 : \begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 - 6t \\ z = 3 - 5t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}, \quad l_2 : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 4 + 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

oraz oblicz odległość między nimi.

*Rozwiązanie.* Zaczniemy od sprawdzenia, czy proste są równoległe. Weźmy wektory kierunkowe tych prostych i obliczmy ich iloczyn wektorowy. Mamy

$$[-3, -6, -5] \times [1, 2, 2] = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -3 & -6 & -5 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = [-12 + 10, -5 + 6, -6 + 6] = [-2, 1, 0] \neq \vec{0},$$

więc proste nie są równoległe. Odległość między nimi, zgodnie z twierdzeniem 6.19, jest równa

$$d(l_1, l_2) = \frac{|[-2, 1, 0] \circ [2 - 1, -1 - 2, 4 - 3]|}{\|[-2, 1, 0]\|} = \frac{|-2 - 3|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}.$$

Z tego wynika również, że proste są skośne; nie są przecinające się, bo  $d(l_1, l_2) \neq 0$ .  $\square$

**Przykład 6.23** (Wzajemne położenie prostych, wspólna płaszczyzna)

Zbadaj wzajemne położenie prostych

$$l_1 : \begin{cases} x = t \\ y = -2t \\ z = 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}, \quad l_2 : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + 4t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

oraz wyznacz ich wspólną płaszczyznę (jeśli istnieje).

*Rozwiązanie.* Obliczmy najpierw iloczyn wektory wektorów kierunkowych danych prostych.

$$[1, -2, 3] \times [1, -1, 4] = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ 1 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = [-8 + 3, 3 - 4, -1 + 2] = [-5, -1, 1]$$

Widzimy więc, że proste nie są równoległe. Zamiast liczyć odległość między nimi (i tak stwierdzić, czy się przecinają), możemy spróbować znaleźć punkt przecięcia.

$$\begin{cases} t = -1 + s \\ -2t = 2 - s \\ 3t = -3 + 4s \end{cases} \Rightarrow s = 0, t = -1.$$

Z tego wynika, że punkt przecięcia istnieje, jest nim  $P = (-1, 2, -3)$ , więc proste nie są skośne, a więc tworzą płaszczyznę.

Do tej płaszczyzny należą wektory kierunkowe prostych  $l_1, l_2$ , więc jej wektorem normalnym będzie ich iloczyn wektorowy. Podstawiając do równania normalnego płaszczyzny mamy

$$\begin{aligned} \pi : -5(x - (-1)) - 1(y - 2) + 1(z - (-3)) &= 0 \\ -5x - 5 - y + 2 + z + 3 &= 0 \\ -5x - y + z &= 0 \end{aligned}$$

co jest równaniem ogólnym płaszczyzny  $\pi$ . □

**Uwaga.** Jeśli chcemy znaleźć rzut prostokątny punktu  $P$  na prostą  $l$ , to najłatwiej będzie znaleźć płaszczyznę  $\pi$  zawierającą punkt  $P$  i prostopadłą do prostej  $l$  (wektor normalny szukanej płaszczyzny będzie wektorem kierunkowym prostej  $l$ ). Następnie wystarczy znaleźć punkt przecięcia  $\pi \cap l$ .

Podobnie, jeśli chcemy znaleźć rzut prostokątny punktu  $P$  na płaszczyznę  $\pi$ , to należy znaleźć prostą  $l$  taką, że  $l \perp \pi$  oraz  $P \in l$  (jak poprzednio, wektor kierunkowy szukanej prostej będzie wektorem normalnym płaszczyzny  $\pi$ ).

Zastosowanie powyższej uwagi niech będzie ćwiczeniem dla Czytelnika<sup>6</sup>.

## §7 Odwzorowania liniowe

**Definicja 7.1.** Odwzorowanie

$$f : V \rightarrow W,$$

gdzie  $V, W$  są przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem  $\mathbb{K}$  jest **liniowe**, jeśli

$$\forall_{u,v \in V} f(u + v) = f(u) + f(v)$$

oraz

$$\forall_{v \in V, \alpha \in \mathbb{K}} f(\alpha v) = \alpha f(v).$$

Podobnie jak w przypadku homomorfizmu grup (definicja 3.19), elementy przeciwne oraz neutralne są zachowywane. Analogicznie do równoważnej charakterystyki podprzestrzeni (fakt 3.29) warunki z powyższej definicji są równoważne warunkowi

$$\forall_{\alpha, \beta \in \mathbb{K}} \quad \forall_{u, v \in V} f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v). \quad (14)$$

<sup>6</sup>który z pewnością zauważył już, że wykorzystaliśmy ją w dowodzie twierdzenia 6.17

### Wniosek 7.2 (z równania 14)

Odwzorowanie liniowe  $f$  jest jednoznacznie określone przez wartości  $f$  na wektorach bazowych dziedziny.

*Dowód.* Wzór 14 można rozszerzyć do większej liczby składników używając  $(\alpha, \beta, \gamma, \dots)$  oraz  $(u, v, w, \dots)$ . Taka postać również będzie równoważna definicji 7.1. Możemy policzyć wartość  $f$  dla każdego wektora, znając jego współrzędne w pewnej bazie  $B$  oraz wartości  $f$  dla wszystkich wektorów z tej bazy.  $\square$

**Definicja 7.3.** Jądro odwzorowania liniowego  $f : V \rightarrow W$  to zbiór

$$\text{Ker } f = f^{-1}(\{\bar{0}\}) = \{v \in V \mid f(v) = \bar{0}\}.$$

**Definicja 7.4.** Obraz odwzorowania liniowego  $f : V \rightarrow W$  to zbiór

$$\text{Im } f = f(V) = \{w \in W \mid \exists v \in V : w = f(v)\}.$$

Jeśli  $B$  jest bazą przestrzeni  $V$ , to

$$\text{Im } f = \text{Lin } f(B).$$

**Fakt 7.5.** Dla każdego odwzorowania liniowego  $f : V \rightarrow W$ , jądro  $f$  jest podprzestrzenią  $V$ , a obraz  $f$  jest podprzestrzenią  $W$ .

Wymiar jądra pewnego odwzorowania  $f$  nazywamy **zerowością** i oznaczamy  $\text{null } f$ , a wymiar jego obrazu nazywamy **rzędem** i oznaczamy  $\text{rank } f$ .

### Przykład 7.6

Weźmy odwzorowanie  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  takie, że

$$f(x, y, z) = (x, y).$$

Znajdźmy jądro i obraz tego odwzorowania.

$$\text{Ker } f = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}, \quad \dim = 1.$$

$$\text{Im } f = \mathbb{R}^2, \quad \dim = 2.$$

Teraz weźmy  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  takie, że

$$g(x, y) = (x, y, x + y).$$

Znajdźmy jądro i obraz tego odwzorowania.

$$\text{Ker } g = \{\bar{0}\}, \quad \dim = 0.$$

$$\text{Im } g = \{(x, y, x + y) : x, y \in \mathbb{R}\}, \quad \dim = 2.$$



**Twierdzenie 7.7** (o rzędzie)

Jeśli  $V, W$  są skończone wymiarowymi przestrzeniami wektorowymi nad ciałem  $\mathbb{K}$  oraz  $f : V \rightarrow W$  jest odwzorowaniem liniowym, to

$$\text{null } f + \text{rank } f = \dim V,$$

$$\dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = \dim V.$$

*Dowód.* Niech  $n = \dim V$  oraz  $k = \dim \text{Ker } f$ . Skoro  $\text{Ker } f$  jest podprzestrzenią przestrzeni  $V$ , to jeśli  $n = k$ , to dla każdego  $\mathbf{v} \in V$  zachodzi  $f(\mathbf{v}) = \bar{0}$ , więc  $\text{Im } f = \{\bar{0}\}$ , ergo teza jest spełniona. Dalej założmy więc, że  $n > k$ . Istnieje taka baza przestrzeni  $V$ , która ma postać

$$\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \mathbf{u}_{k+1}, \dots, \mathbf{u}_n\},$$

gdzie  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$  jest bazą  $\text{Ker } f$ . Weźmy dowolny wektor  $\mathbf{v} \in V$ ,

$$\mathbf{v} = t_1 \mathbf{v}_1 + \dots + t_k \mathbf{v}_k + t_{k+1} \mathbf{u}_{k+1} + \dots + t_n \mathbf{u}_n.$$

Wtedy

$$\begin{aligned} \mathbf{w} = f(\mathbf{v}) &= f(t_1 \mathbf{v}_1 + \dots + t_k \mathbf{v}_k + t_{k+1} \mathbf{u}_{k+1} + \dots + t_n \mathbf{u}_n) \\ &= f(t_1 \mathbf{v}_1) + \dots + f(t_k \mathbf{v}_k) + f(t_{k+1} \mathbf{u}_{k+1}) + \dots + f(t_n \mathbf{u}_n) \\ &= t_1 f(\mathbf{v}_1) + \dots + t_k f(\mathbf{v}_k) + t_{k+1} f(\mathbf{u}_{k+1}) + \dots + t_n f(\mathbf{u}_n) \\ &= t_1(0) + \dots + t_k(0) + t_{k+1} f(\mathbf{u}_{k+1}) + \dots + t_n f(\mathbf{u}_n) \\ &= t_{k+1} f(\mathbf{u}_{k+1}) + \dots + t_n f(\mathbf{u}_n), \end{aligned}$$

więc

$$\text{Im } f = \text{Lin}\{f(\mathbf{u}_{k+1}), \dots, f(\mathbf{u}_n)\}.$$

Wystarczy już tylko udowodnić, że wektory  $f(\mathbf{u}_{k+1}), \dots, f(\mathbf{u}_n)$  są liniowo niezależne. Weźmy ciąg skalarów  $(s_i)$  taki, że

$$\begin{aligned} s_{k+1} f(\mathbf{u}_{k+1}) + \dots + s_n f(\mathbf{u}_n) &= \bar{0} \\ f(s_{k+1} \mathbf{u}_{k+1}) + \dots + f(s_n \mathbf{u}_n) &= \bar{0} \\ f(s_{k+1} \mathbf{u}_{k+1} + \dots + s_n \mathbf{u}_n) &= \bar{0}. \end{aligned}$$

Z tego wynika, że

$$(s_{k+1} \mathbf{u}_{k+1} + \dots + s_n \mathbf{u}_n) \in \text{Ker } f,$$

więc  $(s_{k+1} \mathbf{u}_{k+1} + \dots + s_n \mathbf{u}_n) \in V$  możemy zapisać jako kombinację liniową wektorów  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ . Zakładając, że ciąg  $(s_i)$  jest niezerowy, mamy dwa sposoby zapisu jednego wektora z  $V$ , co stoi w sprzeczności z twierdzeniem 3.34. Z tego wynika, że  $\forall i : s_i = 0$ , więc wektory  $f(\mathbf{u}_{k+1}), \dots, f(\mathbf{u}_n)$  są liniowo niezależne, ergo

$$\dim \text{Im } f = n - k$$

$$\text{rank } f = \dim V - \text{null } f.$$

□

**Definicja 7.8.** Przy danych przestrzeniach wektorowych  $V, W$  nad ciałem  $\mathbb{K}$ , odwzorowanie liniowe  $f : V \rightarrow W$  to:

- **monomorfizm**, jeśli jest injekcją,
- **epimorfizm**, jeśli jest surjekcją,
- **izomorfizm**, jeśli jest bijekcją,
- **endomorfizm**, jeśli  $V = W$ ,
- **automorfizm**, jeśli jest endomorfizmem i izomorfizmem,
- **forma liniowa**, jeśli  $W = \mathbb{K}$ .

### Twierdzenie 7.9

Odwzorowanie liniowe  $f : V \rightarrow W$  jest epimorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy  $\dim \operatorname{Im} f = \dim W$ .

*Dowód.*  $\operatorname{Im} f$  jest podprzestrzenią  $W$ , więc wynika z twierdzenia 3.42.  $\square$

### Twierdzenie 7.10

Odwzorowanie liniowe  $f : V \rightarrow W$  jest monomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy  $\operatorname{Ker} f = \{\bar{0}\}$ .

*Dowód.* Implikacja prawostronna jest trywialna, dlatego udowodnimy tylko lewostronną. Załóżmy przeciwnie, że istnieje takie  $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{v}_2$ , że

$$f(\mathbf{v}_1) = f(\mathbf{v}_2).$$

Wtedy

$$f(\mathbf{v}_1) - f(\mathbf{v}_2) = f(\mathbf{v}_2) - f(\mathbf{v}_1) = \bar{0}$$

$$f(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) = f(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) = \bar{0},$$

co, skoro  $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 \neq \bar{0}$ , przeczy założeniu  $\operatorname{Ker} f = \{\bar{0}\}$ .  $\square$

### Twierdzenie 7.11

Jeśli  $V, W$  są skończenie wymiarowymi przestrzeniami wektorowymi nad ciałem  $\mathbb{K}$ , to ich izomorficzność jest równoważna równości ich wymiarów

$$V \sim W \quad \Leftrightarrow \quad \dim V = \dim W.$$

*Dowód.* Wynika z wniosku 7.2.  $\square$

### Twierdzenie 7.12

Niech  $V, W$  będą pewnymi przestrzeniami nad ciałem  $\mathbb{K}$ , a  $\mathcal{L}(V, W)$  zbiorem wszystkich odwzorowań liniowych między nimi. Struktura  $(\mathcal{L}(V, W), \mathbb{K}, +, \cdot)$  jest przestrzenią wektorową.