

408. APHIS *Fabæ*.

Diagn. Larva nigra, glaberrima.

Habitat in *Vicia faba*; unde læsa fœcunditas, imo & sterilitas.

409. APHIS *Genistæ*.

Diagn. Nigra; alis puncto fusco.

Habitat in *Genista tinctoria*.

Larva nigra, cinereo quasi polline adspersa, quem decutit paritura.

410. APHIS *Urticæ*.

Diagn. Caput & thorax nigra, rostrum excolor, abdomen viride.

Habitat in *Urtica dioica*,

Larva atro-virens glabra nitens; lateribus abdominis superne tot punctis excavatis utrinque, quot sunt eius incisuræ.

Species alias prætermitto a Celeberr. LINNÆO jam adnotatas.

C H E R M E S.

LINN. *Syst. Nat.* p. 453.

411. CHERMES *Evonymi*.

Diagn. Niger; pedibus pallidis.

In *Evonymo vulgari*, cujus folia convolvit.

Larva nigra; seriebus quatuor pororum, umbilicorum abdominis (†); thorace subviridi. *Chermes* alis (4) depressis, antennis tenuissimis.

412. CHERMES *Cratægi*.

Diagn. Larva plumbeo-virens; plica abdominis longitudinali, media.

In convolutis & læsis foliis *Cratægi spinosi*.

Insectum non vidi,

413.

(†) Unde *Aphides* fluidum nectar, *Chermes* vero glutinosum & in lanam concrefcentem succum, plorant.

413. CHERMES *Senecionis*.

Diagn. Flavo-virens, antenn. articulo ultimo crassiore, duobusque pilis terminato.

In *Senecione* 3. *Fl. Carniol.*

Occiput maculis binis, fulvis. Thorax basi subtus spinulis duabus instructus. Oculi glauci. Alæ albidæ, deflexæ. Abdominis latera fusco-fasciata.

Larvam non vidi.

414. CHERMES *Pruni*.

Diagn. Abdomen rubrum: punctis fasciisque lateralibus fuscis.

In foliis *Pruni hortensis*, duo tresve simul.

Alæ anticæ fusco-ferrugineæ. Antennæ pilis duobus divaricatis terminatæ. Oculi fusci. Dorsum vix gibbum.

Larva mihi ignota.

415. CHERMES *Fraxini*.

Diagn. Habitatio ad basim novorum ramorum *Fraxini orni* (apud nos), *excelsioris* LINN. Nam *Ornus* apetala est, *Fraxinus* vero MICHEL, in quo Insecta nostra degunt, corollam gerit.

Larva infans nuda, pallida; oculis fuscis, adolescens capite fusco, sex ordinibus pororum abdominalium, adulta ovato corpore.

Chermes flavo-nigroque varius; alis ad apicem puncto fusco, alioque inferiore marginali. *Formicæ* has quoque visitant, & maxillas luna nivea inquinatas inde reportant.

416. CHERMES *Pyri*.

Diagn. *Mas* nigricans, *fæmina* abdomine fulvo.

In foliis *Pyri comm.*

Antennæ 5-nodiæ: ultimo articulo duabus setulis terminato.

417. CHERMES *Alni*.

Diagn. Antennæ 7-nodiæ. Corpus virescens. Alæ immaculatæ. *Larvam* tegit densa lana plumosis floccis longioribusque radiata.

Habitat in *Alno* de qua lege fufam III. LINN. descriptionem. Faun. Svec. 2. 1008.

THRIPS.