

Bulletin de la Société
d'histoire naturelle de
Colmar

Société d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar. Auteur du texte. Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar. 1879.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc.

[CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE](#)

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment possible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.



G. PH. SCHIMPER

Imp. Ch. Chardon ainc. Paris.

M+588
500033

BULLETIN
DE LA
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE
DE COLMAR

20^e ET 21^e ANNÉES

1879 et 1880

COLMAR

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE VEUVE CAMILLE DECKER

1880.

M^bm^a
36

CATALOGUE
DES
HÉMIPTÈRES-HOMOPTÈRES
(CICADINES et PSYLLIDES)
DE L'ALSACE ET DE LA LORRAINE

Supplément au Catalogue des Hémiptères-Hétéroptères

PAR

Ferd. REIBER et A. PUTON

Membres de la Société entomologique de France, de la
Société d'Histoire naturelle de Colmar, etc.

CATALOGUE
DES
HÉMIPTÈRES-HOMOPTÈRES
(CICADINES et PSYLLIDES)
DE
L'ALSACE ET DE LA LORRAINE.

Lorsque nous avons publié en 1876 le Catalogue des Hémip-tères-Hétéroptères de l'Alsace et de la Lorraine¹, nous avons annoncé qu'il serait suivi des Homoptères qui habitent la même région. C'est cette promesse que nous exécutons aujourd'hui.

Les Homoptères sont d'une étude plus difficile que les Hété-roptères ; cette difficulté provient non seulement de leur taille en général assez petite et de leurs caractères spécifiques souvent peu tranchés, mais surtout du manque de bons ouvrages descriptifs.

La traduction de l'ouvrage inédit de Fieber sur les Cicadines d'Europe² n'a pas été imprimée aussi rapidement que nous l'avions espéré : deux livraisons seulement ont paru, la troisième

¹ *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar, années 1875-76*, pages 51 à 88.

² *Les Cicadines d'Europe* par le Dr FIEBER, traduit de l'allemand par FERD. REIBER. — En vente à Strasbourg, chez M. Reiber, 8, faubourg de Saverne. — 1^{re} livr. de 129 pag. 4 fr. 35 c., contenant l'introduction, et la description de tous les genres, av. 4 pl. — 2^e livr. de 258 pag., contenant la description des espèces jusqu'à Issus, et 11 pl. de caractères génériques. 5 fr. 75 c.

est sous presse. Ces retards ne proviennent nullement de la faute du traducteur, puisque le manuscrit est traduit et livré depuis longtemps.

Les insectes qui font l'objet de ce travail vivent tous aux dépens des végétaux, auxquels ils causent quelquefois des dommages appréciables, quand ils se développent en trop grande abondance. Leur circonscription géographique, comme celle des Hétéroptères, est très-étendue et il est à présumer qu'on trouvera dans notre région presque toutes les espèces qui font partie de la faune de l'Europe centrale. Nous en énumérons aujourd'hui 302 espèces, mais ce nombre sera augmenté par les recherches que nos amis et nous, nous continuons avec ardeur. C'est ainsi que nous donnons déjà un Supplément de 24 espèces à notre liste des Hétéroptères qui se trouve ainsi portée à 518.

Plusieurs de nos Cicadines étaient encore inédites; nous avons obtenu de l'amitié de M. Lethierry, l'entomologiste qui connaît le mieux les Cicadines en France, la description de ces espèces et nous les insérons en notes telles qu'il nous les a transmises.

M. Bellevoye de son côté a continué à enrichir notre Catalogue de ses observations dans la région messine. Nous remercions cordialement nos deux collègues de leur amicale collaboration.

Nous remercions aussi les entomologistes de notre région, qui ont bien voulu, comme pour les Hétéroptères, nous communiquer le résultat de leurs recherches.

FERD. REIBER. Dr PUTON.

HÉMIPTÈRES - HOMOPTÈRES

DE L'ALSACE ET DE LA LORRAINE.

1^{re} Famille. CICADIDES.

Cicadetta. Am.

C. MONTANA. Scop. — Rare. Prise sur divers végétaux en Alsace (chêne, saule marceau, ronce) : Lièpvre, Saint-Pierre-sous-Bois (Fettig), Turckheim (Martin). Metz : vallées de Mance et de Montvaux (B). Nancy.

2^{me} Famille. FULGORIDES.

1^{re} Tribu. FULGORINI.

Myndus. Staol.

M. MUSIVUS. Germ. — Sur les saules. Assez commun, sur les bords du Rhin, de la Bruche et de la Moselle. 5-8.

Cixius. Latr.

C. PILOSUS. Ol. — Commun partout sur les arbres et les buissons, (avec les var. *infumatus* Fieb., et *albicinctus* Germ.).

C. NERVOSUS. L. — Comme le précédent.

C. INTERMEDIUS. Fieb. — Pris à la Vancelle (8, R). Metz, rare (B).

C. CUNICULARIUS. L. — Assez commun partout ; rare à Metz.

C. STIGMATICUS. Ger. — Remiremont, Nancy, assez rare.

Oliarus. Staol.

O. PALLIDUS. H.-S. — Bords du Rhin, à Strasbourg ; sur les saules, 5-8. Remiremont, Gérardmer, Metz, a. r.

O. LEPORINUS. Lin. — Metz, sur les saules ; a. c.

O. CUSPIDATUS. Fieb. — Val de Villé.

Dictyophora. Ger.

D. EUROPÆA. Lin. — Sur les plantes les plus diverses des clairières de la forêt d'Illkirch, près de Strasbourg. Se montre

vers fin juillet pour devenir souvent extraordinairement abondante en août et septembre. Rare dans les bois de la Blüth et de Vendenheim.

Ommatidictus. Spin.

- O. DISSIMILIS. Fall. — Sur les bruyères. Gerbamont (Pierrat), Gérardmer (Cuny).

Issus. Fabr.

- I. COLEOPTRATUS. Fab. — Commun partout sur les buissons, 6-8.

2^{me} Tribu. DELPHACINI.

Asiraca. Latr.

- A. CLAVICORNIS. Fab. — Metz, assez commun dans les lieux arides. M. Bellevoye l'a une fois prise en grand nombre sur le mont Saint-Blaise, au pied et sur le *Teucrium chamaedrys*, en compagnie du *Laccommetopus clavicornis*; n'existe pas à Remiremont, et semble très-rare en Alsace (Soulzbach).

Araeopus. Spin.

- A. CRASSICORNIS. Fab. — Metz; pré Saint-Symphorien. Un seul individu (B).

Megamelus. Fieb.

- M. NOTULA. Ger. — Lieux marécageux. Gérardmer, a. c. Metz; Vittoncourt.

Stenocranus. Fieb.

- S. LINEOLA. Ger. — Partout en Alsace, 5 à 9. Metz, a. c. Rare à Remiremont.

- S. FUSCOVITTATUS. Staol. — Plus rare que le précédent, à Remiremont, Metz, Walbourg. Assez commun sur les roseaux des bords du Rhin, de 4-10.

Kelisia. Fieb.

- K. PALLIDULA. Boh. — Remiremont; très-rare (P).

- K. PERSPICILLATA. Boh. — Gerbamont (Pierrat).

- K. GUTTULA. Ger. — Toute la région, 6-9, a. r.

- K. VITTIPENNIS. Sahlbg. — Metz, sur le Saint-Blaise, très-rare.

Delphacinus. Fieb.

D. MESOMELAS. Boh. — Remiremont, Soulzbach, r.

Chloriona. Fieb.

C. PRASINULA. — Sur les *Carex* des marécages rhénans, c., de 5 à 7; macroptère et brachyptère (R).

Euides. Fieb.

E. SPECIOSA. Boh. — Comme le précédent, 5-8.

Eurysa. Fieb.

E. LINEATA. Perris. — Alsace : Soulzbach, 6, macroptère et brachyptère. Metz, a. r.

Conomelus. Fieb.

C. LIMBATUS. Fab. — Remiremont, Longemer, tr. c. Metz, Vittoncourt; rare; en fauchant sur les joncs. La Vancelle, Vendenheim; macroptère et brachyptère, 7-9.

Delphax. Fab.

D. DISCOLOR. Boh. — Toute la région, souvent commun, 6-8.

D. PELLUCIDA. Fab. — Comme le précédent; c., 5-6, macropt. et brachyptère.

D. STRIATELLA. Fall. — Remiremont; rare; plus c. à Gérardmer. Metz: a. r. Strasbourg: Bords de la Bruche, 6.

D. ELEGANTULA. Boh. — Partout, souvent c., 5-8.

D. ALBOSTRIATA. Fieb. — Metz, r. Dans tous les bois autour de Strasbourg, souvent c., 5-7.

D. SORDIDULA. Staol. — Forêts de Walbourg et de Vendenheim. Remiremont. Metz, a. r., 7-9.

D. COLLINA. Boh. — Remiremont, Metz, a. c. Forêts de Walbourg, d'Illkirch; la Blüth, c.

D. OBSCURELLA. Boh. — Remiremont, r. Metz, c. Strasbourg: Bords du Rhin.

D. REYI. Fieb. — Metz: Magny, Jouy, Saulcy, r.

D. FORCIPATA. Boh. — Remiremont, r. Forêt de Walbourg; Soulzbach, Saint-Pierre-sous-Bois, 6-7.

D. LEPTOSOMA. Flor. — Remiremont, c. Tourbières de Vittoncourt, a. c. Forêts de Geudertheim et de Vendenheim; p. r. sur les herbes, dans les lieux très-ombragés.

- D. LEPIDA. Boh. — Metz, au Saulcy, r. (B).
D. QUADRIMACULATA. Sign. — Metz : Jouy, r. (B).
D. LUGUBRINA. Boh. — Metz, a. r. Strasbourg : Bords du Rhin.
Soulzbach, 4-6, r.
D. AUBEI. Perris. — Metz, r. Strasbourg : Forêts d'Illkirch et
du Rhin, 4-7.
D. EXIGUA. Boh. — Remiremont, Soulzbach, r. Forêt d'Illkirch.
Digues du Rhin, en avril, c., 4-7.
D. DENTICAUDA. Boh. — Bords du Rhin, 4-9.
D. SPINOSA. Fieb. — Remiremont, a. c. Bois de la Blüth.
D. LIMITATA. Fieb. — Remiremont, a. c.
D. FAIRMAIREI. Perris. — Remiremont, r. Metz, Vittoncourt,
a. c. Forêts de Vendenheim et de Walbourg, a. c. sur les
herbes ; 7-9.

Metropis. Fieb.

- M. MAYRI. Fieb. — Trois-Epis, Soulzbach, forêt de Walbourg.
6. 7.; exemplaires macropt. et brachyptères, a. r. (R). Metz,
un individu (B).

Dicranotropis. Fieb.

- D. FLAVIPES. Fieb. — Forêt d'Illkirch, 9. ♀.
D. DIVERGENS. Kb. — Comme le précédent ; exemplaires bra-
chyptères et macroptères, 3. 7.
D. HAMATA. Boh. — Remiremont, a. r. Metz, c. Forêt de Ven-
denheim. Bords du Rhin, p. r. 4-9.

Stiroma. Fieb.

- S. ALBOMARGINATA. Curt. — Remiremont, r. Metz, un exempl.
de la vallée de Montvaux. Forêt de Walbourg, p. r. sur les
herbes au bord des chemins, 5.
S. PTERIDIS. Géné. — Sur la grande fougère (*Pteris aquilina*).
Metz, rare ; 2 exempl. macropt. à Chambley. Bords du Rhin
et forêt d'Illkirch, 5. 9. Remiremont, c.
S. AFFINIS. Fieb. — Remiremont, Soulzbach, Saint-Pierre-sous-
Bois, Niedermunster, c. en 7. Jouy. 6. 7.

3^{me} Tribu. TETTIGOMETRINI.

Tettigometra. Latr.

- T. ATRA. Hagb. — Vallée de Mance , 2 ♀ en fauchant dans les herbes. Mont Saint-Blaise , 2 ♂ sous une pierre, avec le *Lasius niger* (B). (Ces deux derniers plus petits , seraient-ils d'une autre espèce ?).
- T. LEPIDA. Fieb. — Un individu avec *Tapinoma erraticum* (B).
- T. VIRESSENS. Pz. — Remiremont, Gerbamont, Grimont, bords du Rhin, r.
- T. IMPRESSOPUNCTATA. Sig. — Gerbamont (Pierrat) , Lamarche (Caulle), Metz, sur les conifères (a. r. B). Illkirch , bords de la Bruche, Vendenheim (R. 6-9).
- T. IMPRESSIFRONS. Mls. Rey. — Un exempl. de Soulzbach, 6, (R).
- T. MACROCEPHALA. Fieb. — Lamarche (Caulle). Sommets arides de Montvaux, r. (B).
- T. OBLIQUA. Pz. — Remiremont, a. r. Metz, tr. c. Très-répandue en Alsace , et souvent commune sur les végétaux les plus divers , 6-9.

3^{me} Famille. CERCOPIDES.

Triecphora. Am. S.

- T. VULNERATA. Ger. — Partout sur les buissons , tr. c. en été.

Lepyronia. Am. S.

- L. COLEOPTRATA. Lin. — Commune partout sur les herbes.

Aphrophora. Ger.

- A. CORTICEA. Ger. — Sur le pin sylvestre. Trois-Epis (R) , Gérardmer (Cuny).
- A. SALICIS. de G. — Commune partout sur les saules.
- A. ALNI. Fall. — Idem , aussi sur l'aulne.

Ptyelus. Lep. Serv. (*Philaenus Staol.*).

- P. LINEATUS. Lin. — Partout ; plus ou moins commun.
- P. MINOR. Kb. — Remiremont , prairies sèches. Metz , sur le Saint-Blaise, a. c.

- P. EXCLAMATIONIS. Thunb. — Remiremont ; surtout montagne, assez rare.
- P. ALBIPENNIS. Fab. — Sur le pré aride de la lisière méridionale de la forêt d'Illkirch, souvent a. c. surtout fin juillet (R).
- P. CAMPESTRIS. Fall. — Metz, tr. c. dans les prairies.
- P. SPUMARIUS. Lin. — Partout, tr. c. dans les prés, avec toutes les variétés du blanc au noir purs.

4^{me} Famille, MEMBRACIDES.

Centrotus. Fab.

C. CORNUTUS. L. — Commun partout sur les buissons.

Gargara. Am. S.

G. GENISTÆ. Fab. — Commun sur le genêt à balais.

5^{me} Famille. JASSIDES.

1^{re} Tribu. ULOPINI.

Ulopa. Fall.

U. RETICULATA. Fab. — Commun sur la bruyère.

U. TRIVIA. Ger. — Remiremont, tr. r. Metz, sur les coteaux, a. r. ♀, tr. r. ♂. Forêt d'Illkirch.

2^{me} Tribu. PAROPINI.

Megophthalmus. Curt.

M. SCANICUS. Fall. — Remiremont, Metz, a. c. Strasbourg : Dans les allées ombragées, herbeuses des forêts d'Illkirch, de Vendenheim, du Rhin. Soulzbach, 6-10.

3^{me} Tribu. LEDRINI.

Ledra Fab.

L. AURITA. Lin. — Sur les jeunes chênes, le lierre, les noisetiers, t. c. L'insecte parfait apparaît vers la fin de juin. Remiremont, Metz, Soulzbach, St-Pierre-s.-Bois, Vendenheim, a. r.

4^{me} Tribu. BYTHOSCOPINI.

Idiocerus. Lewis.

- I. SCURRA. Ger. — Sur les peupliers, c. En hiver sous les écorces, mais apparaissant à l'air libre aux premiers rayons de soleil.
- I. SALICICOLA. Flor. — Remiremont, un exempl. (P).
- I. NOTATUS Fab. — Sur le prunellier, Metz, Soulzbach, a. c. 6.
- I. ADUSTUS. H.-S. — Metz, t. r. Strasbourg : Bords du Rhin. 8. 9.
- I. SIMILIS. Kb. — Un exempl. de Remiremont et de Metz.
- I. VARIUS. Fab. — A Vendenheim sur le saule marceau , et en hiver sous les écorces, c.
- I. HEYDENI. Kb. — Un individu de Metz et de Walbourg, 7.
- I. POECILUS. H.-S. — Sur les saules rhénans, 3. 7.
- I. SIGNATUS. Fieb. — Un individu de Remiremont et de Metz.
- I. LITURATUS. Fall. — Remiremont , a. c. sur les trembles. Strasbourg : Forêts de Vendenheim , d'Illkirch , bords de la Bruche.
- I. TREMULAE. Esth. — Sainte-Marie-aux-Mines (reçu de feu Mühlenbeck, R).
- I. ELEGANS. Flor. — Remiremont , un exempl. Metz , tr. r. Soulzbach, Walbourg.
- I. LAMINATUS. Flor. — Remiremont , sur un saule pubescent des marais. Metz, sur les saules, c.
- I. AFFINIS. Fieb. — Remiremont , r.
- I. FASCIATUS. Fieb. — Metz, à Longeville, r.
- I. COGNATUS. Fieb. — Metz, à Jouy, sur de jeunes peupliers, a. r.
- I. USTULATUS. Mls. R. — Remiremont (pris, peut-être accidentellement, sur l'épicéa , en avril, P). Strasbourg , bords du Rhin, 6.
- I. CONFUSUS. Flor. — Gerbamont , Remiremont , Gérardmer. Metz, sur les peupliers, a. c.
- I. AURULENTUS. Kb. — Remiremont , en avril sur l'épicéa. Forêt de Vendenheim.
- I. POPULI. Lin. — Sur le tremble, le peuplier, le bouleau, souv. c.
- I. FULGIDUS. Fab. — Remiremont , sur le tremble. Metz , Soulzbach , bords du Rhin.

Macropsis. Lewis.

- M. MICROCEPHALA. H.-S. — Un individu du Hohneck, 2 individus du sommet de Saint-Blaise, un ex. d'Alsace.
- M. PRASINA. Fab. — Remiremont, Gerbamont, Metz, forêt de Geudertheim, r. Dans les herbes du communal de Soulzbach, a. r. en 6.
- M. LANIO. Lin. — Sur les chênes. Remiremont, route de la Schlucht, Soulzbach, La Vancelle, Metz. Souvent c.

Bythoscopus. Ger.

- B. ALNI. Schk. — Sur différents arbres. Schlucht, Remiremont, Soulzbach, Rothlach, Metz (sur l'aulne).
- B. FLAVICOLLIS. Lin. — Comme le précédent. Aussi des bords du Rhin.
- B. RUFUSCULUS. Fieb. — Gérardmer, rare. Remiremont sur le bouleau.
- B. CARPINI. Boh. — Metz, deux exempl. (B).

Pediopsis. Burm.

- P. TILIAE. Ger. — Esplanade de Metz, sur les tilleuls ; rare, peut-être à cause de la difficulté de secouer ces arbres (B).
- P. CEREA. Ger. — Remiremont, rare, sur les saules. Metz, a. r. dans les bois. Bords du Rhin et de la Bruche. Assez c. à Soulzbach, dans les haies.
- P. FUSCULA. Fieb. — Gérardmer.
- P. VIRESSENS. Fab. — Sur les saules. Metz, tr. c, Strasbourg : Bords du Rhin et de la Bruche, forêt de Vendenheim, c. 6-9. Soulzbach.
- P. MENDAX. Fieb. — Sur les saules. Metz, r. Bords du Rhin à Strasbourg.
- P. IMPURA. Boh. — Sur les saules à feuilles étroites (P).
- P. FUSCINERVIS. Boh. — Metz, un exempl. (B).
- P. NASSATA. Ger. — Sur les saules à feuilles étroites. Remiremont, c. Metz, a. c. Soulzbach, bords du Rhin et de la Bruche, 5-8. Jolies variétés lavées de brun.
- P. SCUTELLATA. Boh. — Remiremont, Soulzbach, r. sur les ronces. Metz, c. en battant les haies sur tous les coteaux.

P. NANA. H.-S. — Remiremont, un exempl. Strasbourg : Forêt d'Illkirch, 7-8.

Agallia. Curt.

- A. SINUATA. Mls. R. — Un individu de la Bresse (Vosges) B.
- A. PUNCTICEPS. Ger. — Remiremont, t. r. Metz, a. r. Soulzbach.
- A. RETICULATA. H.-S. — Remiremont, tr. r.
- A. VENOSA. Fall. — Commune partout dans les prés.

5^{me} Tribu. TETTIGONINI.

Tettigonia. Ol.

T. VIRIDIS. Lin. — Commun partout dans les prés humides et les marécages.

Euacanthus. Oliv.

- E. INTERRUPCUS. Lin. — Hautes-Vosges (sur le *Cacalia albifrons*), Vosges, forêt de Walbourg, Metz (dans les prés humides), c.
- E. ACUMINATUS. Fab. — Vosges, bois autour de Strasbourg. Metz, a. c.

Penthimia. Ger.

P. ATRA. Fab. — Vosges inférieures et collineuses. Forêts de Vendenheim et de Walbourg ; Metz, sur la myrtille et les jeunes chênes, 5-8, assez variable.

6^{me} Tribu. ACOCEPHALINI.

Errhomenus. Fieb.

E. BRACHYPTERUS. Fieb. — Tourbière du Belliard (Cuny) ; un exempl. de Remiremont (P).

Eupelix. Germ.

E. CUSPIDATA. Fab. — Forêts de Vendenheim et de Walbourg, pas r. par places dans les herbes, 5-6. Larves pas rares en septembre au pied des cerisiers à la lisière du bois de Vendenheim. Soulzbach, Remiremont. Metz, r. sous les pierres des coteaux secs, au printemps.

E. PRODUCTA. Ger. — Remiremont, Metz, Walbourg, r.

Strongylocephalus. Flor.

S. AGRESTIS. Fall. — Metz, r. prairies de Longeville. Nancy (var. grande et pâle).

Acocephalus. Ger.

- A. STRIATUS. Fab. — Commun partout.
A. BIFASCIATUS. Lin. — Hautes-Vosges et forêt d'Illkirch, 7, (R).
A. INTERRUPTUS. Scott. — Remiremont, tr. r. Metz : Montvaux ♂, plusieurs ♀ au Saint-Blaise ; r. Alsace : Hohkœnigsbourg.
A. SERRATULÆ. Fab. (*albifrons* Scott). — Remiremont, Gérardmer, Nancy, Hautes-Vosges, val de Villé, Strasbourg : Promenade Lenôtre. Metz : Fossés des fortifications, Jouy, Montvaux, au bord des ruisseaux, en écartant les herbes, c.
A. ALBIFRONS. Lin. (*polystolus* Scott). — Metz, fossés des fortifications ♀ a. c., ♂ un peu plus rare. Forêts d'Illkirch et de Walbourg, St-Pierre-s.-Bois, Promenade Lenôtre (à terre).
A. PELAS. Leth. ¹ — Metz, un seul individu (B).

¹ **Acocephalus pelas.** (Fieber, inédit).

Long : 4 millimètres.

♂ Obtus, oblong. Vertex angulairement arrondi en avant, avec le bord antérieur un peu relevé; aussi long dans son milieu que le Pronotum; testacé, sans taches bien distinctes, ainsi que le front et le Pronotum: celui-ci est couvert de petites rugosités transversales très-fines, mais non pas de stries. Ecusson testacé, avec deux taches brunes de chaque côté de la base, peu indiquées. Homélytres testacées, avec les nervures brunâtres seulement vers l'extrémité, et une fascie noire, en croissant, au sommet; l'extrémité hyaline: l'espace compris entre les nervures, surtout sur la partie discoïdale, est couvert de stries transversales plus fortes que chez les *A. histrionicus* Fabr., et *rivularis* Germ. Abdomen testacé, noirâtre au milieu en-dessus et en-dessous. Pieds testacés, avec les tarses brunâtres, et la partie interne des tibias postérieurs noire.

Cette espèce me paraît distincte des *A. histrionicus* et *rivularis* non-seulement par la couleur, mais surtout par les rugosités des homélytres plus fortes et plus distinctement transversales, et par le bord antérieur du vertex qui est relevé au lieu d'être déclive comme chez les ♂ de ces deux espèces.

♀ inconnue.

Metz (Bellevoye). La Nouvelle (Aude) !

A. RIVULARIS. Ger. — Schlucht, Gérardmer, r. Metz, au pied des herbes des prairies, ♀ c., ♂ r.

7^{me} Tribu. JASSINI.

Gnathodus. Fieb.

G. PUNCTATUS. Thunb. — Assez commun partout sur les buissons. Varie du vert pâle au rougeâtre pâle.

Cicadula. Zett.

C. CYANE. Boh. — Un seul exemplaire de Basse-Montigny près Metz, sur le *potamogeton* (B).

C. SEXNOTATA. Fall. — Com. partout dans les herbes humides. Dans les prés salés de Remilly et les tourbières de Vittoncourt on trouve des ex. très-foncés; (rencontrés aussi en grand nombre avec le type en octobre, sur les graminées à demi-séchées des alluvions de la Bruche, près de Strasbourg), 6-10.

C. PUNCTIFRONS. Fall. — Sur les saules. Metz, Remiremont. Strasbourg : Bords du Rhin et de la Bruche, p. r.

C. VARIATA. Fall. — Metz, sur des houblons isolés dans les saussaies de Jouy, a. r. (B).

C. SEPTEMNOTATA. Fall. — Metz : Longeville, vallée de Mance, rare (B).

C. WARONI. Leth. (Soc. Hist. nat. Moselle, 1879). — Un ex. des tourbières de Vittoncourt (B).

C. DIMINUTA. Leth. — Un ex. de la forêt de Vendenheim (R).

Grypotes. Fieb.

G. PINETELLUS. Boh. — Sur les pins sylvestres. Remiremont, Gerbamont, Metz : Saint-Blaise, a. r.

Doratura. J. Sahlbg.

D. STYLATA. Boh. — Sur les graminées dans les bois. Remiremont. Metz : Saint-Blaise. Forêts de Walbourg, d'Illkirch, de Vendenheim, bords de la Bruche, souvent c. 6-9.

Graphoerærus. Thoms.

G. VENTRALIS. Fall. — Prés arides des terrains calcaires, souvent p. r. Rouffach, Soulzmatt, forêt d'Illkirch, sommet du Saint-Blaise à Metz, 5-6.

Thamnotettix. Zett.

- T. FENESTRATA. H.-S. — Remiremont, Lamarche, forêt d'Illkirch, r.
- T. STRIGIPES. Zett. — Strasbourg, Gérardmer.
- T. TENUIS. Ger. — Remiremont, Trois-Epis, La Vancelle, forêts de Vendenheim et d'Illkirch, bords de la Bruche, 6-9. Metz, sur les pins au Saint-Blaise.
- T. CORONIFERA. Marshal. — Remiremont, Gerbamont, Soulzbach, La Vancelle, forêt de Vendenheim, r. 6-8.
- T. CROCEA. H.-S. — Dans les bois. Metz, Strasbourg : forêts d'Illkirch et du Rhin, Montagne-Verte, la Blüth, 5-9, a. c.
- T. ATTENUATA. Ger. — Remiremont, Metz. Strasbourg : Bois d'Illkirch et de Vendenheim, r.
- T. SPLENDIDULA. F. — Metz, r. Un ex. du Val de Villé.
- T. TORNEELLA. Zett. — Metz, Soulzbach, r. Remiremont, r.
- T. ABIETINA. Fall. — Remiremont, c. sur les sapins (P). Metz : Saint-Blaise, sur les conifères, a. r.
- T. PICTA Leth. ¹ — Gérardmer, un exempl. sur l'épicéa.
- T. CRUENTATA. Pz. — Lamarche (Caulle), Soulzbach (R).

*** Thamnotettix picta.** (Fieber, inédit).

Long : 5 à 6 millimètres.

Oblongue, variée de noir et de brun en-dessus. Vertex arrondi en avant, formant au milieu un angle obtus très-peu sensible ; pas plus long en ce milieu que près des yeux ; de moitié moins long que le Pronotum. Front et vertex de couleur variable, quelquefois entièrement pâles avec une rangée de petits traits transversaux bruns de chaque côté du front ; quelquefois le vertex taché de brun, plus fortement en avant, et le front entièrement noir, avec les joues et le clypeus pâles. Pronotum pâle ou taché de noir. Ecusson pâle avec deux taches de chaque côté de la base, et quelquefois une bande longitudinale médiane, noires. Homélytres à fortes nervures, blanches en grande partie ; les cellules quelquefois noires ou d'un ferrugineux foncé, quelquefois pâles mélangées de blanc, mais dans ce cas gardant toujours au moins des taches noires caractéristiques, trois ou quatre allongées le long de la suture, occupant tout l'espace compris entre les nervures voisines, et une autre arrondie, médiane, de chaque côté, à égale distance de la suture et du bord latéral. Membrane blanche, presque entièrement noire sur les

- T. PREYSSLERI Fieb. — Gérardmer (Cuny), Walbourg (R).
T. QUADRINOTATA. Fab. — Remiremont, Retournemer, Metz,
sur les saules, c. Strasbourg : Forêt de Vendenheim, bords
du Rhin et de la Bruche, p. r. 6-9.
T. INTERMEDIA. Boh. — Un ex. du Hohkœnigsbourg (R. 8).
T. SULPHURELLA. Zett. — Remiremont, Gérardmer, Metz, a. c.
dans les marais.

Athysanus. Burm.

- A. STACTOGALUS. Am. — Sur le *Tamarix germanica* des gra-
vières du Rhin, c. 8-10.
A. HEYDENI. Leth. — Avec le précédent, tr. r.
A. ARGENTATUS. Fab. — Forêt de Walbourg. Bords de la Bruche,
sur les saules, c. 6-7.
A. INTERSTITIALIS. Ger. — Metz, prairies de Longeville, quel-
quefois en grand nombre. Forêt d'Illkirch. Bords de la
Bruche, sur les saules, tr. c. 6-7.
A. STRIATULUS. Fall. — Gérardmer (P).
A. OCELLARIS Leth. ¹ — Un exemplaire de Metz (B).

cellules apicales. Dessous du corps de couleur variable, quelquefois entière-
ment noir, quelquefois jaune mélangé de noir. Pieds plus ou moins jaunes
ou noirs ; les tibias postérieurs ayant toujours au moins leur tranche interne
noire. ♀ ♂. — Le ♂ est généralement plus noir. Cette espèce offre
quelque analogie avec la *T. abietina*, Fallen : elle est d'une taille un peu
plus faible : les taches noires le long de la suture, les nervures beaucoup
plus saillantes, et surtout la forme du vertex, plus court, plus arrondi et
presque nullement prolongé en angle en avant, l'en distinguent très-
nettement.

Lyon (Fieber), Gérardmer (Puton), La Comballaz (Suisse-Puton) sur
l'épicéa.

¹ **Athysanus ocellaris** (Fieber, inédit).

Long : 4 $\frac{1}{2}$ millimètres.

Oblong, pâle avec des taches ocellées ; l'abdomen noir en-dessus, pâle sur
les bords et à l'extrémité, jaune en-dessous avec la base noire, la poitrine noire.
Vertex pâle, moucheté de quelques petits traits obscurs transversaux plus ou
moins indécis disparaissant quelquefois ; prolongé en angle obtus en avant,
d'un tiers plus long au milieu que près des yeux, atteignant en ce milieu

- A. STRIOLA. Fall. — Remiremont, tr. r. Gérardmer, moins r. Metz: au Saulcy, fossés des fortifications, a. c. Strasbourg: Bords de la Bruche.
- A. OBSCURELLUS. Kb. — Remiremont, Metz, Strasbourg, a. c.
- ? A. GRISESCENS. Zett. — Un ex. des bords de la Bruche (R).
- A. COGNATUS. (Fieb.) Dgl. Sc. — Metz, deux ex. (B).
- A. SUBFUSCULUS. Fall. — Partout dans les bois, c.
- A. ERYTHROSTICTUS. Leth.¹ — Remiremont, Soulzbach, La Vancelle, Vendenheim, Metz, c. sur les jeunes chênes.

les deux tiers de la longueur du Pronotum. Front pâle avec une rangée de petits traits transversaux noirs de chaque côté. Pronotum pâle moucheté de gris. Homélytres pâles, à nervures pâles; les cellules sont pâles, quelquefois hyalines, et entourées dans presque tout leur contour d'une fine bordure obscure ou noire, et forment une série de taches ocellées très-allongées dans les parties antérieures de l'Homélytre, mais se rétrécissant peu à peu et devenant régulièrement ovales vers l'extrémité. Membrane hyaline, à nervures effacées, son bord interne empiétant assez fortement sur celui du côté opposé. Pattes pâles, avec des tubercules qui donnent naissance aux épines des tibias, noirs. ♂ ♀.

Par ses taches ocellées, cette espèce ressemble un peu à l'*A. orichalceus*. Thomson; mais elle est plus pâle, et la forme du vertex est toute différente, beaucoup plus angulaire en avant.

Metz (Bellevoye). — Autriche (Hoffmann). — Embrun (Hautes-Alpes) !

¹ **Athysanus erythrostictus.** (Fieber, inédit).

Long : 6 $\frac{1}{2}$ millimètres.

Oblong, entièrement d'un pâle grisâtre ou rougeâtre. Vertex prolongé en angle très-obtus en avant, d'un tiers plus long dans son milieu que près des yeux, n'atteignant en ce milieu que la moitié de la longueur du Pronotum. Le vertex, le front, le Pronotum et plus rarement l'abdomen, sont parsemés de petites mouchetures d'un rose vif; mais le plus souvent ces mouchetures disparaissent ou se fondent dans la teinte générale pâle de ces organes; le vertex et le front les gardent le plus souvent, et ont presque toujours une teinte rosée plus marquée que le reste du corps. Homélytres plus longues que l'abdomen, quelquefois entièrement pâles, sans taches; quelquefois pâles avec trois taches obscures le long de la suture, à la jonction des nervures; la dernière de ces taches, celle qui est située le plus près de la membrane, est la plus persistante: de plus, on voit souvent quelques points obscurs sur

- A. PLEBEJUS. Zett. — Commun partout.
- A. LÆVIS. Leth.¹ — Forêt de Vendenheim, 9. c. sur les graminées des digues du Rhin, 4.
- A. RUSSEOLUS. Fall. — Sur les bruyères. La Vancelle, Krüth, Gérardmer.
- A. ÆMULANS. Kb. — Marais de Jouy, r. (B).
- A SORDIDUS. Zett. — Schlucht, Gérardmer. Metz : Marais de Jouy, Montigny, fortifications, a. r. Bords de la Bruche, à Strasbourg.

la partie antérieure de chaque homélytre, à peu près à égale distance de la suture et du bord latéral : ces points et ces taches existent plus fréquemment chez les exemplaires à teinte grise, et disparaissent au contraire chez ceux dont les mouchetures roses sont mieux indiquées. Membrane quelquefois enfumée au sommet. ♂ ♀.

Cette espèce ressemble à l'*A. tinctus*. Zetterst : elle en diffère par le vertex moins long, un peu moins anguleux en avant, et la teinte pâle de l'abdomen.

Elle ressemble aussi beaucoup aux variétés pâles de l'*A. subfuscus*. Fallen ; on la distingue facilement de ce dernier par sa taille plus grande, et par l'absence de la petite bande noire angulée qui existe toujours sur la partie antérieure du vertex du *subfuscus*.

Commun en France, dans les allées ombragées des bois, depuis le commencement jusqu'à la fin de l'été, souvent en compagnie de l'*A. subfuscus*.

¹ **Athysanus lœvis.** (Fieber, inédit).

Long : 4 à 4 $\frac{1}{2}$ millimètres.

Ovale, d'une teinte ferrugineuse pâle, sans taches. Vertex sans taches, prolongé en angle très-obtus en avant, d'un tiers plus long dans son milieu que près des yeux, presque aussi long en ce milieu que le Pronotum, qui est relativement court. Front pâle, avec une série de petits traits transversaux ferrugineux de chaque côté. Pronotum, écusson et homélytres d'un ferrugineux pâle, sans taches : Pronotum garni de très-fines strioles transversales. Homélytres pas plus longues que l'abdomen, luisantes, à nervures fines, concordes. Dos de l'abdomen noir avec les bords de l'extrémité pâles : dessous pâle, avec le ventre noirâtre à la base. ♂. — ♀ inconnue. Il a la forme des *A. plebejus*. Zetterst, et *sordidus*. Zetterst : mais il est encore plus court, le vertex, le Pronotum, l'écusson et les Homélytres sont absolument dépourvus de taches : le Pronotum est beaucoup plus court que celui de l'*A. plebejus*.

Alsace (Reiber). — Batna (Algérie) !

- A. VARIEGATUS. Kb. — Remiremont, r. Metz : Fossés des fortifications, a. c. Soulzbach, La Vancelle, Bois de la Blüth et d'Illkirch, bords de la Bruche, souvent c.
- A. OBSOLETUS. Kb. — Remiremont, a. c. Metz : Tourbières de Vittoncourt, a. c. Strasbourg : Marais derrière l'orangerie, 10.
- Var. SEXPUNCTATUS. J. Sahlbg. — Tourbières de Gérardmer.
- A. LURIDUS. Fieb. — Un seul ex. de Remiremont, cet exemplaire diffère du type par la présence de deux gros points noirs sur le Pronotum.
- A. PRASINUS. Fall. — Remiremont. Metz, a. c. sur les saules.
- A. SIMPLEX. H.-S. — Trois-Epis, Soulzbach, forêts de Vendenheim et de Walbourg, p. r. 5-8.
- A. BREVIPENNIS. Kb. — Remiremont, Gerbamont, rare. Metz : Fossés des fortifications, vallée de Montvaux, a. r. Trois-Epis, Rouffach. Strasbourg : Bords du Rhin, la Blüth, c. 5. Forêt de Walbourg, 5-6.
- A. PELLUCIDUS. Lethierry¹. — Remiremont, un ex. (P).

Goniagnathus. Fieb.

- G. BREVIS. H.-S. — Remiremont, Hohkœnigsbourg, Heiligenstein, r. Metz : Sommet du Saint-Blaise, a. c. mais fugace au soleil. Sa pruinosité est difficile à conserver.

¹ **Athysanus pellucidus.** (Fieber, inédit).

Long : 4 1/2 à 5 millimètres.

Ovale, très-pâle, d'une teinte grise tirant sur le blanc. Vertex sans taches, prolongé en angle bien marqué en avant, de moitié au moins plus long au milieu qu'à la hauteur des yeux ; aussi long dans ce milieu que le Pronotum. Front pâle, orné d'une ligne sublatérale noire qui prend naissance au-dessous et en-dedans des yeux pour former un angle en-dessous de la jonction du front avec le vertex. Le Pronotum est une fois plus large qu'il n'est long dans son milieu, fortement arrondi en avant, empiétant sur le vertex et venant y atteindre au milieu le niveau du bord antérieur des yeux : il est couvert de petites strioles transversales bien visibles : il est d'un gris pâle ou blanc sale, sans taches, ainsi que l'écusson et les Homélytres. Celles-ci sont aussi longues que l'abdomen, à nervures saillantes, leurs intervalles couverts, dans la partie antérieure de la région suturale seulement, de points granuleux, lisses et transparents sur le reste de la surface. Appendice mem-

Jassus. Fab. (*Allygus*. Fieb.).

- J. ATOMARIUS. Ger. — Remiremont, a. r. Metz, a. c.
J. COMMUTATUS. Fieb. — Remiremont, Niedermünster, Vendenheim, r.
J. MIXTUS. Fab. — Remiremont, r. Metz, a. c. Bois de Vendenheim et de Geudertheim, p. r. 7.
J. ABBREVIATUS. Leth. (Soc. hist. nat. Moselle, 1879). — Metz : Mont-Saint-Quentin, 2 ex. 6. 1865 (B).

Platymetopius. Burm.

- P. GUTTATUS. Fieb. = *Argostagum*. Amyot. — Un ex. sur le Mont Saint-Blaise, au-dessus du moulin d'Auchay. (B).
P. UNDATUS. de G. — Gerbamont, Lamarche, prairies humides. Sur des chênes isolés à mi-côte du Saint-Blaise. Sur les bouleaux isolés des clairières de la forêt d'Illkirch.

Deltoccephalus. Burm.

- D. PUNCTUM. Flor. — Prairies sèches, Remiremont, a. r. Soulzbach, 6-8.
D. THIARATUS. Fieb. — Un exemplaire de Gérardmer.
D. SOCIALIS. Flor. — Remiremont, r. Metz, a. c. Strasbourg : Bois de Vendenheim et d'Illkirch.
D. OCELLARIS. Fall. — C. Partout dans les herbes.
D. BOHEMANNI. Zett. var. *calceolatus*. Boh. — Quelques exempl. de Metz (B).
D. BELLEVOYEI. Put. 1877. — Metz : Sommet du Saint-Blaise, a. c. avec le *D. Mayri* (B).

braneux peu développé, son bord interne n'empiétant que très-peu sur celui du côté opposé. Dos de l'abdomen pâle, avec trois bandes noires longitudinales bien marquées, diminuant de largeur à mesure qu'elles approchent de l'extrémité, et disparaissant sur l'avant-dernier segment. Poitrine, ventre et pieds pâles, la partie interne des tibias postérieurs avec une ligne longitudinale noire. ♂ ♀.

Jolie espèce, qui ne ressemble à aucune autre du genre.

Remiremont (Puton). — Mont-Noir près Bailleul (Nord), sur la frontière belge, en fauchant sur des bruyères mêlées de *Sarothamnus scoparius*.

- D. MAYRI. Fieb. — Strasbourg : Bords du Rhin. C. dans la grande clairière d'Illkirch , 6-9. Metz : a. c. au sommet du Saint-Blaise.
- D. REPLETUS. Fieb. — Remiremont, r.
- D. DISTINGUENDUS. Flor. — Vosges. Forêt de Vendenheim. Metz, a. c. sur le Mont Saint-Quentin, 6-10.
- D. PARALLELUS. Fieb. — Forêt de Vendenheim, 7-9.
- D. FLORI. Fieb. — Remiremont, c. Metz , c. au bord des bois des coteaux. Forêt de Walbourg.
- D. FALLENII. Fieb. — Remiremont , Vendenheim , bords de la Bruche, r. 6-9.
- D. PULICARIS. Fall. — Remiremont , prairies sèches et élevées. Metz, r. Alsace : Hohkœnigsbourg, La Vancelle, Heiligenstein , bords de la Bruche , forêt de Geudertheim , sur les bruyères, souvent c. 6-9.
- D. RHOMBIFER. Fieb. — Forêt d'Illkirch, 7.
- D. STRIATUS. Lin. — C. partout, 5-10.
- D. BREVICEPS. Kb. — Remiremont.
- D. LINNEI. Fieb. — Remiremont , 1 ex. Alsace : Hohkœnigsbourg, forêt de Vendenheim, bords de la Bruche, souvent c. 8-10.
- D. LANGUIDUS. Flor. — Soulzbach (R. 6).
- D. ABDOMINALIS. Fab. — Pâturages des Hautes-Vosges , rare. Assez c. sur le communal de Soulzbach , 6.
- D. COLLINUS. Dahlb. — Metz : C. dans les prairies de Longeville, Saint-Symphorien. Strasbourg : Forêt d'Illkirch et bords de la Bruche, p. r. 6. 7.
- D. CEPHALOTES. H.-S. — Remiremont, Metz, c. Forêt d'Illkirch.
- D. PASCUELLUS. Fall. — Bords de la Bruche, 6. (R).
- D. STRIIFRONS. Kb. = *Mulsanti*. Fieb. — Strasbourg : Prairies humides derrière l'orangerie, marécages rhénans, a. c. 7-10.
- D. MINKI. Fieb. — Metz , quelques exemplaires. Strasbourg : Bords du Rhin et de la Bruche, forêt de Vendenheim, 6-10.
- D. METRIUS. Flor. — Metz, pré Saint-Symphorien , a. r. (B).

8^{me} Tribu. TYPHLOCYBINI.

Alebra. Fieb.

A. ALBOSTRIELLA. Fall. — Remiremont, c. sur divers arbres et arbustes. Metz, sur les tilleuls de l'Esplanade, et sur l'aubépine, a. c. Rothlach.

Notus. Fieb.

N. MANDERSTJERNI. Kb. — Remiremont, Gérardmer, r. Lischbach, c. en septembre.

N. AUREOLUS. Fall. — Remiremont, Gérardmer, rare. Metz : Saint-Blaise, dans les herbes fines, les mousses, assez c. Alsace : C. sur les genévriers du communal de Soulzbach, et sur les bruyères de Krüth, 6-8.

N. AGNATUS. Leth. — Remiremont, un ex. Metz : St-Blaise, r. Strasbourg : Forêts d'Illkirch et du Rhin, 5.

N. FLAVIPENNIS. Fab. — Remiremont, r. Metz : Sur les joncs, a. c. Strasbourg : Sur les plantes des marais derrière l'orangerie, et du Rhin, c. 5-10 surtout.

N. MOLLICULUS. Boh. — Remiremont. Bords du Rhin. Forêts d'Illkirch et de Vendenheim, 7-9, c.

N. FACIALIS. Flor. — Remiremont, Metz : Montvaux, assez r. Strasbourg : Au Jardin botanique, c. sur *Phlomis russeliana*. Bords du Rhin. Forêt d'Illkirch, 5-7.

? N. CITRINELLUS. Zett. — Un exempl. contre un tilleul de la promenade Lenôtre, à Strasbourg, 6.

N. SCHMIDTI. (Fieb.) Leth. — Gérardmer, un exempl. Forbach, 2 ex. Niedermünster, Geudertheim; c. sur les *carex* des prés arides des bords du Rhin, 5-9.

Chlorita. Fieb.

C. APICALIS. Flor. — Remiremont. Metz, r.

C. FLAVESCENS. Fab. — C. partout. Metz : Saint-Blaise, sur les pins. Bords du Rhin, sur les saules.

- C. AURANTIACA. Leth. ¹ — Un ex. de Remiremont. (P).
C. SOLANI. Kollar. — Remiremont, Metz, dans les jardins potagers. Bords du Rhin, forêts de Vendenheim, de Geudertheim, 6-9.
C. VIRIDULA. Fall. — Remiremont, Hohkœnigsbourg. Metz : bords de la Moselle et des ruisseaux, sur diverses plantes, c. Forêt d'Illkirch, bords du Rhin, 7-9.

Kybos. Fieb.

- K. SMARAGDULUS. Fall. — Sur les saules. Remiremont, Metz, val de Villé, bords du Rhin et de la Bruche, c. 6-9.

Eupteryx. Curt.

- E. VITTATA. Lin. — Remiremont, bords du Rhin, r. Metz : Tr. c. dans les endroits des prairies où il y a le plus de renoncules. (B).
E. DIMINUTA. Kb. — Toute la région, a. c. 6-9.
E. SIGNATIPENNIS. Boh. — Un ex. du Hohneck. (B).
E. GERMARI. Zett. — Sur les pins. Remiremont, Soulzbach, Metz : Saint- Blaise, a. r.
E. FILICUM. Newp. — Remiremont, Remilly, r.
E. CONCINNA. Ger. — Remiremont. Metz : Grimont, Jouy, sur les chênes, les coudriers, a. c. (B).
E. PULCHELLA. Fall. — Remiremont, Metz, forêts de Walbourg et de Geudertheim, r. 7.

*** Chlorita aurantiaca.** (Fieber, inédit).

Long : 4 millimètres.

Allongée. Tête, Pronotum et écusson de couleur orangée; corps et homélytres d'un jaune citron, pieds d'un jaune pâle. Vertex arrondi en avant, seulement un peu plus long dans son milieu que près des yeux, ayant en longueur un peu plus de la moitié de celle du Pronotum. Ecurosson de couleur orangée, comme la tête et le Pronotum, mais orné dans son milieu d'une bande longitudinale irrégulière et assez large, blanche. Homélytres d'un jaune citron, luisantes, à nervures concolores, un peu divergentes à l'extrémité. ♂ ♀.

Voisine des *C. solani*. Kollar, et *flavescens*. Fabr.

Lyon (Mulsant et Rey). — Remiremont (Puton). — Bar-s-Seine (Cartereau).

- E. ORNATA. Leth. — Gérardmer (Cuny), rochers des Spitzeköpf.
E. BINOTATA. Leth. — Un individu à Remilly. (B).
E. LELIEVREI. Leth. — 2 exempl. des bords du lac de Retournemer. (B).
E. CARPINI. Fourcr. — C. partout, sur les *Teucrium*, et autres plantes.
E. AURATA. Lin. — Remiremont, rare. Metz, Alsace, tr. c. sur diverses plantes (la pomme de terre entre autres).
E. URTICÆ. Fab. — Sur l'ortie. Partout c.
E. CURTISI. Flor. — Remiremont, sur le *Teucrium*, Metz, Walbourg, r.
E. COLLINA. Flor. — Strasbourg : Jardin botanique, sur *Phlomis russeliana*, 7. c.
E. MELISSÆ. Curt. — Metz, sur les lavandes, a. c. (B).

Typhlocyba. Ger.

- T. JUCUNDA. H.-S. — Remiremont, r. Metz : Sur les aulnes bordant le ruisseau de Vallières, r.
T. SEXPUNCTATA. Fall. — Remiremont, La Vancelle, r. Metz, sur les saules à Saint-Blaise, Magny, Voippy, a. r.
T. NITIDULA. Fab. — Remiremont. (P).
T. ROSÆ. Lin. — Remiremont, sur le poirier, l'orme, etc. Metz, tr. c. sur l'orme et les haies. Strasbourg, sur le marronnier, etc. Partout.
T. SULPHURELLA. Zett. — Strasbourg, avec la précédente, r.
T. GEOMETRICA Schk. — Remiremont, r. Metz : 2 exempl. des arbres bordant le ruisseau de Vallières.
T. ULMI. Lin. — Remiremont, r. Metz : Tr. c. sur les ormes et tous les arbres des remparts.
T. QUERCUS. Fab. — Remiremont, r. Un exempl. au vol sur l'Esplanade de Metz.
T. TENERIMA. H.-S. — Remiremt, r. Metz, sur les remparts, a. r.
T. NORQUETI. Leth. — Grimont, un ex. au milieu d'un grand nombre de *Typhlocyba Rosæ*. M. Bellevoye a repris à Chambley un ex. dont le pronotum et le milieu de la tête sont noirs, tandis que le type a ces deux parties d'un jaune pâle.

Zygina. Fieb.

- Z. ALNETI. Dahlb. — Remiremont. (P).
Z. HYPERICI. H.-S. — Sur le millepertuis. Remiremont, Metz : Saint-Blaise, Grimont, a. c. Soulzbach, bords du Rhin, 6-9.
Z. FRAUENFELDI. Leth. ¹ — Un ex. de Remiremont. (P).
Z. SCUTELLARIS. H.-S. — Un ex. de Soulzbach. (R).
Z. PARVULA. Boh. — Remiremont, a. c. Metz, en battant les haies, les rosiers sauvages, c. Soulzbach. Strasbourg : Bois d'Illkirch, du Rhin, de la Blüth, 4-6.
Z. BLANDULA. Rossi. — Remiremont, c. Metz, sur les chênes, t. c.
Z. TILIÆ. Fall. — Metz, avec le précédent, a. c. (B).
Z. RUBROVITTATA. Leth. — Remiremont, sur la *Calluna vulgaris*, en avril.

¹ Zygaña Frauenfeldi. (Fieber, inédit).

Long : 2 à 3 millimètres.

Allongée, pâle, maculée de rouge vif. Vertex pâle, avec une bande longitudinale médiane d'un rouge vif, arrondi en avant, plus long dans son milieu que près des yeux, d'un tiers moins long que le Pronotum. Pronotum pâle, orné dans son milieu d'une large bande longitudinale rouge régulière, entière. Homélytres d'un jaune pâle, ornées de chaque côté sur le clavus d'une bande longitudinale rouge, plus large à la base, diminuant graduellement de largeur et se terminant en pointe à l'extrémité du clavus. Cette bande est régulière, ni dentée ni échancrée, et ne touche en aucun point la suture, laissant un espace pâle assez large tout le long de cette suture. Dos de l'abdomen pâle, quelquefois avec des bandes transversales brunes. Front pâle : dessous de l'abdomen pâle, obscur à la base : pieds pâles. ♂ ♀.

Très-voisine de la *Z. rubrovittata*. Leth., dont elle diffère surtout par la forme régulière de la bande rouge des homélytres, non contiguë à la suture.

Allemagne (Fieber). — Remiremont (Puton). — Paraît très-rare.

PSYLLIDES

DE L'ALSACE ET DE LA LORRAINE.

Livia. Latr.

L. JUNCORUM. Latr. — C. sur les joncs et les conifères. — Une forme plus petite (spec. ?) des bords du lac de Gérardmer. (P).

Livilla. Curt.

L. ULICIS. Curt. — Gerbamont (Pierrat).

Psylla. Geoff.

P. GENISTÆ. Latr. = SPARTII. Hart. — C. sur le genêt à balais.

P. SPARTII. Guérin nec Hart. = SPARTIOPHILA. Fst. — Idem.

P. FÆRSTERI. Flor. — C. sur l'aulne.

P. ALNI. Lin. — Idem.

P. BUXI. Fst. — Metz : Jardin botanique, Guénétrange près Thionville, sur le buis. (B).

P. COSTATOPUNCATA. Fst. = FERRUGINEA. Fst. — Sur l'aubépine, c.

P. PYRISUGA. Fst. — Sur le poirier

P. PYRICOLA. Fst. — Remiremont, c. sur le poirier, en juin.

P. SIMULANS. Fst. — Sur le poirier, c.

P. SALICICOLA. Fst. — Remiremont, sur les saules pubescents. Metz.

P. STENOLABIS. Löw. — Remiremont, c. sur les saules pubescents, 5-6.

P. PRUNI. Scop. = FUMIPENNIS. Fst. — Sur le *Prunus spinosa* à Remiremont ; souvent aussi sur les sapins, mais sans doute accidentellement.

P. HARTIGII. Flor. = SYLVICOLA. Leth. — Remiremont, sur le bouleau, juin. (P).

- P. PINETI. Flor.— Remiremt, sur le *Salix purpurea*, en avril, r.
- P. COSTALIS. Flor. — Remiremont, sur les conifères, r. en avril.
- P. CRATÆGI. Fst. = PITYOPHILA. Flor. = OXYACANTHÆ. M. D.— Sur l'aubépine et les conifères, c. en avril.
- P. PEREGRINA. Fst. = CRATÆGICOLA. Flor. nec Fab. — Sur l'aubépine, Nancy. (P).
- P. MALI. Fst. — Remiremont, sur le pommier; Metz.
Var. RUBIDA. M.-D. — Idem.
- P. BREVIANTENNATA. Fl. — Remiremont, sur les conifères, en avril.
- P. FRAXINICOLA. Fst. — Remiremont, sur le frêne, en juillet.
- P. FRAXINI. de G. — Remiremont, sur le frêne, 6. Metz, sur le frêne et le lilas, a. c.
- P. AFFINIS. Löw. nov. sp. — Remiremt, sur les conifères, r. (P).

Diaphorina. Löw.

- D. PUTONI. Löw. — Un exempl. de Remiremont. (P).

Trioza. Forst.

- T. RHAMNI. Schr. = ABIETICOLA. Fst. — Remiremont, sur les conifères, r. Metz, sur un *Rhamnus*, dans un jardin à Lessy.
- T. NIGRICORNIS. Fst. — Un exempl. de Remiremont. (P).
- T. ALBIVENTRIS. Fst. — Remiremont, Metz, (sur le saule. B.).
- T. URTICÆ. L. — Sur l'ortie, c.
- T. STRIOLA. Flor. — Remiremont (*Salix capræa*, r.).
- T. GALII. Frst. — Metz.
- T. FLAVIPENNIS. Fst. — Lac de Lispach (sur *Prenanthes purpurea*) (P).
- T. PROXIMA. Flor. — Remiremont (*juniperus*, r. P).
- T. REMOTA. Fst. = CINNABARINA. Fst. = HAEMATODES. Fst. = DRYOBIA. Flor. — Remiremont, conifères, 4.

Rhinocola. Fst.

- R. ERICÆ. Curt. — Remiremont, sur la bruyère.
- R. ACERIS. Lin. — Sur les saules.

Aphalara. Fst.

- A. PICTA. Zett. = FLAVIPENNIS. Fst. = SONCHI. Fst. = ALPIGENA. M.-D. — Prairies des montagnes (P). Metz, r. (B).
- A. EXILIS. Web. et Mohr. — A Remiremont, sur l'épicea, en avril. c. (accidentel ?). Metz, sur les saules.
- A. CALTHÆ. Lin. = POLYGONI. Fst. — A Remiremont, comme la précédente. Metz : Bords de la Moselle, marais, c.