

POSOLOGIA

VANDETANIB s'administra per **via oral**. La dosi recomanada és segons prescribió mèdica.

COM s'ha d'ADMINISTRAR Vandetanib?

- La medicació es pot prendre en dejú o després dels menjars.
- Els comprimits s'han d'empassar sencers amb un got d'aigua, sense mastegar, ni desfer a la boca, ni dissoldre.
- Mantingui sempre el mateix horari.

QUÈ fer si...?

- Si s'ha oblidat de prendre una dosi i no han passat més de 12 hores prengui-la el més aviat possible. Si han passat més de 12 hores esperi la següent presa i no dobli mai la dosi.
- Si vomita, no repetir la dosi
- En cas de dubte comenti-ho amb el seu metge o farmacèutic.

Quan NO s'ha d'administrar Vandetanib?

- Si vostè és al·lèrgic a Vandetanib, així com a qualsevol dels components del comprimit com el manitol.
- Si té una anomalia cardíaca congenita anomenada “síndrome de QT congenit”
- Si està embarassada o en període de lactància.

PRECAUCIONS

- Si té alteracions cardíques
- Adopti 1 mesura anticonceptiva si vostè o la seva parella pot quedar-se embarassada i mantingui-les fins 3 mesos després de finalitzar el tractament.
- Protegeixi's del sol amb vestuari adequat i crema amb filtre solar.

INTERACCIONS

Pregunti al seu metge o farmacèutic abans de prendre un medicament, vitamina o planta medicinal, especialment si pren:

- Medicaments que puguin provocar alteracions cardíques (alteracions QT): Amiodarona, haloperidol, citalopram.
- Antibiotics: claritromicina, eritromicina, moxifloxacino, rifampicina, telitromicina
- Antifúngics: fluconazol
- Antiepilèptics: Carbamazepina, fenitoina, fenobarbital
- Herba de St Joan

EFFECTES ADVERSOS

Els efectes adversos més freqüents que no significa que apareguin a tots els pacients són:

- Cardiovasculars: hipertensió, allargament de l'interval QT, risc de sagnats
- Gastrointestinals: Dolor abdominal, diarrees, disminució o pèrdua de la gana
- Dermatològiques: Rash cutani, pell seca
- Infeccions
- Altres: fatiga, mal de cap, insomni

Comenti amb el seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes o qualsevol altre que cregui que pot estar relacionat amb la medicació.

Avisi ràpidament al seu metge si té:

- Una reacció al·lèrgica greu (envermelliment de la pell, dificultats al respirar ...).
- Signes d'infecció com tos, calfreds, febre > 38 °C, dificultats per orinar.
- En cas de sobredosi.

CONSERVACIÓ

Mantingui el medicament en el seu envàs original a temperatura ambient (<30°C) i protegits de la llum i de la humitat.

CADUCITAT

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

ADVERTENCIES

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de Farmàcia de l'Hospital, amb la recepta que li farà el seu metge d'aquest Centre.

Retorni la medicació sobrant a la Farmàcia de l'Hospital.

Depositi les restes del medicament o d'embalatge en el punt SIGRE de la farmàcia més propera o a la Farmàcia de l'Hospital.

Les dones embarassades hauran de tenir especial cura en evitar el contacte amb el contingut de les injeccions.

RECOMANACIONS AL PACIENT

DIES	Nº COMPRIMIITS	Freqüència
	100 MG	

Notes:

Aquest tríptic NO conté tota la informació d'aquest medicament i només pretén ser un resum per ajudar al pacient amb el seu tractament.

Si té qualsevol dubte o necessita més informació contacti amb el seu metge o farmacèutic

COM CONTACTAR

Telèfon Farmàcia

Horari

LOGO HOSPITAL



INFORMACIÓ DE MEDICAMENTS

VANDETANIB
CAPRELSA®

Nom del pacient:

Data: