

4.3 PEMBROLIZUMAB (Keytruda®)

- Anticuerpo monoclonal, humanizado, que se une al receptor PD-1 e impide su unión con PDL-1 y PDL-2.
- Melanoma metastásico, melanoma adyuvante, CPNM localmente avanzado o metastásico en adultos cuyos tumores expresen PD-L1 $\geq 2^a$ L, CPNM metastásico con expresión PD-L1 $\geq 50\%$ 1^a L, CPNM no esca-moso metastásico 1^a L en combinación con QT+Peme, CECC, Ca Uro-telial, L Hodgkin clásico rec/ref.

-2 mg/kg c/3 semanas

-200 mg c/3 semanas



- Vials 50mg pols o 100mg/4mL [25mg/mL]
- Nevera
- 2 mg/kg c/21d | 200mg c/21d
- Preparación SF (SG5%) [1-10] → SF100
- Estab prep: 24h Nev
- Adm IV en 30'
- Filtro 0,2 micras

FÁRMACO	DOSIS	DILUCIÓN	ESTAB	FILTRO	TIEMPO ADM
IPILIMUMAB	3 MG/KG C/3S	SF100ML	24h NEV	NYLON	90'
NIVOLUMAB	3 MG/KG C/2S 240MG C/2S 480MG C/4S	SF50 ML	24h NEV	PES	30-60'
PEMBROLIZUMAB	2 MG/KG C/3S 2MG/KG C/3S	SF100 ML	24h NEV	NYLON	30'