

## Tratamiento farmacológico de alteración de tiroides

Para conocer el tratamiento de la tiroides:

Gridelli, Journal of Endocrinology and Diabetes 2016, ChampiatAnnOncol 2016, Friedman, JAMA Oncol 2016, Weber JCO 2012, Kumar Front Pharmacol 2017, Linardou Ann Translat Medicine 2016, Bristol-Myers REMS 2012, Haanen, Ann Oncol. 2017; Thompson. J Natl ComprCancNetw.2018; Brahmer.J ClinOncol.2018 )

|                                   | Levotiroxina         | Beta Bloqueantes  | Tireostáticos (Metimazol) | Corticoides   | Manejo   |
|-----------------------------------|----------------------|---|---------------------------|---|--|
| <b>Tiroiditis eutiroidea</b>      | No                   | No  | No                        | No  | TSH, T3, T4, antiTPO, anti TG basal<br>TSH antes de cada ciclo   |
| <b>Hipotiroidismo subclínico</b>  | <b>Si TSH &gt;10</b> | <b>No</b>   | <b>No</b>                 | <b>No</b>   | <b>TSH, T3, T4, antiTPO, anti-TG basal</b><br><b>TSH, T3, T4 antes de cada ciclo</b>   |
| <b>Hipotiroidismo primario</b>    | Sí                   | No  | No                        | No  | TSH, T3, T4, antiTPO, anti-TG basal<br>TSH, T3, T4 antes de cada ciclo   |
| <b>Hipotiroidismo secundario</b>  | Sí                   | No  | No                        | En caso de síntomas por efecto masa de la hipófisis o insuficiencia adrenal | TSH, T3, T4, antiTPO, anti TG, niveles cortisol en orina de 24 horas, PRL, LH, FSH, ACTH basal<br>cortisol, T3, T4 antes de cada ciclo y otras si procede      |
| <b>Hipertiroidismo subclínico</b> | No                   | Si síntomas leves   | No                        | No  | TSH, T3, T4, antiTPO, anti-TG, TSABs basal<br>TSH, T3, T4 antes de cada ciclo<br>Evitar sal iodada, fármacos, enjuagues y pastas de dientes que contengan yodo |
| <b>Hipertiroidismo clínico</b>    | No                   | En la primera fase, hasta que se obtiene el efecto tireostático del tratamiento | Sí                        | En hipertiroidismo grado 3-4 o en formas graves de oftalmopatía de Graves   | TSH, T3, T4, antiTPO, anti-TG, TSABs basal<br>TSH, T3, T4 antes de cada ciclo<br>Evitar sal iodada, fármacos, enjuagues y pastas de dientes que contengan yodo |