

4.2 NIVOLUMAB (Opdivo®)

- Anticuerpo monoclonal, humanizado, que se une al receptor PD-1 e impide su unión con PDL-1 y PDL-2.
- El receptor PD-1 es un regulador negativo de la actividad de los linfocitos T, implicado en el control de la respuesta inmunitaria de los linfocitos-T.
- Nivolumab potencia las respuestas de los linfocitos-T incluyendo respuestas antitumorales.
- CPNP, Melanoma, Ca Renal, L Hodgkin clásico, CECC, Ca Urotelial.
- 240 mg c/2 semanas
- 480 mg c/4 semanas



- Vials 240mg, 100mg o 40mg [10mg/mL]
- Nevera
- 3 mg/kg c/14d | 240mg c/14d | 480mg c/28d
- Preparación SF (SG5%) [1-10] o sin diluir → SF50
- Estab prep: 24h Nev
- Adm IV en 30'-60' según dosis
- Filtro 0,2 micras PES

FÁRMACO	DOSIS	DILUCIÓN	ESTAB	FILTRO	TIEMPO ADM
IPILIMUMAB	3 MG/KG C/3S	SF100ML	24h NEV	NYLON	90'
NIVOLUMAB	3 MG/KG C/2S 240MG C/2S 480MG C/4S	SF50 ML	24h NEV	PES	30-60'