

Лабораторная работа № 5

Модель эпидемии (SIR)

Демидова Екатерина Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Математическая модель	7
3.2	Реализация модели в xcos	7
3.3	Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos	11
3.4	Реализация модели в OpenModelica	15
4	Задание для самостоятельного выполнения	18
4.1	Модель SIR с учетом демографии	18
4.2	Реализация модели в xcos	19
4.3	Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos	21
4.4	Реализация модели в OpenModelica	25
4.5	Анализ графиков при разных параметрах модели	26
5	Выводы	32

Список иллюстраций

3.1	Задать переменные окружения в xcos	8
3.2	Модель SIR в xcos	8
3.3	Задать начальные значение в блоке интегрирования для S	9
3.4	Задать начальные значение в блоке интегрирования для I	10
3.5	Задать конечное время интегрирования в xcos	10
3.6	График решения модели SIR при $\beta = 1, \nu = 0.3$	11
3.7	Модель SIR в xcos с применением блока Modelica	12
3.8	Ввод значений входных параметров блока Modelica для модели .	13
3.9	Ввод функции блока Modelica для модели	14
3.10	График решения модели SIR при $\beta = 1, \nu = 0.3$. Блок Modelica . .	15
3.11	Модель в OpenModelica	16
3.12	Параметры моделирования в OpenModelica	16
3.13	График решения модели SIR при $\beta = 1, \nu = 0.3$. OpenModelica . .	17
4.1	Задать переменные окружения в xcos	19
4.2	Модель SIR с учетом демографии в xcos	20
4.3	График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1,$ $\nu = 0.3, \mu = 0.1$	21
4.4	Модель SIR с учетом демографии в xcos с применением блока Modelica	22
4.5	Ввод значений входных параметров блока Modelica для модели .	23
4.6	Ввод функции блока Modelica для модели	24
4.7	График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1,$ $\nu = 0.3, \mu = 0.1$. Блок Modelica	25
4.8	Модель SIR с учетом демографии в OpenModelica	26
4.9	График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1,$ $\nu = 0.3, \mu = 0.1$. OpenModelica	27
4.10	График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1,$ $\nu = 0.3, \mu = 0.3$. OpenModelica	27
4.11	График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1,$ $\nu = 0.3, \mu = 0.7$. OpenModelica	28
4.12	График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1.5,$ $\nu = 0.3, \mu = 0.1$. OpenModelica	28
4.13	График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 2,$ $\nu = 0.3, \mu = 0.1$. OpenModelica	29
4.14	График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 10,$ $\nu = 0.3, \mu = 0.1$. OpenModelica	29

4.15	График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1$, $\nu = 0.5, \mu = 0.1$. OpenModelica	30
4.16	График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1$, $\nu = 0.8, \mu = 0.1$. OpenModelica	30
4.17	График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1$, $\nu = 0.9, \mu = 0.1$. OpenModelica	31

1 Цель работы

Исследование модели эпидемии (SIR) с помощью xcos и OpenModelica.

2 Задание

- Реализовать классическую модель SIR с помощью xcos(в том числе с помощью блока Modelica) и OpenModelica.
- Реализовать модель SIR с учетом демографических признаков с помощью xcos(в том числе с помощью блока Modelica) и OpenModelica.
- Исследовать модель SIR с учетом демографических признаков, изменяя параметры.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Математическая модель

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\frac{\beta IS}{N}, \\ \frac{dI}{dt} = \frac{\beta IS}{N} - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I, \end{cases}$$

где S – численность восприимчивой популяции, I – численность инфицированных, R – численность удаленной популяции (в результате смерти или выздоровления), и N – это сумма этих трёх, а β и γ – это коэффициенты заболеваемости и выздоровления соответственно

3.2 Реализация модели в xcos

Зафиксируем начальные параметры в меню *Моделирование, Задать переменные окружения*, а затем построим модель при помощи блоков моделирования (рис. [3.1], [3.2]).




Рис. 3.1: Задать переменные окружения в xcos




Рис. 3.2: Модель SIR в xcos

Для реализации модели потребовались следующие блоки xcos: - CLOCK_c – запуск часов модельного времени; - CSCOPE – регистрирующее устройство для построения графика; - TEXT_f – задаёт текст примечаний; - MUX – мультиплексер, позволяющий в данном случае вывести на графике сразу несколько кривых; - INTEGRAL_m – блок интегрирования; - GAINBLK_f – в данном случае позволяет

задать значения коэффициентов β и ν ; - SUMMATION – блок суммирования; - PROD_f – поэлементное произведение двух векторов на входе блока.

Первое уравнение модели задано верхним блоком интегрирования, блоком произведения и блоком задания коэффициента β . Блок произведения соединён с выходами верхнего и среднего блоков интегрирования и блоком коэффициента β , что реализует математическую конструкцию $\beta s(t)i(t)$. Третье уравнение модели задано нижним блоком интегрирования и блоком задания коэффициента ν . Для реализации математической конструкции $\nu i(t)$ соединяем выход среднего блока интегрирования и вход блока задания коэффициента ν , а результат передаём на вход нижнего блока интегрирования.

Средний блок интегрирования и блок суммирования определяют второе уравнение модели, которое по сути является суммой правых частей первого и третьего уравнений. Для реализации соединяем входы верхнего и нижнего блоков интегрирования с входами блока суммирования, меняя при этом в его параметрах оба знака на минус. Выход блока суммирования соединяем с входом среднего блока интегрирования

Зафиксируем начальные значения(рис. [3.3], [3.4]).




Рис. 3.3: Задать начальные значение в блоке интегрирования для S




Рис. 3.4: Задать начальное значение в блоке интегрирования для I

Также зададим время интегрирования равное 30(рис. [3.5]).




Рис. 3.5: Задать конечное время интегрирования в xcso

Решение модели SIR выглядит следующим образом(рис. [3.6]).




Рис. 3.6: График решения модели SIR при $\beta = 1, \nu = 0.3$

3.3 Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

Для реализации модели с помощью языка Modelica помимо блоков CLOCK_c, CSCOPe, TEXT_f и MUX требуются блоки CONST_m – задаёт константу; MBLOCK(Modelica generic) – блок реализации кода на языке Modelica(рис. [3.7]).




Рис. 3.7: Модель SIR в xcos с применением блока Modelica

Задаём значения переменных β и ν . Параметры блока Modelica переменные на входе (“beta”, “nu”) и выходе (“s”, “i”, “r”) блока заданы как внешние (“E”). Затем прописываем дифференциальное уравнение (рис. [3.8], [3.9]).




Рис. 3.8: Ввод значений входных параметров блока Modelica для модели




Рис. 3.9: Ввод функции блока Modelica для модели

В результате получим аналогичное предыдущему решение(рис. [3.10]).




Рис. 3.10: График решения модели SIR при $\beta = 1, \nu = 0.3$. Блок Modelica

3.4 Реализация модели в OpenModelica

Реализуем модель в OpenModelica. Для этого создадим файл модели, пропишем там параметры и начальные условия, а также дифференциальное уравнение (рис. [3.11]).




Рис. 3.11: Модель в OpenModelica

Затем укажем параметры моделирования, время также поставим равным 30(рис. [3.12]).




Рис. 3.12: Параметры моделирования в OpenModelica

В результате получим график аналогичный графикам в xcos(рис. [3.13]).




Рис. 3.13: График решения модели SIR при $\beta = 1, \nu = 0.3$. OpenModelica

4 Задание для самостоятельного выполнения

4.1 Модель SIR с учетом демографии

В дополнение к предположениям, которые были сделаны для модели SIR, предположим, что учитываются демографические процессы, в частности, что смертность в популяции полностью уравнивает рождаемость, а все рожденные индивидуумы появляются на свет абсолютно здоровыми. Тогда получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta IS + \mu(N - S), \\ \frac{dI}{dt} = \beta IS - \gamma I - \mu I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I - \mu R, \end{cases}$$

где μ – константа, которая равна коэффициенту смертности и рождаемости. Требуется:

- реализовать модель SIR с учётом процесса рождения гибели особей в `xcos` (в том числе и с использованием блока `Modelica`), а также в `OpenModelica`;
- построить графики эпидемического порога при различных значениях параметров модели (в частности изменяя параметр μ);
- сделать анализ полученных графиков в зависимости от выбранных значений параметров модели

4.2 Реализация модели в xcoss

Для реализации этой модели добавим в переменные окружения μ . Блоки необходимы такие же (рис. [4.1], [4.2]).




Рис. 4.1: Задать переменные окружения в xcoss




Рис. 4.2: Модель SIR с учетом демографии в xcos

Первое уравнение модели задано верхним блоком интегрирования, блоком произведения, блоком задания коэффициента $-\beta$ и сумматором. Блок произведения соединён с выходами верхнего и среднего блоков интегрирования и блоком коэффициента $-\beta$, что реализует математическую конструкцию $-\beta s(t)i(t)$, которая передается в блок суммирования. Ниже заданы математические конструкции μi и μr , которые со знаком плюс передаются в сумматор перед первым блоком интегрирования.

Третье уравнение модели задано нижним блоком интегрирования и блоком задания коэффициента ν . Для реализации математической конструкции $\nu i(t)$ соединяем выход среднего блока интегрирования и вход блока задания коэффициента ν . Перед блоком интегрирования размещаем сумматор, в которой передаем математические конструкции μr со знаком минус и $\nu i(t)$. Результат суммирования передаём на вход нижнего блока интегрирования.

Средний блок интегрирования и блок суммирования определяют второе уравнение модели, которое по сути является суммой правых частей первого и третьего уравнений со знаком минус. Для реализации соединяем входы верхнего и нижнего блоков интегрирования с входами блока суммирования, меняя при этом

в его параметрах оба знака на минус. Выход блока суммирования соединяем с входом среднего блока интегрирования

В результате получим график решения(рис. [4.3]).




Рис. 4.3: График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1, \nu = 0.3, \mu = 0.1$

4.3 Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

Для реализации с помощью блока Modelica добавим блок параметра μ (рис. [4.4]).




Рис. 4.4: Модель SIR с учетом демографии в xcos с применением блока Modelica

Также изменим данные блока Modelica, добавив информацию о третьем параметре и изменив дифференциальное уравнение(рис. [4.5], [4.6]).




Рис. 4.5: Ввод значений входных параметров блока Modelica для модели




Рис. 4.6: Ввод функции блока Modelica для модели

В результате получим график решения(рис. [4.7]).





Рис. 4.7: График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1$, $\nu = 0.3$, $\mu = 0.1$. Блок Modelica

4.4 Реализация модели в OpenModelica

Изменим данные программы в OpenModelica, добавив информацию о третьем параметре и изменив дифференциальное уравнение(рис. [4.8]).

The image shows a screenshot of the OpenModelica IDE. The main window displays the code for a model named 'sir'. The code is as follows:

```
1 model sir
2
3 parameter Real N = 1;
4 parameter Real b = 1;
5 parameter Real g = 0.3;
6 parameter Real m = 0.1;
7
8 Real S(start = 0.999);
9 Real I(start = 0.001);
10 Real R(start = 0);
11
12 equation
13
14 der(S) = -b*S*I/N + m*(N - S);
15 der(I) = b*S*I/N - g*I - m*I;
16 der(R) = g*I - m*R;
17
18 end sir;
```

The interface includes a menu bar with options like 'Доступный на запись', 'Model', 'Вид Текст', and 'sir'. The file path in the title bar is '/home/openmodelica/sir.mo'.

Рис. 4.8: Модель SIR с учетом демографии в OpenModelica

4.5 Анализ графиков при разных параметрах модели

Проанализируем графики, изменяя значения параметров, по-очереди фиксируя два из них.

Можно увидеть, что чем больше значение любого параметра, тем быстрее система приходит в стационарное состояние(рис. [4.11] - [4.17]).

Когда параметр μ достигает значения 0.7(рис. [4.11]) на графике остаются неизменными траектории всех переменных. Это можно объяснить тем, что рождается и умирает столько же здоровых, сколько заражается($\beta - \nu = 1 - 0.3 = 0.7$).




Рис. 4.9: График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1, \nu = 0.3$, $\mu = 0.1$. OpenModelica




Рис. 4.10: График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1, \nu = 0.3$, $\mu = 0.3$. OpenModelica




Рис. 4.11: График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1$, $\nu = 0.3$, $\mu = 0.7$. OpenModelica

При увеличении параметра β на графиках отражается, что количество людей с иммунитетом возрастает до максимума всё раньше(рис. [4.14]).




Рис. 4.12: График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1.5$, $\nu = 0.3$, $\mu = 0.1$. OpenModelica




Рис. 4.13: График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 2, \nu = 0.3, \mu = 0.1$. OpenModelica




Рис. 4.14: График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 10, \nu = 0.3, \mu = 0.1$. OpenModelica

Когда сумма коэффициентов рождаемости и выздоровления равна коэффициенту заболевания, можно увидеть, что остаются неизменными траектории всех переменных(рис. [4.17]).




Рис. 4.15: График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1, \nu = 0.5, \mu = 0.1$. OpenModelica




Рис. 4.16: График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1, \nu = 0.8, \mu = 0.1$. OpenModelica




Рис. 4.17: График решения модели SIR с учетом демографии при $\beta = 1, \nu = 0.9, \mu = 0.1$. OpenModelica

5 Выводы

В результате выполнения работы была исследована модель SIR при помощи xcos и OpenModelica.