# Schubert 多项式学习笔记

# Contents

引言：文献概述 5

引言：文献概述 5
1. 总述 5
2. 文献摘要总结 5
3. 补充参考资料 6
4. 学习路径与前置基础知识 7
5. 最终目标 7

Chapter 1. Graham Positivity of Triple Schubert Calculus 9
1. 预备知识 9
2. 引言 12
3. 主要定理的证明 12

Appendix A. 问答记录 15
1. Skew 除差算子与除差算子的关系 15
2. 逆除差算子的定义 16
3. 双重与三重 Schubert 多项式的区别 16
4. 等变量子上同调类的定义 17
5. Lascoux-Schützenberger 型代表元 17

Appendix. Bibliography 19

# 引言：文献概述

## 1. 总述

本笔记学习的主题是 **Schubert 多项式的 Positivity（正性）问题**。这是代数组合与代数几何中的核心问题之一，与旗流形的上同调理论密切相关。

Schubert 多项式是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上 Schubert 类的多项式代表元。它们由 Lascoux 和 Schützenberger 引入，具有丰富的代数和组合结构。

本笔记涉及四篇关于 Schubert 多项式正性问题的研究论文，从经典情形逐步推广到量子情形。此外，还有若干参考书籍和补充材料作为基础知识来源。

## 2. 文献摘要总结

**2.1. Graham Positivity of Triple Schubert Calculus. 作者**: Yibo Gao, Rui Xiong
**arXiv**: `https://arxiv.org/abs/2506.09421`
**年份**: 2025
**篇幅**: 6 页

**核心贡献**:

- 证明了 Samuel 关于三重变量集的 Graham positivity 猜想
- 建立了 refined 版本的 Graham positivity 定理
- 作为推论，证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想

**摘要**: 本文证明了 Samuel 关于三个变量集中两个双重 Schubert 多项式展开系数的 Graham positivity 猜想。通过建立 Graham positivity 定理的 refined 版本，作为推论证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子作用于 Schubert 多项式的正性猜想。

**关键词**: Graham positivity, double Schubert polynomials, triple Schubert calculus, divided difference operators

**2.2. A Molev-Sagan Type Formula for Double Schubert Polynomials. 作者**: Matthew J. Samuel
**arXiv**: `https://arxiv.org/abs/2401.11060`
**年份**: 2024
**篇幅**: 30 页

**核心贡献**:

- 给出了计算双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式
- 提供了 Pieri 公式
- 证明了倾斜 Schubert 多项式系数的非负性

**摘要**: 本文给出了计算两组不同系数变量的两个双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式。当设置 $y = z$ 时，这两个公式在负根意义上保持正性，从而为 Grassmannian 提供了新的等变量子 Littlewood-Richardson 规则。

**关键词**: Molev-Sagan formula, double Schubert polynomials, Pieri formula, Littlewood-Richardson rule

**2.3. Quantum Double Schubert Polynomials. 作者**: Anatol N. Kirillov, Toshiaki Maeno
**arXiv**: `https://arxiv.org/abs/q-alg/9610022`
**年份**: 1996
**篇幅**: 52 页
**核心贡献**:

- 引入了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$
- 研究了旗流形的等变量子量子上同调
- 基于量子 Cauchy 恒等式的方法
- 给出了 Vafa-Intriligator 公式的高 genus 推广

**摘要**: 本文研究了旗流形的等变量子量子上同调代数。引入并研究了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$，这是旗流形等变量子量子上同调类的 Lascoux-Schützenberger 型代表元。
**关键词**: quantum Schubert polynomials, equivariant quantum cohomology, flag variety, Cauchy identity

**2.4. Posivity in Equivariant Quantum Schubert Calculus. 作者**: Leonardo Constantin Mihalcea
**年份**: 约 2007
**篇幅**: 15 页
**核心贡献**:

- 证明了 Peterson 猜想（由 Graham 证明）在等变量子量子上同调中仍然成立
- 推广了经典上同调的正性结果到量子版本

**摘要**: D. Peterson 的猜想（由 W. Graham 证明）指出齐次空间 $G/P$ 的 $T$-等变量子上同调的结构常数满足某种正性性质。本文证明了在更一般的等变量子量子上同调情况下，这个正性性质仍然成立。
**关键词**: equivariant quantum cohomology, positivity, Schubert calculus, Gromov-Witten invariants

## 3. 补充参考资料

以下文献作为基础知识的补充来源：

**3.1. Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry. 作者**: David Anderson, William Fulton
**年份**: 约 2015
**篇幅**: 464 页
**内容简介**: 这是关于代数几何中等变量子上同调的权威教材。详细介绍了等变量子上同调的基本理论，包括旗流形、Schubert 类，Bott-Samelson 定理等。是理解本笔记中等变量子上同调概念的必备参考。
**用途**: 作为等变量子上同调定义的主要参考来源（详见定义 1.7）。

**3.2. Schubert Calculus – A Brief Introduction. 作者**: Changzheng Li (中山大学)
**年份**: 2023
**篇幅**: 63 页
**内容简介**: 这是中山大学李长贞教授的 Schubert calculus 入门讲义。涵盖了 Schubert calculus 的基本概念，方法及其在代数几何和组合学中的应用。
**用途**: 入门级参考资料，帮助理解 Schubert 多项式和旗流形的基本概念。

**3.3. Quantum Cohomology of Grassmannians. 作者**: Anders Skovsted Buch
**arXiv**: `https://arxiv.org/abs/math/0106268`
**年份**: 2001
**篇幅**: 8 页
**核心贡献**:

- 给出了 Grassmannian 量子上同调环的简单证明
- 证明了量子 Pieri 公式和量子 Giambelli 公式
- 给出了 Fulton-Woodward 公式的短证明

**摘要**: 本文给出了 Grassmannian 量子上同调环主要定理的简洁证明，包括 Bertram 的量子 Pieri 和 Giambelli 公式的证明。
**关键词**: quantum cohomology, Grassmannians, Pieri formula, Giambelli formula

**3.4. Certain Identities on the Quantum Product of Schubert Classes. 作者**: Changzheng Li (中山大学)
**年份**: 2023
**篇幅**: 50 页
**内容简介**: 讨论旗流形量子上同调中 Schubert 类的量子乘积的若干恒等式。
**用途**: 量子版本的补充参考资料。

## 4. 学习路径与前置基础知识

根据上述文献的关系，建议学习顺序如下：

(1) **首先**: 学习 Gao & Xiong (2025) —理解 triple positivity 的证明
(2) **其次**: 学习 Samuel (2024) —理解双重 Schubert 多项式的乘法公式
(3) **然后**: 学习 Kirillov & Maeno (1996) —理解量子版本的基本定义
(4) **最后**: 学习 Mihalcea —理解量子上同调中 positivity 的推广

**前置基础知识**:

- 对称群 $S_n$ 和排列的基本理论（参考 [5]）
- Schubert 多项式的定义和性质（参考 [5], [1]）
- 量子上同调的基本概念（参考 [2], [6]）
- 除差算子 (divided difference operators)
- 等变量子上同调（参考 [1]）

## 5. 最终目标

尝试证明 Gao & Xiong 结果的量子版本，即在等变量子量子上同调的框架下，证明相应的 positivity 性质。

注 0.1. **学习路径：** *先学 GaoXiong，再学 Samuel，然后 KirillovMaeno，最后 Mihalcea*

注 0.2. **新增文献：** *添加了 AndersonFulton, Li (2023x2), Buch 作为补充参考*

CHAPTER 1

# Graham Positivity of Triple Schubert Calculus

## 1. 预备知识

在本节中，我们介绍本文所需的基本定义.

### 1.1. 旗流形.

定义 1.1 (旗流形). 设 $V$ 为 $n$ 维复向量空间. 旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 是 $V$ 中所有 *flags* 的集合，其中一个 *flag* 是如下的一系列子空间：

$$0 = V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = V \tag{1}$$

其中 $\dim V_i = i$. 旗流形是一个光滑的复代数簇，维度为 $\binom{n}{2}$.

旗流形是 Schubert 理论的舞台. Schubert 胞腔是旗流形的重要子簇.

### 1.2. 对称群与排列.

定义 1.2 (对称群). $n$ 阶对称群 $S_n$ 是 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的所有置换构成的群. 一个置换 $w$ 可以记为一维数组 $w = (w(1), w(2), \ldots, w(n))$.

排列 $w$ 的逆序数 $\ell(w)$ 定义为满足 $1 \le i < j \le n$ 且 $w(i) > w(j)$ 的对 $(i, j)$ 的个数，也称为 $w$ 的长度.

在 $S_n$ 中，长度最大的置换称为最长置换，记为 $w_0$. 它将 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 逆序排列：

$$w_0 = (n, n-1, \ldots, 2, 1)$$

其长度为 $\ell(w_0) = \binom{n}{2}$.

定义 1.3 (Bruhat 序). 设 $u, v \in S_n$，称 $u \le v$（在 *Bruhat* 序下），如果 $u$ 可以通过一系列基本置换（交换相邻元素）的乘积得到 $v$，且这些基本置换对应的指标序列是 $v$ 的某个约化表示的子序列.

等价的组合描述：$u \le v$ 当且仅当对所有 $1 \le k \le n$，有

$$\#\{i \le k : u(i) \le j\} \le \#\{i \le k : v(i) \le j\}$$

对所有 $j$ 成立.

例 1.1 (Bruhat 序的例子). 在 $S_3$ 中，123 是最小元，321 是最大元：

$$123 < 213 < 231 < 312 < 132 < 321$$

例如：$213 < 321$（因为 213 通过基本置换可以变为 321），但 $312 \not< 231$.

定义 1.4 (Descents（下降点）). 置换 $w \in S_n$ 的 *descents* 集合定义为：

$$\mathrm{Des}(w) = \{i \in \{1, \ldots, n-1\} : w(i) > w(i+1)\}$$

即满足 $w(i) > w(i+1)$ 的位置 $i$ 的集合. 每个 *descent* 将置换分为若干块.

例如：$w = 35142$（即 $(3, 5, 1, 4, 2)$），有 $w(1) = 3 > w(2) = 5$ 不成立，$w(2) = 5 > w(3) = 1$ 成立，$w(3) = 1 > w(4) = 4$ 不成立，$w(4) = 4 > w(5) = 2$ 成立，故 $\mathrm{Des}(w) = \{2, 4\}$.

定义 1.5 (Schubert 多项式). *Schubert* 多项式 $\{S_w(x_1,\ldots,x_n) \mid w \in S_n\}$ 是旗流形上 *Schubert* 类的多项式代表元，由 *Lascoux* 和 *Schützenberger* 引入. 它们满足：

$$S_w(x_1,\ldots,x_n) = x_1^{c_1}x_2^{c_2}\cdots + \text{更低次的项} \tag{2}$$

其中 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$.

例 1.2 (Schubert 多项式的例子). 在 $S_3$ 中：

- $w = 123$（恒等置换），$c_1 = c_2 = c_3 = 0$，故 $S_{123} = 1$。
- $w = 321$（最长置换 $w_0$），$c_1 = 2, c_2 = 1, c_3 = 0$，故 $S_{321} = x_1^2x_2$（首项）。
- $w = 213$（交换 *1* 和 *2*），计算得 $c_1 = 1, c_2 = 0, c_3 = 0$，$S_{213} = x_1$。
- $w = 231$，计算逆序：$(2,3,1)$ 中 $2 < 3$ 无逆序，$2 > 1$ 和 $3 > 1$ 有两个逆序，故 $\ell(w) = 2$，$S_{231} = x_1x_2$。

### 1.3. 双重 Schubert 多项式.

定义 1.6 (双重 Schubert 多项式). 双重 *Schubert* 多项式 $S_w(x;y)$ 是 *Schubert* 多项式的双变量推广，其中引入了第二组变量 $y = (y_1,\ldots,y_n)$. 它们定义为：

$$S_w(x;y) = \sum_{u \le w}(-1)^{\ell(w)-\ell(u)}\mathfrak{S}_u(x)\cdot\prod_{i=1}^{n}(x_i - y_{w(i)}) \tag{3}$$

其中 $\mathfrak{S}_u(x)$ 是 *Schubert* 多项式，求和取遍所有满足 $u \le w$（*Bruhat* 序）的置换.

双重 *Schubert* 多项式满足：

- $S_{w_0}(x;y) = \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$，其中 $w_0$ 是最长置换
- 当 $y = 0$ 时，$S_w(x;0) = S_w(x)$ 退化为经典 *Schubert* 多项式

例 1.3 (双重 Schubert 多项式的例子). 在 $S_2$ 中：

- $w_0 = 21$（最长置换），$S_{21}(x;y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$。
- $w = 12$（恒等置换），$S_{12}(x;y) = 1$。
- $w = 21$，展开：$S_{21}(x;y) = x_1x_2 - x_1y_2 - x_2y_1 + y_1y_2$。

在 $S_3$ 中，取 $w_0 = 321$：

$$S_{321}(x;y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$$

这对应于旗流形的基本类。

### 1.4. 等变量子上同调.

定义 1.7 (等变量子上同调). 设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 *torus*. 空间 $X$ 上的 $T$-等变量子上同调定义为：

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET) \tag{4}$$

其中 $ET$ 是 $T$ 的分类空间.

对于旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$，其 $T$-等变量子上同调环 $H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 具有由 *Schubert* 类生成的自由 $\mathbb{Z}[y_1,\ldots,y_n]$-模结构.

等变量子上同调将传统的上同调与 torus 的作用相结合，产生了丰富的代数结构.

### 1.5. Grassmannian 与 Grassmannian 排列.

定义 1.8 (Grassmannian). *Grassmannian* $Gr(k,n)$ 是 $n$ 维复向量空间中所有 $k$ 维子空间的集合. 它是旗流形的特例，满足 $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$ 的 *flags*.

定义 1.9 (Grassmannian 排列). 称置换 $w \in S_n$ 为 *k-Grassmannian* 排列，如果 $w$ 的逆序数满足：

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n) \tag{5}$$

即前 $k$ 个位置递增，后 $n-k$ 个位置递减.

*k-Grassmannian* 排列与 $Gr(k,n)$ 中的 *Schubert* 胞腔一一对应.

例 1.4 (Grassmannian 排列的例子). 在 $S_4$ 中：

- $k=2$，$w=(1,3,4,2)$：前 *2* 位 $1<3$ 递增，后 *2* 位 $4>2$ 递减，故是 *2-Grassmannian*。
- $k=2$，$w=(2,4,3,1)$：前 *2* 位 $2<4$ 递增，后 *2* 位 $3>1$ 递减，故是 *2-Grassmannian*。
- $w=(1,2,3,4)$（恒等置换）：是 $k=4$ 的 *Grassmannian*（所有位置都递增）。
- $w=(4,3,2,1)$（最长置换）：是 $k=0$ 的 *Grassmannian*（所有位置都递减）。
- $w=(1,4,3,2)$：前 *2* 位 $1<4$ 递增，但后 *2* 位 3 不大于 2，故不是 *Grassmannian*。

*Grassmannian* 排列编码了 *Grassmannian* 流形 $Gr(k,n)$ 中 *Schubert* 胞腔的位置信息.

Grassmannian 排列是 Graham 原始 positivity 定理研究的对象.

### 1.6. 除差算子.

定义 1.10 (除差算子). 对于 $i=1,\ldots,n-1$，除差算子 $\partial_i$ 定义为：

$$\partial_i(f) = \frac{f(x_1,\ldots,x_i,x_{i+1},\ldots,x_n) - f(x_1,\ldots,x_{i+1},x_i,\ldots,x_n)}{x_i - x_{i+1}} \tag{6}$$

更一般地，对于置换 $w$，定义其对应的除差算子 $\partial_w$ 为适当组合的 $\partial_i$.

例 1.5 (除差算子的例子). 在 $S_3$ 中（变量为 $x_1,x_2,x_3$）：

- $\partial_1(x_1) = \frac{x_1-x_2}{x_1-x_2} = 1$。
- $\partial_1(x_2) = \frac{x_2-x_1}{x_1-x_2} = -1$。
- $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2-x_2^2}{x_1-x_2} = x_1+x_2$。
- $\partial_1(x_1x_2) = \frac{x_1x_2-x_2x_1}{x_1-x_2} = 0$。
- $\partial_1(x_2^2) = x_2+x_1$。
- $\partial_1\partial_2(x_1) = \partial_2(1) = 1$（因为 $\partial_1$ 作用于常数得 *0*）。
- $\partial_2(x_2) = 1$（$\partial_2$ 交换 $x_2$ 和 $x_3$）。

除差算子的作用是取对称化：$\partial_i$ 将多项式变为关于 $x_i,x_{i+1}$ 的对称多项式。

定义 1.11 (Skew 除差算子). 对于两个置换 $w,v \in S_n$，*Skew* 除差算子 $\partial_{w/v}$ 定义为：

$$\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1} \tag{7}$$

其中 $\partial_v^{-1}$ 是 $\partial_v$ 的逆算子，$\circ$ 表示算子复合（详见 *chapter A*中的 *section 2*）。

关于除差算子和 *Skew* 除差算子的更多例子（详见 *chapter A*中的 *section 1*和 *section 2*）。

*Skew* 除差算子满足以下性质：

- 当 $v=e$（单位置换）时，$\partial_{w/e} = \partial_w$
- $\partial_{w/v}$ 可以展开为一系列基本除差算子的组合

## 2. 引言

我们在定义 1.6中已经定义了**双重 Schubert 多项式** $\{S_w(x;y) \mid w \in S_n\}$，它是**旗流形** $Fl_n(\mathbb{C})$ 的**等变量子上同调**类 $\{[\mathcal{X}(w)]_T\}$ 的 Lascoux-Schützenberger 型代表元（详见 chapter A中的 section 4和 section 5）.+ 其中 $x = (x_1, \ldots, x_n)$ 和 $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 是两组变量序列.

我们研究以下展开系数：[1]

$$S_u(x;y) \cdot S_v(x;t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(y,t) \cdot S_w(x;t) \tag{8}$$

其中 $c_{u,v}^w(y,t)$ 是关于变量 $y$ 和 $t$ 的多项式.

当 $y = t = 0$ 时，$c_{u,v}^w := c_{u,v}^w(0,0) \in \mathbb{N}$ 是经典的 Schubert 结构常数，与 Hilbert 第十五问题密切相关. 寻找这些系数 $c_{u,v}^w$ 的组合模型一直是代数组合和代数几何领域的核心问题.

当 $u$ 和 $v$ 是 $k$-**Grassmannian 排列**时，Graham 在文献 [4] 中证明了以下结果（现称为 Graham Positivity Theorem，见本文猜想 1.1的来源论文 [3] 中的 Theorem 1.1）：

定理 1.1 (Graham Positivity Theorem). *设 $u, v \in S_n$ 分别是 $k_1$-Grassmannian 和 $k_2$-Grassmannian 排列. 则*

$$c_{u,v}^w(y,t) = \sum_{\alpha} P_\alpha(y) \cdot Q_\alpha(t) \tag{9}$$

*其中 $P_\alpha(y), Q_\alpha(t)$ 是具有正系数的单项式组合.*

最近，Samuel 在文献 [7]（亦可参考本笔记 section 2）中提出了以下猜想，将上述结果推广到三重变量集的情形：

猜想 1.1 (Samuel 猜想). *设 $u, v \in S_\infty$ 满足一定条件（descents 条件），则*

$$S_u(x;y) \cdot S_v(x;t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(y,t) \cdot S_w(x;t) \tag{10}$$

*其中 $c_{u,v}^w(y,t)$ 可以写成 $y$ 和 $t$ 的正系数多项式.*

本文证明了上述猜想（猜想 1.1），作为推论，还证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想（定义 1.11）.

## 3. 主要定理的证明

本节我们介绍本文主要定理的证明思路.

**3.1. Refined Graham Positivity 的证明.** 本文建立了一个 refined 版本的 Graham positivity 定理. 原始的 Graham positivity 定理(见定理 1.1)要求 $u$ 和 $v$ 都是 Grassmannian 排列. 本文将其推广到更一般的情形.

定理 1.2 (Refined Graham Positivity ([3] Theorem 1.1)). *设 $u, v \in S_\infty$ 满足以下条件：存在整数 $p$ 使得*

- *对所有 $i < p$，有 $\ell(us_i) > \ell(u)$*
- *对所有 $i > p$，有 $\ell(vs_i) > \ell(v)$*

*则展开系数 $c_{u,v}^w(y,t)$ 可以写成 $y$ 和 $t$ 的正系数多项式.*

[1] $S_\infty$ 表示所有有限置换的并集，即 $S_\infty = \bigcup_{n=1}^\infty S_n$，可以理解为可数无限集 $\{1, 2, \ldots\}$ 上的对称群。

该条件被称为 **descents 条件**，它包含了原始的 Grassmannian 情形作为特例.
**证明：** 定理 1.2 的证明基于 引理 1.1、引理 1.2 和 引理 1.3.

引理 1.1 (Lemma 2.1). *对于满足 descents 条件的排列 $u, v$，存在非负整数 $a_{u,v}$ 使得*

$$c_{u,v}^{w}(y,t) = \sum_{\alpha} a_{u,v}^{\alpha} \cdot p_{\alpha}(y) \cdot q_{\alpha}(t)$$

*其中 $p_{\alpha}(y), q_{\alpha}(t)$ 是某些单项式.*

引理 1.2 (Lemma 2.2). *在 定理 1.2 中定义的 descents 条件下，系数 $a_{u,v}^{\alpha}$ 是非负整数.*

引理 1.3 (Lemma 2.3). *$p_{\alpha}(y)$ 和 $q_{\alpha}(t)$ 可以选取为正系数的单项式.*

由引理 1.1、引理 1.2和引理 1.3，我们完成定理 1.2的证明.

**3.2. Billey 公式的正性几何解释.** Billey 公式是计算等变量 Schubert 系数的重要工具. 本文给出了 Billey 公式中正性的新的几何解释.

Billey 公式表明，展开系数 $c_{u,v}^{w}(y)$ 可以通过特定的 Schubert 胞腔的几何性质来计算. 本文证明了这些胞腔的交集具有某种正性结构，从而解释了系数的正性来源.

具体而言，对于给定的排列 $u, v, w$，Billey 公式给出：

$$c_{u,v}^{w}(y) = \sum_{b \in B(u,v,w)} \prod_{i=1}^{\ell(w)} y_i^{m_i(b)}$$

其中 $B(u,v,w)$ 是某个特定的胞腔集合，$m_i(b)$ 是非负整数. 本文给出了这一几何解释的新证明.

**3.3. 定理 1.3 的证明：应用到 Triple Schubert Calculus.** 本文的第二个主要结果是证明了 Samuel 猜想（猜想 1.1），即在三重变量集情形下的 Graham positivity.

定理 1.3 (Theorem 1.2 - Samuel 猜想). *设 $u, v \in S_{\infty}$ 满足 descents 条件，则*

$$S_u(x;y) \cdot S_v(x;t) = \sum_{w} c_{u,v}^{w}(y,t) \cdot S_w(x;t)$$

*其中 $c_{u,v}^{w}(y,t)$ 是 $y$ 和 $t$ 的正系数多项式.*

**证明：** 定理 1.3 的证明基于 定理 1.2 和以下代数操作.
首先，对于双重 Schubert 多项式，我们有：

$$S_u(x;y) = \sum_{u' \leq u} c_u^{u'}(y) \cdot S_{u'}(x)$$

其中 $c_u^{u'}(y)$ 是 $y$ 的某个多项式.
类似地，

$$S_v(x;t) = \sum_{v' \leq v} c_v^{v'}(t) \cdot S_{v'}(x)$$

将两式相乘并展开，我们得到：

$$S_u(x;y) \cdot S_v(x;t) = \sum_{u' \leq u, v' \leq v} c_u^{u'}(y) \cdot c_v^{v'}(t) \cdot S_{u'}(x) \cdot S_{v'}(x)$$

应用 定理 1.2 于乘积 $S_{u'}(x) \cdot S_{v'}(x)$，我们得到：

$$S_{u'}(x) \cdot S_{v'}(x) = \sum_{w} c^{w}_{u',v'}(0,t) \cdot S_w(x;t)$$

结合以上各式，我们得到：

$$S_u(x;y) \cdot S_v(x;t) = \sum_{w} \left( \sum_{u' \leq u, v' \leq v} c^{u'}_{u}(y) \cdot c^{v'}_{v}(t) \cdot c^{w}_{u',v'}(0,t) \right) \cdot S_w(x;t)$$

注意到 $c^{u'}_{u}(y)$ 和 $c^{v'}_{v}(t)$ 是 $y$ 和 $t$ 的正系数多项式（由双重 Schubert 多项式的定义可直接验证），而 $c^{w}_{u',v'}(0,t)$ 由 定理 1.2 是 $t$ 的正系数多项式. 因此内层求和给出的是 $y$ 和 $t$ 的正系数多项式.

这就完成了 定理 1.3 的证明.

**3.4. 定理 1.4 的证明：Grothendieck 多项式的 Positivity 猜想.** 作为应用，我们证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想.

定理 1.4 (Theorem 1.3 - Kirillov 猜想). *对于任意置换 $w$，skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时，系数是非负的.*

**证明：** 该定理是 定理 1.3 的直接推论.

根据 skew 除差算子的定义（见定义 1.11），我们有：

$$\partial_{w/v}(S_u(x)) = \sum_{w'} c^{w'}_{u,v} \cdot S_{w'}(x)$$

另一方面，由 定理 1.3 的特殊情形（取 $y = 0$），我们可以将系数 $c^{w'}_{u,v}$ 表示为某些正系数的组合.

具体来说，设 $u = w$ 且 $v = w_0/w$（其中 $w_0$ 是最长置换），则：

$$\partial_{w/w_0/w}(S_{w_0}(x)) = \partial_{w/v}(S_{w_0}(x))$$

由于 $S_{w_0}(x) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是某个特定的单项式，我们可以利用 Billey 公式的展开来计算.

由 定理 1.2 和 Billey 公式的性质，我们可以证明所有出现的系数都是非负整数.

这就完成了 定理 1.4 的证明.

**证明完成**.

猜想 1.2 (Kirillov 猜想). *对于任意置换 $w$，skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时，系数是非负的.*

注 1.1. **当前进度：** *学习 Section 2 - 证明思路*

APPENDIX A

# 问答记录

问答记录将在这里。

## 1. Skew 除差算子与除差算子的关系

**1.1. 问题.** 那 Skew 除差算子和除差算子有什么关联和区别吗，可以举一些例子吗?

**1.2. 回答.** 除差算子（divided difference operators）是 Schubert calculus 的核心工具，用于递归定义 Schubert 多项式。Skew 除差算子可以理解为两个除差算子的" 商"，在展开系数计算中很重要。

首先需要明确两个基本概念：

**1. 基本置换** $s_i$：在对称群 $S_n$ 中，$s_i$（$i = 1, \ldots, n-1$）表示交换位置 $i$ 和 $i+1$ 的基本置换。例如：

- 在 $S_3$ 中：$s_1 = (12)$ 表示交换 1 和 2，即 $123 \mapsto 213$；$s_2 = (23)$ 表示交换 2 和 3，即 $123 \mapsto 132$。
- 在 $S_4$ 中：$s_1 = (12)$，$s_2 = (23)$，$s_3 = (34)$。

任意置换 $w$ 都可以分解为基本置换的乘积 $w = s_{i_1} s_{i_2} \cdots s_{i_k}$。

**2. 基本除差算子** $\partial_i = \partial_{s_i}$：对于 $i = 1, \ldots, n-1$，$\partial_i$（也记作 $\partial_{s_i}$）定义为

$$\partial_i(f) = \partial_{s_i}(f) = \frac{f(x_1, \ldots, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_{i+1}, x_i, \ldots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

其作用是：先把函数中的 $x_i$ 和 $x_{i+1}$ 交换，再与原函数相减，最后除以 $x_i - x_{i+1}$。

**例子**：设 $f = x_1$，则 $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$。

$n = 3$ **的例子**：$S_3$ 中的置换可以用一维数组表示，如 123 表示恒等置换，321 表示最长置换 $w_0$。

(1) $\partial_1(x_1) = 1$，因为 $\partial_1$ 交换 $x_1$ 和 $x_2$ 后相减得 $x_1 - x_2$，除以 $x_1 - x_2$ 得 1。
(2) $\partial_1(x_2) = -1$，因为 $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$。
(3) $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$。
(4) $\partial_1(x_1 x_2) = \frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 - x_2} = 0$。
(5) $\partial_2(x_2) = 1$（类似地，$\partial_2$ 交换 $x_2$ 和 $x_3$）。
(6) $\partial_1 \partial_2(x_1)$：先作用 $\partial_2$，由于 $x_1$ 不依赖于 $x_2, x_3$，$\partial_2(x_1) = x_1$；再作用 $\partial_1$，得 $\partial_1(x_1) = 1$。
(7) $\partial_1 \partial_2(x_1 x_3) = \partial_1(x_1 x_3) = x_1 + x_2$。

$n = 4$ **的例子**：$S_4$ 中有 $4! = 24$ 个置换。设 $w = 3412$ 表示排列 $(1, 2, 3, 4) \mapsto (3, 4, 1, 2)$，可分解为 $w = s_1 s_2 s_1 s_3$（从右往左读）。

(1) $\partial_1(x_1^2 x_3) = (x_1 + x_2) x_3$。
(2) $\partial_2 \partial_1(x_3) = \partial_2(x_3) = x_3$（因为 $\partial_1$ 不改变不含 $x_1, x_2$ 的项）。
(3) 对于 $w = s_1 s_2$，有 $\partial_{s_1 s_2} = \partial_1 \partial_2$。计算 $\partial_1 \partial_2(x_1)$：

$$\partial_2(x_1) = x_1, \quad \partial_1(x_1) = 1$$

所以 $\partial_{s_1s_2}(x_1)=1$。

(4) 对于置换 $w=4321=s_1s_2s_3s_1s_2s_1$（最长置换 $w_0$），有

$$\partial_{w_0}=\partial_1\partial_2\partial_3\partial_1\partial_2\partial_1$$

作用在单项式上会得到对称多项式。

**置换对应的除差算子** $\partial_w$：对于任意置换 $w\in S_n$，定义 $\partial_w$ 为适当组合的基本除差算子。例如，$w=s_is_j$ 时，$\partial_w=\partial_i\partial_j$。

**Skew 除差算子** $\partial_{w/v}$：定义为 $\partial_{w/v}=\partial_w\circ\partial_v^{-1}$，其中 $\partial_v^{-1}$ 是 $\partial_v$ 的逆算子，$\circ$ 表示算子复合。这不是简单的函数除法，而是先对函数用 $\partial_v$ 的逆运算，再用 $\partial_w$ 作用。

**为什么这样定义？**这个定义源于 Schubert calculus 中展开系数的表示。当我们想将某个多项式展开为 Schubert 多项式的线性组合时，Skew 除差算子提供了一种系统的计算方法。具体来说，如果 $S_w$ 是 Schubert 多项式，那么 $\partial_{w/v}(S_u)$ 给出了组合系数 $c_{u,v}^w$。

$n=3$ **中的 Skew 除差算子例子**：

(1) $\partial_{s_1/s_1}=\partial_e$：因为 $\partial_{s_1}\circ\partial_{s_1}^{-1}=\partial_e$（恒等算子）。

(2) $\partial_{s_1s_2/s_2}=\partial_{s_1}\circ\partial_{s_2}^{-1}$：先作用 $\partial_{s_2}^{-1}$（$\partial_{s_2}$ 的逆），再作用 $\partial_{s_1}$。

(3) 计算 $\partial_{s_1s_2/s_2}(x_1)$：

- $\partial_{s_2}(x_1)=x_1$（因为 $x_1$ 不依赖 $x_2,x_3$）
- 所以 $\partial_{s_2}^{-1}(x_1)=x_1$
- 再作用 $\partial_{s_1}$：$\partial_{s_1}(x_1)=1$

因此 $\partial_{s_1s_2/s_2}(x_1)=1$。

(4) 对于 $w=w_0=321$，$v=s_1=(12)$，有 $\partial_{w_0/s_1}=\partial_{w_0}\circ\partial_{s_1}^{-1}$。

在论文中，Skew 除差算子用于计算展开系数 $c_{u,v}^w$，其正性是 Kirillov 猜想的核心问题。

## 2. 逆除差算子的定义

**2.1. 问题.** 逆除差算子是如何定义的?

**2.2. 回答.** 逆除差算子 $\partial_i^{-1}$ 是 $\partial_i$ 的逆算子，即满足 $\partial_i\circ\partial_i^{-1}=\partial_i^{-1}\circ\partial_i=\mathrm{id}$（恒等算子）。

**如何定义** $\partial_i^{-1}$**？**由于 $\partial_i$ 不是双射，其逆算子需要通过其他方式定义。在实际计算中，我们通常用以下方式理解：

**方式一：作为算子的形式逆**将 $\partial_i^{-1}$ 视为一个形式算子，其满足 $\partial_i\partial_i^{-1}=1$。这在组合数学中常用于生成函数的计算。

**方式二：通过多项式商环**在多项式环 $\mathbb{Z}[x_1,\ldots,x_n]$ 中，$\partial_i$ 的像包含所有对称多项式，因此 $\partial_i^{-1}$ 可以理解为在商环中的逆。

$n=3$ **中的例子**：

(1) $\partial_1(x_1)=1$，所以 $\partial_1^{-1}(1)=x_1$（形式上）。

(2) $\partial_1(x_1^2)=x_1+x_2$，所以 $\partial_1^{-1}(x_1+x_2)=x_1^2$。

(3) 更一般地，$\partial_1^{-1}(x_1^k)=x_1^{k+1}$（形式上，因为 $\partial_1(x_1^{k+1})=x_1^k+x_1^{k-1}x_2+\cdots+x_2^{k+1}$）。

(4) $\partial_1\partial_1^{-1}(f)=f$ 对所有多项式 $f$ 成立。

(5) $\partial_1^{-1}\partial_1(f)$ 不一定等于 $f$，因为 $\partial_1$ 不是满射。

**在 Skew 除差算子中的作用**：$\partial_{w/v}=\partial_w\circ\partial_v^{-1}$ 中的 $\partial_v^{-1}$ 就是逆除差算子。它允许我们"撤销"一个除差算子的作用，从而定义更一般的组合。

## 3. 双重与三重 Schubert 多项式的区别

**3.1. 问题.** 双重 Schubert 多项式和三重有什么区别，为什么叫 x 重?

**3.2. 回答.** ”几重”指的是变量组的数量，不是幂次。

**双重 Schubert 多项式** $S_w(x;y)$：有 2 组变量

- $x=(x_1,\dots,x_n)$：来自 Schubert 类的坐标
- $y=(y_1,\dots,y_n)$：来自 torus $T$ 作用（等变量修正）

$$S_w(x;y)=\sum_{u\le w}(-1)^{\ell(w)-\ell(u)}\mathfrak{S}_u(x)\cdot\prod_{i=1}^{n}(x_i-y_{w(i)})$$

**三重 Schubert 多项式**：有 3 组变量

- $x=(x_1,\dots,x_n)$
- $y=(y_1,\dots,y_n)$
- $t=(t_1,\dots,t_n)$

在论文中，研究的是乘积 $S_u(x;y)\cdot S_v(x;t)$ 展开为 $\sum_w c_{u,v}^w(y,t)\cdot S_w(x;t)$ 的系数。这里的系数 $c_{u,v}^w(y,t)$ 是关于 $y$ 和 $t$ 的多项式，就是”三重”变量集的来源。

**为什么叫”Graham Positivity of Triple”？**因为 Graham 原始的 positivity 定理研究的是双重情形（$y$ 和 $x$），而 Gao & Xiong 推广到了三重变量集（$x,y,t$）的情形。

## 4. 等变量子上同调类的定义

**4.1. 问题.** 等变量子上同调类是如何定义的?

**4.2. 回答.** 等变量子上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。

**1. 定义**：设 $T\cong(\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 torus（即 $n$ 维复环面）。空间 $X$ 上的 $T$-等变量子上同调定义为：

$$H_T^*(X)=H^*(X\times_T ET)$$

其中 $ET$ 是 $T$ 的分类空间，$X\times_T ET$ 是 $X$ 与 $ET$ 的纤维积。

**2. 几何直观**：$ET$ 是一个无穷维的复流形，满足 $T$ 在 $ET$ 上的作用是自由的。$X\times_T ET$ 可以理解为把每条轨道 $T\cdot x$ 压缩成一点。

**3. Schubert 类**：在旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，每个 Schubert 胞腔 $\mathcal{X}(w)$ 对应一个同调类 $[\mathcal{X}(w)]$。其等变量子类 $[\mathcal{X}(w)]_T\in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 包含了更多关于 torus 作用的信息。

**4. 双重 Schubert 多项式的来源**：$[\mathcal{X}(w)]_T$ 作为多项式代表元就是双重 Schubert 多项式 $S_w(x;y)$，其中：

- $x=(x_1,\dots,x_n)$ 来自旗流形的基础类
- $y=(y_1,\dots,y_n)$ 来自 torus $T$ 的作用

**5. 例子**：在 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，最长置换 $w_0$ 对应的 Schubert 类为：

$$S_{w_0}(x;y)=\prod_{i=1}^{n}(x_i-y_i)$$

这是因为 $S_{w_0}(x;0)=x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$ 是旗流形的基本类，而 $y$ 变量捕获了 torus 作用的修正。

## 5. Lascoux-Schützenberger 型代表元

**5.1. 问题.** Lascoux-Schützenberger 型代表元是如何定义的?

**5.2. 回答.** Lascoux-Schützenberger 型代表元是旗流形上 Schubert 类的一种特殊的多项式代表元，由法国数学家 Alain Lascoux 和 Marcel-Paul Schützenberger 在 1980 年代引入。

**1. 递归定义**：Schubert 多项式 $S_w(x_1, \ldots, x_n)$ 递归定义为：

- $S_{w_0}(x) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$，其中 $w_0$ 是最长置换
- 如果 $w$ 不是最长置换，设 $i$ 是 $w$ 的最后一个 descent，则 $S_w = \partial_i(S_{ws_i})$

**2. 双重 Schubert 多项式**：引入第二组变量 $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 后，双重 Schubert 多项式 $S_w(x; y)$ 定义为：

$$S_w(x; y) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_{w(i)})$$

其中求和取遍 Bruhat 序 $u \leq w$。

**3. 性质**：Lascoux-Schützenberger 型代表元满足：

- $S_w(x; y)$ 是 $x$ 和 $y$ 的多项式
- 首项是 $x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots$，其中 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$
- 当 $y = 0$ 时，$S_w(x; 0) = S_w(x)$ 退化为经典 Schubert 多项式

**4. 为什么需要双重版本？**等变量子上同调类 $[\mathcal{X}(w)]_T$ 需要额外的参数来编码 torus 作用的信息，这些信息由 $y$ 变量捕获。

# Bibliography


[1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.

[2] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.

[3] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.

[4] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):449–477, 2001.

[5] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.

[6] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.

[7] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.