

5÷.{7ç+\& /å

> Q ; ; - J + E 2 M - * ` B ;

3. 二阶导数：

$$M''(t) = \lambda e^t M(t) + \lambda^2 e^{2t} M(t),$$

故 $\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2 = (\lambda + \lambda^2) - \lambda^2 = \lambda$ 。

结论： Poisson 分布的均值和方差相等，都等于参数 λ 。■

0.21. 卡方分布与正态分布的关系. 背景 (Background)： 卡方分布定义为标准正态平方和。

目标 (Goal)： 证明若 $Z \sim N(0, 1)$ ，则 $Z^2 \sim \chi^2(1)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps)：

1. Z 的 pdf 为 $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$ 。

2. 设 $Y = Z^2$ ，先求 cdf：

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq Z \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \phi(z) dz.$$

3. 求导得 pdf：

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \phi(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + \phi(-\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}.$$

4. 写成标准形式：

$$f_Y(y) = \frac{1}{\Gamma(1/2)2^{1/2}} y^{1/2-1} e^{-y/2},$$

这正是 $\chi^2(1)$ 的 pdf。

结论： 标准正态变量的平方服从自由度为 1 的卡方分布。■

0.22. 卡方分布的可加性证明. 背景 (Background)： 卡方分布满足可加性：独立卡方变量之和仍为卡方分布。

目标 (Goal)： 证明若 $X_1 \sim \chi^2(m)$ ， $X_2 \sim \chi^2(n)$ 独立，则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(m+n)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps)：

1. 由卡方分布与 Gamma 分布的关系： $\chi^2(r) = \Gamma(r/2, 2)$ 。

2. 利用 Gamma 分布的可加性（见定理 3.3.1）：若 $Y_1 \sim \Gamma(\alpha_1, \beta)$ ， $Y_2 \sim \Gamma(\alpha_2, \beta)$ 独立，则 $Y_1 + Y_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$ 。

3. 因此：

$$X_1 + X_2 \sim \Gamma(m/2, 2) + \Gamma(n/2, 2) = \Gamma((m+n)/2, 2) = \chi^2(m+n).$$

或者直接利用 mgf： $\chi^2(r)$ 的 mgf 为 $M(t) = (1-2t)^{-r/2}$ ，故

$$M_{X_1+X_2}(t) = (1-2t)^{-m/2} \cdot (1-2t)^{-n/2} = (1-2t)^{-(m+n)/2}.$$

结论： 卡方分布具有可加性，自由度可累加。■

0.23. Beta 分布从 Gamma 变量构造的推导. 背景 (Background): Beta 分布可由两个独立 Gamma 变量构造而来。

目标 (Goal): 证明若 $X_1 \sim \Gamma(\alpha, 1)$, $X_2 \sim \Gamma(\beta, 1)$ 独立, 令 $Y = X_1/(X_1 + X_2)$, 则 $Y \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 联合 pdf ($x_1 > 0, x_2 > 0$):

$$h(x_1, x_2) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x_1^{\alpha-1} x_2^{\beta-1} e^{-x_1-x_2}.$$

2. 变换: $y_1 = x_1 + x_2$, $y_2 = \frac{x_1}{x_1+x_2}$, 则 $x_1 = y_1 y_2$, $x_2 = y_1(1 - y_2)$ 。

3. Jacobian 行列式: $|J| = y_1$ 。

4. 联合 pdf:

$$g(y_1, y_2) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} (y_1 y_2)^{\alpha-1} [y_1(1 - y_2)]^{\beta-1} e^{-y_1} \cdot y_1 = y_1^{\alpha+\beta-1} e^{-y_1} \cdot \frac{y_2^{\alpha-1} (1 - y_2)^{\beta-1}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}.$$

5. 分离变量, 可见 $Y_1 = X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha + \beta, 1)$, $Y_2 = \frac{X_1}{X_1+X_2} \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, 且独立。

6. 边缘 pdf:

$$g_2(y_2) = \frac{y_2^{\alpha-1} (1 - y_2)^{\beta-1}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^\infty y_1^{\alpha+\beta-1} e^{-y_1} dy_1 = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} y_2^{\alpha-1} (1 - y_2)^{\beta-1}.$$

结论: Beta 分布可如此构造, 且 Y_1 和 Y_2 独立。■

0.24. Beta 分布的均值与方差推导. 背景 (Background): Beta 分布的均值和方差的计算。

目标 (Goal): 求 $\mathbb{E}Y$ 和 $\text{var}(Y)$, 其中 $Y \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 利用 Beta 函数性质:

$$\int_0^1 y^{\alpha-1} (1 - y)^{\beta-1} dy = B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}.$$

2. 均值:

$$\mathbb{E}Y = \int_0^1 y \cdot \frac{1}{B(\alpha, \beta)} y^{\alpha-1} (1 - y)^{\beta-1} dy = \frac{B(\alpha + 1, \beta)}{B(\alpha, \beta)} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}.$$

3. 二阶矩:

$$\mathbb{E}[Y^2] = \frac{B(\alpha + 2, \beta)}{B(\alpha, \beta)} = \frac{\alpha(\alpha + 1)}{(\alpha + \beta)(\alpha + \beta + 1)}.$$

4. 方差:

$$\text{var}(Y) = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}Y)^2 = \frac{\alpha(\alpha + 1)}{(\alpha + \beta)(\alpha + \beta + 1)} - \frac{\alpha^2}{(\alpha + \beta)^2} = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}.$$

结论: Beta 分布的均值为 $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$, 方差为 $\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$ 。■

0.25. 正态分布的矩母函数推导. 背景 (Background): 正态分布是最重要的连续分布之一。

目标 (Goal): 证明 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的 mgf 为 $M(t) = \exp\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. $X = \sigma Z + \mu$, 其中 $Z \sim N(0, 1)$ 。

2. 标准正态的 mgf:

$$M_Z(t) = \mathbb{E}[e^{tZ}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tz} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = e^{t^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(z-t)^2/2} dz = e^{t^2/2}.$$

3. 一般正态:

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{t(\sigma Z + \mu)}] = e^{\mu t} \mathbb{E}[e^{t\sigma Z}] = e^{\mu t} e^{\frac{1}{2}\sigma^2 t^2} = \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\}.$$

4. 验证均值和方差:

$$M'(t) = (\mu + \sigma^2 t) \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\},$$

$$M''(t) = (\sigma^2 + (\mu + \sigma^2 t)^2) \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\},$$

故 $\mathbb{E}X = M'(0) = \mu$, $\text{var}(X) = M''(0) - \mu^2 = \sigma^2$ 。

结论: 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 mgf 为 $\exp\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$ 。■

0.26. 标准化变换的推导. 背景 (Background): 任何正态变量都可以通过标准化变换化为标准正态。

目标 (Goal): 证明若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 变换 $Z = g(X) = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 其逆为 $X = \sigma Z + \mu$ 。

2. 利用 mgf 的性质 (或直接积分):

$$M_Z(t) = \mathbb{E}[e^{tZ}] = \mathbb{E}\left[e^{t\frac{X-\mu}{\sigma}}\right] = e^{-\mu t/\sigma} \mathbb{E}\left[e^{(t/\sigma)X}\right] = e^{-\mu t/\sigma} \cdot \exp\left\{\mu \frac{t}{\sigma} + \frac{1}{2}\sigma^2 \left(\frac{t}{\sigma}\right)^2\right\} = e^{t^2/2}.$$

3. 这正是 $N(0, 1)$ 的 mgf, 故 $Z \sim N(0, 1)$ 。

4. 概率计算:

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

结论: 标准化变换将正态分布转化为标准正态分布, 从而可用标准正态表计算任意正态概率。■

0.27. t 分布的推导. 背景 (Background): t 分布由标准正态和卡方分布构造而来。

目标 (Goal): 证明若 $Z \sim N(0, 1)$, $V \sim \chi^2(n)$ 独立, $T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}}$, 则 $T \sim t(n)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 变换: $T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}}$, $U = V$, 逆变换为 $Z = T\sqrt{U/n}$, $V = U$ 。

2. Jacobian: $|J| = \sqrt{u/n}$ 。

3. 联合 pdf:

$$h(z, v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \cdot \frac{1}{\Gamma(n/2)2^{n/2}} v^{n/2-1} e^{-v/2}.$$

4. 代入变换并对 u 积分:

$$f_T(t) = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2 u/(2n)} \cdot \frac{1}{\Gamma(n/2)2^{n/2}} u^{n/2-1} e^{-u/2} \cdot \sqrt{\frac{u}{n}} du.$$

5. 整理后令 $y = \frac{u}{2}(1 + t^2/n)$, 得:

$$f_T(t) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{\pi n} \Gamma(n/2)} \cdot \frac{1}{(1 + t^2/n)^{(n+1)/2}}.$$

6. 均值为 0 (对称性), 方差为 $\frac{n}{n-2}$ (当 $n > 2$)。

结论: t 分布的 pdf 如上所示, 当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于标准正态分布。■

0.28. 弱大数定律的完整推导. 背景 (Background): 弱大数定律 (Weak Law of Large Numbers, WLLN) 表明, 当样本量趋于无穷时, 样本均值依概率收敛到总体均值。

目标 (Goal): 证明对于独立同分布的随机变量 $X_1, X_2, \dots$, 若 $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ 且 $\text{var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$, 则 $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$ 。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.29. 乘积收敛性的完整证明. 背景 (Background): 若 $X_n \xrightarrow{P} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{P} Y$, 在什么条件下有 $X_n Y_n \xrightarrow{P} XY$?

目标 (Goal): 证明乘积的收敛性定理。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.30. 样本方差一致性的完整推导. 背景 (Background): 样本方差 S_n^2 是总体方差 σ^2 的一致估计。

目标 (Goal): 证明 $S_n^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$ 。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.31. 均匀分布最大值的详细分析. 背景 (Background): 对于 $U(0, \theta)$ 分布, 样本最大值 Y_n 的分布分析。

目标 (Goal): 详细推导 Y_n 的期望、方差及其一致性。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.32. 退化分布的详细分析. 背景 (Background): 退化分布是所有概率质量集中于一点的分布。

目标 (Goal): 分析在什么情况下 $\bar{X}_n$ 收敛到退化分布。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.33. Stirling 公式. 背景 (Background): Stirling 公式用于近似阶乘: $n! \approx \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$ 。

目标 (Goal): 给出 Stirling 公式的推导。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.34. 均匀分布到指数分布的完整推导. 背景 (Background): 标准化后的均匀分布最大值收敛到指数分布。

目标 (Goal): 证明 $n(\max\{X_1, \dots, X_n\} - 1) \xrightarrow{D} \text{Exp}(1)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.35. 依概率收敛到依分布收敛的完整证明. 背景 (Background): 依概率收敛是依分布收敛的充分条件, 但非必要条件。

目标 (Goal): 证明当 $X_n \xrightarrow{P} c$ (常数) 时, 有 $X_n \xrightarrow{D} c$ 。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.36. Slutsky 定理的详细证明. 背景 (Background): Slutsky 定理允许在依分布收敛的极限中替换依概率收敛的随机变量。

目标 (Goal): 证明 Slutsky 定理的完整形式。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.37. 正态分布有界性的证明. 背景 (Background): 正态分布的尾部概率可以任意小。

目标 (Goal): 证明对任意 $\epsilon > 0$, 存在 η 使得 $\mathbb{P}[|X| > \eta] < \epsilon$ 。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.38. 乘积收敛到依概率收敛的完整证明. 背景 (Background): 若 $X_n \xrightarrow{P} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{P} 0$, 则 $X_n Y_n \xrightarrow{P} 0$ 。

目标 (Goal): 证明该定理。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.39. Δ 方法的完整推导. 背景 (Background): Δ 方法用于计算渐近分布的变换。

目标 (Goal): 证明若 $\sqrt{n}(X_n - \mu) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2)$, 则 $\sqrt{n}(g(X_n) - g(\mu)) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2[g'(\mu)]^2)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.40. 卡方分布 Δ 方法的详细推导. 背景 (Background): 将 Δ 方法应用于卡方变量的标准差。

目标 (Goal): 求 $\sqrt{n}(\sqrt{V_n} - \sqrt{v})$ 。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.41. 二项分布到泊松分布近似的误差分析. 背景 (Background): 当 n 增大、 p 减小时, 二项分布可用泊松分布近似。

目标 (Goal): 分析该近似的误差界。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.42. 中心极限定理的完整证明. 背景 (Background): 中心极限定理 (CLT) 是统计学中最重要的定理之一。

目标 (Goal): 用矩母函数方法证明独立同分布随机变量的 CLT。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.43. 均匀分布样本均值概率的详细计算. 背景 (Background): $U(0, 1)$ 样本均值 $\bar{X}$ 的分布不是正态, 但可用 CLT 近似。

目标 (Goal): 计算 $\mathbb{P}(\bar{X} \leq 0.5)$ 的精确值和近似值。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.44. 比例推断的详细讨论. 背景 (Background): 比例 p 的置信区间和假设检验。

目标 (Goal): 详细推导比例推断的渐近理论。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.45. 卡方检验的详细推导. 背景 (Background): 拟合优度 χ^2 检验的理论基础。

目标 (Goal): 推导 χ^2 统计量的渐近分布。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.46. 方差稳定化变换的详细讨论. 背景 (Background): 方差稳定化变换使得变换后的变量方差近似常数。

目标 (Goal): 推导方差稳定化变换的一般形式。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.47. 多元中心极限定理的完整证明. 背景 (Background): 多元 CLT 是一元 CLT 的推广。

目标 (Goal): 用 mgf 方法证明多元 CLT。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.48. Beta 分布的均值与方差推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出 Beta 分布的均值为 $\mathbb{E}X = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$, 方差为 $\text{var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$ 。这里给出完整推导。

目标 (Goal): 基于 Beta 分布的 pdf 推导其均值和方差。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.49. 正态分布的矩母函数推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的矩母函数为 $M(t) = \exp\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$ 。这里给出完整推导。

目标 (Goal): 证明正态分布的矩母函数。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.50. t 分布的推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出 t 分布的 pdf。这里基于正态变量和卡方变量的比值给出完整推导。

目标 (Goal): 推导 t 分布的 pdf 并验证其性质。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.51. F 分布的推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出 F 分布的 pdf。这里基于两个独立卡方变量的比值给出完整推导。

目标 (Goal): 推导 F 分布的 pdf。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.52. F 分布的均值与方差推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出 F 分布的均值为 $\frac{n}{n-2}$ (当 $n > 2$)，方差为 $\frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}$ (当 $n > 4$)。这里给出完整推导。

目标 (Goal): 基于 F 分布的定义推导其均值和方差。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.53. Poisson 分布的均值与方差推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出 Poisson 分布的均值为 λ ，方差也为 λ 。这里给出完整推导。

目标 (Goal): 基于 Poisson 分布的 pmf 推导其均值和方差。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.54. 正态变量线性组合的推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出若 $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 独立，则 $aX_1 + bX_2 \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$ 。这里给出完整证明。

目标 (Goal): 证明正态变量线性组合的分布性质。

推导步骤 (Derivation Steps): 占位符内容 (待补充)。

0.55. 条件密度与 Radon-Nikodym 定理. 背景 (Background): 在连续情形，条件概率 $\mathbb{P}(X_2 \in B \mid X_1 = x_1)$ 需要用条件密度来定义。

目标 (Goal): 解释条件密度的数学基础——Radon-Nikodym 定理。

推导步骤 (Derivation Steps): 详细推导见 chapter2.tex 第 ?? 节。

0.56. Rao-Blackwell 定理. 背景 (Background): Rao-Blackwell 定理是统计推断中的核心结果，它告诉我们如何利用条件期望改进估计。

目标 (Goal): 证明若 T 是充分统计量的函数，则 $\mathbb{E}(T \mid S)$ 比 T 更精确。

推导步骤 (Derivation Steps): 详细推导见 chapter2.tex 第 ?? 节。

0.57. 贝叶斯公式推导. 背景 (Background): 贝叶斯公式是连接先验与后验的桥梁。

目标 (Goal): 从条件概率的基本定义推导出贝叶斯公式。

推导步骤 (Derivation Steps): 详细推导见 chapter2.tex 第 ?? 节。

0.58. 贝叶斯方法历史概述. 背景 (Background): 贝叶斯方法经历了漫长的发展历程。

目标 (Goal): 概述贝叶斯方法的历史演变。

推导步骤 (Derivation Steps): 详细讨论见 chapter2.tex 第 ?? 节。

0.59. 独立 $\Rightarrow$ 不相关的反例. 背景 (Background): 独立意味着不相关, 但不相关并不意味着独立。

目标 (Goal): 构造不相关但不独立的反例。

推导步骤 (Derivation Steps): 详细反例见 chapter2.tex 第 ?? 节。

0.60. 回归理论的简要推导. 背景 (Background): 回归理论建立了条件均值与线性预测之间的联系。

目标 (Goal): 推导最小二乘估计与相关系数的关系。

推导步骤 (Derivation Steps): 详细推导见 chapter2.tex 第 ?? 节。

0.61. 两两独立不推出相互独立反例. 背景 (Background): 两两独立是 mutual independence 的必要条件, 但不充分。

目标 (Goal): 构造两两独立但不相互独立的反例 (Bernstein's example)。

推导步骤 (Derivation Steps): 详细反例见 chapter2.tex 第 ?? 节。

0.62. 中心极限定理概述. 背景 (Background): 中心极限定理 (CLT) 是概率论和统计学中最重要的结果之一。

目标 (Goal): 概述 CLT 的内容和意义。

推导步骤 (Derivation Steps): 详细讨论见 chapter2.tex 第 ?? 节。

1. 问答记录

1.1. 置信区间的频率派解释. 问：很多初学者把置信区间的定义 $\mathbb{P}_\theta(L \leq \theta \leq U) = 1 - \alpha$ 误解为“ θ 有 $1 - \alpha$ 的概率落在区间 $[L, U]$ 中”。这两种解释有什么区别？哪个是正确的，为什么？

答：这是一个关于频率派与贝叶斯派对置信区间不同理解的核心问题。

关键区别：在频率派统计中， θ 是**固定（但未知）的常数**，而区间 $[L, U]$ 是**随机的**（因为它依赖于样本数据）。因此，我们不能对固定参数 θ 做概率陈述。

正确的频率派解释：如果我们重复抽样很多次，构造置信区间，那么 $100(1 - \alpha)\%$ 的区间会包含真实的 θ 。但对于任何**单次**观察到的区间，真实的 θ 要么在里面，要么不在里面——没有概率可言。

举例说明：设硬币抛掷 $n = 100$ 次， $\hat{p} \sim \text{Binomial}(100, \theta)/100$ 。

- 对于**单一样本**：观察到的区间是某个具体区间如 $[0.45, 0.55]$ ，真实的 θ 要么在里面，要么不在——无法赋予概率。
- 对于**重复抽样**：如果用同样的真实 θ 做 1000 次实验，约 950 次构造出的区间会包含 θ 。这就是“95% 置信度”的含义。

贝叶斯派的理解则不同：在贝叶斯统计中， θ 被视为随机变量（需要先验分布），可以得到“后验可信区间” $P(\theta \in [L, U] \mid \text{data}) = 1 - \alpha$ 。这里的概率是关于 θ 的，可以合理地说是“ θ 有 95% 的概率在这个区间内”。

总结对比：

表述	频率派有效?	含义
$P(\theta \in [L, U]) = 0.95$	否	θ 是固定的
“用此方法构造的区间中 95% 包含 θ ”	是	概率在区间构造上
$P(\theta \in [L, U] \mid \text{data}) = 0.95$	仅在贝叶斯框架下成立	需要对 θ 设定先验分布

置信区间 (confidence interval) 这一术语是**频率派概念**，它描述的是构造过程的可靠性，而不是关于某个固定区间的概率。

1.2. 贝叶斯先验分布的具体例子. 问：在之前关于置信区间的回答中提到，贝叶斯学派认为 θ 需要先验分布。能给出一些具体的先验分布例子吗？先验分布到底代表什么？

答：这是一个很好的问题。在贝叶斯统计中，我们将参数 θ 视为随机变量，因此在推断前必须为其指定一个**先验分布** (prior distribution)，表达我们对参数的初始信念。以下是几个经典例子。

例 1：硬币抛掷 (Bernoulli 分布) ——Beta 先验

设硬币正面朝上的概率为 θ ，抛掷 n 次得到 Y 次正面，则 $Y \sim \text{Binomial}(n, \theta)$ 。

共轭先验：我们为 θ 选择 Beta 分布作为先验：

$$\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$$

其 pdf 为:

$$\pi(\theta) = \frac{\theta^{\alpha-1}(1-\theta)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}, \quad 0 < \theta < 1$$

直观理解: Beta 分布是 $[0, 1]$ 区间上的灵活分布, 参数 (α, β) 控制先验信念:

- $\alpha = \beta = 1$: 均匀分布 (无信息先验), 表示”对 θ 一无所知”
- $\alpha = \beta = 2$: 表示” θ 可能接近 0.5” 的信念 (对称且集中)
- $\alpha = 3, \beta = 1$: 表示” θ 更可能接近 1” 的信念

为什么选择 Beta 分布? 因为它是 Bernoulli/binomial 的共轭先验——后验分布与先验分布具有相同的函数形式, 计算极为方便。观测数据后, 后验分布为:

$$\theta | Y \sim \text{Beta}(\alpha + Y, \beta + n - Y)$$

例 2: 正态均值——正态先验

设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, θ 未知。

共轭先验: 我们为 θ 选择正态分布作为先验:

$$\theta \sim N(\mu_0, \tau_0^2)$$

其中 μ_0 是先验均值 (你对 θ 的初始猜测), τ_0^2 是先验方差 (你对这个猜测的信心)。

直观理解:

- τ_0^2 很大: 先验方差大, 表示对 θ 的初始信念很模糊
- τ_0^2 很小: 先验方差小, 表示对 θ 有很强的先验信念
- $\mu_0 = 0$: 如果你没有任何理由偏好正值或负值

后验分布: 观测数据后, 后验分布为:

$$\theta | \bar{x} \sim N\left(\frac{\frac{\mu_0}{\tau_0^2} + \frac{n\bar{x}}{\sigma^2}}{\frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}}, \frac{1}{\frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}}\right)$$

这是又一个正态分布——共轭性的体现。

为什么需要先验分布? 先验代表什么?

先验分布 (prior distribution) 代表我们在**观测数据之前**对参数 θ 的主观信念 (subjective belief)。这可以从两个角度理解:

- (1) **主观贝叶斯视角:** 先验反映了个人的真实信念。例如, 如果你认为硬币”通常”是公平的, 你可以将先验设为 $\theta \sim \text{Beta}(2, 2)$ (中心在 0.5, 但允许不确定性)。
- (2) **客观贝叶斯视角:** 选择尽量”无信息”的先验, 使后验主要由数据驱动。例如, $\text{Beta}(1, 1)$ (均匀分布) 或 Jeffreys 先验 $\text{Beta}(1/2, 1/2)$ 。

贝叶斯推断的本质是通过贝叶斯定理将先验更新为后验:

$$\underbrace{\pi(\theta | \text{data})}_{\text{后验}} \propto \underbrace{L(\theta | \text{data})}_{\text{似然}} \times \underbrace{\pi(\theta)}_{\text{先验}}$$

数据通过似然函数”告诉”我们信息, 先验通过贝叶斯定理被更新为后验。后验分布集中了所有关于 θ 的信息——既包含先验信念, 也包含数据证据。

先验 vs. 后验的直观理解：

	先验 (Prior)	后验 (Posterior)
时机	看到数据之前	看到数据之后
性质	主观信念或无信息设定	更新后的知识状态

总结：先验分布是贝叶斯统计的标志性特征。它将参数视为随机变量，允许我们以概率语言描述对参数的认知，并通过数据不断更新这种认知。这与频率派的“参数固定但未知”观点形成了根本性对比。

1.3. 参数方法 vs. 非参数方法. 问：在 Chapter 4 的 §4.1 中提到，当 $f(x)$ 或 $p(x)$ 的形式完全未知时，属于哪种统计方法？在哪一章深入讨论？

答：

- 形式完全未知的情况属于**非参数方法** (Nonparametric Methods)
- 在 Chapter 4 的 §4.1.2 有简要提及（直方图估计）
- 深入讨论在 **Chapter 10** (Nonparametric Methods)

简单区分：

场景	方法	章节
分布形式未知	非参数方法（直方图、核密度估计）	Chapter 10
分布形式已知、参数未知	参数方法（MLE、CI、检验）	Chapter 4

1.4. 无偏性过渡到 MLE 的动机. 问：在介绍完无偏估计量的定义后，笔记写道：“无偏性并不保证估计量‘最好’。例如，样本方差 S^2 是无偏的，但 $n^{-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 是有偏的。这引发了一个自然的问题：能否找到一个统一的、‘最优’的估计原则？”为什么要举这个例子？它在整个章节中起什么作用？

答：这是一个**承上启下的关键过渡**。

- 防止误解：**学生刚学完无偏性，容易误以为“无偏 = 最好估计量”。
- 揭示张力：**无偏性只是一个**基本要求**，不是“最优性”的保证。无偏的估计量可以有**很多**，且各有**优劣**。
- 引出 MLE：**正因为无偏性不够，我们需要找“统一的最优原则”——这正是最大似然估计（MLE）被提出的**动机**。

逻辑链条：

无偏性定义 → 揭示局限性 → 引出 MLE 作为统一原则

具体例子：

- S^2 （无偏）和 $\hat{\sigma}^2$ （有偏，但 MLE）
- 两者都常用，但各有用途
- “最优”需要更精确的定义（后续章节的 UMVUE）

数学写作手法：先介绍概念，再指出局限性，自然引出下一个概念——这是 Stein 风格的典型特征，强调“为什么需要”而非直接罗列。

学习笔记.