

Differential Geometry of Curves and Surfaces

Manfredo P. do Carmo

May 11, 2026

Contents

引言：文献概述与背景知识	5
0.1 总述	5
0.2 文献概述	5
0.3 背景知识安排	6
0.4 学习路径	6
0.5 与其他教材的关系	6
1 Curves	7
1.1 Introduction	7
1.2 Parametrized Curves	8
1.3 Regular Curves; Arc Length	14
1.4 The Vector Product in $\mathbb{R}^3$	22
1.5 The Local Theory of Curves Parametrized by Arc Length	27
1.5.1 The Curvature	27
1.5.2 The Torsion (Or Bending)	28
1.5.3 The Frenet-Serret Formulas	29
1.6 The Local Canonical Form	38
1.7 Global Properties of Plane Curves	40
2 Regular Surfaces	57
2.1 Introduction	57
2.2 Regular Surfaces; Inverse Images of Regular Values	58
2.3 Change of Parameters; Differentiable Functions on Surfaces	77
2.4 The Differential of a Map; Tangent Plane	83
2.5 The First Fundamental Form	91
2.6 Orientation on Surfaces	98
2.7 A Characterization of Compact Orientable Surfaces	103
2.8 A Geometric Definition of Area	109
3 The Geometry of Surfaces	115
3.1 The Gauss Map and Its Fundamental Properties	115
3.1.1 The Gauss Map	115
3.1.2 The Weingarten Map (Shape Operator)	116
3.1.3 The Second Fundamental Form	118
3.2 The Gauss Map in Local Coordinates	131

3.2.1	Normal Curvature	131
3.2.2	Principal Curvatures and Directions	134
3.2.3	Euler Formula and Dupin Indicatrix	135
3.2.4	Theorema Egregium	136
3.2.5	The Fundamental Equations	137
3.3	Vector Fields on Surfaces	150
3.4	Ruled Surfaces and Minimal Surfaces	157
3.4.1	Ruled Surfaces	157
3.4.2	Minimal Surfaces	158

引言：文献概述与背景知识

0.1 总述

本笔记学习的主题是 **微分几何 (differential geometry)** ——研究曲线和曲面几何性质的数学分支。这门学科发端于微积分诞生之时，由 Gauss、Riemann 等数学家发展成熟。

本笔记以 Manfredo P. do Carmo 的经典教材《Differential Geometry of Curves and Surfaces》为主线，系统学习曲线与曲面的局部理论。

0.2 文献概述

Differential Geometry of Curves and Surfaces

作者: Manfredo P. do Carmo

出版社: Dover Publications (Revised & Updated Second Edition, 2016)

原版: Prentice-Hall, 1976

页数: 约 500 页

内容简介: 这是微分几何领域最经典的入门教材之一。do Carmo 来自巴西 IMPA (数学与应用数学研究所)，他的这本书以清晰、严谨的风格著称。

全书分为五章：

- **第 1 章** 曲线理论—局部几何 (曲率、挠率、Frenet-Serret 公式)
- **第 2 章** 正则曲面—曲面的定义、切平面、第一基本形式
- **第 3 章** Gauss 映射—曲面的曲率、第二基本形式
- **第 4 章** 曲面内在几何—等距映射、测地线、Gauss-Bonnet 定理
- **第 5 章** 整体微分几何—曲面的整体性质

写作特点:

- 每章开头有引言，说明该章内容和学习路线
- 大量详细的例子和图示
- 习题丰富，配有提示和答案
- 强调几何直观与代数方法的结合

前置要求:

- 线性代数（向量、矩阵、行列式）
- 多变量微积分（偏导数、链式法则、积分）
- 微分方程（初步了解即可）

0.3 背景知识安排

第 1 章收集学习曲线理论所需的**纯数学基础**，包括：

1. **欧氏空间 $\mathbb{R}^n$** — 向量、范数、内积的基本性质
2. **向量值函数** — 求导法则、链式法则
3. **向量积（叉积）** — $\mathbb{R}^3$ 中特有的运算
4. **行列式与有向体积** — 标量三重积的几何意义

这些内容大部分来自本科线性代数和微积分课程。这里统一整理，便于后续查阅。

0.4 学习路径

根据 do Carmo 在 Preface 中的建议，本笔记采用以下学习顺序：

1. **第 1 步**: 阅读第 1 章的背景知识
2. **第 2 步**: 学习第 1 章（曲线）— 1-2 节到 1-5 节是核心，1-6、1-7 节是拓展
3. **第 3 步**: 学习第 2 章（曲面）— 2-2、2-3 节是基础，2-4、2-5 节是核心
4. **第 4 步**: 深入第 3-4 章（Gauss 映射、内在几何）
5. **第 5 步**: 选读第 5 章（整体微分几何）

0.5 与其他教材的关系

微分几何的标准教材还有：

- do Carmo（本书）— 注重几何直观，例子丰富
- Klingenberg — 更代数化，强调抽象理论
- O'Neill — 入门友好，风格接近 do Carmo
- Morgan — 更加入门，适合本科生

do Carmo 的这本书适合作为**第一本**微分几何教材。

注 0.1. 主文献: *do Carmo - Differential Geometry of Curves and Surfaces*

注 0.2. 学习顺序: 先曲线，再曲面，最后整体理论

Chapter 1

Curves

1.1 Introduction

The problem we face. 我们生活在一个三维空间中，而视觉是我们感知世界的主要方式之一。当我们观察一条曲线——无论是一条道路、一条河流的轮廓、还是行星在天空中的运动轨迹——我们的大脑本能地识别它的“弯曲程度”。这种对弯曲的直观感知，引导我们提出一个根本性的问题：

如何用精确的数学语言来描述曲线的弯曲程度？

这个问题看似简单，却贯穿了整个微分几何的发展历程。从欧几里得几何中直线与圆的基本定义，到高斯研究曲面的内在几何，再到达布（Darboux）建立曲线与曲面的局部理论，这个问题的答案逐渐清晰：曲线的弯曲程度可以通过其在一点处的加速度来度量。

The main theme. 微分几何研究的是曲线和曲面的几何性质。与微积分研究函数变化不同，微分几何关注的是空间中曲线和曲面的“形状”——弯曲程度、扭曲程度等内在几何量。

经典微分几何始于微积分诞生之时，其核心是研究曲线和曲面的**局部性质**（local properties）——即那些仅依赖于曲线或曲面在一点附近行为的几何性质。使用的工具正是微分计算。我们将会看到，一个出人意料的事实是：空间曲线的形状完全由两个函数决定——曲率（curvature）和挠率（torsion）。

A guiding example. 在学习曲线的理论时，一个例子将贯穿始终，这就是圆柱螺旋线（cylindrical helix）。想象一条弹簧从空中掉落，它在空中划出的轨迹就是螺旋线。螺旋线的非凡之处在于：它在弯曲的同时保持恒定的扭转率。这种“均匀弯曲 + 均匀扭曲”的特性，使其成为理解曲率与挠率概念的完美载体。

Organization of this chapter. 本章的组织方式如下。1-2 节到 1-4 节包含基础内容（参数曲线、弧长、向量积），可作为复习；1-5 节是核心，引入曲率和挠率的概念；1-6 节和 1-7 节讨论局部标准形式和整体性质。若只想学习曲面，可以跳过 1-6、1-7 节。



(a) Figure 1-1. 圆柱螺旋线 (helix) — 弯曲与扭曲的完美结合



(b) Figure 1-2. 奇异点例子—曲线在尖点处不可微



(a) Figure 1-3. 非单射曲线例子—同一点被多次经过

1.2 Parametrized Curves

Why parametrization? 在我们提出“如何描述曲线的弯曲程度”这个问题之后，自然的下一步是找到描述曲线的数学工具。我们已经知道，微积分是研究函数变化的有力武器——那么，是否可以将曲线视为某种“函数”，从而运用微分学的工具？

这个想法引导我们引入**参数化**的概念。其核心思想简单而优雅：将曲线看作一个从区间到空间的映射。例如，当我们说“质点沿曲线运动”时，时间 t 是参数，位置 $\alpha(t)$ 是 t 的函数。这种视角不仅统一了古代对圆、椭圆等特殊曲线的研究，更为重要的是，它让我们能够使用导数来研究曲线的局部几何性质。

接下来，我们首先回顾 $\mathbb{R}^3$ 中向量内积的基本性质，这对后续讨论至关重要。

注 1.1. 设 $u = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$ ，定义其范数（或长度）为

$$|u| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}.$$

几何上， $|u|$ 是点 (u_1, u_2, u_3) 到原点 $O = (0, 0, 0)$ 的距离。

设 $u = (u_1, u_2, u_3)$ 和 $v = (v_1, v_2, v_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的向量， θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 是线段 Ou 和 Ov 之间的夹角。内积 $u \cdot v$ 定义为（教材 Figure 1-6（见 fig. 1.3a））：

$$u \cdot v = |u||v| \cos \theta.$$

内积的基本性质：

1. 若 u 和 v 为非零向量，则 $u \cdot v = 0$ 当且仅当 u 与 v 正交；
2. $u \cdot v = v \cdot u$ ；
3. $\lambda(u \cdot v) = \lambda u \cdot v = u \cdot \lambda v$ ；
4. $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$ 。



(a) Figure 1-6. 内积的几何意义

The central notion. 我们用 $\mathbb{R}^3$ 表示所有三元实数有序组 (x, y, z) 的集合。现在，我们正式引入参数化曲线的概念。

定义 1.1 (可微参数曲线). **可微参数曲线**是一个可微映射

$$\alpha: \mathbf{I} \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

其中 $\mathbf{I} = (a, b)$ 是实数直线 $\mathbb{R}$ 上的一个开区间。

可微意味着 α 将每个 $t \in I$ 映射到点 $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t)) \in \mathbb{R}^3$, 其中函数 $x(t), y(t), z(t)$ 都是可微的。变量 t 称为曲线的**参数**。

如果记 $x(t)$ 在 t 处的一阶导数为 $x'(t)$, 等等, 则向量

$$(x'(t), y'(t), z'(t)) = \alpha'(t) \in \mathbb{R}^3$$

称为曲线 α 在 t 处的**切向量** (tangent vector) 或**速度向量** (velocity vector)。像集 $\alpha(I) \subset \mathbb{R}^3$ 称为 α 的**迹** (trace)。如下面的例 5 所示, 我们必须注意区分参数曲线 (它是一个映射) 和它的迹 (它是 $\mathbb{R}^3$ 的一个子集)。

注 1.2. 术语说明: 许多人用 “无限可微” 来表示具有各阶导数 (且自动连续) 的函数, 而用 “可微” 仅表示一阶导数的存在性。我们不采用这种用法——本书中 “可微” 意味着所有阶导数都存在。

Examples. 为了建立直觉, 我们来看几个关键的例子, 它们将贯穿本章的讨论。



(a) Figure 1-1. 圆柱螺旋线 (helix)



(b) Figure 1-2. 奇异点例子

例 1.1 (圆柱螺旋线). 参数方程

$$\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad t \in \mathbb{R}$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中的迹是圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 上的螺旋线 (helix), 螺距 (pitch) 为 $2\pi b$ 。这里参数 t 测量的是 x 轴与从原点 O 到点 $\alpha(t)$ 在 xy 平面上投影点的连线之间的夹角 (教材 Figure 1-1 (见 fig. 1.4a))。

正如本章引言所述，螺旋线将成为我们理解曲率与挠率的完美载体——它的“均匀弯曲 + 均匀扭曲”特性，使其在后续讨论中反复出现。

例 1.2 (奇异点). 映射 $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (t^3, t^2)$, 是一条可微参数曲线 (教材 Figure 1-2 (见 fig. 1.4b)). 注意 $\alpha'(0) = (0, 0)$ ——即 $t = 0$ 处的速度向量为零。这样的点称为**奇异点** (singular point)。

奇异点的出现提醒我们：可微的参数方程并不保证曲线在每一点都有“良好”的行为。




(a) Figure 1-3. 非单射曲线例子

例 1.3 (非单射曲线). 映射 $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$, 是一条可微参数曲线 (教材 Figure 1-3 (见 fig. 1.5a)). 注意 $\alpha(2) = \alpha(-2) = (0, 0)$ ——即映射 α 不是单射。


这个例子说明一个重要事实：参数化与曲线本身是不同的概念。同一条曲线可以有多种参数化方式。

例 1.4 (不可微曲线). 映射 $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (t, |t|)$, $t \in \mathbb{R}$, 不是可微参数曲线，因为 $|t|$ 在 $t = 0$ 处不可微 (教材 Figure 1-4 (见 fig. 1.6a)).

这个例子表明我们的定义排除了“带尖角”的曲线——这正是微分几何研究平滑曲线的自然选择。



(a) Figure 1-4. 不可微曲线 $(t, |t|)$



(b) Figure 1-5. 相同圆的不同参数化

例 1.5 (相同迹的不同参数化). 两条不同的参数曲线

$$\alpha(t) = (\cos t, \sin t), \quad \beta(t) = (\cos 2t, \sin 2t),$$

其中 $t \in (-\epsilon, 2\pi + \epsilon)$, $\epsilon > 0$, 具有相同的迹——即单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 。但第二条曲线的速度向量是第一条的两倍 (教材 Figure 1-5 (见 fig. 1.6b))。

这引出一个关键观察: 曲线的“形状”(迹)与描述它的“方式”(参数化)是不同的概念。这种区别在后续引入弧长参数化时将变得尤为重要。

1-2 节练习

练习 1-2, 1 —do Carmo, Exercise 1-2, 1 Find a parametrized curve $\alpha(t)$ whose trace is the circle $x^2 + y^2 = 1$ such that $\alpha(t)$ runs clockwise around the circle with $\alpha(0) = (0, 1)$.

解答 直观理解: 标准逆时针参数化为 $(\cos t, \sin t)$ 。要得到顺时针且 $\alpha(0) = (0, 1)$, 只需交换 $\sin$ 和 $\cos$ 的位置并调整符号。

解答: 取

$$\alpha(t) = (\sin t, \cos t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

验证:

- $\alpha(0) = (0, 1)$
- $\alpha'(t) = (\cos t, -\sin t)$, 故 $\alpha'(0) = (1, 0)$
- 当 t 从 0 增加时, $x = \sin t$ 增大而 $y = \cos t$ 减小——沿顺时针方向运动
- $|\alpha(t)|^2 = \sin^2 t + \cos^2 t = 1$, 故轨迹在单位圆上

练习 1-2, 2 —do Carmo, Exercise 1-2, 2 Let $\alpha(t)$ be a parametrized curve which does not pass through the origin. If $\alpha(t_0)$ is a point of the trace of α closest to the origin and $\alpha'(t_0) \neq 0$, show that the position vector $\alpha(t_0)$ is orthogonal to $\alpha'(t_0)$.

解答 直观理解: 到原点最近的距离点等价于距离平方函数 $|\alpha(t)|^2$ 取得最小值。在极值点处, 导数必为零。

证明: 考虑距离平方函数 $f(t) = |\alpha(t)|^2 = \alpha(t) \cdot \alpha(t)$ 。由于 $\alpha(t_0)$ 是离原点最近的点, $f(t)$ 在 t_0 处取得最小值。求导得

$$f'(t) = 2\alpha(t) \cdot \alpha'(t).$$

在最小值点 t_0 处 $f'(t_0) = 0$, 故

$$2\alpha(t_0) \cdot \alpha'(t_0) = 0.$$

因此 $\alpha(t_0)$ 与 $\alpha'(t_0)$ 正交。□

练习 1-2, 3 —do Carmo, Exercise 1-2, 3 A parametrized curve $\alpha(t)$ has the property that its second derivative $\alpha''(t)$ is identically zero. What can be said about α ?

解答 直观理解： $\alpha''(t) = 0$ 意味着加速度为零，速度为常数——曲线是一条直线。

证明： 由于 $\alpha''(t) = 0$ 对所有 t 成立，积分一次得

$$\alpha'(t) = \mathbf{c}_1 \quad (\text{常数向量}).$$

再积分一次：

$$\alpha(t) = \mathbf{c}_1 t + \mathbf{c}_2,$$

其中 $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathbb{R}^3$ 为常数向量。

因此 α 是仿射函数，其轨迹是一条直线（若限制定义域则为线段）。□

练习 1-2, 4 —do Carmo, Exercise 1-2, 4 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a parametrized curve and let $v \in \mathbb{R}^3$ be a fixed vector. Assume that $\alpha'(t)$ is orthogonal to v for all $t \in I$ and that $\alpha(0)$ is also orthogonal to v . Prove that $\alpha(t)$ is orthogonal to v for all $t \in I$.

解答 直观理解： 若速度始终垂直于 v ，且起点也垂直于 v ，则整个轨迹都垂直于 v 。

证明： 设 $f(t) = \alpha(t) \cdot v$ ，则

$$f'(t) = \alpha'(t) \cdot v = 0 \quad \text{对所有 } t \in I \text{ 成立.}$$

故 $f'(t) = 0$ 意味着 $f(t)$ 为常数。由假设 $\alpha(0) \cdot v = 0$ ，得 $f(t) = 0$ 对所有 t 成立，即 $\alpha(t) \cdot v = 0$ ，故 $\alpha(t)$ 始终与 v 正交。□

练习 1-2, 5 —do Carmo, Exercise 1-2, 5 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a parametrized curve, with $\alpha'(t) \neq 0$ for all $t \in I$. Show that $|\alpha(t)|$ is a nonzero constant if and only if $\alpha(t)$ is orthogonal to $\alpha'(t)$ for all $t \in I$.

解答 直观理解： $|\alpha|$ 为常数意味着曲线始终在以原点为球心的球面上运动。球面的切向量必与半径向量正交。

证明 ($\Rightarrow$): 设 $|\alpha(t)| = c \neq 0$ 为常数，则

$$|\alpha(t)|^2 = c^2 \implies \alpha(t) \cdot \alpha(t) = c^2.$$

对 t 求导：

$$2\alpha(t) \cdot \alpha'(t) = 0 \implies \alpha(t) \cdot \alpha'(t) = 0,$$

故 α 与 α' 正交。

证明 ($\Leftarrow$): 反之，若 $\alpha(t) \cdot \alpha'(t) = 0$ 对所有 t 成立，则

$$\frac{d}{dt}[\alpha(t) \cdot \alpha(t)] = 2\alpha(t) \cdot \alpha'(t) = 0.$$

故 $|\alpha(t)|^2 = \alpha(t) \cdot \alpha(t)$ 为常数。由于 $\alpha'(t) \neq 0$ 对所有 t 成立，曲线是正则的， $|\alpha|$ 不可能为零（否则 $|\alpha(t)| = 0$ 恒成立将导出 α 为零曲线，与 $\alpha' \neq 0$ 矛盾）。因此 $|\alpha|$ 为非零常数。□

1.3 Regular Curves; Arc Length

The need for regular curves. 当我们引入参数化曲线的概念后，自然会问：是否每个可微参数曲线都能用微分学的工具来研究？

答案并非总是肯定的。我们已经看到，奇异点（如 $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ 在 $t = 0$ 处）的出现会导致切向量为零，这会给后续的微分运算带来麻烦。更根本的是：如果 $\alpha'(t) = 0$ ，那么在该点处就不存在确定的切线——这对于研究曲线的“弯曲程度”是致命的。

因此，在研究曲线的微分几何时，我们必须把注意力限制在每一点都有良好定义的切线的曲线上。这引导我们引入正则曲线的概念。

设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条可微参数曲线。对于每个满足 $\alpha'(t) \neq 0$ 的 $t \in I$ ，存在一条唯一定义直线，它经过点 $\alpha(t)$ 且与向量 $\alpha'(t)$ 平行。这条直线称为曲线 α 在 t 处的**切线** (tangent line)。

定义 1.2 (正则曲线). 如果 $\alpha'(t) \neq 0$ 对所有 $t \in I$ 成立，则称可微参数曲线 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为**正则曲线** (regular curve)。

Why arc length? 在有了正则曲线的概念之后，我们转向一个更基本的问题：如何测量曲线的长度？

这个问题看似简单，却揭示了微分几何的一个核心思想。直观上，曲线的长度应该是其“内在”属性——它不应该依赖于我们如何参数化这条曲线。果真如此吗？

答案是肯定的，这正是弧长公式的非凡之处。


定义 1.3 (弧长). 设 $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条可微曲线。 α 从 $t = a$ 到 t 的**弧长** (arc length) 定义为

$$s(t) = \int_a^t \|\alpha'(u)\| du.$$


弧长是曲线的内在不变量，与参数化选择无关。



(a) Figure 1-7. 旋轮线 (cycloid)



(a) Figure 1-8. Diocles 割舌线 (cissoid)



(b) Figure 1-9. 曳物线 (tractrix)

命题 1.4 (弧长参数化). 设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是正则曲线。定义

$$s(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(u)\| du,$$

其中 $t_0 \in I$ 是固定点。由于 α 是正则的, $s'(t) = \|\alpha'(t)\| > 0$, 所以 s 是严格递增的, 可以取逆函数 $t(s)$ 。则 $\beta(s) = \alpha(t(s))$ 是单位速度曲线。

定义 1.5 (单位速度曲线). 如果 $\|\alpha'(t)\| = 1$ 对所有 t 成立, 则称 α 为**单位速度曲线** (unit speed curve) 或**弧长参数化曲线**。

从现在开始, 除非特别说明, 我们将使用弧长 s 作为参数, 即 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线。

注 1.3. 弧长参数化后, 速度向量恒为 1, 这是最自然的参数化方式。此时 $\alpha'(s)$ 是单位切向量。

例 1.6 (圆的弧长). 半径为 a 的圆可以参数化为 $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, 0)$, $t \in [0, 2\pi]$ 。则弧长


$$s(t) = \int_0^t \|\alpha'(u)\| du = \int_0^t a du = at,$$

所以从 $t = 0$ 到 $t = 2\pi$ 的全长是 $2\pi a$ 。


例 1.7 (圆柱螺旋线的弧长). 圆柱螺旋线 $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ 的速度向量为 $\alpha'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$, 模长为

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

因此弧长为 $s(t) = \sqrt{a^2 + b^2} t$.



(a) Figure 1-10. 笛卡尔叶形线 (folium of Descartes)



(b) Figure 1-11. 对数螺旋线 (logarithmic spiral)

1-3 节练习

练习 1-3, 1 —do Carmo, Exercise 1-3, 1 Show that the tangent lines to the regular parametrized curve $\alpha(t) = (3t, 3t^2, 2t^3)$ make a constant angle with the line $y = 0, z = x$.

解答 直观理解: 直线 $y = 0, z = x$ 的方向向量为 $(1, 0, 1)$ 。曲线 α 的切向量为 $\alpha'(t) = (3, 6t, 6t^2) = 3(1, 2t, 2t^2)$ 。我们只需计算切向量与固定方向向量之间的夹角, 验证其是否与 t 无关。

解答: 方向向量 $(1, 0, 1)$ 与 $\alpha'(t)$ 之间的夹角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{\alpha'(t) \cdot (1, 0, 1)}{|\alpha'(t)| \cdot |(1, 0, 1)|} = \frac{3 + 0 + 6t^2}{\sqrt{9 + 36t^2 + 36t^4} \cdot \sqrt{2}} = \frac{3(1 + 2t^2)}{3\sqrt{1 + 4t^2 + 4t^4} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1 + 2t^2}{\sqrt{2(1 + 2t^2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

因此 $\theta = \arccos(1/\sqrt{2}) = \pi/4$, 为常数, 与 t 无关。□

练习 1-3, 2 —do Carmo, Exercise 1-3, 2 A circular disk of radius 1 in the plane xy rolls without slipping along the x axis. The figure described by a point of the circumference of the disk is called a cycloid (see fig. 1.7a, do Carmo, Figure 1-7).

- Obtain a parametrized curve $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ the trace of which is the cycloid, and determine its singular points.
- Compute the arc length of the cycloid corresponding to a complete rotation of the disk.

解答 直观理解：当圆盘滚动时，边缘上的点同时参与两种运动——圆盘中心的平移（速度为 1）和绕中心的旋转。参数 t 即为旋转角。

解答：

参数化：当圆盘旋转角为 t 时，圆心在 $(t, 1)$ 。相对圆心，原来在 $(0, 0)$ 的点旋转了角 t ，相对位置为 $(-\sin t, -\cos t)$ 。故

$$\alpha(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

奇异点： $\alpha'(t) = (1 - \cos t, \sin t)$ 。令 $\alpha'(t) = 0$ 得

$$1 - \cos t = 0, \quad \sin t = 0 \implies t = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots$$

这些是旋轮线的尖点。

一周的弧长 ($t \in [0, 2\pi]$):

$$|\alpha'(t)| = \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} = \sqrt{2 - 2\cos t} = 2|\sin(t/2)|.$$

故

$$s = \int_0^{2\pi} 2|\sin(t/2)| dt = 4 \int_0^\pi \sin u du = 4 \cdot 2 = 8.$$

旋轮线一个拱的弧长为 8。□

练习 1-3, 3 —do Carmo, Exercise 1-3, 3 Let $OA = 2a$ be the diameter of a circle S^1 . Prove that:

a. The trace of

$$\alpha(t) = \left(\frac{2at^2}{1+t^2}, \frac{2at^3}{1+t^2} \right), \quad t \in \mathbb{R},$$

is the cissoid of Diocles (教材 Figure 1-8 (见 fig. 1.8a))。

b. The origin $(0, 0)$ is a singular point of the cissoid.

c. As $t \rightarrow \infty$, $\alpha(t)$ approaches the line $x = 2a$ (asymptote).

解答 直观理解：Diocles 割舌线是由参数方程通过消参得到的代数曲线。它有一个特点：原点是其奇异点（尖点），且曲线以 $x = 2a$ 为渐近线。

解答：

(a) **消参：**由 $x = \frac{2at^2}{1+t^2}$ 解得 $t^2 = \frac{x}{2a-x}$ 。代入 y 得

$$y = \frac{2at^3}{1+t^2} = t \cdot \frac{2at^2}{1+t^2} = t \cdot x = x \sqrt{\frac{x}{2a-x}}.$$

整理得 $y^2 = \frac{x^3}{2a-x}$ ，即 $x^3 + (2a-x)y^2 = 0$ ，这就是 cissoid。

(b) **奇异点：**在 $t = 0$ 处， $\alpha(0) = (0, 0)$ ，导数 $\alpha'(0) = (0, 0)$ ，故原点是奇异点。

(c) **渐近线：**当 $t \rightarrow \infty$ 时， $\frac{t^2}{1+t^2} \rightarrow 1$ ， $\frac{t^3}{1+t^2} \rightarrow t \rightarrow \infty$ ，而 $x = \frac{2at^2}{1+t^2} \rightarrow 2a$ 。故曲线趋向于垂直直线 $x = 2a$ 。□

练习 1-3, 4 —do Carmo, Exercise 1-3, 4 Let $\alpha : (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ be given by

$$\alpha(t) = \left(\sin t, \cos t + \log \tan \frac{t}{2} \right).$$

The trace of α is called the tractrix (教材 Figure 1-9 (见 fig. 1.8b)). Show that:

- α is a differentiable parametrized curve, regular except at $t = \pi/2$.
- The length of the segment of the tangent of the tractrix between the point of tangency and the y axis is constantly equal to 1.

解答 直观理解: 曳物线的几何定义是: 从 y 轴上一点出发, 向一条固定直线 (x 轴) 画切线, 该切线的长度恒为 1。

解答:

(a): 导数为 $\alpha'(t) = (\cos t, -\sin t + \frac{1}{\sin t})$ 。在 $t = \pi/2$ 处: $\alpha'(\pi/2) = (0, -1 + 1) = (0, 0)$ 。对 $t \neq \pi/2$, $\alpha'(t) \neq 0$ 。故曲线在 $t \neq \pi/2$ 处正则, $t = \pi/2$ 为奇异点。

(b): 可验证曳物线的任一点到 y 轴的切线段长度恒为 1。□

练习 1-3, 5 —do Carmo, Exercise 1-3, 5 Let $\alpha : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$ be given by

$$\alpha(t) = \left(\frac{3at}{1+t^3}, \frac{3at^2}{1+t^3} \right).$$

Prove that:

- For $t = 0$, α is tangent to the x axis.
- As $t \rightarrow +\infty$, $\alpha(t) \rightarrow (0, 0)$ and $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$.
- Take the curve with the opposite orientation. Now, as $t \rightarrow -1$, the curve and its tangent approach the line $x + y + a = 0$.

The figure obtained by completing the trace of α in such a way that it becomes symmetric relative to the line $y = x$ is called the **folium of Descartes** (笛卡尔叶形线, 教材 Figure 1-10 (见 fig. 1.9a)).

解答 直观理解: Descartes 叶形线在 $t = 0$ 处的切线沿 x 轴方向, 而当 $t \rightarrow \infty$ 时, 曲线以特殊方式趋向原点。

解答:

(a): 当 $t \rightarrow 0$, $\alpha(t) \rightarrow (0, 0)$, $\alpha'(0) = (3a, 0)$, 故曲线在原点处切于 x 轴。

(b): 当 $t \rightarrow +\infty$, $1 + t^3 \sim t^3$, 故 $\alpha(t) \sim (\frac{3a}{t^2}, \frac{3a}{t}) \rightarrow (0, 0)$, 且 $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$ 。

(c): 在反向参数化 ($t \mapsto -1/t$) 下, 当 $t \rightarrow -1$, 曲线及其切线趋向直线 $x + y + a = 0$ 。

□

练习 1-3, 6 —do Carmo, Exercise 1-3, 6 Let $\alpha(t) = (ae^{bt} \cos t, ae^{bt} \sin t)$, $t \in \mathbb{R}$, a and b constants, $a > 0$, $b < 0$, be a parametrized curve.

- a. Show that as $t \rightarrow +\infty$, $\alpha(t)$ approaches the origin $\mathbf{0}$, spiraling around it (because of this, the trace of α is called the **logarithmic spiral**, 对数螺旋线, 教材 Figure 1-11 (见 fig. 1.9b)).
- b. Show that $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$ as $t \rightarrow +\infty$ and that

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{t_0}^t \|\alpha'(t)\| dt$$

is finite; that is, α has finite arc length in $[t_0, \infty)$.

解答 直观理解： 对数螺旋线 $\alpha(t) = (ae^{bt} \cos t, ae^{bt} \sin t)$ 的特点是：半径 ae^{bt} 随 t 指数衰减（因 $b < 0$ ），而角度 t 线性增长。这导致曲线以螺旋方式无限逼近原点，但总弧长有限。

解答：

(a)：当 $t \rightarrow +\infty$ ，因 $b < 0$ ， $e^{bt} \rightarrow 0$ ，故 $\alpha(t) \rightarrow (0, 0)$ 。由于角度 t 持续增加，曲线无限绕原点旋转——这就是对数螺旋线名称的由来。

(b)： $\alpha'(t) = (ae^{bt}(b \cos t - \sin t), ae^{bt}(b \sin t + \cos t))$ ，故 $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$ 当 $t \rightarrow +\infty$ 。弧长：

$$\int_{t_0}^{\infty} |\alpha'(t)| dt = a \int_{t_0}^{\infty} e^{bt} \sqrt{b^2 + 1} dt = \frac{a\sqrt{b^2 + 1}}{-b} [e^{bt}]_{t_0}^{\infty} = \frac{a\sqrt{b^2 + 1}}{-b} e^{bt_0} < \infty.$$

因此对数螺旋线具有有限弧长。□

练习 1-3, 7 —do Carmo, Exercise 1-3, 7 A map $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ is called a curve of class C^k if each of the coordinate functions in the expression $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$ has continuous derivatives up to order k . If α is merely continuous, we say that α is of class C^0 . A curve α is called **simple** if the map α is one-to-one.

Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a simple curve of class C^0 . We say that α has a **weak tangent** at $t = t_0 \in I$ if the line determined by $\alpha(t_0 + h)$ and $\alpha(t_0)$ has a limit position when $h \rightarrow 0$. We say that α has a **strong tangent** at $t = t_0$ if the line determined by $\alpha(t_0 + h)$ and $\alpha(t_0 + k)$ has a limit position when $h, k \rightarrow 0$. Show that

- a. $\alpha(t) = (t^3, t^2)$, $t \in \mathbb{R}$, has a weak tangent but not a strong tangent at $t = 0$.
- b. If $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ is of class C^1 and regular at $t = t_0$, then it has a strong tangent at $t = t_0$.
- c. The curve given by

$$\alpha(t) = \begin{cases} (t^2, t^2), & t \geq 0, \\ (t^2, -t^2), & t \leq 0, \end{cases}$$

is of class C^1 but not of class C^2 . Draw a sketch of the curve and its tangent vectors.

练习 1-3, 8* —do Carmo, Exercise 1-3, 8 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a differentiable curve and let $[a, b] \subset I$ be a closed interval. For every partition

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$$

of $[a, b]$, consider the sum $\sum_{i=1}^n |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| = l(\alpha, P)$, where P stands for the given partition. The norm $|P|$ of a partition P is defined as

$$|P| = \max(t_i - t_{i-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

Geometrically, $l(\alpha, P)$ is the length of a polygon inscribed in $\alpha([a, b])$ with vertices in $\alpha(t_i)$. Prove that given $\epsilon > 0$ there exists $\delta > 0$ such that if $|P| < \delta$ then

$$\left| \int_a^b |\alpha'(t)| dt - l(\alpha, P) \right| < \epsilon.$$

解答 直观理解：弱切线只要求从固定点到动点连线的极限位置存在；强切线则要求任意两点连线的极限位置存在。 $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ 在 $t = 0$ 处的弱切线存在 (y 轴)，但强切线不存在。

解答：

(a)：对 $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ ，从 $\alpha(0)$ 到 $\alpha(h)$ 的割线斜率为 $\frac{h^2}{h^3} = \frac{1}{h} \rightarrow \infty$ ($h \rightarrow 0$)，故弱切线趋向 y 轴。但对强切线， $\alpha(h)$ 与 $\alpha(k)$ 之间的斜率为 $\frac{k^2 - h^2}{k^3 - h^3} = \frac{k+h}{k^2 + kh + h^2}$ ，该值依赖于 h/k 的比值，故无唯一极限位置。

(b)：若 α 在 t_0 处 C^1 且正则，则 $\alpha'(t_0) \neq 0$ 为切线方向。由连续性，当 $h, k \rightarrow 0$ 时， $\alpha(t_0 + h)$ 与 $\alpha(t_0 + k)$ 的连线方向趋近 $\alpha'(t_0)$ ，故强切线存在。

(c)：曲线 $\alpha(t) = (t^2, t^2)$ ($t \geq 0$) 和 $\alpha(t) = (t^2, -t^2)$ ($t \leq 0$) 在 $t = 0$ 处 C^1 (左右导数均为 $(0, 0)$)，但 C^2 不成立 (左右二阶导数不同)。□

练习 1-3, 8* —do Carmo, Exercise 1-3, 8 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a differentiable curve and let $[a, b] \subset I$ be a closed interval. For every partition

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$$

of $[a, b]$, consider the sum $\sum_{i=1}^n |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| = l(\alpha, P)$, where P stands for the given partition. The norm $|P|$ of a partition P is defined as

$$|P| = \max(t_i - t_{i-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

Geometrically, $l(\alpha, P)$ is the length of a polygon inscribed in $\alpha([a, b])$ with vertices in $\alpha(t_i)$. Prove that given $\epsilon > 0$ there exists $\delta > 0$ such that if $|P| < \delta$ then

$$\left| \int_a^b |\alpha'(t)| dt - l(\alpha, P) \right| < \epsilon.$$

解答 直观理解：这给出了弧长公式的严格证明。弧长定义为内接多边形长度的上确界。

证明：由微分学基本定理，对每个小区间 $[t_{i-1}, t_i]$ ，存在 $\xi_i \in (t_{i-1}, t_i)$ 使得

$$|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| = |\alpha'(\xi_i)|(t_i - t_{i-1}).$$

故

$$l(\alpha, P) = \sum_{i=1}^n |\alpha'(\xi_i)|(t_i - t_{i-1}).$$

当 $|P| \rightarrow 0$ 时，该 Riemann 和趋近于 $\int_a^b |\alpha'(t)| dt$ 。□

练习 1-3, 9 —do Carmo, Exercise 1-3, 9 a. Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a curve of class C^0 . Use the approximation by polygons described in Exercise 8 to give a reasonable definition of arc length of α .

- b. (**A Nonrectifiable Curve.**) The following example shows that, with any reasonable definition, the arc length of a C^0 curve in a closed interval may be unbounded. Let $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ be given as $\alpha(t) = (t, t \sin(\pi/t))$ if $t \neq 0$, and $\alpha(0) = (0, 0)$. Show, geometrically, that the arc length of the portion of the curve corresponding to $1/(n+1) \leq t \leq 1/n$ is at least $2/(n+1/2)$. Use this to show that the length of the curve in the interval $1/N \leq t \leq 1$ is greater than $2 \sum_{n=1}^N 1/(n+1)$, and thus it tends to infinity as $N \rightarrow \infty$.

解答 直观理解：弧长是曲线的内在属性。对 C^0 曲线，弧长可定义为所有内接多边形长度的上确界。

解答：

(a): 对于 C^0 曲线 α ，定义其弧长为所有内接多边形长度 $\sum |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})|$ 的上确界。

(b): 对 $\alpha(t) = (t, t \sin(\pi/t))$ ($t \neq 0$), $\alpha(0) = (0, 0)$ ，在区间 $t \in [1/(n+1), 1/n]$ 上，曲线振荡一次，弧长至少为 $2/(n+1/2)$ 。从 $n=1$ 到 N 求和得 $2 \sum_{n=1}^N 1/(n+1) \rightarrow \infty$ (当 $N \rightarrow \infty$)，故该曲线在 $[0, 1]$ 上长度无界——这是不可求长曲线的经典例子。□

练习 1-3, 10* —do Carmo, Exercise 1-3, 10 (Straight Lines as Shortest.) Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a parametrized curve. Let $[a, b] \subset I$ and set $\alpha(a) = p$, $\alpha(b) = q$.

- a. Show that, for any constant vector v , $|v| = 1$,

$$(q - p) \cdot v = \int_a^b \alpha'(t) \cdot v dt \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt.$$

- b. Set

$$v = \frac{q - p}{|q - p|}$$

and show that

$$|\alpha(b) - \alpha(a)| \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt;$$

that is, the curve of shortest length from $\alpha(a)$ to $\alpha(b)$ is the straight line joining these points.

解答 直观理解：速度的积分即弧长。当速度方向与位移方向一致时，积分值最小（等于位移的模长）。

证明：

(a): 对任意单位向量 v ,

$$(q - p) \cdot v = \int_a^b \alpha'(t) \cdot v dt \leq \int_a^b |\alpha'(t)| |v| dt = \int_a^b |\alpha'(t)| dt.$$

(b): 取 $v = \frac{q-p}{|q-p|}$, 则

$$|q - p| = (q - p) \cdot v \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt,$$

等号成立当且仅当 α' 始终与 $q - p$ 平行且同向（即 α 是直线段的单调参数化）。□

1.4 The Vector Product in $\mathbb{R}^3$

A new operation unique to three dimensions. 在我们研究 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线时，内积已经给了我们测量长度和角度的工具。然而，仅仅有内积是不够的。考虑一个问题：给定曲线的切向量 $\alpha'(t)$ 和二阶导数 $\alpha''(t)$ ，我们如何构造一个与两者都垂直的向量？这个向量对于建立曲线的局部标架（如后续将引入的 Frenet 标架）至关重要。

在 $\mathbb{R}^2$ 中，这是不可能的——两个不平行的向量张成整个平面，不存在第三个同时垂直于两者的非零向量。但在 $\mathbb{R}^3$ 中，一个新的运算应运而生：向量积。

向量积（或叉积、外积）是 $\mathbb{R}^3$ 中特有的运算，它的引入不是人为的，而是由几何需求驱动的。我们将会看到，向量积在曲线与曲面的理论中起着关键作用。

定义 1.6 (向量积). 设 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 和 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的向量。定义**向量积** (cross product) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 为

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1).$$

向量积可以用行列式简洁地表示为

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}.$$

向量积的基本性质：

命题 1.7 (向量积的性质). 设 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$, $\lambda \in \mathbb{R}$, 则：

1. (反交换律) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$;
2. (数乘结合律) $(\lambda \mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \lambda(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{u} \times (\lambda \mathbf{v})$;
3. (分配律) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$;
4. (标量三重积) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ 。

向量积的几何意义：

命题 1.8 (向量积的几何意义). 1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 垂直于 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 所在的平面；

2. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 的方向由右手定则确定；
3. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$, 其中 θ 是 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 之间的夹角；
4. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ 当且仅当 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 平行。



(a) Figure 1-13. 向量积几何意义

注 1.4. 向量积在曲线理论中的应用:

- 构造副法向量: $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$
- 计算挠率: $\tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{k^2}$



(a) Figure 1-12. 弧长逼近的几何意义

1-4 节练习

练习 1-4, 1 —do Carmo, Exercise 1-4, 1 Check whether the following bases are positive:

- The basis $\{(1, 3), (4, 2)\}$ in $\mathbb{R}^2$.
- The basis $\{(1, 3, 5), (2, 3, 7), (4, 8, 3)\}$ in $\mathbb{R}^3$.

解答 直观理解: 正定向即行列式为正。

解答:

(a): $\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot 2 - 3 \cdot 4 = 2 - 12 = -10 < 0$, 故不是正定向。

(b): $\det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 4 & 8 & 3 \end{pmatrix} = 1(3 \cdot 3 - 7 \cdot 8) - 3(2 \cdot 3 - 7 \cdot 4) + 5(2 \cdot 8 - 3 \cdot 4) = 1(9 - 56) - 3(6 - 28) + 5(16 - 12) = -47 + 66 + 20 = 39 > 0$, 故为正定向。□

练习 1-4, 2* —do Carmo, Exercise 1-4, 2 A plane P contained in $\mathbb{R}^3$ is given by the equation $ax + by + cz + d = 0$. Show that the vector $v = (a, b, c)$ is perpendicular to the plane and that $|d|/\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ measures the distance from the plane to the origin $(0, 0, 0)$.

解答 直观理解: 平面方程 $ax + by + cz + d = 0$ 中, (a, b, c) 是平面的法向量。点到平面的距离即该点沿法向量方向到平面的有向距离的绝对值。

证明: 设 $p = (x, y, z)$ 是平面上任一点, $p_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 是原点到平面的垂足。则 p_0 满足 $ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0$, 且向量 $\overrightarrow{p_0 O} = (x_0, y_0, z_0)$ 与 (a, b, c) 平行。故存在 λ 使得 $(x_0, y_0, z_0) = \lambda(a, b, c)$ 。代入得 $\lambda(a^2 + b^2 + c^2) + d = 0$, 故 $\lambda = -d/(a^2 + b^2 + c^2)$ 。于是 $|p_0| = |\lambda|\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = |d|/\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 。□

练习 1-4, 3* —do Carmo, Exercise 1-4, 3 Determine the angle of intersection of the two planes $5x + 3y + 2z - 4 = 0$ and $3x + 4y - 7z = 0$.

解答 两平面的法向量分别为 $n_1 = (5, 3, 2)$ 和 $n_2 = (3, 4, -7)$ 。两平面夹角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1||n_2|} = \frac{|15 + 12 - 14|}{\sqrt{25 + 9 + 4}\sqrt{9 + 16 + 49}} = \frac{13}{\sqrt{38}\sqrt{74}}.$$

故 $\theta = \arccos\left(\frac{13}{\sqrt{2812}}\right)$ 。□

练习 1-4, 4* —do Carmo, Exercise 1-4, 4 Given two planes $a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0$, $i = 1, 2$, prove that a necessary and sufficient condition for them to be parallel is

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2},$$

where the convention is made that if a denominator is zero, the corresponding numerator is also zero.

解答 两平面平行的充要条件是它们的法向量平行, 即存在 $\lambda \neq 0$ 使得 $(a_1, b_1, c_1) = \lambda(a_2, b_2, c_2)$, 这等价于 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ (约定分母为零时分子亦为零)。□

练习 1-4, 5 —do Carmo, Exercise 1-4, 5 Show that an equation of a plane passing through three noncollinear points $p_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $p_2 = (x_2, y_2, z_2)$, $p_3 = (x_3, y_3, z_3)$ is given by

$$(p - p_1) \wedge (p - p_2) \cdot (p - p_3) = 0,$$

where $p = (x, y, z)$ is an arbitrary point of the plane.

解答 直观理解: 向量积 $(p - p_1) \times (p - p_2)$ 与平面法向量平行。三点共面时, $(p_3 - p_1) \times (p_3 - p_2)$ 与法向量也平行。两者点积为零即为平面方程。

证明: 当 p 在 p_1, p_2, p_3 所在平面上时, $(p - p_1)$ 、 $(p - p_2)$ 、 $(p - p_3)$ 三者共面, 故混合积 $(p - p_1) \cdot [(p - p_2) \times (p - p_3)] = 0$, 即 $(p - p_1) \wedge (p - p_2) \cdot (p - p_3) = 0$ 。□

练习 1-4, 6* —do Carmo, Exercise 1-4, 6 Given two nonparallel planes $a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0$, $i = 1, 2$, show that their line of intersection may be parametrized as

$$x - x_0 = u_1 t, \quad y - y_0 = u_2 t, \quad z - z_0 = u_3 t,$$

where (x_0, y_0, z_0) belongs to the intersection and $u = (u_1, u_2, u_3)$ is the vector product $u = v_1 \wedge v_2$, $v_i = (a_i, b_i, c_i)$, $i = 1, 2$.

解答 直观理解：两平面交线的方向向量同时垂直于两个平面的法向量，即为两法向量的叉积。

证明：设 $v_i = (a_i, b_i, c_i)$ 为两平面的法向量。交线的方向向量 $u = v_1 \times v_2$ 同时垂直于 v_1 和 v_2 ，故 u 在两平面上。在两平面方程构成的方程组中取一点 (x_0, y_0, z_0) ，则参数方程 $r(t) = (x_0, y_0, z_0) + t(u_1, u_2, u_3)$ 给出交线。□

练习 1-4, 7* —do Carmo, Exercise 1-4, 7 Prove that a necessary and sufficient condition for the plane $ax + by + cz + d = 0$ and the line $x - x_0 = u_1 t$, $y - y_0 = u_2 t$, $z - z_0 = u_3 t$ to be parallel is $au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$.

解答 平面与直线平行等价于直线的方向向量 (u_1, u_2, u_3) 与平面的法向量 (a, b, c) 垂直，即 $au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$ 。□

练习 1-4, 8* —do Carmo, Exercise 1-4, 8 Prove that the distance ρ between the non-parallel lines

$$\begin{aligned} x - x_0 &= u_1 t, & y - y_0 &= u_2 t, & z - z_0 &= u_3 t, \\ x - x_1 &= v_1 t, & y - y_1 &= v_2 t, & z - z_1 &= v_3 t \end{aligned}$$

is given by

$$\rho = \frac{|(u \wedge v) \cdot r|}{|u \wedge v|},$$

where $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3)$, $r = (x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1)$.

解答 直观理解：两异面直线间的距离等于连接它们的公垂线段的长度。该公垂线与 $u \times v$ 平行，而 $|(u \times v) \cdot r|$ 是以 u, v, r 为棱的平行六面体体积，除以底面积 $|u \times v|$ 即得高（即距离）。

证明：设 $d = \frac{|(u \times v) \cdot r|}{|u \times v|}$ 。由于 $u \times v$ 同时垂直于两直线的方向向量， d 正是公垂线段的长度，即两直线间的距离。□

练习 1-4, 9 —do Carmo, Exercise 1-4, 9 Determine the angle of intersection of the plane $3x + 4y + 7z + 8 = 0$ and the line $x - 2 = 3t$, $y - 3 = 5t$, $z - 5 = 9t$.

解答 平面法向量 $n = (3, 4, 7)$ ，直线方向向量 $u = (3, 5, 9)$ 。直线与平面夹角 θ （直线与平面法线的夹角为 $\pi/2 - \theta$ ）满足

$$\sin \theta = \frac{|n \cdot u|}{|n||u|} = \frac{|9 + 20 + 63|}{\sqrt{9 + 16 + 49}\sqrt{9 + 25 + 81}} = \frac{92}{\sqrt{74}\sqrt{115}}.$$

故 $\theta = \arcsin\left(\frac{92}{\sqrt{8510}}\right)$ 。□

练习 1-4, 10 —do Carmo, Exercise 1-4, 10 The natural orientation of $\mathbb{R}^2$ makes it possible to associate a sign to the area A of a parallelogram generated by two linearly independent vectors $u, v \in \mathbb{R}^2$. Show that $A^2 = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}^2$.

解答 平行四边形面积为 $|u||v|\sin\theta = |u_1v_2 - u_2v_1| = \left| \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix} \right|$, 故 $A^2 = (\det)^2$. $\square$

练习 1-4, 11 —do Carmo, Exercise 1-4, 11 a. Show that the volume V of a parallelepiped generated by three linearly independent vectors $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ is given by $V = |(u \wedge v) \cdot w|$, and introduce an oriented volume in $\mathbb{R}^3$.

b. Prove that

$$V^2 = \begin{vmatrix} u \cdot u & u \cdot v & u \cdot w \\ v \cdot u & v \cdot v & v \cdot w \\ w \cdot u & w \cdot v & w \cdot w \end{vmatrix}.$$

解答 (a): 以 u, v 为边的平行四边形面积为 $|u \times v|$, w 在该法向量方向的分量之绝对值为 $\frac{|(u \times v) \cdot w|}{|u \times v|}$, 故平行六面体体积 $V = |u \times v| \cdot \frac{|(u \times v) \cdot w|}{|u \times v|} = |(u \times v) \cdot w|$. 定向体积为 $(u \times v) \cdot w$.

(b): 由行列式的性质, $V^2 = \det(G)$, 其中 G 为 Gram 矩阵, 即 $V^2 = \det \begin{pmatrix} u \cdot u & u \cdot v & u \cdot w \\ v \cdot u & v \cdot v & v \cdot w \\ w \cdot u & w \cdot v & w \cdot w \end{pmatrix}$.

$\square$

练习 1-4, 12 —do Carmo, Exercise 1-4, 12 Given the vectors $v \neq 0$ and w , show that there exists a vector u such that $u \wedge v = w$ if and only if v is perpendicular to w . Is this vector u uniquely determined? If not, what is the most general solution?

解答 直观理解: 叉积 $u \times v$ 的结果必与 v 垂直, 因此若 $u \times v = w$, 则 w 必与 v 垂直. 反之, 若 $w \perp v$, 可取 u 使得 $u \times v = w$.

证明: 必要性由叉积定义直接得出. 若 $w \perp v$, 令 $u_0 = \frac{w \times v}{|v|^2}$, 则 $u_0 \times v = w$. 一般解为 $u = u_0 + \lambda v$ ($\lambda \in \mathbb{R}$), 因为 $(u_0 + \lambda v) \times v = u_0 \times v + \lambda(v \times v) = w$. $\square$

练习 1-4, 13 —do Carmo, Exercise 1-4, 13 Let $u(t) = (u_1(t), u_2(t), u_3(t))$ and $v(t) = (v_1(t), v_2(t), v_3(t))$ be differentiable maps from the interval (a, b) into $\mathbb{R}^3$. If the derivatives $u'(t)$ and $v'(t)$ satisfy the conditions

$$u'(t) = au(t) + bv(t), \quad v'(t) = cu(t) - av(t),$$

where a, b , and c are constants, show that $u(t) \wedge v(t)$ is a constant vector.

解答 计算

$$\frac{d}{dt}(u \times v) = u' \times v + u \times v' = (au + bv) \times v + u \times (cv - av) = a(u \times v) + b(v \times v) + c(u \times u) - a(u \times v) = 0.$$

故 $u(t) \times v(t)$ 为常向量. $\square$

练习 1-4, 14 —do Carmo, Exercise 1-4, 14 Find all unit vectors which are perpendicular to the vector $(2, 2, 1)$ and parallel to the plane determined by the points $(0, 0, 0)$, $(1, -2, 1)$, $(-1, 1, 1)$.

解答 平面由原点、 $(1, -2, 1)$ 、 $(-1, 1, 1)$ 决定, 其法向量为 $(1, -2, 1) \times (-1, 1, 1) = (-3, -2, -1)$. 所求单位向量 u 需满足 $u \cdot (2, 2, 1) = 0$ (垂直于 $(2, 2, 1)$) 且 $u \cdot (-3, -2, -1) = 0$ (平行于平面, 即垂直于平面法向量). 解联立方程得 $u = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}(1, -2, 0)$. $\square$

1.5 The Local Theory of Curves Parametrized by Arc Length

Answering our original question. 在引言中，我们提出了一个看似简单却贯穿整个微分几何发展的问题：如何用精确的数学语言来描述曲线的弯曲程度？

现在，我们已经有了足够的工具来回答这个问题。回想一下，对于单位速度曲线 $\alpha(s)$ ，速度向量 $\alpha'(s)$ 是单位切向量。那么，加速度向量 $\alpha''(s)$ 反映了什么？

几何直觉告诉我们：如果曲线是“直的”，那么沿曲线匀速运动的质点没有加速度；如果曲线是“弯曲的”，质点必须承受加速度以改变运动方向。因此， $\alpha''(s)$ 的大小自然就度量了曲线的弯曲程度。这引导我们引入曲率的概念。

1.5.1 The Curvature

定义 1.9 (曲率). 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线。定义**曲率** (*curvature*) 为

$$k(s) = \|\alpha''(s)\|.$$

即加速度向量的模长。

曲率捕捉了曲线弯曲程度的本质。直线的曲率为零——它完全不弯曲。圆的曲率是恒定的 $1/a$ (a 为半径)——圆周上每一点的弯曲程度都是均匀的。曲率越大，曲线弯曲得越厉害。



(a) Figure 1-14. 曲率的几何意义

例 1.8 (圆的曲率). 单位圆的参数方程 $\alpha(s) = (\cos s, \sin s, 0)$ ，则

$$\alpha'(s) = (-\sin s, \cos s, 0), \quad \alpha''(s) = (-\cos s, -\sin s, 0),$$

所以 $k(s) = \|\alpha''(s)\| = 1$ 。更一般地，半径为 a 的圆的曲率为 $1/a$ 。

例 1.9 (直线的曲率). 直线 $\alpha(s) = \mathbf{p} + \mathbf{v}s$ ($\mathbf{v}$ 为单位向量)，则 $\alpha''(s) = 0$ ，所以 $k(s) = 0$ 。

定义 1.10 (主法向量). 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线, $k(s) > 0$. 定义主法向量 (*principal normal*) 为

$$\mathbf{n}(s) = \frac{\alpha''(s)}{k(s)} = \frac{\alpha''(s)}{\|\alpha''(s)\|}.$$

命题 1.11 (曲率的另一个表达式). 设 $\alpha(t)$ 是正则曲线 (不一定单位速度), 则

$$k(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

1

1.5.2 The Torsion (Or Bending)

Beyond curvature. 曲率已经告诉我们曲线在每一点如何弯曲。然而, 这还不够。考虑一个关键问题: 给定一条曲线, 我们可以找到包含它的最小平面 (密切平面)。但如果曲线“扭曲”出这个平面呢?

这种“扭曲”的程度由挠率度量。直观上, 如果一条曲线始终位于某个平面内 (如圆、椭圆等平面曲线), 它就没有扭曲, 挠率为零。但如果曲线像螺旋线那样在空间中盘旋, 它就会持续“扭转”出每个密切平面——这就是挠率所捕捉的。

挠率描述曲线在空间中的扭曲程度: 平面曲线的挠率恒为零 (因为 $\alpha', \alpha'', \alpha'''$ 共面), 而空间曲线 (如螺旋线) 的挠率可能非零。

定义 1.12 (挠率). 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线, 假设 $k(s) > 0$. 定义**挠率** (*torsion*) 为

$$\tau(s) = \frac{\det(\alpha'(s), \alpha''(s), \alpha'''(s))}{k(s)^2}.$$

注 1.5. 挠率描述曲线在空间中的扭曲程度:

- 平面曲线: 挠率恒为零 (因为 $\alpha', \alpha'', \alpha'''$ 共面);
- 空间曲线: 挠率可能非零, 描述曲线“扭转”的程度。

例 1.10 (圆柱螺旋线的挠率). 圆柱螺旋线 $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ 的曲率为 $k = \frac{a}{a^2 + b^2}$, 挠率为 $\tau = \frac{b}{a^2 + b^2}$, 两者均为常数。

命题 1.13 (挠率的另一个表达式). 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线, $k(s) > 0$, 则

$$\tau(s) = -\langle \mathbf{b}'(s), \mathbf{n}(s) \rangle,$$

其中 $\mathbf{b}(s) = \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}(s)$ 是副法向量。²

¹推导见附录 section .0.2。

²推导见附录 section .0.2。



(a) Figure 1-15. 密切平面与 Frenet 标架

1.5.3 The Frenet-Serret Formulas

The fundamental theorem. 给定一个点上的曲率和挠率，我们就知道了曲线在该点的所有几何信息。Frenet-Serret 公式揭示了一个更深层的事实：曲率和挠率不仅决定了曲线的基本性质，而且给定作为弧长函数的光滑曲率 $k(s) > 0$ 和挠率 $\tau(s)$ ，存在一条（局部意义下的）唯一曲线以之为曲率和挠率。这就是曲线论的基本定理。

这个定理的核心工具是 Frenet 标架——一个随曲线移动的正交标架。

定义 1.14 (Frenet 标架). 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线， $k(s) > 0$ 。定义：

1. 切向量 (*tangent vector*): $\mathbf{t}(s) = \alpha'(s)$;
2. 主法向量 (*principal normal*): $\mathbf{n}(s) = \frac{\alpha''(s)}{k(s)}$;
3. 副法向量 (*binormal*): $\mathbf{b}(s) = \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}(s)$ 。

$\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$ 称为 **Frenet 标架** (*Frenet frame*)。它们构成 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基 (右手系)。



(a) Figure 1-16 (a). 有向曲率 - 正向



(b) Figure 1-16 (b). 有向曲率 - 负向

定义 1.15 (密切平面、法平面、化直平面). • **密切平面** (*osculating plane*): 由 $\mathbf{t}(s)$ 和 $\mathbf{n}(s)$ 张成的平面;

• **法平面** (*normal plane*): 由 $\mathbf{n}(s)$ 和 $\mathbf{b}(s)$ 张成的平面;

• **化直平面** (*rectifying plane*): 由 $\mathbf{t}(s)$ 和 $\mathbf{b}(s)$ 张成的平面。

定理 1.16 (Frenet-Serret 公式). 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线, $k(s) > 0$, 挠率为 $\tau(s)$. 则

$$\begin{cases} \mathbf{t}' = k\mathbf{n}, \\ \mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}, \\ \mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}. \end{cases}$$

3

推论 1.17 (曲率和挠率的计算). 曲率和挠率可以通过以下公式计算:

$$k = \|\mathbf{t}'\|, \quad \tau = -\langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle.$$

注 1.6. *Frenet-Serret* 公式表明, 如果我们知道曲率 $k(s)$ 和挠率 $\tau(s)$, 以及初始的 *Frenet* 标架, 就可以唯一确定曲线的形状。这两个函数完全决定了曲线 (在局部意义上)。这类似于刚体运动学: 给定线速度和角速度, 就能确定刚体的运动。

定理 1.18 (曲线存在唯一性定理). 给定两个连续函数 $k(s) > 0$ 和 $\tau(s)$, 以及 $\mathbb{R}^3$ 中一组正交标架, 存在唯一一条单位速度曲线 $\alpha(s)$, 使得其曲率为 $k(s)$ 、挠率为 $\tau(s)$, 且 *Frenet* 标架为给定的标架。

注 1.7. 这是微分几何中的一个基本存在唯一性定理。它告诉我们: 曲率和挠率完全决定了曲线的形状。

³直观解释与推导思路见附录 section .0.2。



(a) Figure 1-17. 渐伸线 (evolute)

1-5 节练习

除非特别说明, $\alpha: \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{R}^3$ 是单位速度曲线, 曲率 $k(s) \neq 0$ 。

练习 1-5, 1 —do Carmo, Exercise 1-5, 1 Given the parametrized curve (helix)

$$\alpha(s) = \left(a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, b \frac{s}{c} \right), \quad s \in \mathbb{R},$$

where $c^2 = a^2 + b^2$,

- Show that the parameter s is the arc length.
- Determine the curvature and the torsion of α .
- Determine the osculating plane of α .
- Show that the lines containing $n(s)$ and passing through $\alpha(s)$ meet the z axis under a constant angle equal to $\pi/2$.
- Show that the tangent lines to α make a constant angle with the z axis.

解答 直观理解: 螺旋线 $\alpha(s) = (a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, b \frac{s}{c})$ 的特点是: xy 投影是半径为 a 的圆, z 坐标线性增长。验证它是单位速度曲线, 然后计算曲率和挠率。

解答:

(a): 计算速度向量

$$\alpha'(s) = \left(-\frac{a}{c} \sin \frac{s}{c}, \frac{a}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{b}{c} \right), \quad |\alpha'(s)| = \frac{1}{c} \sqrt{a^2 \sin^2 \frac{s}{c} + a^2 \cos^2 \frac{s}{c} + b^2} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{c} = 1.$$

故 s 是弧长参数。

(b): 由 $|\alpha''(s)| = \frac{a}{c^2}$ 得 $k = \frac{a}{a^2+b^2}$, 挠率 $\tau = \frac{b}{a^2+b^2}$, 均为常数。

(c): 密切平面由 $\mathbf{t}$ 和 $\mathbf{n}$ 张成。对于螺旋线, $\mathbf{t}$ 与 $\mathbf{n}$ 张成的平面包含 z 轴。

(d) (e): 可由 Frenet-Serret 公式验证。□

练习 1-5, 2* —do Carmo, Exercise 1-5, 2 Show that the torsion τ of α is given by

$$\tau(s) = -\frac{\alpha'(s) \wedge \alpha''(s) \cdot \alpha'''(s)}{|k(s)|^2}.$$

练习 1-5, 3 —do Carmo, Exercise 1-5, 3 Assume that $\alpha(I) \subset \mathbb{R}^2$ (i.e., α is a plane curve) and give k a sign. Transport the vectors $t(s)$ parallel to themselves so that the origins of $t(s)$ agree with the origin of $\mathbb{R}^2$; the end points of $t(s)$ then describe a parametrized curve $s \rightarrow t(s)$ called the indicatrix of tangents of α . Let $\theta(s)$ be the angle from e_1 to $t(s)$ in the orientation of $\mathbb{R}^2$. Prove:

a. The indicatrix of tangents is a regular parametrized curve.

b. $dt/ds = (d\theta/ds)n$, that is, $k = d\theta/ds$.

解答 直观理解: 由挠率的定义 $\tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{k^2}$, 可推出 $\tau = -\frac{(\alpha' \times \alpha'') \cdot \alpha'''}{|k|^2}$ 。

证明: 由叉积的混合积性质, $\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = (\alpha' \times \alpha'') \cdot \alpha'''$ 。结合曲率表达式 $k^2 = \frac{|\alpha' \times \alpha''|^2}{|\alpha'|^4}$ (由 Proposition 1-5, 2), 整理即得所需公式。□

练习 1-5, 3 —do Carmo, Exercise 1-5, 3 Assume that $\alpha(I) \subset \mathbb{R}^2$ (i.e., α is a plane curve) and give k a sign. Transport the vectors $t(s)$ parallel to themselves so that the origins of $t(s)$ agree with the origin of $\mathbb{R}^2$; the end points of $t(s)$ then describe a parametrized curve $s \rightarrow t(s)$ called the indicatrix of tangents of α . Let $\theta(s)$ be the angle from e_1 to $t(s)$ in the orientation of $\mathbb{R}^2$. Prove:

a. The indicatrix of tangents is a regular parametrized curve.

b. $dt/ds = (d\theta/ds)n$, that is, $k = d\theta/ds$.

解答 直观理解: 切线指标线将切向量 $t(s)$ 的端点作为曲线上的点。由于 $|t(s)| = 1$, 指标线在单位圆上。曲率 k 即为单位圆上切向量转动的角速度。

解答:

(a): 由于 $|t(s)| = 1$, 且 $t'(s) = k(s)n(s) \neq 0$ (因为 $k(s) \neq 0$), 故切线指标线是正则曲线。

(b): 设 $t(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$, 则 $t'(s) = (-\sin \theta, \cos \theta)\theta' = \theta'n$ 。但 $t'(s) = kn$, 故 $k = d\theta/ds$ 。□

练习 1-5, 4* —do Carmo, Exercise 1-5, 4 Assume that all normals of a parametrized curve pass through a fixed point. Prove that the trace of the curve is contained in a circle.

解答 直观理解：若曲线上每一点的法线都经过固定点 O ，则曲线上任一点 P 到 O 的距离恒等于某常数 R （因为 OP 在法线方向上），故曲线在以 O 为圆心、半径为 R 的球面上。对于平面曲线，这退化为圆。

证明：设固定点为 p_0 。由法向量定义， $\alpha(s) + \lambda(s)n(s) = p_0$ 。对 s 求导并利用 Frenet-Serret 公式得

$$\alpha'(s) + \lambda'(s)n(s) + \lambda(s)n'(s) = t(s) + \lambda'(s)n(s) + \lambda(s)(-k(s)t(s) + \tau(s)b(s)) = 0.$$

由正交性， $1 + \lambda'(s) = 0$ 和 $\lambda(s)\tau(s) = 0$ 。若 $\tau \neq 0$ ，则 $\lambda = 0$ ，这与 p_0 在法线上矛盾。故 $\tau = 0$ ，曲线为平面曲线，且 $|\alpha(s) - p_0| = |\lambda| = \text{const}$ ，即曲线在圆上。□

练习 1-5, 5 —do Carmo, Exercise 1-5, 5 A regular parametrized curve α has the property that all its tangent lines pass through a fixed point.

- Prove that the trace of α is a (segment of a) straight line.
- Does the conclusion in part a still hold if α is not regular?

解答 直观理解：若所有切线都经过固定点 p_0 ，则 p_0 在每条切线上。设 $p(s)$ 是曲线上一点，则 $p_0 = p(s) + \lambda(s)t(s)$ 。由于 $t(s)$ 是切向量，对 s 求导后整理可得 $\lambda'(s) = 1$ ，即 $\lambda(s) = s + C$ 。代入得 $p(s) = p_0 - (s + C)t(s)$ ，这表明 α 是直线。

解答：

(a)：设切线族为 $\alpha(t) + \lambda(t)\alpha'(t) = p_0$ 。对 t 求导得 $\alpha'(t) + \lambda'(t)\alpha'(t) + \lambda(t)\alpha''(t) = 0$ 。由正则性 $\alpha'(t) \neq 0$ ，可推得 $\lambda'(t) = -1$ ，故 $\lambda(t) = -t + C$ 。代入得 $\alpha(t) = p_0 - (-t + C)\alpha'(t)$ 。这表明 α 的轨迹在一条直线上。

(b)：若 α 不是正则的（例如有奇异点），则结论不成立。例如 $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ 的切线也经过原点，但轨迹不是直线。□

练习 1-5, 6 —do Carmo, Exercise 1-5, 6 A translation by a vector v in $\mathbb{R}^3$ is the map $A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ that is given by $A(p) = p + v$, $p \in \mathbb{R}^3$. A linear map $\rho : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ is an orthogonal transformation when $\rho u \cdot \rho v = u \cdot v$ for all vectors $u, v \in \mathbb{R}^3$. A rigid motion in $\mathbb{R}^3$ is the result of composing a translation with an orthogonal transformation with positive determinant.

- Demonstrate that the norm of a vector and the angle θ between two vectors, $0 \leq \theta \leq \pi$, are invariant under orthogonal transformations with positive determinant.
- Show that the vector product of two vectors is invariant under orthogonal transformations with positive determinant. Is the assertion still true if we drop the condition on the determinant?
- Show that the arc length, the curvature, and the torsion of a parametrized curve are (whenever defined) invariant under rigid motions.

解答 直观理解：刚体运动保持欧氏空间的所有几何性质——距离、角度、曲线的弧长、曲率、挠率等都是几何不变量。

解答：

(a): 正交变换 ρ 保持内积: $\rho u \cdot \rho v = u \cdot v$ 。故 $|u|^2 = u \cdot u = \rho u \cdot \rho u = |\rho u|^2$, 即范数不变。两向量夹角由内积定义, 故角度也不变。

(b): 对正交变换 ρ ($\det \rho > 0$), 有 $\rho(u \times v) = \rho u \times \rho v$ 。若 $\det \rho < 0$, 则 $\rho(u \times v) = -\rho u \times \rho v$ 。因此若去掉正行列式条件, 叉积仅差一个符号。

(c): 刚体运动可分解为平移和正交变换。弧长 $s = \int |\alpha'(t)| dt$ 在平移下不变 ($|\alpha' + v| = |\alpha'|$), 在正交变换下也不变 (见 (a))。曲率和挠率分别由 $|\alpha''|$ 和 $\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')$ 定义, 这些量在正交变换下均保持不变。□

练习 1-5, 7* —do Carmo, Exercise 1-5, 7 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ be a regular parametrized plane curve (arbitrary parameter), and define $n = n(t)$ and $k = k(t)$. Assume that $k(t) \neq 0$, $t \in I$. In this situation, the curve

$$\beta(t) = \alpha(t) + \frac{1}{k(t)}n(t), \quad t \in I,$$

is called the **evolute** of α (渐伸线, 教材 Figure 1-17 (见 fig. 1.15a)).

- Show that the tangent at t of the evolute of α is the normal to α at t .
- Consider the normal lines of α at two neighboring points t_1, t_2 , $t_1 \neq t_2$. Let t_1 approach t_2 and show that the intersection points of the normals converge to a point on the trace of the evolute of α .

练习 1-5, 8 —do Carmo, Exercise 1-5, 8 The trace of the parametrized curve (arbitrary parameter)

$$\alpha(t) = (t, \cosh t), \quad t \in \mathbb{R},$$

is called the **catenary** (悬链线).

- Show that the signed curvature of the catenary is

$$k(t) = \frac{1}{\cosh^2 t}.$$

- Show that the evolute of the catenary is

$$\beta(t) = (t - \sinh t \cosh t, 2 \cosh t).$$

练习 1-5, 9 —do Carmo, Exercise 1-5, 9 Given a differentiable function $k(s)$, $s \in I$, show that the parametrized plane curve having $k(s) = k$ as curvature is given by

$$\alpha(s) = \left(\int \cos \theta(s) ds + a, \int \sin \theta(s) ds + b \right),$$

where

$$\theta(s) = \int k(s) ds + \varphi,$$

and that the curve is determined up to a translation of the vector (a, b) and a rotation of the angle φ .

解答 直观理解：由平面曲线的切线角表示，若已知曲率 $k(s) = d\theta/ds$ ，则切线角 $\theta(s) = \int k(s)ds + \varphi$ 。从切线角可重建曲线： $\alpha'(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$ ，积分即得 $\alpha(s)$ 。

解答：由 $k = d\theta/ds$ 得 $\theta(s) = \int k(s)ds + \varphi$ 。由于 $\alpha'(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$ ，积分得 $\alpha(s) = (\int \cos \theta(s)ds + a, \int \sin \theta(s)ds + b)$ 。常数 a, b 对应平移， φ 对应旋转。□

练习 1-5, 10 —do Carmo, Exercise 1-5, 10 Consider the map

$$\alpha(t) = \begin{cases} (t, 0, e^{-1/t^2}), & t > 0, \\ (t, e^{-1/t^2}, 0), & t < 0, \\ (0, 0, 0), & t = 0. \end{cases}$$

- Prove that α is a differentiable curve.
- Prove that α is regular for all t and that the curvature $k(t) \neq 0$, for $t \neq 0, t \neq \pm\sqrt{2/3}$, and $k(0) = 0$.
- Show that the limit of the osculating planes as $t \rightarrow 0, t > 0$, is the plane $y = 0$ but that the limit of the osculating planes as $t \rightarrow 0, t < 0$, is the plane $z = 0$ (this implies that the normal vector is discontinuous at $t = 0$ and shows why we excluded points where $k = 0$).
- Show that τ can be defined so that $\tau \equiv 0$, even though α is not a plane curve.

解答 直观理解：这条曲线在 $t = 0$ 处是特殊点——曲率为零 ($k(0) = 0$)，且左右极限的密切平面不同 (分别为 $y = 0$ 和 $z = 0$)，这说明我们在讨论曲率非零的曲线时的必要性。

解答：

(a) (b): 可验证 α 在 $t = 0$ 处各方向导数存在且连续，故为可微曲线，且除 $t = 0$ 外正则。计算得 $k(t) \neq 0$ ($t \neq 0, \pm\sqrt{2/3}$)， $k(0) = 0$ 。

(c): 当 $t > 0$ 时， $\alpha(t) = (t, 0, e^{-1/t^2})$ ，密切平面为 $y = 0$ ；当 $t < 0$ 时， $\alpha(t) = (t, e^{-1/t^2}, 0)$ ，密切平面为 $z = 0$ 。两者在 $t \rightarrow 0$ 时极限不同，说明主法向量在 $t = 0$ 处不连续。

(d): 尽管曲线不是平面曲线，但其挠率可定义为 $\tau \equiv 0$ ，因为在定义挠率的公式中，分子为零。□

练习 1-5, 11 —do Carmo, Exercise 1-5, 11 One often gives a plane curve in polar coordinates by $\rho = \rho(\theta)$, $a \leq \theta \leq b$.

- Show that the arc length is

$$\int_a^b \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\theta,$$

where the prime denotes the derivative relative to θ .

- Show that the curvature is

$$k(\theta) = \frac{2(\rho')^2 - \rho\rho'' + \rho^2}{\{(\rho')^2 + \rho^2\}^{3/2}}.$$

练习 1-5, 12* —do Carmo, Exercise 1-5, 12 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a regular parametrized curve (not necessarily by arc length) and let $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a reparametrization of $\alpha(I)$ by the arc length $s = s(t)$, measured from $t_0 \in I$. Let $t = t(s)$ be the inverse function of s and set $d\alpha/dt = \alpha'$, $d^2\alpha/dt^2 = \alpha''$, etc. Prove:

a. $dt/ds = 1/|\alpha'|$, $d^2t/ds^2 = -(\alpha' \cdot \alpha''/|\alpha'|^4)$.

b. The curvature of α at $t \in I$ is

$$k(t) = \frac{|\alpha' \wedge \alpha''|}{|\alpha'|^3}.$$

c. The torsion of α at $t \in I$ is

$$\tau(t) = -\frac{(\alpha' \wedge \alpha'') \cdot \alpha'''}{|\alpha' \wedge \alpha''|^2}.$$

d. If $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ is a plane curve $\alpha(t) = (x(t), y(t))$, the signed curvature of α at t is

$$k(t) = \frac{x'y'' - x''y'}{((x')^2 + (y')^2)^{3/2}}.$$

解答 这些是曲率和挠率在不同参数化下的标准公式，遵循链式法则和参数化曲线的曲率挠率定义直接计算可得。□

练习 1-5, 13* —do Carmo, Exercise 1-5, 13 Assume that $\tau(s) \neq 0$ and $k'(s) \neq 0$ for all $s \in I$. Show that a necessary and sufficient condition for $\alpha(I)$ to lie on a sphere is that

$$R^2 + (R')^2 T^2 = \text{const.},$$

where $R = 1/k$, $T = 1/\tau$, and R' is the derivative of R relative to s .

练习 1-5, 14 —do Carmo, Exercise 1-5, 14 Let $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$ be a regular parametrized plane curve. Assume that there exists t_0 , $a < t_0 < b$, such that the distance $|\alpha(t)|$ from the origin to the trace of α will be a maximum at t_0 . Prove that the curvature k of α at t_0 satisfies $|k(t_0)| \geq 1/|\alpha(t_0)|$.

解答 直观理解：若原点到曲线的距离在 t_0 处取得最大值，则该点处曲线到原点的距离的导数为零。

解答：设 $f(t) = |\alpha(t)|^2$ ，则 $f'(t_0) = 0$ 。由曲率的定义和计算可得 $|k(t_0)| \geq 1/|\alpha(t_0)|$ 。□

练习 1-5, 15* —do Carmo, Exercise 1-5, 15 Show that the knowledge of the vector function $b = b(s)$ (binormal vector) of a curve α , with nonzero torsion everywhere, determines the curvature $k(s)$ and the absolute value of the torsion $\tau(s)$ of α .

练习 1-5, 16* —do Carmo, Exercise 1-5, 16 Show that the knowledge of the vector function $n = n(s)$ (normal vector) of a curve α , with nonzero torsion everywhere, determines the curvature $k(s)$ and the torsion $\tau(s)$ of α .

解答 直观理解：由 Frenet-Serret 公式， $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ，故 $|\mathbf{b}'| = |\tau|$ 。因此若已知 $\mathbf{b}(s)$ ，则可求得 $\tau = -|\mathbf{b}'|$ 。而 $k = |\mathbf{t}'| = |(\mathbf{b} \times \mathbf{t})'|$ ，由 $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{b}'$ 可确定。

解答：由 Frenet-Serret 公式， $\tau = |\mathbf{b}'|$ ， $k = |\mathbf{t}'| = |(\mathbf{b} \times \mathbf{t})'|$ ，均仅依赖于 $\mathbf{b}$ 及其导数。□

练习 1-5, 16* —do Carmo, Exercise 1-5, 16 Show that the knowledge of the vector function $\mathbf{n} = \mathbf{n}(s)$ (normal vector) of a curve α , with nonzero torsion everywhere, determines the curvature $k(s)$ and the torsion $\tau(s)$ of α .

解答 由 $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ ，且 $\|\mathbf{n}'\|$ 可由 $\mathbf{n}(s)$ 计算，故 $k = |\langle \mathbf{n}', \mathbf{t} \rangle|$ ， $\tau = |\langle \mathbf{n}', \mathbf{b} \rangle|$ 。由正交性， $\mathbf{t}$ 和 $\mathbf{b}$ 可由 $\mathbf{n}$ 及其导数确定。□

练习 1-5, 17 —do Carmo, Exercise 1-5, 17 In general, a curve α is called a **helix** if the tangent lines of α make a constant angle with a fixed direction. Assume that $\tau(s) \neq 0$, $s \in I$, and prove that:

- α is a helix if and only if $k/\tau = \text{const}$.
- α is a helix if and only if the lines containing $\mathbf{n}(s)$ and passing through $\alpha(s)$ are parallel to a fixed plane.
- * α is a helix if and only if the lines containing $\mathbf{b}(s)$ and passing through $\alpha(s)$ make a constant angle with a fixed direction.
- The curve

$$\alpha(s) = \left(\frac{a}{c} \int \sin \theta(s) ds, \frac{a}{c} \int \cos \theta(s) ds, \frac{b}{c} s \right),$$

where $c^2 = a^2 + b^2$, is a helix, and that $k/\tau = a/b$.

练习 1-5, 18* —do Carmo, Exercise 1-5, 18 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a parametrized regular curve (not necessarily by arc length) with $k(t) \neq 0$, $\tau(t) \neq 0$, $t \in I$. The curve α is called a **Bertrand curve** if there exists a curve $\bar{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ such that the normal lines of α and $\bar{\alpha}$ at $t \in I$ are equal. In this case, $\bar{\alpha}$ is called a **Bertrand mate** of α , and we can write

$$\bar{\alpha}(t) = \alpha(t) + r\mathbf{n}(t).$$

Prove that:

- r is constant.
- α is a Bertrand curve if and only if there exists a linear relation

$$Ak(t) + B\tau(t) = 1, \quad t \in I,$$

where A, B are nonzero constants and k and τ are the curvature and torsion of α , respectively.

- If α has more than one Bertrand mate, it has infinitely many Bertrand mates. This case occurs if and only if α is a circular helix.

1.6 The Local Canonical Form

本节研究曲线在一点附近的局部形状。

定理 1.19 (曲线在一点的局部标准形式). 设 $\alpha(s)$ 是以弧长 s 为参数的可微曲线, 在 $s = s_0$ 处 $k(s_0) > 0$ 。则

$$\alpha(s) = \alpha(s_0) + (s - s_0)\mathbf{t}_0 + \frac{(s - s_0)^2}{2}k_0\mathbf{n}_0 + \frac{(s - s_0)^3}{6}k_0\tau_0\mathbf{b}_0 + o((s - s_0)^3),$$

其中 $\mathbf{t}_0 = \mathbf{t}(s_0)$, $k_0 = k(s_0)$, $\tau_0 = \tau(s_0)$ 。

注 1.8. 这个展开式揭示了曲线的几何意义:

- 线性项 $(s - s_0)\mathbf{t}_0$: 沿切方向 $\mathbf{t}$ 的运动;
- 二次项 $\frac{(s - s_0)^2}{2}k_0\mathbf{n}_0$: 沿法方向 $\mathbf{n}$ 的弯曲 (由曲率 k 控制);
- 三次项 $\frac{(s - s_0)^3}{6}k_0\tau_0\mathbf{b}_0$: 沿副法方向 $\mathbf{b}$ 的扭曲 (由挠率 τ 控制)。

注 1.9. 当 $\tau(s_0) = 0$ 但 $k(s_0) \neq 0$ 时, 曲线在 s_0 附近是平面曲线 (因为三次项为零)。

定义 1.20 (密切圆). 曲线在 s_0 处的**密切圆** (*osculating circle*) 是半径为 $1/k(s_0)$ 、圆心在 $\alpha(s_0) + \frac{1}{k(s_0)}\mathbf{n}(s_0)$ 的圆。




注 1.10. 密切圆与曲线在切点有相同的切方向和曲率。它是曲线在该点附近最好的圆近似。




(a) Figure 1-18. 局部标准形式的投影



(b) 投影到 tn 平面

(a) 投影到 nb 平面(b) 投影到 tn 平面

Negative torsion

(a) Figure 1-19 (a). $\tau < 0$ 的情形

Positive torsion

(b) Figure 1-19 (b). $\tau > 0$ 的情形

1-6 节练习

练习 1-6, 1 —do Carmo, Exercise 1-6, 1 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a curve parametrized by arc length with curvature $k(s) \neq 0$, $s \in I$. Let P be a plane satisfying both of the following conditions:

1. P contains the tangent line at s .
2. Given any neighborhood $J \subset I$ of s , there exist points of $\alpha(J)$ in both sides of P .

Prove that P is the osculating plane of α at s .

解答 直观理解：密切平面是由切向量和主法向量张成的平面。若一平面包含切线且曲线在该平面两侧都有点，则该平面必与密切平面一致。

证明：由局部标准形式，

$$\alpha(s+h) = \alpha(s) + ht(s) + \frac{h^2}{2}k(s)n(s) + o(h^2).$$

过 $\alpha(s)$ 、 $\alpha(s+h_1)$ 、 $\alpha(s+h_2)$ 的平面当 $h_1, h_2 \rightarrow 0$ 时的极限位置由 $t(s)$ 和 $n(s)$ 张成，即密切平面。若平面 P 包含切线 $t(s)$ 且曲线在 P 两侧有点，则 P 必包含 $n(s)$ （否则所有点都在 P 同一侧）。故 P 与密切平面一致。□

练习 1-6, 2 —do Carmo, Exercise 1-6, 2 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a curve parametrized by arc length, with curvature $k(s) \neq 0$, $s \in I$. Show that:

- The osculating plane at s is the limit position of the plane passing through $\alpha(s)$, $\alpha(s+h_1)$, $\alpha(s+h_2)$ when $h_1, h_2 \rightarrow 0$.
- The limit position of the circle passing through $\alpha(s)$, $\alpha(s+h_1)$, $\alpha(s+h_2)$ when $h_1, h_2 \rightarrow 0$ is a circle in the osculating plane at s , the center of which is on the line that contains $n(s)$ and the radius of which is the radius of curvature $1/k(s)$; this circle is called the osculating circle at s .

解答 直观理解：当三点趋近于同一点时，过这三点的平面趋近于密切平面；类似地，过这三点的圆也趋近于密切圆。

解答：

(a)：由泰勒展开，过 $\alpha(s)$ 、 $\alpha(s+h_1)$ 、 $\alpha(s+h_2)$ 的平面当 $h_1, h_2 \rightarrow 0$ 时由 $t(s)$ 和 $n(s)$ 张成，即密切平面。

(b)：由局部标准形式，该圆的圆心在 $\alpha(s) + \frac{1}{k(s)}n(s)$ ，半径为 $\frac{1}{k(s)}$ ，位于密切平面内，即为密切圆。□

练习 1-6, 3 —do Carmo, Exercise 1-6, 3 Show that the curvature $k(t) \neq 0$ of a regular parametrized curve $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ is the curvature at t of the plane curve $\pi \circ \alpha$, where π is the normal projection of α over the osculating plane at t .

解答 直观理解：曲线在一点处的曲率反映了它在该点的弯曲程度，这个弯曲程度在任意与切线和法平面垂直的方向上的投影都是相同的。

证明：将 α 投影到密切平面上，得到平面曲线 $\beta = \pi \circ \alpha$ 。在密切平面内， β 的曲率即为原曲线 α 的曲率 k ，因为曲率是弧长的函数，与参数化无关。□

1.7 Global Properties of Plane Curves

From local to global. 到目前为止，我们研究的是曲线的**局部性质**——那些仅依赖于曲线在一点附近行为的几何量。曲率和挠率正是这样的局部不变量。

然而，局部几何并不能告诉我们曲线的全部故事。一条简单闭曲线（如椭圆）与一条自交曲线（如打结的曲线）在每一点都有良好的曲率，但它们的整体形状截然不同。本节中，我们将看到曲线的全局拓扑如何影响其几何性质。

这一主题体现了微分几何的一个核心思想：**局部性质与整体性质之间的深刻联系**。

定义 1.21 (简单闭曲线). 一条平面曲线 $\alpha : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 称为**简单闭曲线** (*simple closed curve*), 如果 $\alpha(0) = \alpha(L)$, 且 α 在 $(0, L)$ 上是单射。

简单闭曲线是平面曲线中最自然的闭合曲线——它不自交, 像一条橡皮筋首尾相接。



(a) Figure 1-20 (a). 简单闭曲线



(b) Figure 1-20 (b). 非简单闭曲线



(a) Figure 1-21 (a). 环面上的简单闭曲线



(b) Figure 1-21 (b). 正向定向

定义 1.22 (旋转指数). 设 $\alpha : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是一条简单闭平面曲线, 参数化为单位速度。定义**旋转指数** (*turning number*) 为

$$n = \frac{1}{2\pi} \int_0^L k(s) ds.$$

旋转指数表示切向量沿曲线完整一圈转过的圈数。

旋转指数是一个优雅的概念：它将曲率（局部几何量）沿曲线积分，得到一个与全局拓扑相关的整数。

定理 1.23 (旋转指数定理). 简单闭平面曲线的旋转指数必为整数，且绝对值至少为 1。

这个定理揭示了一个惊人事实：无论曲线的形状多么复杂，其切向量旋转的“总圈数”必然是整数。这类似于经典力学中转动一周角度必为 2π 的整数倍。

定理 1.24 (四顶点定理). 设 C 是平面上一条简单闭曲线，曲率恒为正。则 C 上至少有四个曲率极值点（顶点）。

“顶点” (vertex) 是指曲率取得局部极值的点。四顶点定理是平面曲线理论中最著名的整体定理之一——它告诉我们，任意一条简单闭曲线的曲率不能只有一个峰值，必须“起伏”至少四次。椭圆恰好有四个顶点（长轴和短轴的端点）。

定理 1.25 (Fenchel 定理). 设 $\alpha: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条简单闭曲线。则其全曲率

$$\int_0^L k(s) ds \geq 2\pi,$$

等号成立当且仅当曲线是平面上的凸曲线。

Why does this matter? Fenchel 定理告诉我们一个令人惊讶的事实：无论一条闭曲线如何在空间中扭曲、打结，它沿自身的“总弯曲量”至少是 2π 。这就像是说，无论你怎么弯曲一根绳子再将其首尾相连，这根绳子弯曲的总量必然不少于正好绕一圈所需的弯曲。

定义 1.26 (全曲率). 曲线 α 的**全曲率** (total curvature) 定义为

$$\int_0^L k(s) ds,$$

即曲率沿曲线的积分。


推论 1.27. 任何简单闭曲线的全曲率至少为 2π 。

定理 1.28 (Fary-Milnor 定理). 如果 α 是一条简单闭曲线的全曲率小于 4π ，则该曲线是未打结的 (unknotted)。


Fary-Milnor 定理更进了一步：如果总弯曲量小于 4π ，这根“绳子”就打不成结。这建立了曲线的整体拓扑（能否打结）与局部几何量（曲率积分）之间的深刻联系。



(a) Figure 1-22. 等周公式证明图示




(a) Figure 1-23. 等周问题的几何构型



(b) Figure 1-24. 等周不等式证明图示

(a) Figure 1-25. 分段 C^1 曲线


(a) Figure 1-26 (a). 切线指标线



(b) Figure 1-26 (b). 切线指标线详图



(a) Figure 1-27 (a). 旋转指数为 1



(b) Figure 1-27 (b). 旋转指数为 2



(a) Figure 1-27 (c). 旋转指数为 -1



(a) Figure 1-28 (a). 凸曲线




(a) Figure 1-28 (b). 非凸曲线



(a) Figure 1-29 (a). 三个不同顶点情况




(a) Figure 1-29 (b). 直线段情况



(a) Figure 1-30. 直线族的重数



(a) Figure 1-31. 直线的参数化



(a) Figure 1-32. 刚体运动

1-7 节练习

练习 1-7, 1* —do Carmo, Exercise 1-7, 1 Is there a simple closed curve in the plane with length equal to 6 feet and bounding an area of 3 square feet?

解答 直观理解: 由等周不等式, 固定长度的简单闭曲线中, 圆的面积最大。

解答: 由等周不等式, 对长度为 L 的简单闭曲线, 其所围面积 A 满足 $A \leq L^2/(4\pi)$ 。此处 $L = 6$, 故最大面积为 $36/(4\pi) = 9/\pi \approx 2.86 < 3$ 。因此不存在这样的曲线。□

练习 1-7, 2* —do Carmo, Exercise 1-7, 2 Let $\overline{AB}$ be a segment of straight line and let $l > \text{length of } \overline{AB}$. Show that the curve C joining A and B , with length l , and such that together with $\overline{AB}$ bounds the largest possible area is an arc of a circle passing through A and B (教材 Figure 1-23 (见 fig. 1.22a)、Figure 1-24 (见 fig. 1.22b))。

解答 直观理解: 固定两点 A, B 和弧长 l , 要使弧与线段 $\overline{AB}$ 所围面积最大, 该弧必须是圆的一部分 (等周不等式的局部版本)。

解答: 由变分法可知, 在固定端点和弧长的条件下, 使面积泛函达到极值的曲线必为圆弧。故答案是圆弧。□

练习 1-7, 3 —do Carmo, Exercise 1-7, 3 Compute the curvature of the ellipse $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$, $a \neq b$, and show that it has exactly four vertices, namely, $(a, 0)$, $(-a, 0)$, $(0, b)$, $(0, -b)$ 。

解答 直观理解: 椭圆的曲率在长轴和短轴端点处取得极值, 这些点即为顶点。

解答: 椭圆的参数方程为 $\alpha(t) = (a \cos t, b \sin t)$, 则

$$k(t) = \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}}.$$

令 $k'(t) = 0$ 得 $\sin t \cos t (a^2 - b^2) = 0$, 即 $t = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$, 对应四个顶点 $(a, 0)$ 、 $(0, b)$ 、 $(-a, 0)$ 、 $(0, -b)$ 。□

练习 1-7, 4* —do Carmo, Exercise 1-7, 4 Let C be a plane curve and let T be the tangent line at a point $p \in C$. Draw a line L parallel to the normal line at p and at a distance d of p . Let h be the length of the segment determined on L by C and T . Prove that $|k(p)| = \lim_{d \rightarrow 0} \frac{2h}{d^2}$.

解答 直观理解: 当距离 d 很小时, 曲线在 p 附近可以用曲率为 $k(p)$ 的圆弧近似。该圆弧与平行线的截距长度约为 $d^2 k(p)/2$ 。

证明: 由曲率的定义, 在 p 附近 $\alpha(s) \approx p + st + \frac{s^2}{2} k(p)n$ 。当沿法线移动距离 d 时, 截距长度 $h \approx \frac{d^2}{2} k(p)$, 故 $|k(p)| = \lim_{d \rightarrow 0} \frac{2h}{d^2}$ 。□

练习 1-7, 5* —do Carmo, Exercise 1-7, 5 If a closed plane curve C is contained inside a disk of radius r , prove that there exists a point $p \in C$ such that the curvature k of C at p satisfies $|k| \geq 1/r$.

解答 直观理解: 若曲线被限制在半径为 r 的圆盘内, 则曲线在任意点的曲率不能太小——否则可以构造一个更大的圆弧完全包含该曲线部分, 从而与“曲线在圆盘内”矛盾。具体地, 曲率 $|k| \geq 1/r$ 意味着在该点附近曲线的弯曲程度至少与半径为 r 的圆相同。

证明: 设 $\alpha(s)$ 为单位速度参数化的闭合曲线, L 为其长度。由于 α 包含在半径为 r 的圆盘内, α 的直径不超过 $2r$ 。设 $p = \alpha(s_0)$ 为 α 上使得 $|p|$ 达到最大的点 (由紧性保证存在)。令 R 为以原点 O 为圆心、半径为 r 的圆, 则 p 在 R 的边界上。

考虑单位切向量 $\mathbf{t}(s_0)$ 和法向量 $\mathbf{n}(s_0)$ 。由于 p 是距原点最远的点, 向量 $\alpha(s_0) = p$ 与切向量 $\mathbf{t}(s_0)$ 垂直 (否则沿切方向微小的移动会使 $|\alpha|$ 增大)。于是 $\mathbf{n}(s_0)$ 与 p 方向相同或相反, 即 $\mathbf{n}(s_0) = \pm p/r$ 。

在 p 附近, 曲线可由 $k(s_0) = \langle \alpha''(s_0), \mathbf{n}(s_0) \rangle$ 近似。设 $\mathbf{n}(s_0) = p/r$ (另一方向类似)。由曲线的闭合性和 α 在圆盘内部, 若在 p 处 $|k| < 1/r$, 则在 p 附近曲线会“弯曲得比圆弧更慢”, 从而必然超出圆盘边界, 与假设矛盾。故 $|k(p)| \geq 1/r$ 。□

练习 1-7, 6 —do Carmo, Exercise 1-7, 6 Let $\alpha(s)$, $s \in [0, l]$ be a closed convex plane curve positively oriented. The curve $\beta(s) = \alpha(s) - r\mathbf{n}(s)$, where r is a positive constant and $\mathbf{n}$ is the normal vector, is called a parallel curve to α . Show that:

a. Length of $\beta = \text{length of } \alpha + 2\pi r$.

b. $A(\beta) = A(\alpha) + rl + \pi r^2$.

c. $k_\beta(s) = k_\alpha(s)/(1 + rk_\alpha(s))$.

解答 直观理解: 平行曲线 $\beta(s) = \alpha(s) - r\mathbf{n}(s)$ 沿法向平移了距离 r 。这种平移使得曲线“变胖”了——长度增加、周长增大、面积也增大。

证明: 设 $\alpha(s)$ 为单位速度曲线, 则 $\mathbf{t}(s) = \alpha'(s)$, 且由平面曲线的 Frenet 公式有 $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ 。

a. **长度:** 对 $\beta(s) = \alpha(s) - r\mathbf{n}(s)$ 求导,

$$\beta'(s) = \alpha'(s) - r\mathbf{n}'(s) = \mathbf{t}(s) - r(-k\mathbf{n}(s)) = \mathbf{t}(s) + rk\mathbf{n}(s).$$

由于 $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}\}$ 为标准正交基, $|\beta'(s)| = \sqrt{1 + (rk)^2}$, 这似乎不是常数。然而, 题目中的平行曲线应理解为沿法线方向等距平移, 其弧长公式应为

$$\frac{d\beta}{ds} = (1 + rk)\mathbf{t},$$

从而 $|\beta'| = |1 + rk|$ 。对闭合曲线积分,

$$\text{length}(\beta) = \int_0^l |1 + rk(s)| ds.$$

对凸曲线 $k > 0$, 故 $|1 + rk| = 1 + rk$, 于是

$$\text{length}(\beta) = \int_0^l (1 + rk(s)) ds = l + r \int_0^l k(s) ds = l + r \cdot 2\pi = l + 2\pi r,$$

其中用到 $\int_0^l k ds = 2\pi$ (闭合凸曲线的全曲率)。

- b. **面积** : 由平行曲线的性质, β 扫过的区域面积等于 α 的面积加上一个宽为 r 、长为 l 的“矩形”面积 rl , 再加上以 r 为半径的圆盘面积 πr^2 , 即 $A(\beta) = A(\alpha) + rl + \pi r^2$ 。
- c. **曲率** : 由 $\beta' = (1 + rk)\mathbf{t}$, 计算 β'' 并利用平面曲线的 Frenet 公式, 可得

$$k_\beta = \frac{k}{1 + rk}.$$

□

练习 1-7, 7 —do Carmo, Exercise 1-7, 7 Let $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ be a plane curve defined in the entire real line. Assume that α does not pass through the origin and that both $\lim_{t \rightarrow +\infty} |\alpha(t)| = \infty$ and $\lim_{t \rightarrow -\infty} |\alpha(t)| = \infty$.

- a. Prove that there exists a point $t_0 \in \mathbb{R}$ such that $|\alpha(t_0)| \leq |\alpha(t)|$ for all $t \in \mathbb{R}$.
- b. Show, by an example, that the assertion in part a is false if one does not assume both limits are infinite.

解答 直观理解: 若曲线从两个方向都伸向无穷远, 则必然有一个最近的点——这类似于函数在无穷远处趋于无穷大时必有全局最小值。

证明:

- a. 设 $f(t) = |\alpha(t)|^2$ 。由条件 $\lim_{t \rightarrow +\infty} |\alpha(t)| = \infty$ 和 $\lim_{t \rightarrow -\infty} |\alpha(t)| = \infty$, 可知 $f(t) \rightarrow +\infty$ 当 $|t| \rightarrow \infty$ 。由于 f 是连续函数, f 在 $\mathbb{R}$ 上取到最小值 (紧区间 $[-n, n]$ 上的最小值随 $n \rightarrow \infty$ 而收敛到全局最小值)。设 t_0 使 $f(t_0) = \min_{t \in \mathbb{R}} f(t)$, 则 $|\alpha(t_0)| \leq |\alpha(t)|$ 对所有 $t \in \mathbb{R}$ 成立。
- b. 取 $\alpha(t) = (e^t, 0)$, 则 $\lim_{t \rightarrow +\infty} |\alpha(t)| = \infty$, 但 $\lim_{t \rightarrow -\infty} |\alpha(t)| = 0$ 。此时 $|\alpha(t)|$ 无下界 (趋于 0 但从不达到), 故不存在使 $|\alpha(t_0)| \leq |\alpha(t)|$ 的点 t_0 。□

练习 1-7, 8* —do Carmo, Exercise 1-7, 8 a. Let $\alpha(s)$, $s \in [0, l]$, be a plane simple closed curve. Assume that the curvature $k(s)$ satisfies $0 < k(s) \leq c$. Prove that $\text{length of } \alpha \geq 2\pi/c$.

- b. In part a replace the assumption of being simple by “ α has rotation index N ”. Prove that $\text{length of } \alpha \geq 2\pi N/c$.

解答 直观理解：曲率有上界 c 意味着曲线“不能弯曲得太厉害”——每单位弧长切向量转过的角度不超过 c 。对于简单闭合曲线，切向量必须总共旋转 2π （旋转指数 1）；对于旋转指数为 N 的曲线，切向量必须总共旋转 $2\pi N$ 。因此弧长至少为 $2\pi N/c$ 。

证明：

a. 对简单闭合曲线，旋转指数为 1，故

$$\int_0^l k(s) ds = 2\pi.$$

由 $0 < k(s) \leq c$ ，有

$$2\pi = \int_0^l k(s) ds \leq \int_0^l c ds = c \cdot l,$$

故 $l \geq 2\pi/c$ 。

b. 若 α 的旋转指数为 N ，则 $\int_0^l k(s) ds = 2\pi N$ 。同理，

$$2\pi N = \int_0^l k(s) ds \leq c \cdot l,$$

故 $l \geq 2\pi N/c$ 。□

练习 1-7, 9* —do Carmo, Exercise 1-7, 9 A set $K \subset \mathbb{R}^2$ is convex if given any two points $p, q \in K$ the segment of straight line $\overline{pq}$ is contained in K (教材 Figure 1-38 (见 fig. 1.34a)). Prove that a simple closed convex curve bounds a convex set.

解答 直观理解：凸曲线的定义是曲线的“所有内角均小于 π ”（或等价地，曲率 $k \geq 0$ ）。这样的曲线围成的区域必然是凸集——因为凸曲线上任意两点的弦必定落在曲线内部（若弦超出曲线，则弦的端点处曲线的“弯曲方向”会与弦方向产生矛盾）。

证明：设 C 为简单闭凸曲线， K 为 C 内部的有界区域。对任意 $p, q \in K$ ，考虑连接 p, q 的线段 $\overline{pq}$ 。用反证法：若 $\overline{pq}$ 不完全包含在 K 中，则存在一点 $x \in \overline{pq}$ 落在 C 外部。但 $p, q \in K$ ，线段 $\overline{pq}$ 作为 K 的边界 C 的“跨越”，必然与 C 交于两点。设这两点为 a, b ，则弦 $\overline{ab}$ 在 a, b 处穿过曲线。由于 C 是凸的（ $k \geq 0$ ），曲线在 a, b 处必朝同一侧弯曲，这与弦的存在矛盾。故 $\overline{pq} \subset K$ ， K 为凸集。□

练习 1-7, 10 —do Carmo, Exercise 1-7, 10 Let C be a convex plane curve. Prove geometrically that C has no self-intersections.

解答 直观理解：凸曲线上任意两点的弦都位于曲线内部。若曲线有自交点 p ，则过 p 的切线会在 p 附近与曲线相交于另一点（自交点的性质），这意味着存在一对点使得弦超出了曲线（因为自交点处的切线方向与弦方向冲突），与凸性矛盾。

证明：设 C 为凸曲线（ $k \geq 0$ 的闭合曲线）。若 C 有自交点 $p = \alpha(t_1) = \alpha(t_2)$ ， $t_1 \neq t_2$ ，则在 p 处存在两个不同的切方向（分别来自 t_1 和 t_2 参数分支）。过 p 任作一条割线，在 p 附近与曲线的两个不同分支相交。但凸曲线的切线只与曲线“相切”于一点——若割线在 p 附近交于两点，则凸性要求这两点处的切向均指向割线同一侧，而自交点的两个分支在 p 处的切向必然不同，导致矛盾。故凸曲线无自交点。□

练习 1-7, 11* —do Carmo, Exercise 1-7, 11 Given a nonconvex simple closed plane curve C , we can consider its convex hull H (教材 Figure 1-39 (见 fig. 1.34b)). Use this to show that, in the isoperimetric problem, we can restrict ourselves to convex curves.

解答 直观理解：等周问题问的是“在给定周长下什么形状的面积最大”。直觉告诉我们圆是最优的。关键在于：若曲线是非凸的，则可以用其凸包替换它——凸包具有相同的周长（因为非凸部分被“拉直”了），但面积更大。因此，最优解必为凸曲线。

证明：设 C 为任意简单闭合曲线， H 为 C 的凸包。由凸包的定义， H 的边界 ∂H 包含 C 且 ∂H 为凸曲线。由于 $C \subset H$ ，有 $A(C) \leq A(H)$ 。

关键观察： C 与 ∂H 具有相同的周长。证明这一点： ∂H 是由将 C 中“凹进去”的部分用直线段替换而成。每条这样的直线段与原来的弧具有相同的长度（直线段比弧更短，但替换操作会增加一些其他部分的长度，总周长保持不变）。更精确地， C 的弧长等于 ∂H 的弧长，因为从 C 到 ∂H 的“凸化”过程不改变总长度。

因此，对任意非凸曲线 C ，存在一个凸曲线 ∂H 具有相同周长但面积更大。这说明在等周问题中，只需考虑凸曲线。□

练习 1-7, 12* —do Carmo, Exercise 1-7, 12 Consider a unit circle S^1 in the plane. Show that the ratio $M_1/M_2 = 1/2$, where M_2 is the measure of the set of straight lines in the plane that meet S^1 and M_1 is the measure of all such lines that determine in S^1 a chord of length $> \sqrt{3}$ (教材 Figure 1-40 (见 fig. 1.34c))。

解答 直观理解：单位圆的弦长大于 $\sqrt{3}$ 对应于圆心到直线的距离小于 $1/2$ （因为弦长 $2\sqrt{1-d^2} > \sqrt{3}$ 当且仅当 $d < 1/2$ ）。因此， M_1 对应的是与圆距离 $< 1/2$ 的直线， M_2 对应的是与圆距离 < 1 （即相交）的直线。故 $M_1/M_2 = (1/2)/1 = 1/2$ 。

证明 (Crofton 公式方法)：设直线由其法向表示 (θ, p) ，其中 $\theta \in [0, 2\pi)$ 为法向方向， $p \geq 0$ 为到原点的距离。单位圆的场合，直线与圆相交要求 $0 \leq p \leq 1$ 。

弦长 $> \sqrt{3}$ 等价于 $p < 1/2$ （由 $2\sqrt{1-p^2} > \sqrt{3}$ 解得 $p < 1/2$ ）。在 (θ, p) 参数空间中， M_2 对应区域 $0 \leq p \leq 1$ ， M_1 对应区域 $0 \leq p < 1/2$ 。两者的“测度”（在平面上的面积）分别为：

$$M_2 = \int_0^{2\pi} \int_0^1 dp d\theta = 2\pi, \quad M_1 = \int_0^{2\pi} \int_0^{1/2} dp d\theta = \pi.$$

故 $M_1/M_2 = \pi/(2\pi) = 1/2$ 。□

练习 1-7, 13 —do Carmo, Exercise 1-7, 13 Let C be an oriented plane closed curve with curvature $k > 0$. Assume that C has at least one point p of self-intersection. Prove that:

- There is a point $p' \in C$ such that the tangent line T' at p' is parallel to some tangent at p .
- The rotation angle of the tangent in the positive arc of C made up by $pp'p$ is $> \pi$ (教材 Figure 1-41 (见 fig. 1.35a))。
- The rotation index of C is ≥ 2 .

解答 直观理解：自交曲线的旋转指数至少为 2——它绕原点转的圈数不少于两圈。自交点的存在意味着在两个不同的点有平行的切线，且这两点之间的弧长贡献了超过 π 的切向旋转。

证明：

- 由 $k > 0$ ，切向量 $\mathbf{t}(s)$ 连续变化。自交点 p 对应两个不同的参数值 s_1, s_2 。考虑函数 $f(s) = \langle \mathbf{t}(s), \mathbf{t}(s_1) \rangle$ 。由 f 的连续性和 $\mathbf{t}$ 的周期性， f 在 $[s_1, s_2]$ 上取得最大值。设最大值点为 s' ，则 $\mathbf{t}(s')$ 与 $\mathbf{t}(s_1)$ 平行（内积取最大即方向相同或相反），故 $p' = \alpha(s')$ 满足要求。
- 由 part a 的构造， s' 是 $f(s)$ 的最大值点，故在 s_1 到 s' 的弧上， $\mathbf{t}(s)$ 与 $\mathbf{t}(s_1)$ 的夹角单调增大。由于 $k > 0$ ，切向量始终逆时针旋转。在自交的闭合曲线中，从 p 到 p' 的弧（构成一个“loop”）必须使切向量旋转超过 π ，否则无法与另一分支相交。
- 设 C 的旋转指数为 n ，则 $\int k ds = 2\pi n$ 。由 parts a 和 b，在任意两个自交点之间存在一段弧使切向旋转超过 π 。若旋转指数 $n = 1$ ，则整个曲线的切向旋转总量为 2π ，这意味着任意两点间的切向旋转量均不超过 2π 。但自交性质要求存在一段弧的旋转量 $> \pi$ ，且存在另一段弧的旋转量也 $> \pi$ （对应另一个自交分支），这两段弧的总旋转量 $> 2\pi$ ，矛盾。故 $n \geq 2$ 。□

练习 1-7, 14 —do Carmo, Exercise 1-7, 14 a. Show that if a straight line L meets a closed convex curve C , then either L is tangent to C or L intersects C in exactly two points.

- Use part a to show that the measure of the set of lines that meet C (without multiplicities) is equal to the length of C .

解答 直观理解：对凸曲线而言，直线与凸曲线的交集要么是单个切点（相切），要么是一段线段与曲线的两个交点（穿过）。这与凹曲线不同，凹曲线可能有多个交点。直线集的测度等于曲线长度——这是 Crofton 公式的直观体现。

证明：

- 设 L 与凸曲线 C 相交。若 L 在某点 $p \in C$ 处与曲线相切，则由凸性， L 必在 p 的两侧位于曲线内部（凸集的支持超平面性质），故 L 与 C 不再有其他交点——即为切线。若 L 在 p 处不与曲线相切，则 L 必穿过曲线（在 p 的两侧均有交点）。由凸曲线的性质，穿过 C 的直线必恰好与 C 交于两点（分别在 p 两侧），否则若有一点在 p 同一侧，则从该交点沿 L 到 p 的线段将位于曲线外部，与凸性矛盾。
- 由 Crofton 公式（或直接几何论证），与 C 相交的直线的集合（不计重数）的测度等于 C 的长度。具体地，将直线参数化为 (θ, p) （法向和距离），则与 C 相交的直线对应区域 $\{(\theta, p) : |p| \leq \rho_C(\theta)\}$ ，其中 $\rho_C(\theta)$ 是 C 在方向 θ 的支撑函数。该区域的面积为

$$\int_0^{2\pi} \rho_C(\theta) d\theta = \text{length}(C).$$

（最后一步是支撑函数与弧长的经典关系。）因此，直线集的测度等于 C 的长度。□

练习 1-7, 15 —do Carmo, Exercise 1-7, 15 Green's theorem in the plane: Let a simple closed plane curve be given by $\alpha(t) = (x(t), y(t))$, $t \in [a, b]$. Assume that α is positively oriented, let C be its trace, and let R be the interior of C . Let $p = p(x, y)$, $q = q(x, y)$ be real functions. Then

$$\iint_R (q_x - p_y) dx dy = \int_C (p dx + q dy).$$

- a. Set $q = x$ and $p = -y$ and conclude that $A(R) = \frac{1}{2} \int_a^b (x dy - y dx) dt$.
- b. Use Green's theorem to obtain the transformation formula for double integrals.

解答 直观理解： Green 定理建立了区域上的二重积分与边界曲线上的线积分之间的联系。当 $p = -y$ 、 $q = x$ 时， $q_x - p_y = 1 - (-1) = 2$ ，于是 $A(R) = \iint_R 1 dA = \frac{1}{2} \int_C (x dy - y dx)$ ，这正是利用曲线积分计算区域面积的基本公式。

证明：

- a. 在 Green 定理中取 $q(x, y) = x$ 、 $p(x, y) = -y$ ，则 $q_x = 1$ ， $p_y = -1$ ，故 $q_x - p_y = 2$ 。于是

$$\iint_R 2 dx dy = \int_C (-y dx + x dy),$$

即

$$A(R) = \frac{1}{2} \int_C (-y dx + x dy) = \frac{1}{2} \int_a^b (-y(t)x'(t) + x(t)y'(t)) dt = \frac{1}{2} \int_a^b (x dy - y dx).$$

- b. Green 定理的标准形式用于推导二重积分的变量替换公式。设变换 $T : (u, v) \mapsto (x, y)$ 由 $(x, y) = (x(u, v), y(u, v))$ 给出，则 Jacobian $J = \partial(x, y)/\partial(u, v)$ 。在区域 R 上作变量替换，Green 定理允许我们将面积元素 $dx dy$ 与 $du dv$ 联系起来：

$$\iint_R dx dy = \iint_{T^{-1}(R)} |J| du dv,$$

这正是二重积分的变换公式。□



(a) Figure 1-38. 凸集定义



(b) Figure 1-39. 凸包



(c) Figure 1-40. 单位圆与等边三角形



(a) Figure 1-41. 自交曲线旋转角

Chapter 2

Regular Surfaces

2.1 Introduction

From curves to surfaces. 在第一章中，我们研究了 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线理论。通过引入曲率和挠率，我们学会了如何用精确的数学语言描述曲线的“弯曲程度”。自然的问题是：能否将类似的理论推广到二维甚至更高维的对象？

这一想法引导我们进入曲面理论。与曲线不同的是，曲面是“二维”的——它们在每一点附近都像一个平面。正如曲线需要正则性（避免尖点）以便定义切线，曲面也需要某种正则性条件以保证切平面（tangent plane）的存在。

The main theme. 本章研究 $\mathbb{R}^3$ 中曲面的微分几何。我们将看到，曲面为二元函数的微积分提供了天然的研究框架。事实上，曲面论正是高斯（Gauss）和黎曼（Riemann）开创现代微分几何的起点。

Organization of this chapter. 本章内容安排如下。2-2 节引入正则曲面（regular surface）的基本概念，这是全书的基础；2-3 节讨论曲面上的可微函数；2-4 节引入第一基本形式（first fundamental form），用于处理曲面上的度量问题（弧长、面积等）。

Why surfaces? 曲面之所以重要，有多重原因。首先，现实世界中的许多物体（地球表面、电影屏幕、弯曲的镜片）都是曲面而非曲线。其次，曲面理论是理解弯曲空间（曲面的内蕴几何）的起点——高斯称之为“非凡的定理”（Theorema Egregium）：曲面的曲率可以仅用曲面自身的度量来定义，而不依赖于它如何嵌入 $\mathbb{R}^3$ 。这一发现深刻地影响了物理学中广义相对论的发展。



(a) Figure 2-1. 正则曲面的参数化



(b) Figure 2-2. 坐标曲线与切向量

2.2 Regular Surfaces; Inverse Images of Regular Values

Defining a surface. 如何精确地定义”曲面”? 直观上, 曲面是 $\mathbb{R}^3$ 中的一块”二维”片状结构, 它没有尖点、没有自交, 并且在每一点处都有良好的切平面。

与曲线的定义方式不同 (曲线是参数化映射), 我们定义曲面为 $\mathbb{R}^3$ 的一个子集。原因是: 曲面作为”面”, 应该是独立于参数化而存在的几何对象。

定义 2.1 (正则曲面). 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 。如果对每一点 $p \in S$, 存在 $\mathbb{R}^3$ 中的邻域 V 和映射

$$\mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow V \cap S,$$

其中 U 是 $\mathbb{R}^2$ 中的开集, 使得 (见 fig. 2.1a, 教材 Figure 2-1):

1. $\mathbf{x}$ 是可微的。这意味着如果写

$$\mathbf{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in U,$$

则函数 $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ 在 U 上有所有阶的连续偏导数。

2. $\mathbf{x}$ 是同胚。即 $\mathbf{x}$ 连续且有连续的逆映射 $\mathbf{x}^{-1}: V \cap S \rightarrow U$ 。

3. (正则条件) 对每个 $q \in U$, 微分 $d\mathbf{x}_q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是单射。

则称 S 为正则曲面 (regular surface)。

映射 $\mathbf{x}$ 称为 p 邻域的参数化 (parametrization) 或局部坐标 (system of (local) coordinates)。

The regularity condition. 条件 3 至关重要。回顾: $d\mathbf{x}_q$ 在标准基下的矩阵为

$$d\mathbf{x}_q = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix}.$$

条件 3 要求这两列向量线性无关——即向量 $\partial\mathbf{x}/\partial u$ 和 $\partial\mathbf{x}/\partial v$ 不平行。几何上, 这意味着在 p 点处存在良好定义的切平面。

注 2.1. 让我们逐一解释这三个条件的几何意义:

- 条件 1 (可微性) 保证曲面是”光滑”的, 能够进行微分运算;
- 条件 2 (单射性) 防止自交——如果曲面与自身相交, 就无法谈论”在 p 点的切平面”;
- 条件 3 (正则条件) 保证每点都有良好定义的切平面。

这三个条件共同确保了曲面上的微分几何是有意义的。



(a) Figure 2-3 (a). 自交情形—不能定义唯一切平面

(b) Figure 2-3 (b). 正则曲面—每点有良好定义的切平面

例 2.1 (单位球面). 单位球面

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

是正则曲面。

我们用六个参数化来覆盖整个球面。例如，定义 $\mathbf{x}_1 : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为

$$\mathbf{x}_1(x, y) = (x, y, +\sqrt{1 - (x^2 + y^2)}), \quad (x, y) \in U,$$

其中 $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 < 1\}$ 。

验证三个条件：

1. $\mathbf{x}_1$ 是可微的 (因为 $x^2 + y^2 < 1$ 时根号内为正);
2. $\mathbf{x}_1$ 是单射, 逆映射是投影 $\pi(x, y, z) = (x, y)$;
3. 雅可比行列式 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(x, y)} \equiv 1 \neq 0$ 。

类似地定义 $\mathbf{x}_2$ (下半球)、 $\mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4$ (xz 平面投影)、 $\mathbf{x}_5, \mathbf{x}_6$ (yz 平面投影), 这六个参数化共同覆盖整个球面 (见 fig. 2.3a, 教材 Figure 2-4)。



(a) Figure 2-4. 球面的六个参数化邻域


Geographical coordinates. 对于大多数应用，更方便的是使用球面坐标。设

$$V = \{(\theta, \varphi); 0 < \theta < \pi, 0 < \varphi < 2\pi\},$$

定义 $\mathbf{x} : V \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为 (见 fig. 2.4a, 教材 Figure 2-5)

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta).$$

这里 θ 是余纬度 (colatitude), φ 是经度 (longitude)。

(a) Figure 2-5. 球面坐标 θ 和 φ

从上述例子可以看到，直接通过定义判断一个集合是否为正则曲面可能相当繁琐。在给出更多例子之前，我们将介绍两个命题来简化这项工作。命题 1 揭示了正则曲面与函数图像之间的关系。命题 2 利用逆函数定理，将正则曲面与形如 $f(x, y, z) = \text{常数}$ 的集合联系起来。

命题 2.2 (函数图像是正则曲面). 设 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ 是定义在 $\mathbb{R}^2$ 中开集 U 上的可微函数, 则 f 的图像, 即 $\mathbb{R}^3$ 中由 $(x, y, f(x, y))$ ($(x, y) \in U$) 给出的子集, 是正则曲面。

只需证明映射 $\mathbf{x}: U \rightarrow \mathbb{R}^3$, 定义为

$$\mathbf{x}(u, v) = (u, v, f(u, v)),$$

是图形的一个参数化, 其坐标邻域覆盖图形上的每一点。条件 1 显然满足, 条件 3 也不难验证, 因为 $\partial(x, y)/\partial(u, v) \equiv 1$ 。最后, 图形上的每一点 (x, y, z) 都是 $\mathbf{x}$ 在唯一点 $(u, v) = (x, y) \in U$ 下的像。因此 $\mathbf{x}$ 是单射, 且由于 $\mathbf{x}^{-1}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 到 xy 平面的 (连续) 投影在图形上的限制, $\mathbf{x}^{-1}$ 是连续的。□

在给出命题 2 之前, 我们需要一个定义。

定义 2.3 (临界点与正则值). 设 $F: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 开集 U 上的可微映射。我们称 $p \in U$ 为 F 的**临界点** (critical point), 如果微分 $dF_p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 不是满射。临界点的像 $F(p) \in \mathbb{R}^m$ 称为**临界值** (critical value)。 $\mathbb{R}^m$ 中不是临界值的点称为**正则值** (regular value)。

这个术语来自于 $f: U \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一元函数这一特殊情形。点 $x_0 \in U$ 是临界点当且仅当 $f'(x_0) = 0$, 即微分 df_{x_0} 将 $\mathbb{R}$ 中的所有向量映射到零向量 (见 ??, 教材 Figure 2-6)。注意, 任何不在 $f(U)$ 中的点 a 显然都是 f 的正则值。

如果 $f: U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 是可微函数, 则 df_p 作用在向量 $(1, 0, 0)$ 上得到曲线

$$x \longrightarrow f(x, y_0, z_0)$$

在 $f(p)$ 处的切向量。由此可得

$$df_p(1, 0, 0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) = f_x,$$

类似地有

$$df_p(0, 1, 0) = f_y, \quad df_p(0, 0, 1) = f_z.$$

于是 df_p 在基 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 下的矩阵为

$$df_p = (f_x, f_y, f_z).$$

在这种情形下, df_p 不是满射等价于在 p 处 $f_x = f_y = f_z = 0$ 。因此, 对于 $f: U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in f(U)$ 是 f 的正则值当且仅当 f_x, f_y, f_z 在逆像

$$f^{-1}(a) = \{(x, y, z) \in U; f(x, y, z) = a\}$$

中任何点上不同时为零。

命题 2.4 (正则值原像是正则曲面). 设 $f: U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 是可微函数, $a \in f(U)$ 是 f 的正则值, 则 $f^{-1}(a)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的正则曲面。

设 $p = (x_0, y_0, z_0) \in f^{-1}(a)$ 。由于 a 是 f 的正则值, 通过重新标记坐标轴, 我们可以假设在 p 处 $f_z \neq 0$ 。定义映射 $F: U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为

$$F(x, y, z) = (x, y, f(x, y, z)),$$

并用 (u, v, t) 表示 F 取值于 $\mathbb{R}^3$ 中一点的坐标。 F 在 p 处的微分为

$$dF_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ f_x & f_y & f_z \end{pmatrix},$$

因此

$$\det(dF_p) = f_z \neq 0.$$


因此我们可以应用逆函数定理, 它保证存在 p 的邻域 V 和 $F(p)$ 的邻域 W , 使得 $F: V \rightarrow W$ 是可逆的, 且逆映射 $F^{-1}: W \rightarrow V$ 是可微的 (见 fig. 2.5a, 教材 Figure 2-7)。由此可得 F^{-1} 的坐标函数, 即函数

$$x = u, \quad y = v, \quad z = g(u, v, t), \quad (u, v, t) \in W,$$

都是可微的。特别地, $z = g(u, v, a) = h(x, y)$ 是定义在 V 到 xy 平面投影上的可微函数。由于

$$F(f^{-1}(a) \cap V) = W \cap \{(u, v, t); t = a\},$$

我们得到 h 的图像是 $f^{-1}(a) \cap V$ 。由命题 1, $f^{-1}(a) \cap V$ 是 p 的一个坐标邻域。因此 $f^{-1}(a)$ 上每一点都能被坐标邻域覆盖, 故 $f^{-1}(a)$ 是正则曲面。 $\square$



(a) Figure 2-7. 逆函数定理的应用

注 2.2. 证明的关键在于利用逆函数定理“解出 z ”, 即从方程 $f(x, y, z) = a$ 中解出 z 。这可以在 p 的邻域中完成, 因为 $f_z(p) \neq 0$ 。这一事实是一般隐函数定理的特殊情形, 隐函数定理可由逆函数定理推出, 事实上与逆函数定理等价。

例 2.2 (椭球面). 椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$


是正则曲面。实际上, 它是 $f^{-1}(0)$, 其中

$$f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1$$

是可微函数, 0 是 f 的正则值。这是因为偏导数 $f_x = 2x/a^2$, $f_y = 2y/b^2$, $f_z = 2z/c^2$ 仅在点 $(0,0,0)$ 处同时为零, 而该点不在 $f^{-1}(0)$ 中。当 $a = b = c = 1$ 时, 椭球面退化为球面, 因此球面是椭球面的特殊情形。

到目前为止给出的正则曲面例子都是 $\mathbb{R}^3$ 的连通子集。如果 $\mathbb{R}^3$ 中任意两点都可以由完全位于 S 中的连续曲线连接, 则称曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是连通的。在正则曲面的定义中, 我们对曲面的连通性没有限制, 下面的例子表明由命题 2 给出的正则曲面可能不是连通的。

例 2.3 (双叶双曲面不是连通曲面). 双叶双曲面 $-x^2 - y^2 + z^2 = 1$ 是正则曲面, 因为它可以写成 $S = f^{-1}(0)$, 其中 0 是 $f(x, y, z) = -x^2 - y^2 + z^2 - 1$ 的正则值 (见 *fig. 2.6a*, 教材 *Figure 2-8*)。注意曲面 S 不是连通的: 给定分别在两叶 ($z > 0$ 和 $z < 0$) 上的两点, 不存在完全位于曲面上的连续曲线 $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 将它们连接起来; 否则 z 改变符号, 对某个 t_0 有 $z(t_0) = 0$, 这意味着 $\alpha(t_0) \notin S$ 。



(a) Figure 2-8. 非连通曲面: $-y^2 - x^2 + z^2 = 1$

顺便指出, 例 3 的论证方法可用于证明我们后面会反复使用的连通曲面的一个性质。如果 $f: S \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 是定义在连通曲面 S 上的非零连续函数, 则 f 在 S 上不变号。

为证明这一点, 我们使用介值定理 (第二章附录, 命题 4)。设 $f(p) > 0$ 且 $f(q) < 0$ 。由于 S 是连通的, 存在连续曲线 $\alpha: [a, b] \rightarrow S$ 使得 $\alpha(a) = p$, $\alpha(b) = q$ 。将介值定理应用于连续函数 $f \circ \alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 我们发现存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f \circ \alpha(c) = 0$; 即 f 在 $\alpha(c)$ 处为零, 矛盾。

例 2.4 (环面的参数化). 环面 T 是由半径为 r 的圆 S^1 绕圆所在平面内且与圆心距离为 $a > r$ 的直线旋转生成的“曲面” (见 fig. 2.7a, 教材 Figure 2-9)。

设 S^1 是 yz 平面中圆心为 $(0, a, 0)$ 的圆, 则 S^1 由 $(y - a)^2 + z^2 = r^2$ 给出。绕 z 轴旋转此圆得到的图形 T 上的点满足方程

$$z^2 = r^2 - (\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2.$$

因此 T 是函数

$$f(x, y, z) = z^2 + (\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2$$

取 r^2 时的逆像。该函数在 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时可微, 且由于


$$\frac{\partial f}{\partial z} = 2z, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y(\sqrt{x^2 + y^2} - a)}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x(\sqrt{x^2 + y^2} - a)}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

r^2 是 f 的正则值。故环面 T 是正则曲面。

环面的参数化可以写成

$$\mathbf{x}(u, v) = ((r \cos u + a) \cos v, (r \cos u + a) \sin v, r \sin u),$$

其中 $0 < u, v < 2\pi$ (见 fig. 2.7a, 教材 Figure 2-9)。



(a) Figure 2-9. 环面 (torus)

命题 1 表明可微函数的图像是正则曲面。下面的命题给出了其局部逆命题: 任何正则曲面局部都是某个可微函数的图像。

命题 2.5 (局部图形表示). 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是正则曲面, $p \in S$ 。则存在 p 在 S 中的邻域 V , 使得 V 是某个可微函数的图像, 该函数具有以下三种形式之一:

$$z = f(x, y), \quad y = g(x, z), \quad x = h(y, z).$$

设 $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ 是 p 点邻域的参数化, 写成 $\mathbf{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, $(u, v) \in U$. 由定义 1 的条件 3, 三个雅可比行列式

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}, \quad \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \quad \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}$$

中有一个在 $\mathbf{x}^{-1}(p) = q$ 处不为零。

假设 $\partial(x, y)/\partial(u, v)(q) \neq 0$, 考虑映射 $\pi \circ \mathbf{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^2$, 其中 π 是投影 $\pi(x, y, z) = (x, y)$. 则 $\pi \circ \mathbf{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$, 且由于 $\partial(x, y)/\partial(u, v)(q) \neq 0$, 我们可以应用逆函数定理, 保证存在 q 的邻域 V_1 和 $\pi \circ \mathbf{x}(q)$ 的邻域 V_2 , 使得 $\pi \circ \mathbf{x}$ 将 V_1 微分同胚地映射到 V_2 . 由此可得, 限制在 $\mathbf{x}(V_1) = V$ 上, π 是单射, 且存在可微的逆映射 $(\pi \circ \mathbf{x})^{-1} : V_2 \rightarrow V_1$. 由于 $\mathbf{x}$ 是同胚, V 是 p 在 S 中的邻域. 现在, 将 $(\pi \circ \mathbf{x})^{-1} : (x, y) \rightarrow (u(x, y), v(x, y))$ 与函数 $(u, v) \rightarrow z(u, v)$ 合成, 我们得到 V 是可微函数 $z = z(u(x, y), v(x, y)) = f(x, y)$ 的图像. 其他两种情形同理可证. $\square$

下一个命题说明: 如果我们已经知道 S 是正则曲面, 且有一个候选参数化 $\mathbf{x}$, 在满足其他条件时, 不需要验证 $\mathbf{x}^{-1}$ 是否连续. 这个注记在例 1 中使用过。

命题 2.6 (单射保证逆连续). 设 $p \in S$ 是正则曲面 S 的一点, $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是满足 $p \in \mathbf{x}(U) \subset S$ 的映射, 使得定义 1 中的条件 1 和 3 成立. 假设 $\mathbf{x}$ 是单射, 则 $\mathbf{x}^{-1}$ 是连续的。

我们以与命题 3 证明类似的方式进行. 写成 $\mathbf{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, $(u, v) \in U$, 设 $q \in U$. 由条件 1 和 3, 通过交换坐标轴, 我们可以假设 $\partial(x, y)/\partial(u, v)(q) \neq 0$. 设 $\pi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是投影 $\pi(x, y, z) = (x, y)$. 由逆函数定理, 我们得到 q 在 U 中的邻域 V_1 和 $\pi \circ \mathbf{x}(q)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中的邻域 V_2 , 使得 $\pi \circ \mathbf{x}$ 将 V_1 微分同胚地映射到 V_2 .

假设 $\mathbf{x}$ 是双射. 则限制在 $\mathbf{x}(V_1)$ 上, $\mathbf{x}^{-1} = (\pi \circ \mathbf{x})^{-1} \circ \pi$. 因此 $\mathbf{x}^{-1}$ 作为连续映射的合成是连续的. $\square$

命题 2.7 (垂直投影判断法). 设 $S \subset \mathbb{R}^3$. 如果对每一点 $p \in S$, 存在 p 的邻域 V 使得 $V \cap S$ 是以下三种形式之一:

$$z = f(x, y), \quad y = g(x, z), \quad x = h(y, z),$$

其中 f, g, h 是可微函数, 则 S 是正则曲面。

Why is this useful? 这个命题告诉我们: 判断一个集合是否是曲面, 只需检查它局部是否是某个可微函数的图像. 这比直接验证定义中的三个条件要容易得多。

例 2.5 (锥面不是正则曲面). 单叶锥面

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = +\sqrt{x^2 + y^2}\}$$

不是正则曲面. 关键在于顶点 $(0, 0, 0)$ 处——任何包含该点的邻域都与锥面相交, 而在该点处无法定义良好的切平面 (锥面在顶点处有一个“尖”).

这个例子说明了定义中条件 3 的必要性: 如果仅仅去掉顶点, 修改后的曲面将是正则的。

2-2 节练习

练习 2-2, 1 —do Carmo, Exercise 2-2, 1 Show that the cylinder $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1\}$ is a regular surface, and find parametrizations whose coordinate neighborhoods cover it.

解答 直观理解：圆柱面可以通过将平面卷起来得到。我们可以利用极坐标中的角度 u 和高度 v 作为参数。

解答：设 $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1\}$ 。定义映射 $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为

$$\mathbf{x}(u, v) = (\cos u, \sin u, v).$$

为了覆盖整个圆柱面，我们需要至少两个坐标邻域。例如：

1. $U_1 = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2; 0 < u < 2\pi, -\infty < v < +\infty\}$,
2. $U_2 = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2; -\pi < u < \pi, -\infty < v < +\infty\}$ 。

验证正则性（以 U_1 为例）：

1. **可微性：** $\cos u, \sin u, v$ 显然是无限可微的。
2. **同胚：** $\mathbf{x}$ 在 U_1 上是单射，且其逆映射

$$u = \text{atan2}(y, x), \quad v = z$$

在 $\mathbf{x}(U_1)$ 上连续（注意在 U_1 的范围内 atan2 是连续的）。

3. **正则条件：**计算偏导数：

$$\mathbf{x}_u = (-\sin u, \cos u, 0), \quad \mathbf{x}_v = (0, 0, 1).$$

向量积 $\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v = (\cos u, \sin u, 0)$ 。由于 $|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v|^2 = \cos^2 u + \sin^2 u = 1 \neq 0$ ，故 $\mathbf{x}_u$ 与 $\mathbf{x}_v$ 线性无关。

综上所述， S 是一个正则曲面。

练习 2-2, 2 —do Carmo, Exercise 2-2, 2 Is the set $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0 \text{ and } x^2 + y^2 \leq 1\}$ a regular surface? Is the set $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0, \text{ and } x^2 + y^2 < 1\}$ a regular surface?

解答 解答：

1. 集合 $S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$ **不是**正则曲面。原因：考虑边界点 p ，满足 $x^2 + y^2 = 1$ 。在 S_1 中， p 的任何邻域都包含边界，因此它不与 $\mathbb{R}^2$ 中的开集同胚。具体来说，正则曲面的每一点都必须有一个邻域同胚于 $\mathbb{R}^2$ 中的开盘，而闭圆盘的边界点不满足此性质。
2. 集合 $S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0, x^2 + y^2 < 1\}$ **是**正则曲面。原因：它可以视为可微函数 $z = f(x, y) = 0$ 在开集 $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 < 1\}$ 上的图像 (graph)。任何定义在开集上的可微函数的图像都是正则曲面。

练习 2-2, 3 —do Carmo, Exercise 2-2, 3 Show that the two-sheeted cone, with its vertex at the origin, that is, the set $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 - z^2 = 0\}$, is not a regular surface.

解答 直观理解：锥面在原点处有一个“尖点”。虽然在原点以外的部分是平滑的，但原点的存在破坏了整体的正则性。

解答：考虑原点 $P = (0, 0, 0)$ 。如果 S 是正则曲面，则存在 P 的邻域 $V \subset \mathbb{R}^3$ 使得 $V \cap S$ 与 $\mathbb{R}^2$ 中的开盘 U 同胚。

考虑连通性：

- 在 $\mathbb{R}^2$ 中，如果从开盘 U 中移除一个点，剩余的集合 $U \setminus \{q\}$ 仍然是连通的。
- 在锥面 S 中，如果从 $V \cap S$ 中移除原点 P ，剩余的集合将分为两部分（对应 $z > 0$ 和 $z < 0$ ），因而不是连通的。

由于同胚必须保持连通性，这种矛盾说明 P 点不存在满足定义的邻域。因此， S 不是正则曲面。

练习 2-2, 4 —do Carmo, Exercise 2-2, 4 Let $f(x, y, z) = z^2$. Prove that 0 is not a regular value of f and yet that $f^{-1}(0)$ is a regular surface.

解答 解答：

1. **证明 0 不是正则值：**计算 f 的梯度： $\nabla f = (0, 0, 2z)$ 。对于任何点 $(x, y, z) \in f^{-1}(0)$ ，都有 $z^2 = 0$ ，即 $z = 0$ 。因此，在 $f^{-1}(0)$ 的所有点处， $\nabla f = (0, 0, 0)$ 。因为梯度在 $f^{-1}(0)$ 的每一点都为零，所以 0 不是 f 的正则值。
2. **证明 $f^{-1}(0)$ 是正则曲面：**由定义， $f^{-1}(0) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0\}$ 。这正是 $\mathbb{R}^3$ 中的 xy 平面。我们可以用单一坐标片覆盖它：

$$\mathbf{x}(u, v) = (u, v, 0), \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

显然这是一个正则参数化。因此， xy 平面是一个正则曲面。

这个练习说明：正则值定理给出了集合成为正则曲面的**充分条件**，但并非**必要条件**。

练习 2-2, 5* —do Carmo, Exercise 2-2, 5 Let $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x = y\}$ (a plane) and let $\mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ be given by

$$\mathbf{x}(u, v) = (u + v, u + v, uv),$$

where $U = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2; u > v\}$. Clearly, $\mathbf{x}(U) \subset P$. Is $\mathbf{x}$ a parametrization of P ?

解答 解答：要判断 $\mathbf{x}$ 是否为 P 的参数化，我们需要验证正则曲面定义中的三个条件：

1. **可微性：** $\mathbf{x}(u, v) = (u + v, u + v, uv)$ 的分量均为多项式，因而是无限可微的。
2. **同胚：**

- **单射性**: 设 $\mathbf{x}(u, v) = (x, y, z)$, 则 $x = u + v$ 且 $z = uv$. 根据韦达定理, u, v 是二次方程 $t^2 - xt + z = 0$ 的两个根. 根为 $t = \frac{x \pm \sqrt{x^2 - 4z}}{2}$. 由于定义域要求 $u > v$, 故 u 必须取大根, v 必须取小根:

$$u = \frac{x + \sqrt{x^2 - 4z}}{2}, \quad v = \frac{x - \sqrt{x^2 - 4z}}{2}.$$

这表明对给定的 (x, y, z) , (u, v) 是唯一确定的, 故 $\mathbf{x}$ 是单射。

- **逆映射连续性**: 从上述公式可以看出, u 和 v 作为 x, z 的函数在迹 $\mathbf{x}(U)$ (满足 $x^2 - 4z > 0$) 上是连续的。

3. 正则条件: 计算偏导数

$$\mathbf{x}_u = (1, 1, v), \quad \mathbf{x}_v = (1, 1, u).$$

雅可比矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ v & u \end{pmatrix}$. 两列向量线性相关的充要条件是它们成比例. 由于前两个分量均为 1, 这要求 $v = u$. 但在 U 中 $u > v$, 故两列向量始终线性无关。

结论: $\mathbf{x}$ 是 P 的一个参数化 (它覆盖了平面 $x = y$ 中满足 $x^2 > 4z$ 的开子集)。

练习 2-2, 6 —do Carmo, Exercise 2-2, 6 Give another proof of Prop. 1 by applying Prop. 2 to $h(x, y, z) = f(x, y) - z$.

解答 背景说明:

- **命题 1**: 可微函数 $z = f(x, y)$ 的图像是正则曲面。
- **命题 2** (正则值定理): 若 a 是 $h: U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 的正则值, 则 $h^{-1}(a)$ 是正则曲面。

解答: 定义函数 $h: U \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$h(x, y, z) = f(x, y) - z.$$

显然, f 的图像正是集合 $h^{-1}(0) = \{(x, y, z); h(x, y, z) = 0\}$ 。

为了应用命题 2, 我们需要证明 0 是 h 的正则值. 计算 h 的梯度:

$$\nabla h = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, -1 \right).$$

由于梯度的第三个分量始终为 $-1 \neq 0$, 因此梯度向量在任何点都不可能为零向量. 这意味着 h 的所有值 (包括 0) 都是正则值。

根据命题 2, $h^{-1}(0)$ 是正则曲面. 证毕。

练习 2-2, 7 —do Carmo, Exercise 2-2, 7 Let $f(x, y, z) = (x + y + z - 1)^2$.

- Locate the critical points and critical values of f .
- For what values of c is the set $f(x, y, z) = c$ a regular surface?

c. Answer the questions in a and b for the function $f(x, y, z) = xyz^2$.

解答 解答:

第一部分: $f(x, y, z) = (x + y + z - 1)^2$

a. **临界点与临界值:** 计算梯度: $\nabla f = (2(x + y + z - 1), 2(x + y + z - 1), 2(x + y + z - 1))$ 。临界点满足 $\nabla f = (0, 0, 0)$, 即 $x + y + z - 1 = 0$ (这是一个平面)。临界值为 $f(x, y, z) = 0^2 = 0$ 。

b. **正则性分析:**

- 若 $c < 0$, $f^{-1}(c)$ 为空集, 空集显然满足正则曲面定义。
- 若 $c = 0$, $f^{-1}(0) = \{(x, y, z); x + y + z - 1 = 0\}$ 是一个平面, 它是正则曲面。
- 若 $c > 0$, $f^{-1}(c) = \{(x, y, z); x + y + z - 1 = \pm\sqrt{c}\}$, 这是两个平行平面的并集。由于这两个平面不相交, 且每个平面都是正则曲面, 它们的并集也是正则曲面。

结论: 对于所有 $c \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(c)$ 都是正则曲面。

第二部分: $f(x, y, z) = xyz^2$

c1. **临界点与临界值:** 梯度为 $\nabla f = (yz^2, xz^2, 2xyz)$ 。临界点满足: (1) $z = 0$ (对应整个 xy 平面); (2) $x = 0$ 且 $y = 0$ (对应整个 z 轴)。在这两种情况下, 临界值均为 $f = 0$ 。

c2. **正则性分析:**

- 若 $c \neq 0$, 则 c 是正则值。由正则值定理, $f^{-1}(c)$ 是正则曲面。
- 若 $c = 0$, $f^{-1}(0) = \{(x, y, z); xyz^2 = 0\}$ 是三个坐标平面 ($x = 0, y = 0, z = 0$) 的并集。这个集合在坐标轴处发生交汇, 不满足正则曲面的局部同胚性质。

结论: 当 $c \neq 0$ 时, $f^{-1}(c)$ 是正则曲面。

练习 2-2, 8* —do Carmo, Exercise 2-2, 8 Let $\mathbf{x}(u, v)$ be as in Def. 1. Verify that $d\mathbf{x}_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ is one-to-one if and only if

$$\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v} \neq 0.$$

解答 解答: 微分 $d\mathbf{x}_q$ 是从 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的线性映射。在标准基下, 其矩阵表示为以 $\mathbf{x}_u = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}$ 和 $\mathbf{x}_v = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}$ 为列向量的 3×2 矩阵:

$$d\mathbf{x}_q = (\mathbf{x}_u \quad \mathbf{x}_v).$$

- 一个线性映射是单射 (one-to-one), 当且仅当其列向量线性无关。
- 对于 $\mathbb{R}^3$ 中的两个向量 $\mathbf{x}_u$ 和 $\mathbf{x}_v$, 它们线性无关当且仅当它们的向量积 (叉乘) 不为零:

$$\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v \neq 0.$$

注：在 $\mathbb{R}^3$ 中， $\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v$ 通常指代向量积 $\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v$ 。其模长代表了两向量张成的平行四边形的面积；面积非零当且仅当向量线性无关。证毕。

练习 2-2, 9 —do Carmo, Exercise 2-2, 9 Let V be an open set in the xy plane. Show that the set

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0 \text{ and } (x, y) \in V\}$$

is a regular surface.

解答 解答：该集合是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个开区域在 xy 平面上的平铺。我们可以直接给出一个覆盖全集的参数化。

定义映射 $\mathbf{x} : V \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为：

$$\mathbf{x}(u, v) = (u, v, 0).$$

验证定义条件：

1. **可微性：**分量函数 $u, v, 0$ 显然是无限可微的。

2. **同胚：**

- $\mathbf{x}$ 是单射：若 $(u_1, v_1, 0) = (u_2, v_2, 0)$ ，则 $u_1 = u_2, v_1 = v_2$ 。
- 逆映射为 $\mathbf{x}^{-1}(x, y, 0) = (x, y)$ ，这是从 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的投影映射在 S 上的限制，显然是连续的。

3. **正则条件：**计算偏导数：

$$\mathbf{x}_u = (1, 0, 0), \quad \mathbf{x}_v = (0, 1, 0).$$

向量积 $\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v = (0, 0, 1) \neq 0$ 。

因此， S 是一个正则曲面。

练习 2-2, 10* —do Carmo, Exercise 2-2, 10 Let C be a figure "8" in the xy plane and let S be the cylindrical surface over C (见 fig. 2.8a, 教材 Figure 2-11); that is,

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; (x, y) \in C\}.$$

Is S a regular surface?

解答 解答：该集合 S 不是正则曲面。

证明 (使用正则曲面定义的三个条件)：

步骤 1：回忆正则曲面的定义。

根据 do Carmo 的定义 (Definition 2-2-1)，集合 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是正则曲面，当且仅当对每一点 $q \in S$ ，存在 q 的一个邻域 $V \subset \mathbb{R}^3$ 使得 $V \cap S$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中某个开盘在光滑双射下的像，且该双射的逆映射连续。

这三个条件的核心是：每一点都必须存在一个与 $\mathbb{R}^2$ 中开盘同胚的邻域。

步骤 2：分析 figure "8" 曲线 C 的几何结构。

设 figure “8” 曲线 C 在 xy 平面上的参数方程为

$$C : \gamma(t) = (\sin t, \sin 2t), \quad t \in \mathbb{R},$$

或者用隐式方程描述:

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y^2 = x^2 - x^4\}.$$

曲线 C 在原点 $(0, 0)$ 处有自交点。这是因为:

- 当 $t = 0$ 时, $\gamma(0) = (0, 0)$;
- 当 $t = \pi$ 时, $\gamma(\pi) = (0, 0)$;
- 当 $t = \frac{\pi}{2}$ 时, $\gamma(\frac{\pi}{2}) = (1, 0)$;
- 当 $t = \frac{3\pi}{2}$ 时, $\gamma(\frac{3\pi}{2}) = (-1, 0)$ 。

因此, 曲线 C 在原点附近形成一个交叉结构, 类似于字母 “8” 的中心交叉点。

步骤 3: 确定 S 的自交线。

由 S 的定义

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; (x, y) \in C\},$$

即 S 是将曲线 C 沿 z 轴方向平移得到的圆柱面。因此, C 的自交点 $(0, 0)$ 对应于 S 中的一条直线

$$L = \{(0, 0, z); z \in \mathbb{R}\},$$

这条直线 L 是 S 的**自交线** (self-intersection line)。在线 L 上, 每一点 $p = (0, 0, z_0)$ 实际上都是 S 上两个不同点的“合并”——从 C 的两支在 z 方向延伸形成。

步骤 4: 取 L 上一点 p , 证明其任何邻域都不能同胚于 $\mathbb{R}^2$ 中的开盘。

这是证明的核心。我们使用拓扑论证。

设 $p = (0, 0, 0) \in L \subset S$ (一般性设 $z_0 = 0$, 通过平移可得一般情形)。

假设存在 p 在 S 中的邻域 V 使得 V 与 $\mathbb{R}^2$ 中的开盘同胚。则 V 应该具有以下拓扑性质:

1. V 是连通的 (open set in a connected space is connected);
2. $V \setminus \{p\}$ 是连通的, 或者是两个连通分支 (取决于局部结构)。

然而, 实际的局部结构是:

在 p 点的任意小邻域内, S 的形状如下: 由于 C 在 $(0, 0)$ 处有交叉, S 在 p 点附近由两叶 (two sheets) 组成, 这两叶在 p 点处交于直线 L 。更精确地, S 在 p 点附近是两张光滑曲面 (分别来自 C 的两支沿 z 方向的平移) 的并集, 这两张曲面仅在直线 L 上相交。

取 p 的任意小邻域

$$V_\varepsilon = \{(x, y, z) \in S; x^2 + y^2 < \varepsilon^2, |z| < \varepsilon\},$$

则 $V_\varepsilon \setminus \{p\}$ 有**四个**连通分支:

- 第一叶的上半部分: 对应 C 的第一支 (从 $t = 0$ 附近出发), $z > 0$;

- 第一叶的下半部分：对应 C 的第一支， $z < 0$ ；
- 第二叶的上半部分：对应 C 的第二支， $z > 0$ ；
- 第二叶的下半部分：对应 C 的第二支， $z < 0$ 。

然而， $\mathbb{R}^2$ 中开盘挖去中心点后，所得集合只有一个连通分支（它是连通的）。由于同胚保持连通分支数，我们有

$$\# \text{conn. comp.}(V_\varepsilon \setminus \{p\}) = 4 \neq 1 = \# \text{conn. comp.}(D^2 \setminus \{0\}),$$

其中 D^2 表示 $\mathbb{R}^2$ 中的单位开盘。

因此， V_ε 与开盘的同胚不可能成立。这与正则曲面的条件 1 矛盾。

步骤 5：形式化地使用参数化方法验证条件 2 和条件 3 也失效。

正则曲面的定义还有另一个等价的表述 (Theorem 2-2-2)： S 是正则曲面当且仅当对每一点 $q \in S$ ，存在局部参数化 $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 使得

- $\mathbf{x}$ 是光滑的；
- $\mathbf{x}$ 是单射；
- 对所有 $u \in U$ ，雅可比矩阵 $d\mathbf{x}_u$ 的秩为 2（即偏导数 $\mathbf{x}_u$ 和 $\mathbf{x}_v$ 线性无关）。

在自交点 $p = (0, 0, 0)$ 处，假设存在这样的参数化 $\mathbf{x}$ 。则 $\mathbf{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 满足

$$(x(u, v), y(u, v)) \in C, \quad \text{对所有 } (u, v) \in U.$$

由于 C 在 $(0, 0)$ 处有自交，不存在 (u, v) 的邻域使得 $(x(u, v), y(u, v))$ 在 C 上画出单叶的曲线。换言之，任何光滑参数化在自交点附近都会“跨越”自交的两支，从而不能是单射——因为自交点的任何邻域在 C 上都包含来自两支的点，而这些点无法在参数域中被分离。

因此，**条件 2**（参数化的单射性）失败。

即使我们尝试构造非单射的参数化，正则曲面的定义也要求参数化是单射的（局部是嵌入，而非浸入），因此无法通过参数化方法绕过上述拓扑矛盾。

步骤 6：与光滑曲线情形对比。

为了对比，我们考虑如果 C 是光滑曲线（如椭圆）的情形。设

$$C_{\text{ellipse}} = \{(x, y); \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\}, \quad a, b > 0.$$

则对应的圆柱面

$$S_{\text{ellipse}} = \{(x, y, z); (x, y) \in C_{\text{ellipse}}\}$$

是正则曲面。这是因为椭圆是光滑曲线（没有自交点），其每一点处都有正则参数化。沿 z 方向平移后， S_{ellipse} 每一点处都满足正则曲面的三个条件。

特别地，对 S_{ellipse} 的任何点 q ，我们可以构造局部参数化：

$$\mathbf{x}(u, v) = (a \cos u, b \sin u, v), \quad (u, v) \in (0, 2\pi) \times \mathbb{R},$$

其在像集中是双射的，偏导数

$$\mathbf{x}_u = (-a \sin u, b \cos u, 0), \quad \mathbf{x}_v = (0, 0, 1)$$

在任何点都线性无关（因为 $\mathbf{x}_v$ 指向 z 方向，而 $\mathbf{x}_u$ 在 xy 平面内）。

这说明光滑基曲线的圆柱面是正则曲面，而有自交点的曲线（如 figure “8”）的圆柱面不是。

步骤 7：正则曲面与浸入曲面的区别。

需要特别强调的是，上述 S 是一个**浸入曲面**（immersed surface），但不是**正则曲面**（regular surface）。

具体而言，映射

$$\mathbf{x} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{x}(t, s) = (\sin t, \sin 2t, s)$$

是光滑的，且其雅可比矩阵

$$d\mathbf{x}_{(t,s)} = \begin{pmatrix} \cos t & 0 \\ 2 \cos 2t & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

在除了 t 满足 $\cos t = 0$ 且 $\cos 2t = 0$ 的点外，秩均为 2。然而， $\mathbf{x}$ 不是单射——不同的 (t, s) 可以对应 xy 平面上相同的点——并且 $\mathbf{x}$ 的像恰好是 S 。

这揭示了关键区别：

- **浸入**（immersion）：光滑映射 $f : M \rightarrow \mathbb{R}^3$ ，满足 df_p 在每点为单射。浸入允许有自交。
- **嵌入**（embedding）：单射的浸入，且同胚于其像的空间。嵌入没有自交。
- **正则曲面**（regular surface）：等价于嵌入——局部是单射浸入，且像集局部同胚于 $\mathbb{R}^2$ 中的开盘。

因此， S 是一个浸入曲面（通过上述参数化），但由于自交线的存在，它不是嵌入，从而也不是正则曲面。

结论：综合以上论证， S 在自交线 L 上的每一点都不满足正则曲面的定义，因此 S 不是正则曲面。□

练习 2-2, 11 —do Carmo, Exercise 2-2, 11 Prove that the rotations of a surface of revolution S about its axis are diffeomorphisms of S .

解答 直观理解：旋转映射是 $\mathbb{R}^3$ 中保持轴不变的等距变换，它作用在由母线旋转生成的曲面上。由于旋转是双射且光滑，其逆（反向旋转）也是光滑的，故为微分同胚。

证明：设 S 是由平面曲线 $(g(v), h(v))$ ($v \in I$) 绕 z 轴旋转生成的曲面，其标准参数化

$$\mathbf{x}(u, v) = (g(v) \cos u, g(v) \sin u, h(v)), \quad u \in (0, 2\pi), v \in I.$$

绕 z 轴旋转角度 θ 的旋转映射 $R_\theta : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为

$$R_\theta(x, y, z) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta, z).$$

其在 S 上的限制满足 $R_\theta(\mathbf{x}(U)) \subset \mathbf{x}(U)$, 因为旋转不改变 $g(v)$ 和 $h(v)$ 。直接计算得

$$R_\theta(\mathbf{x}(u, v)) = (g(v) \cos(u + \theta), g(v) \sin(u + \theta), h(v)) = \mathbf{x}(u + \theta, v).$$

因此 $R_\theta|_S = \mathbf{x} \circ \bar{R}_\theta \circ \mathbf{x}^{-1}$, 其中 $\bar{R}_\theta(u, v) = (u + \theta, v)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的可微双射 (光滑且有光滑逆 $\bar{R}_{-\theta}$)。

由于 $\mathbf{x}$ 是微分同胚 (参数化是正则的), $R_\theta|_S$ 作为两个微分同胚的复合, 仍为 S 到自身的微分同胚。

练习 2-2, 12 —do Carmo, Exercise 2-2, 12 Parametrized surfaces are often useful to describe sets Σ which are regular surfaces except for a finite number of points and a finite number of lines. For instance, let C be the trace of a regular parametrized curve $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$ which does not pass through the origin $O = (0, 0, 0)$. Let Σ be the set generated by the displacement of a straight line l passing through a moving point $p \in C$ and the fixed point O (a cone with vertex O ; see Fig. 2-22).

- Find a parametrized surface $\mathbf{x}$ whose trace is Σ .
- Find the points where $\mathbf{x}$ is not regular.
- What should be removed from Σ so that the remaining set is a regular surface?

解答 直观理解: Σ 是一个以原点为顶点的锥面。每条母线 (即连接原点和 C 上一点的直线) 都是 Σ 的一部分。当 α 上的点绕原点旋转时, 这些母线生成的锥面在正则点处是正则的, 但在顶点 O 处会出现奇异性。

解答:

a. 设 $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $t \in (a, b)$ 。因为 C 不过原点, 所以 $|\alpha(t)| \neq 0$ 。过 $\alpha(t)$ 和原点 O 的直线可参数化为 $l(t, v) = v\alpha(t)$, $v > 0$ 。因此 Σ 的参数化为

$$\mathbf{x}(t, v) = v\alpha(t) = (vx(t), vy(t), vz(t)), \quad t \in (a, b), v > 0.$$

b. 计算偏导数:

$$\mathbf{x}_t = (vx'(t), vy'(t), vz'(t)), \quad \mathbf{x}_v = \alpha(t) = (x(t), y(t), z(t)).$$

它们的叉乘为

$$\mathbf{x}_t \times \mathbf{x}_v = v\alpha(t) \times \alpha'(t).$$

当 $v = 0$ (即原点 O) 时, 无论 $\alpha'(t)$ 为何值, 叉乘均为零。因此, $\mathbf{x}$ 在锥顶处不满足正则条件。

c. 从 Σ 中移除顶点 O 后, $\Sigma - \{O\}$ 成为正则曲面——因为 $v > 0$ 时 $v\alpha(t) \times \alpha'(t) \neq 0$ ($\alpha(t) \neq 0$ 且 $\alpha'(t) \neq 0$, 两者不平行)。

练习 2-2, 13* —do Carmo, Exercise 2-2, 13 Show that the definition of differentiability of a function $f : V \subset S \rightarrow \mathbb{R}$ given in the text (Def. 1) is equivalent to the following: f is differentiable in $p \in V$ if it is the restriction to V of a differentiable function defined in an open set of $\mathbb{R}^3$ containing p . (Had we started with this definition of differentiability, we could have defined a surface as a set which is locally diffeomorphic to $\mathbb{R}^2$; see Remark 3.)

解答 直观理解：定义 1 通过参数化来定义可微性—— $f \circ \mathbf{x}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中可微。另一个定义则直接说 f 是 $\mathbb{R}^3$ 中某个可微函数限制到曲面 S 上的结果。两者等价，因为正则曲面局部是某些可微函数的图。

证明：

($\Rightarrow$): 设 $f: V \subset S \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $p \in V$ 处按定义 1 可微。取 p 的参数化 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$, $q = \mathbf{x}^{-1}(p) \in U$ 。由定义, $f \circ \mathbf{x}$ 在 q 处可微。因为 $\mathbf{x}$ 是可微嵌入, 其分量都是可微的。令 $\bar{f} = f \circ \mathbf{x}: U \rightarrow \mathbb{R}$ 。由于 S 是正则曲面, 局部上可表示为 $z = f(x, y)$ 的形式, 因此存在 $\mathbb{R}^3$ 中 p 的开邻域 W 和可微函数 $\bar{f}: W \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $\bar{f}|_{S \cap W} = f|_{S \cap W}$ 。故 f 是 $\mathbb{R}^3$ 中某可微函数在 S 上的限制。

($\Leftarrow$): 反过来, 若存在开集 $W \subset \mathbb{R}^3$ ($p \in W$) 和可微函数 $\bar{f}: W \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $f|_V = \bar{f}|_V$ 。取 p 的参数化 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$, 则 $f \circ \mathbf{x} = \bar{f} \circ \mathbf{x}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中可微函数的复合, 故在 $q = \mathbf{x}^{-1}(p)$ 处可微。按定义 1, f 在 p 处可微。

备注：这个等价性允许我们把曲面定义为“局部微分同胚于 $\mathbb{R}^2$ 的集合”。

练习 2-2, 14 —do Carmo, Exercise 2-2, 14 Let $A \subset S$ be a subset of a regular surface S . Prove that A is itself a regular surface if and only if A is open in S ; that is, $A = U \cap S$, where U is an open set in $\mathbb{R}^3$.

解答 直观理解：正则曲面局部是平直的 (微分同胚于 $\mathbb{R}^2$ 的开集)。如果 A 是 S 的子集且本身也是正则曲面, 那么 A 的每一点附近都有一小块“平直的”邻域, 这些邻域的并恰好是 A 在 S 中的内部, 即 A 是 S 的开子集。反过来, S 的任何开子集局部仍是 S 的图像, 因此仍是正则曲面。

证明：

($\Rightarrow$): 设 A 本身是正则曲面。对任意 $p \in A$, 存在 p 在 A 中的参数化 $\mathbf{x}: U \rightarrow A$ 。由于 $\mathbf{x}$ 是 U 到 $A \subset S$ 的可微映射, 且 $d\mathbf{x}_q$ 在每点可逆, 根据正则曲面的局部图形定理 (教材命题), A 在 p 附近可以表示为某个可微函数 $z = f(x, y)$ 的图。这个图形同时也是 S 在 p 附近的一部分, 因此存在 $\mathbb{R}^3$ 中的开集 W , 使得 $A \cap W = S \cap W$ 。令 $U = W$, 则 $A = U \cap S$ 。

($\Leftarrow$): 反过来, 设 $A = U \cap S$, 其中 U 是 $\mathbb{R}^3$ 的开集。对任意 $p \in A$, 由于 U 是开集, p 在 $\mathbb{R}^3$ 中有邻域 $W \subset U$ 。在 p 附近, S 可以用参数化 $\mathbf{x}: \tilde{U} \rightarrow S$ 描述。那么 $\mathbf{x}^{-1}(W \cap S)$ 是 $\tilde{U}$ 中的开集, 从而 $W \cap S$ 可以作为正则曲面 (它是 S 的开子集, 局部仍是 $\mathbb{R}^2$ 的可微像)。因此 A 本身是正则曲面。

练习 2-2, 15 —do Carmo, Exercise 2-2, 15 Let C be a regular curve and let $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow C, \beta: J \subset \mathbb{R} \rightarrow C$ be two parametrizations of C in a neighborhood of $p \in \alpha(I) \cap \beta(J) = W$. Let

$$h = \alpha^{-1} \circ \beta: \beta^{-1}(W) \rightarrow \alpha^{-1}(W)$$

be the change of parameters. Prove that

a. h is a diffeomorphism.

b. The absolute value of the arc length of C in W does not depend on which parametrization is chosen to define it, that is,

$$\left| \int_{t_0}^t |\alpha'(t)| dt \right| = \left| \int_{\tau_0}^{\tau} |\beta'(\tau)| d\tau \right|, \quad t = h(\tau), t \in I, \tau \in J.$$

解答 直观理解：同一曲线用不同参数描述时，参数变换 h 必须是光滑且可逆的（微分同胚），否则无法保持曲线的正则性。弧长作为几何不变量，也不应依赖于参数化的选择。

证明：

a. 曲线 C 作为 $\mathbb{R}^3$ 中的正则曲线，其切向量 $\alpha'(t) \neq 0$ 。设 $h = \alpha^{-1} \circ \beta$ ，则 $h(\tau) = \alpha^{-1}(\beta(\tau))$ 。由于 β 和 α^{-1} 都是可微的（正则曲线的参数化是微分同胚）， h 是可微的。类似地， $h^{-1} = \beta^{-1} \circ \alpha$ 也是可微的。因此 h 是微分同胚。

b. 弧长公式：

$$s_\alpha(t) = \int_{t_0}^t |\alpha'(t)| dt, \quad s_\beta(\tau) = \int_{\tau_0}^\tau |\beta'(\tau)| d\tau.$$

由链式法则， $\alpha'(h(\tau)) \cdot h'(\tau) = \beta'(\tau)$ ，故 $|\beta'(\tau)| = |\alpha'(h(\tau))| \cdot |h'(\tau)|$ 。做变量替换 $t = h(\tau)$ ：

$$\int_{\tau_0}^\tau |\beta'(\tau)| d\tau = \int_{\tau_0}^\tau |\alpha'(h(\tau))| \cdot |h'(\tau)| d\tau = \int_{h(\tau_0)}^{h(\tau)} |\alpha'(t)| dt.$$

取 $t_0 = h(\tau_0)$ ，即得等式。

练习 2-2, 16* —do Carmo, Exercise 2-2, 16 Let $\mathbb{R}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = -1\}$ be identified with the complex plane $\mathbb{C}$ by setting $(x, y, -1) = x + iy = \zeta \in \mathbb{C}$. Let $P : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ be the complex polynomial

$$P(\zeta) = a_0 \zeta^n + a_1 \zeta^{n-1} + \cdots + a_n, \quad a_0 \neq 0, a_i \in \mathbb{C}, i = 0, \dots, n.$$

Denote by π_N the stereographic projection of $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ from the north pole $N = (0, 0, 1)$ onto $\mathbb{R}^2$. Prove that the map $F : S^2 \rightarrow S^2$ given by

$$F(p) = \pi_N^{-1} \circ P \circ \pi_N(p), \quad \text{if } p \in S^2 - \{N\},$$

$$F(N) = N$$

is differentiable.

解答 直观理解： F 是球面 S^2 的自映射，它由球极投影 $\pi_N : S^2 - \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 、复多项式 $P : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 和逆球极投影 $\pi_N^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow S^2 - \{N\}$ 复合而成。由于这三者都是可微的（多项式是光滑的，球极投影是微分同胚），它们的复合也是可微的。在 N 处我们单独定义 $F(N) = N$ ，这是光滑的因为 N 是孤立的。

证明：

记 $\pi_N : S^2 - \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为球极投影。若 $p = (x, y, z) \in S^2 - \{N\}$ ，则

$$\pi_N(x, y, z) = \left(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z} \right) = (\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2.$$

其逆映射为

$$\pi_N^{-1}(\xi, \eta) = \left(\frac{2\xi}{\xi^2 + \eta^2 + 1}, \frac{2\eta}{\xi^2 + \eta^2 + 1}, \frac{\xi^2 + \eta^2 - 1}{\xi^2 + \eta^2 + 1} \right).$$

步骤 1: π_N 在 $S^2 - \{N\}$ 上是光滑的（作为有理函数）。

步骤 2: $P : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 作为复多项式是光滑的（等价于 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的光滑映射）。


步骤 3: π_N^{-1} 在 $\mathbb{R}^2$ 上是光滑的（有理函数）。

因此, 对 $p \in S^2 - \{N\}$,

$$F(p) = \pi_N^{-1}(P(\pi_N(p)))$$

是三个光滑映射的复合, 故光滑。

在 N 处, 由于 N 是 S^2 的孤立点, 且 $F(N) = N$ 正好与 $p \rightarrow N$ 时的极限一致 (当 $p \rightarrow N$ 时 $\pi_N(p) \rightarrow \infty$, 而 P 作为多项式在无穷远处也趋于无穷, 但 $\pi_N^{-1}(\infty) = N$), F 在 N 处也是光滑的。



(a) Figure 2-11. 8 字曲线生成的柱面

2.3 Change of Parameters; Differentiable Functions on Surfaces

在上一节中, 我们看到正则曲面可以用不同的参数化来描述。例如, 球面可以用地理坐标 (θ, φ) , 也可以用平面垂直投影的六个局部坐标卡来描述。重要的是, 由曲面本身决定的几何量 (如切平面) 不应该依赖于参数化的选择。

Why do we need different parametrizations? 一个参数化 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 只能覆盖曲面的一部分。例如, 球面的地理坐标参数化在两极处失效 (雅可比为零)。因此, 我们需要多个参数化来覆盖整个曲面。

不同参数化之间的关系由**坐标变换** (change of parameters) 描述。如果 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 和 $\tilde{\mathbf{x}}: \tilde{U} \rightarrow S$ 是两个有重叠区域的参数化, 则在重叠区域上有坐标变换

$$\Phi = \mathbf{x}^{-1} \circ \tilde{\mathbf{x}}: \tilde{U}' \rightarrow U,$$

其中 $\tilde{U}' \subset \tilde{U}$ 是重叠区域在 $\tilde{\mathbf{x}}$ 下的像。

命题 2.8 (坐标变换是可微的). 设 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 和 $\tilde{\mathbf{x}}: \tilde{U} \rightarrow S$ 是正则曲面 S 的两个参数化, 假设 $\mathbf{x}^{-1}(\mathbf{x}(U) \cap \tilde{\mathbf{x}}(\tilde{U})) \subset U$ 。则坐标变换 $\Phi = \mathbf{x}^{-1} \circ \tilde{\mathbf{x}}$ 是可微的。

This is important. 这个命题告诉我们：无论我们用哪个参数化来计算，曲面上的可微函数的概念是良好定义的。一个函数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 p 处可微，意味着它在某个（从而任何）参数化下是可微的。

定义 2.9 (曲面上的可微函数). 设 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 是定义在正则曲面 S 上的函数。如果对每一点 $p \in S$ ，存在参数化 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 使得 $p \in \mathbf{x}(U)$ ，且合成函数

$$f \circ \mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

在 $q = \mathbf{x}^{-1}(p)$ 处是可微的，则称 f 在 p 处可微 (differentiable)。

类似地，可以定义可微映射 $F: S_1 \rightarrow S_2$ 。

注 2.3. 这个定义的关键在于：它不依赖于参数化的选择。如果一个函数在一个参数化下是可微的，它在所有参数化下都是可微的。

例 2.6 (高度函数). 设 S 是单位球面，定义高度函数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $f(x, y, z) = z$ 。在地理坐标下， $f(\mathbf{x}(\theta, \varphi)) = \cos \theta$ ，这是可微的。因此 f 是 S 上的可微函数。

定义 2.10 (可微曲线). 曲面 S 上的可微曲线是可微映射 $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow S$ ，其中 I 是区间。

Connection with Chapter 1. 注意到如果 $\alpha: I \rightarrow S$ 是曲面 S 上的可微曲线，则作为 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线， α 也是可微的（因为包含映射 $i: S \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ 是嵌入）。

2-3 节练习

练习 2-3, 1 —do Carmo, Exercise 2-3, 1 Let $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ be the unit sphere and let $f: S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ be given by $f(x, y, z) = z$. Show that f is differentiable.

解答 解答：根据曲面上可微函数的定义，我们需要证明对于 S^2 的任何参数化 $\mathbf{x}: U \rightarrow S^2$ ，合成函数 $f \circ \mathbf{x}: U \rightarrow \mathbb{R}$ 是可微的。

1. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 上的函数 $\tilde{f}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ，定义为 $\tilde{f}(x, y, z) = z$ 。这是一个多项式函数，在 $\mathbb{R}^3$ 上显然是无限可微的。
2. 球面上的函数 f 正是 $\tilde{f}$ 在 S^2 上的限制，即 $f = \tilde{f}|_{S^2}$ 。
3. 对于 S^2 的任何参数化 $\mathbf{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ ，由于 $\mathbf{x}$ 是可微映射，其分量函数 x, y, z 都是 (u, v) 的可微函数。
4. 合成函数为 $(f \circ \mathbf{x})(u, v) = \tilde{f}(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) = z(u, v)$ 。
5. 由于 $z(u, v)$ 是可微函数，因此 $f \circ \mathbf{x}$ 在 U 上可微。

结论： f 是 S^2 上的可微函数。

练习 2-3, 2 —do Carmo, Exercise 2-3, 2 Let $S \subset \mathbb{R}^3$ be a regular surface and let $p \in S$. Show that there exists a neighborhood V of p in S such that the projection onto the tangent plane at p maps V diffeomorphically onto an open set of $\mathbb{R}^2$.

解答 解答：通过旋转和平移，我们可以假设 $p = (0, 0, 0)$ ，且 p 点处的切平面 $T_p S$ 为 xy 平面（即 $z = 0$ ）。

1. **局部图形表示：**根据正则曲面的性质（教材 2-2 节命题 4），如果 $T_p S$ 是 xy 平面，则在 p 点附近存在邻域 $V \subset S$ ，使得 S 可以表示为一个可微函数 $z = f(x, y)$ 的图像。
2. **投影映射：**定义投影映射 $\pi : V \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为 $\pi(x, y, z) = (x, y)$ 。由于 π 是 $\mathbb{R}^3$ 中线性投影映射在 S 上的限制，它在 S 上是可微的。
3. **逆映射：**由于 V 是图像，对任何 $(x, y) \in \pi(V)$ ，其在 V 中的原像唯一确定为 $\mathbf{x}(x, y) = (x, y, f(x, y))$ 。
4. **微分同胚：**
 - $\mathbf{x}$ 是可微映射（因为 f 可微）。
 - $\pi \circ \mathbf{x} = \text{id}_{\pi(V)}$ 且 $\mathbf{x} \circ \pi = \text{id}_V$ 。

因此， π 是从 V 到开集 $U = \pi(V) \subset \mathbb{R}^2$ 的微分同胚。

结论：在 p 点附近的局部区域，曲面总能微分同胚地投影到其切平面上。

练习 2-3, 3* —do Carmo, Exercise 2-3, 3 Let $\mathbf{x} : U \rightarrow S$ be a parametrization of a regular surface S . Show that $\mathbf{x}^{-1} : \mathbf{x}(U) \rightarrow U$ is continuous. (This shows that condition 2 in the definition of a regular surface can be replaced by: $\mathbf{x}$ is a homeomorphism onto its image.)

解答 解答：我们要证明如果 $\mathbf{x}$ 满足可微性（条件 1）和正则性（条件 3），则 $\mathbf{x}^{-1}$ 必然是连续的。

1. **构造 3D 映射：**设 $q \in U$ 。定义映射 $F : U \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为：

$$F(u, v, t) = \mathbf{x}(u, v) + tN(u, v),$$

其中 $N(u, v) = \frac{\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v}{|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v|}$ 是曲面在点 (u, v) 处的单位法向量。

2. **雅可比行列式：**计算 F 在 $(q, 0)$ 处的导数。其雅可比矩阵的列向量为 $\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v, N$ 。由于 $\mathbf{x}_u$ 和 $\mathbf{x}_v$ 线性无关且 N 与它们正交且非零，这三个向量构成 $\mathbb{R}^3$ 的基。因此， $\det(dF_{(q,0)}) \neq 0$ 。
3. **应用逆映射定理：**根据逆映射定理，存在 $(q, 0)$ 的邻域和 $\mathbf{x}(q)$ 的邻域 $W \subset \mathbb{R}^3$ ，使得 F 在该邻域内有可微的逆映射 $F^{-1} : W \rightarrow U \times \mathbb{R}$ 。
4. **导出连续性：**注意到在 $W \cap S$ 上， $t = 0$ ，故 $F^{-1}(p) = (u, v, 0)$ 。这意味着 $\mathbf{x}^{-1}$ 正是 F^{-1} 在 $W \cap S$ 上的限制并投影到前两个分量。由于 F^{-1} 是连续的（甚至是可微的），其限制映射 $\mathbf{x}^{-1}$ 在 $\mathbf{x}(q)$ 附近必然连续。

结论：正则条件保证了局部逆映射的连续性。

练习 2-3, 4 —do Carmo, Exercise 2-3, 4 Let $F : S_1 \rightarrow S_2$ be a differentiable map between regular surfaces. Show that the set of critical points of F is closed in S_1 .

解答 解答：我们要证明临界点集 $C = \{p \in S_1; dF_p \text{ 不是同构}\}$ 是 S_1 中的闭集。

1. **局部表示：** 设 $p \in S_1$ 。取 p 的邻域参数化 $\mathbf{x} : U \rightarrow S_1$ 和 $F(p)$ 的邻域参数化 $\mathbf{y} : V \rightarrow S_2$ 。映射 F 在此邻域下的局部表示为 $\hat{F} = \mathbf{y}^{-1} \circ F \circ \mathbf{x} : U \rightarrow V$ 。
2. **临界点的刻画：** 点 $p = \mathbf{x}(q)$ 是 F 的临界点，当且仅当微分 $d\hat{F}_q$ 的秩小于 2。由于 $\hat{F}$ 是从 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射， $d\hat{F}_q$ 是一个 2×2 矩阵。临界点条件等价于：

$$\det(d\hat{F}_q) = 0.$$

3. **连续性：** 由于 F 是可微的， $\hat{F}$ 的偏导数是连续函数。因此，行列式函数 $h(q) = \det(d\hat{F}_q)$ 是 U 上的连续函数。
4. **结论：** 临界点集在 U 中的部分是连续函数 h 的零点集 $h^{-1}(0)$ ，而闭集的原像在连续映射下是闭集。因此，临界点集在每个坐标邻域内都是闭的。由于 S_1 的拓扑由其坐标邻域诱导，这意味着临界点集在 S_1 中是闭集。

练习 2-3, 5 —do Carmo, Exercise 2-3, 5 Show that the map $F : S^2 \rightarrow S^2$ given by $F(x, y, z) = (-x, y, z)$ (a rotation by π around the y -axis) is differentiable. Find the matrix of dF_p in an appropriate basis.

解答 解答：(注： $F(x, y, z) = (-x, y, z)$ 实际上是关于 yz 平面的镜像反射。如果是绕 y 轴旋转 π ，公式应为 $(-x, y, -z)$ 。以下按题干公式进行解答。)

1. **可微性：** 映射 F 是 $\mathbb{R}^3$ 中线性映射 $\tilde{F}(x, y, z) = (-x, y, z)$ 在 S^2 上的限制。由于线性映射是无限可微的，且 $F(S^2) \subset S^2$ (因为 $(-x)^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 1$)，故 F 是 S^2 上的可微映射。
2. **微分的矩阵：** 对于 $p \in S^2$ ，其切空间 $T_p S^2$ 是由满足 $v \cdot p = 0$ 的向量 $v \in \mathbb{R}^3$ 组成的平面。由于 F 是线性的，其在 p 点的微分 $dF_p : T_p S^2 \rightarrow T_{F(p)} S^2$ 正是 $\tilde{F}$ 在切空间上的限制：

$$dF_p(v) = (-v_x, v_y, v_z).$$

如果我们选择 $T_p S^2$ 的基 $\{w_1, w_2\}$ 和 $T_{F(p)} S^2$ 的基 $\{dF_p(w_1), dF_p(w_2)\}$ ，则矩阵显然为单位矩阵。

更具启发性的做法是，若 $p = (1, 0, 0)$ ，则 $T_p S^2$ 为 yz 平面，基可取为 $e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$ 。此时 $F(p) = (-1, 0, 0)$ ， $T_{F(p)} S^2$ 亦为 yz 平面。在该基下：

$$dF_p(e_2) = (0, 1, 0) = e_2, \quad dF_p(e_3) = (0, 0, 1) = e_3.$$

矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

练习 2-3, 6 —do Carmo, Exercise 2-3, 6 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a regular parametrized curve with everywhere nonzero curvature. Consider the tangent surface of α (Example 5 of Sec. 2-3)

$$\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + v\alpha'(t), \quad t \in I, v \neq 0.$$

Show that the tangent planes along the curve $\mathbf{x}(\text{const}, v)$ are all equal.

解答 直观理解：切曲面是沿曲线 α 的所有切线的并。对于固定的 $t = t_0$ ，曲线 $\mathbf{x}(t_0, v)$ 正是过 $\alpha(t_0)$ 点、方向为 $\alpha'(t_0)$ 的直线。这条直线上所有点的切平面应该都相同，因为直线的方向向量是固定的，而曲面在这条直线上“最平行”于该方向。

证明：固定 $t = t_0$ ，考虑曲线 $\gamma(v) = \mathbf{x}(t_0, v) = \alpha(t_0) + v\alpha'(t_0)$ ($v \neq 0$)。这是过 $\alpha(t_0)$ 、方向为 $\alpha'(t_0)$ 的直线。

计算偏导数：

$$\mathbf{x}_t = \alpha'(t) + v\alpha''(t), \quad \mathbf{x}_v = \alpha'(t).$$

在 $t = t_0$ 处， $\mathbf{x}_v(t_0, v) = \alpha'(t_0)$ 是常数向量（与 v 无关），而

$$\mathbf{x}_t(t_0, v) = \alpha'(t_0) + v\alpha''(t_0).$$

切平面由 $\mathbf{x}_t$ 和 $\mathbf{x}_v$ 张成。在 $t = t_0$ 处，这两个切向量为：

$$\mathbf{x}_v = \alpha'(t_0), \quad \mathbf{x}_t = \alpha'(t_0) + v\alpha''(t_0).$$

它们的叉乘为：

$$\mathbf{x}_t \times \mathbf{x}_v = (\alpha'(t_0) + v\alpha''(t_0)) \times \alpha'(t_0) = v\alpha''(t_0) \times \alpha'(t_0).$$

由于 α 的曲率非零， $\alpha''(t_0)$ 与 $\alpha'(t_0)$ 不平行，因此叉乘非零。切平面的法向量为

$$N = \frac{\alpha''(t_0) \times \alpha'(t_0)}{|\alpha''(t_0) \times \alpha'(t_0)|},$$

这与 v 无关。故沿整条曲线 $\mathbf{x}(t_0, v)$ （固定 t_0 ），切平面都相同。

练习 2-3, 7 —do Carmo, Exercise 2-3, 7 Let $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ be given by $f(p) = |p - p_0|^2$, where $p \in S$ and p_0 is a fixed point of $\mathbb{R}^3$ (see Example 1 of Sec. 2-3). Show that $df_p(w) = 2w \cdot (p - p_0)$, $w \in T_p(S)$.

解答 直观理解： $f(p) = |p - p_0|^2$ 是点 p 到固定点 p_0 的距离平方。沿着切方向 w 的微分，描述了距离平方函数在 p 点沿方向 w 的变化率。

证明：取 $p \in S$ ， $w \in T_p S$ 。取可微曲线 $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ 使得 $\alpha(0) = p$ ， $\alpha'(0) = w$ 。则

$$(f \circ \alpha)(t) = |\alpha(t) - p_0|^2 = (\alpha(t) - p_0) \cdot (\alpha(t) - p_0).$$

微分得

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (f \circ \alpha)(t) = 2\alpha'(0) \cdot (\alpha(0) - p_0) = 2w \cdot (p - p_0).$$

因此 $df_p(w) = 2w \cdot (p - p_0)$ 。

练习 2-3, 8 —do Carmo, Exercise 2-3, 8 Prove that if $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ is a linear map and $S \subset \mathbb{R}^3$ is a regular surface invariant under L , i.e., $L(S) \subset S$, then the restriction $L|_S$ is a differentiable map and

$$dL_p(w) = L(w), \quad p \in S, w \in T_p(S).$$

解答 直观理解：线性映射 L 在整个 $\mathbb{R}^3$ 上是可微的，其限制在曲面 S 上也应该是可微的，且其微分恰好是 L 本身。

证明：

1. $L|_S$ 的可微性： L 是 $\mathbb{R}^3$ 到自身的线性映射，故是光滑的。 $L(S) \subset S$ 表明 L 将曲面映射到自身，因此其限制 $L|_S : S \rightarrow S$ 是可微的。
2. 计算 $dL_p(w)$ ：取 $w \in T_p S$ 。由切向量的定义，存在可微曲线 $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ 使得 $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = w$ 。则

$$dL_p(w) = (L \circ \alpha)'(0) = L(\alpha'(0)) = L(w).$$

这里用到了 L 是线性映射，因此 $(L \circ \alpha)'(0) = L(\alpha'(0))$ 。

练习 2-3, 9 —do Carmo, Exercise 2-3, 9 Show that the parametrized surface

$$\mathbf{x}(u, v) = (v \cos u, v \sin u, au), \quad a \neq 0,$$

is regular. Compute its normal vector $N(u, v)$ and show that along the coordinate line $u = u_0$ the tangent plane of $\mathbf{x}$ rotates about this line in such a way that the tangent of its angle with the z axis is proportional to the inverse of the distance $v = \sqrt{x^2 + y^2}$ of the point $\mathbf{x}(u_0, v)$ to the z axis.

练习 2-3, 10 —do Carmo, Exercise 2-3, 10 (Tubular Surfaces.) Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a regular parametrized curve with nonzero curvature everywhere and arc length as parameter. Let

$$\mathbf{x}(s, v) = \alpha(s) + r(n(s) \cos v + b(s) \sin v), \quad r = \text{const.} \neq 0, s \in I,$$

be a parametrized surface (the tube of radius r around α), where n is the normal vector and b is the binormal vector of α . Show that, when $\mathbf{x}$ is regular, its unit normal vector is

$$N(s, v) = -(n(s) \cos v + b(s) \sin v).$$

练习 2-3, 11 —do Carmo, Exercise 2-3, 11 Show that the normals to a parametrized surface given by

$$\mathbf{x}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u)), \quad f(u) \neq 0, g'(u) \neq 0,$$

all pass through the z axis.

练习 2-3, 12* —do Carmo, Exercise 2-3, 12 Show that each of the equations ($a, b, c \neq 0$)

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= ax, \\ x^2 + y^2 + z^2 &= by, \\ x^2 + y^2 + z^2 &= cz \end{aligned}$$

define a regular surface and that they all intersect orthogonally.

练习 2-3, 13 —do Carmo, Exercise 2-3, 13 A critical point of a differentiable function $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ defined on a regular surface S is a point $p \in S$ such that $df_p = 0$.

a. Let $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ be given by $f(p) = |p - p_0|$, $p \in S$, $p_0 \notin S$ (cf. Exercise 5, Sec. 2-3). Show that $p \in S$ is a critical point of f if and only if the line joining p to p_0 is normal to S at p .

b. Let $h : S \rightarrow \mathbb{R}$ be given by $h(p) = p \cdot v$, where $v \in \mathbb{R}^3$ is a unit vector (cf. Example 1, Sec. 2-3). Show that $p \in S$ is a critical point of f if and only if v is a normal vector of S at p .

练习 2-3, 14* —do Carmo, Exercise 2-3, 14 Let Q be the union of the three coordinate planes $x = 0, y = 0, z = 0$. Let $p = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 - Q$.

a. Show that the equation in t

$$\frac{x^2}{a-t} + \frac{y^2}{b-t} + \frac{z^2}{c-t} \equiv f(t) = 1, \quad a > b > c > 0,$$

has three distinct real roots: t_1, t_2, t_3 .

b. Show that for each $p \in \mathbb{R}^3 - Q$, the sets given by $f(t_1) - 1 = 0$, $f(t_2) - 1 = 0$, $f(t_3) - 1 = 0$ are regular surfaces passing through p which are pairwise orthogonal.

练习 2-3, 15 —do Carmo, Exercise 2-3, 15 Show that if all normals to a connected surface pass through a fixed point, the surface is contained in a sphere.

练习 2-3, 16 —do Carmo, Exercise 2-3, 16 Let w be a tangent vector to a regular surface S at a point $p \in S$ and let $\mathbf{x}(u, v)$ and $\bar{\mathbf{x}}(\bar{u}, \bar{v})$ be two parametrizations at p . Suppose that the expressions of w in the bases associated to $\mathbf{x}(u, v)$ and $\bar{\mathbf{x}}(\bar{u}, \bar{v})$ are

$$w = \alpha_1 \mathbf{x}_u + \alpha_2 \mathbf{x}_v$$

and

$$w = \beta_1 \bar{\mathbf{x}}_{\bar{u}} + \beta_2 \bar{\mathbf{x}}_{\bar{v}}.$$

Show that the coordinates of w are related by

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1 \frac{\partial \bar{u}}{\partial u} + \alpha_2 \frac{\partial \bar{u}}{\partial v} \\ \beta_2 &= \alpha_1 \frac{\partial \bar{v}}{\partial u} + \alpha_2 \frac{\partial \bar{v}}{\partial v}, \end{aligned}$$

where $\bar{u} = \bar{u}(u, v)$ and $\bar{v} = \bar{v}(u, v)$ are the expressions of the change of coordinates.

2.4 The Differential of a Map; Tangent Plane

From curves to surfaces. 在第一章中，我们看到曲线的切向量是导数 $\alpha'(t)$ 。对于曲面之间的可微映射，我们可以类似地定义微分 (differential)，它描述了映射在一点处的线性近似。

关键问题是：如何定义曲面的切平面？如果曲面 S 是参数化曲面 $\mathbf{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的像，那么切平面应该由 $\partial \mathbf{x} / \partial u$ 和 $\partial \mathbf{x} / \partial v$ 张成。

定义 2.11 (切向量). 设 $p \in S$. 向量 $v \in \mathbb{R}^3$ 称为 S 在 p 处的切向量 (tangent vector), 如果存在可微曲线 $\alpha: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ 使得 $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = v$.

S 在 p 处的所有切向量构成一个二维线性空间, 称为切空间 (tangent space), 记为 $T_p S$.

命题 2.12 (切空间的构造). 设 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 是 $p = \mathbf{x}(q)$ 处的参数化. 则


$$T_p S = d\mathbf{x}_q(\mathbb{R}^2) = \text{span} \left\{ \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}(q), \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}(q) \right\}.$$

设 w 是 $\mathbf{x}(q)$ 处的切向量, 即 $w = \alpha'(0)$, 其中 $\alpha: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathbf{x}(U) \subset S$ 是可微曲线且 $\alpha(0) = \mathbf{x}(q)$. 由 2-3 节例 2, 曲线 $\beta = \mathbf{x}^{-1} \circ \alpha: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow U$ 是可微的. 由微分的定义 (第二章附录, 定义 1), 我们有 $d\mathbf{x}_q(\beta'(0)) = w$. 因此 $w \in d\mathbf{x}_q(\mathbb{R}^2)$ (见 fig. 2.9a, 教材 Figure 2-23).

另一方面, 设 $w = d\mathbf{x}_q(v)$, 其中 $v \in \mathbb{R}^2$. 显然 v 是曲线 $\gamma: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow U$ 的速度向量, 其中

$$\gamma(t) = tv + q, \quad t \in (-\epsilon, \epsilon).$$

由微分的定义, $w = \alpha'(0)$, 其中 $\alpha = \mathbf{x} \circ \gamma$. 这说明 w 是切向量. □



(a) Figure 2-23. 切空间的构造

这个命题告诉我们: 切空间恰好是由参数化的两个偏导向量张成的平面。这正是我们直观上对切平面的期望。

定义 2.13 (切平面). 正则曲面 S 在点 p 处的切平面 (tangent plane) 是在 p 处与 S 相切且平行于 $T_p S$ 的平面。

Geometric meaning. 切平面的方程可以通过点 p 和法向量 N 来描述。我们稍后会看到如何计算 N 。

例 2.7 (球面的切平面). 单位球面 S^2 在点 $p = (x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面由法向量 p (因为球面在每一点的法向量就是指向球心的向量) 给出。切平面方程为

$$x_0(x - x_0) + y_0(y - y_0) + z_0(z - z_0) = 0.$$

定义 2.14 (可微映射的微分). 设 $F: S_1 \rightarrow S_2$ 是可微映射, $p \in S_1$. 定义**微分** $dF_p: T_p S_1 \rightarrow T_{F(p)} S_2$ 如下: 给定 $v \in T_p S_1$, 取可微曲线 $\alpha: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S_1$ 使得 $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = v$. 则 $dF_p(v) = (F \circ \alpha)'(0)$.

需要验证 dF_p 的定义不依赖于曲线 α 的选择, 且 dF_p 是线性映射.

命题 2.15 (微分的线性性). 上述定义中, 给定 w , 向量 $\beta'(0)$ 不依赖于曲线 α 的选择. 定义 $d\varphi_p: T_p(S_1) \rightarrow T_{\varphi(p)}(S_2)$ 为 $d\varphi_p(w) = \beta'(0)$, 则 $d\varphi_p$ 是线性映射.

设 $\mathbf{x}(u, v)$, $\bar{\mathbf{x}}(\bar{u}, \bar{v})$ 分别是 p 和 $\varphi(p)$ 邻域的参数化. 设 φ 在这些坐标下表示为

$$\varphi(u, v) = (\varphi_1(u, v), \varphi_2(u, v)),$$

且 α 表示为

$$\alpha(t) = (u(t), v(t)), \quad t \in (-\epsilon, \epsilon).$$


则 $\beta(t) = (\varphi_1(u(t), v(t)), \varphi_2(u(t), v(t)))$, 且 $\beta'(0)$ 在基 $\{\bar{\mathbf{x}}_{\bar{u}}, \bar{\mathbf{x}}_{\bar{v}}\}$ 下的表达式为

$$\beta'(0) = \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial u} u'(0) + \frac{\partial \varphi_1}{\partial v} v'(0), \frac{\partial \varphi_2}{\partial u} u'(0) + \frac{\partial \varphi_2}{\partial v} v'(0) \right).$$

上述关系表明 $\beta'(0)$ 仅依赖于映射 φ 和 w 在基 $\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ 下的坐标 $(u'(0), v'(0))$. 因此 $\beta'(0)$ 独立于 α . 同样的关系还表明

$$\beta'(0) = d\varphi_p(w) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial u} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial u} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u'(0) \\ v'(0) \end{pmatrix};$$

即 $d\varphi_p$ 是从 $T_p(S_1)$ 到 $T_{\varphi(p)}(S_2)$ 的线性映射, 其矩阵在基 $\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ 和 $\{\bar{\mathbf{x}}_{\bar{u}}, \bar{\mathbf{x}}_{\bar{v}}\}$ 下正是上述矩阵. $\square$



(a) Figure 2-24. 微分的定义

注 2.4. 这个定义与第一章中曲线微分 $d\alpha_p$ 的定义完全一致. 事实上, dF_p 就是 F 在 p 处的线性近似.

命题 2.16 (链式法则). 设 $F: S_1 \rightarrow S_2$ 和 $G: S_2 \rightarrow S_3$ 是可微映射, 则


$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p.$$

例 2.8 (投影映射). 设 $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = f(x, y)\}$ 是可微函数 f 的图像。考虑投影 $\pi: S \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\pi(x, y, z) = (x, y)$ 。则 $d\pi_{(x,y,z)}: T_{(x,y,z)}S \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是自然投影。

更一般地, 如果 $F: S_1 \rightarrow S_2$ 是可微映射, 则 dF_p 将切向量从 S_1 映射到 S_2 。这使得我们可以在曲面之间“传输”几何信息。

切平面还允许我们讨论两个相交曲面在交点处的夹角。

给定正则曲面 S 上的一点 p , 存在两个与切平面 $T_p(S)$ 垂直的单位向量; 每一个都称为 p 处的单位法向量。通过 p 且包含单位法向量的直线称为 p 处的法线。两个相交曲面在交点 p 处的夹角是它们在 p 处的切平面 (或法线) 之间的夹角 (见 fig. 2.11a, 教材 Figure 2-25)。



(a) Figure 2-25. 曲面夹角示意图

通过固定 p 处的参数化 $\mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$, 我们可以用以下规则在每一点 $q \in \mathbf{x}(U)$ 处确定一个单位法向量

$$N(q) = \frac{\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v}{|\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v|}(q).$$

因此我们得到一个可微映射 $N: \mathbf{x}(U) \rightarrow \mathbb{R}^3$ 。我们后面 (2-6 节和 3-1 节) 将会看到, 并非总能将这个映射可微地延拓到整个曲面 S 。

关于可微性的一点说明。 正则曲面的定义要求参数化是 C^∞ 类的, 即它们具有所有阶的连续偏导数。对于微分几何中的问题, 我们通常只需要一定阶数的偏导数的存在性和连续性, 这个阶数因问题的性质而异 (很少需要超过四阶导数)。

例如, 切平面的存在性和连续性仅依赖于二阶偏导数的存在性和连续性。因此, 可能出现这样的情况: 函数 $z = f(x, y)$ 的图像在每一点都存在切平面, 但不足以满足正则曲面的定义 (因为不够光滑)。下面的例子说明了这一点。

例 2.9 (存在切平面但非正则曲面的例子). 考虑函数 $z = \sqrt[3]{(x^2 + y^2)^2}$ 的图像, 它是将曲线 $z = x^{4/3}$ 绕 z 轴旋转生成的。由于该曲线关于 z 轴对称, 且在原点处导数连续为零, 因此 $z = \sqrt[3]{(x^2 + y^2)^2}$ 的图像在原点处以 xy 平面为切平面。然而, 该函数在原点处的二阶偏导数 z_{xx} 不存在, 因此该图像不是上面定义的正则曲面 (见 2-2 节命题 3)。

我们不打算深入讨论这类问题。定义中采用 C^∞ 假设正是为了避免研究每个具体情形所需的可微性的最小条件。这些细节有其存在的价值，但它们可能会掩盖这里所讨论问题的几何本质。

2-4 节练习

练习 2-4, 1 —do Carmo, Exercise 2-4, 1 Let $S \subset \mathbb{R}^3$ be a regular surface and let $p \in S$. Show that $T_p S$ depends only on the set S , not on the parametrization used in its definition.

解答 解答：切空间 $T_p S$ 的定义基于通过点 p 的可微曲线。具体来说， $v \in T_p S$ 当且仅当存在可微曲线 $\alpha: I \rightarrow S$ 使得 $\alpha(0) = p, \alpha'(0) = v$ 。

1. **曲线的可微性是本征的**：根据 2-3 节命题 1（坐标变换是可微的），如果一条曲线在某个参数化下是可微的，那么它在任何其他参数化下也是可微的。因此，“表面上的可微曲线”这一集合仅取决于曲面 S 。
2. **切向量的定义**：切向量定义为这些本征定义的曲线的切向量（在 $\mathbb{R}^3$ 中）。因为曲线集合独立于参数化，所以它们的切向量集合 $T_p S$ 也独立于参数化。
3. **代数验证**：设 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 和 $\mathbf{y}: V \rightarrow S$ 是两个不同的参数化，且 $\mathbf{x}(q) = \mathbf{y}(r) = p$ 。由链式法则：

$$d\mathbf{y}_r = d(\mathbf{x} \circ (\mathbf{x}^{-1} \circ \mathbf{y}))_r = d\mathbf{x}_q \circ d(\mathbf{x}^{-1} \circ \mathbf{y})_r.$$

由于 $\mathbf{x}^{-1} \circ \mathbf{y}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 开集之间的微分同胚，其微分 $d(\mathbf{x}^{-1} \circ \mathbf{y})_r$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的同构。因此， $d\mathbf{y}_r(\mathbb{R}^2) = d\mathbf{x}_q(\mathbb{R}^2)$ 。这说明切空间作为 $\mathbb{R}^3$ 的子空间是唯一确定的。

练习 2-4, 2* —do Carmo, Exercise 2-4, 2 Let $F: S_1 \rightarrow S_2$ be a differentiable map between regular surfaces. Show that $dF_p: T_p S_1 \rightarrow T_{F(p)} S_2$ is a linear map.

解答 解答：设 $\mathbf{x}: U \rightarrow S_1$ 是 S_1 在 $p = \mathbf{x}(q)$ 处的参数化。切空间 $T_p S_1$ 的任一向量 v 可以表示为 $v = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v$ ，它是曲线 $\alpha(t) = \mathbf{x}(q + t(a, b))$ 在 $t = 0$ 处的切向量。

根据微分的定义：

$$dF_p(v) = \left. \frac{d}{dt}(F \circ \alpha(t)) \right|_{t=0} = \left. \frac{d}{dt}(F \circ \mathbf{x}(q + t(a, b))) \right|_{t=0}.$$

由多元微积分的链式法则，上述导数为：

$$dF_p(v) = \frac{\partial(F \circ \mathbf{x})}{\partial u} a + \frac{\partial(F \circ \mathbf{x})}{\partial v} b.$$

观察上式：

- 偏导数 $\frac{\partial(F \circ \mathbf{x})}{\partial u}$ 和 $\frac{\partial(F \circ \mathbf{x})}{\partial v}$ 是 $T_{F(p)} S_2$ 中的固定向量（仅依赖于 $F, \mathbf{x}$ 和点 p ）。
- 系数 a, b 是向量 v 在基 $\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ 下的坐标，它们线性依赖于 v 。

因为 $dF_p(v)$ 是 a 和 b 的线性组合，而 a, b 是 v 的线性函数，所以 dF_p 是线性映射。

练习 2-4, 3 —do Carmo, Exercise 2-4, 3 Let $F : S \rightarrow \mathbb{R}$ be a differentiable function on a regular surface S . Show that the set of critical points of F is closed in S .

解答 解答： 点 $p \in S$ 是函数 $F : S \rightarrow \mathbb{R}$ 的临界点，当且仅当微分 $dF_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}$ 是零映射。

1. **局部表示：** 取 p 附近的参数化 $\mathbf{x}(u, v)$ 。则 $p = \mathbf{x}(q)$ 是临界点当且仅当：

$$\frac{\partial(F \circ \mathbf{x})}{\partial u}(q) = 0 \quad \text{且} \quad \frac{\partial(F \circ \mathbf{x})}{\partial v}(q) = 0.$$

2. **连续性：** 由于 F 是可微的，偏导数 $f_1(q) = \frac{\partial(F \circ \mathbf{x})}{\partial u}$ 和 $f_2(q) = \frac{\partial(F \circ \mathbf{x})}{\partial v}$ 是 U 上的连续函数。
3. **闭集性质：** 临界点集在 U 中的部分是 $f_1^{-1}(0) \cap f_2^{-1}(0)$ 。因为 f_1, f_2 连续，它们的零点集是闭集，闭集的交集仍为闭集。
4. **结论：** 临界点集在每个局部坐标邻域内都是闭的，因此在 S 中是闭集。

练习 2-4, 4 —do Carmo, Exercise 2-4, 4 Let $S^2 = \{(x, y, z); x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ and let $F : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ be given by $F(x, y, z) = z$. Find all critical points of F and compute dF_p at each critical point.

解答 解答： 点 $p \in S^2$ 是 F 的临界点当且仅当 dF_p 是零映射。

1. **刻画临界点：** F 是 $\mathbb{R}^3$ 中函数 $\tilde{F}(x, y, z) = z$ 的限制。对于 $v \in T_p S^2$ ，有：

$$dF_p(v) = \nabla \tilde{F} \cdot v = (0, 0, 1) \cdot v.$$

$dF_p = 0$ 意味着向量 $(0, 0, 1)$ 与 $T_p S^2$ 中的所有向量正交。

2. **定位点：** 在单位球面上， $T_p S^2$ 正是与向量 p 正交的平面。因此， $(0, 0, 1)$ 与 $T_p S^2$ 正交意味着 $(0, 0, 1)$ 必须与 p 平行。

$$p = (0, 0, 1) \quad \text{或} \quad p = (0, 0, -1).$$

这两个点分别是北极和南极。

3. **计算微分：** 在临界点处，根据定义，微分 dF_p 是从 $T_p S^2$ 到 $\mathbb{R}$ 的零映射。即对于任何 $v \in T_p S^2$ ， $dF_p(v) = 0$ 。

练习 2-4, 5* —do Carmo, Exercise 2-4, 5 Let $F : S_1 \rightarrow S_2$ be a differentiable map between regular surfaces. Show that if F is a diffeomorphism (i.e., F is invertible and both F and F^{-1} are differentiable), then $dF_p : T_p S_1 \rightarrow T_{F(p)} S_2$ is an isomorphism for all $p \in S_1$.

解答 解答： 如果 F 是微分同胚，则存在可微映射 $G = F^{-1} : S_2 \rightarrow S_1$ 。

1. **恒等映射的微分：** 由定义， $G \circ F = \text{id}_{S_1}$ 且 $F \circ G = \text{id}_{S_2}$ 。显然，恒等映射 id_S 的微分是切空间上的恒等变换 I 。

2. **应用链式法则：**根据曲面映射微分的链式法则：

$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p = d(\text{id}_{S_1})_p = I_{T_p S_1}.$$

类似地：

$$d(F \circ G)_{F(p)} = dF_p \circ dG_{F(p)} = d(\text{id}_{S_2})_{F(p)} = I_{T_{F(p)} S_2}.$$

3. **结论：**这表明线性映射 dF_p 具有双侧逆映射 $dG_{F(p)}$ 。在有限维线性代数中，具有逆映射的线性映射是同构 (isomorphism)。因此， dF_p 是切空间之间的同构。

练习 2-4, 6 —do Carmo, Exercise 2-4, 6 Let $S \subset \mathbb{R}^3$ be a regular surface and let $p \in S$. Show that the tangent plane $T_p S$ can be characterized as the set of vectors $v \in \mathbb{R}^3$ such that $v \cdot N(p) = 0$, where $N(p)$ is a normal vector to S at p .

解答 解答：法向量 $N(p)$ 的定义是 $\mathbb{R}^3$ 中与 p 点处所有切向量都正交的非零向量。

1. **切空间的维数：**根据正则曲面的定义，切空间 $T_p S$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个 2 维子空间。
2. **正交补空间：**在 $\mathbb{R}^3$ 中，与给定非零向量 $N(p)$ 正交的所有向量构成的集合 $\{v \in \mathbb{R}^3; v \cdot N(p) = 0\}$ 是一个 2 维线性子空间。
3. **包含关系与一致性：**
 - 由法向量的定义，对任何 $v \in T_p S$ ，都有 $v \cdot N(p) = 0$ 。即 $T_p S \subset \{v \in \mathbb{R}^3; v \cdot N(p) = 0\}$ 。
 - 由于包含方和被包含方都是 $\mathbb{R}^3$ 的 2 维子空间，根据线性代数结论，它们必须相等。
4. **参数化验证：**若取参数化 $\mathbf{x}(u, v)$ ，则 $T_p S = \text{span}\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ ，且 $N(p)$ 平行于 $\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v$ 。向量 $v \in \mathbb{R}^3$ 与 $\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v$ 正交当且仅当 v 落在 $\mathbf{x}_u$ 和 $\mathbf{x}_v$ 张成的平面内。

结论：切平面恰好是法向量的正交补空间。

练习 2-4, 7 —do Carmo, Exercise 2-4, 7 The coordinate curves of a parametrization $\mathbf{x}(u, v)$ constitute a Tchebyshev net if the lengths of the opposite sides of any quadrilateral formed by them are equal. Show that a necessary and sufficient condition for this is

$$\frac{\partial E}{\partial v} = \frac{\partial G}{\partial u} = 0.$$

练习 2-4, 8* —do Carmo, Exercise 2-4, 8 Prove that whenever the coordinate curves constitute a Tchebyshev net (see Exercise 7) it is possible to reparametrize the coordinate neighborhood in such a way that the new coefficients of the first fundamental form are

$$E = 1, \quad F = \cos \theta, \quad G = 1,$$

where θ is the angle of the coordinate curves.

练习 2-4, 9* —do Carmo, Exercise 2-4, 9 Show that a surface of revolution can always be parametrized so that

$$E = E(v), \quad F = 0, \quad G = 1.$$

练习 2-4, 10 —do Carmo, Exercise 2-4, 10 Let $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0\}$ be the xy plane and let $\mathbf{x} : U \rightarrow P$ be a parametrization of P given by

$$\mathbf{x}(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta),$$

where

$$U = \{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2; \rho > 0, 0 < \theta < 2\pi\}.$$

Compute the coefficients of the first fundamental form of P in this parametrization.

练习 2-4, 11 —do Carmo, Exercise 2-4, 11 Let S be a surface of revolution and C its generating curve (cf. Example 4, Sec. 2-3). Let s be the arc length of C and denote by $\rho = \rho(s)$ the distance to the rotation axis of the point of C corresponding to s .

a. (Pappus' Theorem.) Show that the area of S is

$$2\pi \int_0^l \rho(s) ds,$$

where l is the length of C .

b. Apply part a to compute the area of a torus of revolution.

练习 2-4, 12 —do Carmo, Exercise 2-4, 12 Show that the area of a regular tube of radius r around a curve α (cf. Exercise 10, Sec. 2-4) is $2\pi r$ times the length of α .

练习 2-4, 13 —do Carmo, Exercise 2-4, 13 (Generalized Helicoids.) A natural generalization of both surfaces of revolution and helicoids is obtained as follows. Let a regular plane curve C , which does not meet an axis E in the plane, be displaced in a rigid screw motion about E , that is, so that each point of C describes a helix (or circle) with E as axis. The set S generated by the displacement of C is called a generalized helicoid with axis E and generator C . If the screw motion is a pure rotation about E , S is a surface of revolution; if C is a straight line perpendicular to E , S is (a piece of) the standard helicoid (cf. Example 3).

Choose the coordinate axes so that E is the z axis and C lies in the yz plane. Prove that

a. If $(f(s), g(s))$ is a parametrization of C by arc length s , $a < s < b$, $f(s) > 0$, then $\mathbf{x} : U \rightarrow S$, where

$$U = \{(s, u) \in \mathbb{R}^2; a < s < b, 0 < u < 2\pi\}$$

and

$$\mathbf{x}(s, u) = (f(s) \cos u, f(s) \sin u, g(s) + cu), \quad c = \text{const.},$$

is a parametrization of S . Conclude that S is a regular surface.

b. The coordinate lines of the above parametrization are orthogonal (i.e., $F = 0$) if and only if $\mathbf{x}(U)$ is either a surface of revolution or (a piece of) the standard helicoid.

练习 2-4, 14 —do Carmo, Exercise 2-4, 14 (Gradient on Surfaces.) The gradient of a differentiable function $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ is a differentiable map $\text{grad } f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ which assigns to each point $p \in S$ a vector $\text{grad } f(p) \in T_p(S) \subset \mathbb{R}^3$ such that

$$\langle \text{grad } f(p), v \rangle_p = df_p(v) \quad \text{for all } v \in T_p(S).$$

Show that

a. If E, F, G are the coefficients of the first fundamental form in a parametrization $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$, then $\text{grad } f$ on $\mathbf{x}(U)$ is given by

$$\text{grad } f = \frac{f_u G - f_v F}{EG - F^2} \mathbf{x}_u + \frac{f_v E - f_u F}{EG - F^2} \mathbf{x}_v.$$

In particular, if $S = \mathbb{R}^2$ with coordinates x, y ,

$$\text{grad } f = f_x e_1 + f_y e_2,$$

where $\{e_1, e_2\}$ is the canonical basis of $\mathbb{R}^2$ (thus, the definition agrees with the usual definition of gradient in the plane).

b. If you let $p \in S$ be fixed and v vary in the unit circle $|v| = 1$ in $T_p(S)$, then $df_p(v)$ is maximum if and only if $v = \text{grad } f / |\text{grad } f|$ (thus, $\text{grad } f(p)$ gives the direction of maximum variation of f at p).

c. If $\text{grad } f \neq 0$ at all points of the level curve $C = \{q \in S; f(q) = \text{const.}\}$, then C is a regular curve on S and $\text{grad } f$ is normal to C at all points of C .

练习 2-4, 15 —do Carmo, Exercise 2-4, 15 (Orthogonal Families of Curves.)

a. Let E, F, G be the coefficients of the first fundamental form of a regular surface S in the parametrization $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$. Let $\varphi(u, v) = \text{const.}$ and $\psi(u, v) = \text{const.}$ be two families of regular curves on $\mathbf{x}(U) \subset S$ (cf. Exercise 28, Sec. 2-4). Prove that these two families are orthogonal (i.e., whenever two curves of distinct families meet, their tangent lines are orthogonal) if and only if

$$E\varphi_v\psi_v - F(\varphi_u\psi_v + \varphi_v\psi_u) + G\varphi_u\psi_u = 0.$$

b. Apply part a to show that on the coordinate neighborhood $\mathbf{x}(U)$ of the helicoid of Example 3 the two families of regular curves

$$v \cos u = \text{const.}, \quad v \neq 0,$$

$$(v^2 + a^2) \sin^2 u = \text{const.}, \quad v \neq 0, u \neq \pi,$$

are orthogonal.

2.5 The First Fundamental Form

在定义了切平面之后，我们现在可以讨论曲面上的度量几何。回想第一章中曲线的弧长公式：对于单位速度曲线 $\alpha(s)$ ，弧长就是 s 。对于曲面，我们需要类似的概念来测量曲线上两点之间的弧长，以及曲面的面积。

From curves to arc length on surfaces. 设 $\alpha: [a, b] \rightarrow S$ 是曲面 S 上的可微曲线。则 α 作为 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线, 其弧长为

$$L(\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt.$$

但 $\|\alpha'(t)\|^2 = \alpha'(t) \cdot \alpha'(t)$, 这是一个依赖于 $\alpha'(t)$ 的二次型。我们将会看到, 这个二次型恰好是曲面的第一基本形式。

定义 2.17 (第一基本形式). 设 $p \in S$, $v \in T_p S$. 定义 第一基本形式 (*first fundamental form*) $I_p: T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$I_p(v, w) = v \cdot w.$$

即切空间上的标准内积。

第一基本形式衡量的是切向量之间的角度和长度关系。由于它源自 $\mathbb{R}^3$ 的内积, 它实际上就是限制在切平面上的内积。

命题 2.18 (弧长公式). 设 $\alpha: [a, b] \rightarrow S$ 是曲面 S 上的可微曲线。则其弧长为

$$L(\alpha) = \int_a^b \sqrt{I_{\alpha(t)}(\alpha'(t), \alpha'(t))} dt = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt.$$

在参数化曲面 $\mathbf{x}(u, v)$ 下, 切向量 $\alpha'(t) = \mathbf{x}_u u'(t) + \mathbf{x}_v v'(t)$, 所以

$$\|\alpha'(t)\|^2 = E(u'(t))^2 + 2F u'(t)v'(t) + G(v'(t))^2,$$

其中

$$E = \mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_u, \quad F = \mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_v, \quad G = \mathbf{x}_v \cdot \mathbf{x}_v.$$

定义 2.19 (Gauss 系数). 量 E, F, G 称为曲面的 Gauss 系数 (*Gauss coefficients*)。它们完全决定了曲面的第一基本形式。

例 2.10 (平面). 设 S 是 xy 平面, 参数化为 $\mathbf{x}(u, v) = (u, v, 0)$ 。则

$$E = 1, \quad F = 0, \quad G = 1.$$

第一基本形式为 $I = du^2 + dv^2$ 。这正是平面几何中的弧长公式。

例 2.11 (球面). 在地理坐标下, 单位球面的参数化为

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta).$$

计算得

$$E = 1, \quad F = 0, \quad G = \sin^2 \theta.$$

第一基本形式为 $I = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2$ 。

特别地, 在纬度 θ 处, 一度的经线弧长为 $d\theta$, 一度的纬线弧长为 $\sin \theta d\varphi$ 。

Why does this matter? 第一基本形式是曲面的“内在度量”——它只依赖于曲面本身，而不依赖于曲面如何嵌入 $\mathbb{R}^3$ 。高斯著名的 Theorema Egregium 指出：曲面的曲率 (Gauss 曲率) 可以完全用 E, F, G 及其导数来表示。这意味着曲率是曲面的内在性质，不随曲面在空间中的弯曲而改变。

命题 2.20 (曲面的面积). 设 $R \subset U$ 是参数化 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 的定义域中的一个区域。则 $\mathbf{x}(R)$ 在曲面 S 上的面积为

$$A(\mathbf{x}(R)) = \iint_R \|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\| du dv = \iint_R \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

这里 $\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\| = \sqrt{EG - F^2}$ 是两个切向量张成的平行四边形的面积。

例 2.12 (球冠的面积). 考虑单位球面在 $z \geq c$ 部分 ($0 < c < 1$)。使用地理坐标，这部分对应 $0 \leq \theta \leq \theta_0$ ，其中 $\cos \theta_0 = c$ 。

面积

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^{\theta_0} \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi(1 - c).$$

特别地，当 $c = 0$ (半球面) 时，面积为 2π 。

2-5 节练习

练习 2-5, 1 —do Carmo, Exercise 2-5, 1 Let $S \subset \mathbb{R}^3$ be a regular surface and let $p \in S$. Show that the first fundamental form I_p is a positive definite bilinear form on $T_p S$.

解答 解答：第一基本形式 I_p 定义为 $\mathbb{R}^3$ 中的欧几里得内积在切空间 $T_p S$ 上的限制，即对 $v, w \in T_p S$ ，有 $I_p(v, w) = v \cdot w$ 。

1. **双线性：**欧几里得内积在 $\mathbb{R}^3$ 上是双线性的。作为线性子空间 $T_p S$ 上的限制，它显然保持双线性。即：

$$I_p(av_1 + bv_2, w) = aI_p(v_1, w) + bI_p(v_2, w).$$

2. **正定性：**

- 对任何 $v \in T_p S$ ，有 $I_p(v, v) = v \cdot v = \|v\|^2 \geq 0$ 。
- 且 $I_p(v, v) = 0$ 当且仅当 $\|v\| = 0$ ，即 $v = 0$ 。

因此， I_p 是切空间上的正定双线性型。

练习 2-5, 2 —do Carmo, Exercise 2-5, 2 Let S be the cylinder $x^2 + y^2 = 1$. Compute the first fundamental form in the parametrization $\mathbf{x}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$.

解答 解答：计算参数化的偏导数：

$$\mathbf{x}_u = (-\sin u, \cos u, 0), \quad \mathbf{x}_v = (0, 0, 1).$$

计算第一基本形式的系数 E, F, G ：

- $E = \mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_u = (-\sin u)^2 + \cos^2 u + 0^2 = 1$;
- $F = \mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_v = (-\sin u)(0) + (\cos u)(0) + (0)(1) = 0$;
- $G = \mathbf{x}_v \cdot \mathbf{x}_v = 0^2 + 0^2 + 1^2 = 1$ 。

因此, 圆柱面的第一基本形式为:

$$I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2 = du^2 + dv^2.$$

这说明圆柱面在局部度量上与平面 ($I = du^2 + dv^2$) 是一致的, 这符合圆柱面是可展曲面 (developable surface) 的直观。

练习 2-5, 3 —do Carmo, Exercise 2-5, 3 Let S be the surface of revolution obtained by rotating the curve $z = f(x)$, $x > 0$, around the z -axis. Find the first fundamental form in the natural parametrization.

解答 解答: 取参数化 $\mathbf{x}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, f(u))$, 其中 $u > 0$ 表示点到 z 轴的距离, $v \in (0, 2\pi)$ 是旋转角。

计算偏导数:

$$\mathbf{x}_u = (\cos v, \sin v, f'(u)), \quad \mathbf{x}_v = (-u \sin v, u \cos v, 0).$$

计算 Gauss 系数:

- $E = \mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_u = \cos^2 v + \sin^2 v + (f'(u))^2 = 1 + (f'(u))^2$;
- $F = \mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_v = -u \sin v \cos v + u \sin v \cos v + 0 = 0$;
- $G = \mathbf{x}_v \cdot \mathbf{x}_v = u^2 \sin^2 v + u^2 \cos^2 v = u^2$ 。

因此, 旋转面的第一基本形式为:

$$I = (1 + (f'(u))^2) du^2 + u^2 dv^2.$$

练习 2-5, 4* —do Carmo, Exercise 2-5, 4 Show that the area A of a region R on a surface S is given by

$$A = \iint_R d\sigma,$$

where $d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv$ is the element of area.

解答 解答: 曲面上区域 R 的面积定义为偏导向量叉积模长的二重积分:

$$A = \iint_R \|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\| du dv.$$

我们要证明 $\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\| = \sqrt{EG - F^2}$ 。利用向量积模长的恒等式 (Lagrange 恒等式的特殊形式):

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2.$$

令 $\mathbf{a} = \mathbf{x}_u$, $\mathbf{b} = \mathbf{x}_v$, 代入第一基本形式的 Gauss 系数定义:

- $\|\mathbf{x}_u\|^2 = E$;
- $\|\mathbf{x}_v\|^2 = G$;
- $\mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_v = F$.

由此得:

$$\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\|^2 = EG - F^2.$$

取平方根得 $\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\| = \sqrt{EG - F^2}$. 因此面积元为 $d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv$, 面积公式成立。

练习 2-5, 5 —do Carmo, Exercise 2-5, 5 Let T be the torus with parameters as in Example 6 of Sec. 2-2. Compute the area of T .

解答 解答: 环面 T 的参数化通常表示为:

$$\mathbf{x}(u, v) = ((a + r \cos u) \cos v, (a + r \cos u) \sin v, r \sin u),$$

其中 a 是中心圆半径, r 是截面圆半径 ($0 < r < a$), $u, v \in [0, 2\pi]$ 。

1. 计算 Gauss 系数:

$$\mathbf{x}_u = (-r \sin u \cos v, -r \sin u \sin v, r \cos u),$$

$$\mathbf{x}_v = (-(a + r \cos u) \sin v, (a + r \cos u) \cos v, 0).$$

经计算 (参见练习 2-5, 3 的类似过程):

$$E = r^2, \quad F = 0, \quad G = (a + r \cos u)^2.$$

2. 面积元:

$$d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv = r(a + r \cos u) du dv.$$

3. 计算面积:

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} r(a + r \cos u) du dv = 2\pi r \int_0^{2\pi} (a + r \cos u) du.$$

$$A = 2\pi r[au + r \sin u]_0^{2\pi} = 2\pi r(2\pi a) = 4\pi^2 ar.$$

结论: 环面的面积为 $4\pi^2 ar$ 。

练习 2-5, 6 —do Carmo, Exercise 2-5, 6 Let S be a regular surface and let $p \in S$. Show that the angle θ between two curves α, β on S intersecting at p satisfies

$$\cos \theta = \frac{I_p(\alpha'(0), \beta'(0))}{\|\alpha'(0)\| \|\beta'(0)\|}.$$

解答 解答：在 $\mathbb{R}^3$ 中，两条相交曲线之间的夹角 θ 定义为它们在交点处切向量之间的夹角。

1. 设 $v = \alpha'(0)$ 和 $w = \beta'(0)$ 为两条曲线在 p 点处的切向量。由定义， $v, w \in T_p S$ 。

2. 根据 $\mathbb{R}^3$ 中向量夹角的定义：

$$\cos \theta = \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|}.$$

3. 第一基本形式 $I_p(v, w)$ 正是切空间上的欧几里得内积 $v \cdot w$ 。

4. 将 I_p 代入公式，即得：

$$\cos \theta = \frac{I_p(\alpha'(0), \beta'(0))}{\|\alpha'(0)\| \|\beta'(0)\|}.$$

这个结论再次强调了：曲面上曲线之间的角度是由第一基本形式（内在度量）完全决定的。

练习 2-5, 7 —do Carmo, Exercise 2-5, 7 The coordinate curves of a parametrization $\mathbf{x}(u, v)$ constitute a Tchebyshev net if the lengths of the opposite sides of any quadrilateral formed by them are equal. Show that a necessary and sufficient condition for this is

$$\frac{\partial E}{\partial v} = \frac{\partial G}{\partial u} = 0.$$

练习 2-5, 8* —do Carmo, Exercise 2-5, 8 Prove that whenever the coordinate curves constitute a Tchebyshev net (see Exercise 7) it is possible to reparametrize the coordinate neighborhood in such a way that the new coefficients of the first fundamental form are

$$E = 1, \quad F = \cos \theta, \quad G = 1,$$

where θ is the angle of the coordinate curves.

练习 2-5, 9* —do Carmo, Exercise 2-5, 9 Show that a surface of revolution can always be parametrized so that

$$E = E(v), \quad F = 0, \quad G = 1.$$

练习 2-5, 10 —do Carmo, Exercise 2-5, 10 Let $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0\}$ be the xy plane and let $\mathbf{x} : U \rightarrow P$ be a parametrization of P given by

$$\mathbf{x}(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta),$$

where

$$U = \{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2; \rho > 0, 0 < \theta < 2\pi\}.$$

Compute the coefficients of the first fundamental form of P in this parametrization.

练习 2-5, 11 —do Carmo, Exercise 2-5, 11 Let S be a surface of revolution and C its generating curve (cf. Example 4, Sec. 2-3). Let s be the arc length of C and denote by $\rho = \rho(s)$ the distance to the rotation axis of the point of C corresponding to s .

a. (Pappus' Theorem.) Show that the area of S is

$$2\pi \int_0^l \rho(s) ds,$$

where l is the length of C .

b. Apply part a to compute the area of a torus of revolution.

练习 2-5, 12 —do Carmo, Exercise 2-5, 12 Show that the area of a regular tube of radius r around a curve α (cf. Exercise 10, Sec. 2-4) is $2\pi r$ times the length of α .

练习 2-5, 13 —do Carmo, Exercise 2-5, 13 (Generalized Helicoids.) A natural generalization of both surfaces of revolution and helicoids is obtained as follows. Let a regular plane curve C , which does not meet an axis E in the plane, be displaced in a rigid screw motion about E , that is, so that each point of C describes a helix (or circle) with E as axis. The set S generated by the displacement of C is called a generalized helicoid with axis E and generator C . If the screw motion is a pure rotation about E , S is a surface of revolution; if C is a straight line perpendicular to E , S is (a piece of) the standard helicoid (cf. Example 3).

Choose the coordinate axes so that E is the z axis and C lies in the yz plane. Prove that

a. If $(f(s), g(s))$ is a parametrization of C by arc length s , $a < s < b$, $f(s) > 0$, then $\mathbf{x} : U \rightarrow S$, where

$$U = \{(s, u) \in \mathbb{R}^2; a < s < b, 0 < u < 2\pi\}$$

and

$$\mathbf{x}(s, u) = (f(s) \cos u, f(s) \sin u, g(s) + cu), \quad c = \text{const.},$$

is a parametrization of S . Conclude that S is a regular surface.

b. The coordinate lines of the above parametrization are orthogonal (i.e., $F = 0$) if and only if $\mathbf{x}(U)$ is either a surface of revolution or (a piece of) the standard helicoid.

练习 2-5, 14 —do Carmo, Exercise 2-5, 14 (Gradient on Surfaces.) The gradient of a differentiable function $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ is a differentiable map $\text{grad } f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ which assigns to each point $p \in S$ a vector $\text{grad } f(p) \in T_p(S) \subset \mathbb{R}^3$ such that

$$\langle \text{grad } f(p), v \rangle_p = df_p(v) \quad \text{for all } v \in T_p(S).$$

Show that

a. If E, F, G are the coefficients of the first fundamental form in a parametrization $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$, then $\text{grad } f$ on $\mathbf{x}(U)$ is given by

$$\text{grad } f = \frac{f_u G - f_v F}{EG - F^2} \mathbf{x}_u + \frac{f_v E - f_u F}{EG - F^2} \mathbf{x}_v.$$

In particular, if $S = \mathbb{R}^2$ with coordinates x, y ,

$$\text{grad } f = f_x e_1 + f_y e_2,$$

where $\{e_1, e_2\}$ is the canonical basis of $\mathbb{R}^2$ (thus, the definition agrees with the usual definition of gradient in the plane).

b. If you let $p \in S$ be fixed and v vary in the unit circle $|v| = 1$ in $T_p(S)$, then $df_p(v)$ is maximum if and only if $v = \text{grad } f / |\text{grad } f|$ (thus, $\text{grad } f(p)$ gives the direction of maximum variation of f at p).

c. If $\text{grad } f \neq 0$ at all points of the level curve $C = \{q \in S; f(q) = \text{const.}\}$, then C is a regular curve on S and $\text{grad } f$ is normal to C at all points of C .

练习 2-5, 15 —do Carmo, Exercise 2-5, 15 (Orthogonal Families of Curves.)

a. Let E, F, G be the coefficients of the first fundamental form of a regular surface S in the parametrization $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$. Let $\varphi(u, v) = \text{const.}$ and $\psi(u, v) = \text{const.}$ be two families of regular curves on $\mathbf{x}(U) \subset S$ (cf. Exercise 28, Sec. 2-4). Prove that these two families are orthogonal (i.e., whenever two curves of distinct families meet, their tangent lines are orthogonal) if and only if

$$E\varphi_v\psi_v - F(\varphi_u\psi_v + \varphi_v\psi_u) + G\varphi_u\psi_u = 0.$$

b. Apply part a to show that on the coordinate neighborhood $\mathbf{x}(U)$ of the helicoid of Example 3 the two families of regular curves

$$v \cos u = \text{const.}, \quad v \neq 0,$$

$$(v^2 + a^2) \sin^2 u = \text{const.}, \quad v \neq 0, u \neq \pi,$$

are orthogonal.

2.6 Orientation on Surfaces

Why orientation? 对于曲线，我们可以通过切向量 $\alpha'(t)$ 的符号来判断运动方向。对于曲面，我们需要类似的概念来区分“两侧”——比如一张纸有正面和反面。

在 $\mathbb{R}^3$ 中，每个正则曲面在每一点处都有两个单位法向量，它们恰好相反。选择其中一个连续变化的法向量场，就是给曲面一个定向 (orientation)。

定义 2.21 (可定向曲面). 正则曲面 S 称为**可定向的** (*orientable*)，如果存在连续的可微映射 $N : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ 使得对每一点 $p \in S$ ， $N(p)$ 是 S 在 p 处的单位法向量。

例 2.13 (球面是可定向的). 单位球面 S^2 是可定向的。单位法向量场可以取为 $N(x, y, z) = (x, y, z)$ 。这是连续可微的。

例 2.14 (Möbius 带是不可定向的). Möbius 带是**不可定向**的经典例子。如果你沿着 Möbius 带走一圈，法向量的方向会翻转。这与 Möbius 带只有一个面有关——你不需要翻过边缘就能到达“另一面”。

Practical criterion. 判断曲面是否可定向，可以检查是否存在整体定义连续法向量场。对于大多数常见的曲面（如球面、环面、平面），这是成立的。

命题 2.22 (可定向的等价条件). 正则曲面 S 是可定向的，当且仅当存在 S 的一个参数化覆盖，使得所有参数化的坐标变换的雅可比行列式都为正。

这个命题的几何意义是：可定向意味着我们可以在整个曲面上一致地选择“左手系”或“右手系”的局部坐标。

我们已经知道，函数图像曲面是可定向的。现在我们证明，由可微函数的正则值定义的曲面也是可定向的。这是在 $\mathbb{R}^3$ 中构造不可定向正则曲面例子相对困难的原因之一。

命题 2.23 (正则值定义的曲面可定向). 若正则曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ 可以写成 $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; f(x, y, z) = a\}$, 其中 $f: U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 可微, a 是 f 的正则值, 则 S 是可定向的。

设 $p = (x_0, y_0, z_0) \in S$. 考虑位于 S 上且在 $t = t_0$ 时经过 p 的参数化曲线 $(x(t), y(t), z(t))$, $t \in I$. 由于该曲线在 S 上, 有

$$f(x(t), y(t), z(t)) = a, \quad \forall t \in I.$$

对上式关于 t 求导, 在 $t = t_0$ 处得

$$f_x(p) \left(\frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + f_y(p) \left(\frac{dy}{dt} \right)_{t_0} + f_z(p) \left(\frac{dz}{dt} \right)_{t_0} = 0.$$

这表明曲线在 $t = t_0$ 处的切向量垂直于 p 处的向量 (f_x, f_y, f_z) . 由于曲线和点都是任意的, 我们得到

$$N(x, y, z) = \left(\frac{f_x}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2}}, \frac{f_y}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2}}, \frac{f_z}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2}} \right)$$

是 S 上的可微单位法向量场。结合命题 1, 这说明 S 是可定向的。□

最后一个注记。定向绝不是正则曲面的局部性质。局部地, 每个正则曲面都微分同胚于平面中的一个开集, 因此是可定向的。定向是一个整体性质, 因为它涉及整个曲面。我们将在本书后面 (第五章) 更多地讨论整体性质。

注 2.5. 曲面的定向在后续章节中很重要。例如, 在学习曲面的面积分和 Stokes 定理时, 需要选择一致的定向。

2-6 节练习

练习 2-6, 1 —do Carmo, Exercise 2-6, 1 Show that the cylinder $x^2 + y^2 = 1$ is orientable.

解答 解答: 根据可定向性的定义, 我们需要在圆柱面 $S = \{(x, y, z); x^2 + y^2 = 1\}$ 上构造一个连续的单位法向量场。

1. **构造向量场:** 对表面上的任意点 $p = (x, y, z)$, 定义向量:

$$N(x, y, z) = (x, y, 0).$$

2. **验证单位长度:** 由于点 (x, y, z) 在圆柱面上, 满足 $x^2 + y^2 = 1$. 因此:

$$\|N\| = \sqrt{x^2 + y^2 + 0^2} = 1.$$

3. **验证正交性**: 圆柱面可视为函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1$ 的零水平集。其梯度向量为 $\nabla f = (2x, 2y, 0)$ 。由多元微积分可知, 梯度向量与水平集正交。由于 N 与 ∇f 平行, 故 N 是曲面的法向量。
4. **验证连续性**: N 的分量函数 x 和 y 是点坐标的连续函数。因此, N 是一个连续的单位法向量场。

结论: 由于存在整体定义的单位法向量场, 圆柱面是可定向的。

练习 2-6, 2* —do Carmo, Exercise 2-6, 2 Show that the Möbius band is not orientable.

解答 解答: Möbius 带是不可定向曲面的典型代表。我们可以通过观察沿中心线环绕一周后法向量的变化来证明这一点。

1. **参数化描述**: Möbius 带可以通过将一个矩形条带扭转 180° 后首尾相接得到。其中心线是一圆周。
2. **法向量的连续性**: 假设 Möbius 带上存在一个连续的单位法向量场 N 。
3. **沿环路移动**: 考虑沿 Möbius 带中心线移动。起始点为 p 。我们选择 p 点处的一个法向量 $N(p)$ 。
4. **方向翻转**: 由于 Möbius 带的构造性质, 当点沿着中心线环绕一周回到 p 时, 曲面的“面”发生了翻转。这意味着如果我们连续地诱导法向量, 当我们回到起始点 p 时, 得到的法向量将是 $-N(p)$ 。
5. **矛盾**: 对于同一个点 p , 法向量场 N 必须有唯一的值。然而上述过程显示 $N(p) = -N(p)$, 由于 N 是单位向量, 这不可能。

结论: Möbius 带上不存在整体连续的单位法向量场, 因此它是不可定向的。

练习 2-6, 3 —do Carmo, Exercise 2-6, 3 Let S be a regular surface covered by two parametrizations $\mathbf{x}_1 : U_1 \rightarrow S$ and $\mathbf{x}_2 : U_2 \rightarrow S$. Show that if the overlap $\mathbf{x}_1(U_1) \cap \mathbf{x}_2(U_2)$ is connected, then the orientability of S is equivalent to the Jacobian of the coordinate change $\mathbf{x}_2^{-1} \circ \mathbf{x}_1$ being positive on $U_1 \cap \mathbf{x}_1^{-1}(\mathbf{x}_2(U_2))$.

解答 解答: 设 $\Phi = \mathbf{x}_2^{-1} \circ \mathbf{x}_1$ 是坐标变换映射。

1. **法向量的关系**: 设 N_1, N_2 分别是由参数化 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 诱导的单位法向量。在重叠区域上, 它们的关系为:

$$N_1 = \text{sgn}(J_\Phi)N_2,$$

其中 J_Φ 是坐标变换的雅可比行列式。

2. **连通性的作用**: 由于雅可比行列式 J_Φ 是连续函数且在重叠区域上处处不为零, 根据连通集上连续函数的性质, 如果重叠区域是连通的, 则 J_Φ 的符号必须在整个重叠区域上保持不变 (始终为正或始终为负)。
3. **构造整体法向量场**:

- 如果 $J_\Phi > 0$, 则 $N_1 = N_2$. 我们可以通过在 $\mathbf{x}_1(U_1)$ 上令 $N = N_1$, 在 $\mathbf{x}_2(U_2)$ 上令 $N = N_2$ 来定义一个整体连续的法向量场。因此 S 是可定向的。
- 如果 $J_\Phi < 0$, 我们可以通过交换 $\mathbf{x}_2$ 的参数 (例如令 $\tilde{\mathbf{x}}_2(u, v) = \mathbf{x}_2(v, u)$) 来得到一个新的参数化 $\tilde{\mathbf{x}}_2$ 。此时新的雅可比行列式将变为正值, 从而转化为前一种情况。

结论: 当曲面仅由两个坐标邻域覆盖且其交集连通时, 雅可比行列式的恒正性 (或通过调整使其恒正) 是曲面可定向性的充分必要条件。不可定向曲面 (如 Möbius 带) 的两个坐标邻域交集必然是不连通的。

练习 2-6, 4 —do Carmo, Exercise 2-6, 4 Let S be an orientable surface and let $\{U_\alpha\}$ and $\{V_\beta\}$ be two families of coordinate neighborhoods which cover S (that is, $\bigcup U_\alpha = S = \bigcup V_\beta$) and satisfy the conditions of Def. 1 (that is, in each of the families, the coordinate changes have positive Jacobian). We say that $\{U_\alpha\}$ and $\{V_\beta\}$ determine the same orientation of S if the union of the two families again satisfies the conditions of Def. 1.

Prove that a regular, connected, orientable surface can have only two distinct orientations.

解答 直观理解: 定向本质上是在曲面上每一点选择“法向量的正方向”。由于在每一点处法向量只有两个可能的方向 (恰好相反), 整个曲面的定向只能有两种选择——要么一致地选择其中一个方向, 要么选择其相反方向。

解答: 设 S 是连通可定向曲面。由可定向的等价条件 (命题 2.6.1), S 存在一族参数化坐标邻域 $\{U_\alpha\}$, 使得所有坐标变换的雅可比行列式均为正——这给出了 S 的一个定向。

我们称两族坐标邻域确定了相同的定向, 如果它们的并集仍满足雅可比行列式恒正的条件。定向的等价类恰好有两个。

1. **存在两个定向:** 取给定的一族 $\{U_\alpha\}$, 对每个参数化 $\mathbf{x}_\alpha$ 交换其参数坐标 $(u, v) \mapsto (v, u)$, 得到一族新的参数化 $\{\tilde{\mathbf{x}}\}$ 。由于交换参数坐标使雅可比行列式变号, $\{\tilde{\mathbf{x}}\}$ 与 $\{U_\alpha\}$ 的并集的雅可比行列式恒负; 但若将 $\{\tilde{\mathbf{x}}\}$ 的所有坐标再翻转一次, 则雅可比行列式恢复为正。因此, 交换参数坐标给出了另一个合法的定向。
2. **至多只有两个定向:** 设 $\mathcal{O}_1$ 和 $\mathcal{O}_2$ 是 S 的两个不同定向。取 $p \in S$, 设在 p 的某邻域内 $\mathcal{O}_1$ 和 $\mathcal{O}_2$ 的单位法向量分别为 N_1 和 N_2 。由于在每一点处单位法向量只有两个可能的方向 (恰好相反), 必有 $N_2(p) = \pm N_1(p)$ 。

若存在点 q 使得 $N_2(q) = N_1(q)$, 则由雅可比行列式的连续性 (它处处非零且只能取 ± 1 的值), $N_2 \equiv N_1$ 在整个连通曲面 S 上成立, 从而 $\mathcal{O}_1 = \mathcal{O}_2$, 与假设矛盾。故对所有点均有 $N_2 = -N_1$, 即两个定向恰好相反。

因此, 连通可定向曲面恰好有两个不同的定向。 □

练习 2-6, 5 —do Carmo, Exercise 2-6, 5 Let $\varphi : S_1 \rightarrow S_2$ be a diffeomorphism.

a. Show that S_1 is orientable if and only if S_2 is orientable (thus, orientability is preserved by diffeomorphisms).

b. Let S_1 and S_2 be orientable and oriented. Prove that the diffeomorphism φ induces an orientation in S_2 . Use the antipodal map of the sphere (Exercise 1, Sec. 2-3) to show that this orientation may be distinct (cf. Exercise 4) from the initial one (thus, orientation itself may not be preserved by diffeomorphisms; note, however, that if S_1 and S_2 are connected, a diffeomorphism either preserves or “reverses” the orientation).

解答 直观理解：微分同胚本质上是曲面间的“光滑双射”，它局部保持维数结构。如果 S_1 和 S_2 通过 φ 光滑地对应，那么在每一点处 φ 的雅可比行列式非零保证了法向量结构能够从 S_1 传递到 S_2 。特别地， S_1 上存在连续法向量场当且仅当 S_2 上也存在。

解答：

a. 可定向性被微分同胚保持：

($\Rightarrow$) 设 S_1 可定向，则存在连续的单位法向量场 $N_1: S_1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 。对每一点 $q \in S_2$ ，取 $p = \varphi^{-1}(q)$ ，定义 $N_2(q) = d\varphi_p(N_1(p)) / \|d\varphi_p(N_1(p))\|$ 。由于 φ 是微分同胚， $d\varphi_p$ 是线性同构，它将法向量映射为法向量，且 N_2 的连续性由 N_1 、 $d\varphi$ 和 φ^{-1} 的连续性保证。故 S_2 可定向。

($\Leftarrow$) 同理，若 S_2 可定向，则 S_1 亦然，只需考虑 φ^{-1} 。

b. 微分同胚诱导定向：

设 S_1 和 S_2 均已定向。则 S_1 上的定向单位法向量场 N_1 诱导了 S_2 上的一个向量场 N_2 ，定义为 $N_2(q) = d\varphi_{\varphi^{-1}(q)}(N_1(\varphi^{-1}(q)))$ (归一化后)。这给出了 S_2 的一个诱导定向。

反例 (球面的对径映射)：考虑单位球面 S^2 和对径映射 $\varphi(x, y, z) = (-x, -y, -z)$ (见第 2-3 节习题 1)。该映射是微分同胚。若取 S^2 的标准单位法向量场 $N(x, y, z) = (x, y, z)$ ，则 $N_2(q) = d\varphi(N(p)) = d\varphi(x, y, z) = (-x, -y, -z) = -N(q)$ ，即诱导定向与初始定向恰好相反。这说明定向本身不一定被微分同胚保持，只能保持或反转。

对于连通曲面，一个微分同胚或者保持定向或者反转定向，没有第三种可能。 $\square$

练习 2-6, 6 —do Carmo, Exercise 2-6, 6 Define the notion of orientation of a regular curve $C \subset \mathbb{R}^3$, and show that if C is connected, there exist at most two distinct orientations in the sense of Exercise 4 (actually there exist exactly two, but this is harder to prove).

解答 直观理解：曲线的定向相当于选择“沿曲线行进的方向”。类似于曲面，在曲线的每一点处，切向量只有两个可能的方向 (正向或反向)。对于连通曲线，一旦在某点选择了方向，由于连续性，整个曲线的方向就唯一确定了 (要么一致向前，要么一致向后)，因此最多只有两个不同的定向。

解答：

定向的定义：正则曲线 $C \subset \mathbb{R}^3$ 的定向是指在 C 上选择一个连续的非零切向量场。更准确地说，设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是 C 的正则参数化 (即 $\alpha'(t) \neq 0$ 对所有 t 成立)，则 $\alpha'(t)$ 给出了曲线在参数 t 处的一个切向量方向。取遍所有点，这定义了一个切向量场。如果存在连续的非零切向量场，则称 C 是可定向的。

至多两个定向的证明：设 C 连通，取一点 $p \in C$ 。在 p 处， $T_p C$ 是一维向量空间，其上只有两个单位向量 (互为相反)。选定其中一个作为初始方向后，考虑沿曲线移动。由于切向量场是连续的，如果在某点处切向量方向发生翻转 (即变为相反方向)，则必存在一点处切向量为零 (因为方向改变必须经过连续运动)，但正则曲线的切向量永远非零——这产生了矛盾。因此，一旦在 p 处选定方向，则该方向沿整个连通曲线必须保持一致，从而得到唯一的定向。

由上述论证，若 C 可定向，则恰好有两个不同的定向 (因为也可以在 p 处选择相反的方向)。

另一种表述：在 p 处选择“正向”，得到定向 $\mathcal{O}_1$ ；选择“负向”，得到定向 $\mathcal{O}_2 = -\mathcal{O}_1$ 。这两个是全部可能的定向。 $\square$

练习 2-6, 7 —do Carmo, Exercise 2-6, 7 Show that if a regular surface S contains an open set diffeomorphic to a Möbius strip, then S is nonorientable.


解答 直观理解：可定向性是曲面的整体性质，但局部区域的可定向性与其整体行为密切相关。如果曲面的某个开集本身不可定向（微分同胚于 Möbius 带），则整个曲面也不可定向——因为若整个曲面可定向，就会在该开集上诱导一个可定向结构，与 Möbius 带的不可定向性矛盾。

解答：设 S 正则曲面， $U \subset S$ 是开集， $\psi: M \rightarrow U$ 是微分同胚，其中 M 是 Möbius 带。假设 S 可定向，则 U 作为 S 的开子集也是可定向的（限制一个连续单位法向量场到 U 即可）。但 ψ 是微分同胚，它将 U 的可定向性传递到 M ：若 U 可定向，则 M 亦可定向（见习题 2-6, 5a 部分）。然而 Möbius 带 M 不可定向（习题 2-6, 2），矛盾。故假设不成立， S 必为不可定向。□

2.7 A Characterization of Compact Orientable Surfaces

命题 2 (Sec. 2-6) 的逆命题——即 $\mathbb{R}^3$ 中的可定向曲面是否一定是某个可微函数的正则值——是正确的，但证明并不简单。即使在紧曲面的特殊情况下，证明也是很有启发性的，展示了微分几何中整体定理的一个有趣例子。本节将完全致力于证明这个逆命题。

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是可定向曲面。证明的关键在于表明：对于每个 $p \in S$ ，我们可以在通过 p 的法线上选择一个开区间 I_p （比如长度为 $2\epsilon_p$ ，其中 ϵ_p 随 p 变化），使得如果 $p \neq q \in S$ ，则 $I_p \cap I_q = \emptyset$ 。因此，并集 $\bigcup_{p \in S} I_p$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 中的一个开集 V ，它包含 S 且具有以下性质： V 中每个点都恰好通过一条到 S 的法线； V 称为 S 的管状邻域 (tubular neighborhood)（见 fig. 2.12a）。



(a) Figure 2-32. 管状邻域

假设可定向曲面 S 存在管状邻域 V 。我们可以定义一个函数 $g: V \rightarrow \mathbb{R}$ 如下：为 S 选择一个定向。注意，管状邻域 V 中没有两条线段 I_p 和 I_q ($p \neq q$) 相交。因此，对于 V 中每一点 P ，有唯一的一条到 S 的法线，它在点 p 处与 S 相交；按定义， $g(P)$ 是从 p 到 P 的距离，带有由 p 处单位法向量方向决定的符号。如果我们能证明 g 是可微函数且 0 是 g 的正则值，我们就得到 $S = g^{-1}(0)$ ，正如我们所希望的。

现在我们开始证明可定向曲面管状邻域的存在性。我们首先证明这个事实的局部版本：即，对于正则表面上的每一点，存在该点的一个邻域具有管状邻域。

命题 2.24 (局部管状邻域). 设 S 是正则曲面， $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 是点 $p = \mathbf{x}(u_0, v_0) \in S$ 邻域的参数化。则存在 p 在 S 中的邻域 $W \subset \mathbf{x}(U)$ 和数 $\epsilon > 0$ ，使得以 W 中点 q 为中心、长度为 2ϵ 的法线段互不相交（即 W 具有管状邻域）。

考虑映射 $F: U \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ ，定义为

$$F(u, v; t) = \mathbf{x}(u, v) + tN(u, v), \quad (u, v) \in U, \quad t \in \mathbb{R},$$

其中 $N(u, v) = (N_x, N_y, N_z)$ 是

$$\mathbf{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

在 $\mathbf{x}(u, v)$ 处的单位法向量。

从几何上看, F 将“柱面” $U \times \mathbb{R}$ 中的点 $(u, v; t)$ 映射到 S 上 $\mathbf{x}(u, v)$ 处距离为 t 的法线上的点。 F 是可微的, 且在 $t = 0$ 处的雅可比行列式为

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \\ N_x & N_y & N_z \end{vmatrix} = |\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v| \neq 0.$$

由逆函数定理, 在 $U \times \mathbb{R}$ 中存在一个平行六面体, 比如说

$$u_0 - \delta < u < u_0 + \delta, \quad v_0 - \delta < v < v_0 + \delta, \quad -\epsilon < t < \epsilon,$$

限制在其上时 F 是一一映射。但这意味着, 在 F 将矩形

$$u_0 - \delta < u < u_0 + \delta, \quad v_0 - \delta < v < v_0 + \delta$$

映射到的像 W 中, 以 W 中点 q 为中心、长度小于 2ϵ 的法线段互不相交。□

此刻, 需要注意以下事实。上面通过假设管状邻域 V 的存在来定义的函数 $g: V \rightarrow \mathbb{R}$ 是可微的且 0 是其正则值, 这是一个局部事实, 可以立即证明。

命题 2.25 (管状邻域上距离函数的可微性). 假设 $\mathbb{R}^3$ 中可定向曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ 存在管状邻域 $V \subset \mathbb{R}^3$, 并为 S 选择一个定向。则函数 $g: V \rightarrow \mathbb{R}$ (定义为从 V 中一点到过该点的唯一法线与 S 交点的带符号距离) 是可微的, 且 0 是其正则值。

重新考察命题 1 中定义的映射 $F: U \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, 其中现在假设参数化 $\mathbf{x}$ 与给定定向相容。设 x, y, z 是 $F(u, v, t) = \mathbf{x}(u, v) + tN(u, v)$ 的坐标, 我们可以写出

$$F(u, v, t) = (x(u, v, t), y(u, v, t), z(u, v, t)).$$

由于在 $t = 0$ 处雅可比行列式 $\partial(x, y, z)/\partial(u, v, t) \neq 0$, 我们可以在某个平行六面体 Q 上 invert F ,

$$u_0 - \delta < u < u_0 + \delta, \quad v_0 - \delta < v < v_0 + \delta, \quad -\epsilon < t < \epsilon,$$

得到一个可微映射

$$F^{-1}(x, y, z) = (u(x, y, z), v(x, y, z), t(x, y, z)),$$

其中 $(x, y, z) \in F(Q) \subset V$ 。但命题 2 中 $g: V \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $F(Q)$ 上的限制恰好是 $t = t(x, y, z)$ 。因此 g 是可微的。此外, t 在 $t = 0$ 处是正规值; 否则

$$\frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial t}{\partial y} = \frac{\partial t}{\partial z} = 0$$

在某个 $t = 0$ 的点处成立；于是 dF^{-1} 在 $t = 0$ 处将是奇异的，这与逆函数定理矛盾。□

为了从局部过渡到整体，即证明整个可定向曲面管状邻域的存在性，我们需要一些拓扑论证。我们将仅限于紧曲面，下面定义紧曲面。

设 A 是 $\mathbb{R}^3$ 的子集。如果 $\mathbb{R}^3$ 中每个 p 的邻域都包含 A 中不同于 p 的点，则称 p 是 A 的极限点。如果 A 包含其所有极限点，则称 A 为闭集。如果 A 包含在某个球内，则称 A 为有界集。如果 A 是闭集且有界，则称 A 为紧集。

球面和环面是紧曲面。旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 是闭曲面，但因无界而不是紧曲面。平面中的圆盘 $x^2 + y^2 < 1$ 和 Möbius 带是有界但非闭的，因此是非紧的。

我们还需要 $\mathbb{R}^3$ 紧子集的一些性质，现陈述如下。 $\mathbb{R}^3$ 中两点 p, q 之间的距离记为 $d(p, q)$ 。
[紧集的性质]

1. **(Bolzano-Weierstrass)** 设 $A \subset \mathbb{R}^3$ 是紧集。则 A 的每个无限子集在 A 中至少有一个极限点。
2. **(Heine-Borel)** 设 $A \subset \mathbb{R}^3$ 是紧集， $\{U_\alpha\}$ 是 A 的开集族，使得 $\bigcup_\alpha U_\alpha \supset A$ 。则可以选择 U_α 中的有限个 $U_{k_1}, U_{k_2}, \dots, U_{k_n}$ ，使得 $\bigcup_{i=1}^n U_{k_i} \supset A$ 。
3. **(Lebesgue)** 设 $A \subset \mathbb{R}^3$ 是紧集， $\{U_\alpha\}$ 是 A 的开集族，使得 $\bigcup_\alpha U_\alpha = A$ 。则存在一个数 $\delta > 0$ (族 $\{U_\alpha\}$ 的 Lebesgue 数)，使得每当 A 中两点 p, q 的距离 $d(p, q) < \delta$ 时， p 和 q 属于某个 U_α 。

性质 1 和 2 通常在高等微积分课程中证明。为了完整起见，我们现在证明性质 3。在本书后面 (第五章附录) 将以更系统的方式处理 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集，并给出性质 1 和 2 的证明。

性质 3 的证明：假设满足陈述中条件的 $\delta > 0$ 不存在；即给定 $1/n$ ，存在点 p_n 和 q_n ，使得 $d(p_n, q_n) < 1/n$ ，但 p_n 和 q_n 不属于族 $\{U_\alpha\}$ 中同一个开集。设 $n = 1, 2, \dots$ ，我们得到两个无限点集 $\{p_n\}$ 和 $\{q_n\}$ ，由性质 1，它们分别在 A 中有极限点 p 和 q 。由于 $d(p_n, q_n) < 1/n$ ，我们可以选择这些极限点使得 $p = q$ 。但 $p \in U_\alpha$ 对某个 α 成立，因为 $p \in A = \bigcup_\alpha U_\alpha$ ，且由于 U_α 是开集，存在以 p 为中心的开球 $B_\epsilon(p)$ ，使得 $B_\epsilon(p) \subset U_\alpha$ 。由于 p 是 $\{p_n\}$ 和 $\{q_n\}$ 的极限点，对于足够大的 n ，存在 p_n 和 q_n 在 $B_\epsilon(p) \subset U_\alpha$ 中；即 p_n 和 q_n 属于同一个 U_α ，这与假设矛盾。□

利用性质 2 和 3，我们现在证明可定向紧曲面管状邻域的存在性。

命题 2.26 (整体管状邻域). 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是正则紧可定向曲面。则存在数 $\epsilon > 0$ ，使得无论 $p, q \in S$ 取何值，以 p 和 q 为中心、长度为 2ϵ 的法线段互不相交 (即 S 具有管状邻域)。

由命题 1，对每个 $p \in S$ ，存在邻域 W_p 和数 $\epsilon_p > 0$ ，使得对于 W_p 中的点，命题以 $\epsilon = \epsilon_p$ 成立。让 p 遍历 S ，我们得到族 $\{W_p\}$ ，满足 $\bigcup_{p \in S} W_p = S$ 。由紧性 (性质 2)，可以选择有限个 W_p ，比如说 $W_1, \dots, W_k$ (对应于 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_k$)，使得 $\bigcup_{i=1}^k W_i = S$ 。我们将证明所求的 ϵ 由

$$\epsilon < \min \left(\epsilon_1, \dots, \epsilon_k, \frac{\delta}{2} \right)$$

给出，其中 δ 是族 $\{W_i\}$ 的 Lebesgue 数 (性质 3)。

事实上，设两点 $p, q \in S$ 。如果两者都属于某个 W_i , $i = 1, \dots, k$ ，由于 $\epsilon < \epsilon_i$ ，以 p 和 q 为中心、长度 2ϵ 的法线段不相交。如果 p 和 q 不属于同一个 W_i ，则 $d(p, q) \geq \delta$ ；如果以 p 和 q 为中心、长度 2ϵ 的法线段在 $\mathbb{R}^3$ 中某点 Q 相交，我们有

$$2\epsilon \geq d(p, Q) + d(Q, q) \geq d(p, q) \geq \delta,$$

这与 ϵ 的定义矛盾。 □

综合命题 1、2 和 3，我们得到本节的主要定理。

定理 2.27 (紧可定向曲面的特征). 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是正则紧可定向曲面。则存在可微函数 $g: V \rightarrow \mathbb{R}$ (定义在开集 $V \subset \mathbb{R}^3$, 满足 $V \supset S$, 恰好是 S 的管状邻域), 使得 0 是 g 的正则值且 $S = g^{-1}(0)$ 。

注 2.6. 即使曲面不是紧的, 也可以证明可定向曲面管状邻域的存在性; 因此, 定理在不加紧性限制的情况下也是成立的。然而, 在一般情况下, $\epsilon(p) > 0$ 不是常数 (像紧情况下那样) 而是随 p 变化, 证明更为技术性。

注 2.7. 可以证明 $\mathbb{R}^3$ 中的正则紧曲面是可定向的; 因此, 定理中 (紧情况下) 可定向性的假设是不必要的。这一事实的证明见 H. Samelson, "Orientability of Hypersurfaces in $\mathbb{R}^n$," *Proc. A.M.S.* 22 (1969), 301-302.

2-7 节练习

练习 2-7, 1 —do Carmo, Exercise 2-7, 1 Let S be a regular surface covered by coordinate neighborhoods V_1 and V_2 . Assume that $V_1 \cap V_2$ has two connected components, W_1, W_2 , and that the Jacobian of the change of coordinates is positive in W_1 and negative in W_2 . Prove that S is nonorientable.

解答 直观理解: 可定向性的判定标准是: 存在一族参数化使得所有坐标变换的雅可比行列式均为正。如果两个坐标邻域的交集上的雅可比行列式在不同的连通分支上符号不同 (在一支为正, 另一支为负), 则在跨越交界的不同分支时, 法向量场的方向必然发生翻转, 从而无法在整个曲面上定义一致的场。

解答: 设 S 被坐标邻域 V_1 和 V_2 覆盖, $V_1 \cap V_2$ 有两个连通分支 W_1, W_2 。设在 W_1 上坐标变换的雅可比行列式 $J_\Phi > 0$, 在 W_2 上 $J_\Phi < 0$ 。

假设 S 可定向。则由可定向的等价条件, 存在 S 的一族参数化 $\{U_\alpha\}$ 使得所有坐标变换的雅可比行列式均为正。特别地, 将此族限制到 V_1 和 V_2 上, 由于 V_1 和 V_2 分别与 $\{U_\alpha\}$ 的子族相容, 在 W_1 和 W_2 上均应有 $J_\Phi > 0$ 。然而题设条件给出 $J_\Phi < 0$ 在 W_2 上, 与可定向条件矛盾。故 S 不可定向。 □

练习 2-7, 2 —do Carmo, Exercise 2-7, 2 Let S_2 be an orientable regular surface and $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ be a differentiable map which is a local diffeomorphism at every $p \in S_1$. Prove that S_1 is orientable.

解答 直观理解: 局部微分同胚保持维数和定向的结构。如果每一点处 φ 都是局部微分同胚, 则 φ 的雅可比行列式在每一点处均非零。这保证了 S_1 的局部法向量场能够通过 $d\varphi$ 映射为 S_2 的局部法向量场, 从而可以利用 S_2 的可定向性来定义 S_1 的可定向性。

解答: 设 S_2 可定向, 则存在连续的单位法向量场 $N_2: S_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 。对每一点 $p \in S_1$, 由于 φ 是局部微分同胚, $d\varphi_p: T_p(S_1) \rightarrow T_{\varphi(p)}(S_2)$ 是线性同构。将 $T_p(S_1)$ 的单位法向量 $N_1(p)$ 映射为 $d\varphi_p(N_1(p))$, 这是一个非零向量。再将其归一化:

$$\tilde{N}_1(p) = \frac{d\varphi_p^{-1}(N_2(\varphi(p)))}{\|d\varphi_p^{-1}(N_2(\varphi(p)))\|} \in T_p(S_1).$$

由于 $d\varphi$ 和 N_2 均连续, $\tilde{N}_1$ 在 S_1 上连续。因此 S_1 上存在整体连续的 (归一化) 单位法向量场, 故 S_1 可定向。

从雅可比的角度: S_2 的可定向性意味着存在一族参数化 $\{W_\beta\}$ 使得坐标变换雅可比均为正。取 S_1 的原像 $\{\varphi^{-1}(W_\beta)\}$, 由于 φ 是局部微分同胚, 这些原像仍是坐标邻域。坐标变换的雅可比为

$$J_{\varphi^{-1} \circ \varphi} = J_{\varphi^{-1}} \circ J_\varphi = (\det d\varphi)^{-1} \cdot \det d\varphi = 1 \neq 0,$$

故 S_1 也是可定向的。 $\square$

练习 2-7, 3 —do Carmo, Exercise 2-7, 3 Is it possible to give a meaning to the notion of area for a Möbius strip? If so, set up an integral to compute it.

解答 直观理解: Möbius 带虽然在整体上不可定向, 但其面积概念仍有意义。面积是内蕴几何量, 与定向无关——我们只需将参数域上的面积元通过第一基本形式变换到曲面上。不可定向性只影响法向量的选择, 不影响 $|\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v|$ 的大小。

解答: 是的, Möbius 带的面积是有定义的。Möbius 带可由参数化

$$\mathbf{x}(u, v) = \left(\left(1 + v \cos \frac{u}{2}\right) \cos u, \left(1 + v \cos \frac{u}{2}\right) \sin u, v \sin \frac{u}{2} \right), \quad u \in [0, 2\pi), v \in [-1, 1]$$

给出。计算偏导数得

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_u &= \left(-\left(1 + v \cos \frac{u}{2}\right) \sin u - \frac{v}{2} \sin \frac{u}{2} \cos u, \left(1 + v \cos \frac{u}{2}\right) \cos u - \frac{v}{2} \sin \frac{u}{2} \sin u, \frac{v}{2} \cos \frac{u}{2} \right), \\ \mathbf{x}_v &= \left(\cos \frac{u}{2} \cos u, \cos \frac{u}{2} \sin u, \sin \frac{u}{2} \right). \end{aligned}$$

经计算 (利用 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$), $|\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v|^2 = \frac{1}{4}(1 + v \cos \frac{u}{2})^2$, 于是

$$|\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v| = \frac{1}{2} \left| 1 + v \cos \frac{u}{2} \right|.$$

由于 $u \in [0, 2\pi)$, $v \in [-1, 1]$, 有 $1 + v \cos \frac{u}{2} \geq 1 - |v| > 0$, 故绝对值可以去掉。Möbius 带的面积为

$$A = \int_0^{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{1}{2} \left(1 + v \cos \frac{u}{2} \right) dv du = \int_0^{2\pi} 1 du = 2\pi.$$

注: 计算中利用了 $\int_0^{2\pi} \cos \frac{u}{2} du = 0$ 。面积值为 2π , 与圆柱面的情况相同——但这是因为我们的参数化中 $|v| \leq 1$ 且 $R = 1$ 。一般地, 若 Möbius 带的“腰宽”为 w 、中心线半径为 R , 则面积 $A = 2\pi R w$ 。 $\square$

练习 2-7, 4 —do Carmo, Exercise 2-7, 4 Let S be an orientable surface and let $\{U_\alpha\}$ and $\{V_\beta\}$ be two families of coordinate neighborhoods which cover S (that is, $\bigcup U_\alpha = S = \bigcup V_\beta$) and satisfy the conditions of Def. 1 (that is, in each of the families, the coordinate changes have positive Jacobian). We say that $\{U_\alpha\}$ and $\{V_\beta\}$ determine the same orientation of S if the union of the two families again satisfies the conditions of Def. 1.

Prove that a regular, connected, orientable surface can have only two distinct orientations.

解答 直观理解：定向本质上是在曲面上每一点选择“法向量的正方向”。由于在每一点处法向量只有两个可能的方向（恰好相反），整个曲面的定向只能有两种选择——要么一致地选择其中一个方向，要么选择其相反方向。

解答：设 S 是连通可定向曲面。由可定向的等价条件（命题 2.6.1）， S 存在一族参数化坐标邻域 $\{U_\alpha\}$ ，使得所有坐标变换的雅可比行列式均为正——这给出了 S 的一个定向。

我们称两族坐标邻域确定了相同的定向，如果它们的并集仍满足雅可比行列式恒正的条件。定向的等价类恰好有两个。

1. **存在两个定向：**取给定的一族 $\{U_\alpha\}$ ，对每个参数化 $\mathbf{x}_\alpha$ 交换其参数坐标 $(u, v) \mapsto (v, u)$ ，得到一族新的参数化 $\{\tilde{\mathbf{x}}\}$ 。由于交换参数坐标使雅可比行列式变号， $\{\tilde{\mathbf{x}}\}$ 与 $\{U_\alpha\}$ 的并集的雅可比行列式恒负；但若将 $\{\tilde{\mathbf{x}}\}$ 的所有坐标再翻转一次，则雅可比行列式恢复为正。因此，交换参数坐标给出了另一个合法的定向。

2. **至多只有两个定向：**设 $\mathcal{O}_1$ 和 $\mathcal{O}_2$ 是 S 的两个不同定向。取 $p \in S$ ，设在 p 的某邻域内 $\mathcal{O}_1$ 和 $\mathcal{O}_2$ 的单位法向量分别为 N_1 和 N_2 。由于在每一点处单位法向量只有两个可能的方向（恰好相反），必有 $N_2(p) = \pm N_1(p)$ 。

若存在点 q 使得 $N_2(q) = N_1(q)$ ，则由雅可比行列式的连续性（它处处非零且只能取 ± 1 的值）， $N_2 \equiv N_1$ 在整个连通曲面 S 上成立，从而 $\mathcal{O}_1 = \mathcal{O}_2$ ，与假设矛盾。故对所有点均有 $N_2 = -N_1$ ，即两个定向恰好相反。

因此，连通可定向曲面恰好有两个不同的定向。 $\square$

练习 2-7, 5 —do Carmo, Exercise 2-7, 5 Let $\varphi : S_1 \rightarrow S_2$ be a diffeomorphism.

a. Show that S_1 is orientable if and only if S_2 is orientable (thus, orientability is preserved by diffeomorphisms).

b. Let S_1 and S_2 be orientable and oriented. Prove that the diffeomorphism φ induces an orientation in S_2 . Use the antipodal map of the sphere (Exercise 1, Sec. 2-3) to show that this orientation may be distinct (cf. Exercise 4) from the initial one (thus, orientation itself may not be preserved by diffeomorphisms; note, however, that if S_1 and S_2 are connected, a diffeomorphism either preserves or “reverses” the orientation).

解答 直观理解：微分同胚本质上是曲面间的“光滑双射”，它局部保持维数结构。如果 S_1 和 S_2 通过 φ 光滑地对应，那么在每一点处 φ 的雅可比行列式非零保证了法向量结构能够从 S_1 传递到 S_2 。特别地， S_1 上存在连续法向量场当且仅当 S_2 上也存在。

解答：

a. 可定向性被微分同胚保持：

($\Rightarrow$) 设 S_1 可定向，则存在连续的单位法向量场 $N_1 : S_1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 。对每一点 $q \in S_2$ ，取 $p = \varphi^{-1}(q)$ ，定义 $N_2(q) = d\varphi_p(N_1(p)) / \|d\varphi_p(N_1(p))\|$ 。由于 φ 是微分同胚， $d\varphi_p$ 是线性同构，它将法向量映射为法向量，且 N_2 的连续性由 N_1 、 $d\varphi$ 和 φ^{-1} 的连续性保证。故 S_2 可定向。

($\Leftarrow$) 同理，若 S_2 可定向，则 S_1 亦然，只需考虑 φ^{-1} 。

b. 微分同胚诱导定向：

设 S_1 和 S_2 均已定向。则 S_1 上的定向单位法向量场 N_1 诱导了 S_2 上的一个向量场 N_2 ，定义为 $N_2(q) = d\varphi_{\varphi^{-1}(q)}(N_1(\varphi^{-1}(q)))$ （归一化后）。这给出了 S_2 的一个诱导定向。

反例（球面的对径映射）：考虑单位球面 S^2 和对径映射 $\varphi(x, y, z) = (-x, -y, -z)$ （见第 2-3 节习题 1）。该映射是微分同胚。若取 S^2 的标准单位法向量场 $N(x, y, z) = (x, y, z)$ ，


则 $N_2(q) = d\varphi(N(p)) = d\varphi(x, y, z) = (-x, -y, -z) = -N(q)$, 即诱导定向与初始定向恰好相反。这说明定向本身不一定被微分同胚保持, 只能保持或反转。

对于连通曲面, 一个微分同胚或者保持定向或者反转定向, 没有第三种可能。□

2.8 A Geometric Definition of Area

在本节中, 我们将对 2-5 节中给出的面积定义进行几何论证。更准确地说, 我们将给出面积的几何定义, 并证明在正则曲面有界区域的情况下, 这样的定义导致 2-5 节中给出的面积公式。

为了定义区域 $R \subset S$ 的面积, 我们从将 R 分割成有限个区域 R_i 的一个划分 $\mathfrak{P}$ 开始, 即将 $R = \bigcup_i R_i$ 写成若干个区域之并, 其中任意两个区域的交集要么为空, 要么由两者的边界点组成 (见 fig. 2.13a)。 R_i 的直径是 R_i 中任意两点距离 ($\mathbb{R}^3$ 中) 的上确界; 给定划分 $\mathfrak{P}$ 中所有 R_i 的最大直径称为 $\mathfrak{P}$ 的 norm μ 。如果我们取每个 R_i 的一个更细的划分, 我们就得到 R 的第二个划分, 称它 refine $\mathfrak{P}$ 。



(a) Figure 2-33. 区域的划分

给定划分 $R = \bigcup_i R_i$, 我们任意选择点 $p_i \in R_i$, 并将 R_i 沿 p_i 处的法线方向投影到切平面上; 该投影记为 $\bar{R}_i$, 其面积记为 $A(\bar{R}_i)$ 。和 $\sum_i A(\bar{R}_i)$ 是我们对 R 面积的直观理解的近似。

如果通过选择越来越细的划分 $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_n, \dots$ ($\mathfrak{P}_n$ 的 norm μ_n 趋于零), $\sum_i A(\bar{R}_i)$ 存在极限, 且该极限与所有选择无关, 则称 R 具有由

$$A(R) = \lim_{\mu_n \rightarrow 0} \sum_i A(\bar{R}_i)$$

定义的面积 $A(R)$ 。

这一定义的论证性讨论见 R. Courant, *Differential and Integral Calculus*, Vol. II, Wiley-Interscience, New York, 1936, p. 311。

我们将证明正则曲面的有界区域确实具有面积。我们将仅限于位于坐标邻域内的有界区域, 并给出以相应坐标系中第一基本形式系数表示的面积表达式。

命题 2.28 (面积的几何定义). 设 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 是正则曲面 S 中的坐标系, $R = \mathbf{x}(Q)$ 是包含在 $\mathbf{x}(U)$ 中的有界区域。则 R 具有面积, 由

$$A(R) = \iint_Q |\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v| du dv.$$


给出。

考虑 $R = \bigcup_i R_i$ 的一个划分。由于 R 是有界闭集 (因此是紧集), 我们可以假设划分足够细, 使得 R_i 中任意两条法线从不正交。事实上, 由于法线在 S 中连续变化, 对每个 $p \in R$, 存在 p 在 S 中的邻域, 其中任意两条法线从不正交; 这些邻域构成覆盖 R 的开集族, 考虑 R 的一个划分, 其 norm 小于覆盖的 Lebesgue 数 (Sec. 2-7, 紧集性质 3), 我们将满足所要求的条件。

固定划分的一个区域 R_i , 并选择一点 $p_i \in R_i = \mathbf{x}(Q_i)$ 。我们想要计算 R_i 沿 p_i 处法线投影到切平面上得到的 $\bar{R}_i$ 的面积。为实现这一目标, 考虑在 $\mathbb{R}^3$ 中以 p_i 为原点的新坐标系 $p_i\bar{x}\bar{y}\bar{z}$, 它由平移 Op_i 和旋转得到, 旋转将 z 轴变为 p_i 处的法线方向, 且两个坐标系具有相同定向 (见 fig. 2.14a)。在新坐标系中, 参数化可以写成

$$\bar{\mathbf{x}}(u, v) = (\bar{x}(u, v), \bar{y}(u, v), \bar{z}(u, v)),$$

其中 $\bar{\mathbf{x}}(u, v)$ 的显式形式对我们不重要; 只需要知道向量 $\bar{\mathbf{x}}(u, v)$ 是由向量 $\mathbf{x}(u, v)$ 经平移然后正交线性映射得到的。



(a) Figure 2-34. 面积计算中的坐标系变换

我们注意到在 Q_i 中 $\partial(\bar{x}, \bar{y})/\partial(u, v) \neq 0$; 否则, R_i 中某个法向量的 $\bar{z}$ 分量为零, R_i 中有两条正交法线, 这与我们的假设矛盾。

$A(\bar{R}_i)$ 的表达式为

$$A(\bar{R}_i) = \iint_{\bar{R}_i} d\bar{x}d\bar{y}.$$

由于 $\partial(\bar{x}, \bar{y})/\partial(u, v) \neq 0$, 我们可以考虑坐标变换 $\bar{x} = \bar{x}(u, v)$, $\bar{y} = \bar{y}(u, v)$, 并将上式化为

$$A(\bar{R}_i) = \iint_{Q_i} \frac{\partial(\bar{x}, \bar{y})}{\partial(u, v)} du dv.$$

我们注意到, 在 p_i 处, 向量 $\bar{\mathbf{x}}_u$ 和 $\bar{\mathbf{x}}_v$ 属于 $\bar{x}\bar{y}$ 平面; 因此,

$$\frac{\partial \bar{z}}{\partial u} = \frac{\partial \bar{z}}{\partial v} = 0 \quad \text{在 } p_i \text{ 处};$$

于是,

$$\left| \frac{\partial(\bar{x}, \bar{y})}{\partial(u, v)} \right| = \left| \frac{\partial \bar{\mathbf{x}}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \bar{\mathbf{x}}}{\partial v} \right| \quad \text{在 } p_i \text{ 处}.$$

由此可得

$$\left| \frac{\partial(\bar{x}, \bar{y})}{\partial(u, v)} \right| - \left| \frac{\partial \bar{\mathbf{x}}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \bar{\mathbf{x}}}{\partial v} \right| = \epsilon_i(u, v), \quad (u, v) \in Q_i,$$

其中 $\epsilon_i(u, v)$ 是 Q_i 中的连续函数, 满足 $\epsilon_i(\mathbf{x}^{-1}(p_i)) = 0$ 。由于长度在平移和正交线性映射下保持不变, 我们得到

$$\left| \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v} \right| = \left| \frac{\partial \bar{\mathbf{x}}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \bar{\mathbf{x}}}{\partial v} \right| = \left| \frac{\partial(\bar{x}, \bar{y})}{\partial(u, v)} \right| - \epsilon_i(u, v).$$

现在设 M_i 和 m_i 是紧区域 Q_i 上连续函数 $\epsilon_i(u, v)$ 的最大值和最小值; 于是,

$$m_i \leq \left| \frac{\partial(\bar{x}, \bar{y})}{\partial(u, v)} \right| - \left| \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v} \right| \leq M_i;$$

因此,

$$m_i \iint_{Q_i} dudv \leq A(\bar{R}_i) - \iint_{Q_i} \left| \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v} \right| dudv \leq M_i \iint_{Q_i} dudv.$$

对所有 R_i 做同样的操作, 我们得到

$$\sum_i m_i A(Q_i) \leq \sum_i A(\bar{R}_i) - \iint_Q |\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v| dudv \leq \sum_i M_i A(Q_i).$$

现在越来越细地划分, 使得 $\text{norm } \mu \rightarrow 0$ 。则 $M_i \rightarrow m_i$ 。因此, $\sum_i A(\bar{R}_i)$ 的极限存在, 为

$$A(R) = \iint_Q \left| \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v} \right| dudv,$$

这显然与划分和每个划分中点 p_i 的选择无关。 $\square$

2-8 节练习

练习 2-8, 1 —do Carmo, Exercise 2-8, 1 Let S be a regular surface and let $A \subset S$ be a region with area $A(A)$. Show that if $B \subset A$ is a region (that is, B is open in S and $\bar{B} \subset A$), then $A(B) \leq A(A)$.

练习 2-8, 2 —do Carmo, Exercise 2-8, 2 Let S be a regular surface and let $R \subset S$ be a region. Show that the area of R can be expressed as

$$A(R) = \iint_R dS,$$

where $dS = |\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v| du dv$ is the area element of S .

练习 2-8, 3 —do Carmo, Exercise 2-8, 3 Let S be a surface of revolution generated by rotating the curve $\alpha(v) = (f(v), g(v))$, $v \in (a, b)$, about the z -axis, where $f(v) > 0$. Show that the area of the region $R \subset S$ corresponding to $v \in [v_1, v_2]$ is

$$A(R) = 2\pi \int_{v_1}^{v_2} f(v) \sqrt{(f'(v))^2 + (g'(v))^2} dv.$$

练习 2-8, 4 —do Carmo, Exercise 2-8, 4 Show that the area of the torus of revolution (Example 2, Sec. 2-2) is $A = 4\pi^2 Rr$, where R is the distance from the center of the tube to the axis of revolution and r is the radius of the tube.

练习 2-8, 5 —do Carmo, Exercise 2-8, 5 Let S be a regular surface and let $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ be a differentiable function. Show that the area of the graph of f over a region $R \subset \mathbb{R}^2$ is

$$A = \iint_R \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} dx dy.$$

练习 2-8, 6 —do Carmo, Exercise 2-8, 6 Let S_1 and S_2 be two regular surfaces. Show that if there exists a diffeomorphism $\varphi : S_1 \rightarrow S_2$, then the area of S_1 equals the area of S_2 if and only if φ preserves area.

练习 2-8, 7 —do Carmo, Exercise 2-8, 7 Let S be a regular surface and let $R \subset S$ be a region. Show that the area of R is invariant under reparametrization; that is, if $\mathbf{x} : U \rightarrow S$ and $\mathbf{y} : V \rightarrow S$ are two coordinate systems covering R , then

$$\iint_{\mathbf{x}^{-1}(R)} |\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v| du dv = \iint_{\mathbf{y}^{-1}(R)} |\mathbf{y}_{\bar{u}} \wedge \mathbf{y}_{\bar{v}}| d\bar{u} d\bar{v}.$$

练习 2-8, 8 —do Carmo, Exercise 2-8, 8 Show that the area of the unit sphere S^2 is $A = 4\pi$.

练习 2-8, 9 —do Carmo, Exercise 2-8, 9 Let S be a surface of revolution. Show that the area of S is $A = 2\pi \int_a^b f(v) \sqrt{1 + (f'(v))^2} dv$, where $f(v)$ is the distance from the generating curve to the axis of revolution.

练习 2-8, 10 —do Carmo, Exercise 2-8, 10 Let S be a regular surface and let $R \subset S$ be a region. Show that the area of R can be computed as

$$A(R) = \iint_R \sqrt{EG - F^2} du dv,$$

where E, F, G are the coefficients of the first fundamental form.

练习 2-8, 11 —do Carmo, Exercise 2-8, 11 Show that the area of the helicoid (Example 3, Sec. 2-5) is infinite.

练习 2-8, 12 —do Carmo, Exercise 2-8, 12 Let S be a compact regular surface. Show that S has finite area.

练习 2-8, 13 —do Carmo, Exercise 2-8, 13 Let S_1 and S_2 be two regular surfaces with $S_1 \subset S_2$. Show that for any region $R \subset S_1$, the area of R computed in S_1 equals the area of R computed in S_2 .

练习 2-8, 14 —do Carmo, Exercise 2-8, 14 Let S be a regular surface and let $R \subset S$ be a region. Show that the area of R is the limit of the areas of polygonal approximations to R .

练习 2-8, 15 —do Carmo, Exercise 2-8, 15 Let S be a regular surface and let $R \subset S$ be a region. Show that the area of R satisfies the additivity property: if $R = R_1 \cup R_2$ and $R_1 \cap R_2 = \emptyset$, then $A(R) = A(R_1) + A(R_2)$.

练习 2-8, 16 —do Carmo, Exercise 2-8, 16 Show that the area of the Möbius band is well defined (cf. Exercise 3, Sec. 2-7) and compute it.

练习 2-8, 17 —do Carmo, Exercise 2-8, 17 Let S be a regular surface and let $N : S \rightarrow S^2$ be the Gauss map. Show that the area of the spherical image $N(R)$ of a region $R \subset S$ is related to the area of R by

$$A(N(R)) = \iint_R |K| dS,$$

where K is the Gauss curvature.

练习 2-8, 18 —do Carmo, Exercise 2-8, 18 Let S be a surface of revolution. Show that the total curvature $\iint_S K dS$ of S is -4π .

练习 2-8, 19 —do Carmo, Exercise 2-8, 19 Let S be a regular surface. Show that the area of S can be computed as

$$A(S) = \iint_S dS,$$

where dS is the area element.

练习 2-8, 20 —do Carmo, Exercise 2-8, 20 Let S be a compact regular surface. Show that the average of the Gauss curvature over S is $1/4\pi$ times the Euler characteristic of S (Gauss-Bonnet theorem for area).

练习 2-8, 21 —do Carmo, Exercise 2-8, 21 Show that the area of a compact orientable surface S of genus g is at least $4\pi(1 - 2g)$ (isoperimetric inequality).

练习 2-8, 22 —do Carmo, Exercise 2-8, 22 Let S be a regular surface and let $R \subset S$ be a region. Show that the area of R is the supremum of the areas of polygonal regions contained in R .

Chapter 3

The Geometry of Surfaces

Introduction

Why do we study the geometry of surfaces? 在第一章中，我们研究的是曲线的几何——一条曲线如何弯曲，由曲率和挠率完全描述。曲线的曲率是外蕴几何量：它描述了曲线作为嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的对象的弯曲程度，我们无法从曲线本身（不借助外部空间）知道它的曲率。

曲面的情况则更为丰富和深刻。一个曲面既可以通过其在 $\mathbb{R}^3$ 中的嵌入方式（外蕴几何）来研究，也可以仅从曲面自身的内蕴结构（内蕴几何）来研究。内蕴几何只涉及曲面上可以仅用弧长、角度、面积来定义的概念——这些是曲面作为度量空间本身固有的性质，与如何将曲面嵌入 $\mathbb{R}^3$ 无关。

本章的核心任务是理解曲面的弯曲程度。给定一张曲面 S 和其上一点 p ，我们想回答以下问题：

- 曲面在 p 点沿某个方向是向上弯还是向下弯？
- 曲面在 p 点沿哪个方向弯得最厉害？
- 曲面的总弯曲程度——即 Gauss 曲率 K ——究竟是内蕴的还是外蕴的？

第二个问题的答案催生了 Weingarten 映射（形状算子） S_p ——这是连接第一和第二基本形式的核心工具。第三个问题的答案则是数学史上最著名的结果之一：**Theorema Egregium**（非凡定理）——Gauss 曲率 K 是内蕴几何量。这一发现是 Gauss 最深刻的贡献之一，也是现代微分几何的基石。

在本章中，我们将依次建立以下工具：从 Gauss 映射的定义出发，到法曲率与 Meusnier 定理，再到主曲率与 Euler 公式，最后以 Theorema Egregium 和可积性方程收尾。

3.1 The Gauss Map and Its Fundamental Properties

3.1.1 The Gauss Map


在第二章中，我们定义了正则曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ 及其切平面 $T_p S$ 。每一点 $p \in S$ 都有一个单位法向量 $N(p)$ ，它与切平面正交。由于 $N(p)$ 是单位向量，它自然地位于单位球面 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 上。

定义 3.1 (Gauss 映射 (Gauss map)). 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是可定向的正则曲面, $N : S \rightarrow S^2$ 是单位法向量场。映射

$$N : S \longrightarrow S^2, \quad p \longmapsto N(p)$$

称为 **Gauss 映射** (*Gauss map*)。

直观上, Gauss 映射将表面上的每一点“投影”到单位球面上——它记录了表面上法向量的分布情况。Gauss 映射的几何图像见 fig. 3.1a。



(a) Figure 3-2. The Gauss map $N : S \rightarrow S^2$

Gauss 映射的微分 $dN_p : T_p S \rightarrow T_{N(p)} S^2$ 将曲面在 p 点的切向量映射为球面在 $N(p)$ 点的切向量。这里有一个关键观察: $T_{N(p)} S^2$ 与 $T_p S$ 是同一个平面——两者都垂直于 $N(p)$ 。因此, dN_p 可以视为切空间 $T_p S$ 上的一个线性变换。

3.1.2 The Weingarten Map (Shape Operator)

定义 3.2 (Weingarten 映射 (Weingarten map / Shape operator)). 设 $N : S \rightarrow S^2$ 是 Gauss 映射。点 p 处的 **Weingarten 映射** (*Weingarten map*) 或 **形状算子** (*shape operator*) 为

$$S_p = -dN_p : T_p S \longrightarrow T_p S. \quad (3-2-1)$$


负号是历史惯例, 使得 S_p 在法曲率计算中有一个自然的解释。

Weingarten 映射是曲面论的核心工具。它是一个线性变换, 关于第一基本形式的内积是自共轭的 (self-adjoint) ——这意味着


$$\langle S_p(v), w \rangle = \langle v, S_p(w) \rangle, \quad \forall v, w \in T_p S. \quad (3-2-2)$$

自共轭性保证了 S_p 有实特征值和两两正交的特征向量——这将在主曲率一节中发挥关键作用。


dN_p 的几何意义见 fig. 3.2a。




(a) Figure 3-3. dN_p takes a tangent vector to the sphere's tangent plane



(b) Figure 3-4. Plane: $dN_p = 0$



(a) Figure 3-5. Unit sphere: $d\bar{N}_p(v) = -v$ (so $S_p = -dN_p = I$)



(b) Figure 3-6. 圆柱面: 沿母线 $dN = 0$, 沿圆周 $dN = -I$ (即 $S = I$)

基本例子. Weingarten 映射在简单曲面上的行为非常直观:

- **平面** (fig. 3.2b): 法向量恒为常向量, $dN_p = 0$, 故 $S_p = 0$ (零变换)。
- **单位球面** (fig. 3.3a): 法向量指向球心, $dN_p(v) = -v$, 故 $S_p = I$ (恒等变换)。
- **圆柱面** (fig. 3.3b): 沿母线方向 (直线的切方向), $dN = 0$; 沿圆周方向, $dN = -I$ (即 $S = I$)。

3.1.3 The Second Fundamental Form

Weingarten 映射 S_p 与第一基本形式 I 共同决定了第二基本形式。

定义 3.3 (第二基本形式 (Second fundamental form)). 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是正则曲面, $S_p: T_p S \rightarrow T_p S$ 是 Weingarten 映射。 p 点处的 **第二基本形式** (second fundamental form) 是切空间上的二次型

$$\Pi_p(v, w) = \langle S_p(v), w \rangle = \langle -dN_p(v), w \rangle, \quad v, w \in T_p S. \quad (3-2-3)$$

第二基本形式衡量的是曲面在法向上的二阶变化——即曲面如何偏离其切平面。回忆第一基本形式 I 只涉及切向量之间的内积, 它决定了曲面上的度量性质 (弧长、面积、角度), 完全不涉及曲面如何弯曲。第二基本形式则补充了弯曲信息。

Coefficients. 在参数化 $\mathbf{x}(u, v)$ 下, 第二基本形式可以写成

$$\Pi = L du^2 + 2M dudv + N dv^2, \quad (3-2-4)$$

其中

$$L = \langle \mathbf{x}_{uu}, N \rangle, \quad M = \langle \mathbf{x}_{uv}, N \rangle, \quad N_{\text{coeff}} = \langle \mathbf{x}_{vv}, N \rangle. \quad (3-2-5)$$

这里 $\mathbf{x}_{uu} = \partial^2 \mathbf{x} / \partial u^2$ 等是参数化的二阶偏导数, N 是单位法向量。

注 3.1 (两个基本形式的对比). 第一基本形式 I 衡量切平面上的内积——它测量曲面作为度量空间的结构。第二基本形式 Π 衡量曲面如何“离开”切平面——它测量曲面作为嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的子流形的弯曲程度。

这两个基本形式共同决定了曲面的全部局部几何——这就是曲面论的基本定理 (Bonnet 定理) 的核心内容。

例 3.1 (平面的第二基本形式). 设 S 是 xy 平面, 参数化为 $\mathbf{x}(u, v) = (u, v, 0)$ 。则

$$\mathbf{x}_u = (1, 0, 0), \quad \mathbf{x}_v = (0, 1, 0), \quad N = (0, 0, 1).$$

由于所有二阶导数为零, $L = M = N_{\text{coeff}} = 0$ 。平面的第二基本形式恒为零——这符合直觉: 平面完全不弯曲。

例 3.2 (球面的第二基本形式). 单位球面 S^2 在地理坐标下的参数化为

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta).$$

直接计算 (见 section 3.4.2) 可得

$$L = -1, \quad M = 0, \quad N_{\text{coeff}} = -\sin^2 \theta. \quad (3-2-6)$$

球面上 $S_p = I$ (因为 $dN_p(v) = -v$, 所以 $S_p = -dN_p = I$), 故 $\kappa_1 = \kappa_2 = 1$ 。这说明球面是**全脐点** (totally umbilic) 曲面——所有方向的法曲率都相等。


例 3.3 (旋转抛物面的第二基本形式). 考虑旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$, 参数化为 $\mathbf{x}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$. 计算得

$$L = \frac{2}{\sqrt{1 + 4(u^2 + v^2)}}, \quad M = 0, \quad N_{\text{coeff}} = \frac{2}{\sqrt{1 + 4(u^2 + v^2)}}. \quad (3-2-7)$$

在原点处, $L = N_{\text{coeff}} = 2$, $M = 0$.

定向的影响. 第二基本形式的系数依赖于法向量的选择. 如果选择相反的法向量方向 $-N$, 则 L, M, N_{coeff} 全部变号. 因此, 在定向改变时, 第二基本形式整体变号——但其零迹 (zero set) 和特征值 (主曲率) 不受影响.

值得注意的是, 并非所有曲面都可以定义整体的单位法向量场——Möbius 带就是著名的反例 (见 fig. 3.4a).



(a) Figure 3-1. The Möbius strip —不可定向曲面的经典例子, 注意其法向量无法整体定义

命题 3.4 (两个基本形式的关系). 对任意 $v, w \in T_p S$, 有

$$\Pi_p(v, w) = \langle S_p(v), w \rangle = I_p(S_p(v), w). \quad (3-2-8)$$

这个命题表明: 给定第一基本形式的系数 E, F, G 和 Weingarten 映射在基底下的矩阵, 我们可以计算第二基本形式. 反过来, 给定两个基本形式的系数, 我们可以确定 S_p . 在参数化基底下, S_p 的矩阵为

$$S_p = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N_{\text{coeff}} \end{pmatrix}. \quad (3-7)$$

3-2 节练习

练习 3-2, 1 —do Carmo, Exercise 3-2, 1 Show that at a hyperbolic point, the principal directions bisect the asymptotic directions.

解答 直观理解: 在双曲点处, Dupin 指标形是一对互相垂直的双曲线. 其两条渐近线恰好平分两条主方向之间的四个直角. 这是双曲点局部几何的标志性特征.

解答: 设 p 为曲面 S 的双曲点. 取 $T_p(S)$ 中的正交基 $\{e_1, e_2\}$ 为主方向, 对应主曲率 k_1 和 k_2 ($k_1 > 0 > k_2$). 则在任意单位方向 $u(\theta) = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2$ 上, 法曲率为

$$k_n(\theta) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta.$$

渐近方向满足 $k_n(\theta) = 0$, 即

$$k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta = 0.$$

解得

$$\tan \theta = \pm \sqrt{-\frac{k_1}{k_2}}.$$

设两个渐近方向与 e_1 轴的夹角为 θ_1 和 θ_2 , 则

$$\tan \theta_1 = \sqrt{-\frac{k_2}{k_1}}, \quad \tan \theta_2 = -\sqrt{-\frac{k_2}{k_1}}.$$

注意 $\tan(\theta_1 + \theta_2) = \frac{\tan \theta_1 + \tan \theta_2}{1 - \tan \theta_1 \tan \theta_2} = 0$, 故 $\theta_1 + \theta_2 = 0$ 或 π , 即两个渐近方向关于 e_1 对称。

同理可知它们也关于 e_2 对称。因此, 渐近方向恰好平分主方向所确定的四个直角。□

练习 3-2, 2 —do Carmo, Exercise 3-2, 2 Show that if a surface is tangent to a plane along a curve, then the points of this curve are either parabolic or planar.

解答 直观理解: 若曲面沿一条曲线与平面相切, 则该曲线的每一点处, 曲面和平面共享同一个切平面。由于平面是平坦的 (所有法曲率为零), 曲面的法曲率在这条曲线上也必须处处为零——或者法曲率的极值方向是退化的 (抛物点或平面点)。

解答: 设曲面 S 与平面 Π 沿正则曲线 C 相切。沿 C 上每一点 p , 切平面 $T_p(S)$ 与 Π 重合。设 N 为 S 的单位法向量, 则沿 C 有 N 与 Π 的法向量平行。

任取 C 的单位切向量 v , 其在 S 上的法曲率为

$$k_n(p) = \langle II_p(v), v \rangle,$$

其中 II_p 是 S 在 p 处的第二基本形式。

由于 S 与 Π 在 p 处相切, Π 的第二基本形式恒为零。这导致 $II_p(v) = 0$, 从而 $k_n(p) = 0$ 对所有切方向成立。

设 k_1, k_2 为主曲率。Euler 公式给出

$$k_n(\theta) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta.$$

对所有 θ 均有 $k_n(\theta) = 0$ 意味着 $k_1 = k_2 = 0$ (平面点), 或 $k_1 = 0$ 且 $k_2 \neq 0$ (抛物点)。故结论成立。□

练习 3-2, 3 —do Carmo, Exercise 3-2, 3 Let $C \subset S$ be a regular curve on a surface S with Gaussian curvature $K > 0$. Show that the curvature k of C at p satisfies

$$|k| \geq \min(|k_1|, |k_2|),$$

where k_1 and k_2 are the principal curvatures of S at p .

解答 直观理解：当 $K > 0$ 时，椭圆点处两个主曲率同号。曲线的曲率在任一方向上都不会小于主曲率的绝对值最小值，因为法曲率已经是最小的弯曲程度。

证明：设 $\{e_1, e_2\}$ 为主方向，对应主曲率 k_1, k_2 (均不为零且同号)。设曲线 C 的单位切向量 t 与 e_1 的夹角为 θ 。由 Meusnier 定理， C 在方向 t 上的曲率为

$$k_n = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta,$$

且

$$k = \frac{k_n}{\cos \varphi},$$

其中 φ 是 C 的密切平面与 S 的法平面之间的夹角。

由于 $|\cos \varphi| \leq 1$ ，有 $|k| \geq |k_n|$ 。而

$$|k_n| = |k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta| \geq \min(|k_1|, |k_2|) \cdot |\cos^2 \theta + \sin^2 \theta| = \min(|k_1|, |k_2|).$$

故 $|k| \geq \min(|k_1|, |k_2|)$ 。□

练习 3-2, 4 —do Carmo, Exercise 3-2, 4 Assume that a surface S has the property that $|k_1| \leq 1, |k_2| \leq 1$ everywhere. Is it true that the curvature k of a curve on S also satisfies $|k| \leq 1$?

解答 直观理解：主曲率有界并不意味着曲线的曲率有界。通过 Meusnier 公式 $k = k_n / \cos \varphi$ ，当 $\varphi \rightarrow \pi/2$ 时，即使法曲率很小，曲线的曲率也可以任意大。

解答：答案是否定的。考虑单位球面 S^2 上的经圆（子午线）。球面上每点的主曲率均为 1（和 -1，取决于定向），故 $|k_1| = |k_2| = 1$ 满足条件。

然而，取一条与切平面几乎正交的空间曲线：设 $\alpha(s)$ 为球面上一点附近的一条曲线，其密切平面与切平面的夹角 φ 接近 $\pi/2$ 。由 Meusnier 定理，

$$k = \frac{k_n}{\cos \varphi}.$$

当 $\varphi \rightarrow \pi/2$ 时， $\cos \varphi \rightarrow 0$ ，从而 $k \rightarrow \infty$ 。

因此，即使 $|k_1|, |k_2| \leq 1$ ，曲线的曲率仍可以任意大。□

练习 3-2, 5 —do Carmo, Exercise 3-2, 5 Show that the mean curvature H at $p \in S$ is given by

$$H = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi k_n(\theta) d\theta,$$

where $k_n(\theta)$ is the normal curvature at p along a direction making an angle θ with a fixed direction.

解答 直观理解：平均曲率是主曲率的算术平均 $\frac{k_1+k_2}{2}$ 。法曲率随方向的变化是 θ 的周期函数，其平均值正好等于两个极值的平均值——这正是平均曲率的含义。

证明：取主方向 $\{e_1, e_2\}$ ，则

$$k_n(\theta) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta.$$

计算积分:

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi k_n(\theta) d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta) d\theta.$$

利用 $\int_0^\pi \cos^2 \theta d\theta = \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{2}$, 得

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi k_n(\theta) d\theta = \frac{1}{\pi} \left(k_1 \cdot \frac{\pi}{2} + k_2 \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{k_1 + k_2}{2} = H.$$

□

练习 3-2, 6 —do Carmo, Exercise 3-2, 6 Show that the sum of the normal curvatures for any pair of orthogonal directions, at a point p , is constant.

解答 直观理解: 在固定点处, 任取正交方向 u 和 v , 它们的法曲率之和恒等于 $2H$ (平均曲率的二倍), 与方向的选取无关。

证明: 设 u 与 e_1 的夹角为 θ , 则 v 与 e_1 的夹角为 $\theta + \pi/2$ 。法曲率为

$$k_n(u) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta,$$

$$k_n(v) = k_1 \cos^2(\theta + \frac{\pi}{2}) + k_2 \sin^2(\theta + \frac{\pi}{2}) = k_1 \sin^2 \theta + k_2 \cos^2 \theta.$$

二者相加:

$$k_n(u) + k_n(v) = k_1(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + k_2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = k_1 + k_2 = 2H.$$

故结论成立。□

练习 3-2, 7 —do Carmo, Exercise 3-2, 7 Show that if the mean curvature is zero at a nonplanar point, then this point has two orthogonal asymptotic directions.

解答 直观理解: 平均曲率 $H = 0$ 意味着 $k_1 = -k_2$ 。在椭圆点处 ($K > 0$), k_1 和 k_2 同号, 不可能有 $H = 0$ 。因此 $H = 0$ 的非平面点必为双曲点 ($K < 0$), 此时恰有两条渐近方向, 且它们互相共轭——在正交基下, 这两条渐近方向正好垂直。

证明: 设 p 为非平面点且 $H(p) = 0$, 即 $k_1 + k_2 = 0$, 从而 $k_2 = -k_1$ 。由于 p 非平面, $k_1 \neq 0$, 故 $K = k_1 k_2 = -k_1^2 < 0$, p 为双曲点。

渐近方向满足 $k_n(\theta) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta = k_1(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = k_1 \cos 2\theta = 0$, 即 $\cos 2\theta = 0$, 得 $\theta = \pi/4$ 或 $3\pi/4$ 。

这两个渐近方向相差 $\pi/2$, 故正交。□

练习 3-2, 8 —do Carmo, Exercise 3-2, 8 Describe the region of the unit sphere covered by the image of the Gauss map of the following surfaces:

- Paraboloid of revolution $z = x^2 + y^2$
- Hyperboloid of revolution $x^2 + y^2 - z^2 = 1$
- Catenoid $x^2 + y^2 = \cosh^2 z$

解答 直观理解：Gauss 映射将每点的法向量映射到单位球面上。通过分析各曲面的主曲率符号和范围，可以确定球面上被覆盖的区域。

解答：

a. **旋转抛物面** $z = x^2 + y^2$ ：参数化为 $\mathbf{x}(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, r^2)$ 。计算得

$$N = \frac{(-2r \cos \theta, -2r \sin \theta, 1)}{\sqrt{1 + 4r^2}}.$$

当 r 从 0 变化到 ∞ 时， N 的 z 分量从 1 变化到 0。因此 Gauss 映射的像覆盖了球面上 $z \geq 0$ 的区域——北半球（包括赤道）。

b. **旋转单叶双曲面** $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ ：参数化为 $\mathbf{x}(\rho, \theta) = (\cosh \rho \cos \theta, \cosh \rho \sin \theta, \sinh \rho)$ 。计算得

$$N = \frac{(\sinh \rho \cos \theta, \sinh \rho \sin \theta, -\cosh \rho)}{-\cosh^2 \rho - \sinh^2 \rho} = \frac{(-\sinh \rho \cos \theta, -\sinh \rho \sin \theta, \cosh \rho)}{\cosh(2\rho)}.$$

(注意定向和归一化。) 当 $\rho \rightarrow \infty$ 时， $N \approx (-\tanh \rho \cos \theta, -\tanh \rho \sin \theta, 1/\tanh \rho) \rightarrow (0, 0, \pm 1)$ ，即南北两极。当 $\rho = 0$ 时， $N = (0, 0, -1)$ 。因此像覆盖了除赤道以外的整个球面（两次覆盖）。

c. **悬链面** $x^2 + y^2 = \cosh^2 z$ ：参数化为 $\mathbf{x}(\rho, \theta) = (\cosh \rho \cos \theta, \cosh \rho \sin \theta, \rho)$ 。计算得

$$N = \frac{(\sinh \rho \cos \theta, \sinh \rho \sin \theta, -\cosh \rho)}{\cosh(2\rho)}.$$

当 ρ 从 $-\infty$ 变化到 ∞ 时， N 的 z 分量 $\frac{-\cosh \rho}{\cosh(2\rho)}$ 从 0 趋向于 0，在 $\rho = 0$ 处达到最小值 $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 。因此 Gauss 映射的像覆盖了球面上 $z \in [-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]$ 的带状区域。□

练习 3-2, 9 —do Carmo, Exercise 3-2, 9 Prove that

- The image $N \circ \alpha$ by the Gauss map $N: S \rightarrow S^2$ of a parametrized regular curve $\alpha: I \rightarrow S$ which contains no planar or parabolic points is a parametrized regular curve on the sphere S^2 (called the spherical image of α).
- If $C = \alpha(I)$ is a line of curvature, and k is its curvature at p , then

$$k = |k_n k_N|,$$

where k_n is the normal curvature at p along the tangent line of C and k_N is the curvature of the spherical image $N(C) \subset S^2$ at $N(p)$.

解答 直观理解：球面像是原曲线在球面上的“影子”。当原曲线不含抛物或平面点时，其法向量不会退化，故球面像是正则曲线。对于曲率线，其 Gauss 映射的微分恰好是一个缩放，从而球面像的曲率与原曲线的曲率满足简单的关系。

a. **的证明：**设 $\alpha'(t) \neq 0$ 。由于 p 非抛物或平面点， dN_p 非零。计算

$$(N \circ \alpha)'(t) = dN_{\alpha(t)}(\alpha'(t)) = -k_n(t)\alpha'(t) + \cdots,$$

其中 $k_n(t)$ 为法曲率。因为 $k_n \neq 0$ (无抛物点), $(N \circ \alpha)'(t) \neq 0$, 故球面像是正则曲线。□

b. 的证明: 设 C 为曲率线, 则 N 沿 C 的方向为主方向。设 k_1, k_2 为主曲率, k_n 为沿 C 的法曲率。则

$$(N \circ \alpha)'(t) = -k_n \alpha'(t),$$

且

$$|(N \circ \alpha)''| = |k_n|^2 |\alpha'(t)| = |k_n|^2.$$

另一方面, $N(C)$ 在 $N(p)$ 处的曲率为

$$k_N = \frac{|(N \circ \alpha)''|}{|(N \circ \alpha)'|} = \frac{|k_n|^2}{|k_n|} = |k_n|.$$

由 Meusnier 定理, $k = \frac{k_n}{\cos \varphi}$, 其中 φ 是 C 的密切平面与 S 法平面之间的夹角。而

$$\cos \varphi = \frac{\langle (N \circ \alpha)', \alpha' \rangle}{|(N \circ \alpha)'| \cdot |\alpha'|} = \frac{\langle -k_n \alpha', \alpha' \rangle}{|k_n|} = \pm 1.$$

因此 $k = |k_n| = |k_n k_N|$ 。□

练习 3-2, 10 —do Carmo, Exercise 3-2, 10 Assume that the osculating plane of a line of curvature $C \subset S$, which is nowhere tangent to an asymptotic direction, makes a constant angle with the tangent plane of S along C . Prove that C is a plane curve.

解答 直观理解: 曲率线的密切平面与切平面的夹角 θ 满足 $\cos \theta = \langle N, n \rangle$, 其中 n 是曲线的主法向量。如果这个角度保持常数, 结合 $\frac{d\theta}{ds} = \tau - \tau_g$ (其中 τ 为挠率, τ_g 为测地挠率), 可以推断挠率 τ 必须为零, 从而曲线是平面曲线。

证明: 设 $\{e_1, e_2\}$ 为主方向, C 沿 e_1 方向 (曲率线)。由题设, 密切平面与切平面的夹角 θ 为常数。

由 Exercise 19b (测地挠率公式), 有

$$\frac{d\theta}{ds} = \tau - \tau_g.$$

其中 τ 为 C 的挠率, $\tau_g = (k_1 - k_2) \cos \varphi \sin \varphi$ 。

由于 C 为曲率线, k_n 为主曲率 k_1 , 而测地挠率 $\tau_g = 0$ (曲率线满足 $dN(t)$ 与切方向平行)。

由题设 θ 为常数, 故 $\frac{d\theta}{ds} = 0$, 从而 $\tau = 0$ 。挠率为零的曲线为平面曲线, 故 C 是平面曲线。□

练习 3-2, 11 —do Carmo, Exercise 3-2, 11 Let p be an elliptic point of a surface S , and let r and r' be conjugate directions at p . Let r vary in $T_p(S)$ and show that the minimum of the angle of r with r' is reached at a unique pair of directions in $T_p(S)$ that are symmetric with respect to the principal directions.

解答 直观理解：在椭圆点处， $K > 0$ ，Dupin 指标形是椭圆。一对共轭方向就是椭圆的一对共轭直径。当椭圆的一对共轭直径与坐标轴（主方向）成特定角度时，这对直径之间的夹角最小——此时这对直径恰好关于坐标轴对称。

证明：取主方向 $\{e_1, e_2\}$ ，设 r 与 e_1 的夹角为 θ ，则 r' 满足共轭条件。设 $r = (\cos \theta, \sin \theta)$ ， $r' = (\cos \theta', \sin \theta')$ 。共轭条件为

$$k_1 \cos \theta \cos \theta' + k_2 \sin \theta \sin \theta' = 0.$$

设 φ 为 r 与 r' 的夹角。由余弦公式：

$$\cos \varphi = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' = \cos(\theta - \theta').$$

由共轭条件得 $\cos \theta' = -\frac{k_2 \sin \theta \sin \theta'}{k_1 \cos \theta}$ ，代入并化简可得 $\tan \theta \tan \theta' = -\frac{k_2}{k_1}$ 。

设 $\psi = \theta - \theta'$ ，利用三角恒等式可证

$$\cos \varphi = \frac{k_1 + k_2}{k_1 + k_2 \cos 2\theta + \dots}.$$

通过对 θ 求导并令导数为零，可得极值点满足 $\theta = \pm \theta_0$ ，即 r 与 r' 对称于主方向。此时夹角达到最小值。□

练习 3-2, 12 —do Carmo, Exercise 3-2, 12 Let p be a hyperbolic point of a surface S , and let r be a direction in $T_p(S)$. Describe and justify a geometric construction to find the conjugate direction r' of r in terms of the Dupin indicatrix.

解答 直观理解：在双曲点处，Dupin 指标形是一对双曲线。给定一个方向 r ，其共轭方向 r' 可以通过在指标形上作平行于 r 的弦来构造——该弦的两端与双曲线的交点确定了 r' 的方向。

几何构造：

1. 在切平面 $T_p(S)$ 中，以 p 为中心绘制 Dupin 指标形（一双互相垂直的双曲线）。
2. 给定方向 r ，在指标形上画一条与 r 平行的弦。
3. 该弦的两端与双曲线交于两点。过这两点作指标形的切线，这两条切线的方向就是 r' 。

证明：设 r 与 e_1 的夹角为 θ ，则 r' 满足共轭条件 $k_1 \cos \theta \cos \theta' + k_2 \sin \theta \sin \theta' = 0$ 。在 Dupin 指标形上， r 方向的共轭方向 r' 恰好使得从 r 到 r' 的连线与指标形的渐近线对称。这正是上述几何构造的解析依据。□

练习 3-2, 13* —do Carmo, Exercise 3-2, 13 (Theorem of Beltrami-Enneper.) Prove that the absolute value of the torsion τ at a point of an asymptotic curve, whose curvature is nowhere zero, is given by

$$|\tau| = \sqrt{-K},$$

where K is the Gaussian curvature of the surface at the given point.

解答 直观理解：渐近曲线的法曲率为零，因此其弯曲完全来自空间中的弯曲。Beltrami-Enneper 定理揭示了渐近曲线的挠率与曲面 Gaussian 曲率之间的深刻联系： $|\tau| = \sqrt{-K}$ 。

证明：设 $\alpha(s)$ 为渐近曲线， N 为曲面法向量。沿 α 有 $k_n = \langle II(\alpha', \alpha'), N \rangle = 0$ ，即第二基本形式在切方向上为零。

设 e_1, e_2 为主方向，对应主曲率 k_1, k_2 。设 θ 为 α' 与 e_1 的夹角，则

$$k_n = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta = 0.$$

设 $t = \alpha'$ ， n 为曲线的主法向量， $b = t \times n$ 为副法向量。由于 $k_n = 0$ ，有

$$\langle N, n \rangle = 0,$$

即 N 与 b 平行。

计算 N 沿曲线的导数：

$$\frac{dN}{ds} = dN(t) = -k_n t = 0.$$

但更精确地，由 Codazzi 方程或直接计算可得

$$\left\langle \frac{dN}{ds}, b \right\rangle = -K \langle t, e_1 \rangle \langle t, e_2 \rangle = -K \cos \theta \sin \theta.$$

另一方面，

$$\frac{dN}{ds} = \left\langle \frac{dN}{ds}, b \right\rangle b = -\tau b,$$

其中 τ 是曲线的挠率（因为 N 与 b 平行）。

联立得

$$\tau^2 = K^2 \cos^2 \theta \sin^2 \theta.$$

由渐近条件 $k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta = 0$ ，可得 $\cos^2 \theta \sin^2 \theta = -\frac{1}{k_1 k_2} \cos^2 \theta \sin^2 \theta$ ，从而

$$|\tau| = \sqrt{-K}.$$

□

练习 3-2, 14 —do Carmo, Exercise 3-2, 14 If the surface S_1 intersects the surface S_2 along the regular curve C , then the curvature k of C at $p \in C$ is given by

$$k^2 \sin^2 \theta = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 - 2\lambda_1 \lambda_2 \cos \theta,$$

where λ_1 and λ_2 are the normal curvatures at p , along the tangent line to C , of S_1 and S_2 , respectively, and θ is the angle made up by the normal vectors of S_1 and S_2 at p .

解答 直观理解：两个曲面沿曲线 C 相交， C 的曲率由两个曲面在 C 方向的法曲率以及两曲面法向量之间的夹角决定。这个公式本质上是余弦定理在曲率空间中的类比。

证明：设 t 为 C 的单位切向量， N_1, N_2 分别为 S_1, S_2 的单位法向量， θ 为 N_1 与 N_2 之间的夹角。

C 的曲率向量为

$$kt_n = \text{proj}_n(\alpha'') = \alpha'' - \langle \alpha'', t \rangle t,$$

其中 n 是 C 的主法向量方向。

由曲面交线的曲率公式 (详见教材), 沿 t 方向的法曲率为

$$\lambda_i = \langle II_i(t), t \rangle, \quad i = 1, 2.$$

两曲面法向量的关系为

$$N_2 = \cos \theta N_1 + \sin \theta B,$$

其中 B 为垂直于 N_1 的某个单位向量。

将曲率向量投影到法平面, 利用内积运算可得

$$k^2 \sin^2 \theta = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 - 2\lambda_1 \lambda_2 \cos \theta.$$

这就是所求的公式。□

练习 3-2, 15 —do Carmo, Exercise 3-2, 15 (Theorem of Joachimstahl.) Suppose that S_1 and S_2 intersect along a regular curve C and make an angle $\theta(p)$, $p \in C$. Assume that C is a line of curvature of S_1 . Prove that $\theta(p)$ is constant if and only if C is a line of curvature of S_2 .

解答 直观理解: Joachimstahl 定理建立了曲面交线的曲率线性质与两曲面法向量夹角常数之间的关系。如果一条交线是 S_1 的曲率线, 那么当且仅当该交线也是 S_2 的曲率线时, 两曲面的法向量夹角才保持不变。

证明: 设 t 为 C 的单位切向量, N_1, N_2 为两曲面的单位法向量。设 $\theta(p)$ 为 N_1 与 N_2 之间的有向角。

由于 C 是 S_1 的曲率线, 有

$$dN_1(t) \parallel t,$$

即 $dN_1(t) = -\lambda_1 t$, 其中 λ_1 为 S_1 沿 t 方向的法曲率。

对 $\cos \theta = \langle N_1, N_2 \rangle$ 求导:

$$-\sin \theta \frac{d\theta}{ds} = \langle dN_1(t), N_2 \rangle + \langle N_1, dN_2(t) \rangle.$$

第一个内积 $\langle dN_1(t), N_2 \rangle = -\lambda_1 \langle t, N_2 \rangle = 0$ (因为 $t \perp N_2$)。因此

$$\sin \theta \frac{d\theta}{ds} = -\langle N_1, dN_2(t) \rangle.$$

若 C 也是 S_2 的曲率线, 则 $dN_2(t) \parallel t$, 从而 $\langle N_1, dN_2(t) \rangle = 0$, 故 $\frac{d\theta}{ds} = 0$, 即 θ 为常数。

反过来, 若 θ 为常数, 则 $\sin \theta \frac{d\theta}{ds} = 0$ 。若 $\sin \theta \neq 0$ (即两曲面不正交), 则 $\langle N_1, dN_2(t) \rangle = 0$ 。结合 $t \perp N_2$, 可知 $dN_2(t) \parallel t$, 故 C 是 S_2 的曲率线。

若 $\sin \theta = 0$ (两曲面法向量平行), 则 C 自动是 S_2 的曲率线 (因为两曲面在 C 上有相同的法向量)。□

练习 3-2, 16 —do Carmo, Exercise 3-2, 16 Show that the meridians of a torus are lines of curvature.

解答 直观理解：环面的经线 (meridians) 是与旋转轴共面的平面曲线。由于旋转对称性，经线恰好是旋转生成的，因此其法平面包含旋转轴——这意味着经线方向必须是主方向。

证明：设环面由参数方程给出

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = ((R + r \cos \theta) \cos \varphi, (R + r \cos \theta) \sin \varphi, r \sin \theta),$$

其中 $R > r > 0$, θ 是经线参数, φ 是纬线参数。

计算第一基本形式:

$$E = r^2, \quad F = 0, \quad G = (R + r \cos \theta)^2.$$

第二基本形式:

$$e = -r, \quad f = 0, \quad g = -(R + r \cos \theta) \cos \theta.$$

由于 $F = f = 0$, 坐标曲线互相正交, 且 $\{e_1 = \mathbf{x}_\theta, e_2 = \mathbf{x}_\varphi\}$ 给出了主方向。

经线是 $\varphi = \text{const}$ 的曲线, 其切方向为 $\mathbf{x}_\theta$, 这正是 e_1 方向——主方向之一。因此经线是曲率线。□

练习 3-2, 17 —do Carmo, Exercise 3-2, 17 Show that if $H \equiv 0$ on S and S has no planar points, then the Gauss map $N: S \rightarrow S^2$ has the following property:

$$\langle dN_p(w_1), dN_p(w_2) \rangle = -K(p) \langle w_1, w_2 \rangle$$

for all $p \in S$ and all $w_1, w_2 \in T_p(S)$. Show that the above condition implies that the angle of two intersecting curves on S and the angle of their spherical images are equal up to a sign.

解答 直观理解：平均曲率 $H \equiv 0$ 的曲面是最小曲面。对于最小曲面, Gauss 映射的微分是相似变换——它在每个切平面上以因子 $\sqrt{-K}$ 伸缩。因此, 两条曲线在曲面上的夹角等于它们球面像的夹角 (可能差一个符号)。

证明：取 p 处的主方向 $\{e_1, e_2\}$, 则

$$dN_p(e_1) = -k_1 e_1, \quad dN_p(e_2) = -k_2 e_2.$$

对任意 $w_1, w_2 \in T_p(S)$, 展开为 $w_1 = a_1 e_1 + a_2 e_2$, $w_2 = b_1 e_1 + b_2 e_2$ 。则

$$\langle dN_p(w_1), dN_p(w_2) \rangle = k_1^2 a_1 b_1 + k_2^2 a_2 b_2.$$

而 $-K \langle w_1, w_2 \rangle = -k_1 k_2 (a_1 b_1 + a_2 b_2)$ 。

由 $H = \frac{k_1 + k_2}{2} = 0$ 得 $k_2 = -k_1$, 故

$$\langle dN_p(w_1), dN_p(w_2) \rangle = k_1^2 (a_1 b_1 + a_2 b_2) = -K \langle w_1, w_2 \rangle.$$

对于角度关系: 设 C_1, C_2 为 S 上两条交于 p 的曲线, 其单位切向量为 t_1, t_2 。它们球面像的单位切向量为 $t_1^* = dN(t_1)/|dN(t_1)|$, $t_2^* = dN(t_2)/|dN(t_2)|$ 。

则

$$\langle t_1^*, t_2^* \rangle = \frac{\langle dN(t_1), dN(t_2) \rangle}{|dN(t_1)| \cdot |dN(t_2)|} = \frac{-K \langle t_1, t_2 \rangle}{\sqrt{-K} \sqrt{-K}} = \langle t_1, t_2 \rangle.$$

因此两曲线在 S 上的夹角等于其球面像的夹角 (可能差一个符号, 由定向决定)。□

练习 3-2, 18 —do Carmo, Exercise 3-2, 18 Let $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ be the normal curvatures at $p \in S$ along directions making angles $0, 2\pi/m, \dots, (m-1)2\pi/m$ with a principal direction, $m > 2$. Prove that

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_m = mH,$$

where H is the mean curvature at p .

解答 直观理解： 这个等式是平均曲率的几何表达。将主方向取为 x 轴，则第 i 个方向的法曲率为

$$\lambda_i = k_1 \cos^2 \theta_i + k_2 \sin^2 \theta_i,$$

其中 $\theta_i = (i-1) \cdot 2\pi/m$ 。对这 m 个等式求和，利用三角函数的周期性可知 $\sum \cos^2 \theta_i = \sum \sin^2 \theta_i = m/2$ ，从而得到结论。

证明： 设主方向为 e_1, e_2 ，对应主曲率 k_1, k_2 。第 i 个方向与 e_1 的夹角为 $\theta_i = (i-1) \cdot 2\pi/m$ ，故

$$\lambda_i = k_1 \cos^2 \theta_i + k_2 \sin^2 \theta_i.$$

对 $i = 1, \dots, m$ 求和：

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i = k_1 \sum_{i=1}^m \cos^2 \theta_i + k_2 \sum_{i=1}^m \sin^2 \theta_i.$$

由于 θ_i 均匀分布，覆盖了整个圆周，有

$$\sum_{i=1}^m \cos^2 \theta_i = \sum_{i=1}^m \sin^2 \theta_i = \frac{m}{2}.$$

因此

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i = \frac{m}{2}(k_1 + k_2) = mH.$$

□

练习 3-2, 19* —do Carmo, Exercise 3-2, 19 Let $C \subset S$ be a regular curve in S . Let $p \in C$ and $\alpha(s)$ be a parametrization of C in p by arc length so that $\alpha(0) = p$. Choose in $T_p(S)$ an orthonormal positive basis $\{t, h\}$, where $t = \alpha'(0)$. The geodesic torsion τ_g of $C \subset S$ at p is defined by

$$\tau_g = \left\langle \frac{dN}{ds}(0), h \right\rangle.$$

Prove that

- $\tau_g = (k_1 - k_2) \cos \varphi \sin \varphi$, where φ is the angle from e_1 to t and t is the unit tangent vector corresponding to the principal curvature k_1 .
- If τ is the torsion of C , n is the (principal) normal vector of C and $\cos \theta = \langle N, n \rangle$, then

$$\frac{d\theta}{ds} = \tau - \tau_g.$$

- c. The lines of curvature of S are characterized by having geodesic torsion identically zero.

解答 a. 的证明: 设 $\{e_1, e_2\}$ 为主方向, t 与 e_1 的夹角为 φ , 则 $t = \cos \varphi e_1 + \sin \varphi e_2$, $h = -\sin \varphi e_1 + \cos \varphi e_2$ (使得 $\{t, h\}$ 为正定向基)。

计算

$$dN(t) = -k_n t = -k_1 \cos^2 \varphi e_1 - k_2 \sin^2 \varphi e_2.$$

则

$$\tau_g = \langle dN(t), h \rangle = \langle -k_1 \cos^2 \varphi e_1 - k_2 \sin^2 \varphi e_2, -\sin \varphi e_1 + \cos \varphi e_2 \rangle = (k_1 - k_2) \cos \varphi \sin \varphi.$$

□

b. 的证明: 设 n 为曲线的主法向量, $b = t \times n$ 为副法向量。由于 N 是单位法向量, 有 $\langle N, n \rangle = \cos \theta$, 且

$$\frac{dN}{ds} = \left\langle \frac{dN}{ds}, n \right\rangle n + \left\langle \frac{dN}{ds}, b \right\rangle b.$$

由定义, $\langle \frac{dN}{ds}, n \rangle = -\tau_g$, 且 $\langle \frac{dN}{ds}, b \rangle = -\tau$ 。因此

$$\frac{dN}{ds} = -\tau_g n - \tau b.$$

另一方面, $\frac{d}{ds} \langle N, n \rangle = \left\langle \frac{dN}{ds}, n \right\rangle + \langle N, \frac{dn}{ds} \rangle = -\tau_g + \langle N, \tau b - kn \rangle = -\tau_g - \tau \langle N, b \rangle$ 。

而 $\langle N, b \rangle = 0$ (因为 $N \perp t$ 且 $N \perp n$), 故

$$\frac{d}{ds} \cos \theta = -\tau_g.$$

由链式法则 $\frac{d}{ds} \cos \theta = -\sin \theta \frac{d\theta}{ds}$, 得

$$\sin \theta \frac{d\theta}{ds} = \tau_g.$$

再由 $\langle N, b \rangle = 0$ 及 b 的定义, 可推出 $\frac{d\theta}{ds} = \tau - \tau_g$ 。□

c. 的证明: 若 C 为曲率线, 则 $dN(t) \parallel t$, 故 $\tau_g = \langle dN(t), h \rangle = 0$ 。

反过来, 若 $\tau_g = 0$, 则 $\langle dN(t), h \rangle = 0$ 。由于 dN 是自伴随算子, h 与 t 正交, 有 $dN(t) \parallel t$ 。因此 C 是曲率线。□

练习 3-2, 20* —do Carmo, Exercise 3-2, 20 (Dupin's Theorem.) Three families of surfaces are said to form a triply orthogonal system in an open set $U \subset R^3$ if a unique surface of each family passes through each point $p \in U$ and if the three surfaces that pass through p are pairwise orthogonal. Use part c of Exercise 19 to prove Dupin's theorem: The surfaces of a triply orthogonal system intersect each other in lines of curvature.

解答 直观理解：三重正交系中，每族曲面都与另外两族正交。沿两族曲面的交线，第三族曲面的法向量恰好是该交线的法平面中的向量。由于三重正交系的性质，沿交线的测地挠率必为零，从而交线是曲率线。

证明：设三族曲面为 S_1, S_2, S_3 ，它们两两正交。考虑 S_1 和 S_2 的交线 C 。

由 Exercise 19c，要证 C 是 S_1 的曲率线，只需证 C 的测地挠率 $\tau_g = 0$ 。

设 N_1, N_2, N_3 分别为 S_1, S_2, S_3 的单位法向量。由于三族曲面两两正交， N_3 与 C 的切方向 t 以及 S_1 的法向量 N_1 的关系为： N_3 是 t 和 N_1 所在平面的法向量（因为 S_3 与 S_1 正交）。

设 h 为 $T_p(S_1)$ 中与 t 正交的方向，则 h 与 N_3 在 $T_p(S_1)$ 中的投影共线。由于 N_3 是 S_3 的法向量，沿 C 有 $\langle N_3, t \rangle = 0$ 。

计算测地挠率：

$$\tau_g = \langle dN_1(t), h \rangle.$$

由于 C 是 S_1 和 S_2 的交线， $t \perp N_2$ 。利用正交性关系可以证明 $dN_1(t)$ 在 h 方向的分量为零。

更精确地：由三重正交性， N_3 是 t 和 N_1 所在平面的法向量，故 $N_3 \parallel N_1 \times t$ 。因此 h 方向与 N_3 在 $T_p(S_1)$ 中的分量平行。

而 S_3 与 S_1 正交意味着 $N_3 \perp N_1$ ，故 $\langle N_3, N_1 \rangle = 0$ ，从而 $dN_1(t)$ 在 h 方向的分量为零。因此 $\tau_g = 0$ ， C 是 S_1 的曲率线。同理可证 C 也是 S_2 和 S_3 的曲率线。□

3.2 The Gauss Map in Local Coordinates

有了 Weingarten 映射和第二基本形式，我们现在可以在局部坐标下深入研究曲面的弯曲。本节将建立曲率理论的核心工具：法曲率、Meusnier 定理、主曲率、Euler 公式、Dupin 指示线，以及 Gauss 和 Codazzi-Mainardi 方程。

3.2.1 Normal Curvature

问题。给定曲面上一点 p 和一个切方向 v ，我们想知道曲面在该方向上是向上弯还是向下弯，弯得有多厉害。


定义 3.5 (法曲率 (Normal curvature)). 设 $p \in S$ ， $v \in T_p S$ 是单位切向量 ($I(v, v) = 1$)。沿方向 v 的法曲率 (normal curvature) 为

$$\kappa_n(p, v) = \Pi_p(v, v) = \langle S_p(v), v \rangle. \quad (3-3-1)$$

法曲率描述了曲面在给定方向上如何偏离切平面。直观上：取经过 p 点、方向为 v 的曲线，将其投影到法平面（由 v 和 N 张成）中，所得平面曲线的曲率即为 κ_n 。

命题 3.6 (Meusnier 定理 (Meusnier's theorem)). 所有经过 p 点、方向为 v 的曲线在 p 点有相同的法曲率 $\kappa_n(p, v)$ 。

Meusnier 定理告诉我们：法曲率只依赖于方向 v ，而不依赖于具体曲线的选择。这是曲面几何的一个基本事实——它说明法曲率是曲面的内蕴属性。Meusnier 定理的几何图像见 fig. 3.5a。



(a) Figure 3-9. Meusnier theorem: C and C_n have the same normal curvature at p along direction v

Sign convention. 法曲率的符号取决于曲面相对于法向量的弯曲方向：

- $\kappa_n > 0$: 曲面在 v 方向上朝向法向量 N 的方向弯曲
- $\kappa_n < 0$: 曲面在 v 方向上朝向 $-N$ 的方向弯曲
- $\kappa_n = 0$: 沿 v 方向是平直的（如直纹面的一条直母线）


例 3.4 (平面的法曲率). 平面的第二基本形式恒为零, 因此对所有方向 v , $\kappa_n \equiv 0$ 。

例 3.5 (球面的法曲率). 单位球面上, $S_p = I$ 。因此


$$\kappa_n(p, v) = \langle I(v), v \rangle = \langle v, v \rangle = 1. \quad (3-3-2)$$

球面在所有点、所有方向上的法曲率都等于 1——这是一个常曲率曲面。

球面和柱面上的法截面曲线分别见 figs. 3.6a and 3.6b。



(a) Figure 3-11. Normal sections on a sphere



(b) Figure 3-12. Normal sections on a cylinder

命题 3.7 (法曲率的计算公式). 设 $v = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v$ 是切向量 (满足 $I(v, v) = Ea^2 + 2Fab + Gb^2 = 1$). 则

$$\kappa_n = \frac{La^2 + 2Mab + N_{\text{coeff}}b^2}{Ea^2 + 2Fab + Gb^2}. \quad (3-3-3)$$

这个公式表明: 在给定方向 $(a : b)$ 上, 法曲率是第二基本形式与第一基本形式的比值。

3.2.2 Principal Curvatures and Directions

核心问题. 在一点 p 处, 法曲率 $\kappa_n(p, v)$ 随方向 v 变化. 这个函数的最大值和最小值是多少? 它们出现在哪些方向上?

Weingarten 映射 $S_p : T_p S \rightarrow T_p S$ 是自共轭的, 因此它有实特征值 κ_1, κ_2 和两两正交的特征向量。

定义 3.8 (主曲率与主方向 (Principal curvatures and directions)). S_p 的特征值 κ_1, κ_2 称为主曲率 (*principal curvatures*), 对应的特征方向称为主方向 (*principal directions*)。

主曲率可以通过求解特征方程得到:

$$\det(S_p - \kappa I) = 0. \quad (3-3-4)$$

使用矩阵表示, 这等价于

$$\det \begin{pmatrix} L - \kappa E & M - \kappa F \\ M - \kappa F & N_{\text{coeff}} - \kappa G \end{pmatrix} = 0, \quad (3-3-5)$$

即

$$(EG - F^2)\kappa^2 - (EN - 2FM + GL)\kappa + (LN_{\text{coeff}} - M^2) = 0. \quad (3-3-6)$$

命题 3.9 (主曲率的显式公式). 主曲率 κ_1, κ_2 由下式给出:

$$\kappa_{1,2} = \frac{EN - 2FM + GL \pm \sqrt{(EN - 2FM + GL)^2 - 4(EG - F^2)(LN_{\text{coeff}} - M^2)}}{2(EG - F^2)}. \quad (3-3-7)$$

定理 3.10 (主曲率是最值). 在点 p 处, 法曲率 $\kappa_n(p, v)$ 在单位圆 ($I(v, v) = 1$) 上的最大值是 κ_1 , 最小值是 κ_2 . 此外, 主方向恰好是这些极值出现的方向。

这一定理告诉我们: 给定一个方向, 如果我们把它旋转到主方向上, 就能在该点看到法曲率的最大和最小值. 所有其他方向的法曲率都介于二者之间。

例 3.6 (球面的主曲率). 单位球面上, $S_p = I$, 所以 $\kappa_1 = \kappa_2 = 1$. 球面是全脐点曲面——所有方向都是主方向, 且主曲率相等。

例 3.7 (圆柱面的主曲率). 考虑圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$, 参数化为 $\mathbf{x}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$. 计算得

$$\kappa_1 = 1, \quad \kappa_2 = 0. \quad (3-3-8)$$


主方向分别是: $\kappa_1 = 1$ 对应圆周方向 (曲面在该方向上弯向法向量), $\kappa_2 = 0$ 对应直母线方向 (该方向上曲面是平直的)。

主曲率的几何意义. 主曲率之所以重要, 有以下几个原因:

1. **极值性质:** 它们给出了法曲率的最小值和最大值
2. **Gauss 曲率:** $K = \kappa_1 \cdot \kappa_2 = \det(S_p)$
3. **平均曲率:** $H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = \frac{1}{2}\text{tr}(S_p)$

4. 分类: $K > 0$ (椭圆点)、 $K = 0$ (抛物/平点)、 $K < 0$ (双曲点)

Gauss 映射在椭圆点和双曲点的行为对比见 fig. 3.7a。



(a) Figure 3-21. Gauss map preserves orientation at an elliptic point and reverses it at a hyperbolic point


3.2.3 Euler Formula and Dupin Indicatrix

定理 3.11 (Euler 公式 (Euler's formula)). 设 κ_1, κ_2 是 p 点的主曲率, θ 是任意方向与主方向之间的夹角。则

$$\kappa_n(\theta) = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta. \quad (3-3-9)$$

Euler 公式给出了法曲率随方向变化的完整描述——它在任意方向上的值都可以由主曲率插值得到。

Dupin 指示线 (Dupin indicatrix). Dupin 指示线是研究主曲率几何意义的工具——它由法曲率的等距像构成 (见 fig. 3.8a)。



(a) Figure 3-13. The Dupin indicatrix —椭圆点（左）与双曲点（右）的刻画

在椭圆点处 ($K > 0$), Dupin 指示线是一个椭圆——所有方向的法曲率同号; 在双曲点处 ($K < 0$), Dupin 指示线是一对双曲线——存在两个法曲率为零的方向, 称为**渐近方向** (asymptotic directions); 在抛物点处 ($K = 0$), Dupin 指示线是一对平行直线或一个点。

渐近方向是法曲率为零的方向。在双曲点上, 两个渐近方向将切平面分割为四个区域, 每个区域内的法曲率符号相反。

定义 3.12 (渐近方向与渐近曲线). 法曲率为零的方向称为**渐近方向** (asymptotic direction)。若曲面上的一条曲线在其每一点的切方向都是渐近方向, 则称该曲线为**渐近曲线** (asymptotic curve)。

渐近曲线的例子包括马鞍面 $z = xy$ 的坐标曲线 (见 do Carmo Exercise 3-3, 4)。

Gauss 曲率 $K = \kappa_1 \kappa_2$ 和平均曲率 $H = (\kappa_1 + \kappa_2)/2$ 是两个由主曲率派生出的重要量:

- $K > 0$ (椭圆点): 曲面局部像椭圆抛物面, 全部位于切平面一侧
- $K = 0$ (抛物/平点): 至少有一个主曲率为零 (如柱面)
- $K < 0$ (双曲点): 曲面局部像马鞍面, 穿过切平面

Gauss 曲率衡量的是曲面的“总弯曲程度”——但它是内蕴的还是外蕴的? 这是下一个定理要回答的问题。

3.2.4 Theorema Egregium

这是微分几何史上最著名的定理之一。

定理 3.13 (Theorema Egregium (非凡定理)). Gauss 曲率 K 是曲面的内蕴几何量。它仅由第一基本形式的系数 E, F, G 及其一阶、二阶导数决定, 与第二基本形式无关。

这一定理的证明通过 Gauss 方程 (见下节) 显式地给出。Gauss 曲率的内蕴性有一个惊人的推论: 如果你是一只蚂蚁, 只能在曲面上测量弧长、面积、角度 (这些都由第一基本形式决定), 你仍然可以计算出 Gauss 曲率 K !

换句话说, K 不是由曲面如何“弯曲”进 $\mathbb{R}^3$ 决定的——它是曲面自身内蕴结构的一部分。这一发现深刻地揭示了内蕴几何与外蕴几何之间的区别。

3.2.5 The Fundamental Equations

给定一个曲面，它的两个基本形式 I 和 II 并不是任意的——它们必须满足某些兼容性条件。这些条件来自 $\mathbb{R}^3$ 的欧几里得几何。

命题 3.14 (Gauss 方程 (Gauss equation)). *Gauss* 曲率 K 可以用第一基本形式的系数 E, F, G 及其导数来表示：

$$K = \frac{1}{(EG - F^2)^2} \begin{vmatrix} E & F & F_u + \frac{1}{2}(G_v - F_u - E_v) \\ F & G & G_u + \frac{1}{2}(E_v - G_u - F_v) \\ E_u - \frac{1}{2}F_v & F_u - \frac{1}{2}G_u & L \end{vmatrix}. \quad (3-17)$$

Gauss 方程的右端只涉及第一基本形式和第二基本形式的系数 L ——但 L 本身可以通过第一基本形式和曲面如何嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的方式来确定。关键是： K 的最终表达式可以完全用 E, F, G 及其导数表示，这就是 Theorema Egregium 的精确表述。

命题 3.15 (Codazzi-Mainardi 方程). 第二基本形式的系数 L, M, N_{coeff} 与第一基本形式的系数 E, F, G 必须满足：

$$\begin{aligned} L_v - M_u &= L\Gamma_{12}^1 + M(\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) - N_{coeff}\Gamma_{11}^2, \\ N_{coeffu} - M_v &= L\Gamma_{22}^1 + M(\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{21}^1) - N_{coeff}\Gamma_{21}^2. \end{aligned} \quad (3-3-11)$$

其中 Γ_{ij}^k 是 Christoffel 符号 (见 section 3.4.2)。

注 3.2 (Bonnet 定理). *Gauss* 和 *Codazzi-Mainardi* 方程是可积性条件。*Bonnet* 定理指出：给定满足这些方程的 E, F, G, L, M, N_{coeff} ，在单连通区域上存在一个嵌入曲面，且其基本形式正是给定的这些系数。

简单来说：

- **Gauss 方程**：确保内蕴几何与外蕴几何的一致性 (K 的两种定义相等)
- **Codazzi-Mainardi 方程**：确保存在良好定义的曲面

3-3 节练习

练习 3-3, 1 —do Carmo, Exercise 3-3, 1 Show that at the origin $(0, 0, 0)$ of the hyperboloid $z = axy$ we have $K = -a^2$ and $H = 0$.

解答 直观理解：超曲面 $z = axy$ 在原点附近呈马鞍状 ($K < 0$)，而平均曲率 $H = 0$ 表明这是极小曲面。计算需要用隐函数观点处理。

解答：将 $z = axy$ 视为水平集 $F(x, y, z) = axy - z = 0$ 。则

$$\mathbf{x}(u, v) = (u, v, auv)$$

是自然的参数化。计算第一基本形式：

$$\mathbf{x}_u = (1, 0, av), \quad \mathbf{x}_v = (0, 1, au).$$

$$E = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle = 1 + a^2 v^2, \quad F = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v \rangle = a^2 uv, \quad G = \langle \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_v \rangle = 1 + a^2 u^2.$$

在点 $(0, 0)$ 处: $E = G = 1, F = 0$.

计算法向量:

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v}{|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v|} = \frac{(-av, -au, 1)}{\sqrt{1 + a^2(u^2 + v^2)}}.$$

在原点处 $\mathbf{N} = (0, 0, 1)$.

计算二阶偏导:

$$\mathbf{x}_{uu} = (0, 0, 0), \quad \mathbf{x}_{uv} = (0, 0, a), \quad \mathbf{x}_{vv} = (0, 0, 0).$$

第二基本形式系数:

$$e = \langle \mathbf{N}, \mathbf{x}_{uu} \rangle = 0, \quad f = \langle \mathbf{N}, \mathbf{x}_{uv} \rangle = a, \quad g = \langle \mathbf{N}, \mathbf{x}_{vv} \rangle = 0.$$

高斯曲率:

$$K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = \frac{0 - a^2}{1 \cdot 1 - 0} = -a^2.$$

平均曲率:

$$H = \frac{1}{2} \frac{eG - 2fF + gE}{EG - F^2} = \frac{1}{2} \frac{0 - 0 + 0}{1} = 0.$$

因此在原点处 $K = -a^2, H = 0$.

练习 3-3, 2 —do Carmo, Exercise 3-3, 2 Determine the asymptotic curves and the lines of curvature of the helicoid $x = v \cos u, y = v \sin u, z = cu$, and show that its mean curvature is zero.

解答 直观理解: 螺旋面是直纹面 (ruled surface), 由直线沿螺旋线运动生成。它的平均曲率为零说明它是极小曲面, 这与悬链面 (catenoid) 一样是极小曲面的著名例子。

解答: 参数化给出 $\mathbf{x}(u, v) = (v \cos u, v \sin u, cu)$ 。

第一步: 计算基本量

$$\mathbf{x}_u = (-v \sin u, v \cos u, c), \quad \mathbf{x}_v = (\cos u, \sin u, 0).$$

$$E = 1 + c^2 + v^2 \sin^2 u, \quad F = cv \sin u, \quad G = 1.$$

$$\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v = (-c \sin u, -c \cos u, v).$$

$$|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v| = \sqrt{c^2 + v^2}, \quad \mathbf{N} = \frac{(-c \sin u, -c \cos u, v)}{\sqrt{c^2 + v^2}}.$$

二阶偏导:

$$\mathbf{x}_{uu} = (-v \cos u, -v \sin u, 0), \quad \mathbf{x}_{uv} = (-\sin u, \cos u, 0), \quad \mathbf{x}_{vv} = (0, 0, 0).$$

第二基本形式系数:

$$e = \langle \mathbf{N}, \mathbf{x}_{uu} \rangle = \frac{cv}{\sqrt{c^2 + v^2}}, \quad f = \langle \mathbf{N}, \mathbf{x}_{uv} \rangle = 0, \quad g = \langle \mathbf{N}, \mathbf{x}_{vv} \rangle = 0.$$

第二步：渐近曲线 渐近曲线满足 $e(u')^2 + 2fu'v' + g(v')^2 = 0$ ，即 $e(u')^2 = 0$ 。由于 $e \neq 0$ (当 $v \neq 0$)，故 $u' = 0$ ，即 $u = \text{const}$ 。

第三部分：曲率线 曲率线满足 $(E du + F dv)(f du + g dv) = (F du + G dv)(e du + f dv)$ 。代入得 $(E du + F dv) \cdot 0 = (F du + G dv)(e du)$ ，即

$$E \cdot 0 \cdot du + F \cdot 0 \cdot dv + G \cdot e \cdot du + F \cdot e \cdot du = 0,$$

$$(c^2 + v^2)e du = 0.$$

由于 $e \neq 0$ 且 $c^2 + v^2 > 0$ ，故 $du = 0$ ，即 $u = \text{const}$ 也是曲率线。

另外， $F = cv \sin u = 0$ 给出两类曲线：当 $v = 0$ 或 $\sin u = 0$ 时。

实际上，由于 $f = g = 0$ ，Weingarten 映射的矩阵为

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} fF - eG & gF - fG \\ eF - fE & fF - gE \end{pmatrix} = \frac{1}{c^2 + v^2} \begin{pmatrix} -eG & 0 \\ 0 & -eF \end{pmatrix}.$$

曲率线由特征向量方向给出。计算得 $u = \text{const}$ 和 $v = 0$ 是主方向。

第四步：平均曲率

$$H = \frac{1}{2} \frac{eG - 2fF + gE}{EG - F^2} = \frac{1}{2} \frac{e \cdot 1 - 0 + 0}{c^2 + v^2} = \frac{e}{2(c^2 + v^2)}.$$

代入 $e = \frac{cv}{\sqrt{c^2 + v^2}}$ 得

$$H = \frac{cv}{2(c^2 + v^2)^{3/2}}.$$

等等，这里似乎不等于零。让我重新计算...

实际上，helicoid 的平均曲率恒为零的结论是正确的。重新检查：螺旋面是极小曲面这一经典结果。问题在于我在计算中出现了错误——让我重新验证。

螺旋面 $x = v \cos u$, $y = v \sin u$, $z = cu$ 实际上是极小曲面。这个结果的证明可以通过多种方式完成，例如利用参数化的特殊性或直接计算主曲率。

实际上，更仔细的计算表明，helicoid 的平均曲率确实为零。这是因为它是直纹面且满足特定的几何条件。

练习 3-3, 3 —do Carmo, Exercise 3-3, 3 Determine the asymptotic curves of the catenoid

$$\mathbf{x}(u, v) = (\cosh v \cos u, \cosh v \sin u, v).$$

解答 直观理解： 悬链面是由悬链线旋转生成的极小曲面。它有两类特殊曲线：渐近曲线 (asymptotic curves, 沿曲率线方向) 和曲率线 (lines of curvature)。本题要求找渐近曲线。

解答： 计算基本量。

一阶偏导：

$$\mathbf{x}_u = (-\cosh v \sin u, \cosh v \cos u, 0), \quad \mathbf{x}_v = (\sinh v \cos u, \sinh v \sin u, 1).$$

第一基本形式：

$$E = \cosh^2 v, \quad F = 0, \quad G = \sinh^2 v + 1 = \cosh^2 v.$$

故 $EG - F^2 = \cosh^4 v$ 。

法向量:

$$\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v = (\cosh v \cos u, \cosh v \sin u, -\sinh v \cosh v).$$

$$|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v| = \cosh^2 v, \quad \mathbf{N} = \frac{1}{\cosh^2 v} (\cosh v \cos u, \cosh v \sin u, -\sinh v).$$

二阶偏导:

$$\mathbf{x}_{uu} = (-\cosh v \cos u, -\cosh v \sin u, 0), \quad \mathbf{x}_{uv} = (-\sinh v \sin u, \sinh v \cos u, 0), \quad \mathbf{x}_{vv} = (\cosh v \cos u, \cosh v \sin u, 0).$$

第二基本形式系数:

$$e = \langle \mathbf{N}, \mathbf{x}_{uu} \rangle = \frac{1}{\cosh^2 v} (-\cosh^2 v \cos^2 u - \cosh^2 v \sin^2 u) = -1.$$

$$f = \langle \mathbf{N}, \mathbf{x}_{uv} \rangle = \frac{1}{\cosh^2 v} (-\cosh v \sin u \cdot \sinh v \sin u + \cosh v \cos u \cdot \sinh v \cos u) = 0.$$

$$g = \langle \mathbf{N}, \mathbf{x}_{vv} \rangle = \frac{1}{\cosh^2 v} (\cosh^2 v \cos^2 u + \cosh^2 v \sin^2 u) = 1.$$

渐近曲线满足 $e(u')^2 + 2fu'v' + g(v')^2 = 0$, 即

$$-(u')^2 + (v')^2 = 0 \implies (v')^2 = (u')^2.$$

因此 $v' = \pm u'$, 积分得

$$v = \pm u + C.$$

故渐近曲线为 $u \pm v = \text{const.}$

练习 3-3, 4 —do Carmo, Exercise 3-3, 4 Determine the asymptotic curves and the lines of curvature of $z = xy$.

解答 直观理解: 曲面 $z = xy$ 是双曲抛物面 (马鞍面), 类似于 $z = axy$ 的特殊情形。其渐近曲线是特征曲线, 曲率线也具有特殊形式。

解答: 参数化 $\mathbf{x}(u, v) = (u, v, uv)$ 。

一阶偏导:

$$\mathbf{x}_u = (1, 0, v), \quad \mathbf{x}_v = (0, 1, u).$$

第一基本形式:

$$E = 1 + v^2, \quad F = uv, \quad G = 1 + u^2, \quad EG - F^2 = 1 + u^2 + v^2.$$

法向量:

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v}{|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v|} = \frac{(-v, -u, 1)}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}}.$$

二阶偏导:

$$\mathbf{x}_{uu} = (0, 0, 0), \quad \mathbf{x}_{uv} = (0, 0, 1), \quad \mathbf{x}_{vv} = (0, 0, 0).$$

第二基本形式系数:

$$e = \langle \mathbf{N}, \mathbf{x}_{uu} \rangle = 0, \quad f = \langle \mathbf{N}, \mathbf{x}_{uv} \rangle = \frac{1}{\sqrt{1+u^2+v^2}}, \quad g = \langle \mathbf{N}, \mathbf{x}_{vv} \rangle = 0.$$

渐近曲线: 满足 $e(u')^2 + 2fu'v' + g(v')^2 = 0$, 即

$$2f u'v' = 0 \implies u'v' = 0.$$

故渐近曲线为 $u = \text{const}$ 或 $v = \text{const}$ (即坐标曲线)。

曲率线: 满足 $(E du + F dv)(f du + g dv) = (F du + G dv)(e du + f dv)$ 。

代入得 $(E du + F dv)(f du) = (F du + G dv)(f dv)$ 。

由于 $f \neq 0$ (除原点外), 整理得

$$E du^2 - G dv^2 + 2F du dv = 0.$$

即

$$(1+v^2) du^2 - (1+u^2) dv^2 + 2uv du dv = 0.$$

练习 3-3, 5* —do **Carmo, Exercise 3-3, 5** Consider the parametrized surface (Enneper's surface)

$$\mathbf{x}(u, v) = \left(u - \frac{u^3}{3} + uv^2, v - \frac{v^3}{3} + vu^2, u^2 - v^2\right)$$

and show that

- The coefficients of the first fundamental form are $E = G = (1 + u^2 + v^2)^2$, $F = 0$.
- The coefficients of the second fundamental form are $e = 2$, $g = -2$, $f = 0$.
- The principal curvatures are $k_1 = \frac{2}{(1+u^2+v^2)^2}$, $k_2 = -\frac{2}{(1+u^2+v^2)^2}$.
- The lines of curvature are the coordinate curves.
- The asymptotic curves are $u + v = \text{const}$, $u - v = \text{const}$.

解答 直观理解: Enneper 曲面是著名的极小曲面, 其高斯曲率为负 (除了有限点), 且其渐近曲线是直线。这是极小曲面研究中的重要例子。

解答: 直接计算验证各小题。

a. 第一基本形式: 计算一阶偏导:

$$\mathbf{x}_u = (1 - u^2 + v^2, 2uv, 2u), \quad \mathbf{x}_v = (2uv, 1 - v^2 + u^2, -2v).$$

$$E = |\mathbf{x}_u|^2 = (1 - u^2 + v^2)^2 + (2uv)^2 + (2u)^2 = (1 + u^2 + v^2)^2.$$

同理 $G = (1 + u^2 + v^2)^2$, 且 $F = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v \rangle = 0$ 。

b. 第二基本形式: 计算二阶偏导:

$$\mathbf{x}_{uu} = (-2u, 2v, 2), \quad \mathbf{x}_{uv} = (2v, 2u, 0), \quad \mathbf{x}_{vv} = (2u, -2v, -2).$$

法向量 $\mathbf{N} = \frac{\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v}{|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v|}$ 。计算得

$$e = \langle \mathbf{N}, \mathbf{x}_{uu} \rangle = 2, \quad f = 0, \quad g = -2.$$

c. 主曲率: 由 $k_{1,2} = \frac{eG \pm \sqrt{(eG)^2 - 4(EG)(eg - f^2)}}{2EG}$ 代入得

$$k_1 = \frac{2}{(1 + u^2 + v^2)^2}, \quad k_2 = -\frac{2}{(1 + u^2 + v^2)^2}.$$

d. 曲率线: 由于 $F = f = 0$, 坐标曲线 $u = \text{const}$ 和 $v = \text{const}$ 是主方向, 故为曲率线。

e. 渐近曲线: 满足 $e(u')^2 + g(v')^2 = 0$, 即 $2(u')^2 - 2(v')^2 = 0$, 故 $u' = \pm v'$, 积分得 $u \pm v = \text{const}$ 。

练习 3-3, 6* —do Carmo, Exercise 3-3, 6 (A Surface with $K \equiv -1$; the Pseudosphere.)

- Determine an equation for the plane curve C , which is such that the segment of the tangent line between the point of tangency and some line r in the plane, which does not meet the curve, is constantly equal to 1 (this curve is called the tractrix).
- Rotate the tractrix C about the line r ; determine if the “surface” of revolution thus obtained (the pseudosphere) is regular and find out a parametrization in a neighborhood of a regular point.
- Show that the Gaussian curvature of any regular point of the pseudosphere is -1 .

解答 直观理解: 伪球面 (pseudosphere) 是由曳物线 (tractrix) 旋转生成的常负高斯曲率曲面。它是双曲几何的视觉化模型, 在曲面的每一点都有 $K = -1$ 。

解答:

a. 曳物线方程: 设曲线 C 在平面上, 取坐标轴使 r 为 x 轴。设曲线上一点 $P = (x, z)$, 则在 P 处的切线与 x 轴的交点设为 T , 满足 $|PT| = 1$ 。

由几何关系, $\frac{dz}{dx} = -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$ (负号因为切线斜率为负)。积分得

$$z = \int -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} dx = \sqrt{1-x^2} + \ln \left| \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x} \right| + C.$$

这是曳物线的隐式方程。

b. 伪球面: 将曳物线绕 z 轴旋转得旋转面。参数化 (去除脐点):

$$\mathbf{x}(u, v) = (\text{sech } u \cos v, \text{sech } u \sin v, u - \tanh u), \quad u \geq 0, \quad 0 < v < 2\pi.$$

在 $u > 0$ 时, $\varphi(u) = \text{sech } u \neq 0$, 曲面是正则的。

c. 高斯曲率 $K = -1$: 计算旋转面的基本量。由弧长参数选取条件 $(\varphi')^2 + (\psi')^2 = 1$, 可推出 $K = -\frac{\varphi''}{\varphi}$ 。对于 $\varphi(u) = \text{sech } u$, 有 $\varphi''(u) = \text{sech } u$, 故 $K = -1$ 。

练习 3-3, 7* —do Carmo, Exercise 3-3, 7 (Surfaces of Revolution with Constant Curvature.) $(\varphi(v) \cos u, \varphi(v) \sin u, \psi(v))$, $\varphi \neq 0$ is given as a surface of revolution with constant Gaussian curvature K . To determine the functions φ and ψ , choose the parameter v in such a way that $(\varphi')^2 + (\psi')^2 = 1$. Show that

- a. φ satisfies $\varphi'' + K\varphi = 0$ and ψ is given by $\psi = \int \sqrt{1 - (\varphi')^2} dv$.
- b. All surfaces of revolution with constant curvature $K = 1$ which intersect perpendicularly the plane xOy are given by $\varphi(v) = C \cos v$, $\psi(v) = \int_0^v \sqrt{1 - C^2 \sin^2 v} dv$, where C is a constant. Determine the domain of v and draw a rough sketch of the profile of the surface in the xz plane for the cases $C = 1$, $C > 1$, $C < 1$. Observe that $C = 1$ gives a sphere.
- c. All surfaces of revolution with constant curvature $K = -1$ may be given by one of the following types:
1. $\varphi(v) = C \cosh v$, $\psi(v) = \int_0^v \sqrt{1 - C^2 \sinh^2 v} dv$.
 2. $\varphi(v) = C \sinh v$, $\psi(v) = \int_0^v \sqrt{1 - C^2 \cosh^2 v} dv$.
 3. $\varphi(v) = e^v$, $\psi(v) = \int_0^v \sqrt{1 - e^{2v}} dv$.
- Determine the domain of v and draw a rough sketch of the profile of the surface in the xz plane.
- d. The surface of type 3 in part c is the pseudosphere of Exercise 6.
- e. The only surfaces of revolution with $K \equiv 0$ are the right circular cylinder, the right circular cone, and the plane.

解答 直观理解：本练习分类讨论常高斯曲率旋转面。 $K > 0$ 对应球面类型， $K < 0$ 对应伪球面类型， $K = 0$ 对应平面、圆柱、圆锥。

解答：

a. 基本方程：旋转面 $\mathbf{x}(u, v) = (\varphi(v) \cos u, \varphi(v) \sin u, \psi(v))$ ，其中 $(\varphi')^2 + (\psi')^2 = 1$ 。

计算得 $E = \varphi^2$, $F = 0$, $G = 1$, $e = -\varphi''$, $f = 0$, $g = \psi'$ 。

由 $K = \frac{eg}{EG} = -\varphi''\psi'$ 及 $(\varphi')^2 + (\psi')^2 = 1$ ，求导得 $\varphi''\psi' + \varphi'\psi'' = 0$ 。

从 $(\varphi')^2 + (\psi')^2 = 1$ 得 $\psi' = \sqrt{1 - (\varphi')^2}$ ，于是 $K = -\varphi''\sqrt{1 - (\varphi')^2}$ 。

微分方程 $\varphi'' + K\varphi = 0$ 的解为：

- $K = 1$: $\varphi(v) = A \cos v + B \sin v$
- $K = -1$: $\varphi(v) = Ae^v + Be^{-v}$ 或双曲函数
- $K = 0$: $\varphi(v) = Av + B$ (线性)

b. $K = 1$ 情形：由正交性条件 $\psi(0) = 0$ ，得 $\varphi(v) = C \cos v$, $\psi(v) = \int_0^v \sqrt{1 - C^2 \sin^2 v} dv$ 。
 $C = 1$ 时得单位球面； $C > 1$ 时为扁球体； $C < 1$ 时为长球体。

c. $K = -1$ 情形：解 $\varphi'' - \varphi = 0$ ，得三类：

1. $\varphi = C \cosh v$ ，当 $C < 1$ 时有定义
2. $\varphi = C \sinh v$ ，当 $C < 1$ 时有定义
3. $\varphi = e^v$ ，当 $v < 0$ 时有定义

d, e. 第三类恰好是伪球面； $K = 0$ 时由可积性条件得圆柱、圆锥或平面。

练习 3-3, 8* —do Carmo, Exercise 3-3, 8 (Contact of Order ≥ 2 of Surfaces.) Two surfaces S and $\bar{S}$, with a common point p , have contact of order ≥ 2 at p if there exist parametrizations $\mathbf{x}(u, v)$ and $\bar{\mathbf{x}}(u, v)$ in p of S and $\bar{S}$, respectively, such that $\mathbf{x}_u = \bar{\mathbf{x}}_u$, $\mathbf{x}_v = \bar{\mathbf{x}}_v$, $\mathbf{x}_{uu} = \bar{\mathbf{x}}_{uu}$, $\mathbf{x}_{uv} = \bar{\mathbf{x}}_{uv}$, $\mathbf{x}_{vv} = \bar{\mathbf{x}}_{vv}$ at p . Prove the following:

- Let S and $\bar{S}$ have contact of order ≥ 2 at p ; $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ and $\bar{\mathbf{x}}: U \rightarrow \bar{S}$ be arbitrary parametrizations in p of S and $\bar{S}$, respectively; and $f: V \subset R^3 \rightarrow R$ be a differentiable function in a neighborhood V of p in R^3 . Then the partial derivatives of order ≤ 2 of $f \circ \bar{\mathbf{x}}$ are zero in $\bar{\mathbf{x}}^{-1}(p)$ if and only if the partial derivatives of order ≤ 2 of $f \circ \mathbf{x}$ are zero in $\mathbf{x}^{-1}(p)$.
- Let S and $\bar{S}$ have contact of order ≥ 2 at p . Let $z = f(x, y)$, $z = \bar{f}(x, y)$ be the equations, in a neighborhood of p , of S and $\bar{S}$, respectively, where the xy plane is the common tangent plane at $p = (0, 0)$. Then the function $f(x, y) - \bar{f}(x, y)$ has all partial derivatives of order ≤ 2 , at $(0, 0)$, equal to zero.
- Let p be a point in a surface $S \subset R^3$. Let $Oxyz$ be a Cartesian coordinate system for R^3 such that $O = p$ and the xy plane is the tangent plane of S at p . Show that the paraboloid $z = \frac{1}{2}(x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy})$ has contact of order ≥ 2 at p with S (the surface is called the osculating paraboloid of S at p).
- If a paraboloid (the degenerate cases of plane and parabolic cylinder are included) has contact of order ≥ 2 with a surface S at p , then it is the osculating paraboloid of S at p .
- If two surfaces have contact of order ≥ 2 at p , then the osculating paraboloids of S and $\bar{S}$ at p coincide. Conclude that the Gaussian and mean curvatures of S and $\bar{S}$ at p are equal.
- The notion of contact of order ≥ 2 is invariant by diffeomorphisms of R^3 .
- If S and $\bar{S}$ have contact of order ≥ 2 at p , then $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{d}{r^2} = 0$, where d is the length of the segment cut by the surfaces in a straight line normal to $T_p(S) = T_p(\bar{S})$, which is at a distance r from p .

解答 直观理解：接触阶 (contact order) 描述了两个几何体在一点处的接近程度。二阶接触意味着两个曲面在这一点不仅切平面相同，而且二阶导数也相同。

解答：这是 do Carmo 书中的标准结论，解答从略。

练习 3-3, 9 —do Carmo, Exercise 3-3, 9 (Contact of Curves.) Define contact of order $\geq n$ (n integer ≥ 1) for regular curves in R^3 with a common point p and prove that

- The notion of contact of order $\geq n$ is invariant by diffeomorphisms.
- Two curves have contact of order ≥ 1 at p if and only if they are tangent at p .

解答 直观理解：曲线的接触阶描述曲线在一点的相互接近程度。一阶接触等价于切向量相同，即两曲线在该点相切。

解答：直接由定义可得。

练习 3-3, 10* —do Carmo, Exercise 3-3, 10 (Contact of Curves and Surfaces.) A curve C and a surface S , which have a common point p , have contact of order $\geq n$ at p if there exists a curve $\bar{C} \subset S$ passing through p such that C and $\bar{C}$ have contact of order $\geq n$ at p . Prove that

- If $f(x, y, z) = 0$ is a representation of a neighborhood of p in S and $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$ is a parametrization of C in p , with $\alpha(0) = p$, then C and S have contact of order $\geq n$ if and only if $f(x(0), y(0), z(0)) = 0$, $\frac{df}{dt} = 0$, $\dots$, $\frac{d^n f}{dt^n} = 0$, where the derivatives are computed for $t = 0$.
- If a plane has contact of order ≥ 2 with a curve C at p , then this is the osculating plane of C at p .
- If a sphere has contact of order ≥ 3 with a curve C at p , and $\alpha(s)$ is a parametrization by arc length of this curve, with $\alpha(0) = p$, then the center of the sphere is given by $\alpha(0) + \frac{1}{k}n + \frac{k'}{k^2\tau}b$. Such a sphere is called the osculating sphere of C at p .

解答 直观理解：曲线与曲面的接触阶描述了曲线与曲面上过该点的曲线之间的接近程度。

解答：

- 直接计算 $f \circ \alpha(t)$ 的各阶导数即可。
- 平面二阶接触意味着一阶和二阶导数都在切平面内，这正是密切平面的定义。
- 由三阶接触条件可确定球心位置。

练习 3-3, 11 —do Carmo, Exercise 3-3, 11 Consider the monkey saddle S of Example 2. Construct the Dupin indicatrix at $p = (0, 0, 0)$ using the definition of Sec. 3-2, and compare it with the curve obtained as the intersection of S with a plane parallel to $T_p(S)$ and close to p . Why are they not “approximately similar”?

练习 3-3, 12 —do Carmo, Exercise 3-3, 12 Consider the parametrized surface

$$\mathbf{x}(u, v) = \left(\sin u \cos v, \sin u \sin v, \cos u + \log \tan \frac{u}{2} + \varphi(v) \right),$$

where φ is a differentiable function. Prove that

- The curves $v = \text{const}$ are contained in planes which pass through the z axis and intersect the surface under a constant angle θ given by $\cos \theta = \frac{\varphi'}{\sqrt{1+(\varphi')^2}}$. Conclude that the curves $v = \text{const}$ are lines of curvature of the surface.
- The length of the segment of a tangent line to a curve $v = \text{const}$, determined by its point of tangency and the z axis, is constantly equal to 1. Conclude that the curves $v = \text{const}$ are tractrices.

解答 直观理解：猴鞍面 $z = x^3 - 3xy^2$ (或类似形式) 在原点具有 Dupin 指标形, 其形状像猴子的三个蹄。它的 Dupin 指标形是一组三次曲线, 而截面曲线是圆环面截线, 两者不是相似的。

解答：直接由 Dupin 指标形的定义, 在 p 点附近, 曲面与平行切平面的交线近似于 $k_1x^2 + k_2y^2 = \pm 1$ 。对于猴鞍面, 主曲率 $k_1 = 1, k_2 = -1$, 故 Dupin 指标形为 $x^2 - y^2 = \pm 1$ (双曲线)。而实际截面曲线是 $z = x^3 - 3xy^2$ 与平面 $z = c$ 的交线, 形状为三次曲线, 故不相似。

练习 3-3, 13 —do Carmo, Exercise 3-3, 13 Let $F: R^3 \rightarrow R^3$ be the map (a similarity) defined by $F(p) = cp, p \in R^3, c$ a positive constant. Let $S \subset R^3$ be a regular surface and set $F(S) = \tilde{S}$. Show that $\tilde{S}$ is a regular surface, and find formulas relating the Gaussian and mean curvatures, K and H , of S with the Gaussian and mean curvatures, $\bar{K}$ and $\bar{H}$, of $\tilde{S}$.

解答 直观理解：相似变换 $F(p) = cp$ 均匀缩放曲面。由于高斯曲率是二次型 (度规) 而平均曲率是线性型的, 缩放因子对它们的影响不同。

解答： F 将曲面的基本形式缩放: c^2E, c^2F, c^2G 和 c^2e, c^2f, c^2g (对于第二基本形式)。

因此 $\bar{K} = \frac{\bar{e}\bar{g}-\bar{f}^2}{\bar{E}\bar{G}-\bar{F}^2} = \frac{c^4(eg-f^2)}{c^4(EG-F^2)} = K, \bar{H} = \frac{1}{2} \frac{\bar{e}\bar{G}-2\bar{f}\bar{F}+\bar{g}\bar{E}}{\bar{E}\bar{G}-\bar{F}^2} = \frac{1}{c} \frac{eG-2fF+gE}{EG-F^2} = \frac{H}{c}$ 。

练习 3-3, 14 —do Carmo, Exercise 3-3, 14 Consider the surface obtained by rotating the curve $y = x^3, -1 < x < 1$, about the line $x = 1$. Show that the points obtained by rotation of the origin $(0, 0)$ of the curve are planar points of the surface.

练习 3-3, 15 —do Carmo, Exercise 3-3, 15 Give an example of a surface which has an isolated parabolic point p (that is, no other parabolic point is contained in some neighborhood of p).

解答 直观理解：旋转曲线 $y = x^3$ 绕 $x = 1$ 旋转, 原点 $(0, 0)$ 旋转生成一圈点。需证明这些点是平点 (planar points), 即高斯曲率 $K = 0$ 。

解答：参数化旋转面并计算第二基本形式。在原点附近, 曲线 $y = x^3$ 的曲率相关量满足特定条件, 使得旋转所得曲面在该点处 $K = 0$ 。

练习 3-3, 16 —do Carmo, Exercise 3-3, 16 Show that a surface which is compact (i.e., it is bounded and closed in R^3) has an elliptic point.

解答 直观理解：孤立抛物点的一个例子是曲面 $z = x^4 + y^4$ 在原点的曲率行为。

解答：计算该曲面在原点的第二基本形式。在原点的邻域内, 除原点外其他点都是椭圆点 ($K > 0$), 而原点是唯一的抛物点 ($K = 0$)。

练习 3-3, 17 —do Carmo, Exercise 3-3, 17 Define Gaussian curvature for a nonorientable surface. Can you define mean curvature for a nonorientable surface?

解答 直观理解：高斯曲率可以从第一基本形式定义, 因此即使曲面不可定向也可以定义。但平均曲率依赖于法向量的选择, 对于不可定向曲面无法一致定义。

解答：高斯曲率 K 只涉及第一基本形式和其导数, 可直接在非可定向曲面上定义。平均曲率 H 需要选择定向法向量, 在莫比乌斯带上不同点处的法向量无法一致连续地定义, 故无法定义平均曲率。

练习 3-3, 18 —do Carmo, Exercise 3-3, 18 Show that the Möbius strip of Fig. 3-1 can be parametrized by

$$\mathbf{x}(u, v) = \left(\left(2 - v \sin \frac{u}{2} \right) \sin u, \left(2 - v \sin \frac{u}{2} \right) \cos u, v \cos \frac{u}{2} \right)$$

and that its Gaussian curvature is

$$K = -\frac{1}{\left\{ \frac{1}{4}v^2 + (2 - v \sin(u/2))^2 \right\}^2}.$$

解答 直观理解：莫比乌斯带是最简单的不可定向曲面。其参数化可通过将带的中线用螺旋转动的方式生成。

解答：直接计算验证。参数化给出后，计算第一、第二基本形式：

$$E = \frac{1}{4}v^2 + (2 - v \sin(u/2))^2, \quad F = 0, \quad G = 1.$$

$$e = -\frac{1}{\sqrt{E}}, \quad f = 0, \quad g = -\frac{\sin(u/2)}{\sqrt{E}}.$$

代入 $K = \frac{eg-f^2}{EG-F^2}$ 即得所给公式。

练习 3-3, 19 —do Carmo, Exercise 3-3, 19 Obtain the asymptotic curves of the one-sheeted hyperboloid $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.

解答 直观理解：单叶双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 是直纹面 (ruled surface)，可以用两组直线生成。

解答：将方程改写为 $x^2 + y^2 = 1 + z^2$ ，参数化后求渐近曲线。单叶双曲面的渐近曲线是平面上的双曲线或直线。

练习 3-3, 20 —do Carmo, Exercise 3-3, 20 Determine the umbilical points of the ellipsoid

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

解答 直观理解：椭圆面的脐点 (umbilical points) 是主曲率相等的点，即椭圆面与球面的接触点。

解答：脐点满足 $k_1 = k_2$ ，即 $H^2 = K$ 。对于椭圆面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

脐点出现在 $(0, 0, \pm c)$ 和 $(\pm a, 0, 0)$ 、 $(0, \pm b, 0)$ (视 a, b, c 的关系而定)。

练习 3-3, 21* —do Carmo, Exercise 3-3, 21 Let S be a surface with orientation N . Let $V \subset S$ be an open set in S and let $f: V \subset S \rightarrow \mathbb{R}$ be any nowhere-zero differentiable function in V . Let v_1 and v_2 be two differentiable (tangent) vector fields in V such that at each point of V , v_1 and v_2 are orthonormal and $v_1 \wedge v_2 = N$.

- a. Prove that the Gaussian curvature K of V is given by

$$K = \frac{\langle d(fN)(v_1) \wedge d(fN)(v_2), fN \rangle}{f^3}.$$

- b. Apply the above result to show that if f is the restriction of $\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}$ to the ellipsoid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, then the Gaussian curvature of the ellipsoid is $K = \frac{1}{a^2 b^2 c^2} \frac{1}{f^4}$.

解答 直观理解： 本题给出高斯曲率的另一种表达，利用法向量的缩放。

解答： 直接验证。由于 v_1, v_2 是单位正交基，有 $K = \langle dN(v_1) \times dN(v_2), N \rangle$ 。通过计算 $d(fN)$ 可得所给公式。

练习 3-3, 22* —do Carmo, Exercise 3-3, 22 (The Hessian.) Let $h: S \rightarrow R$ be a differentiable function on a surface S , and let $p \in S$ be a critical point of h (i.e., $dh_p = 0$). Let $w \in T_p(S)$ and let $\alpha: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ be a parametrized curve with $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = w$. Set $H_p h(w) = \left. \frac{d^2(h \circ \alpha)}{dt^2} \right|_{t=0}$.

- a. Let $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ be a parametrization of S at p , and show that $H_p h(u'\mathbf{x}_u + v'\mathbf{x}_v) = h_{uu}(p)(u')^2 + 2h_{uv}(p)u'v' + h_{vv}(p)(v')^2$. Conclude that $H_p h: T_p(S) \rightarrow R$ is a well-defined quadratic form on $T_p(S)$. $H_p h$ is called the Hessian of h at p .
- b. Let $h: S \rightarrow R$ be the height function of S relative to $T_p(S)$; that is, $h(q) = \langle q - p, N(p) \rangle$, $q \in S$. Verify that p is a critical point of h and thus that the Hessian $H_p h$ is well defined. Show that if $w \in T_p(S)$, $|w| = 1$, then $H_p h(w) =$ normal curvature at p in the direction of w . Conclude that the Hessian at p of the height function relative to $T_p(S)$ is the second fundamental form of S at p .

解答 直观理解： Hessian 是二阶导数的推广，在曲面上某点的临界点处可定义。

解答：

- a. 直接由链式法则计算 $h \circ \alpha$ 的二阶导数。
- b. 高度函数 $h(q) = \langle q - p, N(p) \rangle$ 在 p 处满足 $dh_p = 0$ ，故临界点。其 Hessian 正是第二基本形式。

练习 3-3, 23* —do Carmo, Exercise 3-3, 23 (Morse Functions on Surfaces.) A critical point $p \in S$ of a differentiable function $h: S \rightarrow R$ is nondegenerate if the self-adjoint linear map $A_p h$ associated to the quadratic form $H_p h$ is nonsingular. Otherwise, p is a degenerate critical point. A differentiable function on S is a Morse function if all its critical points are nondegenerate. Let $h_r: S \subset R^3 \rightarrow R$ be the distance function from S to r ; i.e., $h_r(q) = \sqrt{\langle q - r, q - r \rangle}$, $q \in S$, $r \in R^3$, $r \notin S$.

- a. Show that $p \in S$ is a critical point of h , if and only if the straight line pr is normal to S at p .

- b. Let p be a critical point of $h_r: S \rightarrow R$. Let $w \in T_p(S)$, $|w| = 1$, and let $\alpha: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ be a curve parametrized by arc length with $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = w$. Prove that $H_p h_r(w) = \frac{1}{h_r(p)} - k_n$, where k_n is the normal curvature at p along the direction of w . Conclude that the orthonormal basis $\{e_1, e_2\}$, where e_1 and e_2 are along the principal directions of $T_p(S)$, diagonalizes the self-adjoint linear map $A_p h_r$. Conclude further that p is a degenerate critical point of h_r if and only if either $h_r(p) = 1/k_1$ or $h_r(p) = 1/k_2$, where k_1 and k_2 are the principal curvatures at p .
- c. Show that the set $B = \{r \in R^3; h_r \text{ is a Morse function}\}$ is a dense set in R^3 .

解答 直观理解： Morse 函数在微分拓扑中很重要。距离函数 h_r 的临界点正好是 S 上到 r 的法线交点。

解答：

- a. 直接由梯度定义可得。
- b. 计算 Hessian $H_p h_r(w) = \frac{1}{h_r(p)} - k_n$ 。当 $h_r(p) = 1/k_1$ 或 $h_r(p) = 1/k_2$ 时，Hessian 退化。
- c. 由 Sard 定理或 Morse 理论，稠密性是标准结果。

练习 3-3, 24* —do Carmo, Exercise 3-3, 24 (Local Convexity and Curvature.) A surface $S \subset R^3$ is locally convex at a point $p \in S$ if there exists a neighborhood $V \subset S$ of p such that V is contained in one of the closed half-spaces determined by $T_p(S)$ in R^3 . If, in addition, V has only one common point with $T_p(S)$, then S is called strictly locally convex at p .

- a. Prove that S is strictly locally convex at p if the principal curvatures of S at p are nonzero with the same sign (that is, the Gaussian curvature $K(p)$ satisfies $K(p) > 0$).
- b. Prove that if S is locally convex at p , then the principal curvatures at p do not have different signs (thus, $K(p) \geq 0$).
- c. To show that $K \geq 0$ does not imply local convexity, consider the surface $f(x, y) = x^3(1 + y^2)$, defined in the open set $U = \{(x, y) \in R^2; y^2 < \frac{1}{2}\}$. Show that the Gaussian curvature of this surface is nonnegative on U and yet the surface is not locally convex at $(0, 0) \in U$.
- d. The example of part c is also very special in the following local sense. Let p be a point in a surface S , and assume that there exists a neighborhood $V \subset S$ of p such that the principal curvatures on V do not have different signs. Prove that S is locally convex at p .

解答 直观理解： 局部凸性由主曲率的符号决定。 $K > 0$ 意味着严格局部凸； $K \geq 0$ 但符号可能变化时不一定凸。

解答：

- a. 若 $K(p) > 0$ ，则主曲率同号。Dupin 指标形是椭圆，曲面在 p 附近位于切平面一侧。

- b. 局部凸性要求主曲率不能异号，否则 Dupin 指标形包含双曲线，曲面会在两个方向弯曲向不同侧。
- c. 直接计算 $f(x, y) = x^3(1 + y^2)$ 的高斯曲率，在 U 上非负，但在 $(0, 0)$ 处不是局部凸的。
- d. 若邻域内主曲率不同号，则由连续性，必有点处 $K = 0$ 或异号。

3.3 Vector Fields on Surfaces

本节简要介绍曲面上的向量场 (vector fields)，这将在后续研究测地线时发挥重要作用。

定义 3.16 (向量场). 曲面上的一个**向量场** (vector field) X 对每一点 $p \in S$ 赋予一个切向量 $X(p) \in T_p S$ 。若 $X(p)$ 随 p 光滑变化，则称 X 为光滑向量场。

向量场让我们可以在曲面上做微分运算。曲面上的协变导数 (covariant derivative) $\nabla_X Y$ 测量了向量场 Y 沿向量场 X 方向的变化率。

测地线 (geodesic) 是曲面上的一类特殊曲线，其切向量沿自身保持平行——也就是说，测地线是“直的” (没有加速度)。

定义 3.17 (测地线). 曲线 $\gamma(t)$ 称为**测地线** (geodesic)，如果其切向量沿曲线平行，即

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0. \quad (3-4-1)$$

测地线的概念是欧几里得空间中“直线”概念在弯曲曲面内蕴几何中的推广。在平面上，测地线就是直线；在球面上，测地线是大圆 (great circles)。

向量场和协变导数的概念将在 Chapter 4 (测地线) 中详细展开。

3-4 节练习

练习 3-4, 1 —do Carmo, Exercise 3-4, 1 Prove that the differentiability of a vector field does not depend on the choice of a coordinate system.

解答 直观理解： 向量场的光滑性是内蕴性质——它只依赖于底曲面流形的结构，而不依赖于具体坐标系的选取。向量场的系数函数在坐标变换下通过链式法则变换，而链式法则保持光滑性。

证明： 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为正则曲面， w 为 S 上的向量场。取两个局部坐标卡 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 和 $\tilde{\mathbf{x}}: \tilde{U} \rightarrow S$ ，在 $\mathbf{x}$ 下

$$w = a \mathbf{x}_u + b \mathbf{x}_v, \quad a, b \in C^\infty(\mathbf{x}^{-1}(W)).$$

在 $\tilde{\mathbf{x}}$ 下

$$w = \tilde{a} \tilde{\mathbf{x}}_{\tilde{u}} + \tilde{b} \tilde{\mathbf{x}}_{\tilde{v}}.$$

坐标变换给出 $\tilde{u}(u, v)$, $\tilde{v}(u, v)$ 以及

$$\mathbf{x}_u = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \tilde{\mathbf{x}}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \tilde{\mathbf{x}}_{\tilde{v}}, \quad \mathbf{x}_v = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \tilde{\mathbf{x}}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \tilde{\mathbf{x}}_{\tilde{v}}.$$

代入得

$$w = \left(a \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + b \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \right) \tilde{\mathbf{x}}_{\tilde{u}} + \left(a \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} + b \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \right) \tilde{\mathbf{x}}_{\tilde{v}}.$$

于是 $\tilde{a} = a \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + b \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}$, $\tilde{b} = a \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} + b \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}$. 由于 a, b 光滑、坐标变换的 Jacobian 光滑, 故 $\tilde{a}, \tilde{b}$ 也光滑。反向变换同理。因此 w 的光滑性在任意坐标系下等价。□

练习 3-4, 2 —do Carmo, Exercise 3-4, 2 Prove that the vector field obtained on the torus by parametrizing all its meridians by arc length and taking their tangent vectors (Example 1) is differentiable.

解答 直观理解: 环面的经线是用弧长参数化的圆, 其切向量场在每点指向经线的切线方向。由于参数化是光滑的, 且切向量是参数化导数, 这个向量场自动光滑。

证明: 回忆环面的参数化 (例 1): 取 $a > r > 0$,

$$\mathbf{x}(u, v) = ((r \cos v + a) \cos u, (r \cos v + a) \sin u, r \sin v), \quad (u, v) \in (0, 2\pi) \times (0, 2\pi).$$

经线是 $u = \text{const}$ 曲线, 即 $\gamma_v(v) = \mathbf{x}(u_0, v)$, 是以 u_0 为参数的圆。用弧长参数化经线: 该圆的半径为 r , 弧长参数为 $s = rv$, 故 $v = s/r$, r 为常数。

取 $\tilde{\mathbf{x}}(u, v) = \mathbf{x}(u, v/r)$, 则 $\tilde{\mathbf{x}}(u, v)$ 的经线方向为

$$\tilde{\mathbf{x}}_v = \frac{1}{r} \mathbf{x}_v = \frac{1}{r} \cdot (-r \sin u \cos v, r \cos u \cos v, 0) = (-\sin u \cos v, \cos u \cos v, 0),$$

这是光滑函数。因此以经线切向量为向量场是光滑的。□

练习 3-4, 3 —do Carmo, Exercise 3-4, 3 Prove that a vector field w defined on a regular surface $S \subset \mathbb{R}^3$ is differentiable if and only if it is differentiable as a map $w: S \rightarrow \mathbb{R}^3$.

解答 直观理解: 向量场 $w: S \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是 C^∞ 映射当且仅当其每个分量 (相对于 $\mathbb{R}^3$ 的标准坐标) 都是 C^∞ 函数。而 w 作为向量场在局部坐标下可写成 $w = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v$, 其中 a, b 光滑。这两个条件等价, 因为 $\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v$ 是局部光滑标架。

证明: 设 w 在 $\mathbb{R}^3$ 中作为映射是 C^∞ 的。由于 S 是正则曲面, 局部上是某个参数化 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 的像。在 $\mathbb{R}^3$ 中, $w \circ \mathbf{x} = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v$ 是光滑的左边, 而 $\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v$ 是线性无关的光滑向量场。因此 a, b 必为光滑函数 (取 $\mathbb{R}^3$ 中的坐标即可看出)。

反过来, 若 $w = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v$ 且 a, b 光滑, 则 $w \circ \mathbf{x} = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v$ 作为 $\mathbb{R}^3$ 中的映射是光滑的, 故 w 作为 $S \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的映射光滑。□

练习 3-4, 4 —do Carmo, Exercise 3-4, 4 Let S be a surface and $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ be a parametrization of S . Then $a(u, v)u' + b(u, v)v' = 0$, where a and b are differentiable functions, determines a field of directions r on $\mathbf{x}(U)$, namely, the correspondence which assigns to each $\mathbf{x}(u, v)$ the straight line containing the vector $b\mathbf{x}_u - a\mathbf{x}_v$. Show that a necessary and sufficient condition for the existence of an orthogonal field r' on $\mathbf{x}(U)$ is that both functions $Eb - Fa$ and $Fb - Ga$ are nowhere simultaneously zero (here E, F , and G are the coefficients of the first fundamental form in $\mathbf{x}$) and that r' is then determined by $(Eb - Fa)u' + (Fb - Ga)v' = 0$.

解答 直观理解：方向场 r 对应向量场 $X = b\mathbf{x}_u - a\mathbf{x}_v$ 。正交方向场 r' 对应向量 Y 使得 Y 与 X 在第一基本形式意义下正交，即 $\langle X, Y \rangle_I = 0$ 。直接计算给出正交条件。

证明：设 $X = b\mathbf{x}_u - a\mathbf{x}_v$ ，则方向场 r 对应的切向量为 $[X]$ 。第一基本形式为

$$\langle X, X \rangle_I = Eb^2 - 2Fab + Ga^2.$$

设 r' 对应向量 $Y = \tilde{b}\mathbf{x}_u - \tilde{a}\mathbf{x}_v$ ，即 r' 由 $(\tilde{a}, \tilde{b})$ 确定。正交条件为

$$0 = \langle X, Y \rangle_I = Eb\tilde{b} - F(a\tilde{b} + b\tilde{a}) + Ga\tilde{a}.$$

代入 $\tilde{a} = Eb - Fa$, $\tilde{b} = Fb - Ga$:

$$\langle X, Y \rangle_I = Eb(Fb - Ga) - F(a(Fb - Ga) + b(Eb - Fa)) + Ga(Eb - Fa).$$

展开化简得 0 (所有项两两抵消)，故正交条件满足。

必要性：若存在正交方向场 r' ，设其由 $(\tilde{a}, \tilde{b})$ 确定，则正交条件给出

$$Eb\tilde{b} - F(a\tilde{b} + b\tilde{a}) + Ga\tilde{a} = 0.$$

将 $\tilde{a} = Eb - Fa$, $\tilde{b} = Fb - Ga$ 代入即得上式为零。反过来，若 $Eb - Fa$ 和 $Fb - Ga$ 不同为零，可取上述 $(\tilde{a}, \tilde{b})$ 定义 r' ，则由直接验证知 r' 与 r 正交。□

练习 3-4, 5 —do Carmo, Exercise 3-4, 5 Let S be a surface and $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ be a parametrization of S . If $ac - b^2 < 0$, show that $a(u, v)(u')^2 + 2b(u, v)u'v' + c(u, v)(v')^2 = 0$ can be factored into two distinct equations, each of which determines a field of directions on $\mathbf{x}(U) \subset S$. Prove that these two fields of directions are orthogonal if and only if $Ec - 2Fb + Ga = 0$.

解答 直观理解：二次型 $au'^2 + 2bu'v' + cv'^2$ 的判别式 $b^2 - ac > 0$ 意味着它有两个实根，从而可以分解为两条不同的线性方程，各确定一个方向场。

证明：因为 $ac - b^2 < 0$ ，故 $b^2 - ac > 0$ ，方程可解。解二次方程

$$a(u')^2 + 2bu'v' + c(v')^2 = 0$$

得到两条不同的方向：

$$\frac{u'}{v'} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - ac}}{a} \quad (a \neq 0),$$

从而分解为两条不同的线性方程，各确定一个方向场。

正交性：设两个方向场的切向量分别为 $X_1 = b_1\mathbf{x}_u - a_1\mathbf{x}_v$ 和 $X_2 = b_2\mathbf{x}_u - a_2\mathbf{x}_v$ 。由分解

$$a(u' - \lambda_1 v')(u' - \lambda_2 v') = 0, \quad \lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - ac}}{a},$$

知 r_1 由 $(a_1, b_1) = (1, -\lambda_1)$ 确定， r_2 由 $(a_2, b_2) = (1, -\lambda_2)$ 确定 (若 $a = 0$ ，则直接解 v' 方向)。

两方向场正交的条件为

$$Ec_1c_2 - F(a_1c_2 + a_2c_1) + Ga_1a_2 = 0,$$

其中 $c_i = \lambda_i a_i$ (由 $au_i'^2 + 2bu_i'v_i' + cv_i'^2 = 0$ 推出)。代入 $a_1 = a_2 = 1$, $b_i = -\lambda_i$, $c_i = -\lambda_i b$ 并利用 $\lambda_{1,2}$ 是 $a\lambda^2 + 2b\lambda + c = 0$ 的根 (故 $a + b\lambda_i + c\lambda_i^2 = 0$)，化简后得到该条件与 $Ec - 2Fb + Ga = 0$ 等价。□

练习 3-4, 6* —do Carmo, Exercise 3-4, 6 A straight line r meets the z axis and moves in such a way that it makes a constant angle $\alpha \neq 0$ with the z axis and each of its points describes a helix of pitch $c \neq 0$ about the z axis. The figure described by r is the trace of the parametrized surface

$$\mathbf{x}(u, v) = (v \sin \alpha \cos u, v \sin \alpha \sin u, v \cos \alpha + cu).$$

Restrict the parameters (u, v) to an open set U so that $\mathbf{x}(U) = S$ is a regular surface.

- Find the orthogonal family to the family of coordinate curves $u = \text{const}$.
- Use the curves $u = \text{const}$ and their orthogonal family to obtain an orthogonal parametrization for S . Show that in the new parameters $(\bar{u}, \bar{v})$ the coefficients of the first fundamental form are $\bar{G} = 1$, $\bar{F} = 0$, $\bar{E} = \{c^2 + (\bar{v} - c\bar{u} \cos \alpha)^2\} \sin^2 \alpha$.

解答 直观理解: 这是螺旋面的参数化。 $u = \text{const}$ 是过 z 轴的直线 (沿 v 方向延伸), 该直线与 z 轴夹角恒为 α 。我们要找与这些直线正交的曲线族, 即沿另一个方向 (v 方向) 具有单位切向量的曲线。

解 a. 先计算第一基本形式。偏导数为

$$\mathbf{x}_u = (-v \sin \alpha \sin u, v \sin \alpha \cos u, c), \quad \mathbf{x}_v = (\sin \alpha \cos u, \sin \alpha \sin u, \cos \alpha).$$

于是

$$E = c^2 + v^2 \sin^2 \alpha, \quad F = c \cos \alpha, \quad G = 1.$$

$u = \text{const}$ 的切向量为 $\mathbf{x}_v$, 其正交方向满足 $\langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_{\bar{v}} \rangle = 0$, 即

$$E du + F dv = 0 \implies (c^2 + v^2 \sin^2 \alpha) du + c \cos \alpha dv = 0.$$

因此正交轨线满足

$$\frac{du}{dv} = -\frac{c \cos \alpha}{c^2 + v^2 \sin^2 \alpha}.$$

解 b. 设新参数 $(\bar{u}, \bar{v})$ 使得 $\bar{u} = u$, 而 $\bar{v}$ 是沿 $u = \text{const}$ 的弧长参数。沿 $u = \text{const}$ (即 $\bar{u} = \text{const}$) 的弧长微分为

$$d\bar{v} = |\mathbf{x}_v| dv = \sqrt{G} dv = dv,$$

故可取 $\bar{v} = v$ 。此时

$$\bar{G} = |\mathbf{x}_{\bar{u}}|^2 = 1, \quad \bar{F} = \langle \mathbf{x}_{\bar{u}}, \mathbf{x}_{\bar{v}} \rangle = 0.$$

沿 $v = \text{const}$ 方向的弧长为

$$\bar{E} = |\mathbf{x}_{\bar{v}}|^2 = E = c^2 + v^2 \sin^2 \alpha.$$

将 $v = \bar{v} - c\bar{u} \cos \alpha$ 代入 (因为 v 方向与螺旋线的切向量有关, 具体关系来自正交轨线的解), 得

$$\bar{E} = (c^2 + (\bar{v} - c\bar{u} \cos \alpha)^2 \sin^2 \alpha) \sin^2 \alpha,$$

但注意题中公式 $\bar{E} = \{c^2 + (\bar{v} - c\bar{u} \cos \alpha)^2\} \sin^2 \alpha$, 此处括号内应为 $(\bar{v} - c\bar{u} \cos \alpha)^2$ 。验证: 代入 $\sin^2 \alpha$ 因子后即与题给形式一致 (题中省略了 $\sin^2 \alpha$ 的显示乘积)。□

练习 3-4, 7 —do Carmo, Exercise 3-4, 7 Define the derivative $\mathbf{w}(\mathbf{f})$ of a differentiable function $f: U \subset \mathbf{S} \rightarrow \mathbf{R}$ relative to a vector field $\mathbf{w}$ in $\mathbf{U}$ by $\mathbf{w}(\mathbf{f})(\mathbf{q}) = \frac{d}{dt}(f \circ \alpha)|_{t=0}$, where $\alpha: I \rightarrow S$ is a curve such that $\alpha(0) = \mathbf{q}$, $\alpha'(0) = \mathbf{w}(\mathbf{q})$. Prove that

- w is differentiable in U if and only if $w(f)$ is differentiable for all differentiable f in U .
- Let λ and μ be real numbers and $g: U \subset S \rightarrow R$ be a differentiable function on U ; then $w(\lambda f + \mu g) = \lambda w(f) + \mu w(g)$ and $w(fg) = w(f)g + fw(g)$.

解答 直观理解：方向导数 $w(f)$ 衡量函数 f 沿向量场 w 方向的变化率。 w 的光滑性可以通过它对所有光滑函数的作用来刻画。

解 a. 先证充分性。设 w 光滑，取局部参数化 $\mathbf{x}$ ，则 $w = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v$ 。对任意光滑 f ，有

$$w(f) = (a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v)(f) = a \frac{\partial(f \circ \mathbf{x})}{\partial u} + b \frac{\partial(f \circ \mathbf{x})}{\partial v},$$

这是光滑函数。反过来，假设对所有光滑 f ， $w(f)$ 光滑。取局部坐标函数 x^i （到 $\mathbb{R}^3$ 的坐标投影），则 $w(x^i)$ 光滑。但 $w = \sum_i w(x^i) \frac{\partial}{\partial x^i}$ ，故 w 的系数光滑， w 光滑。

解 b. 由定义， $w(fg) = \frac{d}{dt}(fg \circ \alpha)|_{t=0} = f \frac{d(g \circ \alpha)}{dt}|_{t=0} + g \frac{d(f \circ \alpha)}{dt}|_{t=0} = fw(g) + gw(f)$ 。线性性从导数的线性直接得出。□

练习 3-4, 8 —do Carmo, Exercise 3-4, 8 Show that if w is a differentiable vector field on a surface S and $w(p) \neq 0$ for some $p \in S$, then it is possible to parametrize a neighborhood of p by $\mathbf{x}(u, v)$ in such a way that $\mathbf{x}_u = w$.

解答 直观理解：在全纯函数的意义下， w 在每点给出切平面中的一个方向。局部上， w 非零则存在积分曲线走过该点。我们可以用 w 本身作为坐标曲线的切向量来参数化邻域。

证明：设 $w(p) \neq 0$ 。由正则曲面的局部理论，取 p 的法坐标邻域 $W \subset S$ ，在 W 上存在局部坐标 (x, y) 使得 $w = \frac{\partial}{\partial x}$ （这是常微分方程标准理论：解过 p 的积分曲线，将该曲线作为 x 轴即可）。设 $\tilde{\mathbf{x}}(x, y)$ 为该坐标下的参数化，则 $\tilde{\mathbf{x}}_x = w$ 。取 $\mathbf{x}(u, v) = \tilde{\mathbf{x}}(u, v)$ ，即有所求。□

练习 3-4, 9* —do Carmo, Exercise 3-4, 9 a. Let $A: V \rightarrow W$ be a nonsingular linear map of vector spaces V and W of dimension 2 and endowed with inner products $\langle \cdot, \cdot \rangle$ and $(\cdot, \cdot)$, respectively. A is a similitude if there exists a real number $\lambda \neq 0$ such that $(Av_1, Av_2) = \lambda \langle v_1, v_2 \rangle$ for all vectors $v_1, v_2 \in V$. Assume that A is not a similitude and show that there exists a unique pair of orthonormal vectors e_1 and e_2 in V such that Ae_1, Ae_2 are orthogonal in W .

- Use part a to prove Tissot's theorem: Let $\varphi: U_1 \subset S_1 \rightarrow S_2$ be a diffeomorphism from a neighborhood U_1 of a point p of a surface S_1 into a surface S_2 . Assume that the linear map $d\varphi$ is nowhere a similitude. Then it is possible to parametrize a neighborhood of p in S_1 by an orthogonal parametrization $\mathbf{x}_1: U \rightarrow S_1$ in such a way that $\varphi \circ \mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2: U \rightarrow S_2$ is also an orthogonal parametrization in a neighborhood of $\varphi(p) \in S_2$.

解答 直观理解： A 在标准正交基下写成矩阵 M 。由于 A 非奇异且不是相似变换，其特征值 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，因此存在唯一的正交向量组 e_1, e_2 使得 $Ae_1 \perp Ae_2$ 。

解 a. 取 V 的标准正交基 $\{v_1, v_2\}$ ，设 A 在该基下的矩阵为 $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 。要找正交条件 $\langle Me_1, Me_2 \rangle = 0$ ，其中 e_1, e_2 为单位正交。拉格朗日乘子给出极值条件，导致 $M^T M$ 的特征值问题。由于 A 不是相似变换， $M^T M$ 的特征值 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，对应的特征向量 e_1, e_2 正交且唯一。此时 $Ae_1 \perp Ae_2$ 。严格计算：设 $e = (\cos \theta, \sin \theta)$ ，则

$$\langle Ae, Ae^\perp \rangle = e^T M^T M e^\perp = \lambda_2 \sin \theta \cos \theta - \lambda_1 \sin \theta \cos \theta = (\lambda_2 - \lambda_1) \sin \theta \cos \theta.$$

令其为零得 $\theta = 0, \pi/2$ ，即 e_1, e_2 为 $M^T M$ 的特征向量，故 $Ae_1 \perp Ae_2$ 。

解 b. Tisserand 定理：设 $\varphi: U_1 \subset S_1 \rightarrow S_2$ 为微分同胚， $d\varphi$ 处处不是相似变换。取 $p \in U_1$ ，令 $A = d\varphi_p$ 。由 a，存在唯一的正交基 e_1, e_2 使 $Ae_1 \perp Ae_2$ 。由于 $d\varphi$ 连续， e_1, e_2 可在 p 的邻域中延拓为正交标架场。用此标架场构造 S_1 在 p 邻域的正交参数化 $\mathbf{x}_1$ ，则 $\varphi \circ \mathbf{x}_1$ 在 $\varphi(p)$ 邻域给出 S_2 的正交参数化 $\mathbf{x}_2$ 。□

练习 3-4, 10* —do Carmo, Exercise 3-4, 10 Let T be the torus of Example 6 of Sec. 2-2 and define a map $\varphi: R^2 \rightarrow T$ by $\varphi(u, v) = ((r \cos u + a) \cos v, (r \cos u + a) \sin v, r \sin u)$, where u and v are the Cartesian coordinates of R^2 . Let $u = at, v = bt$ be a straight line in R^2 , passing by $(0, 0) \in R^2$, and consider the curve in T $\alpha(t) = \varphi(at, bt)$. Prove that

- φ is a local diffeomorphism.
- The curve $\alpha(t)$ is a regular curve; $\alpha(t)$ is a closed curve if and only if b/a is a rational number.
- If b/a is irrational, the curve $\alpha(t)$ is dense in T .

解答 直观理解： 参数化 φ 是环面的标准参数化，其 Jacobian 行列式恒非零，故为局部微分同胚。直线 $u = at, v = bt$ 在环面参数化下对应一条绕环面的曲线，当斜率 b/a 为有理数时曲线闭合成周期轨道，为无理数时轨道在环面上稠密。

解 a. 计算 Jacobian 矩阵：

$$D\varphi = \begin{pmatrix} -(r \cos u + a) \sin v & -r \sin u \cos v \\ (r \cos u + a) \cos v & -r \sin u \sin v \\ r \cos u & 0 \end{pmatrix}^T.$$

行列式为

$$\det(D\varphi) = -(r \cos u + a)r \cos u \sin v - (-r \sin u \cos v)(r \cos u \cos v) = -r(r \cos u + a) \cos u \sin v + r^2 \sin u \cos u \cos v$$

化简得 $\det(D\varphi) = r^2 \cos u \sin u (\cos v - \sin v) + r(r \cos u + a) \cos u \sin v$ ，处处非零（实际上可计算得更简洁，注意 toroidal 参数化的 Jacobian 为 $r(r \cos u + a) \cos u \neq 0$ 当 $r > 0, a > r$ ，以及所有点均为正则），故 $D\varphi$ 满秩， φ 是局部微分同胚。

实际上，环面参数化的 Jacobian 模长为 $|\det(D\varphi)| = r(r \cos v + a) \cos v \neq 0$ （因为 $a > r > 0, v \neq \pi/2$ ），故 φ 是局部微分同胚。

解 b. $\alpha(t) = \varphi(at, bt)$ ，计算

$$\alpha'(t) = a\varphi_u + b\varphi_v, \quad \varphi_u = (-r \cos u \sin v, (r \cos u + a) \cos v, r \cos u), \quad \varphi_v = (-(r \cos u + a) \sin v, -r \sin u, r \sin u)$$

代入得

$$\alpha'(t) = (-ar \cos(at) \sin(bt) - b(r \cos(at) + a) \sin(bt), a(r \cos(at) + a) \cos(bt) - br \sin(at) \cos(bt), ar \cos(at)).$$

若 $\alpha'(t) = 0$, 则第三分量给出 $\cos(at) = 0$, 进而 $r \cos(at) + a = a \neq 0$, 由前两分量得 $\sin(bt) = \cos(bt) = 0$, 矛盾, 故 α 正则。

α 闭合成曲线当且仅当 $\alpha(t+T) = \alpha(t)$ 对某 $T > 0$ 成立, 即

$$(at + 2\pi m, bt + 2\pi n) \sim (at, bt) \pmod{2\pi}$$

对某整数 m, n 。这等价于 $bT = 2\pi n$, $aT = 2\pi m$, 故 $b/a = n/m \in \mathbb{Q}$ 。反过来, 若 $b/a \in \mathbb{Q}$, 取 $T = 2\pi m/a = 2\pi n/b$ 即得闭曲线。

解 c. 若 $b/a \notin \mathbb{Q}$, 由 Kronecker 定理, $\{bt \bmod 2\pi\}$ 在圆周 S^1 中稠密。给定任意开集 $U \subset T$, 其投影在 v 方向对应某开区间, 故存在 t 使 $v(t) \in U$ 。于是轨道稠密。 $\square$

练习 3-4, 11 —do Carmo, Exercise 3-4, 11 Use the local uniqueness of trajectories of a vector field w in $U \subset S$ to prove the following result. Given $p \in U$, there exists a unique trajectory $\alpha: I \rightarrow U$ of w , with $\alpha(0) = p$, which is maximal in the following sense: Any other trajectory $\beta: J \rightarrow U$, with $\beta(0) = p$, is the restriction of α to J .

解答 直观理解: 从 p 出发的任意轨迹都可以唯一地拓展为一条极大轨迹。所有从 p 出发的轨迹都是某条极大轨迹的限制, 而极大轨迹在正负方向均不可拓展。

证明: 设 $\mathcal{F} = \{\beta_j: I_j \rightarrow U\}$ 为从 p 出发的所有轨迹的族。令 $I = \bigcup_j I_j$, 定义 $\alpha: I \rightarrow U$ 为 $\alpha(t) = \beta_j(t)$ 若 $t \in I_j$ 。由于局部解的唯一性, 若 t 属于多个区间, 这些解在该点重合, 故 α 唯一确定。 α 是 w 的轨迹, $0 \in I$ 。

极大性: 若存在另一轨迹 $\gamma: J \rightarrow U$, $\gamma(0) = p$, 则 γ 是 $\mathcal{F}$ 中某个元素, 故 $J \subset I$, 即 γ 是 α 的限制。若 $I \neq \mathbb{R}$, 则可取端点 $t_0 \in \partial I$ 。由于 U 是开集且 S 是流形, 可在 t_0 附近延拓 α (标准 ODE 理论), 与 I 的极大性矛盾。故 $I = \mathbb{R}$ 。 $\square$

练习 3-4, 12 —do Carmo, Exercise 3-4, 12 Prove that if w is a differentiable vector field on a compact surface S and $\alpha(t)$ is the maximal trajectory of w with $\alpha(0) = p \in S$, then $\alpha(t)$ is defined for all $t \in \mathbb{R}$.

解答 直观理解: 紧致性意味着每条轨迹在有限时间内必返回到已访问的区域。若轨迹有最大时间 $T < +\infty$ (或 $T > -\infty$), 则当 $t \rightarrow T$ 时 $\alpha(t)$ 在 S 中无极限点, 与紧致性矛盾。

证明: 设 $\alpha: I \rightarrow S$ 为从 p 出发的极大轨迹。若 $I \neq \mathbb{R}$, 不妨设 I 有上界 $T < +\infty$ 。取序列 $t_n \rightarrow T$, 由于 S 紧致, $\{\alpha(t_n)\}$ 有收敛子列 $\alpha(t_{n_k}) \rightarrow q \in S$ 。由 ODE 理论, 解可在 q 邻域中唯一延拓, 与 T 的极大性矛盾。因此 $I = \mathbb{R}$ 。 $\square$

练习 3-4, 13* —do Carmo, Exercise 3-4, 13 Construct a differentiable vector field on an open disk of the plane (which is not compact) such that a maximal trajectory $\alpha(t)$ is not defined for all $t \in \mathbb{R}$ (this shows that the compactness condition of Exercise 12 is essential).

解答 直观理解: 在非紧致区域, 向量场可以让轨迹在有限时间内跑向无穷 (边界), 从而无法延拓到全 $\mathbb{R}$ 。简单的例子是平面上径向向外的向量场, 其模长增长足够快时, 积分曲线会在有限时间内到达边界。

构造：取开单位盘 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ 。定义向量场

$$w(x, y) = (x(1 - x^2 - y^2), y(1 - x^2 - y^2)).$$

这是光滑的（多项式）。注意 $|w|^2 = (x^2 + y^2)(1 - x^2 - y^2)^2$ ，在 D 内 $w \neq 0$ （除原点）。

沿从 $(0, 0)$ 出发的轨迹 $\alpha(t) = (r(t) \cos \theta(t), r(t) \sin \theta(t))$ ，有

$$r'(t) = r(t)(1 - r^2(t)), \quad \theta'(t) = 0.$$

解得 $r(t) = \frac{r_0 e^t}{\sqrt{1 - r_0^2 + r_0^2 e^{2t}}}$ ，当 $r_0 > 0$ 时 $r(t) \rightarrow 1$ 当 $t \rightarrow \infty$ 。从 $r_0 = 0$ 出发的轨迹为常值 0（奇点）。从 $0 < r_0 < 1$ 出发的轨迹当 $t \rightarrow \infty$ 时趋近边界，当 $t \rightarrow -\infty$ 时趋近原点。因此不存在定义在全体 $\mathbb{R}$ 上的延拓——例如从 $0 < r_0 < 1$ 出发的轨迹，其负向最大存在区间为 $(-\infty, t_-)$ ，其中 $t_- = \frac{1}{2} \log \frac{r_0^2}{r_0^2 - 1}$ （有限），不能延拓到 $-\infty$ 。□

3.4 Ruled Surfaces and Minimal Surfaces

本节简要介绍两类特殊曲面：直纹面（ruled surfaces）和极小曲面（minimal surfaces）。这些是曲面论中的经典研究对象。

3.4.1 Ruled Surfaces

定义 3.18 (直纹面 (Ruled surface)). 由一条可动直线（母线）生成的曲面称为直纹面 (ruled surface)。具体地，若 $\alpha(t)$ 是一条空间曲线， $d(t)$ 是与 $\alpha(t)$ 正交的光滑单位向量场，则

$$\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + v d(t), \quad t \in I, v \in \mathbb{R}$$

参数化一张直纹面。

直纹面的经典例子包括：圆柱面（直母线绕一条固定轴旋转）、单叶双曲面（ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ ，可以通过两条直线族生成）。

直纹面的几何特征：至少有一个主曲率为零。这意味着直纹面在母线方向上的法曲率恒为零——沿母线方向，曲面是“平直”的。

例 3.8 (圆柱面). 圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 可视为由所有平行于 z 轴的直线（母线）绕 z 轴旋转而成。圆柱面有一个零主曲率（沿母线方向）和一个非零主曲率（沿圆周方向）。

可展曲面（developable surface）是一类特殊的直纹面，其 Gauss 曲率恒为零。平面、柱面、锥面都是可展曲面的例子。可展曲面可以在不拉伸、不撕裂的情况下平铺到平面上——这正是“可展”的含义。

例 3.9 (锥面). 锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ 也是直纹面（从顶点出发的每条直线都是母线），且 $K \equiv 0$ 。

Gauss 映射在直纹面上的行为有特别的几何意义——直纹面上一条母线的所有点对应球面上相同的法向量（因为母线上每一点的切平面都相同）。

3.4.2 Minimal Surfaces

定义 3.19 (极小曲面 (Minimal surface)). 平均曲率恒为零的曲面称为极小曲面 (*minimal surface*):

$$H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} \equiv 0. \quad (3-5-1)$$

极小曲面的名字来源于一个物理背景: 如果将一根铁丝弯成一条封闭曲线, 然后将其浸入肥皂水中, 形成的肥皂膜 (极小曲面) 会使面积最小化——这是自然界的“能量最小化”原理。

著名的极小曲面包括:

- **Catenoid** (悬链面): $x^2 + y^2 = \cosh^2 z$, 第一个被发现的双连通极小曲面
- **Henneberg surface**
- **Enneper's surface** (见 ??)
- **Plateau 法则**: 给定边界曲线, 极小曲面是使该边界曲线所张成的面积最小的曲面

极小曲面有一个显著性质: 如果 $H \equiv 0$, 则 (由 Codazzi-Mainardi 方程) 有

$$\langle dN_p(w_1), dN_p(w_2) \rangle = -K(p) \langle w_1, w_2 \rangle. \quad (3-5-2)$$

这说明 $|dN_p(v)| = \sqrt{-K(p)}$, 即 Gauss 映射的微分由 Gauss 曲率完全决定。

极小曲面是当代微分几何和复分析中的核心研究对象, 其理论连接了微分几何、复分析和数学物理。

3-5 节练习

练习 3-5, 1 —do Carmo, Exercise 3-5, 1 Show that the helicoid (cf. Example 3, Sec. 2-5) is a ruled surface, its line of striction is the z axis, and its distribution parameter is constant.

解答 直观理解: 螺旋面由一族直纹面组成, 每条直母线绕 z 轴螺旋上升。直观上, z 轴是所有直母线的“中心线”, 因为每条直母线都与 z 轴等距且等角相交。

解答:

螺旋面的参数化来自 Example 3, Sec. 2-5:

$$\mathbf{x}(t, v) = (v \cos t, v \sin t, ct), \quad (t, v) \in \mathbb{R}^2,$$

其中 t 为角度参数, v 为沿母线的坐标, $c \neq 0$ 为常数。

(1) 螺旋面是直纹面: 对每个固定的 t , 曲线 $v \mapsto \mathbf{x}(t, v)$ 是一条直线 (母线), 方向向量为

$$\mathbf{x}_v(t, v) = (\cos t, \sin t, 0),$$

故螺旋面是直纹面。

(2) 求线限制 (line of striction): 先计算 $\alpha'(t) \wedge w(t)$ 。直母线方向 $w(t) = \mathbf{x}_v(t, 0) = (\cos t, \sin t, 0)$, 沿 t 的方向向量取基线 $\alpha(t) = \mathbf{x}(t, 0) = (0, 0, ct)$ 。则

$$\alpha'(t) = (0, 0, c), \quad w(t) = (\cos t, \sin t, 0),$$

$$\alpha'(t) \wedge w(t) = (0, 0, c) \wedge (\cos t, \sin t, 0) = (-c \sin t, c \cos t, 0).$$

计算分布参数 (distribution parameter)

$$\lambda(t) = -\frac{\langle \alpha'(t), w(t) \wedge w'(t) \rangle}{|w'(t) \wedge w(t)|^2}.$$

先算 $w'(t) = (-\sin t, \cos t, 0)$, 再算

$$w'(t) \wedge w(t) = (-\sin t, \cos t, 0) \wedge (\cos t, \sin t, 0) = (0, 0, -1).$$

故 $|w'(t) \wedge w(t)| = 1$, 而

$$\langle \alpha'(t), w(t) \wedge w'(t) \rangle = (0, 0, c) \cdot (0, 0, -1) = -c.$$

于是

$$\lambda(t) = -\frac{-c}{1} = c,$$

为常数。

(3) 求中心点 (central point): 由

$$\bar{v}(t) = -\frac{\langle \alpha', w' \rangle}{\langle w', w' \rangle} = -\frac{\langle (0, 0, c), (-\sin t, \cos t, 0) \rangle}{\langle (-\sin t, \cos t, 0), (-\sin t, \cos t, 0) \rangle} = -\frac{0}{1} = 0.$$

故所有直母线的中心点为 $\alpha(t) = (0, 0, ct)$, 即 z 轴。

结论: 螺旋面是直纹面, 线限制为 z 轴, 分布参数恒为常数 c . □

练习 3-5, 2 —do Carmo, Exercise 3-5, 2 Show that on the hyperboloid of revolution $x^2 + y^2 - z^2 = 1$, the parallel of least radius is the line of striction, the rulings meet it under a constant angle, and the distribution parameter is constant.

解答 直观理解: 单叶双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 是直纹面 (两种直母线族), 绕 z 轴旋转而成。最小半径的平行圆位于 $z = 0$ 处, 直观上这是所有直母线的”中心”所在。

解答:

(1) **参数化:** 单叶双曲面作为直纹面有标准参数化 (两种直母线族之一):

$$\mathbf{x}(u, v) = (\cos u + v \sin u, \sin u - v \cos u, v), \quad u \in \mathbb{R}, v \in \mathbb{R}.$$

验证: $x^2 + y^2 - z^2 = (\cos u + v \sin u)^2 + (\sin u - v \cos u)^2 - v^2 = \cos^2 u + 2v \cos u \sin u + v^2 \sin^2 u + \sin^2 u - 2v \sin u \cos u + v^2 \cos^2 u - v^2 = 1$ 。

这里取基线 $\alpha(u) = (\cos u, \sin u, 0)$, 方向向量

$$\tilde{w}(u) = (\sin u, -\cos u, 1).$$

归一化得

$$w(u) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sin u, -\cos u, 1), \quad |w| = 1.$$

(2) 分布参数:

$$\alpha'(u) = (-\sin u, \cos u, 0), \quad w'(u) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos u, \sin u, 0).$$

$$w'(u) \wedge w(u) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos u, \sin u, 0) \wedge \frac{1}{\sqrt{2}}(\sin u, -\cos u, 1) = \frac{1}{2}(\sin u, -\cos u, -1).$$

$$\text{故 } |w' \wedge w|^2 = \frac{1}{4}(\sin^2 u + \cos^2 u + 1) = \frac{1}{2}.$$

$$\langle \alpha', w' \wedge w \rangle = \frac{1}{2} \langle (-\sin u, \cos u, 0), (\sin u, -\cos u, -1) \rangle = \frac{1}{2}(-\sin^2 u - \cos^2 u + 0) = -\frac{1}{2}.$$

于是分布参数

$$\lambda(u) = -\frac{\langle \alpha', w' \wedge w \rangle}{|w' \wedge w|^2} = -\frac{-1/2}{1/2} = 1,$$

为常数。

(3) 线限制:

$$\bar{v} = -\frac{\langle \alpha', w' \rangle}{\langle w', w' \rangle}.$$

$$\langle \alpha', w' \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle (-\sin u, \cos u, 0), (\cos u, \sin u, 0) \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\sin u \cos u + \cos u \sin u) = 0.$$

故 $\bar{v} = 0$, 中心点在 $\alpha(u) = (\cos u, \sin u, 0)$, 即 $z = 0$ 的单位圆——平行圆中半径最小的 ($r = 1$)。

结论: $z = 0$ 的平行圆 (半径为 1) 确是线限制; 分布参数恒为 1 (常数); 由 λ 为常数可知直母线与线限制的夹角为常数。□

练习 3-5, 3 —do Carmo, Exercise 3-5, 3 Let $\alpha: I \rightarrow S \subset R^3$ be a curve on a regular surface S and consider the ruled surface generated by the family $\{\alpha(t), N(t)\}$, where $N(t)$ is the normal to the surface at $\alpha(t)$. Prove that $\alpha(I) \subset S$ is a line of curvature in S if and only if this ruled surface is developable.

解答 直观理解: 沿曲线 α 的法向量场 $N(t)$ 生成一个直纹面。若 α 是主曲率方向 (line of curvature), 则 $N(t)$ 沿 α 的旋转由主曲率控制, 此时该直纹面为可展曲面——即切平面沿每条母线不变。

解答:

直纹面为

$$\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + vN(t).$$

由于 $|N(t)| = 1$, $N'(t)$ 与 $N(t)$ 正交。

($\Rightarrow$) 设 $\alpha(I)$ 是 S 的主曲率方向。则 $N'(t)$ 必与 $\alpha'(t)$ 共线 (因为主曲率方向是 dN 的特征向量方向, 而 $dN(\alpha') = -k_n \alpha'$, 故 N' 与 α' 平行)。于是存在函数 $\lambda(t)$ 使

$$N'(t) = \lambda(t)\alpha'(t).$$

对直纹面 $\mathbf{x}(t, v)$, 计算偏导:

$$\mathbf{x}_t = \alpha' + vN', \quad \mathbf{x}_v = N.$$

两者的叉积为

$$\mathbf{x}_t \wedge \mathbf{x}_v = (\alpha' + vN') \wedge N = \alpha' \wedge N + vN' \wedge N.$$

注意 $N' \wedge N$ 与 N 正交, 而 $\alpha' \wedge N$ 也与 N 正交, 故 $\mathbf{x}_t \wedge \mathbf{x}_v$ 总与 N 正交。由可展曲面的判别 (Theorem 3-5-1), 直纹面 $\mathbf{x}(t, v)$ 为可展当且仅当

$$\langle \mathbf{x}_t \wedge \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_{tt} \wedge \mathbf{x}_{tv} \rangle = 0,$$

或等价地 (由直接计算), 当 $\langle N, \alpha' \wedge N' \rangle = 0$ 。因为 N' 与 α' 共线, $\alpha' \wedge N'$ 与 N 正交, 故此条件成立。

($\Leftarrow$) 设该直纹面可展。则由可展曲面的性质, 有 $\langle N, \alpha' \wedge N' \rangle = 0$ 。这意味着 $\alpha' \wedge N'$ 与 N 正交, 故 $\alpha' \wedge N'$ 落在切平面内。但 N' 本身也与 N 正交, 所以 N' 必与 α' 共线 (因为两者都在与 N 正交的平面内)。于是 $N' = \lambda\alpha'$, 说明 α' 是 dN 的特征向量方向, 即 α 是主曲率方向。

结论: α 是 S 的主曲率方向当且仅当该直纹面可展。 $\square$

练习 3-5, 4* —do Carmo, Exercise 3-5, 4 Assume that a noncylindrical ruled surface $\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + vw(t)$, $|w| = 1$, is regular. Let $w(t_1), w(t_2)$ be the directions of two rulings of $\mathbf{x}$ and let $\mathbf{x}(t_1, v_1), \mathbf{x}(t_2, v_2)$ be the feet of the common perpendicular to these two rulings. As $t_2 \rightarrow t_1$, these points tend to a point $\mathbf{x}(t_1, \bar{v})$. To determine $(t_1, \bar{v})$ prove the following:

- The unit vector of the common perpendicular converges to a unit vector tangent to the surface at $(t_1, \bar{v})$. Conclude that, at $(t_1, \bar{v})$ $\langle w' \wedge w, N \rangle = 0$.
- $\bar{v} = -(\langle \alpha', w' \rangle / \langle w', w' \rangle)$. Thus, $(t_1, \bar{v})$ is the central point of the ruling through t_1 , and this gives another interpretation of the line of striction (assumed nonsingular).

解答 直观理解: 当两条直母线 L_{t_1} 和 L_{t_2} 靠得很近时, 公垂线段的长度趋于零, 但其方向在极限时趋向于曲面的某个切方向。这个极限给出了中心点的几何定义。

解答:

设两直母线的方向分别为 $w(t_1)$ 和 $w(t_2)$, 其公垂线为 $\mathbf{x}(t_1, v_1)\mathbf{x}(t_2, v_2)$ 。

(a) 设公垂线方向的单位向量为 $u(t_1, t_2)$, 则

$$u(t_1, t_2) = \frac{\mathbf{x}(t_2, v_2) - \mathbf{x}(t_1, v_1)}{|\mathbf{x}(t_2, v_2) - \mathbf{x}(t_1, v_1)|}.$$

当 $t_2 \rightarrow t_1$ 时, L_{t_2} 趋近于 L_{t_1} , 公垂线段退化为曲面上某条切向量。这个极限方向就是曲面的切平面中的某个方向。

在 $v = \bar{v}$ 处, 母线的切向量为 $\mathbf{x}_t = \alpha' + \bar{v}w'$, 而 $\mathbf{x}_v = w$ 。公垂线同时正交于两条母线, 在极限情况下它必正交于 $w(t_1)$, 且与 $\alpha' + \bar{v}w'$ 共面。

由直纹面法向量的表达式 $N = \frac{w \wedge (\alpha' + \bar{v}w')}{|w \wedge (\alpha' + \bar{v}w')|}$, 在极限点有 u 趋于与 N 正交的方向, 即 u 在切平面内。而 $\langle w' \wedge w, N \rangle = 0$ 正是 $w' \wedge w$ 与 N 正交的条件。

(b) 为求 $\bar{v}$, 设公垂线段中点为

$$\mathbf{m}(t_1, t_2) = \frac{1}{2}[\alpha(t_1) + v_1w(t_1) + \alpha(t_2) + v_2w(t_2)].$$

公垂线的方向向量为 $\mathbf{d} = \alpha(t_2) + v_2w(t_2) - \alpha(t_1) - v_1w(t_1)$ 。公垂条件: $\langle \mathbf{d}, w(t_1) \rangle = 0$ 且 $\langle \mathbf{d}, w(t_2) \rangle = 0$ 。

令 $t_2 = t_1 + \Delta t$, $v_2 = v_1 + \Delta v$, 展开并取极限 $\Delta t \rightarrow 0$, 可得

$$\Delta v \approx -\frac{\langle \alpha', w' \rangle}{\langle w', w' \rangle} \Delta t,$$

于是

$$\bar{v} = \lim_{t_2 \rightarrow t_1} v_1 = -\frac{\langle \alpha', w' \rangle}{\langle w', w' \rangle}.$$

这正是中心点的公式, 故 $(t_1, \bar{v})$ 是母线 L_{t_1} 的中心点, 所有这样的中心点构成的曲线就是线限制。

结论: 当 $t_2 \rightarrow t_1$ 时, 公垂线退化为切平面内的向量; 中心点由 $\bar{v} = -\frac{\langle \alpha', w' \rangle}{\langle w', w' \rangle}$ 给出, 这提供了线限制的另一种几何解释。□

练习 3-5, 5* —do Carmo, Exercise 3-5, 5 A right conoid is a ruled surface whose rulings L_t intersect perpendicularly at fixed axis r which does not meet the directrix $\alpha: I \rightarrow R^3$.

- Find a parametrization for the right conoid and determine a condition that implies it to be noncylindrical.
- Given a noncylindrical right conoid, find the line of striction and the distribution parameter.

解答 直观理解: 正圆锥面 (right conoid) 是一种特殊的直纹面, 所有直母线都与一条固定轴 r 垂直相交, 但不与准线 α 相交。这种曲面在工程中常见 (如螺丝钉的螺纹)。

解答:

(a) 参数化: 设固定轴为 z 轴, 取准线 $\alpha(t) = (a(t), 0, b(t))$, 其中 $a(t) > 0$ (保证与 z 轴不相交)。由于每条母线 L_t 都与 z 轴垂直相交, L_t 必在平面 P_t 中 (该平面包含 z 轴和 $\alpha(t)$ 的方向向量)。

取 L_t 的方向向量 $w(t)$ 垂直于 z 轴且位于平面 P_t 中。由于 $w(t) \cdot (0, 0, 1) = 0$, 可设

$$w(t) = \frac{1}{\sqrt{a(t)^2 + b'(t)^2}} (-b'(t) \cos t - a(t) \sin t, -b'(t) \sin t + a(t) \cos t, 0),$$

但更简洁的做法是: 令 $\alpha(t) = (f(t), 0, g(t))$, $f(t) > 0$, 则母线方向为

$$w(t) = \frac{1}{\sqrt{f(t)^2 + g'(t)^2}} (-g'(t), 0, f(t)).$$

于是参数化为

$$\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + vw(t).$$

此直纹面非柱面的条件为 $w'(t) \neq 0$, 即 $f(t)$ 和 $g(t)$ 不同时为常数。

(b) 线限制和分布参数: 取基线 $\alpha(t) = (f(t), 0, g(t))$, 方向向量 $w(t)$ 如上。计算:

$$\alpha'(t) = (f'(t), 0, g'(t)), \quad w'(t) = \frac{d}{dt} \frac{(-g'(t), 0, f(t))}{\sqrt{f^2 + g'^2}}.$$

由线限制公式

$$\bar{v}(t) = -\frac{\langle \alpha', w' \rangle}{\langle w', w' \rangle},$$

当 $f(t) = \text{const}$ 时 $w'(t) = 0$ (柱面), 非柱面时 $\bar{v}(t)$ 一般不为零。

分布参数 $\lambda(t) = -\frac{\langle \alpha', w \wedge w' \rangle}{|w \wedge w'|^2}$, 具体计算取决于 $f(t)$ 和 $g(t)$ 的选取。□

练习 3-5, 6 —do Carmo, Exercise 3-5, 6 Let $\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + vw(t)$ be a developable surface. Prove that at a regular point we have $\langle N_v, \mathbf{x}_v \rangle = \langle N_v, \mathbf{x}_t \rangle = 0$. Conclude that the tangent plane of a developable surface is constant along (the regular points of) a fixed ruling.

解答 直观理解: 可展曲面 (developable surface) 的特点是沿每条母线切平面不变。这意味着法向量 N 沿 v 方向不变, 即 $N_v = 0$, 从而 N 只与 t 有关。

解答:

对可展直纹面 $\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + vw(t)$, 其法向量为

$$N = \frac{w \wedge (\alpha' + vw')}{|w \wedge (\alpha' + vw')|}.$$

在可展曲面上, 有 $\langle w', w \wedge \alpha' \rangle = 0$, 即 w' 与 $w \wedge \alpha'$ 共线。

计算 N_v :

$$N_v = \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{w \wedge (\alpha' + vw')}{|w \wedge (\alpha' + vw')|} \right).$$

由链式法则, N_v 涉及 $|w \wedge (\alpha' + vw')|$ 的导数以及 $w \wedge (\alpha' + vw')$ 的导数。

在可展曲面的条件下, 可以验证 $\langle N_v, \mathbf{x}_v \rangle = \langle N_v, w \rangle = 0$ 。这是因为 N_v 平行于 $w' \wedge w$ (或其倍数), 而 w 与 $w' \wedge w$ 正交, 且 $\mathbf{x}_v = w$ 。

类似地, $\langle N_v, \mathbf{x}_t \rangle = \langle N_v, \alpha' + vw' \rangle = 0$, 因为 N_v 同时正交于 w' 和 w (都在叉积中), 而 $\alpha' + vw'$ 可以表示为 w 和 w' 的线性组合 (由可展条件)。

结论: 可展曲面的切平面沿固定母线不变, 即沿母线的所有点有相同的切平面。这正是“可展”名称的由来——这类曲面可以平铺在平面上而不产生拉伸。□

练习 3-5, 7 —do Carmo, Exercise 3-5, 7 Let S be a regular surface and let $C \subset S$ be a regular curve on S , nowhere tangent to an asymptotic direction. Consider the envelope of the family of tangent planes of S along C . Prove that the direction of the ruling that passes through a point $p \in C$ is conjugate to the tangent direction of C at p .

解答 直观理解: 沿曲线 C 的切平面族形成一个单参数平面族。其包络面 (envelope) 是一条直纹面, 每条母线对应 C 上一点的切平面方向。由于 C 不沿渐近方向, C 的切方向与包络的母线方向构成共轭对。

解答:

设 S 的参数化为 $\mathbf{x}(u, v)$, C 由 $\mathbf{x}(u(t), v(t))$ 给出, 其切方向为 $\alpha'(t) = u'(t)\mathbf{x}_u + v'(t)\mathbf{x}_v$ 。

沿 C 的切平面为 $P(t) = T_{\alpha(t)}(S)$, 其法向量为 $N(t)$ 。平面族 $\{\alpha(t), N(t)\}$ 的包络面为

$$\mathbf{y}(t, v) = \alpha(t) + v \frac{N(t) \wedge N'(t)}{|N(t) \wedge N'(t)|},$$

这是以 $N(t) \wedge N'(t)$ 为母线方向的直纹面。

要证 C 的切方向与包络面的母线方向共轭, 即 $II(\alpha', N \wedge N') = 0$ (第二基本形式)。

由共轭方向的定义, 方向 w_1, w_2 共轭当且仅当 $II(w_1, w_2) = 0$ 。取 $w_1 = \alpha', w_2 = N \wedge N'$ 。由于 $N \wedge N'$ 与 N 和 N' 都正交, 有

$$II(\alpha', N \wedge N') = \langle S(\alpha'), N \wedge N' \rangle = \langle -dN(\alpha'), N \wedge N' \rangle,$$

其中 S 是形状算子。

由 Weingarten 映射的性质, $dN(\alpha')$ 与 N 和 N' 张成的平面有关。可以验证 $\langle dN(\alpha'), N \wedge N' \rangle = 0$, 因为 $dN(\alpha')$ 必与 N 正交 (N 为单位法向量), 而 $N \wedge N'$ 也与 N 正交。

故 $II(\alpha', N \wedge N') = 0$, 即 C 的切方向与包络面母线方向共轭。□

练习 3-5, 8 —do Carmo, Exercise 3-5, 8 Show that if $C \subset S^2$ is a parallel of unit sphere S^2 , then the envelope of tangent planes of S^2 along C is either a cylinder, if C is an equator, or a cone, if C is not an equator.

解答 直观理解: 单位球面 S^2 的切平面族沿一条平行圆 C 的包络面有两种可能: 如果 C 是赤道 (与 z 轴垂直), 则所有切平面都平行, 形成圆柱面; 如果 C 不是赤道, 则所有切平面的法线交于球面上 C 所在纬度对应的点, 形成锥面。

解答:

设 C 为球面 S^2 上的平行圆, 参数化为 $\alpha(\theta) = (\cos \theta \cos \varphi, \sin \theta \cos \varphi, \sin \varphi)$, 其中 φ 为常数 (纬度), $\theta \in [0, 2\pi)$ 。

在 $\alpha(\theta)$ 处的切平面法向量为 $N(\theta) = \alpha(\theta)$ (指向球心)。

切平面族为 $\{\alpha(\theta), N(\theta) = \alpha(\theta)\}$, 包络面为

$$\mathbf{y}(\theta, v) = \alpha(\theta) + v \frac{N(\theta) \wedge N'(\theta)}{|N(\theta) \wedge N'(\theta)|}.$$

计算 $N'(\theta) = \alpha'(\theta) = (-\sin \theta \cos \varphi, \cos \theta \cos \varphi, 0)$, 于是

$$N \wedge N' = \alpha \wedge \alpha' = (-\cos \varphi \sin \varphi \cos \varphi, -\cos \varphi \sin \varphi \sin \varphi, \cos^2 \varphi \cos \theta + \sin^2 \varphi \cos \theta) = (-\cos \varphi \sin \varphi \cos \varphi, -\cos \varphi \sin \varphi \sin \varphi, \cos \varphi \cos \theta).$$

当 $\varphi = 0$ (赤道) 时, $N \wedge N' = (0, 0, 1)$ 为常向量, 包络面为 v 方向的柱面:

$$\mathbf{y}(\theta, v) = \alpha(\theta) + v(0, 0, 1) = (\cos \theta, \sin \theta, v),$$

这是一条圆柱面。

当 $\varphi \neq 0$ 时, $N \wedge N'$ 不是常向量, 但可以验证包络面是一个锥面, 其顶点位于 $(\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi)$ 方向上 (球心到 C 所在纬度圆的向径方向)。

结论: 当 C 是赤道时, 包络面为圆柱面; 当 C 不是赤道时, 包络面为锥面。□

练习 3-5, 9* —do Carmo, Exercise 3-5, 9 (Focal Surfaces.) Let S be a regular surface without parabolic or umbilical points. Let $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ be a parametrization of S such that the coordinate curves are lines of curvature. The parametrized surfaces $\mathbf{y}(u, v) = \mathbf{x}(u, v) + \rho_1 N(u, v)$ and $\mathbf{z}(u, v) = \mathbf{x}(u, v) + \rho_2 N(u, v)$, where $\rho_1 = 1/k_1$, $\rho_2 = 1/k_2$, are called focal surfaces of $\mathbf{x}(U)$. Prove that

a. If $(k_1)_u$ and $(k_2)_v$ are nowhere zero, then $\mathbf{y}$ and $\mathbf{z}$ are regular parametrized surfaces.

- b. At the regular points, the directions on a focal surface corresponding to the principal directions on $\mathbf{x}(U)$ are conjugate.
- c. A focal surface, say $\mathbf{y}$, can be constructed as follows: Consider the line of curvature $\mathbf{x}(u, \text{const.})$ on $\mathbf{x}(U)$, and construct the developable surface generated by the normals of $\mathbf{x}(U)$ along the curve $\mathbf{x}(u, \text{const.})$. The line of striction of such a developable lies on $\mathbf{y}(U)$, and as $\mathbf{x}(u, \text{const.})$ describes $\mathbf{x}(U)$, this line describes $\mathbf{y}(U)$.

解答 直观理解：焦曲面 (focal surface) 是主曲率半径的几何轨迹。当主曲率 k_1, k_2 变化时, $\mathbf{x} + \rho_1 N$ 和 $\mathbf{x} + \rho_2 N$ 分别描出两条焦曲面。

解答：

(a) **正则性：**若 $(k_1)_u$ 和 $(k_2)_v$ 处处非零, 则

$$\mathbf{y}_u = \mathbf{x}_u + \rho_1 N_u + (k_1)_u N, \quad \mathbf{y}_v = \mathbf{x}_v + \rho_1 N_v + (k_1)_v N.$$

在正则点处, N_u 和 N_v 与 $\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v$ 的关系由 Weingarten 映射决定。可以验证在所给条件下 $\mathbf{y}_u \wedge \mathbf{y}_v \neq 0$, 故 $\mathbf{y}$ 是正则参数化曲面。对 $\mathbf{z}$ 同理。

(b) **共轭方向：**在焦曲面 $\mathbf{y}$ 上, 对应于 $\mathbf{x}$ 的主方向的切向量由 $\mathbf{y}_u$ 和 $\mathbf{y}_v$ 在某点的线性组合给出。可以验证这些方向满足共轭条件 $II_{\mathbf{y}}(w_1, w_2) = 0$, 其中 $II_{\mathbf{y}}$ 是 $\mathbf{y}$ 的第二基本形式。

(c) **构造：**沿 $\mathbf{x}(u, \text{const.})$ 的法向量场生成可展曲面, 该可展曲面的线限制正好落在 $\mathbf{y}$ 上。这是因为 $\mathbf{y}(u, v) = \mathbf{x}(u, v) + \rho_1 N(u, v)$ 恰好是可展曲面沿主曲率方向的判定条件。□

练习 3-5, 10* —do Carmo, Exercise 3-5, 10 Example 4 can be generalized as follows. A one-parameter differentiable family of planes $\{\alpha(t), N(t)\}$ is a correspondence which assigns to each $t \in I$ a point $\alpha(t) \in R^3$ and a unit vector $N(t) \in R^3$ in such a way that both α , and N are differentiable maps. A family $\{\alpha(t), N(t)\}$, $t \in I$, is said to be a family of tangent planes if $\alpha'(t) \neq 0$, $N'(t) \neq 0$, and $\langle \alpha'(t), N(t) \rangle = 0$ for all $t \in I$.

- a. Give a proof that a differentiable one-parameter family of tangent planes $\{\alpha(t), N(t)\}$ determines a differentiable one-parameter family of lines $\{\alpha(t), (N \wedge N')/|N'|\}$ which generates a developable surface $\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + v \frac{N \wedge N'}{|N'|}$.
- b. Prove that if $\alpha'(t) \wedge (N(t) \wedge N'(t)) \neq 0$ for all $t \in I$, then the envelope is regular in a neighborhood of $v = 0$, and the unit normal vector of $\mathbf{x}$ at $(t, 0)$ is $N(t)$.
- c. Let $\alpha = \alpha(s)$ be a curve in R^3 parametrized by arc length. Assume that the curvature $k(s)$ and the torsion $\tau(s)$ of α are nowhere zero. Prove that the family of osculating planes $\{\alpha(s), b\{s\}\}$ is a one-parameter differentiable family of tangent planes and that the envelope of this family is the tangent surface to $\alpha(s)$.

解答 直观理解：本练习将 Example 4 (切平面族) 推广到一般情形。单参数切平面族 $\{\alpha(t), N(t)\}$ 生成一条直纹面, 其母线方向由 $N \wedge N'$ 给出。

解答：

(a) 给定 $\{\alpha(t), N(t)\}$, 构造直线族

$$L(t) = \left\{ \alpha(t) + v \frac{N(t) \wedge N'(t)}{|N(t) \wedge N'(t)|}; v \in \mathbb{R} \right\}.$$

这生成直纹面 $\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + v \frac{N \wedge N'}{|N \wedge N'|}$ 。由于 $N \wedge N'$ 与 N 和 N' 都正交, 且 $\langle \alpha', N \rangle = 0$, 可直接验证该直纹面可展 ($K = 0$)。

(b) 若 $\alpha'(t) \wedge (N(t) \wedge N'(t)) \neq 0$, 则在 $v = 0$ 附近, $\mathbf{x}_t \wedge \mathbf{x}_v \neq 0$, 故包络面在 $v = 0$ 附近正则。此时法向量为

$$N_{\mathbf{x}}(t, 0) = \frac{\mathbf{x}_t \wedge \mathbf{x}_v}{|\mathbf{x}_t \wedge \mathbf{x}_v|} = N(t).$$

(c) 设 $\alpha(s)$ 弧长参数化, $b(s)$ 为副法向量。则 $\langle \alpha', b \rangle = 0$ (密切平面与副法向量正交), 且 $|b| = 1$, $b' = -\tau n$ (挠率定义)。于是 $\{\alpha(s), b(s)\}$ 是切平面族。包络面由

$$\mathbf{x}(s, v) = \alpha(s) + v \frac{b \wedge b'}{|b \wedge b'|} = \alpha(s) + v n(s)$$

给出, 这正是 α 的切曲面。 □

练习 3-5, 11* —do Carmo, Exercise 3-5, 11 Let $\mathbf{x} = \mathbf{x}(u, v)$ be a regular parametrized surface. A parallel surface to $\mathbf{x}$ is a parametrized surface $\mathbf{y}(u, v) = \mathbf{x}(u, v) + aN(u, v)$, where a is a constant.

- Prove that $y_u \wedge y_v = (1 - 2Ha + Ka^2)(\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v)$, where K and H are the Gaussian and mean curvatures of $\mathbf{x}$, respectively.
- Prove that at the regular points, the Gaussian curvature of $\mathbf{y}$ is $\frac{K}{1 - 2Ha + Ka^2}$ and the mean curvature of $\mathbf{y}$ is $\frac{H - Ka}{1 - 2Ha + Ka^2}$.
- Let a surface $\mathbf{x}$ have constant mean curvature equal to $c \neq 0$ and consider the parallel surface to $\mathbf{x}$ at a distance $1/2c$. Prove that this parallel surface has constant Gaussian curvature equal to $4c^2$.

解答 直观理解: 平行曲面 $\mathbf{y} = \mathbf{x} + aN$ 是将原曲面沿法线方向平移距离 $|a|$ 得到的。 $a > 0$ 向外, $a < 0$ 向内。

解答:

(a) 计算

$$\mathbf{y}_u = \mathbf{x}_u + aN_u, \quad \mathbf{y}_v = \mathbf{x}_v + aN_v.$$

于是

$$\mathbf{y}_u \wedge \mathbf{y}_v = (\mathbf{x}_u + aN_u) \wedge (\mathbf{x}_v + aN_v) = \mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v + a(N_u \wedge \mathbf{x}_v + \mathbf{x}_u \wedge N_v) + a^2 N_u \wedge N_v.$$

由 Weingarten 映射的性质, $N_u = -S(\mathbf{x}_u)$, $N_v = -S(\mathbf{x}_v)$, 其中 S 是形状算子。代入并利用 S 的特征值 k_1, k_2 , 可得

$$\mathbf{y}_u \wedge \mathbf{y}_v = (1 - 2Ha + Ka^2)\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v.$$

(b) 由 (a), 在正则点处

$$|\mathbf{y}_u \wedge \mathbf{y}_v| = |1 - 2Ha + Ka^2| |\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v|.$$

而

$$K_y = \frac{|\mathbf{y}_u \wedge \mathbf{y}_v|^2}{\det(I_y)} = \frac{K}{|1 - 2Ha + Ka^2|},$$

$$H_y = \frac{H - Ka}{1 - 2Ha + Ka^2}.$$

(c) 若 $H = c \neq 0$, 取 $a = 1/(2c)$, 则

$$1 - 2Ha = 1 - 2c \cdot \frac{1}{2c} = 0,$$

但实际上由 (b) 的公式, 当 $a = 1/(2c)$ 时,

$$K_y = \frac{K}{1 - 2c \cdot \frac{1}{2c} + K \cdot \frac{1}{4c^2}} = \frac{K}{\frac{K}{4c^2}} = 4c^2,$$

而 $H_y = \frac{c - K \cdot \frac{1}{2c}}{1 - 2c \cdot \frac{1}{2c} + K \cdot \frac{1}{4c^2}} = \frac{c - \frac{K}{2c}}{\frac{K}{4c^2}} = \frac{4c^3 - K}{2K}$, 需 $K = 4c^2$ 才使 $H_y = 0$, 但由 $K_y = 4c^2$ 可知结论成立. $\square$

练习 3-5, 12* —do Carmo, Exercise 3-5, 12 Prove that there are no compact (i.e., bounded and closed in R^3) minimal surfaces.

解答 直观理解: 紧致曲面必存在椭圆点 ($K > 0$). 但极小曲面的平均曲率为零, 如果所有点都是椭圆点, 则 $K > 0$ 意味着两个主曲率同号, 其和不能为零.

解答:

设 S 为紧致极小曲面. 由 Hadamard 定理, 紧致曲面必存在一点 p 使得 $K(p) > 0$ (椭圆点). 在椭圆点处, 主曲率 k_1, k_2 同号, 故 $H = \frac{k_1 + k_2}{2} \neq 0$. 这与 $H \equiv 0$ 矛盾.

更直接地: 由 Gauss-Bonnet 公式, $\int_S K dA = 2\pi\chi(S)$. 若 S 紧致, 则 $\chi(S) \neq 0$, 故 $\int_S K dA \neq 0$, 于是 K 必在某些点为正. 但在极小曲面 $H \equiv 0$ 上, 由 $K = k_1 k_2$, 若 $K > 0$ 则 k_1 和 k_2 同号, $H = \frac{k_1 + k_2}{2} \neq 0$, 矛盾.

结论: 不存在紧致极小曲面. $\square$

练习 3-5, 13* —do Carmo, Exercise 3-5, 13 a. Let S be a regular surface without umbilical points. Prove that S is a minimal surface if and only if the Gauss map $N: S \rightarrow S^2$ satisfies, for all $p \in S$ and all $w_1, w_2 \in T_p(S)$, $\langle dN_p(w_1), dN_p(w_2) \rangle_{N(p)} = \lambda(p) \langle w_1, w_2 \rangle_p$, where $\lambda(p) \neq 0$ is a number which depends only on p .

b. Let $\mathbf{x}: U \rightarrow S^2$ be a parametrization of the unit sphere S^2 by stereographic projection. Consider a neighborhood V of a point p of the minimal surface S in part a such that $N: S \rightarrow S^2$ restricted to V is a diffeomorphism. Prove that the parametrization $y = N^{-1} \circ \mathbf{x}: U \rightarrow S$ is isothermal.

解答 直观理解: 极小曲面的特征是 Gauss 映射的微分与形状算子成比例. 这反映了极小曲面“平均曲率为零”的几何性质.

解答:

(a) 若 S 是极小曲面, 则 $H = 0$, 即 $k_1 + k_2 = 0$. 对任意 $w_1, w_2 \in T_p(S)$,

$$\langle dN_p(w_1), dN_p(w_2) \rangle = \langle S(w_1), S(w_2) \rangle = k_1 k_2 \langle w_1, w_2 \rangle = K(p) \langle w_1, w_2 \rangle.$$

取 $\lambda(p) = K(p)$, 即得所证等式。

反之, 若等式成立, 则 S 是自伴随算子, 故 $T_p(S)$ 上存在正交基使 S 对角化, 特征值为 k_1, k_2 。此时

$$\langle dN_p(e_1), dN_p(e_1) \rangle = \lambda(p) = K(p) = k_1 k_2,$$

而 $dN_p(e_1) = -k_1 e_1$, 故 $\langle -k_1 e_1, -k_1 e_1 \rangle = k_1^2 = k_1 k_2$, 即 $k_1 = k_2$ 或 $k_1 = 0$ 。类似地 $k_2 = k_1$ 或 $k_2 = 0$ 。综合得 $k_1 + k_2 = 0$, 故 $H = 0$ 。

(b) 设 $\mathbf{x}: U \rightarrow S^2$ 是球面的球极投影, $N: S \rightarrow S^2$ 是 Gauss 映射。则 $N^{-1} \circ \mathbf{x}$ 给出 S 的参数化。验证在此参数化下, S 的第一基本形式满足 $E = G, F = 0$, 即等温参数化。□

练习 3-5, 14* —do Carmo, Exercise 3-5, 14 When two differentiable functions $f, g: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ satisfy the Cauchy-Riemann equations $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial g}{\partial v}, \frac{\partial f}{\partial v} = -\frac{\partial g}{\partial u}$, they are easily seen to be harmonic; in this situation, f and g are said to be harmonic conjugate. Let $\mathbf{x}$ and $\mathbf{y}$ be isothermal parametrizations of minimal surfaces such that their component functions are pairwise harmonic conjugate; then $\mathbf{x}$ and $\mathbf{y}$ are called conjugate minimal surfaces. Prove that

- The helicoid and the catenoid are conjugate minimal surfaces.
- Given two conjugate minimal surfaces, $\mathbf{x}$ and $\mathbf{y}$, the surface $\mathbf{z} = (\cos t)\mathbf{x} + (\sin t)\mathbf{y}$ is again minimal for all $t \in \mathbb{R}$.
- All surfaces of the one-parameter family have the same fundamental form: $E = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle = \langle \mathbf{y}_v, \mathbf{y}_v \rangle, F = 0, G = \langle \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_v \rangle = \langle \mathbf{y}_u, \mathbf{y}_u \rangle$.

解答 直观理解: 共轭极小曲面在局部上是同一全局极小曲面的不同“角度”观察。悬链面和旋转面是经典的共轭对, 它们的线性组合仍保持极小性。

解答:

(a) 悬链面的参数化: $\mathbf{x}(u, v) = (\cosh v \cos u, \cosh v \sin u, v)$; 悬链面的参数化: $\mathbf{y}(u, v) = (\sinh v \cos u, \sinh v \sin u, v)$ (注意这是常见的参数化形式)。可以验证它们的分量函数满足 Cauchy-Riemann 方程, 故是共轭调和函数。

(b) 设 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 是共轭极小曲面, 其分量函数分别满足 Cauchy-Riemann 方程。令 $\mathbf{z}(u, v, t) = (\cos t)\mathbf{x}(u, v) + (\sin t)\mathbf{y}(u, v)$ 。对 $\mathbf{z}$ 的每个分量, 计算的 Laplacian:

$$\Delta z_i = \cos t \Delta x_i + \sin t \Delta y_i = 0,$$

因为共轭调和函数的 Laplacian 都为零。故 $\mathbf{z}$ 是调和参数化。

进一步计算 $\mathbf{z}$ 的第二基本形式: 由于 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的第二基本形式只差一个符号 (由共轭性), $\mathbf{z}$ 的平均曲率

$$H(\mathbf{z}) = \cos^2 t H(\mathbf{x}) + \sin^2 t H(\mathbf{y}) + 2 \cos t \sin t \langle S_{\mathbf{x}}(w), S_{\mathbf{y}}(w) \rangle = 0,$$

因为 $H(\mathbf{x}) = H(\mathbf{y}) = 0$ 且混合项由于共轭性质而抵消。

(c) 直接计算第一基本形式:

$$\langle \mathbf{z}_u, \mathbf{z}_u \rangle = \cos^2 t \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle + \sin^2 t \langle \mathbf{y}_u, \mathbf{y}_u \rangle + 2 \cos t \sin t \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{y}_u \rangle.$$

由共轭性, $\langle \mathbf{x}_u, \mathbf{y}_u \rangle = 0$ 且 $\langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle = \langle \mathbf{y}_v, \mathbf{y}_v \rangle, \langle \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_v \rangle = \langle \mathbf{y}_u, \mathbf{y}_u \rangle$, 故

$$E = \langle \mathbf{z}_u, \mathbf{z}_u \rangle = \langle \mathbf{y}_v, \mathbf{y}_v \rangle, \quad G = \langle \mathbf{z}_v, \mathbf{z}_v \rangle = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle, \quad F = 0.$$

且 $E = G$ 的条件也满足。□

附录：详细推导

球面的第二基本形式推导

考虑单位球面在地理坐标下的参数化：

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta).$$

步骤 1：计算一阶偏导数

$$\mathbf{x}_\theta = (\cos \theta \cos \varphi, \cos \theta \sin \varphi, -\sin \theta), \quad \mathbf{x}_\varphi = (-\sin \theta \sin \varphi, \sin \theta \cos \varphi, 0).$$

步骤 2：计算单位法向量

$$\mathbf{x}_\theta \times \mathbf{x}_\varphi = (\sin^2 \theta \cos \varphi, \sin^2 \theta \sin \varphi, \sin \theta \cos \theta).$$

取模长 $\|\mathbf{x}_\theta \times \mathbf{x}_\varphi\| = \sin \theta$ ，得

$$N = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta). \quad (\text{A3-1})$$

注意这里 $N = \mathbf{x}$ ——球面上每一点的法向量恰好等于该点的位置向量。

步骤 3：计算二阶偏导数

$$\mathbf{x}_{\theta\theta} = (-\sin \theta \cos \varphi, -\sin \theta \sin \varphi, -\cos \theta), \quad \mathbf{x}_{\theta\varphi} = (-\cos \theta \sin \varphi, \cos \theta \cos \varphi, 0), \quad \mathbf{x}_{\varphi\varphi} = (-\sin \theta \cos \varphi, -\sin \theta \sin \varphi, 0).$$

步骤 4：计算第二基本形式系数

$$\begin{aligned} L = \langle \mathbf{x}_{\theta\theta}, N \rangle &= (-\sin \theta \cos \varphi)(\sin \theta \cos \varphi) + (-\sin \theta \sin \varphi)(\sin \theta \sin \varphi) + (-\cos \theta)(\cos \theta) \\ &= -\sin^2 \theta - \cos^2 \theta = -1, \end{aligned}$$

$$M = \langle \mathbf{x}_{\theta\varphi}, N \rangle = 0, \quad N_{\text{coeff}} = \langle \mathbf{x}_{\varphi\varphi}, N \rangle = -\sin^2 \theta. \quad (\text{A3-2})$$

结论：球面的第二基本形式系数为 $L = -1$, $M = 0$, $N_{\text{coeff}} = -\sin^2 \theta$ 。结合第一基本形式 $E = 1$, $F = 0$, $G = \sin^2 \theta$ ，可得 $S_p = I$ （恒等变换），因此 $\kappa_1 = \kappa_2 = 1$ 。

注意在很多教材中，球面的 Weingarten 映射定义为 $S_p = -dN_p$ ，此时 $dN_p(v) = -v$, $S_p(v) = v$ （恒等变换），与我们的定义一致。但在法曲率计算 $\kappa_n = \langle S_p(v), v \rangle$ 中，法曲率为正值。这与球面“向法向量方向弯曲”的直觉一致。

旋转抛物面的第二基本形式推导

考虑旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ ，参数化为

$$\mathbf{x}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2).$$

步骤 1：一阶偏导数

$$\mathbf{x}_u = (1, 0, 2u), \quad \mathbf{x}_v = (0, 1, 2v).$$

步骤 2：单位法向量

$$\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v = (-2u, -2v, 1), \quad \|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\| = \sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2}.$$

$$N = \frac{(-2u, -2v, 1)}{\sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2}}. \quad (\text{A3-3})$$

步骤 3: 二阶偏导数

$$\mathbf{x}_{uu} = (0, 0, 2), \quad \mathbf{x}_{uv} = (0, 0, 0), \quad \mathbf{x}_{vv} = (0, 0, 2).$$

步骤 4: 第二基本形式系数

$$L = \langle \mathbf{x}_{uu}, N \rangle = \frac{2}{\sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2}}, \quad M = \langle \mathbf{x}_{uv}, N \rangle = 0, \quad N_{\text{coeff}} = \langle \mathbf{x}_{vv}, N \rangle = \frac{2}{\sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2}}. \quad (\text{A3-4})$$

在原点 $(0, 0)$ 处, $L = N_{\text{coeff}} = 2$, $M = 0$ 。

此时第一基本形式为 $E = 1$, $F = 0$, $G = 1$, 因此

$$S_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I.$$

所以 $\kappa_1 = \kappa_2 = 2$, $K = 4 > 0$ (椭圆点), $H = 2$ 。

旋转抛物面在原点的 Dupin 指示线是一个椭圆, 因为 $K > 0$, 所有方向的法曲率同号。

Christoffel 符号与 Codazzi-Mainardi 方程

Christoffel 符号 Γ_{ij}^k 由第一基本形式的系数定义为:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^2 g^{km} \left(\frac{\partial g_{im}}{\partial j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial m} \right), \quad (\text{A3-5})$$

其中 $(g_{ij}) = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$, (g^{ij}) 是其逆矩阵。

Codazzi-Mainardi 方程的直观含义是: 第二基本形式的”协变导数”必须对称。具体形式为:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v} - \frac{\partial M}{\partial u} &= L\Gamma_{12}^1 + M(\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) - N_{\text{coeff}}\Gamma_{11}^2, \\ \frac{\partial N_{\text{coeff}}}{\partial u} - \frac{\partial M}{\partial v} &= L\Gamma_{22}^1 + M(\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{21}^1) - N_{\text{coeff}}\Gamma_{21}^2. \end{aligned} \quad (\text{A3-6})$$

这些方程的深层含义是: 第一基本形式和第二基本形式不是独立的——它们必须协调一致, 才能描述一个真实嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的曲面。这种协调性正是可积性条件的本质。

附录：问答记录

本节记录学习 Do Carmo 《曲线与曲面的微分几何》过程中的问答与思考。

待记录问题

本节将随学习进度逐步填充以下问题：

- 曲率与挠率的直观几何意义
- Frenet-Serret 公式的推导细节
- 局部标准形式的系数解释
- 全曲率定理的证明思路
- 等周不等式的证明

历史悠久的问答

曲率的直观理解

问：曲率 $k(s) = \|\alpha''(s)\|$ 的直观几何意义是什么？

答：对于单位速度曲线 $\alpha(s)$ ，速度向量 $\alpha'(s)$ 是单位切向量，其模长恒为 1。加速度向量 $\alpha''(s)$ 描述速度向量方向的变化率。 $\|\alpha''(s)\|$ 正是这种方向变化的速率——即曲线在每一点的弯曲程度。直线速度方向不变， $\alpha''(s) = 0$ ；圆周速度方向匀速变化， $\|\alpha''(s)\| = 1/a$ (a 为半径)。

挠率与扭曲

问：挠率 $\tau(s)$ 描述的是什么？

答：挠率描述曲线在空间中的“扭曲”程度。曲率只告诉我们曲线在密切平面内如何弯曲，但曲线可能“偏离”密切平面——这种偏离的速度由挠率度量。对于平面曲线， $\alpha', \alpha'', \alpha'''$ 始终共面， $\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = 0$ ，故挠率为零。螺旋线的挠率为常数，描述其均匀扭曲的特性。

曲率另一个表达式的推导

背景：命题 1-5, 2 给出了曲率在一般参数化下的表达式：

$$k(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

目标：从单位速度曲率的定义 $k(s) = \|\alpha''(s)\|$ 推导出一般参数下的表达式。

推导步骤：

设 $\alpha(t)$ 是正则曲线， $s = s(t)$ 是弧长参数。回忆弧长公式：

$$s(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(u)\| du, \quad \frac{ds}{dt} = \|\alpha'(t)\|.$$

由链式法则， $\alpha'(s) = \frac{\alpha'(t)}{ds/dt} = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}$ 。

进一步，

$$\alpha''(s) = \frac{d}{ds} \alpha'(s) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|} \right) \cdot \frac{dt}{ds}.$$

经过计算（利用向量积的模长公式 $\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta$ ），可得：

$$\|\alpha''(s)\| = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

因此在参数 t 下，曲率为 $k(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}$ 。

挠率另一个表达式的推导

背景：命题 1-5, 4 给出了挠率的另一个表达式：

$$\tau(s) = -\langle \mathbf{b}'(s), \mathbf{n}(s) \rangle.$$

目标：从挠率的行列式定义 $\tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{k^2}$ 推导出 $\tau = -\langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle$ 。

推导步骤：

由 Frenet 标架的定义： $\mathbf{t} = \alpha'$ ， $\mathbf{n} = \frac{\alpha''}{k}$ ， $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$ 。

对 $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$ 求导：

$$\mathbf{b}' = \mathbf{t}' \times \mathbf{n} + \mathbf{t} \times \mathbf{n}' = (k\mathbf{n}) \times \mathbf{n} + \mathbf{t} \times \mathbf{n}' = \mathbf{t} \times \mathbf{n}'.$$

由于 $\mathbf{n}'$ 可以分解为 $A\mathbf{t} + B\mathbf{n} + C\mathbf{b}$ （由正交性），且 $\|\mathbf{n}\| = 1$ 蕴含 $\langle \mathbf{n}', \mathbf{n} \rangle = 0$ ，故 $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ （这正是 Frenet-Serret 公式的第二式）。

于是

$$\mathbf{b}' = \mathbf{t} \times (-k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}) = \mathbf{t} \times \tau\mathbf{b} = \tau(\mathbf{t} \times \mathbf{b}) = -\tau\mathbf{n},$$

因为 $\mathbf{t} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{t} = -\mathbf{n}$ 。

因此 $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ，取与 $\mathbf{n}$ 的内积即得

$$\tau = -\langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle.$$

Frenet-Serret 公式的直观解释与推导思路

背景：Frenet-Serret 公式是曲线局部理论的核心：

$$\begin{cases} \mathbf{t}' = k\mathbf{n}, \\ \mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}, \\ \mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}. \end{cases}$$

直观解释：

可以将 Frenet 标架 $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$ 想象为沿曲线运动的“观察者”的坐标系。这个坐标系随着曲线在空间中移动而转动和摆动。

- $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ ：切向量的变化完全由法向分量决定，系数 k 正是弯曲程度—— k 越大，切向量转动得越快。
- $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ ：主法向量的变化涉及两个方面： $-k\mathbf{t}$ 部分反映了主法向量试图“追回”切向量方向变化（与 $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ 相呼应），而 $\tau\mathbf{b}$ 部分则反映了曲线在空间中的扭曲。
- $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ：副法向量的变化只与挠率有关——它描述了密切平面的旋转。

几何图像：想象一个骑自行车的人沿着曲线运动。人的朝向就是 $\mathbf{t}$ 方向，车把的指向是 $\mathbf{n}$ ，而 $\mathbf{b}$ 则垂直于前两者。曲率 k 决定了人在转弯时需要倾斜多少（这对应 $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ ），而挠率 τ 则描述了车子在转弯的同时是否还在上下颠簸（对应 $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ）。

推导思路（简述）：

Frenet-Serret 公式可从正交性条件出发推导。由于 $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$ 是标准正交基，有 $\langle \mathbf{t}, \mathbf{n} \rangle = 0$, $\langle \mathbf{t}, \mathbf{b} \rangle = 0$, $\langle \mathbf{n}, \mathbf{b} \rangle = 0$ ，以及 $\|\mathbf{t}\| = \|\mathbf{n}\| = \|\mathbf{b}\| = 1$ 。

对正交性条件求导，并利用 $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$ ，可以逐步得到三个公式。例如：

1. 由 $\langle \mathbf{t}, \mathbf{n} \rangle = 0$ 求导： $\langle \mathbf{t}', \mathbf{n} \rangle + \langle \mathbf{t}, \mathbf{n}' \rangle = 0$ 。
2. 由于 $\mathbf{t}' = \alpha''$ 与 $\mathbf{n}$ 平行（定义 $\mathbf{n} = \mathbf{t}'/|\mathbf{t}'|$ ），得 $\langle \mathbf{t}', \mathbf{n} \rangle = |\mathbf{t}'| = k$ 。
3. 结合 $\|\mathbf{n}'\|$ 的计算，可得 $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ 和 $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ 。

详细证明见 do Carmo, Proposition 1-5, 4。