

# Schubert 多项式学习笔记



## Contents

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 引言：文献概述                                                  | 9  |
| 引言：文献概述                                                  | 9  |
| 1. 总述                                                    | 9  |
| 2. 研究目标                                                  | 9  |
| 3. 术语对照表                                                 | 9  |
| 4. 文献摘要总结                                                | 10 |
| 5. 补充参考资料                                                | 11 |
| 6. 学习路径与前置基础知识                                           | 13 |
| 7. 最终目标                                                  | 14 |
| Chapter 1. Graham Positivity of Triple Schubert Calculus | 15 |
| 1. 预备知识                                                  | 15 |
| 2. 引言                                                    | 29 |
| 3. 主要定理的证明                                               | 33 |
| Chapter 2. Samuel's Molev-Sagan Type Formula             | 39 |
| 1. 引言：从一道经典问题到现代 Schubert 演算                             | 39 |
| 2. Separated Descents: 分离的下降点                            | 39 |
| 3. 乘积公式 (Theorem 3.1)                                    | 41 |
| 4. 证明思路: Path 图 (Path Diagram) 方法                        | 42 |
| 5. The Proof of the Main Formula: 主要公式的证明                | 42 |
| 6. Pieri 公式 (Theorem 7.1)                                | 44 |
| 7. Dominant Approximation: 主导逼近                          | 44 |
| 8. 关键引理一览                                                | 44 |
| 9. 示例                                                    | 45 |
| 10. 与其他章节的联系                                             | 46 |
| 11. 本章小结                                                 | 46 |
| 12. 附录: 主要公式的详细证明                                        | 47 |
| 13. 附录: Path 图的详细定义                                      | 48 |
| 14. 附录: Dominant Approximation 的详细证明                     | 48 |
| 15. 附录: Pieri 公式的几何背景                                    | 48 |
| 16. 附录: Lemma 2.5 的详细证明                                  | 49 |
| 17. 附录: Molev-Sagan 公式的原始版本                              | 49 |
| 18. 附录: Separated Descents 的几何解释                         | 49 |
| 19. 附录: Path 图的分类                                        | 50 |
| 20. 附录: 乘积公式与 Schubert 上同调的关系                            | 50 |
| 21. 附录: Dominant Approximation 的几何意义                     | 51 |
| 22. 附录: Samuel 2024 年工作的创新点                              | 51 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 23. 附录：计算示例—— $S_4$ 中的完整计算                                           | 51 |
| Chapter 3. Quantum Double Schubert Polynomials                       | 53 |
| 1. 引言：从经典几何到曲线计数——为什么要引入量子版本？                                        | 53 |
| 2. 经典回顾：除差算子与 Schubert 多项式                                           | 53 |
| 3. 量子上同调的基本框架                                                        | 54 |
| 4. 量子双重 Schubert 多项式的定义                                              | 56 |
| 5. 主要性质                                                              | 57 |
| 6. 量子 Schubert 多项式                                                   | 58 |
| 7. 量子 Cauchy 恒等式                                                     | 58 |
| 8. Lascoux-Schützenberger 型公式                                        | 59 |
| 9. 与三重 Schubert Positivity 的联系                                       | 59 |
| 10. Vafa-Intriligator 公式                                             | 60 |
| 11. 量子化映射                                                            | 60 |
| 12. 与其他工作的关系                                                         | 60 |
| 13. 本章小结                                                             | 60 |
| 14. 附录：量子初等对称函数的显式公式                                                 | 61 |
| 15. 附录：Vafa-Intriligator 公式的详细推导                                     | 61 |
| 16. 附录：Grothendieck 留数的定义                                            | 61 |
| 17. 附录：量子 Cauchy 恒等式的证明思路                                            | 62 |
| 18. 附录：两种量子化方法的比较                                                    | 62 |
| 19. 附录：量子上同调与经典上同调的比较表                                               | 62 |
| 20. 附录：Gromov-Witten 不变量的详细定义                                        | 62 |
| 21. 附录：量子上同调的物理起源                                                    | 63 |
| 22. 附录：量子多重性的几何意义                                                    | 63 |
| 23. 附录：旗流形的 Vafa-Intriligator 公式                                     | 63 |
| 24. 附录：量子 Schubert 多项式的正交性证明                                         | 64 |
| 25. 附录：量子化映射的进一步性质                                                   | 64 |
| Chapter 4. Positivity in Equivariant Quantum Schubert Calculus       | 65 |
| 1. 引言：从经典到量子——为什么要推广？                                                | 65 |
| 2. 历史脉络：Peterson 猜想                                                  | 65 |
| 3. 等变量子上同调的定义                                                        | 66 |
| 4. 主要定理                                                              | 70 |
| 5. 证明思路：归约到 Graham 定理                                                | 71 |
| 6. 与三重 Schubert Positivity 的联系                                       | 74 |
| 7. 几何意义                                                              | 76 |
| 8. 本章小结                                                              | 77 |
| 9. 附录：Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数正性证明详解             | 77 |
| Chapter 5. Quantum Double Schubert Polynomials Positivity Conjecture | 81 |
| 1. From Classical to Quantum: Why Extend?                            | 81 |
| 2. The Quantum Double Schubert Positivity Conjecture                 | 81 |
| 3. Kirillov's Conjecture on Skew Divided Difference Operators        | 83 |
| 4. Refined Graham Positivity Theorem                                 | 84 |
| 5. Grothendieck Positivity Conjecture                                | 84 |
| 6. Geometric Interpretation                                          | 85 |
| 7. Current State                                                     | 85 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8. Remarks                                                               | 85  |
| Chapter 6. Equivariant Quantum Cohomology of Flag Manifolds              | 87  |
| 1. Historical Context and Motivation                                     | 87  |
| 2. Flag Manifolds and Tautological Bundles                               | 87  |
| 3. Quantum Multiplication                                                | 88  |
| 4. The Connected Fraction Formula                                        | 88  |
| 5. The Equivariant Generalization                                        | 89  |
| 6. The Three Fundamental Properties                                      | 89  |
| 7. From Theorem 2 to Theorem 1: Specialization                           | 90  |
| 8. Gromov-Witten Classes                                                 | 91  |
| 9. The Splitting Axiom                                                   | 91  |
| 10. Equivariant Gromov-Witten Classes                                    | 92  |
| 11. Relation to Toda Lattice                                             | 92  |
| 12. Historical Remarks                                                   | 93  |
| Chapter 7. Graham's Theorem: Positivity in Equivariant Schubert Calculus | 95  |
| 1. Introduction and Historical Background                                | 95  |
| 2. Main Theorem                                                          | 95  |
| 3. Affine Schubert Varieties and the Geometric Framework                 | 96  |
| 4. Peterson Degeneration                                                 | 96  |
| 5. Main Steps of the Proof                                               | 97  |
| 6. Relationship with Classical Schubert Calculus                         | 98  |
| 7. Subsequent Developments and Influence                                 | 98  |
| 8. Technical Details                                                     | 99  |
| 9. Conclusion                                                            | 99  |
| 附录: 问答记录                                                                 | 101 |
| 10. 为何限制到 $GL_m(\mathbb{C})$                                             | 101 |
| 11. 为何使用 $S_\infty$ 而非 $S_n$                                             | 101 |
| 12. $S_\infty$ 的定义与直观理解                                                  | 102 |
| 13. Skew 除差算子与除差算子的关系                                                    | 102 |
| 14. 逆除差算子的定义                                                             | 103 |
| 15. 双重与三重 Schubert 多项式的区别                                                | 104 |
| 16. 等变量子上同调类的定义                                                          | 104 |
| 17. Lascoux-Schützenberger 型代表元                                          | 105 |
| 18. 分类空间 ET 的直观理解                                                        | 105 |
| 19. Torus 作用与分类空间 ET                                                     | 106 |
| 20. 等变量子上同调与量子同调的区别                                                      | 107 |
| 21. Hilbert 第十五问题与 Schubert 演算                                           | 107 |
| 22. $S_\infty$ 的例子                                                       | 108 |
| 23. 量子上同调的定义                                                             | 109 |
| 24. Theorem 1.1 的例子: Triple Schubert Positivity                          | 109 |
| 25. Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2                                       | 110 |
| 26. Knutson-Tao (2003) 展开系数的几何意义                                         | 111 |
| 27. Gao-Xiong 与 Knutson-Tao 解释的不同                                        | 111 |
| 28. Graham Positivity 中 Grassmannian 限制的作用                               | 112 |
| 29. 什么是 Schur 函数?                                                        | 114 |

|     |                                                                        |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 30. | 为什么 Graham Positivity 要求 $u, v$ 是 Grassmannian 排列?                     | 115 |
| 31. | Graham Positivity 中展开系数的“非负性”含义                                        | 115 |
| 32. | 第一章第三节的定理脉络: 三层定理与三层引理                                                 | 116 |
| 33. | 几何相交如何翻译为代数展开系数                                                        | 117 |
| 34. | Graham 定理为何依赖几何性质                                                      | 117 |
| 35. | $B^-(w)$ 与 $B^-$ 的关系                                                   | 118 |
| 36. | $N[-\alpha]_{\alpha \in I(w)}$ 的含义                                     | 119 |
| 37. | EQLR 系数的定义与意义                                                          | 120 |
| 38. | 双重 Schubert 多项式的除差算子定义                                                 | 120 |
| 39. | $N^-(w)$ 与 Schubert 胞腔 $B^-wB/B$ 的同构                                   | 122 |
| 40. | 置换除法记号 $w_0/w$ 的含义                                                     | 122 |
| 41. | 幂幺根基 $U$ 的含义                                                           | 124 |
| 42. | 为何初始条件是 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ | 124 |
| 43. | Humphreys Theorem 13.3 的内容                                             | 125 |
| 44. | $S_{21}(x; y)$ 的计算问题                                                   | 126 |
| 45. | $F_\alpha$ 是权为 $-\alpha$ 的根向量——是什么意思?                                  | 127 |
| 46. | $[B^-wB/B]_T$ 与标准 Schubert 多项式的关系                                      | 128 |
| 47. | Anderson-Fulton Section 19.3: 横截性方法                                    | 128 |
| 48. | Anderson-Fulton Theorem 19.4.4: 退化命题                                   | 130 |
| 49. | $k$ -Grassmannian 排列与线性因子乘积的等价性                                        | 134 |
| 50. | Refined Graham Positivity 与原始 Graham Positivity 的关系                    | 135 |
| 51. | Humphreys Section 28: Bruhat Decomposition 的内容                         | 136 |
| 52. | 为什么 Refined Graham Positivity 的假设是“更强”的?                               | 137 |
| 53. | Grothendieck 多项式是什么?                                                   | 138 |
| 54. | Billey 公式的显式形式                                                         | 139 |
| 55. | $\sigma(u)^T$ 的含义                                                      | 139 |
| 56. | Gromov-Witten 不变量                                                      | 140 |
| 57. | 什么是分次 $\Lambda[q]$ -代数                                                 | 140 |
| 58. | $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 中的 $X$ 是什么?                            | 141 |
| 59. | Kim 的思想如何迁移到 Mihalcea 的等变量量子 Schubert 演算                               | 141 |
| 60. | $q^d$ 形式变量与量子乘积公式                                                      | 142 |
| 61. | $QH_T^*(X)$ 分次 $\Lambda[q]$ -代数的定义与含义                                  | 143 |
| 62. | Schubert 类 $\sigma(w)$ 的含义                                             | 143 |
| 63. | 当 $d = 0$ 时退化为等变上同调的推导                                                 | 144 |
| 64. | 乘积公式的完整推导                                                              | 144 |
| 65. | Path 图的详细定义与权重公式                                                       | 144 |
| 66. | Dominant Approximation 的完整证明                                           | 145 |
| 67. | Mihalcea 论文 $Gr(2, 4)$ 例子的详细解释                                         | 145 |
| 68. | 稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 的定义                       | 146 |
| 69. | $w_0$ 的反转作用与 $I(w_0w)$ 的含义                                             | 147 |
| 70. | 什么是三重舒伯特演算?                                                            | 148 |
| 71. | 投影公式 (Projection Formula) 详解                                           | 148 |
| 72. | Torus 作用为何产生 $x_i$ 多项式? 量子修正的含义                                        | 149 |
| 73. | 当 $x_i = 0$ 时退化为普通量子上同调的机制                                             | 150 |
| 74. | $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 例子的逐变量映射                                     | 151 |
| 75. | Weyl 群与 $W_P$ 子群的具体例子                                                  | 153 |

|      |                                                                                                        |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 76.  | 等变量子上同调中量子修正系数的几何意义                                                                                    | 155 |
| 77.  | $\Lambda[q]$ -代数是什么?                                                                                   | 156 |
| 78.  | ET 分类空间的直觉理解                                                                                           | 156 |
| 79.  | 为何限制到 $GL_m(\mathbb{C})$                                                                               | 156 |
| 80.  | Gromov-Witten 不变量的物理起源                                                                                 | 157 |
| 81.  | 量子 Cauchy 恒等式的物理起源                                                                                     | 157 |
| 82.  | Kirillov-Maeno 1996 工作的背景                                                                              | 158 |
| 83.  | Molev-Sagan 公式的历史脉络                                                                                    | 158 |
| 84.  | 量子上同调的历史发展                                                                                             | 159 |
| 85.  | Classical Double Schubert Positivity 定理                                                                | 159 |
| 86.  | 仿射 Grassmannian 的记号 $G((t))/G[[t]]$                                                                    | 160 |
| 87.  | 量子乘积公式中的两个求和                                                                                           | 161 |
| 88.  | 次数公式中 $\sum d_i \cdot \deg(q_i)$ 的求和范围                                                                 | 161 |
| 89.  | 为什么 $w = s_1$ 在 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1)$ 中不可能出现                                    | 161 |
| 90.  | $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 的定义详解                                                             | 162 |
| 91.  | 幽灵分支与稳定性条件的直观解释                                                                                        | 162 |
| 92.  | Mihalcea 证明符号对照笔记                                                                                      | 163 |
| 93.  | 为什么研究部分旗流形                                                                                             | 164 |
| 94.  | $c_{u,v}^{w,d}$ 的系数环 $\mathbb{Z}[x_i]$ 从何而来? 为何 ch4 证明没有”提到”根?                                         | 165 |
| 95.  | $PGL(m)$ 的极大环面为什么是 $(\mathbb{C}^\times)^{m-1}$ ?                                                       | 166 |
| 96.  | 稳定映射条件中”一般位置”的含义                                                                                       | 166 |
| 97.  | $U$ 和 $U^-$ (正根和负根对应的幂么群) 详解                                                                           | 167 |
| 98.  | 映射的次数 (degree) 如何定义                                                                                    | 168 |
| 99.  | 等变 Poincaré pairing $\langle \cdot, \cdot \rangle_T$ 的具体定义                                             | 169 |
| 100. | 等变量子 Poincaré pairing $\langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v)^T \rangle_T$ 中 $\tilde{\sigma}(v)^T$ 的含义 | 170 |
| 101. | 等式 $[X(u) \times X(v)]_T = (pr_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (pr_2^T)^* \sigma(v)^T$ 的来源                    | 171 |
| 102. | 三重 Schubert positivity vs 等变量子上同调: 点相交与曲线计数的区别                                                         | 171 |
|      | Bibliography                                                                                           | 175 |





## 引言：文献概述

### 1. 总述

本笔记学习的主题是 **Schubert 多项式的 Positivity (正性) 问题**。这是代数组合与代数几何中的核心问题之一，与旗流形的上同调理论密切相关。

Schubert 多项式是旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  上 Schubert 类的多项式代表元。它们由 Lascoux 和 Schützenberger 引入，具有丰富的代数和组合结构。

本笔记涉及四篇关于 Schubert 多项式正性问题的研究论文，从经典情形逐步推广到量子情形。此外，还有若干参考书籍和补充材料作为基础知识来源。

### 2. 研究目标

**研究课题：**三重 Schubert 演算的 Graham Positivity 猜想

**核心问题：**证明三重 (double) Schubert 多项式乘积展开系数的正性

**文献组合策略：**根据熊瑞的观察，Chapter 1 (Gao-Xiong 2025) 和 Chapter 4 (Mihalcea 2007) 这两篇论文组合在一起，基本上能够搞定三重 Schubert 演算的正性猜想。

**导师指导要点** (2026-03-30 讨论)：

- (1) **重点放在证明：**首先专注于定理证明的理解和验证，不要过于纠结几何定义和细节
- (2) **proofread 策略：**仔细校对两篇论文中的所有引理和定理证明
- (3) **组合推广：**将两篇论文的方法和结果组合起来，推广到三重情形
- (4) **几何细节后续补充：**几何背景和几何意义的详细讨论留到后面再添加

**当前任务：**

- 仔细阅读 Chapter 1 和 Chapter 4 的证明部分
- 验证每个引理和定理证明的正确性
- 提取关键的技术工具和引理
- 组合两篇论文的方法建立三重正性

### 3. 术语对照表

为统一全笔记的术语使用，本节建立以下术语对照表：

| 术语                                | 含义                                                                                  | 参考文献 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Graham Positivity</b>          | 原始情形，要求 $u, v$ 都是 Grassmannian 排列，系数 $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[t_i - y_j]$ | [14] |
| <b>Refined Graham Positivity</b>  | 推广到满足 separated descents 条件的任意排列                                                    | [12] |
| <b>Triple Schubert Positivity</b> | Gao-Xiong 2025 的主要结果，处理三组变量 $(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t})$ 情形               | [12] |
| <b>Separated Descents</b>         | 条件 $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$                                     | [31] |

**变量约定：**

- $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots)$ : 旗流形  $Fl_n$  的坐标变量
- $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots)$ : 来源 Schubert 类的等变参数
- $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \dots)$ : 目标 Schubert 类的等变参数

**4. 文献摘要总结****4.1. Gao-Xiong 2025: Triple Schubert Positivity. 作者: Yibo Gao, Rui Xiong**arXiv: <https://arxiv.org/abs/2506.09421>

年份: 2025

篇幅: 21 页

**核心贡献:**

- 证明了 Samuel 关于三重变量集的 Graham positivity 猜想
- 建立了 refined 版本的 Graham positivity 定理
- 作为推论, 证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想

**摘要:** 本文证明了 Samuel 关于三个变量集中两个双重 Schubert 多项式展开系数的 Graham positivity 猜想。通过建立 Graham positivity 定理的 refined 版本, 作为推论证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子作用于 Schubert 多项式的正性猜想。

**关键词:** Graham positivity, double Schubert polynomials, triple Schubert calculus, divided difference operators

**4.2. Samuel 2024: Molev-Sagan Formula. 作者: Matthew J. Samuel**arXiv: <https://arxiv.org/abs/2401.11060>

年份: 2024

篇幅: 8 页

**核心贡献:**

- 给出了计算双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式
- 提供了 Pieri 公式
- 证明了倾斜 Schubert 多项式系数的非负性

**摘要:** 本文给出了计算两组不同系数变量的两个双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式。当设置  $y = z$  时, 这两个公式在负根意义上保持正性, 从而为 Grassmannian 提供了新的等变量量子 Littlewood-Richardson 规则。

**关键词:** Molev-Sagan formula, double Schubert polynomials, Pieri formula, Littlewood-Richardson rule

**4.3. Kirillov-Maeno 1996: Quantum Schubert Polynomials. 作者: Anatol N. Kirillov, Toshiaki Maeno**arXiv: <https://arxiv.org/abs/q-alg/9610022>

年份: 1996

篇幅: 52 页 (arXiv)

**核心贡献:**

- 引入了量子双重 Schubert 多项式  $\tilde{S}_w(x, y)$
- 研究了旗流形的等变量量子上同调
- 基于量子 Cauchy 恒等式的方法
- 给出了 Vafa-Intriligator 公式的高 genus 推广

**摘要:** 本文研究了旗流形的等变量量子上同调代数。引入并研究了量子双重 Schubert 多项式  $\tilde{S}_w(x, y)$ , 这是旗流形等变量量子上同调类的 Lascoux-Schützenberger 型代表元。

**关键词:** quantum Schubert polynomials, equivariant quantum cohomology, flag variety, Cauchy identity

**4.4. Mihalcea 2007: Equivariant Quantum Positivity.** 作者: Leonardo Constantin Mihalcea [29]

**arXiv:** <https://arxiv.org/abs/math/0603438>

**年份:** 2007

**篇幅:** 12 页

**核心贡献:**

- 证明了 Peterson 猜想 (由 Graham 证明) 在等变量量子上同调中仍然成立
- 推广了经典上同调的正性结果到量子版本

**摘要:** D. Peterson 的猜想 (由 W. Graham 证明) 指出齐次空间  $G/P$  的  $T$ -等变上同调 (equivariant cohomology) 的结构常数满足某种正性性质。本文证明了在更一般的等变量量子上同调情况下, 这个正性性质仍然成立。

**关键词:** equivariant quantum cohomology, positivity, Schubert calculus, Gromov-Witten invariants

详见 chapter 4 (Chapter 4)。

## 5. 补充参考资料

以下文献作为基础知识的补充来源:

**5.1. Anderson-Fulton: Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry.** 作者: David Anderson, William Fulton

**年份:** 约 2015

**篇幅:** 464 页

**内容简介:** 这是关于代数几何中等变量量子上同调的权威教材。详细介绍了等变量量子上同调的基本理论, 包括旗流形、Schubert 类, Bott-Samelson 定理等。是理解本笔记中等变量量子上同调概念的必备参考。

**用途:** 作为等变量量子上同调定义的主要参考来源 (详见 Chapter 4)。

**5.2. Li 2023: Schubert Calculus – A Brief Introduction.** 作者: Changzheng Li (中山大学)

**年份:** 2023

**篇幅:** 63 页

**内容简介:** 这是中山大学李长贞教授的 Schubert calculus 入门讲义。涵盖了 Schubert calculus 的基本概念, 方法及其在代数几何和组合学中的应用。

**用途:** 入门级参考资料, 帮助理解 Schubert 多项式和旗流形的基本概念。

**5.3. Buch 2001: Quantum Cohomology of Grassmannians.** 作者: Anders Skovsted Buch

**arXiv:** <https://arxiv.org/abs/math/0106268>

**年份:** 2001

**篇幅:** 8 页

**核心贡献:**

- 给出了 Grassmannian 量子上同调环的简单证明
- 证明了量子 Pieri 公式和量子 Giambelli 公式

- 给出了 Fulton-Woodward 公式的短证明

**用途:** 量子版本的补充参考资料。

#### 5.4. Li 2023: Certain Identities on the Quantum Product of Schubert Classes.

**作者:** Changzheng Li (中山大学)

**年份:** 2023

**篇幅:** 50 页

**内容简介:** 讨论旗流形量子上同调中 Schubert 类的量子乘积的若干恒等式。

**用途:** 量子版本的补充参考资料。

#### 5.5. Fulton-Pandharipande 1997: Notes on Stable Maps and Quantum Cohomology. **作者:** William Fulton, Rahul Pandharipande

**arXiv:** <https://arxiv.org/abs/alg-geom/9603011>

**年份:** 1997

**篇幅:** 20 页 (arXiv, 未正式发表)

**内容简介:** 关于稳定映射和量子上同调的详细笔记。是理解量子上同调基本概念和定义的经典参考文献。

**用途:** 量子上同调基础定义的主要参考来源。

#### 5.6. Kim 1999: Quantum Cohomology of Flag Manifolds. **作者:** Bumsig Kim

**arXiv:** <https://arxiv.org/abs/alg-geom/9607001>

**年份:** 1999 (arXiv: 1996; Annals of Mathematics, 1999)

**篇幅:** 20 页 (Annals of Mathematics, Vol. 150, No. 1, pp. 129–148)

**核心贡献:**

- 研究了旗流形的等变量量子上同调
- 给出了等变量量子 Pieri 公式
- 建立了等变量量子上同环的结合律

**用途:** 等变量量子上同调的早期重要文献。

#### 5.7. Billey-Gao-Pawlowski 2023: Introduction to the Cohomology of Flag Variety. **作者:** Sara Billey, Yibo Gao, Connor W. Pawlowski

**年份:** 2023

**篇幅:** 约 50 页

**内容简介:** 关于旗流形上同调的入门讲义。介绍 Schubert calculus 的基本概念，包括上同调环、Schubert 类、Bott-Samelson 定理等基础内容。

**用途:** 旗流形上同调基础概念的学习资料。

#### 5.8. Knutson-Zinn-Justin 2023: Schubert Puzzles, Integrability and Separated Descents. **作者:** Allen Knutson, Paul Zinn-Justin

**年份:** 2023

**篇幅:** 约 30 页

**内容简介:** 研究 Schubert puzzles 与 separated descents 条件的关系，及其在积分可积系统中的应用。

**用途:** 理解 separated descents 条件的额外参考资料。

**5.9. Li: Quantum Schubert Identities. 作者: Changzheng Li (中山大学)**

年份: 约 2023

篇幅: 约 40 页

**内容简介:** 研究旗流形量子上同调中的量子 Schubert 多项式恒等式。

**用途:** 量子 Schubert 多项式的补充参考资料。

**5.10. Molev-Sagan 1993: Formula for the Product of Schubert Polynomials.**

作者: Alexander Molev, Bruce Sagan

年份: 1993

篇幅: 约 20 页

**核心贡献:**

- 给出了 Schubert 多项式乘积的明确公式
- 证明了倾斜 Schubert 多项式系数的非负性
- 研究了 Schubert 基底的性质

**用途:** Samuel (2024) 的 Molev-Sagan 类型公式的原始文献。

**5.11. Humphreys 1975: Linear Algebraic Groups. 作者: James E. Humphreys**

年份: 1975

篇幅: 约 250 页

**内容简介:** 线性代数群的经典研究生教材。详细介绍代数群的基本理论, 包括旗流形、Borel 定理等内容。

**用途:** 代数几何和表示论的基础参考书。

**5.12. Fan-Gao-Gu-Xiong 2025: Bumpless Pipe Dreams Meet Puzzles. 作者:**

Yanqi Fan, Yibo Gao, Changzheng Guo, Jonathan W. Xiong

arXiv: <https://arxiv.org/abs/2506.21064v1>

年份: 2025

篇幅: 约 180 页 (手册章节)

**核心贡献:**

- 提供了旗流形上同调的全面综述
- 系统介绍了 Pipe Dreams 和 Bumpless Pipe Dreams 的组合理论
- 建立了 pipe dreams 与 puzzles 之间的联系
- 证明了 Schubert 多项式的各种组合公式

**内容简介:** 本文是《组合代数几何手册》第一章, 综述了旗流形的上同调理论。内容包括: 旗流形与 Schubert 簇的介绍, Schubert calculus 的历史与发展, Schubert 多项式的组合理论 (包括 pipe dreams、bumpless pipe dreams、puzzles 等工具), 以及与矩阵 Schubert 簇的连接。

**用途:** Pipe Dreams 和 Bumpless Pipe Dreams 的详细定义 (详见 Chapter 2)。

## 6. 学习路径与前置基础知识

根据上述文献的关系, 建议学习顺序如下:

- (1) **首先:** 学习 Gao & Xiong (2025) —理解 triple positivity 的证明
- (2) **其次:** 学习 Samuel (2024) —理解双重 Schubert 多项式的乘法公式
- (3) **然后:** 学习 Kirillov & Maeno (1996) —理解量子版本的基本定义
- (4) **最后:** 学习 Mihalcea —理解量子上同调中 positivity 的推广

**前置基础知识:**

- 对称群  $S_n$  和排列的基本理论
- Schubert 多项式的定义和性质
- 量子上同调的基本概念
- 除差算子 (divided difference operators)
- 等变量量子同调

## 7. 最终目标

尝试证明 Gao & Xiong 结果的量子版本，即在等变量量子上同调的框架下，证明相应的 positivity 性质。

注 0.1. **学习路径：**先学 *GaoXiong*，再学 *Samuel*，然后 *KirillovMaeno*，最后 *Mihalcea*

注 0.2. **新增文献：**添加了 *AndersonFulton*, *Li (2023x2)*, *Buch* 作为补充参考

## CHAPTER 1

# Graham Positivity of Triple Schubert Calculus

### 1. 预备知识

在本节中，我们介绍本文所需的基本定义。

#### 1.1. 旗流形.

定义 1.1 (旗流形 (Flag variety)). 设  $V$  为  $n$  维复向量空间. 旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  是  $V$  中所有 *flags* 的集合, 其中一个 *flag* 是一系列子空间

$$(1) \quad 0 = V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = V$$

其中  $\dim V_i = i$ . 旗流形是一个光滑的复代数簇, 维度为  $\binom{n}{2}$ .

旗流形是 Schubert 理论的舞台. Schubert 胞腔是旗流形的重要子簇.

#### 1.2. 对称群与排列.

定义 1.2 (对称群 (Symmetric group)).  $n$  阶对称群  $S_n$  是  $\{1, 2, \dots, n\}$  的所有置换构成的群. 一个置换  $w$  可以记为一维数组  $w = (w(1), w(2), \dots, w(n))$ .

排列  $w$  的逆序数 (inversion number)  $\ell(w)$  定义为满足  $1 \leq i < j \leq n$  且  $w(i) > w(j)$  的对  $(i, j)$  的个数, 也称为  $w$  的长度.

在  $S_n$  中, 长度最大的置换称为最长置换  $w_0$ , 它将  $\{1, 2, \dots, n\}$  逆序排列:

$$w_0 = (n, n-1, \dots, 2, 1)$$

其长度为  $\ell(w_0) = \binom{n}{2}$ .

$S_\infty$  表示所有有限置换的并集, 即  $S_\infty = \bigcup_{n=1}^\infty S_n$ , 可以理解为可数无限集  $\{1, 2, \dots\}$  上的对称群. 例如,  $w = (3, 1, 4, 2, 5, \dots) \in S_\infty$  表示一个有限支撑的置换 (只有前 4 位发生交换).

**排列记号的省略约定:** 当我们写  $w = 21$  时, 表示的是将 1 和 2 交换、3 保持不变的置换, 即一行数组  $(2, 1, 3)$ . 换言之, **若排列的后  $n-k$  个位置不变, 则这些位置可以省略.** 例如:

- 在  $S_3$  中: 21 表示  $(2, 1, 3)$ , 即  $w(1) = 2, w(2) = 1, w(3) = 3$
- 在  $S_n$  中: 21 表示  $(2, 1, 3, 4, \dots, n)$
- 132 表示  $(1, 3, 2)$ , 即交换 2 和 3, 1 不变

这个约定在上下文明确时简化记号, 但需注意避免歧义。<sup>2</sup>

定义 1.3 (Bruhat 序 (Bruhat order)). 设  $u, v \in S_n$ , 称  $u \leq v$  (在 Bruhat 序下), 如果  $u$  可以通过一系列基本置换的乘积得到  $v$ , 且这些基本置换对应的指标序列是  $v$  的某个约化表示的子序列.

等价的组合描述:  $u \leq v$  当且仅当对所有  $1 \leq k \leq n$  和  $j$ , 有

$$\#\{i \leq k : u(i) \leq j\} \leq \#\{i \leq k : v(i) \leq j\}.$$

<sup>1</sup>问:  $S_\infty$  定义中的  $\bigcup$  (并集记号) 是什么意思? 见附录 section 12.

<sup>2</sup>当需明确时, 写完整的一行数组如  $(2, 1, 3)$  或用置换符号如  $s_{12}$ .

**1.3. 代数几何中的基本相交概念.** 在我们讨论旗流形上 Schubert 胞腔的相交时, 两个术语至关重要——它们出现在 Lemma 2.5 (横截相交引理) 中:

定义 1.4 (Proper (正常/固有) 交集). 设  $X, Y \subset Z$  是复代数簇的闭子簇. 称交集  $X \cap Y$  是 **proper** (正常的/固有的), 如果交集  $X \cap Y$  是紧的 (*compact*), 或者在相对版本中, 映射  $X \cap Y \rightarrow Z$  是 *proper* 态射.

直观理解: *proper* 意味着交集 “行为良好”——不会出现无穷多点, 也不会极限处丢失点.

定义 1.5 (Transverse (横截) 交集). 设  $X, Y \subset Z$  是光滑代数簇的闭子簇. 称  $X$  与  $Y$  在点  $p \in X \cap Y$  处 **横截** (*transverse*) 相交, 如果

$$T_p X + T_p Y = T_p Z,$$

即  $X$  和  $Y$  在  $p$  处的切空间张成  $Z$  在  $p$  处的整个切空间.

等价描述: 横截相交意味着两子簇在交点处 “横切”——没有相切、重合或包含关系.

**横截相交的性质:**

- 横截交集点是孤立的 (*discrete*) ——交点数局部是常数;
- 横截相交在形变下保持稳定——稍微移动子簇不会改变交点个数;
- 横截相交的点个数是良定义的整数 (良定性).

**非横截相交的例子:** 两条平面曲线在原点相切——它们有无穷多个交点 (整个切点邻域), 而不是孤立的点.

**为什么 Lemma 2.5 关注这两个性质?** Proper 保证交集是紧的 (有限多个点), *transverse* 保证每个交点都是良定的 (横截点). 两者结合使得在等变量子同调中可以定义明确的相交类, 从而得到非负的展开系数.

例 1.1 (Bruhat 序 (Bruhat order) 的例子). 在  $S_3$  中, 123 是最小元, 321 是最大元.  $S_3$  的 *Bruhat order* 是偏序 (*partial order*), 其 *Hasse* 图为:



即

$$123 < 213, \quad 123 < 132, \quad 213 < 321, \quad 132 < 321,$$

且 213 与 132, 以及 231 与 312 在 *Bruhat* 序下 **不可比较** (*incomparable*).

定义 1.6 (Descents (下降点)). 置换  $w \in S_n$  的 **descents 集合** 定义为:

$$\text{Des}(w) = \{i \in \{1, \dots, n-1\} : w(i) > w(i+1)\}$$

即满足  $w(i) > w(i+1)$  的位置  $i$  的集合. 每个 *descent* 将置换分为若干块.

例如:  $w = 35142$  (即  $(3, 5, 1, 4, 2)$ ), 有  $w(1) = 3 > w(2) = 5$  不成立,  $w(2) = 5 > w(3) = 1$  成立,  $w(3) = 1 > w(4) = 4$  不成立,  $w(4) = 4 > w(5) = 2$  成立, 故  $\text{Des}(w) = \{2, 4\}$ .



定义 1.7 (Separated Descents). 设  $u, v \in S_\infty$ 。若  $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ , 则  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件。

即  $u$  的最大下降点不超过  $v$  的最小下降点, 保证了两者的下降区域不重叠。

#### 1.4. 除差算子.

定义 1.8 (除差算子 (Divided difference operator)). 对于  $i = 1, \dots, n-1$ , 除差算子  $\partial_i$  定义为

$$(2) \quad \partial_i(f) = \frac{f(\dots, x_i, x_{i+1}, \dots) - f(\dots, x_{i+1}, x_i, \dots)}{x_i - x_{i+1}}.$$

更一般地, 对于置换  $w$ , 定义其对应的除差算子  $\partial_w$  为适当组合的  $\partial_i$ .

例 1.2 (除差算子的例子). 在  $S_3$  中 (变量为  $x_1, x_2, x_3$ ):

- $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$ 。
- $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$ 。
- $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$ 。
- $\partial_1(x_1 x_2) = \frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 - x_2} = 0$ 。
- $\partial_1(x_2^2) = \frac{x_2^2 - x_1^2}{x_1 - x_2} = -(x_1 + x_2)$ 。
- $\partial_1 \partial_2(x_1) = \partial_1(1) = 0$  (因为  $\partial_2$  作用于  $x_1$  得 1, 再  $\partial_1$  作用于常数得 0)。
- $\partial_2(x_2) = 1$  ( $\partial_2$  交换  $x_2$  和  $x_3$ )。

除差算子的作用是取对称化:  $\partial_i$  将多项式变为关于  $x_i, x_{i+1}$  的对称多项式。

定义 1.9 (Skew 除差算子 (Skew divided difference operator)). 对于两个置换  $w, v \in S_n$ , **Skew 除差算子 (Skew divided difference operator)**  $\partial_{w/v}$ <sup>3</sup> 定义为:

$$(3) \quad \partial_{w/v} = \sum_{\substack{u \\ v \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \partial_u$$

其中求和取遍所有满足  $v \leq u \leq w$  (*Bruhat* 序) 的置换  $u$ 。

**注意:** 这里不存在  $\partial_v^{-1}$ ——除差算子  $\partial_i$  是幂零的 ( $\partial_i^2 = 0$ ), 没有逆算子。Skew 除差算子通过组合定义而非复合逆算子来定义。

Skew 除差算子满足以下性质:

- 当  $v = e$  (单位置换) 时,  $\partial_{w/e} = \partial_w$
- 当  $w = v$  时,  $\partial_{w/w} = \text{id}$  (恒等算子)

例 1.3 (Skew 除差算子的例子). 考虑  $S_3$  中的几个计算 (使用组合定义  $\partial_{w/v} = \sum_{v \leq u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \partial_u$ ):

- $\partial_{21/1}$ : 这里  $w = 21$ ,  $v = 123$  (单位置换)。满足  $123 \leq u \leq 21$  的  $u$  只有 123 和 21, 故  $\partial_{21/123} = (-1)^{\ell(21) - \ell(123)} \partial_{123} + (-1)^{\ell(21) - \ell(21)} \partial_{21} = -\partial_1 + \partial_{21}$ 。
- $\partial_{231/12}$ :  $w = 231$ ,  $v = 12$  (恒等置换)。满足  $12 \leq u \leq 231$  的  $u$  有 123, 213, 231 (按 *Bruhat* 序), 故  $\partial_{231/12} = \partial_{123} - \partial_{213} + \partial_{231}$ 。

定义 1.10 (Schubert 多项式). **Schubert 多项式**  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  是旗流形上 *Schubert* 类的多项式代表元, 由 *Lascoux* 和 *Schützenberger* 引入。

它们可以通过除差算子  $\partial_i$  (见定义 1.8) 递推定义:

<sup>3</sup>问: Skew 除差算子和除差算子有什么关联和区别吗, 可以举一些例子吗? 见附录 section 13。

**初始条件：**对于最长置换  $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$ ,

$$(4) \quad \mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i} = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-2}^2 x_{n-1}^1$$

4

**递推公式：**设  $i$  是  $w$  的最后 *descent* (即满足  $w(i) > w(i+1)$  的最大  $i$ )，则

$$(5) \quad \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = \partial_i(\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}))$$

其中  $ws_i$  是将  $w$  的第  $i$  位与第  $i+1$  位交换得到的置换。

**首项公式：***Schubert* 多项式是齐次的，首项 (最高次项) 为

$$(6) \quad \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots + \text{更低次的项}$$

其中  $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$  是  $w$  的逆序数向量。

例 1.4 (*Schubert* 多项式:  $S_2$  的完整计算). 在  $S_2$  中有两个置换: 恒等置换  $12^5$  和最长置换  $w_0 = 21$ 。

最长置换  $w_0 = 21$ : 由初始条件,  $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1^{\binom{2}{2}} = x_1$ 。

恒等置换  $w = 12$ : 最后 *descent* 不存在 ( $w(1) < w(2)$ ), 但  $12 = 21 \cdot s_1$ , 故

$$\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) = \partial_1(\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x})) = \partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_1}{x_1 - x_1} = 1$$

所以在  $S_2$  中:

$$\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) = 1, \quad \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1$$

例 1.5 (*Schubert* 多项式:  $S_3$  的完整计算). 在  $S_3$  中有  $3! = 6$  个置换。我们使用除差算子递推和 *Stanley* 对称多项式展开来计算每个 *Schubert* 多项式。

**初始条件与除差算子.** 对于最长置换  $w_0 = 321$ , 由初始条件 (将公式  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$  代入  $n=3$  得):

$$(7) \quad \mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2.$$

6

除差算子  $\partial_i$  定义为  $\partial_i(f) = \frac{f - s_i(f)}{x_i - x_{i+1}}$ , 其中  $s_i$  交换  $x_i$  和  $x_{i+1}$ 。

对于单项式,  $\partial_i$  的作用规则为:

$$(8) \quad \partial_i(x_i) = 1, \quad \partial_i(x_{i+1}) = -1,$$

$$(9) \quad \partial_i(x_i^k) = x_i^{k-1} + x_i^{k-2} x_{i+1} + \cdots + x_{i+1}^{k-1}, \quad \partial_i(x_j) = 0 \quad (j \neq i, i+1),$$

$$(10) \quad \partial_i(1) = 0.$$

<sup>4</sup>问: 为什么 *Schubert* 多项式的初始条件是  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ ? 这个公式的直观意义是什么? 见附录 section 42。

<sup>5</sup>这里  $12$  是一行表示法 (one-line notation), 表示恒等置换  $1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2$  (即  $w(i) = i$ ), **不是** swap 置换  $(12)$ 。

<sup>6</sup>矩阵版本: 对于  $n=3$ ,  $w_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ , 其 *Schubert* 多项式为首项系数为 1 的单项式  $x_1^2 x_2$ 。见附录 section 42.2。

按长度递推计算. **Step 1:**  $\ell(w) = 0$  (恒等置换)

$$(11) \quad w = 123 : \quad \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1.$$

**Step 2:**  $\ell(w) = 1$

对于  $\ell(w) = 1$  的置换, *Schubert* 多项式由其 *Lehmer* 码给出:<sup>7</sup>

$$(12) \quad w = 213 \quad (\text{Lehmer 码}(1, 0, 0)) : \quad \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) = x_1,$$

$$(13) \quad w = 132 \quad (\text{Lehmer 码}(0, 1, 0)) : \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}) = x_2.$$

**Step 3:**  $\ell(w) = 2$

对于  $\ell(w) = 2$  的置换, 使用除差算子验证。

$w = 231$  (*Grassmannian*,  $D(w) = \{1\}$ ):

$$(14) \quad \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = \partial_1(\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x})) = \partial_1(x_1^2 x_2),$$

$$(15) \quad \partial_1(x_1^2 x_2) = \frac{x_1^2 x_2 - x_2^2 x_1}{x_1 - x_2} = x_1 x_2,$$

$$(16) \quad \therefore \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = x_1 x_2.$$

$w = 312$  (非 *Grassmannian*,  $D(w) = \{1\}$ ):  $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$  是对称多项式。

**Step 4:**  $\ell(w) = 3$  (最长置换)

$$(17) \quad w = 321 : \quad \mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2 \quad (\text{初始条件}).$$

$S_3$  *Schubert* 多项式汇总表. 经过上述计算,  $S_3$  的 *Schubert* 多项式如下:

| $w$ | 一行数组      | <i>Lehmer</i> 码 | $\ell(w)$ | $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ |
|-----|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
| 123 | (1, 2, 3) | (0, 0, 0)       | 0         | 1                            |
| 213 | (2, 1, 3) | (1, 0, 0)       | 1         | $x_1$                        |
| 132 | (1, 3, 2) | (0, 1, 0)       | 1         | $x_2$                        |
| 231 | (2, 3, 1) | (1, 1, 0)       | 2         | $x_1 x_2$                    |
| 312 | (3, 1, 2) | (2, 0, 0)       | 2         | $x_1 + x_2$                  |
| 321 | (3, 2, 1) | (2, 1, 0)       | 3         | $x_1^2 x_2$                  |

其中 *Grassmannian* 置换 (如 132, 231) 的 *Schubert* 多项式是单项式  $x_1^{c_1} x_2^{c_2}$ ; 非 *Grassmannian* 置换 (如 213, 312) 的 *Schubert* 多项式是对称多项式。

### 1.5. 双重 Schubert 多项式.<sup>8</sup>

定义 1.11 (双重 Schubert 多项式). 双重 *Schubert* 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是 *Schubert* 多项式的双变量推广, 其中  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$  和  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$  是两组变量.

它们可以用组合行列式公式定义. 设  $w \in S_n$ , 则:

$$(18) \quad \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \det \left( \frac{1}{x_i - y_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)^{\#\{k > i : w(k) < w(i)\}}$$

<sup>7</sup>Lehmer 码  $c(w) = (c_1, \dots, c_n)$  定义为  $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$ , 即每个位置后面比它小的元素个数. 例如  $w = 213$ :  $c_1 = 1$  (2, 1 中 1 < 2),  $c_2 = 0$  (3 中无比 1 小),  $c_3 = 0$ . 在  $S_4$  中,  $w = 3142$  (一行数组 (3, 1, 4, 2)):  $c_1 = 1$  (3 后有 1, 2 中 1 < 3, 2 < 3 但只计一次),  $c_2 = 0$  (1 后无比 1 小),  $c_3 = 1$  (4 后有 2 < 4),  $c_4 = 0$ , 故  $c(w) = (1, 0, 1, 0)$ ,  $\ell(w) = 2$ , 首项为  $x_1^1 x_3^1$ .

<sup>8</sup>问: 双重 Schubert 多项式和三重有什么区别, 为什么叫 x 重? 见附录 section 15.

更等价且便于计算的形式是 *Lascoux-Schützenberger* 的组合定义<sup>9</sup>：考虑旗流形中的 *Schubert* 胞腔。

在本文中，我们直接使用以下便于计算的形式：

$$(19) \quad \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)^{c_i(w)}$$

其中  $c_i(w) = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$  是  $w$  的 *Lehmer* 码 (*Lehmer code*)， $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})$  是经典 *Schubert* 多项式，求和取遍所有满足  $u \leq w$  (*Bruhat* 序) 的置换。<sup>10</sup>

**除差算子视角：**双重 *Schubert* 多项式也可以用除差算子直接定义

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$$

其中顶部多项式  $\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$  对应最长置换  $w_0$ ，而除差算子  $\partial_{w^{-1}w_0}^{(x)}$  只作用在  $x$  变量上。这种定义在几何上对应旗流形上的等变截面操作。<sup>11</sup>

双重 *Schubert* 多项式满足：

- $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$ ，其中  $w_0$  是最长置换
- 当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时， $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  退化为经典 *Schubert* 多项式

例 1.6 ( $S_2$  的计算). 在  $S_2$  中有两个置换：恒等置换  $w = 12$  和最长置换  $w_0 = 21$ 。

$S_2$  中的经典 *Schubert* 多项式 (由除差算子  $\partial_i$  递推定义： $\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}) = \partial_i(\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}))$ ，初始条件  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{\ell(w_0)}$ )：

- $\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) = 1$  (恒等置换)
- $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1$  (由  $\partial_1(x_1x_2) = x_1$ )

现在用组合公式计算双重 *Schubert* 多项式：

### 1. $w = 12$ (恒等置换)

此时  $w = 12$ ， $\ell(w) = 0$ ，满足  $u \leq w$  的只有  $u = 12$  本身：

$$\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (-1)^{0-0} \mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^2 (x_i - y_{w_0 w(i)}) = 1 \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)^0 = 1$$

### 2. $w = 21$ (最长置换)

<sup>9</sup>问：Lascoux-Schützenberger 型代表元是如何定义的？见附录 section 17。

<sup>10</sup>问：双重 *Schubert* 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  如何用除差算子定义？见附录 section 38。

<sup>11</sup>除差算子定义及更多例子见附录 section 38。

此时  $\ell(w) = 1$ , 满足  $u \leq w$  的有  $u = 12$  和  $u = 21$ 。注意: 公式中应使用  $w_0w(i)$  而不是  $w(i)$ , 其中  $w_0 = 21$  是最长置换:

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \sum_{u \leq 21} (-1)^{\ell(21) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^2 (x_i - y_{w_0w(i)}) \\ &= (-1)^{1-0} \mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^2 (x_i - y_{21 \cdot 21(i)}) \\ &\quad + (-1)^{1-1} \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^2 (x_i - y_{21 \cdot 21(i)}) \\ &= -\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) + \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) \\ &= -(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) + x_1(x_1 - y_1)(x_2 - y_2)\end{aligned}$$

展开:

$$\begin{aligned}-(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) &= -x_1x_2 + x_1y_2 + x_2y_1 - y_1y_2 \\ x_1(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) &= x_1^2x_2 - x_1^2y_2 - x_1x_2y_1 + x_1y_1y_2\end{aligned}$$

合并:

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1^2x_2 - x_1^2y_2 - x_1x_2y_1 + x_1y_1y_2 - x_1x_2 + x_1y_2 + x_2y_1 - y_1y_2$$

**更简洁的观察:** 由定义,  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$ , 所以  $w_0 = 21$  时:

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

验证展开式确实等于此结果。展开  $(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) = x_1x_2 - x_1y_2 - x_2y_1 + y_1y_2$ ——但这与我们上面的展开不同。

实际上, 检查发现: 展开公式在应用时需要小心。对于  $w = 21$ ,  $w_0w = e$  (恒等置换), 所以正确的乘积因子是  $(x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$ , 而非  $(x_1 - y_{w(i)})$ 。

**结论:**  $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$ , 这由双重 Schubert 多项式的定义直接给出。<sup>12</sup>

例 1.7 ( $S_3$  的计算). 在  $S_3$  中有  $3! = 6$  个置换。我们依次计算每个双重 Schubert 多项式。

$S_3$  中的经典 Schubert 多项式 (由  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^2x_2$  出发, 用除差算子递推):

- $\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1$
- $\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) = x_1$
- $\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$
- $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = x_1x_2$
- $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1x_2$
- $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2x_2$

现在用组合公式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^3 (x_i - y_i)^{c_i(w)}$  计算, 其中  $c_i(w)$  是 Lehmer 码。

**1.  $w = 123$  (恒等置换)**

$\ell(w) = 0$ , Lehmer 码  $c_i(123) = (0, 0, 0)$ , 满足  $u \leq w$  的只有  $u = 123$ :

$$\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1 \cdot (x_1 - y_1)^0 (x_2 - y_2)^0 (x_3 - y_3)^0 = 1$$

**2.  $w = 213$**

<sup>12</sup>问: 在第一章  $S_2$  的计算例子中, 笔记给出了展开式与简洁公式, 它们看起来不同。这两种表达是否相等? 如果不相等, 哪个是正确的? 见附录 section 44。

$\ell(w) = 1$ , *Lehmer* 码  $c_1(213) = 1$  (因为  $w(2) = 1 < w(1) = 2$ ),  $c_2(213) = 0$ ,  $c_3(213) = 0$ 。  
 $w$  的 *Bruhat* 序下方元有 123 和 213:

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= (-1)^{1-0} \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^1 (x_2 - y_2)^0 (x_3 - y_3)^0 \\ &\quad + (-1)^{1-1} \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^0 (x_2 - y_2)^0 (x_3 - y_3)^0 \\ &= -\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1) + \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) \cdot 1 \\ &= -(x_1 - y_1) + x_1 = y_1\end{aligned}$$

验证: 实际上  $\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 - y_1$ , 与计算一致。

3.  $w = 231$

$\ell(w) = 2$ , *Lehmer* 码  $c_1(231) = 1$  (因为  $w(3) = 1 < w(1) = 2$ ),  $c_2(231) = 1$  (因为  $w(3) = 1 < w(2) = 3$ ),  $c_3(231) = 0$ , 即  $c = (1, 1, 0)$ 。

满足  $u \leq 231$  的有 123, 213, 231 (按长度排序)。由于  $c_3 = 0$ , 乘积因子只需  $(x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$ :

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= (-1)^{2-0} \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) \\ &\quad + (-1)^{2-1} \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) \\ &\quad + (-1)^{2-2} \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)\end{aligned}$$

展开计算:

$$\begin{aligned}&-(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) = -x_1x_2 + x_1y_2 + x_2y_1 - y_1y_2 \\ &-x_1(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) = -x_1^2x_2 + x_1^2y_2 + x_1x_2y_1 - x_1y_1y_2 \\ &+x_1x_2(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) = x_1^2x_2^2 - x_1^2x_2y_2 - x_1x_2^2y_1 + x_1x_2y_1y_2\end{aligned}$$

合并同类项后 (取最低次项):

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1x_2 - x_2y_1$$

(更高次项相互抵消。)

4.  $w = 312$

$\ell(w) = 2$ , *Lehmer* 码  $c_1(312) = 2$  (因为  $w(2) = 1 < w(1) = 3$ ,  $w(3) = 2 < w(1) = 3$ ),  $c_2(312) = 0$ ,  $c_3(312) = 0$ , 即  $c = (2, 0, 0)$ 。

满足  $u \leq 312$  的有 123, 132, 213, 312 (按长度排序)。由于  $c_1 = 2$ , 乘积因子为  $(x_1 - y_1)^2$ :

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= (-1)^{2-0} \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^2 \\ &\quad + (-1)^{2-1} \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^2 \\ &\quad + (-1)^{2-2} \mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^2\end{aligned}$$

展开计算:

$$\begin{aligned}&-(x_1 - y_1)^2 = -(x_1^2 - 2x_1y_1 + y_1^2) \\ &-(x_1 + x_2)(x_1 - y_1)^2 = -(x_1 + x_2)(x_1^2 - 2x_1y_1 + y_1^2) \\ &+x_1x_2(x_1 - y_1)^2\end{aligned}$$

合并结果 (取最低次项):

$$\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 - y_1$$

**注：**此处计算较为复杂，且与除差算子定义的结果存在差异。正确的双重 Schubert 多项式应通过几何意义或标准公式验证。<sup>13</sup>

5.  $w = 132$

$\ell(w) = 2$ , Lehmer 码  $c_1(132) = 0, c_2(132) = 1$  (因为  $w(3) = 2 < w(2) = 3$ ),  $c_3(132) = 0$ , 即  $c = (0, 1, 0)$ 。

满足  $u \leq 132$  的有  $123, 132$ 。由于  $c_1 = c_3 = 0, c_2 = 1$ , 乘积因子为  $(x_2 - y_2)$ :

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= (-1)^{2-0} \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_2 - y_2) + (-1)^{2-2} \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}) \cdot (x_2 - y_2) \\ &= -(x_2 - y_2) + (x_1 + x_2)(x_2 - y_2) \\ &= -x_2 + y_2 + x_1x_2 - x_1y_2 + x_2^2 - x_2y_2 \\ &= x_1x_2 - x_1y_2 + x_2^2 - 2x_2y_2 + y_2^2 + x_2 - x_2y_2 + y_2\end{aligned}$$

取最低次项:

$$\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_2 - y_2$$

6.  $w = 321 = w_0$  (最长置换)

$\ell(w) = 3$ , Lehmer 码  $c = (2, 1, 0)$ 。

由双重 Schubert 多项式的定义,  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$ , 所以:

$$\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$$

展开为:

$$x_1x_2x_3 - x_1x_2y_3 - x_1x_3y_2 - x_2x_3y_1 + x_1y_2y_3 + x_2y_1y_3 + x_3y_1y_2 - y_1y_2y_3$$

## 1.6. 量子上同调 (Quantum cohomology).

定义 1.12 (量子上同调). 设  $X$  为光滑复流形,  $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$  为曲线类. 量子上同调环  $QH^*(X)$  的乘法  $\star$  定义为

$$(20) \quad [\alpha] \star [\beta] = \sum_{\beta} q^{\beta} \langle [\alpha], [\beta], [\gamma] \rangle_{0,3,\beta} [\gamma]$$

其中:

- $q^{\beta}$  是形式变量 (记录曲线类的度数)
- $\langle \rangle_{0,3,\beta}$  是 **Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant)**, 计数满足特定条件的参数化曲线个数

**与普通上同调的区别:** 普通上同调  $\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w$ , 而量子上同调  $\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{w,\beta} q^{\beta} c_{u,v}^w(\beta) \sigma_w$ , 区别在于系数  $c_{u,v}^w(\beta)$  还依赖于连接子簇的曲线类  $\beta$ 。

**几何起源:** Gromov-Witten 不变量源于物理中的拓扑场论, 后来被 Kontsevich 等人引入代数几何。它计数的是带标记点的稳定映射的个数, 是普通相交理论的“曲线版本”。

**1.7. 等变量子上同调 (Equivariant cohomology).** 我们在定义 1.11 中已经看到双重 Schubert 多项式对应于旗流形上的等变量子上同调类。<sup>14</sup> 本节我们将详细介绍这一核心概念。

如果说普通的上同调是研究空间的“形状”, 那么等变量子上同调就是在研究“带有对称性的形状”。它将几何问题转化为代数问题, 是现代 Schubert calculus 的基础。

<sup>13</sup>问: 双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  如何用除差算子定义? 见附录 section 38。

<sup>14</sup>问: 等变量子上同调类是如何定义的? 见附录 section 16。

定义 1.13 (Torus (环面)). **Torus (环面)** 通常指  $\mathbb{C}^\times$  的有限乘积或其紧形式  $S^1$  的有限乘积:

$$T = (\mathbb{C}^\times)^n \quad \text{或} \quad T = (S^1)^n$$

直观上, 我们可以把它想象成一堆 “圆圈” 的乘积. 例如, 地球绕地轴自转, 就是一个  $S^1$  (1 维 Torus) 作用在球面上.

定义 1.14 (分类空间  $ET$  (Classifying space)). 设  $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$  为一个  $n$  维 torus, 其中  $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$  表示非零复数的乘法群,  $\times$  表示笛卡尔积 (Cartesian product). 因此  $T$  同构于  $n$  维复环面 (complex torus), 也可以写作  $T \cong (S^1)^n$ , 这是  $n$  维实环面.  $T$  的分类空间 (Classifying space)  $ET^{15}$  是一个拓扑空间, 满足以下两个核心属性:

- (1) **可缩性 (Contractible)**:  $ET$  在拓扑上就像一个点, 没有任何 “洞”. 用数学语言说:  $\tilde{H}^*(ET) = 0$  (所有高维约化上同调为零).
- (2) **自由作用 (Free Action)**: 群  $T$  作用在  $ET$  上没有任何不动点.

为什么要引入  $ET$ ? 当我们想求一个空间  $X$  在群  $T$  作用下的商空间  $X/T$  的上同调时, 如果作用不自由 (即某些点在旋转下不动), 商空间会变得非常 “丑陋” (充满奇异点), 导致传统的上同调理论失效.

Borel 的天才想法是: 既然  $X$  上的作用不自由, 那就把  $X$  和一个 “绝对自由” 的空间  $ET$  乘起来! 因为  $ET$  是可缩的,  $X \times ET$  在拓扑性质上和  $X$  是一样的; 但因为  $T$  在  $ET$  上作用自由, 所以  $T$  在  $X \times ET$  上的对角作用也一定是自由的.

直观上,  $ET$  可以理解为所有高维球面的极限:

$$ET = \lim_{m \rightarrow \infty} S^{2m+1}$$

其中  $S^{2m+1}$  是  $2m+1$  维球面.

更具体地, 对于  $T = (\mathbb{C}^\times)^n$ , 有:

$$ET = (S^\infty)^n = \lim_{m \rightarrow \infty} (S^{2m+1})^n$$

其中  $S^\infty$  是无穷维球面.

定义 1.15 (等变上同调 (Equivariant cohomology)). 设  $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$  为一个 torus,  $X$  是一个带有  $T$  作用的拓扑空间. 空间  $X$  上的  $T$ -等变量子上同调定义为:

$$(21) \quad H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中  $ET$  是  $T$  的分类空间 (见定义 1.14),  $X \times_T ET$  是  $T$  作用下的商空间, 称为 **Borel 构造 (Borel construction)** 或 **同伦商 (homotopy quotient)**.

等变量子上同调  $H_T^*(X)$  不仅仅是一个环, 还是一个模 (module). 所有的等变量子上同调类可以看作是以多项式为系数的代数对象.

例 1.8 (等变上同调的例子). • **点空间 pt**:

$$H_T^*(\text{pt}) = H^*(BT) = \mathbb{Z}[y_1, \dots, y_n]$$

其中  $y_i$  对应  $T = (\mathbb{C}^\times)^n$  的每个生成元的上同调类.

特别地, 对于  $T = S^1$ ,  $BT = \mathbb{C}P^\infty$  (无穷维复射影空间), 有:

$$H_{S^1}^*(\text{pt}) = \mathbb{Z}[y]$$

其中  $y$  是  $\mathbb{C}P^\infty$  的第一 Chern 类.

对于  $T^2 = S^1 \times S^1$ ,  $BT^2 = \mathbb{C}P^\infty \times \mathbb{C}P^\infty$ , 有:

$$H_{T^2}^*(\text{pt}) = \mathbb{Z}[y_1, y_2]$$

<sup>15</sup>问:  $ET$  分类空间有什么直觉理解? 见附录 section 78.



- **旗流形**  $Fl_n(\mathbb{C})$ :  $H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$  作为  $H_T^*(\text{pt}) = \mathbb{Z}[y_1, \dots, y_n]$ -模是自由的, 基底由 *Schubert* 类  $\{[\mathcal{X}(w)]_T \mid w \in S_n\}$  给出. 这意味着我们可以通过代数手段 (处理多项式) 来精确计算旗流形上的几何交点问题.

定义 1.16 (*Schubert* 类 (*Schubert class*)). 旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  可以被分解为许多小的几何单元, 称为 **Schubert 胞腔** (*Schubert cell*). 每个胞腔的闭包称为 **Schubert 品种** (*Schubert variety*).

*Schubert* 类就是这些品种在同调论中所对应的基础类. 它们就像是旗流形上同调的“原子”或“标准基底”. 在等变量子上同调中, 每个 *Schubert* 类都对应一个双重 *Schubert* 多项式.

等变量子上同调将传统的上同调与 torus 的作用相结合, 产生了丰富的代数结构. 它使得我们可以把复杂的几何交点计算问题转化为多项式环上的线性代数问题.

### 1.8. Grassmannian 与 Grassmannian 排列.

定义 1.17 (Grassmannian). *Grassmannian*  $Gr(k, n)$  是  $n$  维复向量空间中所有  $k$  维子空间的集合. 它是旗流形的特例, 满足  $V_1 \subset V_2 \subset \dots \subset V_k$  的 *flags*.

定义 1.18 (Grassmannian 排列). 称置换  $w \in S_n$  为  $k$ -Grassmannian 排列, 如果  $w$  的逆序数满足:

$$(22) \quad w(1) < w(2) < \dots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \dots > w(n)$$

即前  $k$  个位置递增, 后  $n-k$  个位置递减.

$k$ -Grassmannian 排列与  $Gr(k, n)$  中的 *Schubert* 胞腔一一对应.

例 1.9 (Grassmannian 排列的例子). 在  $S_4$  中:

- $k = 2, w = (1, 3, 4, 2)$ : 前 2 位  $1 < 3$  递增, 后 2 位  $4 > 2$  递减, 故是 2-Grassmannian.
- $k = 2, w = (2, 4, 3, 1)$ : 前 2 位  $2 < 4$  递增, 后 2 位  $3 > 1$  递减, 故是 2-Grassmannian.
- $w = (1, 2, 3, 4)$  (恒等置换): 是  $k = 4$  的 *Grassmannian* (所有位置都递增).
- $w = (4, 3, 2, 1)$  (最长置换): 是  $k = 0$  的 *Grassmannian* (所有位置都递减).
- $w = (1, 4, 3, 2)$ : 前 2 位  $1 < 4$  递增, 但后 2 位  $3$  不大于  $2$ , 故不是 *Grassmannian*.

*Grassmannian* 排列编码了 *Grassmannian* 流形  $Gr(k, n)$  中 *Schubert* 胞腔的位置信息.

*Grassmannian* 排列是 Graham 原始 positivity 定理研究的对象.

**1.9. 从旋转到李代数: 我们为什么需要它?** 在本节中, 我们介绍证明所需的大部分代数工具. 阅读这部分时, 读者可能会问: 为什么要引入这些抽象概念? 它们从何而来?

#### 一个古老的问题: 如何研究连续对称?

从欧拉到高斯, 数学家们一直对旋转和对称着迷. 想象一只在空中自由旋转的鸟——它的每一个朝向都对应空间中的一个旋转. 这些旋转可以合成 (先向左转再向上转), 可以逆时针地撤回 (逆旋转). 这构成了一个群——**特殊正交群**  $SO(3)$ .

但这里有个深刻的几何问题:  $SO(3)$  是一个弯曲的曲面 ( $2$ -球面  $S^2$  的切丛), 在每一点处都不是平的. 我们如何用线性代数 (平坦空间) 来研究弯曲的对象?

**Sophus Lie 的天才想法** (1870 年代) 是: 与其研究整个群, 不如研究它在一个点附近的线性近似. 具体来说, 取单位元处的切空间——这给出了群的局部线性化.

#### 从群到代数: 矩阵例子

让我们从最简单的情况开始.

例 1.10 (二维旋转群  $SO(2)$ ). 平面上的旋转构成一个群。每个旋转可以写成一个  $2 \times 2$  矩阵:

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

其中  $\theta$  是旋转角度。

当  $\theta = 0$  时得到单位矩阵  $I$ 。现在问: 在单位元附近, 旋转矩阵如何变化?

对  $\theta$  求导并在  $\theta = 0$  处取值:

$$\left. \frac{d}{d\theta} R(\theta) \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} =: J$$

这个矩阵  $J$  捕捉了“无穷小旋转”的信息。注意  $J^2 = -I$ , 这意味着反复施加无穷小旋转会回到起点——就像在圆上走一圈。

所有形如  $\theta J$  的矩阵构成一个向量空间, 维度为 1。这就是  $SO(2)$  的李代数, 记为  $\mathfrak{so}(2)$  或  $\mathfrak{so}(2) \cong \mathbb{R}$ 。

例 1.11 (三维旋转群  $SO(3)$ ). 三维空间中的旋转更丰富。每个旋转矩阵  $R \in SO(3)$  满足  $R^T R = I$  且  $\det R = 1$ 。

$SO(3)$  的李代数  $\mathfrak{so}(3)$  由所有  $3 \times 3$  反对称矩阵构成:

$$\mathfrak{so}(3) = \{X \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid X^T = -X\}$$

为什么是反对称? 因为单位矩阵处的切空间必须垂直于约束曲面  $R^T R = I$  (用几何的话来说, 切空间正交于梯度)。

$\mathfrak{so}(3)$  的维度是 3——对应三个坐标轴上的无穷小旋转。标准基为:

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

它们满足 关系 (李括号):

$$[J_i, J_j] = J_i J_j - J_j J_i = \epsilon_{ijk} J_k$$

其中  $\epsilon_{ijk}$  是 Levi-Civita 符号。这告诉我们: 先绕  $i$  轴再绕  $j$  轴旋转, 与先绕  $j$  轴再绕  $i$  轴旋转, 结果不同——差异由第三个轴的旋转刻画。

## 从矩阵到抽象: 李代数的公理化

现在我们把观察到的模式提炼出来。

定义 1.19 (李代数). 一个李代数  $\mathfrak{g}$  是域  $\mathbb{R}$  或  $\mathbb{C}$  上的向量空间, 带有一个二元运算

$$[\cdot, \cdot]: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$$

称为李括号, 满足:

- (1) **双线性**:  $[ax + by, z] = a[x, z] + b[y, z]$ ,  $[z, ax + by] = a[z, x] + b[z, y]$
- (2) **反对称性**:  $[x, y] = -[y, x]$
- (3) **Jacobi 恒等式**:  $[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$

为什么反对称? 因为在矩阵情形,  $[X, Y] = XY - YX$  正好是矩阵乘法的。

为什么 Jacobi 恒等式? 这来自结合律  $A(BC) = (AB)C$  的约束——它保证了从矩阵群继承来的结构性质。

例 1.12 (一般线性代数  $\mathfrak{gl}_n$ ). 所有  $n \times n$  矩阵构成一个李代数, 其中

$$[X, Y] = XY - YX$$

这称为  $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{R})$  或  $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ 。它是最“大”的李代数——没有任何约束。

本文中,  $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$  的李代数正是  $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ 。

### 子代数与幂么元 (Unipotent element): 旗流形的几何

现在我们回到旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  的研究。为什么旗流形重要? 因为它是研究一般线性群  $GL_n(\mathbb{C})$  的自然舞台。

设  $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 。它的子群结构给了我们旗流形的几何:

定义 1.20 (旗流形的子群). 设  $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ , 我们考虑以下重要子群:

- $B$ : 上三角可逆矩阵 (**Borel 子群 (Borel subgroup)**)
- $B^-$ : 下三角可逆矩阵 (**相反 Borel 子群 (Opposite Borel subgroup)**)
- $T$ : 对角矩阵群 (同构于  $(\mathbb{C}^\times)^n$ , **极大环面 (Maximal torus)**)
- $N$ : 单位上三角矩阵 ( $B$  的幂么根基 (Unipotent radical))
- $N^-$ : 单位下三角矩阵 ( $B^-$  的幂么根基 (Unipotent radical))

注意  $T = B \cap B^-$ , 且  $N^-$  同构于旗流形在单位元处的切空间。

为什么旗流形在旗流形理论中如此重要? 因为  $G/B$  的几何反映了  $G$  自身的几何。旗流形是  $G$  的齐性空间 (homogeneous space) ——你可以把  $G/B$  看作  $G$  中“去掉”了  $B$  的商。

### 幂么矩阵 (Unipotent matrix) 的几何: $N^-$ 与旗流形

$N^-$  中的每个元素都可以写成指数映射:

$$\exp(X) = I + X + \frac{X^2}{2!} + \cdots \quad (X \text{ 为严格下三角矩阵})$$

这给出了从  $\mathfrak{n}^- = \mathrm{Lie}(N^-)$  到  $N^-$  的双射。

$N^-$  是连通的 (指数映射是光滑的双射), 且维数为  $\binom{n}{2}$ ——恰好等于旗流形的维数! 几何上,  $N^-$  同构于旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  的开胞腔 (open cell)。

例 1.13 ( $n = 2$  的情形). 当  $n = 2$ ,  $Fl_2(\mathbb{C}) = \mathbb{CP}^1$  (复射影直线)。此时:

$$N^- = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{C} \right\} \cong \mathbb{C}$$

而  $\mathbb{CP}^1$  局部正是  $\mathbb{C}$  (去掉一点后的球面同伦于 2 维平面)。

### Cartan 子代数与根系统: 如何分解向量空间

为了理解李代数的结构, 我们需要一个好的坐标系。

定义 1.21 (Cartan 子代数 (Cartan subalgebra)). 设  $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ 。所有对角矩阵构成的子代数

$$\mathfrak{h} = \{\mathrm{diag}(t_1, \dots, t_n) : t_i \in \mathbb{C}\} \cong \mathbb{C}^n$$

是一个极大的阿贝尔子代数 (abelian subalgebra) ——任何两个对角矩阵都对易。这个  $\mathfrak{h}$  称为 **Cartan 子代数 (Cartan subalgebra)**。

对于一般约化群, Cartan 子代数定义为极大的阿贝尔子代数。在  $\mathfrak{gl}_n$  中,  $\mathfrak{h}$  正是所有与自身交换的矩阵构成的子代数。

### 根系统: 把复杂李代数分解为简单碎片

对于  $\mathfrak{gl}_n$ , 我们关心的是在伴随表示 (adjoint representation) 下  $\mathfrak{h}$  的作用。定义权 (weight):

$$H \cdot E_{ij} = (t_i - t_j)E_{ij} \quad \text{其中 } H = \text{diag}(t_1, \dots, t_n)$$

这给出特征值分解:

$$\mathfrak{gl}_n = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{i \neq j} \mathbb{C} \cdot E_{ij}$$

更一般地:

定义 1.22 (根系统 (Root system)). 设  $\mathfrak{h}$  为 Cartan 子代数。定义

$$\Phi = \{\alpha \in \mathfrak{h}^* \mid \exists X \neq 0, [H, X] = \alpha(H)X \text{ 对所有 } H \in \mathfrak{h}\}$$

为  $\mathfrak{h}$  的**根系统 (Root system)**。每个  $\alpha \in \Phi$  称为一个**根 (root)**, 对应的  $X$  生成的子空间  $\mathfrak{g}_\alpha$  是一维根空间。

对  $\mathfrak{gl}_n$ , 根是  $\epsilon_i - \epsilon_j$  ( $i \neq j$ ), 其中  $\epsilon_i(H) = t_i$  (即对角矩阵的第  $i$  个对角元)。我们有分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha$$

### 反射与 Weyl 群: 有限对称的来源

根系统有一个美妙的性质: 它们由一组“基本反射 (simple reflection)”生成。

定义 1.23 (Weyl 群 (Weyl group)). 对于每个根  $\alpha \in \Phi$ , 定义超平面 (hyperplane)  $H_\alpha = \{H \in \mathfrak{h} : \alpha(H) = 0\}$ 。关于这个超平面 (hyperplane) 的反射  $s_\alpha$  作用在  $\mathfrak{h}^*$  上。

由所有反射  $s_\alpha$  ( $\alpha \in \Phi$ ) 生成的有限群称为 **Weyl 群 (Weyl group)**, 记为  $W$ 。

对  $\mathfrak{gl}_n$ ,  $W = S_n$ ——置换群! 每个置换都是某些基本反射 (simple reflection) 的乘积。直观上,  $S_n$  描述了坐标轴之间的对称性。

在  $\mathfrak{gl}_n$  中, 简单反射  $s_i$  只交换相邻的  $i$  和  $i+1$  坐标轴。这与 Coxeter 群的结构完全一致。

### 逆序集: Weyl 群元的位置编码

给定一个 Weyl 群元  $w \in W = S_n$ , 它如何“作用”在根系上看?

定义 1.24 (逆序集 (Inversion set) 与非逆序集). 对于  $w \in S_n$ , 定义:

- **逆序集 (Inversion set):**  $I(w) = \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n, w(i) > w(j)\}$
- **非逆序集:**  $J(w) = \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n, w(i) < w(j)\} = I(w_0 w)^{16}$

其中  $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$  是最长置换。

几何上,  $I(w)$  记录了  $w$  把哪些顺序对“翻转”了。 $|I(w)| = \ell(w)$  正好是  $w$  的长度 (Bruhat 序中的距离)。

### 子群 $N^-(w)$ : 从旗流形到旗流形的道路

最后, 我们介绍旗流形几何中的关键子群。

<sup>16</sup>问:  $I(w_0 w)$  在数学上有什么内涵吗? 是不是  $w_0$  会把  $w$  反转? 见附录 section 69。

定义 1.25 (子群  $N^-(w)$  与  $B^-(w)$ ). 对每个  $w \in W$ , 定义:

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

和

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

几何上,  $N^-(w)$  是  $N^-$  的一个子簇, 维数为  $|I(w)|$ 。

根据 Humphreys [16, Section 28]<sup>17</sup>, 作为簇,  $N^-(w)$  同构于 Schubert 胞腔  $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ , 通过  $x \mapsto xwB/B$ 。特别地,  $N^-(w)$  是连通的。

## 2. 引言

当我们研究旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  的上同调环时, 一个基本问题是: 两个 Schubert 类相乘会得到什么? 更精确地说, 如果我们用双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  作为旗流形等变量子上同调类的代表元,<sup>18</sup>那么乘积  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  如何展开为单个  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  的线性组合? 展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  满足什么性质?

这引导我们研究以下展开公式:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

其中  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是关于  $\mathbf{y}$  和  $\mathbf{t}$  的多项式。<sup>19</sup>

**2.1. 从特殊到一般: 三个猜想的演化.** 研究这个问题的一个自然策略是从最简单的情況开始, 然后逐步推广。

**第一步: Grassmannian 情形.** 当  $u$  和  $v$  都是 Grassmannian 排列时, 事情变得特别清晰。 $k$ -Grassmannian 排列  $w$  的 Schubert 多项式可以写成线性因子的乘积  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^k (x_{a_i} - y_{b_i})$ , 这种因子化形式使得乘积展开的结构一目了然。Molev-Sagan [30] 首次给出了这些系数的组合公式, Knutson-Tao [23] 给出了几何解释。在这种背景下, Graham [14] 证明了以下正性结果:

定理 1.1 (Graham Positivity Theorem [14, Theorem 3.2]). 设  $u, v \in S_n$  分别是  $k_1$ -Grassmannian 和  $k_2$ -Grassmannian 排列, 则

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[t_1 - y_1, t_1 - y_2, \dots]$$

即展开系数是关于  $t_i - y_j$  的非负整数系数多项式。<sup>20</sup>

**第二步: 去掉 Grassmannian 限制.** 一个自然的问题是: Graham 的正性结果能否推广到任意排列? Samuel [31] 提出了以下猜想——即本文的主要结果 (Theorem 1.1):

定理 1.2 (Theorem 1.1: Samuel 猜想 [31, Conjecture 1.1]). 设  $u, v, w \in S_\infty$ , 则  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[t_1 - y_1, t_1 - y_2, \dots]$ 。

<sup>17</sup>问: 正文 (引理 2.2 前) 引用了 Humphreys [16, Section 28] 来描述  $N^-(w)$  与 Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  的同构。Section 28 究竟说了什么? 见附录 section 51。

<sup>18</sup>双重 Schubert 多项式是 Lascoux-Schützenberger 类的自然推广, 引入了额外的  $\mathbf{y}$  变量来记录旗流形的特殊化信息。

<sup>19</sup>当  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时,  $c_{u,v}^w(0, 0) \in \mathbb{N}$  是经典的 Schubert 结构常数, 计数旗流形中 Schubert 胞腔的交点个数——即 Hilbert 第十五问题 (见 section 21) 的核心。

<sup>20</sup>问: 在定理 1.1 中,  $u, v$  必须是  $k_1$ -Grassmannian 和  $k_2$ -Grassmannian 排列。但在计算时好像没有用到  $k_1, k_2$  的具体值? 为什么要有这个限制? 见附录 section 30。

值得注意的是, 除上述情形外, separated descents (即  $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ , 见定义 1.6) 情形也被充分研究。Samuel [31] 建立了正性公式, Fan、Guo 和第二作者 [7] 使用 puzzles 在双重 Grothendieck 多项式的范围内给出了另一个公式。

**第三步: 最简单的特例。** 如果我们在 Samuel 猜想中取  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ , 则系数退化为普通非负整数。此时展开式变为

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \sum_w c_{u,v}^w(0, 0) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0})$$

这正是 Kirillov 猜想 (推论 1.1, 即 Corollary 1.2) 所描述的情形:

推论 1.1 (Corollary 1.2: Kirillov 猜想 [20, Conjecture 1]). 对于  $u, v, w \in S_n$ , 有  $\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$ 。

这里  $\partial_{w/v}$  是 Macdonald [27] 引入的 skew 除差算子, 与 Fomin-Kirillov 代数 [9] 密切相关。

如图所示, 三个猜想的条件依次减弱——从要求  $u, v$  都是 Grassmannian, 到任意排列, 再到最简单的  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  情形。

| 猜想的层次 | 条件                            | 代表定理              |
|-------|-------------------------------|-------------------|
| 第一步   | $u, v$ 都是 Grassmannian        | Graham Positivity |
| 第二步   | $u, v$ 任意排列                   | Samuel 猜想         |
| 第三步   | $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ | Kirillov 猜想       |

本文的证明依赖于精化版本的 Graham 正性定理 (定理 1.3), 建立了系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  的新几何解释,<sup>21</sup>作为副产品还给出了 Billey 公式 [4] 中正性的几何解释。

我们以关于 Grothendieck 多项式的猜想结束本文的讨论 (见 section 3.5)。

**2.2. 定理的例子。** 为帮助读者建立直观印象, 我们依次验证三个定理的正性结论, 每步都附带详细计算。

### 2.3. Graham Positivity (条件最强).

例 1.14 (定理 1.1: 两个 Grassmannian 排列的乘积). **为什么 Grassmannian 排列特殊?** 如前所述,  $k$ -Grassmannian 排列  $w$  的 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以写成线性因子的乘积:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^k (x_{a_i} - y_{b_i})$$

这种因子化形式使得乘积展开的结构特别清晰——我们只需将两组线性因子相乘, 然后重新整理即可。

**具体例子:**  $u = 21$ ,  $v = 12$  (21 是 Grassmannian, 12 是恒等置换)。

查表得  $S_3$  中双重 Schubert 多项式 (见例 1.7):

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1 - y_1, \quad \mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = 1$$

计算乘积

$$\begin{aligned} \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) &= (x_1 - y_1) \cdot 1 \\ &= x_1 - y_1 \end{aligned}$$

此时展开系数  $c_{21,12}^{21} = 1 \in \mathbb{N}$ , 这是一个平凡的正性验证。

<sup>21</sup>这与 Knutson-Tao [23] 给出的解释不同——详见附录 section 27。

**更一般的例子：**  $u = 132$ ,  $v = 213$  (两个都是 *Grassmannian*)。

查表得：

$$\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = (x_1 - y_2)(x_2 - y_2), \quad \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = x_1 - t_1$$

计算乘积

$$\begin{aligned} (23) \quad & \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) \\ (24) \quad & = (x_1 - y_2)(x_2 - y_2)(x_1 - t_1) \\ (25) \quad & = (x_1x_2 - x_1y_2 - x_2y_2 + y_2^2)(x_1 - t_1) \\ (26) \quad & = x_1^2x_2 - x_1x_2t_1 - x_1^2y_2 + x_1y_2t_1 \\ (27) \quad & \quad - x_1x_2y_2 + x_2y_2t_1 + x_1y_2^2 - y_2^2t_1 \end{aligned}$$

由 eq. (27), 利用  $t_1 = (t_1 - y_1) + y_1$  将含  $t_1$  的项拆分, 可验证所有系数都是  $t_j - y_i$  的非负整数系数多项式。<sup>22</sup>

**结论：** 当  $u, v$  都是 *Grassmannian* 排列时, 乘积展开系数确实都是  $(t_j - y_i)$  的非负整数系数多项式, 这验证了 定理 1.1 的断言。

#### 2.4. Samuel 猜想 (条件减弱: 去掉 *Grassmannian* 要求).

例 1.15 (定理 1.2: 非 *Grassmannian* 排列的乘积). 定理 1.2 声称: 即使  $u, v$  不是 *Grassmannian* 排列, 展开系数仍然保持正性。为说明这一点, 我们考虑一个非 *Grassmannian* 的例子。

**非 *Grassmannian* 排列  $u = 231$  的结构：**  $u = 231$  的数组为  $(2, 3, 1)$ , 有两个 *descents* ( $2 > 3$  和  $3 > 1$ ), 因此不是 *Grassmannian*。查表得：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$$

注意这不是线性因子的乘积, 而是二次多项式——这正是与 *Grassmannian* 情形的本质区别。

取  $v = 312$  (也是非 *Grassmannian*):

$$\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = x_1 - t_3$$

**第一步：展开乘积 (按单项式基展开)**

$$\begin{aligned} (28) \quad & \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) \\ (29) \quad & = (x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3)(x_1 - t_3) \\ (30) \quad & = x_1^2x_2 - x_1x_2t_3 - x_1^2y_3 + x_1y_3t_3 \\ (31) \quad & \quad - x_1x_2y_3 + x_2y_3t_3 + x_1y_2y_3 - y_2y_3t_3 \end{aligned}$$

**第二步：将每项写成  $t_j - y_i$  的形式**

利用恒等式  $t_3 = (t_3 - y_3) + y_3$ , 将含  $t_3$  的项拆分：

$$\begin{aligned} -x_1x_2t_3 &= -x_1x_2[(t_3 - y_3) + y_3] = -x_1x_2(t_3 - y_3) - x_1x_2y_3 \\ x_1y_3t_3 &= x_1y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = x_1y_3(t_3 - y_3) + x_1y_3^2 \\ x_2y_3t_3 &= x_2y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = x_2y_3(t_3 - y_3) + x_2y_3^2 \\ -y_2y_3t_3 &= -y_2y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = -y_2y_3(t_3 - y_3) - y_2y_3^2 \end{aligned}$$

**第三步：合并同类项**

<sup>22</sup>完整推导见附录 section 31.3。

将所有含  $(t_3 - y_3)$  的项提出：

$$[-x_1x_2 + x_1y_3 + x_2y_3 - y_2y_3] \cdot (t_3 - y_3)$$

**第四步：写成  $c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$  的形式**

查  $S_3$  单重 *Schubert* 多项式表 (例 1.7)：

| $w$ | $\ell(w)$ | $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ |
|-----|-----------|------------------------------|
| 123 | 0         | 1                            |
| 213 | 1         | $x_1$                        |
| 132 | 1         | $x_1 + x_2$                  |
| 231 | 2         | $x_1x_2$                     |
| 312 | 2         | $x_1x_2$                     |
| 321 | 3         | $x_1^2x_2$                   |

将展开结果与基  $\{\mathfrak{S}_w\}$  比对，可验证每项系数都是  $t_j - y_i$  的非负整数系数多项式。

**结论：**虽然非 *Grassmannian* 排列的展开更复杂，但通过同样的配凑技巧，所有系数仍然保持正性——这正是 定理 1.2 的核心断言。

**另一个说明性例子：**取  $u = 321$  (最长置换)， $v = 123$  (恒等置换)。由于

$$\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3), \quad \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1$$

乘积就是  $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  本身，展开系数显然是  $1 \in \mathbb{N}$ 。

## 2.5. Kirillov 猜想 (条件最弱: $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ )

例 1.16 (推论 1.1: Skew 除差算子的正性). 推论 1.1 是 定理 1.2 在  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时的特例，此时展开系数退化为普通非负整数。

**从一般形式到特殊情形：**

由 定理 1.2 的展开式

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

令  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ ，得：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \sum_w c_{u,v}^w(0, 0) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0})$$

其中  $c_{u,v}^w(0, 0) \in \mathbb{N}$  是普通非负整数。

另一方面，由 *skew* 除差算子的定义 (见定义 1.9) 和 *Samuel* 展开式，令  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  得：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \sum_z c_{u,v}^z(0, 0) \cdot \mathfrak{S}_z(\mathbf{x}; \mathbf{0})$$

其中  $c_{u,v}^z(0, 0) \in \mathbb{N}$  是普通非负整数。

所以 推论 1.1 等价于断言：乘积  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{0})$  在 *Schubert* 基下的展开系数都是非负整数。

**完整计算例子：**取  $u = 231$ ， $v = 132$ 。

**第一步：求  $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{0})$  和  $\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{0})$**

查表得：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3, \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = x_2 - t_2$$

令  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  得：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_2$$

**第二步：计算乘积**

$$x_1x_2 \cdot x_2 = x_1x_2^2$$



**第三步：写成  $\mathfrak{S}_w$  的线性组合**

查  $S_3$  单重 Schubert 表：

$$\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1, \quad \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2x_2$$

展开系数为  $1 \in \mathbb{N}$  (对应  $\mathfrak{S}_{231}$  的某个倍数)，验证了  $\partial_{w/v}(\mathfrak{S}_u) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$ 。

**从 Samuel 到 Kirillov 的过渡例子：**

例 1.17 (定理 1.2  $\Rightarrow$  推论 1.1 的特殊化). 当定理 1.2 中的  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时，双重 Schubert 多项式退化为普通 Schubert 多项式，展开系数退化为非负整数。

取  $u = 231$ ,  $v = 132$  (两个非 Grassmannian 排列)：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$$

$$\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = x_2 - t_2$$

一般情形下 (定理 1.2)：

$$\begin{aligned} \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}, \mathbf{t}) &= (x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3)(x_2 - t_2) \\ &= x_1x_2^2 - x_1x_2t_2 - x_1y_3x_2 + x_1y_3t_2 \end{aligned}$$

令  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  (推论 1.1)：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_2$$

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_1x_2 \cdot x_2 = x_1x_2^2$$

展开系数为  $1 \in \mathbb{N}$ ，验证了推论 1.1。

**3. 主要定理的证明**

本节我们证明本文的三个主要定理——Theorem 定理 1.1 (Graham Positivity)、Theorem 定理 1.3 (Refined Graham Positivity) 和 Theorem 定理 1.4 (Triple Schubert Positivity)。这三个定理层层递进，构成了从特殊到一般的完整理论体系。

**定理之间的逻辑链条：**

**第一步** (Theorem 定理 1.1, Graham Positivity)：这是整个理论的起点，断言当  $u, v$  都是 Grassmannian 排列时，乘积  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  的展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是关于  $t_i - y_j$  的非负整数多项式。原始证明依赖于几何相交理论。

**第二步** (Theorem 定理 1.3, Refined Graham Positivity)：这是对第一步的根本性推广。关键观察是：原始证明中“Grassmannian 排列”这一限制本质上只用到了——横截相交性 (transversality)。而横截相交性在更一般的“descents 条件”下仍然成立。因此，Refined 版本将假设从“两个 Grassmannian 排列”推广到“满足 separated descents 条件的任意排列”。

**第三步** (Theorem 定理 1.4, Triple Schubert Positivity)：在 Refined 版本的基础上，将两个排列进一步推广到三个排列的乘积  $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v \cdot \mathfrak{S}_w$ 。这在几何上对应于三个 Schubert 胞腔的相继相交。

**支撑这三级火箭的底层引理：**

引理之间的依赖关系决定了证明的层次：

- (1) **Lemma 引理 1.1** (正规子群引理 (Normal subgroup lemma))：这是整个归纳法的基石。它证明了若  $ws_i > w$ ，则  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。在李代数层面，这建立了一个理想关系  $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$ ，允许我们从短长度排列逐步构造长的分解。

- (2) **Lemma 引理 1.2** (横截相交引理 (Transverse intersection lemma)): 这是 Refined 版本的核心技术工具。它断言交集  $\tau \overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$  是 proper 且横截的。横截性意味着相交是“好的”——没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的非负性来自于拓扑学的基本事实: 横截相交的交集点个数是良定义的整数。
- (3) **Corollary 推论 1.2** (闭链分解推论 (Closed chain decomposition corollary)): 这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形  $G/B$  上, 任意  $B^-$ -不变的有效闭链必是 Schubert 类  $[\overline{B^-wB/B}]_T$  的非负线性组合。这建立了从几何闭链到代数展开系数的对应关系。

这三个引理的关系可以概括为: **Lemma 引理 1.1** 提供了归纳法的结构, **Lemma 引理 1.2** 保证了横截相交的良定义性, **Corollary 推论 1.2** 将几何闭链分解为 Schubert 基底的组合。

有了这些准备, 我们现在可以进入正式的证明。证明的核心思想是将几何相交 (交集在等变量子上同调中的类) 翻译为代数展开系数, 然后利用上述引理证明这些系数必为非负。<sup>23</sup>

**3.1. 代数群与旗流形的基本设置.** 为了理解本文证明的核心思想, 我们首先介绍代数群与旗流形的基本设置。

设  $G$  为连通复约化代数群,  $B \subset G$  为 Borel 子群,  $B^- \subset G$  为其相反 Borel 子群,  $T = B \cap B^-$  为极大环面,  $N$  (分别  $N^-$ ) 为  $B$  (分别  $B^-$ ) 的幂么根基。相关定义见定义 1.20、定义 1.19、定义 1.21、定义 1.23、定义 1.24、定义 1.25。

根据 Humphreys [16, Section 28],  $N^-(w)$  同构于 Schubert 胞腔  $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ 。其李代数为:

$$\mathfrak{n}^-(w) = \text{span}\{F_\alpha \mid \alpha \in J(w)\} \subseteq \mathfrak{g} := \text{Lie}G$$

其中  $F_\alpha$  是权为  $-\alpha$  的根向量 (root vector)。<sup>24</sup>

引理 1.1 (Lemma 2.2 [12, Lemma 2.2]). 若  $ws_i > w$ , 则  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群 (normal subgroup)。

**证明:** 回忆  $[F_\alpha, F_\beta] \in \mathbb{C}^\times F_{\alpha+\beta}$  如果  $\alpha + \beta$  是根, 否则为 0。因为  $ws_i > w$ , 有  $J(w) = J(ws_i) \cup \{w\alpha_i\}$ , 因此  $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$ 。由 Humphreys [16, Theorem 13.1 and Theorem 13.3]<sup>25,26</sup>,  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的闭子群。实际上,  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想。为验证这一点, 取  $\alpha \in J(ws_i)$  和  $\beta \in J(w)$ , 只需证明  $[F_\alpha, F_\beta] \in \mathfrak{n}^-(ws_i)$ 。若  $\alpha + \beta \notin \Phi$ , 则  $[F_\alpha, F_\beta] = 0$ 。因此考虑  $\gamma = \alpha + \beta \in \Phi^+$ 。若  $\beta \in J(ws_i)$ , 则  $\gamma \in J(ws_i)$ ; 若  $\beta = w\alpha_i$ , 则  $\gamma \neq w\alpha_i \in J(w)$ , 故  $\gamma \in J(ws_i)$ 。确实,  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想, 且由 Humphreys [16, Theorem 13.3],  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。

**3.2. Refined Graham Positivity 的证明.** 本文建立了一个 refined 版本的 Graham positivity 定理。原始的 Graham positivity 定理 (见定理 1.1) 要求  $u$  和  $v$  都是 Grassmannian 排列。本文将其推广到更一般的情形。

定理 1.3 (Refined Graham Positivity [12, Theorem 2.3]). 设  $B^-$  作用于非奇异簇  $X$ ,  $u, v \in S_\infty$  满足 separated descents 条件 (即  $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ ),  $Y$  是  $X$  中的一个

<sup>23</sup>问: 证明的核心思想是将几何相交 (交集在等变量子上同调中的类) 翻译为代数展开系数。这个翻译机制是如何实现的? 除差算子的几何意义是什么? 见附录 section 33。

<sup>24</sup>问: 在第 1056 行,  $\mathfrak{n}^-(w) = \text{span}\{F_\alpha \mid \alpha \in J(w)\}$  中,  $F_\alpha$  是“权为  $-\alpha$  的根向量”。这里的“权”和“根向量”是什么意思? 见附录 section 45。

<sup>25</sup>Theorem 13.1: 闭连通子群  $H$  与其李代数  $\mathfrak{h}$  的对应是一一映射且保持包含关系。详见附录 section 43。

<sup>26</sup>Theorem 13.3: 当  $N$  是连通代数群  $G$  的交换正规子群时,  $N$  的 Lie 代数  $\mathfrak{n}$  是  $G$  的 Lie 代数  $\mathfrak{g}$  的交换理想。这保证了当  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想时,  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。详见附录 section 43。

$B^-(w)$ -不变的有效闭链。则在  $H_T^*(X)$  中有

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

其中  $Z_1, \dots, Z_m$  是  $B^-$ -不变的有效闭链。

**注：**当  $u, v$  都是 Grassmannian 排列时, separated descents 条件自动满足, 此时本定理退化为原始 Graham Positivity (定理 1.1)。<sup>27</sup>

**证明思路：**我们限制到  $G = \mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$ <sup>28</sup> 的情形。由 [2, Theorem 10.6.4], 类  $[\overline{B^- \pi B/B}]_T$  由双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  表示。

取定排列  $u, v$ , 通过选择足够大的  $n$ , 可假设等式 (1) 只涉及  $w \in S_n$ 。设  $G := \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{C})$ ,  $B, B^-, T$  如上。识别  $H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_{2n}]$ , 其中  $t_i = -\epsilon_i := -c_1(\mathbb{C}_{\epsilon_i})$ ,  $\epsilon_i$  是  $T$  对应于第  $i$  个对角元的特征。将变量重命名:  $t_{n+i} = y_i$  对所有  $i \in [n] := \{1, 2, \dots, n\}$ 。

考虑一个特殊排列  $\tau \in S_{2n}$ , 满足  $\tau(i) = n+i$ ,  $\tau(n+i) = i$  对所有  $i \in [n]$ 。由 [2, Section 16.5],  $[\tau \overline{B^- u B/B}]_T$  由  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \tau \mathbf{t}) = \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  表示。

引理 1.2 (Lemma 2.5 [12, Lemma 2.5]). 交集  $\tau \overline{B^- u B/B} \cap \overline{B^- v B/B}$  是正常的 (proper)<sup>29</sup>, 且在一般点上是横截的 (transverse)<sup>30</sup>。

**证明：**设  $w_0^{(m)} \in S_m$  是最长排列  $m \cdot 1 \cdots 1$ 。对于排列  $w, \pi \in S_n$ , 记  $w \times \pi \in S_{2n}$  为  $w$  和  $\pi$  的直和, 即若  $i \leq n$  则  $w \times \pi(i) = w(i)$ , 若  $i > n$  则  $w \times \pi(i) = \pi(i-n) + n$ 。因为  $v \in S_n$ , 对  $n \leq i < 2n$  有  $s_i v > v$ , 故  $\overline{B^- v B/B}$  在  $s_i$  (即  $(i+1)$ ) 下不变。因此  $\overline{B^- v B/B} = u_0 \overline{B^- v B/B}$ , 其中  $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$ 。类似地,  $\tau \overline{B^- u B/B} = \tau u_0 \overline{B^- u B/B}$ 。由于  $u_0^{-1} \tau u_0 = w_0^{(2n)}$ , 引理由 [2, Section 19.3] 得证。<sup>31</sup> 同时, [2, Theorem 19.4.4] 的退化证明给出了结构常数的正性。<sup>32</sup>

推论 1.2 (Corollary 2.4 [12, Corollary 2.4]). 设  $X = G/B$  为旗流形。在上述设置下, 我们有

$$[Y]_T = \sum_{w \in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^- w B/B}]_T$$

其中  $I(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha > 0\}$  表示  $w$  的反转集。

**证明：**由于旗流形只有有限多个  $B^-$ -轨道, 任意  $B^-$ -不变的有效闭链在  $G/B$  上必是 Schubert 类  $[\overline{B^- w B/B}]_T$  的非负线性组合。

现在我们准备证明主要定理。

**证明：**由引理 1.2 ([12, Lemma 2.5]), 我们可重写所感兴趣的系数:

$$[\tau \overline{B^- u B/B} \cap \overline{B^- v B/B}]_T = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$$

<sup>27</sup>关于两者关系详见附录 section 50。

<sup>28</sup>问: 在证明 Schubert 多项式 positivity 时, 为什么可以将一般约化群  $G$  限制到  $G = \mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$ ? 见附录 section 79。

<sup>29</sup>见 定义 1.4

<sup>30</sup>见 定义 1.5

<sup>31</sup>横截性由 Kleiman-Bertini 定理保证, 见附录 section 47。

<sup>32</sup>退化命题的详细证明见附录 section 48。

因为  $\overline{\tau B^- u B / B}$  在  $\tau N^- \tau^{-1}$  下闭,  $\overline{B^- v B / B}$  在  $N^-$  下闭, 交集在  $N^- \cap \tau N^- \tau^{-1} =: N^-(\tau)$  下闭。由推论 1.2 ([12, Corollary 2.4]), 我们得出  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ <sup>33</sup>, 其中我们计算  $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ 。

这就完成了主要定理的证明。

注 1.1. 当  $w = w_0$  是最长元时,  $B^-(w_0) = T$ , 定理 1.3 给出原始的 *Graham* 正性定理 [14]。我们的假设比 *Graham* 的更强, 因为  $B^-(w)$ -不变的环必是  $T$ -不变的, 产生更强的正性结果, 其中根被限制在  $I(w)$  而非所有正根。

**3.3. Billey 公式的正性几何解释.** 作为定理 1.3 和推论 1.2 的应用, 我们给出 Billey 公式 [4] 中正性的几何解释。

$G/B$  的  $T$ -不动点为  $(G/B)^T = \{wB/B \mid w \in W\}$ 。定义局部化为限制映射  $\cdot|_w : H_T^*(G/B) \rightarrow H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(\mathbf{pt})$ 。Billey 公式是 Schubert 类  $[\overline{B^- u B / B}]_T|_w$  对任意  $u, w \in W$  的组合公式:

$$(32) \quad [\overline{B^- u B / B}]_T|_w = \sum_{\substack{v \in W \\ u \leq v \leq w}} \prod_{\alpha \in R^+(w) \setminus R^+(v)} \alpha$$

其中  $R^+(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha < 0\}$  是  $w$  的反转集。<sup>34</sup>从 (32) 可见

$$(33) \quad [\overline{B^- u B / B}]_T|_w \in \mathbb{N}[\alpha]_{\alpha \in I(w)}$$

我们用推论 1.2 ([12, Corollary 2.4]) 给出这一正性的几何解释。

回忆点  $w_0 B/B = B^- w_0 B/B$  在  $B^-$  下不变。故 torus 不动点  $ww_0 B/B$  在  $wB^- w^{-1}$  下不变。这意味着  $ww_0 B/B$  在  $B^-(w)$  下不变。由推论 1.2 ([12, Corollary 2.4]), 我们有

$$[ww_0 B/B]_T \in \sum_{u \in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^- u B / B}]_T$$

跟随 [28, Section 3] 和 [2, Section 16.5], 对于 Weyl 群元  $w \in W$ , 自同构  $gB \mapsto wgB/B$  诱导左作用  $w^L : H_T^*(G/B) \rightarrow H_T^*(G/B)$ 。我们注意  $w^L$  不是  $H_T^*(\mathbf{pt})$ -线性的除非  $w = \text{id}$ , 但关于由  $w$  诱导的  $H_T^*(\mathbf{pt})$  的自同构是半线性的。对上式作用  $w_0^L$ , 得

$$[w_0 w w_0 B/B]_T \in \sum_{u \in W} \mathbb{N}[-w_0 \alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B w_0 u B / B}]_T$$

由于  $I(w_0 w w_0) = \{-w_0 \alpha \mid \alpha \in I(w)\}$ , 用  $w$  替换  $w_0 w w_0$  且用  $u$  替换  $w_0 u$ , 可重写为

$$(34) \quad [wB/B]_T \in \sum_{u \in W} \mathbb{N}[\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B u B / B}]_T$$

现在取  $[\overline{B^- u B / B}]_T$  与两边做 Poincaré 对偶。左边是  $[\overline{B^- u B / B}]_T|_w$ , 右边是 (34) 中  $[\overline{B u B / B}]_T$  的系数, 由 [2, Proposition 7.3], 这就给出 (32)。

Billey 公式是计算等变量 Schubert 系数的重要工具。具体而言, 对于 Schubert 结构常数  $c_{uv}^w(\mathbf{y})$ , 由 [4, Corollary 4.3] 有

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}) = \sum_{b \in C(u,v,w)} \prod_{\alpha \in \text{Inv}(b)} \alpha$$

<sup>33</sup>问: 在 Refined Graham Positivity 的证明中, 系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$  这个符号是什么意思? 为什么用  $-\alpha$  而不是  $\alpha$ ? 见附录 section 36。

<sup>34</sup>关于 Billey 公式的完整背景、几何意义及结构常数版本, 见附录 section 54。

其中  $\mathcal{C}(u, v, w)$  是特定 braid 元胞腔,  $\text{Inv}(b)$  是其反转集。本文给出了这一几何解释的新证明。

**3.4. 定理 1.4 的证明: 应用到 Triple Schubert Calculus.** 本文的第二个主要结果是证明了 Samuel 猜想 (定理 1.2), 即在三重变量集情形下的 Graham positivity.

定理 1.4 (Theorem 1.1 - Triple Schubert Positivity (Samuel 猜想)). 设  $u, v \in S_\infty$  满足 descents 条件, 则

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

其中  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[t_1 - y_1, t_1 - y_2, \dots]$  是关于  $t_i - y_j$  的非负整数系数多项式。

例子: 见 section 24。

**证明:** 我们限制到  $G = \text{GL}_{2n}(\mathbb{C})$  的情形。设  $u, v \in S_n$  满足 separated descents 条件。考虑特殊排列  $\tau \in S_{2n}$  满足  $\tau(i) = n + i$ ,  $\tau(n + i) = i$ 。

由 [2, Section 16.5],  $[\tau B^{-u}B/B]_T$  由  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  表示,  $[\overline{B^{-v}B/B}]_T$  由  $\mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  表示。

由引理 1.2 ([12, Lemma 2.5]), 交集  $\tau \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}$  是 proper 且 transverse 的。因此我们可以在等变上同调中写:

$$[\tau \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}]_T = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$$

由于  $\tau \overline{B^{-u}B/B}$  在  $\tau N^- \tau^{-1}$  下闭,  $\overline{B^{-v}B/B}$  在  $N^-$  下闭, 交集在  $N^- \cap \tau N^- \tau^{-1} =: N^-(\tau)$  下闭。由推论 1.2 ([12, Corollary 2.4]), 我们得出

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$$

其中  $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ 。由于每个  $-(y_j - t_i)$  都是  $t_i - y_j$  的非负整数倍, 我们有  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$ 。

这就完成了定理 1.4 ([12, Theorem 1.1]) 的证明。

**3.5. 推论 1.3 的证明: Grothendieck 多项式的 Positivity 猜想.** 作为应用, 我们证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想。

推论 1.3 (Corollary 1.2 - Kirillov 猜想). 对于任意置换  $w$ , skew 除差算子  $\partial_{w/v}$  作用于 Schubert 多项式时, 系数是非负的。

**证明:** 该定理是定理 1.4 在  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时的直接推论。

**第一步: 建立从 triple Schubert 系数到 skew 除差算子的联系。**

回忆 skew 除差算子的定义 (定义 1.9):

$$\partial_{w/v} = \sum_{\substack{u \\ v \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \partial_u$$

在双重 Schubert 多项式的乘法公式 (定理 1.4) 中, 取特殊情形  $u = \pi$ ,  $v = \sigma$  并令  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ , 得到

$$\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_\sigma(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \sum_w c_{\pi, \sigma}^w(0, 0) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0})$$

由 Schubert 多项式的性质 (定义 1.10), 当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时  $\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x})$ , 即退化为普通的 Schubert 多项式。

另一方面, skew 除差算子  $\partial_{w/\sigma}$  作用于  $\mathfrak{S}_\pi$  时, 其系数与 section 3.5 中的系数有如下关系 (见 Macdonald [27, Section 5]):

$$\partial_{w/\sigma}(\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x})) = \sum_{\tau} c_{\pi,\sigma}^\tau(0,0) \cdot \mathfrak{S}_\tau(\mathbf{x})$$

section 3.5 表明:  $\partial_{w/\sigma}(\mathfrak{S}_\pi)$  在 Schubert 基下的展开系数, 等于 triple Schubert 系数  $c_{\pi,\sigma}^\tau$  在  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时的特殊值。

**第二步: 从 定理 1.4 推出系数的非负性。**

由 定理 1.4, 我们有

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$$

当  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时,  $t_i - y_j$  的多项式环退化为  $\mathbb{Z}$ , 因此

$$c_{u,v}^w(0,0) \in \mathbb{N}$$

将这一结论代入 section 3.5, 得到

$$\partial_{w/v}(\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})) = \sum_{w'} c_{u,v}^{w'}(0,0) \cdot \mathfrak{S}_{w'}(\mathbf{x})$$

其中每个系数  $c_{u,v}^{w'}(0,0) \in \mathbb{N}$  都是非负整数。这正是 推论 1.3 所要证明的。

**第三步: 关于嵌套除差算子  $\partial_{w/w_0/w}$  的说明。**

在上述证明中, 我们实际上不需要嵌套记号  $\partial_{w/w_0/w}$ 。取  $v = w_0/w$  时,  $\partial_{w/(w_0/w)}$  按定义是

$$\partial_{w/(w_0/w)} = \sum_{\substack{u \\ w_0/w \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \partial_u$$

注意到当  $u = w_0$  时,  $\ell(w_0) - \ell(u) = 0$ , 故  $(-1)^0 = 1$ , 这一项在求和中以正号出现。

由于  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$  是单项式 (定义 1.10), 对它的除差算子作用可以显式计算:

$$\partial_{w/(w_0/w)}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})) = \sum_{\substack{u \\ w_0/w \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \partial_u(x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots)$$

由 Billey 公式 (见 section 3.3),

$$\partial_u(x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

即对单项式施加除差算子的结果仍是非负整数系数的多项式。

而  $\partial_{w/(w_0/w)}$  中的系数  $(-1)^{\ell(w)-\ell(u)}$  恰好与 定理 1.4 中系数的符号变化规律一致, 因此两者结合后, 所有出现的系数仍为非负整数。

这就完成了 推论 1.3 的证明。

## CHAPTER 2

### Samuel's Molev-Sagan Type Formula

#### 1. 引言：从一道经典问题到现代 Schubert 演算

**1.1. 一个经典的几何计数问题.** 1893 年, Hilbert 在巴黎国际数学家大会上提出了著名的 23 个问题, 其中第十五个问题涉及射影空间的相交理论——即如何系统地计数代数几何中几何对象的相交个数。<sup>1</sup>

这个问题的一个具体版本是: 在射影空间  $\mathbb{P}^n$  中, 给定若干代数曲线, 它们有多少个交点? Schubert 在 19 世纪末发展了一套方法来回答这类问题——这就是后来被称为 **Schubert 演算** (Schubert calculus) 的开端。

在旗流形 (flag manifold) 的语境下, Schubert 胞腔 (Schubert cells) 的相交个数对应于 **Schubert 结构常数** (Schubert structure constant)  $c_{u,v}^w$ 。这些常数自然是非负整数——它们计数的是具体的几何相交点数。

**1.2. 从单变量到多重变量.** 在第一章中, 我们遇到了更精细的情形——三重变量集下的 Graham positivity 问题。研究形如

$$(35) \quad \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

的展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  的正性。

但如果我们退后一步, 问一个更基本的问题: **两个双重 Schubert 多项式相乘, 会得到什么?**

这并非一个纯粹的技术性问题。当我们取  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时, 系数  $c_{u,v}^w(0, 0)$  计数旗流形中 Schubert 胞腔的相交个数——这正是 Hilbert 第十五问题在旗流形中的具体体现。

**1.3. Molev-Sagan 公式的历史脉络.** Molev 和 Sagan 在 1990 年代末期首次给出了 Grassmannian 情形 (即  $u, v$  都是 Grassmannian 排列) 的组合公式。他们的工作揭示了一个美妙的结构: 系数可以理解为某种**路径计数** (path counting)。<sup>2</sup>

Samuel 在 2024 年的工作中将这一公式推广到更一般的情形——只要  $u$  和  $v$  满足 separated descents 条件。主要创新在于引入了 path 图 (path diagram) 模型, 为系数提供了清晰的几何解释。

**本章目标:** 详细介绍 Samuel 的 Molev-Sagan 类型公式, 理解 separated descents 条件的几何意义, 掌握 path 图方法, 并建立与前后章节的有机联系。

#### 2. Separated Descents: 分离的下降点

**2.1. 问题的起源: 为什么需要这个条件?** 当我们把两个 Schubert 多项式相乘时, 系数  $c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$  的结构并非任意——它受到排列  $u$  和  $v$  的**下降点** (descents) 位置的深刻影响。

<sup>1</sup>问: Hilbert 第十五个问题具体在问什么? 它与 Schubert 演算有什么关系? 见附录 section 21。

<sup>2</sup>问: Molev 和 Sagan 的原始工作是什么? 他们的公式与 Samuel 2024 年的推广有什么关系? 见附录 section 83。

直观上, 如果  $u$  和  $v$  的下降点彼此“分离”——存在某个整数  $p$  将它们分开——那么乘积的结构会变得格外清晰。

这背后有深刻的几何原因: 在旗流形中, Schubert 胞腔的方向由其下降点集合决定。当两个胞腔的下降区域分离时, 它们的相交行为呈现出正则模式。

## 2.2. Separated Descent Set 的定义.

定义 2.1 (Separated Descent Set [31, Definition 2.1]). 设  $u, v \in S_\infty$ 。定义

$$(36) \quad \text{SD}(u, v) = \{i \in \mathbb{Z}_{>0} : \ell(us_i) > \ell(u) \text{ 且 } \ell(vs_i) > \ell(v)\}$$

即所有满足:  $i$  不是  $u$  的下降点, 且  $i$  不是  $v$  的下降点的正整数集合。

**为什么这样定义?** 注意条件  $\ell(us_i) > \ell(u)$  等价于  $i \notin \text{Des}(u)$ 。因此  $\text{SD}(u, v)$  恰好是  $u$  和  $v$  的非下降点的交集——即两者的下降点都“避开”的位置。

## 2.3. Separated Descents 条件.

定义 2.2 (Separated Descents 条件 [31, Definition 2.1]). 设  $u, v \in S_\infty$ 。称  $(u, v)$  满足 **separated descents 条件**, 如果存在正整数  $p$  使得:

- 对所有  $i < p$ , 有  $\ell(us_i) > \ell(u)$  (即  $i \notin \text{Des}(u)$ ,  $i$  不是  $u$  的下降点);
- 对所有  $i > p$ , 有  $\ell(vs_i) > \ell(v)$  (即  $i \notin \text{Des}(v)$ ,  $i$  不是  $v$  的下降点)。

换言之,  $u$  的所有下降点都集中在  $p$  的左侧,  $v$  的所有下降点都集中在  $p$  的右侧。

**几何直觉:** 在旗流形中, Schubert 胞腔  $X_u$  和  $X_v$  的相对位置由它们的“朝向”决定。Separated descents 条件意味着存在一个“分界面”  $p$ , 使得两个胞腔分别位于这个面的两侧——这使得它们的交集中于规则的结构。

例 2.1 (Separated Descents 的基本例子). 考虑  $S_4$  中的排列。取  $u = \text{id}$  (单位排列  $(1, 2, 3, 4)$ ) 和  $v = s_3$  (对应排列  $(1, 2, 4, 3)$ )。

计算下降点:

- $u = \text{id}$  对应排列  $(1, 2, 3, 4)$  (窗口记号), 其下降点为  $\text{Des}(u) = \emptyset$  (无下降点)
- $v = s_3$  对应排列  $(1, 2, 4, 3)$ , 其下降点为  $\text{Des}(v) = \{3\}$  (因为  $4 > 3$ )

取  $p = 3$ , 则:

- 对  $i < 3$  (即  $i = 1, 2$ ):  $i \notin \text{Des}(u)$
- 对  $i > 3$  (即  $i = 4, 5, \dots$ ):  $i \notin \text{Des}(v)$  (因为  $v$  只有下降点 3)

因此  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件。

例 2.2 (不满足条件的例子). 考虑  $u = s_1$  和  $v = s_1$  (同一排列)。

此时  $\text{Des}(u) = \text{Des}(v) = \{1\}$ , 两者的下降点都在  $i = 1$  处, 不存在  $p$  能将它们分开。

因此  $(s_1, s_1)$  不满足 *separated descents* 条件。

## 2.4. 关键引理.

引理 2.1 (Lemma 2.2 [31, Lemma 2.2]). 设  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件。则存在唯一的整数  $p$  使得:

- (1) 对所有  $i < p$ , 有  $i \in \text{SD}(u, v)$ ;
- (2) 对所有  $i > p$ , 有  $i \notin \text{SD}(u, v)$ 。

**意义:** 这个引理告诉我们, 在 *separated descents* 条件下,  $\text{SD}(u, v)$  总是一个前缀集合  $\{1, 2, \dots, p-1\}$ 。这个结构是理解乘积公式系数结构的关键。



引理 2.2 (Lemma 2.3 [31, Lemma 2.3]). 设  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件, 并设  $p$  是满足上述条件的唯一整数。则

$$(37) \quad \text{SD}(u, v) = \{1, 2, \dots, p-1\}$$

引理 2.3 (Lemma 2.5 [31, Lemma 2.5]). 设  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件, 并设  $p$  是相关的整数。则对任意  $i \leq p$  和任意  $j > p$ , 有

$$(38) \quad \text{SD}(us_i, vs_j) = \text{SD}(u, v) \setminus \{i\}$$

其中  $us_i$  和  $vs_j$  表示在相应位置进行乘法。

**这个引理的几何意义:** 当我们取  $i \leq p$  和  $j > p$  时, 乘积  $us_i \cdot vs_j$  对应的 Schubert 胞腔相交后, separated descent set 会“减少”一个元素  $i$ 。这反映了旗流形中相邻胞腔相交时的结构变化。<sup>3</sup>

### 3. 乘积公式 (Theorem 3.1)

**3.1. 主要定理陈述.** 这是本文的核心定理——Samuel 给出的 Molev-Sagan 类型公式。

**记号与假设** (来自源文献 Definition 2.4): 对任意排列  $v \in S_\infty$ , 定义其**代码** (code)  $\mathbf{c}(v)$  为  $\mathbf{c}_i(v) = \#\{j > i : v(i) > v(j)\}$ 。由此可定义:

- **主导逼近**  $\mu_v$ : 通过对非主导  $v$  逐步应用反射  $s_i$  (满足  $\ell(vs_i) = \ell(v) + 1$ ) 直至代码成为分拆而得到的唯一主导排列;
- **划分**  $\lambda(v)$ :  $\mu_v$  代码的共轭分拆。

当  $u$  和  $v$  满足 *separated descents* 条件时, 乘积系数  $c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$  与 path 图权重  $d_{u, \lambda(v)}^{wv^{-1}\mu_v}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$  相等 (见下节)。

定理 2.1 (Theorem 3.1: 乘积公式 (Product Formula) [31, Theorem 3.1]). 设  $u, v \in S_\infty$  满足 *separated descents* 条件, 则

$$(39) \quad \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_{w \in S_\infty} c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

其中系数  $c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$  是关于  $\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j$  的非负整数系数多项式。

**关于系数记号的说明:** 在一般情况下, 乘积  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{z})$  的展开系数记为  $c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$ 。当  $u$  和  $v$  满足 *separated descents* 条件时, Samuel 证明了这些系数可以通过 path 图的权重显式计算。设  $\mu_v$  是  $v$  的**主导逼近** (dominant approximation),  $\lambda(v)$  是对应的分拆, 则

$$(40) \quad c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = d_{u, \lambda(v)}^{wv^{-1}\mu_v}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

其中  $d_{u, \lambda}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$  是下节定义的 path 图权重之和。

**这为什么重要?** 当  $\mathbf{y} = \mathbf{z}$  时, (39) 简化为

$$(41) \quad \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \sum_w c_{uv}^w(\mathbf{y}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

此时系数  $c_{uv}^w(\mathbf{y})$  恰好是 Graham positivity 研究的对象。换言之, 定理 eq. (39) 是 Graham positivity 的源头——它告诉我们**为什么**展开系数会是正多项式。<sup>4</sup>

注 2.1. 当  $u$  和  $v$  不满足 *separated descents* 条件时, 公式 (39) 不再直接适用——系数  $c_{uv}^w$  可能不再是正多项式。此时需要更一般的处理。

<sup>3</sup>Lemma 2.5 的详细证明和几何解释见附录 section 16。

<sup>4</sup>乘积公式的完整推导见附录 section 12。

**3.2. 与第一章 Graham Positivity 的联系.** 在第一章中, 我们陈述了 Graham positivity 定理: 三重 Schubert 多项式的系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是关于  $t_i - y_j$  的非负多项式。

乘积公式 (39) 提供了理解这一现象的代数框架。当  $u$  和  $v$  的下降点分离时, 乘积展开的系数恰好记录了某种“路径”的计数——而路径计数天然是非负的。

推论 2.1 (推论: Graham positivity 的路径解释). 当  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件时, 系数  $c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$  等于  $d_{u, \lambda(v)}^{wv^{-1}\mu_v}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$ ——即从  $u$  到  $wv^{-1}\mu_v$  的 *path* 图权重之和。特别地, 当  $\mathbf{y} = \mathbf{z}$  时, 这些权重都是非负的。

## 4. 证明思路: Path 图 (Path Diagram) 方法

**4.1. 为什么需要 Path 图?** 乘积公式的证明依赖于一种组合模型——**path 图** (path diagram)。这个模型的美妙之处在于: 它将抽象的代数运算转化为直观的路径计数。

**核心定义** (对应源文献的 Definition 3.1): 对排列  $u, w$  和分拆  $\lambda$ , 定义

$$(42) \quad d_{u, \lambda}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = \sum_{P \in \text{Path}_\lambda(u, w)} \text{wt}_{P, \lambda}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

其中  $\text{Path}_\lambda(u, w)$  是满足特定条件的路径集合,  $\text{wt}$  是路径权重。

在 *separated descents* 情形下, 系数  $c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$  通过 (40) 与  $d_{u, \lambda(v)}^w$  关联。

权重的计算涉及  $\mathbf{y}$  和  $\mathbf{z}$  变量的巧妙分配——每一个“拐角” (corner) 处都可能贡献一个因子  $(\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$ 。

**核心洞察:** path 图模型揭示了多重 Schubert 多项式的乘法与旗流形中的相交理论之间存在一一对应。几何相交  $\Leftrightarrow$  路径计数。<sup>5</sup>

引理 2.4 (Lemma 3.2 [31, Lemma 3.2]). 设  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件。则对任意  $w$ , 如果  $c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \neq 0$ , 则  $w$  可以通过一系列特定的 *path* 图操作从  $u$  和  $v$  构造出来。

引理 2.5 (Lemma 3.3 [31, Lemma 3.3]). 对任意满足条件的  $u, v, w$ , 系数  $c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$  等于  $d_{u, \lambda(v)}^{wv^{-1}\mu_v}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$ , 即从  $u$  到  $wv^{-1}\mu_v$  的所有合法 *path* 图的权重之和 (参见源文献 Definition 3.1)。

**4.2. Path 图的几何直观.** 在旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  中, Schubert 胞腔  $X_w$  可以用 Bruhat 胞腔分解来描述。每个胞腔有一个“起始方向” (由 descent set 决定) 和一个“结束方向”。

当两个胞腔  $X_u$  和  $X_v$  的 descent set 分离时, 它们的相交可以用以下方式描述:

- (1) 找到一个“分界”  $p$  将空间分为两部分
- (2)  $X_u$  位于分界线的一侧,  $X_v$  位于另一侧
- (3) 它们的交集集中的每条曲线都可以用从  $u$  到某个中间态再到  $v$  的路径来描述

Path 图就是这种路径的组合模型化。

## 5. The Proof of the Main Formula: 主要公式的证明

本节给出定理 eq. (39) 的完整证明。证明分为几个关键步骤。

<sup>5</sup>Path 图的详细定义与权重公式见附录 section 13。

**5.1. Step 1: 归纳基础 (Induction Basis).** 我们首先考虑最基本的情形。设  $p$  是满足 separated descents 条件的整数。

当  $u = \text{id}$  (单位排列, identity permutation) 且  $v = \text{id}$  时,

$$(43) \quad \mathfrak{S}_{\text{id}}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_{\text{id}}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = 1 = \mathfrak{S}_{\text{id}}(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

故  $e_{\text{id}, \text{id}}^{\text{id}} = 1$ , 其他系数为零。

**几何意义:** 单位元对应的 Schubert 胞腔是旗流形本身, 两个旗流形的交集仍是旗流形——交点数为 1。

### 5.2. Step 2: 提升引理 (Lifting Lemma).

引理 2.6 (Lemma 4.3 [31, Lemma 4.3]). 若  $\ell(ws_i) < \ell(w)$  且  $\ell(us_i) > \ell(u), \ell(vs_i) > \ell(v)$ , 则  $c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = 0$ 。

**意义:** 这个引理告诉我们, 如果  $w$  在位置  $i$  ”下降”, 但  $u$  和  $v$  在同一位置都不下降, 那么乘积中不会出现  $w$ ——因为几何上不存在这样的相交。

引理 2.7 (Lemma 4.4: 提升引理 (Lifting Lemma) [31, Lemma 4.4]). 若  $\ell(ws_i) > \ell(w)$ , 则  $c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = c_{u, vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$ 。

这两个引理告诉我们: 在 separated descents 条件下, 系数  $c_{uv}^w$  的结构受到 Bruhat 序 (Bruhat order) 的强烈约束——不满足特定下降条件的情形系数必为零。

**几何解释:** 提升引理反映了 Schubert 胞腔在旗流形中的包含关系。当我们”提升”  $v$  到  $vs_i$  时, 胞腔变大, 相应的相交结构也发生变化。

### 5.3. Step 3: 递归结构 (Recursive Structure).

引理 2.8 (Lemma 4.5 [31, Lemma 4.5]). 设  $(u, v)$  满足 separated descents 条件, 并设  $p$  是相关整数。则对任意  $i \leq p$  和  $j > p$ , 有

$$(44) \quad c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = \sum_k c_{us_i, v}^{u_k}(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \cdot c_{u_k, vs_j}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

其中求和遍历所有中间排列  $u_k$ 。

引理 2.9 (Lemma 4.6 [31, Lemma 4.6]). *Path* 图的权重满足类似的递归关系: 每个”拐角”处的权重因子  $(\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$  被分配到相应项中。

**直观理解:** 递归公式将乘积分解为两个因子的卷积——这正是 path 图的结构: 每条路径可以分成两段, 每段贡献一个因子。

**5.4. Step 4: 归纳完成 (Induction Completion).** 现在假设对所有长度小于  $\ell(u) + \ell(v)$  的情形, 定理已成立。对任意  $w$ , 考虑两种情形:

**情形 1:**  $\ell(w) < \ell(u) + \ell(v)$ 。此时由引理 2.6, 如果  $w$  不满足特定条件, 则系数为零。否则, 我们可以应用 Lemma 引理 2.7 将问题转化为较短的排列。

**情形 2:**  $\ell(w) = \ell(u) + \ell(v)$ 。此时应用递归公式 Lemma 引理 2.8, 将乘积分解为两个较短的乘积, 然后利用归纳假设。

通过这两种情形的分析, 我们完成了定理的归纳证明。<sup>6</sup>

<sup>6</sup>详细推导见附录 section 12。

### 6. Pieri 公式 (Theorem 7.1)

当公式中取  $v = c_{p,k}$  (即特定循环排列) 时, 我们得到一个重要的特殊情形:

定理 2.2 (Theorem 7.1: Pieri 公式 (Pieri Formula) [31, Theorem 7.1]). 当  $v = c_{p,k} = s_{k-p+1}s_{k-p+2}\cdots s_k$  (循环排列, *cycloidal permutation*) 时, 乘积公式简化为

$$(45) \quad \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_{c_{p,k}}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_{\substack{w \\ \ell(w)=\ell(u)+k}} e_{u, c_{p,k}}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

Pieri 公式在 Schubert calculus 中有着悠久的历史——它对应于旗流形 (flag manifold) 中 Grassmannian 子流形的相交性质。<sup>7</sup>

**几何意义:** 循环排列  $c_{p,k}$  对应 Grassmannian  $Gr(k, p+k)$  中的特定 Schubert 类。Pieri 公式描述了这些类与一般 Schubert 类的相交规则。

### 7. Dominant Approximation: 主导逼近

本文的另一个关键贡献是 **dominant approximation** (主导逼近) 概念。

对于每个排列  $v$ , 存在一个唯一的“最简单”的排列  $\mu_v$ , 使得

$$(46) \quad \mathfrak{S}_{\mu_v}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \prod_{i=1}^{\infty} E_{\lambda_i(v)}(\mathbf{x}; \mathbf{z}_i)$$

其中  $E_{\lambda}(\mathbf{x}; \mathbf{z})$  是所谓的主导 (dominant) Schubert 多项式 (dominant Schubert polynomial), 具有特别简洁的形式。

这一结果的深刻之处在于: 它告诉我们**每个 Schubert 多项式都可以“近似”为一个主导多项式**, 而这种近似的误差项具有某种可控的结构。<sup>8</sup>

**为什么叫“主导”?** 在代数几何中, “dominant” 通常意味着某类对象中的最简单或最特殊的代表。在 Schubert 多项式的语境下, 主导多项式是那些对应 Grassmannian 情形的多项式——它们的结构最为简单和清晰。

### 8. 关键引理一览

本文证明过程中使用的关键引理汇总如下:

引理 2.10 (Lemma 4.1 [31, Lemma 4.1]). (消减条件的另一种表述) 设  $w$  满足  $\ell(ws_i) < \ell(w)$ , 则

$$(47) \quad c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = c_{us_i, v}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

引理 2.11 (Lemma 4.2 [31, Lemma 4.2]). (提升引理的另一种表述) 设  $w$  满足  $\ell(ws_i) > \ell(w)$ , 则

$$(48) \quad c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = c_{us_i, v}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z}) + c_{u, vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

引理 2.12 (Lemma 4.8 [31, Lemma 4.8]). (系数非负性, *nonnegative coefficients*) 对所有  $u, v, w$ , 系数  $c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$  是关于变量  $(\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$  的非负整数系数 (*nonnegative integer coefficients*) 多项式。

<sup>7</sup>Pieri 公式的几何背景和详细例子见附录 section 15。

<sup>8</sup>Dominant approximation 的完整证明见附录 section 14。

## 9. 示例

为了更具体地理解乘积公式的应用，本节给出几个例子。

例 2.3 (例 8.1: 基本情形). 设  $u = s_1$  (换位, *transposition*),  $v = s_2$  (另一个换位)。此时  $\text{Des}(u) = \{1\}$ ,  $\text{Des}(v) = \{2\}$ , 故  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件 (取  $p = 2$ )。

直接计算可得

$$(49) \quad \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_{s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{s_1 s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) + (y_1 - z_2) \mathfrak{S}_{s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

其中  $s_1 s_2$  是长度为 2 的排列。

例 2.4 (例 8.2: Pieri 特殊情形). 取  $u = s_1$ ,  $v = c_{2,1} = s_1$ 。则由 *Pieri* 公式,

$$(50) \quad \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{s_1 s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) + (y_1 - z_1) \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

注意到  $s_1 s_1 = s_1$  (因为  $s_1^2 = 1$ ), 但这里指的是不同的路径图配置。

例 2.5 (例 8.3: 非 *separated descents* 情形). 取  $u = s_1$ ,  $v = s_1$ 。此时  $\text{Des}(u) = \text{Des}(v) = \{1\}$ , 不满足 *separated descents* 条件。

直接展开可得

$$(51) \quad \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot (\mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) + (\mathbf{y}_1 - \mathbf{z}_1))$$

这个展开包含常数项, 不符合一般乘积公式的形式。

例 2.6 (例 8.4: 路径图解释). 考虑例 8.1 中的情形  $u = s_1$ ,  $v = s_2$ 。

此时 *separated descent set* 为  $\text{SD}(s_1, s_2) = \{1\}$  (因为  $p = 2$ )。

从  $(s_1, s_2)$  出发, 到  $\mathfrak{S}_{s_1 s_2}$  有两条路径:

(1) 直接相乘: 贡献  $\mathfrak{S}_{s_1 s_2}$

(2) 经过拐角  $(s_1 s_2, s_2)$ : 在拐角处取权重  $(y_1 - z_2)$ , 贡献  $(y_1 - z_2) \mathfrak{S}_{s_2}$

路径图的权重之和恰好给出 (49) 的展开。

例 2.7 (例 8.5: 更复杂的  $S_4$  情形). 考虑  $u = s_1 s_2$  和  $v = s_3$ , 这是我们在 *separated descents* 定义中用过的例子。

计算下降点:

- $u = s_1 s_2$  对应排列  $(1, 3, 2, 4)$ , 下降点  $\text{Des}(u) = \{2\}$
- $v = s_3$  对应排列  $(1, 2, 4, 3)$ , 下降点  $\text{Des}(v) = \{3\}$

取  $p = 3$ , 满足 *separated descents* 条件。

此时乘积为

$$\mathfrak{S}_{s_1 s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{s_3}(\mathbf{x}; \mathbf{z}).$$

直接计算 (利用除差算子的性质) 可得:

$$\mathfrak{S}_{s_1 s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{s_3}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{s_1 s_2 s_3}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) + (y_1 - z_2) \mathfrak{S}_{s_2 s_3}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) + (y_1 - z_3) \mathfrak{S}_{s_1 s_3}(\mathbf{x}; \mathbf{y}).$$

**Path 图解释:** 这个展开对应三条路径, 每条路径的权重因子分别为  $(y_1 - z_3)$ 、 $(y_1 - z_2)$  等。

例 2.8 (例 8.6: Grassmannian 排列情形). 当  $u$  和  $v$  都是 *Grassmannian* 排列时, 乘积公式有特别简洁的形式。

取  $u = s_1 s_2$  (对应 2-*Grassmannian* 排列, 形状为  $(2, 1, 0, \dots)$ ) 和  $v = s_3$  (对应 1-*Grassmannian* 排列, 形状为  $(1, 1, 1, \dots)$ )。

利用 *Pieri* 公式 (定理 7.1), 我们有

$$\mathfrak{S}_{s_1 s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{s_3}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_{\substack{w \\ \ell(w)=\ell(u)+1}} e_{u, s_3}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}).$$

在这个特殊情形下, 所有系数  $e_{u, s_3}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$  都是单项式 (而非多项式), 这反映了 *Grassmannian* 情形的组合特殊性。

例 2.9 (例 8.7: 验证非负性). 考虑例 8.1 中的展开:

$$\mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_{s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{s_1 s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) + (y_1 - z_2) \mathfrak{S}_{s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{y}).$$

**验证正性:**

- $\mathfrak{S}_{s_1 s_2}$  的系数是 1 (非负)
- $(y_1 - z_2)$  系数是 1 (非负)

当我们取  $\mathbf{y} = \mathbf{z}$  时,  $y_1 - z_2 = 0$ , 展开简化为

$$\mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}) \mathfrak{S}_{s_2}(\mathbf{x}) = \mathfrak{S}_{s_1 s_2}(\mathbf{x}),$$

这正是经典情形下  $s_1 s_2$  的升序性质。

## 10. 与其他章节的联系

本章建立的乘积公式与前后章节有深刻的联系。

**10.1. 与第一章 (Graham Positivity) 的联系.** 当  $\mathbf{y} = \mathbf{z}$  时, 乘积公式简化为 Graham positivity 的核心——展开系数是关于  $y_i - y_j$  的非负多项式。

Path 图模型为这一正性提供了组合解释: 每条路径对应一个非负的“贡献”, 系数是这些贡献的和——因此必然是非负的。

**10.2. 与第三章 (量子双重 Schubert) 的联系.** 在量子双重 Schubert 多项式的语境下, 乘积公式有更丰富的结构。Kirillov-Maeno 的量子乘法涉及形式变量  $q$ :

$$\tilde{\mathfrak{S}}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \star \tilde{\mathfrak{S}}_v(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_{w, d} q^d c_{uv}^{w, d} \tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}; \mathbf{z})$$

当  $q = 0$  时, 这退化为本章的乘积公式。

## 11. 本章小结

本章介绍了 Samuel 的 Molev-Sagan 类型公式的核心内容。关键点如下:

- (1) **Separated descents 条件** (separated descents condition) 是公式成立的本质条件——它反映了旗流形 (flag manifold) 中 Schubert 胞腔 (Schubert cells) 相交的正则性;
- (2) **乘积公式** (product formula) (eq. (39)) 将双重 Schubert 多项式的乘积展开为系数非负的 Schubert 多项式线性组合;
- (3) **Path 图模型** (path diagram model) 提供了系数几何含义的组合解释——路径计数;
- (4) **Dominant approximation** (主导逼近) 提供了将一般排列“化简”为主导排列的系统方法;
- (5) **提升引理** (lifting lemma) 和 **消减引理** (reduction lemma) 是证明的结构性工具。

作为推论, 当  $y = z$  时, 本章的公式直接给出 Graham positivity 猜想的证明——这将是下一章的主题。

## 12. 附录：主要公式的详细证明

**12.1. 背景 (Background).** 本节给出定理 eq. (39) 的完整证明细节。证明采用对  $\ell(u) + \ell(v)$  的归纳法。

### 12.2. 参数定义 (Parameter Definitions).

- $u, v \in S_\infty$ : 两个无穷排列 (有限排列的并)
- $\ell(w)$ : 排列  $w$  的长度 (inversion 个数)
- $\text{Des}(w) = \{i : \ell(ws_i) < \ell(w)\}$ : 下降点集合
- $p$ : separated descents 条件中的分界整数

### 12.3. 已知条件 (Given).

- $(u, v)$  满足 separated descents 条件
- 归纳假设: 对所有  $\ell(u') + \ell(v') < \ell(u) + \ell(v)$  的情形, 公式成立

### 12.4. 目标 (Goal). 证明

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_w c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

**12.5. 详细推导步骤 (Derivation Steps).** **步骤 1:** 考虑  $w$  满足  $\ell(ws_i) < \ell(w)$  的情形。

由 Schubert 多项式的基本性质 (见第一章), 有

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \frac{\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) - \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})}{x_i - y_j}$$

其中  $j$  是某个特定指标。

**步骤 2:** 应用引理 引理 2.10 和引理 引理 2.11 进行递归。

当  $\ell(ws_i) < \ell(w)$  时,

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = c_{us_i, vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

当  $\ell(ws_i) > \ell(w)$  时,

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = c_{us_i, v}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z}) + c_{u, vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

**步骤 3:** 利用 separated descents 条件控制下降点位置。

由定义, 存在  $p$  使得:

- 对  $i < p$ :  $i \in \text{SD}(u, v)$
- 对  $i > p$ :  $i \notin \text{SD}(u, v)$

**步骤 4:** 构造递归公式。

对任意  $i \leq p$  和  $j > p$ , 定义

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = \sum_k c_{us_i, v}^{u_k}(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \cdot c_{u_k, vs_j}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

**步骤 5:** 完成归纳。

通过步骤 1-4 的递归结构, 可以验证展开系数恰好由 path 图的权重给出。详细证明见论文 [31, Section 5]。

### 13. 附录：Path 图的详细定义

#### Path 图的定义 (Definition 4.1).

定义 2.3 (Path Diagram [31, Definition 4.1]). 设  $u, v$  满足 *separated descents* 条件。一个从  $(u, v)$  到  $w$  的 *path* 图是一个满足以下条件的有限有向图：

- (1) 顶点集为  $S_\infty$  的一个有限子集；
- (2) 边由  $(u', v') \rightarrow (u's_i, v')$  或  $(u', v's_i)$  给出；
- (3) 起点为  $(u, v)$ ，终点为  $(w, w)$  或类似终态；
- (4) 路径上的“拐角” (*corner*) 处标记权重因子。

#### 权重函数 (Definition 4.4).

定义 2.4 (Weight Function [31, Definition 4.4]). 设  $P$  为一个 *path* 图。定义其 **权重** 为

$$(52) \quad \text{wt}(P) = \prod_{(\text{拐角} \rightarrow i, j)} (\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$$

其中乘积遍历路径上所有拐角， $i$  和  $j$  是与该拐角相关的指标。

#### 非零区域 (Definition 4.7).

定义 2.5 (Non-zero Region [31, Definition 4.7]). 设  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件。定义

$$(53) \quad \mathcal{R}(u, v) = \{w \in S_\infty : c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \neq 0\}$$

即所有展开系数非零的  $w$  构成的集合。

### 14. 附录：Dominant Approximation 的详细证明

**背景.** Dominant approximation 告诉我们，每个排列  $v$  都可以通过某种“最简单”的代表  $\mu_v$  来近似，其中  $\mu_v$  是唯一的 Grassmannian 排列。

**主要结论.** 对每个  $v$ ，存在唯一的  $\mu_v$  和非负整数  $a_i$  (仅有限多个非零)，使得

$$(54) \quad \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{\mu_v}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) + \sum_i (\mathbf{z}_i - \mathbf{z}_{i+1}) \cdot \mathfrak{S}_{v_i}(\mathbf{x}; \mathbf{z})$$

其中  $v_i$  是某些中间排列。

**证明思路.** 证明基于对排列长度的归纳。关键观察是：每个非-dominant 排列都可以通过一系列“局部变换”化简为 dominant 排列，而这些变换恰好由引理 2.10 和引理 2.11 控制。

详细证明见论文 [31, Section 6]。

### 15. 附录：Pieri 公式的几何背景

**历史背景.** Pieri 公式起源于 19 世纪末意大利几何学家 Pieri 的工作。他证明了射影空间中超平面相交的基本规则。

在 Schubert 演算中，Pieri 公式描述了特定 Schubert 类的乘法规则。

**循环排列  $c_{p,k}$  的含义.** 循环排列  $c_{p,k} = s_{k-p+1}s_{k-p+2} \cdots s_k$  对应 Grassmannian  $Gr(k, p+k)$  中的最大维 Schubert 胞腔。

当旗流形  $Fl_n$  限制到  $Gr(k, n)$  时，乘法规则大大简化——这正是 Pieri 公式成立的原因。



**例子：Gr(2, 4) 的 Pieri 规则.** 设  $X = \text{Gr}(2, 4)$ ，考虑乘法

$$\sigma_{(2,1)} \star \sigma_{(1)} = \sigma_{(2,2)} + \sigma_{(3,1)}$$

对应的 path 图模型解释了为什么第二项的系数为 1——只有一条路径贡献。

### 16. 附录：Lemma 2.5 的详细证明

**Lemma 2.5 的重新陈述：** 设  $(u, v)$  满足 separated descents 条件，并设  $p$  是相关的整数。则对任意  $i \leq p$  和任意  $j > p$ ，有

$$\text{SD}(us_i, vs_j) = \text{SD}(u, v) \setminus \{i\}$$

**证明：**

步骤 1：理解  $\text{SD}(us_i, vs_j)$  的定义。

由定义， $\text{SD}(us_i, vs_j)$  包含满足以下条件的  $k$ ：

$$\ell(us_i s_k) > \ell(us_i) \text{ 且 } \ell(vs_j s_k) > \ell(vs_j)$$

步骤 2：分析  $k$  的可能取值。

情况 A： $k \neq i$ 。此时  $us_i s_k = us_k s_i$ （因为  $s_i^2 = 1$  且  $s_i$  与  $s_k$  可交换当  $k \neq i$ ）。因此  $\ell(us_i s_k) = \ell(us_k s_i)$ 。

由于  $i \leq p$ ，根据 separated descents 条件， $i \in \text{SD}(u, v)$ ，即  $\ell(us_i) > \ell(u)$ 。这意味着  $s_i$  在 Bruhat 序下是  $u$  的一个“提升”。

通过详细的 Bruhat 序分析，可以证明：当  $k \neq i$  时，条件  $\ell(us_i s_k) > \ell(us_i)$  等价于  $k \in \text{SD}(u, v)$ 。

情况 B： $k = i$ 。此时  $\ell(us_i s_i) = \ell(u) < \ell(us_i)$ ，所以  $k = i$  不在  $\text{SD}(us_i, vs_j)$  中。

综合两种情况， $\text{SD}(us_i, vs_j) = \text{SD}(u, v) \setminus \{i\}$ 。

(详细证明见论文 [31, Lemma 2.5])。

### 17. 附录：Molev-Sagan 公式的原始版本

**Molev-Sagan 1999 年的原始结果.** Molev 和 Sagan 在 1999 年的工作中首次给出了 Grassmannian 情形（即  $u, v$  都是 Grassmannian 排列）的组合公式。

**原始公式：** 对于 Grassmannian 排列  $u, v$ ，乘积  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})\mathfrak{S}_v(\mathbf{x})$  的展开系数由以下路径规则给出：

设  $\lambda = \text{shape}(u)$ ， $\mu = \text{shape}(v)$  是对应的分拆。则

$$c_{\lambda, \mu}^\nu = \sum_T \text{wt}(T)$$

其中求和遍历所有满足 certain lattice conditions 的半标准 Young 表 (semi-standard Young tableaux)， $\text{wt}(T)$  是对应的权重。

**与 Samuel 2024 年推广的关系：**

Samuel 的贡献在于将这个公式推广到了非 Grassmannian 情形，条件是两个排列满足 separated descents。他的 path 图方法统一了对两类情形的处理。

### 18. 附录：Separated Descents 的几何解释

**旗流形中的几何.** 在旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  中，每个排列  $w \in S_n$  对应一个 Schubert 胞腔  $X_w^\circ$ （维数为  $\ell(w)$ ）及其闭包  $\overline{X_w}$ 。

Schubert 胞腔的“方向”由其下降点集合  $\text{Des}(w)$  决定。

**几何直觉：**

- $i \in \text{Des}(w)$  意味着在旗流形的第  $i$  个标志 (flag) 处，胞腔有“转折”

- 当两个胞腔的下降点分离时，它们在旗流形中的相对位置变得规则

**分离条件的几何含义：**

设  $(u, v)$  满足 separated descents 条件，存在  $p$  使得：

- $u$  的所有下降点在  $p$  左侧
- $v$  的所有下降点在  $p$  右侧

这意味着存在一个“分界”旗 (flag)  $F_p$ ，使得  $X_u$  位于  $F_p$  的一侧， $X_v$  位于  $F_p$  的另一侧。

当两个胞腔相交时，交集集中的每条曲线都必须“穿过” $F_p$ ，但穿过的位置由路径唯一确定——这正是 path 图模型的几何起源。

## 19. 附录：Path 图的分类

**Path 图的类型.** 根据起点和终点的不同，path 图可以分为以下几类：

**类型 A:**  $u$  路径 (从  $u$  到  $w_0$ )

这类 path 图的顶点是  $u$  的各种“提升”。

**类型 B:**  $v$  路径 (从  $v$  到  $w_0$ )

类似地，顶点是  $v$  的各种提升。

**类型 C:** 混合路径 (从  $(u, v)$  到  $(w, w)$ )

这类 path 图同时涉及  $u$  和  $v$  的变化，对应乘积  $c_{uv}^w$ 。

**路径的权重计算.** 对于混合路径，权重计算规则如下：

每个“拐角”（即路径改变方向的顶点）贡献一个因子  $(\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$ ，其中  $i$  和  $j$  由拐角的类型决定。

具体而言：

- 如果拐角来自  $u$  的变化 ( $u \rightarrow us_i$ )，贡献因子  $\mathbf{y}_i$
- 如果拐角来自  $v$  的变化 ( $v \rightarrow vs_j$ )，贡献因子  $-\mathbf{z}_j$
- 总权重是所有拐角因子的乘积

## 20. 附录：乘积公式与 Schubert 上同调的关系

**经典 Schubert 上同调.** 在普通上同调  $H^*(Fl_n)$  中，Schubert 类  $\{\sigma_w\}$  满足乘法

$$\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w$$

其中  $c_{u,v}^w$  是非负整数 (Schubert 结构常数)。

**几何意义:**  $c_{u,v}^w$  计数的是 Schubert 簇  $X_u, X_v, X_{w_0w}$  的相交点数。

**等变上同调中的推广.** 在等变上同调  $H_T^*(Fl_n)$  中，类似的乘法给出系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{x})$ ——这些是关于 torus 权  $x_i$  的多项式。

Graham positivity 定理 (第一章) 证明了这些多项式的系数总是非负的。

**双重情形.** 在双重 Schubert 多项式的情形，乘法

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_w c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

给出了一族新的系数  $c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$ 。

当  $\mathbf{y} = \mathbf{z}$  时， $c_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{y})$  即为 Graham 系数 (此时等于 path 图权重之和)。

当进一步取  $\mathbf{y} = \mathbf{z} = 0$  时， $c_{uv}^w(0; 0)$  回到经典 Schubert 结构常数。

## 21. 附录：Dominant Approximation 的几何意义

**主导排列.** 在 Schubert 演算中, Grassmannian 排列 (对应  $Gr(k, n)$  的 Schubert 胞腔) 扮演着特殊角色——它们的胞腔结构最为简单。

**主导排列的定义:**

排列  $w$  被称为**主导的** (dominant), 如果其 Lehmer 码  $c(w) = (c_1, \dots, c_n)$  满足单调递减性:

$$c_1 \geq c_2 \geq \dots \geq c_n$$

**几何含义:**

主导排列  $w$  对应的 Schubert 胞腔  $X_w$  具有最简单的边界结构——它只包含在”标准”方向上的胞腔。

这使得主导 Schubert 多项式具有特别简洁的形式:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n x_i^{c_i} \quad (\text{当 } w \text{ 是主导的})$$

**为什么叫”主导”?** 在代数几何中, ”dominant” 通常意味着某类对象中的最一般或最特殊的代表。在 Schubert 胞腔的语境下, 主导排列对应的胞腔在某种偏序下是”最大的”——它吸收了所有可能的边界。

Dominant approximation 的意义在于: 每个排列都可以”近似”为一个主导排列, 而误差项具有可控的结构。

## 22. 附录：Samuel 2024 年工作的创新点

**主要创新.** Samuel 2024 年的工作 (arXiv: 2401.11061) 在以下方面做出了创新:

### 1. 统一的框架:

Molev-Sagan 原公式只适用于 Grassmannian 情形。Samuel 将其推广到了所有满足 separated descents 条件的排列, 建立了一个统一的框架。

### 2. Path 图的显式构造:

Samuel 引入了 path 图的显式构造方法, 使得系数的计算变得更加系统和直观。

### 3. 提升引理的精致版本:

Samuel 给出了提升引理的精致版本, 使得递归证明更加简洁。

### 4. Dominant approximation:

Samuel 的 dominant approximation 方法为理解任意排列的 Schubert 多项式提供了新视角。

**与先前工作的比较.**

| 方面   | Molev-Sagan (1999) | Samuel (2024) |
|------|--------------------|---------------|
| 适用范围 | Grassmannian 排列    | 满足 SD 条件的任意排列 |
| 主要工具 | 路径计数               | Path 图        |
| 证明方法 | 归纳                 | 递归 + Path 图   |
| 主导逼近 | 无                  | 有             |

## 23. 附录：计算示例—— $S_4$ 中的完整计算

**Setup.** 在  $S_4$  中考虑 separated descents 情形。

取  $u = s_1 s_2$  (对应排列  $(1, 3, 2, 4)$ ),  $v = s_3$  (对应排列  $(1, 2, 4, 3)$ )。

计算:

- $\text{Des}(u) = \{2\}$

- $\text{Des}(v) = \{3\}$
- $p = 3$  满足 separated descents 条件

**Path 图构造.** 从  $(u, v) = ((1, 3, 2, 4), (1, 2, 4, 3))$  出发, 我们可以构造以下 path 图:

**路径 1:** 直接到  $w = uv = s_1 s_2 s_3$  (对应排列  $(1, 3, 4, 2)$ )

这条路径贡献  $\mathfrak{S}_{s_1 s_2 s_3}$ 。

**路径 2:** 经过拐角  $(s_1 s_2 s_3, s_3)$  到  $w = s_3$

在拐角处, 由于  $i = 2 \leq p$  且  $j = 3 > p$ , 权重为  $(\mathbf{y}_2 - \mathbf{z}_3)$ 。

这条路径贡献  $(\mathbf{y}_2 - \mathbf{z}_3)\mathfrak{S}_{s_3}$ 。

**完整展开.** 因此,

$$\mathfrak{S}_{s_1 s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{y})\mathfrak{S}_{s_3}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{s_1 s_2 s_3}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) + (\mathbf{y}_2 - \mathbf{z}_3)\mathfrak{S}_{s_3}(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

这验证了乘积公式在具体情形下的正确性。

## Quantum Double Schubert Polynomials

### 1. 引言：从经典几何到曲线计数——为什么要引入量子版本？

**1.1. 经典相交理论的局限.** 在前两章中, 我们研究了经典双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  的性质, 以及三重变量集情形下的 Graham positivity。

但当我们研究旗流形 (flag manifold) 上曲线的个数时, 普通的相交理论遇到了根本性的困难。

设想我们想要计数  $\mathbb{P}^1$  到旗流形的稳定映射个数。在经典相交理论中, 我们只能计数点与点的交集——这是一种静态的计数。但带参数的曲线涉及额外的自由度: 每条曲线有自己的“度数” (degree), 这对应于同调类  $\beta \in H_2(Fl_n, \mathbb{Z})$ 。

这引导我们进入量子上同调 (quantum cohomology) 的世界——一个源于物理中拓扑场论 (topological field theory) 的思想, 由 Kontsevich 和 Manin 系统化。<sup>1</sup>

**1.2. 量子上同调的核心思想.** 在量子上同调 (quantum cohomology) 中, Schubert 类的乘法不再是普通的乘积, 而是一种带有形式变量  $q^\beta$  的新运算

$$[\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w, \beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) [\sigma_w].$$

其中  $\beta$  记录了连接子簇的曲线类 (curve class),  $q^\beta$  是形式变量。这一公式最初来自物理中的 **A-twisted topological field theory**, 它揭示了曲线计数与多项式结构常数之间的深层联系。<sup>2</sup>

**关键洞察:** 量子上同调中的乘法  $q^\beta$  因子编码了曲线计数的额外信息——这正是经典情形所缺失的。

Kirillov 和 Maeno 在 1996 年的工作中引入了量子双重 Schubert 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{q})$ , 这是旗流形等变量量子上同调类的 Lascoux-Schützenberger 型代表元。本文介绍这一工作的核心内容。<sup>3</sup>

### 2. 经典回顾：除差算子与 Schubert 多项式

在引入量子版本之前, 我们先简要回顾经典理论的核心定义——这些内容在 Chapter 1 中已有详细讨论, 这里做快速梳理以保持连贯性。

**2.1. 除差算子.** 除差算子 (divided difference operator) 是 Schubert 演算的核心工具。我们在 Chapter 1 中已经看到,  $\partial_i$  测量了多项式在交换两个变量时的变化率:

定义 3.1 (除差算子). 对于  $i = 1, \dots, n-1$ , 除差算子  $\partial_i$  定义为:

$$(55) \quad \partial_i f = \frac{f(x_1, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots) - f(x_1, \dots, x_{i+1}, x_i, \dots)}{x_i - x_{i+1}}.$$

<sup>1</sup>问: 什么是量子上同调? 它与经典上同调的本质区别是什么? 为什么量子版本来自物理学? 见附录 section 21。

<sup>2</sup>公式 (1.2) 的详细解释和几何意义见附录 section 22。

<sup>3</sup>Kirillov-Maeno 1996 年的工作背景及其与先前工作的关系见附录 section 82。

**关键性质：** $\partial_i$  满足 Leibniz 法则

$$(56) \quad \partial_i(fg) = (\partial_i f)g + (s_i f)(\partial_i g),$$

其中  $s_i f = f(x_1, \dots, x_{i+1}, x_i, \dots)$  表示交换  $x_i$  和  $x_{i+1}$ 。

**2.2. 经典 Schubert 多项式.** 正如 Chapter 1 中所定义, Schubert 多项式通过除差算子作用在特殊多项式  $x^\delta$  上得到:

定义 3.2 (Schubert 多项式). 设  $\delta = (n-1, n-2, \dots, 1, 0)$ ,  $w_0$  为  $S_n$  的最长置换。**Schubert 多项式** 定义为:

$$(57) \quad \mathfrak{S}_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0}(x^\delta),$$

其中  $x^\delta = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \dots x_n^0$ 。

当引入  $y$  变量后, 我们得到双重版本——这正是 Chapter 2 研究乘积公式时使用的工具:

定义 3.3 (双重 Schubert 多项式). **双重 Schubert 多项式** 定义为:

$$(58) \quad \mathfrak{S}_w(x, y) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j).$$

### 3. 量子上同调的基本框架

为什么量子上同调是自然的? 这需从几何学中寻求解释。

在经典相交理论中, 我们计算子流形  $X, Y \subset V$  的交集  $X \cap Y$  的点数。但在旗流形的情形, 当我们要计数**连接两点的曲线**时, 普通的相交理论失效了——因为这不是点与点的交集, 而是曲线与曲线的交汇。

Kontsevich 和 Manin 的伟大贡献在于, 他们意识到这种计数可以系统化——通过引入 Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant)。<sup>4</sup>

**3.1. Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant).** 设  $V$  是光滑复流形,  $\beta \in H_2(V, \mathbb{Z})$  是曲线类 (curve class)。**Gromov-Witten 不变量**

$$\langle I_{0,m,\beta}^V \rangle : H^*(V, \mathbb{Q})^{\otimes m} \longrightarrow \mathbb{Q}.$$

计数满足特定条件的参数化曲线个数。

**直观理解:**  $\langle I_{0,m,\beta}^V \rangle (X_1^* \otimes \dots \otimes X_m^*)$  是满足以下条件的稳定映射 (stable map)  $f : \mathbb{P}^1 \rightarrow V$  的“虚拟个数”:

- $f$  的像代表同调类  $\beta$ ;
- $f(p_i) \in X_i$  (其中  $p_1, \dots, p_m \in \mathbb{P}^1$  是标记点)。

这些不变量最初来自物理中的拓扑场论, 后来被严格化——这又是数学从物理学汲取营养的又一经典案例。<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Gromov-Witten 不变量的详细定义和计算方法见附录 section 20。

<sup>5</sup>问: Gromov-Witten 不变量最初是如何从物理中推导出来的? A-model 和 B-model 是什么? 见附录 section 80。

**3.2. 量子上同调的几何意义.** 理解量子上同调的关键在于认识到它编码了曲线计数的额外信息。

在经典 Schubert calculus 中, 我们问的是: ”两个 Schubert 簇  $X(u)$  和  $X(v)$  在旗流形中相交于几个点?”

在量子上同调中, 我们问的是更深的问题: ”给定同调类  $\beta$ , 有多少条曲线连接  $X(u)$  和  $X(v)$ , 并且这些曲线通过了旗流形中的特定位置?”

这类似于从问”两点之间有多少条直线”到问”两点之间有多少条抛物线”——问题变得更加丰富和复杂。

**为什么这是重要的?** 因为:

- (1) 量子上同调包含了经典理论无法触及的代数几何结构;
- (2) 量子修正项揭示了旗流形的更深层性质;
- (3) 量子上同调与弦理论的对偶性提供了新的计算工具。

**量子变量的含义:** 形式变量  $q_i$  编码了第  $i$  个曲线类的信息。当我们说某个系数”包含  $q_1^2 q_3$  项”时, 意思是这个项对应着两条 1 类曲线和一条 3 类曲线的组合。

例 3.1 ( $\mathbb{P}^1$  上的曲线计数). 最简单的例子是  $\mathbb{P}^1$  (射影直线)。在经典相交理论中:

$$[\text{点}] \cdot [\text{点}] = 1 \cdot [\mathbb{P}^1]$$

因为两个点确定一条直线。

在量子上同调中, 我们需要考虑曲线的亏格 (*genus*) 和次数。对于  $\mathbb{P}^1$ , 其小量子上同调环为

$$QH^*(\mathbb{P}^1) = \mathbb{Z}[x, q]/(x^2 = q)$$

其中  $x = c_1(\mathcal{O}(1))$ ,  $q$  对应基本类。这说明量子修正在  $\mathbb{P}^1$  上的作用是良定义但非平凡的。

**澄清:** 虽然  $\mathbb{P}^1$  的 *Gromov-Witten* 不变量并非完全平凡, 但相比高亏格或更复杂的旗流形, 其量子结构相对简单。对于亏格 0 曲线, 量子上同调环的维数与经典上同调相同, 只是乘法结构被量子修正了。

例 3.2 (旗流形上的曲线计数). 在旗流形  $Fl_n$  中, 计数曲线是一个深刻的问题。不同的同调类  $\beta$  对应于旗流形中不同”方向”的曲线族。

例如, 在  $Fl_3$  中, 从某个旗到另一个旗的曲线可能属于不同的同调类。量子上同调中的  $q$  变量正是记录了这些不同曲线类的相对权重。

**3.3. 小量子上同调环 (small quantum cohomology ring).** 对于旗流形 (flag manifold)  $Fl_n = SL_n/B$ , 小量子上同调环 (small quantum cohomology ring) 的结构由 Givental、Kim 以及 Ciocan-Fontanine 确定。<sup>6</sup>

定理 3.1 (小量子上同调环 [21, Theorem 8]). 小量子上同调环  $QH^*(Fl_n)$  同构于

$$\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n; q_1, \dots, q_{n-1}]/(\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n).$$

其中  $\tilde{e}_i(x|q)$  是量子初等对称函数, 由以下行列式生成:

$$\det \begin{pmatrix} x_1 + t & q_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & x_2 + t & q_2 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & x_3 + t & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & x_n + t \end{pmatrix} = t^n + \tilde{e}_1 t^{n-1} + \cdots + \tilde{e}_n.$$

<sup>6</sup>各数学家贡献的历史顺序和相互关系见附录 section 84。

当  $q_1 = \dots = q_{n-1} = 0$  时, (3.1) 退化为经典上同调环——这体现了量子版本与经典版本之间的深刻联系。

**几何含义：**量子初等对称函数  $\tilde{e}_i$  对应于旗流形中特定子流形的类。它们的零点描述了旗流形的量子修正结构。

**关于  $\tilde{e}_i$  的显式定义：**虽然  $\tilde{e}_i$  在 [21] 中由行列式生成函数隐式定义, 但附录 section 14 给出了其显式展开形式。简而言之,  $\tilde{e}_i(x|q)$  是  $x$  变量的初等对称多项式  $e_i$  的量子修正, 其中  $q$  变量记录了旗流形中曲线类的信息。当所有  $q_j = 0$  时,  $\tilde{e}_i(x|0) = e_i(x_1, \dots, x_i)$ 。

#### 4. 量子双重 Schubert 多项式的定义

有了量子上同调框架后, 我们现在可以正式定义量子双重 Schubert 多项式。

**4.1. 顶部多项式 (top polynomial).** 设  $x = (x_1, \dots, x_n)$  和  $y = (y_1, \dots, y_n)$  是两组变量,  $q = (q_1, \dots, q_{n-1})$  是量子变量。

**顶部多项式 (top polynomial)** 定义为

$$\tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y) := \prod_{i=1}^{n-1} \Delta_i(y_{n-i} \mid x_1, \dots, x_i).$$

其中

$$\Delta_k(t \mid x_1, \dots, x_k) := \sum_{j=0}^k t^{k-j} e_j(x_1, \dots, x_k \mid q_1, \dots, q_{k-1}).$$

是关于  $x_1, \dots, x_k$  的量子初等对称函数的生成函数。<sup>7</sup>

**为什么叫“顶部多项式”？**当  $q = 0$  时,  $\tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y) = \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$ , 这正是对应最长置换  $w_0$  的 Schubert 多项式——在 Bruhat 序 (Bruhat order) 中, 它是旗流形的“最大维” Schubert 胞腔。

**4.2. 量子双重 Schubert 多项式.** 有了顶部多项式, 我们通过对它施加除差算子来生成所有量子双重 Schubert 多项式:

**定义 3.4** (量子双重 Schubert 多项式 [21, Definition 4]). 对于每个置换  $w \in S_n$ , 定义 **量子双重 Schubert 多项式**为

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y) = \partial_{ww_0}^{(y)} \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y).$$

其中除差算子  $\partial_{ww_0}^{(y)}$  作用于  $y$  变量。

**注记：**此处的除差算子下标  $\partial_{ww_0}$  与经典情形 (见 (57)) 的  $\partial_{w^{-1}w_0}$  不同。两种约定在旗流形几何中有不同的方便之处, 但当  $q = 0$  时结果一致。

**与经典版本的关系：**当  $q = 0$  时,

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y) \Big|_{q=0} = \mathfrak{S}_w(x, y).$$

即经典双重 Schubert 多项式。这是“经典极限”的一个典型例子——量子理论在  $q \rightarrow 0$  时退化为经典理论。

**验证：**设  $q = 0$ , 则  $\Delta_i(y_{n-i} \mid x_1, \dots, x_i) = \prod_{j=1}^i (x_j + y_{n-i+j})$ , 而

$$\prod_{i=1}^{n-1} \prod_{j=1}^i (x_j + y_{n-i+j}) = \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j) = \mathfrak{S}_{w_0}(x, y).$$

<sup>7</sup>量子初等对称函数  $e_j(x_1, \dots, x_k \mid q_1, \dots, q_{k-1})$  的显式公式和递推关系见附录 section 14。



然后由除差算子的性质可得 (3.4)。

## 5. 主要性质

量子双重 Schubert 多项式具有一系列重要性质。

**5.1. 稳定性 (stability).** 与经典版本类似 (见 Chapter 1 的稳定性 (stability) 讨论), 量子双重 Schubert 多项式也具有稳定性:

命题 3.1 (稳定性). 设  $m > n$  且  $i: S_n \hookrightarrow S_m$  是自然嵌入, 则

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y) = \tilde{\mathfrak{S}}_{i(w)}(x, y).$$

这意味着量子双重 Schubert 多项式在嵌入下保持不变——我们可以将其定义在  $S_\infty$  上, 这对于理论研究非常便利。

**为什么稳定性重要?** 在经典 Schubert 多项式理论中, 稳定性保证了多项式可以作为  $S_\infty$  上的对象来研究, 而不必关心具体的  $n$ 。量子版本继承了这一性质, 使得无穷维的分析成为可能。

**5.2.  $S_3$  的完整例子.** 为了建立直观感受, 我们展示  $S_3$  的量子双重 Schubert 多项式的完整集合:

例 3.3 ( $S_3$  的量子双重 Schubert 多项式). 在  $S_3$  中, 量子双重 Schubert 多项式为:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathfrak{S}}_{s_1 s_2 s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) &= (x_1 + y_2)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1) + q_1(x_1 + y_2), \\ \tilde{\mathfrak{S}}_{s_2 s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) &= (x_1 + y_1)(x_1 + y_2) - q_1, \\ \tilde{\mathfrak{S}}_{s_1 s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) &= (x_1 + y_1)(x_2 + y_1) + q_1, \\ \tilde{\mathfrak{S}}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) &= x_1 + y_1, \\ \tilde{\mathfrak{S}}_{s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) &= x_1 + x_2 + y_1 + y_2, \\ \tilde{\mathfrak{S}}_{\text{id}}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) &= 1.\end{aligned}$$

其中  $q_1$  项的符号约定基于 [21, Section 4]。

**观察:** 每个多项式都由一个经典部分加上一到两个  $q$  修正项组成。当  $q_1 = 0$  时, 这些公式退化为经典双重 Schubert 多项式。

**关键洞察:** 第一个公式 (对应最长元  $w_0 = s_1 s_2 s_1$ ) 包含了  $q_1$  项, 这反映了在量子上同调中, 最高维 Schubert 类的乘法会涉及量子修正——这正是量子与经典理论的核心差异所在。

例 3.4 (验证经典极限). 以  $\tilde{\mathfrak{S}}_{s_2 s_1}$  为例。当  $q_1 = 0$  时,

$$\tilde{\mathfrak{S}}_{s_2 s_1} = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)$$

由第一章的知识, 经典双重 Schubert 多项式满足

$$\mathfrak{S}_{s_2 s_1}(x, y) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2) = x_1^2 + x_1 y_1 + x_1 y_2 + y_1 y_2$$

这正是  $(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)$  的展开。经典极限验证通过。

**关于完整性的说明:** 由于  $s_2 s_1$  在  $S_3$  中的长度为 2, 其 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_{s_2 s_1}(x, y)$  关于  $x$  变量的总次数为 2 (等于置换长度)。因此上述展开  $x_1^2 + x_1 y_1 + x_1 y_2 + y_1 y_2$  是完整的——没有遗漏更高次项, 因为多项式的次数已由 Bruhat 序固定。

## 6. 量子 Schubert 多项式

除了量子双重版本, Kirillov 和 Maeno 还定义了不含  $y$  变量的量子 Schubert 多项式。

**6.1. 量子配对 (quantum pairing).** 在经典理论中, 我们用标量积  $\langle f, g \rangle = \partial_{w_0}(fg)$  来定义 Schubert 多项式的正交性 (orthogonality)。在量子情形, 我们需要用量子配对 (quantum pairing) 来替代:

定义量子配对 (quantum pairing) 为 Grothendieck 留数 (Grothendieck residue):

$$\langle f, g \rangle_Q = \text{Res}_{\tilde{I}}(fg).$$

其中  $\tilde{I}$  是由量子初等对称函数生成的理想。这个配对对应于量子上同调环中的相交形式 (intersection form)。

**为什么使用 Grothendieck 留数 (Grothendieck residue)?** 这是因为在商环  $QH^*(Fl_n)$  中, 普通的积分被留数公式所替代——这反映了量子版本与经典版本的本质差异。<sup>8</sup>

## 6.2. 定义.

定义 3.5 (量子 Schubert 多项式 [21, Definition 5]). 量子 **Schubert 多项式**  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(x)$  是将字典序排列的单项式  $\{x^I \mid I \subset \delta\}$  关于量子配对  $\langle, \rangle_Q$  进行 *Gram-Schmidt* 正交化 (*Gram-Schmidt orthogonalization*) 得到的。

这一定义在结构上与经典 Schubert 多项式的刻画像 (见 Chapter 2 的讨论) 完全对应——只是将普通标量积替换为了量子标量积。

量子 Schubert 多项式满足以下正交性 (orthogonality) 条件:

$$\langle \tilde{\mathfrak{S}}_u, \tilde{\mathfrak{S}}_v \rangle_Q = \begin{cases} 1 & \text{若 } v = w_0 u, \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

**几何意义:** 这一正交性对应于量子上同调环中 Schubert 类的相交数。在量子版本中, 相交不再只是点计数, 而是涉及曲线的虚拟计数。

## 7. 量子 Cauchy 恒等式

这是本文的核心结果之一——它建立了量子与经典 Schubert 多项式之间的对偶关系。

定理 3.2 (量子 Cauchy 恒等式 [21, Theorem B]). 设  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(x) = \tilde{\mathfrak{S}}_w(x, 0)$ , 则

$$\sum_{w \in S_n} \tilde{\mathfrak{S}}_w(x) \mathfrak{S}_{w w_0}(y) = \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y).$$

**这为什么重要?** 这一恒等式将量子 Schubert 多项式与经典 Schubert 多项式联系起来。当  $q = 0$  时, (3.2) 退化为经典的 Cauchy 公式

$$\sum_{w \in S_n} \mathfrak{S}_w(x) \mathfrak{S}_{w w_0}(y) = \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j).$$

这正是 Chapter 2 中研究乘积公式时的基础。

**几何意义:** (3.2) 建立了量子 Schubert 多项式 (对应量子上同调类) 与经典 Schubert 多项式 (对应普通上同调类) 之间的对偶关系。这种对偶性在数学物理中有深刻的根源。<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Grothendieck 留数的定义和性质见附录 section 16。

<sup>9</sup>量子 Cauchy 恒等式的物理起源 (拓扑场论中的对偶性) 见附录 section 81。

## 8. Lascoux-Schützenberger 型公式

作为量子 Cauchy 恒等式的一个直接推论，我们得到量子 Schubert 多项式的 Lascoux-Schützenberger 型公式。

推论 3.1 (Lascoux-Schützenberger 型公式 [21, Theorem C]). 设  $\tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y)$  如上定义，则

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(x) = \partial_{ww_0}^{(y)} \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y) \Big|_{y=0}.$$

**这告诉我们什么？** 量子 Schubert 多项式可以通过对量子双重 Schubert 多项式施加除差算子，然后取  $y = 0$  来得到。这与经典情形

$$\mathfrak{S}_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0} \mathfrak{S}_{w_0}(x).$$

的结构完全类似——量子版本只是经典版本的自然推广。

## 9. 与三重 Schubert Positivity 的联系

在 Chapter 1 中，我们研究了 Gao-Xiong 关于三重 Schubert Positivity (triple Schubert positivity) 的结果。现在我们揭示量子双重 Schubert 多项式与这一结果的联系。

回顾 Chapter 1 的核心问题：研究展开系数

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t}).$$

的正性。

**关键联系：** 当我们考虑量子上同调时，同样的乘法在量子配对下有更丰富的结构。量子双重 Schubert 多项式提供了这些乘法结构的代数代表元。

具体而言，等变量量子上同调 (equivariant quantum cohomology) 环  $QH_{U_n}^*(Fl_n)$  同构于

$$\mathbf{Z}[x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n; q_1, \dots, q_{n-1}] / \tilde{J}.$$

其中理想  $\tilde{J}$  由

$$e_i(x \mid q_1, \dots, q_{n-1}) - e_i(y_1, \dots, y_n), \quad 1 \leq i \leq n.$$

生成。

量子双重 Schubert 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y)$  在这个环中扮演的角色，与经典双重 Schubert 多项式在经典等变量量子上同调中扮演的角色完全类似。

命题 3.2 (量子与三重的联系). 设  $u, v, w \in S_n$ 。则在等变量量子上同调  $QH_{U_n}^*(Fl_n)$  中，Schubert 类的量子乘积展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \beta)$  满足：

- 当  $\beta = 0$  (曲线类为零) 时，系数退化为经典等变量量子上同调的结构常数；
- 当  $\beta \neq 0$  时，系数记录了连接 Schubert 子簇的  $\beta$  类曲线个数。

特别地，Gao-Xiong 的 triple Schubert positivity 结果可以理解为等变量量子上同调在  $\beta = 0$  时的情形——此时量子双重 Schubert 多项式给出了结构常数的代数代表元。

**三重版本的关键洞察：** 当 Gao-Xiong 研究三重变量集  $(x, y, t)$  时，他们实际上是在研究等变量量子上同调 (equivariant quantum cohomology) 的一个精化版本。命题 3.2 明确了两者的关系：Gao-Xiong 的正性结果对应于量子配对下  $\beta = 0$  的特殊情形，而 Kirillov-Maeno 的量子双重 Schubert 多项式则给出了完整的代数框架。

### 10. Vafa-Intriligator 公式

本文的另一重要贡献是给出了 Vafa-Intriligator 公式 (Vafa-Intriligator formula) 的高维推广。

Vafa-Intriligator 公式最初来自物理, 它给出了某些余维一子流形上交点数的显式计算。在旗流形的情形, 这涉及 Gromov-Witten 不变量的显式公式。

Kirillov 和 Maeno 在 Section 8 中给出了旗流形的 Vafa-Intriligator 公式的高维推广。这一公式在量子上同调中的地位, 如同经典 Schubert 多项式在普通上同调中的地位——它提供了计算结构常数的组合工具。

我们将在附录中给出这一公式的详细推导 (见 section 15)。

### 11. 量子化映射

Kirillov 和 Maeno 还引入了量子化映射, 这是理解量子与经典关系的关键工具。

定义量子化映射  $P_n \rightarrow \overline{P}_n$  为

$$\tilde{f}(x) = \sum_{w \in S(n)} \partial_w^{(y)} f(y) \tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y)|_{\overline{P}_n}.$$

命题 3.3 (配对保持 (pairing preservation)). 量子化映射保持配对 (pairing preservation):

$$\langle \tilde{f}, \tilde{g} \rangle_Q = \langle f, g \rangle, \quad f, g \in P_n.$$

这意味着量子化是配对保持的线性映射, 但不保持乘法 (见 [21, Remark 5(i)]).

量子化保持初等多项式和完全齐次对称多项式, 但将单形式映射到量子单形式。

**为什么这个性质重要?** 配对保持意味着量子化保持了相交理论的核心结构——但乘法结构的变化正是量子效应的体现。这揭示了量子与经典之间的深刻联系和本质差异。

### 12. 与其他工作的关系

本文与 Fomin、Gelfand 和 Postnikov 的独立工作有部分重叠, 但采用了完全不同的方法。

Postnikov 等人基于一类交换算子  $X_i$  发展了量子 Schubert 多项式理论, 得到了量子 Monk 公式、正交性和量子乘法的定义等结果。

Kirillov-Maeno 的方法则基于量子 Cauchy 恒等式和留数配对, 提供了另一种理解量子 Schubert 结构常数的途径。这两种方法互为补充, 共同构成了量子 Schubert calculus (quantum Schubert calculus) 的基础。<sup>10</sup>

### 13. 本章小结

本章介绍了 Kirillov 和 Maeno 关于量子双重 Schubert 多项式的工作。关键要点如下:

- (1) **量子上同调的动机**: 经典相交理论无法处理曲线计数问题, 需要引入量子修正
- (2) **量子初等对称函数**  $\tilde{e}_i(x|q)$  由行列式生成函数定义, 它们生成了小量子上同调环的 Relations
- (3) **量子双重 Schubert 多项式**  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y)$  通过对顶部多项式施加除差算子定义
- (4) **经典极限**: 当  $q = 0$  时,  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y)$  退化为经典双重 Schubert 多项式
- (5) **量子 Cauchy 恒等式** 建立了量子 Schubert 多项式与经典 Schubert 多项式之间的对偶关系
- (6) **量子化映射** 是配对保持的线性映射, 但不保持乘法
- (7) 这些结果与 Chapter 1 的 Gao-Xiong 三重 Schubert positivity 工作有深刻的联系

<sup>10</sup>Fomin-Gelfand-Postnikov 方法与 Kirillov-Maeno 方法的比较见附录 section 18。

在下一章中, 我们将继续探讨 Mihalcea 关于等变量量子量子上同调正性的结果。

#### 14. 附录: 量子初等对称函数的显式公式

**背景.** 量子初等对称函数  $\tilde{e}_i(x|q)$  通过行列式生成函数定义。本节给出其显式展开形式。

**行列式递推.** 考虑  $n \times n$  三对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} x_1 + t & q_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & x_2 + t & q_2 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & x_3 + t & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & x_n + t \end{pmatrix}$$

定义  $D_m(t) = \det(A_m)$ , 其中  $A_m$  是  $m \times m$  的主子矩阵。则  $D_m(t)$  满足递推关系:

$$D_m(t) = (x_m + t)D_{m-1}(t) - q_{m-1}D_{m-2}(t)$$

其中  $D_0(t) = 1$ ,  $D_1(t) = x_1 + t$ 。

**显式公式.** 通过递推可得:

$$\tilde{e}_k(x|q) = \sum_{j=0}^{\lfloor k/2 \rfloor} (-1)^j \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_j \leq k-1} q_{i_1} q_{i_2} \cdots q_{i_j} \cdot e_{k-2j}(x_1, \dots, x_{k-j}).$$

当  $q = 0$  时, 这简化为  $e_k(x_1, \dots, x_k)$ 。

#### 15. 附录: Vafa-Intriligator 公式的详细推导

**历史背景.** Vafa 和 Intriligator 在 1996 年基于物理中的拓扑场论提出了一个计算某些余维一子流形上交点数目的公式。

在旗流形的情形, 这个公式涉及 Gromov-Witten 不变量的显式计算。

**公式陈述.** 对于 Grassmannian  $G/P$ , Vafa-Intriligator 公式给出:

$$c_{u,v}^w(q) = \sum_{\beta} q^{\beta} \langle I_{0,3,\beta}(\sigma_u, \sigma_v, \sigma_{w^\vee}) \rangle$$

其中求和遍历所有有效的曲线类  $\beta$ 。

详细证明涉及以下步骤 (详见 [21, Section 8]):

- (1) 将问题化为留数计算
- (2) 应用 Localization 定理
- (3) 验证与已知结果的一致性

#### 16. 附录: Grothendieck 留数的定义

**定义.** 设  $\tilde{I}_n \subset \overline{P}_n = \mathbf{Z}[q_1, \dots, q_{n-1}][x_1, \dots, x_n]$  是由量子初等对称函数生成的理想。设  $\mathcal{H} = \det \left( \frac{\partial \tilde{e}_i}{\partial x_j} \right)$  是 Hessian。

对于  $f \in \overline{P}_n$ :

- 若  $\deg f < \deg \mathcal{H}$ , 则  $\text{Res}_{\tilde{I}}(f) = 0$
- 若  $\deg f = \deg \mathcal{H}$ , 则  $f \equiv \frac{\alpha}{n!} \mathcal{H} \pmod{\tilde{I}_n}$ , 其中  $\text{Res}_{\tilde{I}}(f) = \alpha$

**在量子配对中的应用.** 配对定义为  $\langle f, g \rangle_Q = \text{Res}_{\tilde{I}}(fg)$ 。这个配对在商环  $\overline{P}_n/\tilde{I}_n \cong QH^*(Fl_n)$  上诱导非退化配对。

### 17. 附录：量子 Cauchy 恒等式的证明思路

量子 Cauchy 恒等式

$$\sum_{w \in S_n} \tilde{\mathfrak{S}}_w(x) \mathfrak{S}_{w_0}(y) = \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y)$$

的证明分为以下步骤：

步骤 1：两边同时关于  $x$  变量应用除差算子  $\partial_{vw_0}^{(x)}$ 。

步骤 2：利用正交性关系简化左边。

步骤 3：验证所得表达式等于右边。

详细证明见 [21, Theorem B]。

### 18. 附录：两种量子化方法的比较

Kirillov-Maeno 方法和 Fomin-Gelfand-Postnikov 方法是量子 Schubert 演算中两条独立发展的路线。

**Kirillov-Maeno 方法：**

- 核心工具：量子 Cauchy 恒等式和 Grothendieck 留数配对
- 多项式对象：量子双重 Schubert 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y)$
- 优点：与经典理论的结构对应清晰

**Fomin-Gelfand-Postnikov 方法：**

- 核心工具：交换算子  $X_i$
- 多项式对象：量子 Schubert 多项式  $Q_w(x; q)$
- 优点：组合结构更显式

两种方法在  $q = 0$  时都退化为经典 Schubert 理论。

### 19. 附录：量子上同调与经典上同调的比较表

| 性质  | 经典上同调        | 量子上同调           |
|-----|--------------|-----------------|
| 环结构 | $H^*(Fl_n)$  | $QH^*(Fl_n)$    |
| 乘法  | Schubert 类相交 | 曲线计数修正          |
| 参数  | 无            | 形式变量 $q$        |
| 正性  | 整数系数         | 多项式系数（有待第四章）    |
| 配对  | 积分           | Grothendieck 留数 |

### 20. 附录：Gromov-Witten 不变量的详细定义

**背景.** Gromov-Witten 不变量起源于 1990 年代代数几何与拓扑弦理论的对偶研究。Gromov (1985) 首先提出了紧致化轨迹空间的想法，后来被 Kontsevich (1994) 系统化。

**稳定映射空间.** 设  $V$  是光滑复流形， $\beta \in H_2(V, \mathbb{Z})$  是曲线类。**稳定映射**  $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow V$  是满足以下条件的映射：

- $f_*[\mathbb{P}^1] = \beta$ （映射代表同调类  $\beta$ ）
- $f$  在标记点  $p_1, \dots, p_m$  处有良好定义
- 稳定性条件：有限自同构群

稳定映射的模空间记作  $\overline{M}_{0,m}(V, \beta)$ ，这是一个紧致化的轨迹空间。

**不变量的定义.** Gromov-Witten 不变量定义为：

$$\langle I_{0,m,\beta}^V \rangle(\gamma_1 \otimes \cdots \otimes \gamma_m) = \int_{[\overline{M}_{0,m}(V,\beta)]^{\text{vir}}} \prod_{i=1}^m \text{ev}_i^*(\gamma_i)$$

其中：

- $[\overline{M}_{0,m}(V,\beta)]^{\text{vir}}$  是虚拟基本类 (virtual fundamental class)
- $\text{ev}_i : \overline{M}_{0,m}(V,\beta) \rightarrow V$  是评估映射
- $\gamma_i \in H^*(V, \mathbb{Q})$  是上同调类

**与曲线计数的关系.** 当所有类都是余维一子流形的基本类时，Gromov-Witten 不变量计数的是满足条件的稳定映射的“虚拟个数”。这推广了经典的相交理论。

## 21. 附录：量子上同调的物理起源

**拓扑场论背景.** 量子上同调起源于物理中的**拓扑 A-模型** (topological A-model)。在弦论中，我们考虑将二维世界面 (worldsheet) 映射到目标空间  $V$ 。

当世界面是球面 (亏格 0) 时，对应的就是**量子上同调**中的计数问题。

**A-twisted topological field theory.** Witten 首先观察到，通过对  $N=2$  超对称场论进行 A-twist，可以得到一个拓扑场论，其算子代数正好是量子上同调环。

物理中的关联函数 (correlation function) 对应于数学中的 Gromov-Witten 不变量：

$$\langle \phi_1 \phi_2 \cdots \phi_m \rangle = \int_{\overline{M}_{0,m}} \prod_i \text{ev}_i^*(\phi_i)$$

**为什么来自物理？** 数学家最初研究的是经典相交理论。但物理学家在研究拓扑弦论时发现，仅仅计数点是不够的——必须考虑世界面上的动力学。这导致了量子上同调的产生。这是一个数学从物理学汲取深刻思想的经典案例。

## 22. 附录：量子多重性的几何意义

在公式

$$[\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w,\beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) [\sigma_w]$$

中， $\beta$  编码了曲线类的信息。

**几何解释：** 考虑旗流形  $Fl_n$  中三个 Schubert 子簇  $X_u, X_v, X_w$ 。经典情形下，计数的是点与点的交集。但量子情形下，我们计数的是连接这些子簇的曲线。

具体而言， $c_{u,v}^w(\beta)$  计数的是：

- 从  $X_u$  中一点出发
- 到  $X_v$  中一点
- 类为  $\beta$  的曲线
- 终点在  $X_w$  中

当  $\beta = 0$  (即点映射) 时，这退化为经典相交数。

## 23. 附录：旗流形的 Vafa-Intriligator 公式

**历史.** Vafa 和 Intriligator 在 1996 年基于物理中的镜像对称 (mirror symmetry) 思想提出了计算某些余维一子流形交点数的公式。

在旗流形  $Fl_n$  的情形，这个公式给出了 Gromov-Witten 不变量的显式表达式。

**公式陈述.** 对于旗流形  $Fl_n$ , Vafa-Intriligator 公式断言:

$$c_{u,v}^w(q) = \frac{1}{|W|} \sum_{\sigma \in W} \frac{\sigma(\sigma_u)\sigma(\sigma_v) \prod_{\alpha \in R^+} \alpha}{\prod_{\alpha \in R^+} (1 - q^\alpha \sigma(e^{-\alpha}))}$$

其中  $W$  是 Weyl 群,  $R^+$  是正根集合。

这个公式的美妙之处在于: 它将抽象的曲线计数问题转化为具体的求和。

## 24. 附录: 量子 Schubert 多项式的正交性证明

定理: 量子 Schubert 多项式满足正交性关系

$$\langle \tilde{\mathfrak{S}}_u, \tilde{\mathfrak{S}}_v \rangle_Q = \delta_{v, w_0 u}$$

**证明思路:**

步骤 1: 归约到典范元素。

由量子 Cauchy 恒等式,

$$\langle \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y), \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, z) \rangle_Q^{(x)} = C(y, z)$$

其中右边是”典范元素”。

步骤 2: 施加除差算子。

对两边施加除差算子  $\partial_{vw_0}^{(y)} \partial_{ww_0}^{(z)}$ :

$$\langle \tilde{\mathfrak{S}}_v(x, y), \tilde{\mathfrak{S}}_w(x, z) \rangle_Q^{(x)} = \sum_{u \in S_n} \partial_{vw_0}^{(y)} \mathfrak{S}_u(y) \cdot \partial_{ww_0}^{(z)} \mathfrak{S}_{w_0 u}(z)$$

步骤 3: 取极限。

取  $y = z = 0$ , 利用经典的正交性关系  $\eta(\partial_w \mathfrak{S}_u) = \delta_{w,u}$ , 可得所求结果。

详细证明见 [21, Section 5]。

## 25. 附录: 量子化映射的进一步性质

量子化映射  $\Phi: P_n \rightarrow \overline{P}_n$  定义为

$$\Phi(f)(x) = \sum_{w \in S^{(n)}} \partial_w^{(y)} f(y) \tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y) \Big|_{\overline{P}_n}$$

**性质汇总:**

- (1) **线性性:**  $\Phi(af + bg) = a\Phi(f) + b\Phi(g)$
- (2) **配对保持:**  $\langle \Phi(f), \Phi(g) \rangle_Q = \langle f, g \rangle$
- (3) **保持初等对称函数:**  $\Phi(e_i) = \tilde{e}_i$
- (4) **不保持乘法:**  $\Phi(fg) \neq \Phi(f)\Phi(g)$

**为什么不保持乘法?** 这是量子效应的核心体现。在量子理论中, 乘法结构被量子修正了——这不是映射的缺陷, 而是数学本质的改变。



## Positivity in Equivariant Quantum Schubert Calculus

### 1. 引言：从经典到量子——为什么要推广？

在前三章中，我们逐步建立了 Schubert calculus 的现代框架：chapter 1 在三重变量集下建立了 Graham positivity (定理 1.1)，chapter 2 给出了 Molev-Sagan 类型公式，chapter 3 引入了量子双重 Schubert 多项式。每一步推广都自然地引出了下一个问题。

现在，一个自然的追问摆在我们面前：**经典上同调的正性能否推广到量子版本？**

这个问题并非无的放矢。我们已经知道，在经典等变上同调 (equivariant cohomology) 中，Graham 证明了 Peterson 的猜想 (定理 1.1) ——展开系数是关于负根  $x_i$  的非负多项式。但量子上同调的情况有所不同：乘法不再是单纯的相交计数，而涉及 Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant)<sup>1</sup>——计数的是满足特定条件的曲线个数。在更复杂的代数几何世界中，同类正性结果是否仍然成立？

**核心发现** (Mihalcea, 2007)：答案是肯定的。等变量子上同调 (equivariant quantum cohomology) 的结构常数  $c_{u,v}^{w,d}$  仍然是关于负根  $x_1, \dots, x_r$  的非负整数系数多项式。

这个结果值得我们深思。通常，数学的每一次推广都会引入新的复杂性——更多的参数、更微妙的行为、更多的潜在反例。但在这里，Schubert calculus 的核心正性在从经典到量子的推广中表现出惊人的稳定性。这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合，而是反映了某种更深层的几何和代数结构。

### 2. 历史脉络：Peterson 猜想

要理解 Mihalcea 的工作，需要回顾一段精彩的历史。这段历史展现了数学猜想如何通过一代代数学家的工作逐步得到证明和推广。

**2.1. 经典情形。** 在经典 Schubert calculus 中，结构常数  $c_{u,v}^w$  计数旗流形中三个 Schubert 簇的交点个数，自然是非负整数。这种非负性 (称为 **Schubert positivity**) 植根于几何相交 (geometric intersection) 的具体计数——两条代数曲线在复流形中的相交个数 [6, §1]。

但当引入等变修正时，问题变得微妙了。等变上同调 (equivariant cohomology)  $H_T^*(G/P)$  中的结构常数  $c_{u,v}^w$  不再是简单的整数，而是关于 torus 作用参数的多项式 [5, 1]。**这些多项式的系数还能保持非负吗？**

这是一个深刻的问题。在等变量子上同调中，类不再是子簇的直接上同调类，而是提升到  $X \times_T ET$  (同伦商空间, homotopy quotient) 上的类。在这种更抽象的设置中，非负性不再能从几何相交直接读出。

**2.2. Peterson 的天才猜想。** 1997 年，Daniel Peterson 在 MIT 的课堂上提出了一个令许多人惊讶的猜想：**即使在这些多项式中，系数仍然是“正”的**——具体而言， $c_{u,v}^w$  可以写成负根  $-\alpha_i$  的非负系数多项式。

为什么说这是“天才”的猜想？因为没有人能预期到这一点。等变量子上同调中的类失去了直接的几何意义，正性似乎不应该自动保持。Peterson 的洞察力在于他预见到了隐藏的统一结构。

<sup>1</sup>问：什么是 Gromov-Witten 不变量？它计数的是什么？见附录 section 56。

这个猜想被 Graham 在 2001 年证明：

定理 4.1 (Graham Positivity Theorem [14, Theorem 3.2]). 设  $X = G/P$  为齐次空间,  $u, v, w \in W^P$ 。则在等变上同调 (equivariant cohomology) 中, <sup>2</sup>

$$\sigma(u)^T \cdot \sigma(v)^T = \sum_w c_{u,v}^w \sigma(w)^T$$

其中  $\sigma(u)^T$  表示等变上同调 (equivariant cohomology) 中的 Schubert 类,  $T$  代表 torus 等变 (equivariant)。<sup>3</sup>

**为什么叫“正性”?**<sup>4</sup> 因为每个  $c_{u,v}^w$  都可以表示为形如  $x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots$  的单项式的非负线性组合, 其中所有系数都是非负整数。

**2.3. 量子化带来的挑战.** Graham 定理的证明利用了等变量子上同调的几何性质<sup>5</sup>。但当我们目光投向量子上同调时, 同样的正性问题变得更加复杂。在量子上同调 (quantum cohomology) 中, 乘法不再是单纯的相交计数, 而涉及 Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant) [25, 15]——计数的是满足特定条件的曲线个数:

$$(59) \quad \sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w).$$

这里  $d$  是曲线类的多重次数 (multi-degree),  $q^d$  是形式变量。<sup>6</sup> 关键问题出现了: 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  作为  $x_i$  的多项式, 是否仍然满足正性?

一个自然的想法是: 能否将量子情形“退化”到已知的 Graham 情形? 如果能找到合适的极限或归约, Mihalcea 的工作正是基于这个思路。

### 3. 等变量子上同调的定义

在前一节中, 我们看到了从经典到等变量子上同调的正性问题自然延伸。但等变量子上同调 (equivariant quantum cohomology) 究竟是什么? 本节给出其正式定义。<sup>7</sup>

**3.1. 思想来源: Kim 的贡献.** 在深入定义之前, 有必要提及 Kim 的重要贡献 [19]。正是在 Kim 的工作基础上, Mihalcea 才得以将 Graham 的 positivity 结果推广到量子情形。Kim 认识到, 等变上同调 (equivariant cohomology) 与量子上同调 (quantum cohomology) 之间存在一个“公共的母体”——等变量子上同调 (equivariant quantum cohomology), 它同时包含了这两者的结构 [19, §1]。

<sup>2</sup>问:  $\sigma(u)^T$  是什么意思? 上标  $T$  代表什么? 见附录 section 55。

<sup>3</sup>问: 在 Schubert 演算中,  $\sigma(w)$  是什么意思? 例如  $\sigma(1) = 1$  (单位类) 和  $\sigma(s_1) = [\text{点}]$  (超平面类)。见附录 section 62。

<sup>4</sup>问: 在 Graham Positivity 定理中, 为什么说展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是  $t_j - y_i$  的非负整数系数多项式? 展开式中明明有负项 (如  $-x_1 t_2$ )? 见附录 section 31。

<sup>5</sup>问: 在 Chapter 4 (Mihalcea) 中提到: “Graham 定理的证明利用了等变量子上同调的几何性质。”为什么 Graham 的证明要依赖几何性质? 具体用了什么几何性质? 到了量子上同调为何变得更复杂? 见附录 section 34。

<sup>6</sup>问:  $\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$  这个公式中,  $q^d$  是形式变量,  $q$  是什么? 求和是对什么?  $u, v, w$  是什么? 见附录 section 60。

<sup>7</sup>问:  $H^*(X \times_T ET)$  是什么? 是量子同调吗?  $H^*(X \times_T ET)$  是怎么定义的? 我不了解上同调定义, 这是量子同调吗? 见附录 section 20。

这一认识的关键在于：我们可以同时考虑 torus 作用（产生  $x_i$  多项式）和量子修正（产生  $q$  变量）。<sup>8</sup>

**3.2. 设置.** 以下 Setup 列出本文所需的核心几何对象。带 ?? 引用的是 Chapter 1 中已有正式定义的概念；其余给出详细定义。

**定义 4.1 (连通复半单李群).**  $G$  为**连通复半单李群** (*connected complex semisimple Lie group*)。这意味着：

- (1)  $G$  是复流形，同时带有光滑群结构；
- (2) 作为实流形， $G$  是连通的；
- (3) 其李代数  $\mathfrak{g}$  是半单 (*semisimple*) 的——即  $\mathfrak{g}$  没有非平凡可解理想。

典型例子： $GL_n(\mathbb{C})$ 、 $SL_n(\mathbb{C})$ 、 $Sp_{2n}(\mathbb{C})$ 、 $SO_n(\mathbb{C})$  等。

**定义 4.2 (抛物子群).**  $P \subset G$  为**抛物子群** (*parabolic subgroup*)。这等价于：存在一个 Borel 子群  $B \subset G$  (极大连通可解子群) 使得  $B \subset P$ 。几何上， $G/P$  是紧齐次空间 (*compact homogeneous space*)，称为旗流形 (*flag variety*) 的推广。

**定义 4.3 (Borel 子群与极大环面).**  $B \subset P$  为 **Borel 子群** (*Borel subgroup*)，即  $G$  的极大连通可解子群。 $T \subset B$  为**极大环面** (*maximal torus*)，满足  $T \cong (\mathbb{C}^\times)^r$ ，其中  $r = \text{rank}(G)$  为  $G$  的秩 (*rank*)。 $T$  在  $G$  的结构理论中扮演中心角色：它决定了根系统的几何。

**定义 4.4 (齐次空间).**  $X = G/P$  为**齐次空间** (*homogeneous space*)。这意味着群  $G$  通过左乘作用传递地作用在  $X$  上， $P$  为该作用的迷向子群 (*isotropy subgroup*)。当  $P = B$  时， $X = G/B$  是旗流形 (*flag variety*)；当  $P$  对应 Grassmannian 型子群时， $X$  是部分旗流形。

**定义 4.5 (Weyl 群与  $W_P$  子群).**  $W$  为  $G$  的 **Weyl 群** (*Weyl group*)，见定义 1.23 (Chapter 1)。 $W_P \subset W$  为由  $P$  确定的子群：它是  $W$  中所有使  $\Delta_P$  (见下) 保持不变的 Weyl 反射生成的子群。<sup>9</sup>

**定义 4.6 (正单根系与  $\Delta_P$ ).**  $\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$  为**正单根系** (*positive simple root system*)，见定义 1.21 (Chapter 1)。选取一个 Borel 子群  $B$  对应一个正根的选择。 $\Delta_P \subset \Delta$  为由  $P$  确定的子集：它是  $\Delta$  中被  $P$  (或等价地，被其对应的抛物子群) 包含的简单根的集合。直观上， $\Delta_P$  记录了  $P$  在 Weyl 群中“忘记”了哪些反射方向。

**定义 4.7 (最短长度代表元  $W^P$ ).**  $W^P \subset W$  为  $W/W_P$  的**最短长度代表元集合** (*shortest length representatives*)。即：每个陪集  $wW_P \in W/W_P$  中唯一的长度最短元素。形式化地，

$$W^P = \{w \in W \mid \ell(w) \leq \ell(w') \text{ 对所有 } w' \in wW_P\}$$

其中  $\ell(w)$  是 Weyl 群的长度函数 ( $w$  的 *inversion* 个数)。 $W^P$  在 Schubert 理论中扮演关键角色： $G/P$  的 Schubert 细胞由  $W^P$  参数化。

记  $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]^{10}$ ，其中  $x_i$  对应负单根  $-\alpha_i$  (negative simple roots)。

<sup>8</sup>问：这里 torus 作用为什么对应的是  $x_i$  多项式？为什么量子修正产生  $q$  变量？这个修正到底是什么含义？见附录 section 72。

<sup>9</sup>问：Weyl 群与  $W_P$  子群的具体例子？例如  $GL_3$  中不同抛物子群对应的  $W_P$  是什么？见附录 section 75。

<sup>10</sup>问：等变量子上同调类是如何定义的？见附录 section 16。

**3.3. 等变量子上同调.** 基于 Kim 的思想, Mihalcea 将等变量子上同调定义为分次  $\Lambda[q]$ -代数。

定义 4.8 (等变量子上同调). 等变量子上同调 (equivariant quantum cohomology)  $QH_T^*(X)$  是一个分次  $\Lambda[q]$ -代数, 其  $\Lambda[q]$ -基底为  $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ . 乘法  $\circ$  定义为:

$$(60) \quad \sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w),^{11}$$

其中  $c_{u,v}^{w,d}$  称为等变量子 **Littlewood-Richardson 系数** (equivariant quantum LR coefficient, 简称 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数)。<sup>12</sup>

**关键性质:**  $c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  是齐次多项式, 次数为  $c(u) + c(v) - c(w) - \sum d_i \cdot \deg(q_i)$ 。<sup>13, 14</sup>

**与经典情形的关系:** 等变量子上同调是以下两者的共同推广:

- 当  $d = 0$  时, 退化为等变上同调 (equivariant cohomology)  $H_T^*(X)$  (对应 Graham positivity) <sup>15</sup>;
- 当所有  $x_i = 0$  时, 退化为普通量子上同调 (quantum cohomology)  $QH^*(X)$  <sup>16</sup>。

这种“共同推广”的性质解释了为什么等变量子上同调是一个自然的研究对象——它同时推广了两个重要的上同调理论。

**3.4. Kim 的结构定理.** 在前一节的定义之后, Kim 证明了等变量子上同调具有代数结构。<sup>17</sup>

定理 4.2 (等变量子上同调的结构 [19, Proposition 3.1]). 设  $X = G/P$  为齐次空间, 则  $(A, \circ)$  是交换、结合的  $\Lambda[q]$ -代数, 其中  $A = QH_T^*(X)$ 。进一步, 有以下标准同构:

- (1)  $A/\langle \Lambda^+ \cdot A \rangle \simeq QH^*(X)$  作为  $\mathbb{Z}[q]$ -代数;
- (2)  $A/\langle q \cdot A \rangle \simeq H_T^*(X)$  作为  $\Lambda$ -代数。

其中  $\Lambda^+ \subset \Lambda$  表示由正次数元素构成的真理想。

**意义解读:** 这个命题告诉我们, 等变量子上同调  $QH_T^*(X)$  同时包含两个重要退化的代数结构:

- 第一个同构表明, 当我们“忘掉”  $x_i$  (即取  $\Lambda^+$  理想商), 只剩下量子参数  $q$ , 得到普通量子上同调  $QH^*(X)$ ;
- 第二个同构表明, 当我们“忘掉”  $q$  (即取  $q$  生成的理想商), 只剩下  $x_i$  参数, 得到等变上同调  $H_T^*(X)$ 。

<sup>11</sup>问:  $\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$  这个公式中, 这两个求和分别是对什么求和的? 见附录 section 87。

<sup>12</sup>问: 在定义 4.8 中提到:  $QH_T^*(X)$  是一个分次  $\Lambda[q]$ -代数。什么是分次  $\Lambda[q]$ -代数? 其中的  $q$  变量代表什么? 见附录 section 57。

<sup>13</sup>问: 次数公式  $c(u) + c(v) - c(w) - \sum d_i \cdot \deg(q_i)$  中的求和指标  $i$  的范围是什么? 见附录 section 88。

<sup>14</sup>问:  $c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  是非负系数多项式, 但 ch4 的证明似乎没有提到根  $x_i$  从何而来——这些根是怎么进来的? 见附录 section 94。

<sup>15</sup>问: 为什么当  $d = 0$  时, 量子乘积公式  $\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$  退化为等变上同调  $H_T^*(X)$  (对应 Graham positivity)? 见附录 section 63。

<sup>16</sup>问: 为什么当  $x_i = 0$  时, 退化为普通量子上同调  $QH^*(X)$ ? 这其中的数学机制是什么? 见附录 section 73。

<sup>17</sup>问: Kim 的等变量子上同调结构定理 (Proposition 3.1) 到底说了什么? 证明在哪里? 直观上如何理解两个同构? 见附录 section 3.4。

**为什么这个定理重要？**它证明了等变量子上同调的乘法确实良定义且满足交换律和结合律——这是 Mihalcea 整个 positivity 证明的基础。

**与 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数的关系：**由这些同构可以推出，当  $d = 0$  时， $c_{u,v}^{w,d}$  退化为等变 LR 系数  $c_{u,v}^w$ ；当  $c_{u,v}^{w,d}$  的多项式次数为 0 时（即  $c(u) + c(v) = c(w) + \sum d_i \cdot \deg q_i$ ），它等于普通量子 LR 系数。

### 3.5. 例子. 例 1: Grassmannian $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 的情形。<sup>18</sup>

设  $X = Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 。此时  $W = S_2 = \{1, s_1\}$ ，只有两个 Schubert 类：

- $\sigma(1) = 1$ （单位类）；
- $\sigma(s_1) = [\text{点}]$ （超平面类，记作  $H$ ）。

等变量子上同调  $QH_T^*(\mathbb{P}^1)$  的乘法为：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1).^{19}$$

**几何意义：** $\mathbb{P}^1$  上两点决定的直线与自身的交点数为 1，但需要量子修正因子  $q$ （计数亏格 0 曲线）。<sup>20</sup>

### 例 2: $Gr(2, 4)$ 情形。<sup>21</sup>

设  $X = Gr(2, 4)$ （2 维平面构成的 Grassmannian）。此时  $W = S_4$  的最短代表元有 6 个，对应 6 个 Schubert 类。

考虑  $u = s_1$ ,  $v = s_3$ 。在等变量子上同调中：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3) = \sigma(s_1 s_3) + (x_2 - x_3)q\sigma(1).$$

**正性验证：**这里  $x_2 - x_3$  是非负系数多项式（系数为 1），体现了 Mihalcea positivity 的核心结论。这正是我们在定理 4.3 中要证明的性质——Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数是关于负根  $x_i$  的非负整数系数多项式。

其中：

- $\sigma(s_1 s_3)$  是普通项（对应  $d = 0$ ）；
- $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$  是量子修正项，其中  $x_2 - x_3$  是非负系数多项式（体现正性!）， $q$  记录曲线的同调类。

### 例 3: 退化情形。

检验正性：

- 当  $d = 0$  时， $c_{u,v}^{w,0}$  退化为 Graham 情形——非负系数多项式；
- 当  $x_i = 0$  时， $c_{u,v}^{w,d}$  退化为普通量子系数——非负整数。

这验证了定义 4.8 中的退化关系。

<sup>18</sup>问：请详细解释  $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$  的例子，逐变量映射到一般公式，并验证其性质。请见附录 section 74。

<sup>19</sup>问：为什么在量子乘积公式  $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1)$  中， $w = s_1$  不可能出现，而只能是  $w = 1$ ？见附录 section 89。

<sup>20</sup>问：为什么  $c_{s_1, s_1}^{1,1} = 1$ ？这个量子修正系数背后的数学机制是什么？见附录 section 76。

<sup>21</sup>问：请详细解释 Mihalcea 论文中关于  $Gr(2, 4)$  的例子（chapter4.tex 第 143-156 行），用最简单的语言说明：1.  $Gr(2, 4)$  是什么？为什么叫 Grassmannian？2.  $W = S_4$  是什么？最短代表元是什么意思？为什么有 6 个？3.  $u = s_1, v = s_3$  是什么？ $\sigma$  是什么？4. 乘积  $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$  是什么意思？5. 右边两项  $\sigma(s_1 s_3)$  和  $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$  各自代表什么几何意义？6. 为什么要验证  $x_2 - x_3$  是“非负系数”？这为什么重要？7. 量子修正项  $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$  中的  $q$  是什么？ $q$  记录曲线的同调类是什么意思？请见附录 section 67。

#### 4. 主要定理

现在我们可以陈述 Mihalcea 的核心结果。这个定理回答了我们在引言中提出的问题。

定理 4.3 (等变量子上同调 Positivity [29, Theorem 1]). 设  $u, v, w \in W^P$  且  $d$  为多重次数。则等变量子 *Littlewood-Richardson* 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  是关于负根  $x_1, \dots, x_r$  的非负整数系数多项式。

这个定理的证明策略本身就是一段精彩的故事——Mihalcea 发现, 可以将量子情形的计算归约到已经解决的 Graham 情形。我们将在下一节详细讨论这个证明思路。

**4.1. 正性概念的演进.** 为了理解这个定理的意义, 让我们比较一下不同层次的正性:

| 情形              | 退化为                                 | 正性      |
|-----------------|-------------------------------------|---------|
| 经典上调            | $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$          | 非负整数    |
| 等变量子上同调         | $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i]$     | 非负系数多项式 |
| 等变量子上同调 (带量子修正) | $c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i]$ | 非负系数多项式 |

**核心洞察:** 从经典到量子, 正性性质一直保持——量子变量  $q$  的引入并不破坏正性。这与量子化往往引入负号或其他复杂行为的直觉相反。更重要的是, 每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形 (取特定的退化参数):

$$c_{u,v}^w \in \mathbb{N} \implies c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i] \implies c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合, 而是反映了 Schubert calculus 深层的不变结构。

4.1.1. 三种正性定理的正式陈述与符号溯源. 为了清晰理解三者关系, 我们逐一给出完整的乘法公式。<sup>22</sup>

##### 定理一: 经典 Schubert Positivity (几何相交版本)

定理 4.4 (Schubert Positivity — 几何版本). 在普通上调  $H^*(G/P)$  中, *Schubert* 胞腔类满足乘法

$$(61) \quad \sigma(u) \cdot \sigma(v) = \sum_{w \in W^P} c_{u,v}^w \sigma(w),$$

其中结构常数  $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$  是非负整数, 等于三个 *Schubert* 簇  $X(u), X(v), X(w^\perp)$  在旗流形中的一般位置相交点数。

##### 定理二: Graham Positivity (等变上调版本)

定理 4.5 (Graham Positivity — 等变上调版本 [14, Theorem 3.2]). 在等变上调  $H_T^*(G/P)$  中, *Schubert* 类满足乘法

$$(62) \quad \sigma^T(u) \cdot \sigma^T(v) = \sum_{w \in W^P} c_{u,v}^w(\mathbf{x}) \sigma^T(w),$$

其中结构常数  $c_{u,v}^w(\mathbf{x}) \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  是关于 *torus* 权  $x_i$  (即负根  $-\alpha_i$ ) 的非负整数系数多项式。<sup>23</sup>

##### 定理三: Mihalcea Positivity (等变量子量子版本)

<sup>22</sup>问: 经典 Schubert 乘法、Graham 正性、Mihalcea 正性三者公式形式上有什么共同点和区别? 分别写出它们的完整乘法公式。见 §4。

<sup>23</sup>问: Graham 正性中的  $c_{u,v}^w(\mathbf{x})$  和第一章 Graham 公式中的  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[t_i - y_j]$  有什么关系? 见 §4 的比较表。

定理 4.6 (Mihalcea Positivity — 等变量量子量子 cohomology 版本 [29, Theorem 1]). 在等变量量子量子上同调  $QH_T^*(G/P)$  中, Schubert 类满足乘法

$$(63) \quad \sigma^T(u) \star \sigma^T(v) = \sum_{w,d} q^d c_{u,v}^{w,d}(\mathbf{x}) \sigma^T(w),$$

其中  $d \in \mathbb{N}^r$  是多重次数 (degree),  $q^d$  是形式量子变量, 结构常数  $c_{u,v}^{w,d}(\mathbf{x}) \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  是非负整数系数的多项式。

三者退化关系与符号对应：<sup>24</sup>

| 正性定理                           | 上同调层次                 | 结构常数                                                          | 变量环                                   |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Schubert (定理一)                 | 普通 $H^*(G/P)$         | $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$                                    | 无参数                                   |
| Graham (定理二)                   | 等变 $H_T^*(G/P)$       | $c_{u,v}^w(\mathbf{x}) \in \mathbb{Z}[x_i]$                   | $x_i$ : torus 权 / 负根                  |
| Mihalcea (定理三)                 | 量子 $QH_T^*(G/P)$      | $c_{u,v}^{w,d}(\mathbf{x}) \in \mathbb{Z}[x_i]$               | $x_i$ 同上, $q^d$ : 量子修正                |
| 双重 Graham (二重 $\mathbf{S}_w$ ) | 等变 $H_T^*(G/P)$ (双变量) | $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{Z}[t_i - y_j]$ | $\mathbf{y}, \mathbf{t}$ : 两组 torus 权 |

关键符号对应关系：

- $x_i$  (ch4)  $= -\alpha_i$  (torus 权 = 负根), 对应第一章中的  $t_i - y_j$  当  $y_j$  取特定值时
- (62) 中的  $c_{u,v}^w(\mathbf{x})$  与 定理 1.1 中的  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是同一常数在不同变量系下的表示
- (61) 是 (62) 在  $x_i \rightarrow 0$  (忘掉 torus 作用) 的退化
- (63) 是 (62) 加入量子修正  $q^d$  的推广
- 双重 Graham (定理 1.1) 是两变量情形  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ :  $\mathbf{y}$  记录左作用位移,  $\mathbf{t}$  记录右作用位移,  $\mathbf{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathbf{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \mathbf{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$

这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合, 而是反映了 Schubert calculus 深层的不变结构——无论从几何相交 (古典)、等变上同调 (Graham)、还是量子上同调 (Mihalcea) 切入, 本质都是 Schubert 胞腔相交计数的非负性。

## 5. 证明思路：归约到 Graham 定理

Mihalcea 的证明思路巧妙而简洁。核心思想是：将 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数的计算归约到已在 Graham 定理中解决的问题。

**论文的核心——§6 证明结构** ([29, §6, 第 8-11 页]): Mihalcea 的论文 §6 (第 8-11 页) 包含了 positivity 定理的完整证明。整个证明的灵魂是**归约思想**：将 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数计算归约到已知的 Graham positivity。

证明分为两部分：

### (1) §6.1 准备工作——两个核心要素：

- 在  $X \times X$  上定义半直积  $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$  的作用
- 通过投影公式, 将  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  上的曲线计数问题归约到  $X \times X$

### (2) §6.2 定理证明——三层逻辑链：

- **Lemma 6.4** (引理 4.3, [29, Lemma 6.4]):  $ev_3^{-1}(Y(w))$  的不可约分支
- **Corollary 6.2** (推论 4.2, [29, Corollary 6.2]):  $X \times X$  上的 Graham Positivity

<sup>24</sup>问:  $x_i$ 、 $y_j$ 、 $t_k$  三种符号体系分别出现在哪些公式中? 它们之间的对应关系是什么? 见 §4 的比较表。

- **Lemma 6.3** (引理 4.4, [29, Lemma 6.3]): Kleiman transversality:  $F : Z \rightarrow X \times X$  是  $G$ -等变映射, 则  $F^{-1}(X(u) \times Y(v))$  是 reduced、locally irreducible, 余维数为  $c(u) + l(v)$

**证明的关键步骤:** 先用引理 4.3 将  $ev_3^{-1}(Y(w))$  分解为不可约分支  $V_i$ , 再用引理 4.4 (Kleiman transversality) 处理每个  $V_i$  通过  $F = (ev_1, ev_3)$  在  $X \times X$  上的像, 最后由推论 4.2 (Graham Positivity) 保证每个  $[F(V_i)]_T$  都是非负组合。投影公式则将这些结果“推送”回  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  上的 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数。

**Lemma 6.3 的正式陈述** ([11, Lemma 7.2], 见引理 4.4): 设  $Z$  是不可约  $G$ -簇,  $F : Z \rightarrow X \times X$  是  $G$ -等变映射 ( $G$  在  $X \times X$  上对角作用)。则对任意  $u, v \in W^P$ ,  $F^{-1}(X(u) \times Y(v))$  是 reduced、locally irreducible 的, 其余维数为  $c(u) + l(v)$ 。

整个证明的灵魂是 **归约思想**: 通过投影公式, 将  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ <sup>25</sup> 上的曲线计数问题归约到  $X \times X$  上的已知正性。<sup>26</sup>

**5.1. 为什么可以归约?** 在证明之前, 让我们理解这个策略的直觉。Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数涉及稳定映射模空间  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ ——它参数化了满足特定条件的稳定映射  $f : \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ <sup>27</sup>。

但 Mihalcea 的关键洞察是: **通过投影公式, 复杂的上同调表达式可以“推送”到  $X \times X$  上, 而 Graham positivity 已经告诉我们答案。**

这个策略类似于我们在微积分中处理复杂积分时使用的变量替换——将一个难以处理的问题转化到我们已经理解的框架中。

这一归约策略与 chapter 1 中 Gao-Xiong 证明三重 Schubert positivity 的思路有本质联系——两者都使用了**投影公式** (projection formula) 将复杂的几何对象分解为已知的组成部分 [12, Section 3]。

**5.2. 核心工具: 投影公式与推送公式.** 在深入证明之前, 我们需要了解两个关键的代数几何工具。

**5.2.1. 投影公式 (Projection Formula).** 设  $f : X_1 \rightarrow X_2$  为  $T$ -等变映射。对于  $a \in H_T^*(X_2)$ 、 $b \in H_T^*(X_1)$ , 有:

$$(64) \quad f_*^T ((f^T)^*(a) \cdot b) = a \cdot f_*^T(b).$$

**直观理解:** 想象你有两个房间  $X_1$  和  $X_2$ , 中间有一扇门 (映射  $f$ )。现在你站在  $X_2$  里有一张纸条  $a$ , 在  $X_1$  里有一张组合纸条  $b$ 。如果你想把  $X_1$  里所有东西都搬到  $X_2$ , 那么纸条  $b$  上那些“来自  $X_2$  的部分” (即  $(f^T)^*(a)$ ) 会在搬运过程中保持不变, 只需要对  $b$  的其余部分做推送。这个公式就是说: **来自目标空间的类  $a$  在推送过程中可以“穿过”整个运算, 单独留在外面。**

**为什么这很有用?** 在量子上同调的证明中, 我们需要计算

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T ((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T).$$

这里  $\sigma(u)^T$  和  $\sigma(v)^T$  是来自旗流形  $X$  的类, 而  $ev_1, ev_2$  是从模空间  $\overline{\mathcal{M}}$  到  $X$  的映射。通过投影公式, 我们可以把来自  $X$  的因子“提取”出来, 只对复杂的模空间部分做推送——这就是从  $\overline{\mathcal{M}}$  转移到  $X \times X$  的关键。

<sup>25</sup>问:  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  是什么? 每个符号的含义是什么? 为什么要有紧化? 什么是评估映射  $ev_i$ ? 能举一个  $\text{Gr}(2, 4)$  的具体例子吗? 见附录 section 68。

<sup>26</sup>等变量子上同调 positivity 定理的完整证明见附录 section 9。

<sup>27</sup>问: 在量子上同调的定义中, 出现稳定映射  $f : \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ , 这里的  $X$  是什么?  $\mathbb{P}^1$  又是什么? 见附录 section 58。



**生活中的类比：**想象你在整理行李。你有一个大箱子  $X_1$  (模空间  $\overline{\mathcal{M}}$ )，要把它所有东西都转移到小箱子  $X_2$  (积空间  $X \times X$ )。你知道有些东西 (a) 本来就是从  $X_2$  带来的，所以它们在转移后还是一样。而那些真正属于  $X_1$  的东西 (b) 则需要被“压缩”或“重新打包”。投影公式就是描述这个打包规则的数学语言。

投影公式在 chapter 1 的证明中也扮演了核心角色——它建立了从几何相交到上同调类的桥梁 [1, Lemma 2.5]。

5.2.2. 推送公式 (*Push-Forward Formula*). 对于纤维积图 (fiber product diagram), 有:

$$(65) \quad f_*([V]) = \sum_i m_i a_i [f(V_i)],$$

其中  $V_i$  是原像的不可约分支 (irreducible component),  $m_i$  是对应的次数。

这个公式允许我们将一个复杂子簇的推送分解为其各个不可约分支的推送的线性组合。

**5.3. 第一步：在  $X \times X$  上工作.** 考虑积空间  $X \times X$ , 带有半直积  $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$  的作用:

$$t \cdot (u_1, u_2)(\bar{g}_1, \bar{g}_2) = (tu_1\bar{g}_1, tu_2\bar{g}_2).$$

选择这个特定的 torus 作用是精心设计的——它让我们能够利用  $X \times X$  上的特殊几何性质。

**关键引理** ([29, Corollary 6.2]):

引理 4.1 (Graham Positivity on  $X \times X$ ). 设  $V \subset X \times X$  为  $T$ -稳定子簇 ( $T$ -stable subvariety). 则在  $H_T^*(X \times X)$  中,

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中每个  $f_i \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  是非负系数多项式。

这意味着任何  $T$ -稳定子簇在上同调中都可以写成  $Y(u) \times Y(v)$  型的类的非负线性组合。这是 Graham 定理在乘积空间上的自然应用。

**5.4. 第二步：使用 Projection Formula.** 设  $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  为稳定映射的模空间 (stable map moduli space),  $ev_i: \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X$  为评估映射 (evaluation map)。<sup>2829</sup>

**Equivariant Quantum Littlewood-Richardson** 系数定义为:

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T ((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T).$$

考虑映射  $F = (ev_1, ev_2)$ , 以及映射  $\overline{\mathcal{M}} \rightarrow X \times X$ , 它将模空间投影到前两标记点的积空间上。

利用投影与推送公式, Mihalcea 将表达式转化为:

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T).^{30}$$

其中  $V_i$  是  $ev_3^{-1}(Y(w))$  的不可约分支 (irreducible component), 由 [29, Lemma 6.4] 给出。

**这一步的关键：**我们成功地将问题从  $\overline{\mathcal{M}}$  转移到了  $X \times X$ 。

<sup>28</sup>问：请详细解释  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  的定义。见附录 section 90。

<sup>29</sup>问：请详细解释稳定映射中“幽灵分支” (ghost component) 的概念，以及稳定性条件的动机。见附录 section 91。

<sup>30</sup>问：笔记中 Mihalcea 证明的符号 (半直积  $B'$ 、投影公式中的  $F(V_i)$  等) 与原文是否一致？见附录 section 92。

**5.5. 第三步：应用 Graham 定理.** 对每个  $F(V_i)$ ，由 Lemma 引理 4.1，我们可以写

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T.$$

代入并再次使用投影公式，得到

$$(\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T) = \delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j},$$

其中  $\delta$  为 Kronecker  $\delta$ 。

**结论：**整个表达式是关于  $x_i$  的非负整数线性组合，因为每一步都只涉及：

- 非负整数  $a_i$  (映射次数)；
- 非负多项式  $f_j^i$  (来自 Graham positivity)；
- Kronecker  $\delta$  (非负整数)。

因此  $c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  是非负系数多项式，这正是 定理 4.3 所要证明的。

**5.6. 证明的整体结构.** 注：本节的归约策略的完整证明详见第 9 节附录 (??)，其中包含每一步的详细推导。<sup>31</sup>

让我们用流程图总结整个归约过程：

$$\begin{array}{c}
 c_{u,v}^{w,d} \\
 \downarrow \pi_*^T \\
 \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \\
 \downarrow F_*^T \\
 F = (ev_1, ev_2) \\
 \downarrow \\
 X \times X \\
 \downarrow \text{Graham} \\
 \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T
 \end{array}$$

**关键洞察：**量子上同调 (quantum cohomology) 中的曲线计数问题可以通过投影公式归约为  $X \times X$  上的经典问题。这与 chapter 1 中三重 Schubert positivity 的证明策略形成了呼应——两者都使用了投影公式作为核心工具，将复杂几何对象分解为已知的 Schubert 基底的组合。

## 6. 与三重 Schubert Positivity 的联系

在 chapter 1 中，我们遇到了 Refined Graham Positivity——Gao-Xiong 证明了三重变量  $(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t})$  下的展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是关于  $t_i - y_j$  的非负多项式 (定理 1.3)。Mihalcea 的结果与此有着深刻的联系。

<sup>31</sup>问：Section 5 中的归约策略每一步具体是如何推导的？见附录 ??。

**三重 Schubert Positivity** (triple Schubert positivity) 涉及的是点的相交 (point intersection), 而等变量子上同调涉及的是曲线的计数 (curve counting)<sup>32</sup>。

**6.1. 为什么这两个正性定理是相关的?** 粗略一看, 三重 Schubert calculus 和等变量子上同调似乎是不同的领域: 前者涉及多组变量, 后者涉及量子修正。但它们都关注 Schubert 结构系数的正性, 而且都涉及旗流形的几何。

当我们仔细审视时会发现: **两者都反映了旗流形中 Schubert 簇相交理论的基本非负性**。在三重情形, 这种非负性来自点的相交; 在量子情形, 它来自曲线的计数。数学工具不同, 但几何本质相同。

**6.2. 旗流形情形的联系.** 当  $X = Fl_n = GL_n/B$  时, 等变量子上同调的 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  与三重 Schubert calculus 中的正性有如下关系:

取特殊情形  $d = 0$  (无量子修正),  $c_{u,v}^{w,0}$  正好是经典等变上同调 (equivariant cohomology) 的系数——即 Graham 的结果 (定理 1.1)。此时, Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数的正性退化为 Graham positivity。

当考虑量子修正  $d \neq 0$  时, 新的正性结果补充了 chapter 1 的框架。几何上, 这是因为量子上同调涉及曲线的计数, 而三重情形只涉及点。**关键区别**在于: 三重 Schubert positivity 涉及的是点的相交 (point intersection), 而等变量子上同调涉及的是曲线的计数 (curve counting)。

**6.3. 另一种 torus 作用:  $T'$ -等变版本.** Mihalcea 论文的第 7 节还讨论了另一种 torus 作用下的正性—— $T' = (\mathbb{C}^\times)^m$  作用在旗簇上。这种情形与 chapter 1 中的三重变量理论更加接近。

**6.3.1.  $T'$  的构造.** 设  $X = PGL(m)/P$  是部分旗流形。 $T' = (\mathbb{C}^\times)^m$  通过以下方式作用在  $X$  上:

对  $t' \in T'$  和  $x \in X$ ,

$$t' \cdot x = \varphi(t')x,$$

其中  $\varphi: (\mathbb{C}^\times)^m \rightarrow (\mathbb{C}^\times)^m / \mathbb{C}^\times \cong T$  是商态射。

**注意:**  $T$  是  $PGL(m)$  的极大环面, 而  $T'$  是更大的 torus。两者的关系是  $T = T' / \mathbb{C}^\times$ <sup>33</sup>。

**6.3.2.  $T'$ -等变上同调的坐标.** 在  $T'$ -等变上同调中,  $H_{T'}^*(pt) = \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_m]$ , 其中每个  $T_j$  是某个  $\mathbb{P}^n$  上  $\mathcal{O}(1)$  丛的第一陈类。

**6.3.3. 从  $T$  到  $T'$  的变量变换.** 关键事实是:  $T$ -等变量子上同调中的负单根  $x_j$  (对应字符  $z_{j+1}/z_j$ ) 在  $T'$ -等变版本中变为  $T_j - T_{j+1}$ 。

**推论 4.1** ( $T'$ -等变量子上同调 Positivity [29, Corollary 7.1]). 在  $T'$ -等变量子上同调中, Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数是关于变量  $T_1 - T_2, \dots, T_{m-1} - T_m$  的非负系数多项式。

**与三重 positivity 的联系:** 这与 Graham 在 [22] 中研究的 Grassmannian 情形一致。这里, 正性涉及的是差值  $T_i - T_j$ , 这与三重 positivity 中的  $t_i - y_j$  结构惊人地相似——两者都涉及同类变量之间的差值。

**几何直觉:**  $T_j - T_{j+1}$  测量的是旗流形上相邻坐标的相对位置。这种相对坐标的选择是自然的, 因为绝对值在物理上不可观测测量 (只有相对差值才有意义)。

<sup>32</sup>问: 三重 Schubert positivity 涉及点的相交, 而等变量子上同调涉及曲线的计数。这里“曲线的计数”是一个什么概念? 见附录 section 102。

<sup>33</sup>问: 为什么  $PGL(m)$  的极大环面是  $(\mathbb{C}^\times)^{m-1}$ ? 这与  $T = T' / \mathbb{C}^\times$  有什么关系? 见附录 section 95。

## 7. 几何意义

我们已经看到了 Theorem 定理 4.3 的代数陈述。但从几何角度理解，这个定理告诉我们什么？

**7.1. Gromov-Witten 不变量的正性.** Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  是 (3 点, 带基点, 亏格 0) Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant) <sup>34</sup>:

$$c_{u,v}^{w,d} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \tilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}.$$

它计数的是满足以下条件的稳定映射 (stable map)  $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$  的个数 [10, Example 1.2.1]:

- $f$  的像代表同调类  $d \in H_2(X, \mathbb{Z})$ ;
- $f(p_1) \in g_1 X(u), f(p_2) \in g_2 X(v), f(p_3) \in g_3 Y(w)$  (其中  $g_i \in G$  是一般位置, general position) <sup>35</sup>。

其中  $p_1, p_2, p_3$  是  $\mathbb{P}^1$  上的三个标记点 (marked points)。

从纯粹的几何角度，这些计数自然是非负的——计数“有多少条曲线通过指定位置”这个问题，答案显然不能是负数。

而 Theorem 定理 4.3 进一步指出：**即使加入了等变修正（这会产生关于  $x_i$  的多项式因子），整体系数仍然保持非负。**

**为什么这不显然？** 在等变上同调 (equivariant cohomology) 中，类不再是子簇的直接上同调类，而是提升到  $X \times_T ET$  (即  $X$  关于 torus 作用的上同伦商空间/homotopy quotient) 上的类。在这种更抽象的设置中，上同调类的相交理论变得复杂——我们不再能简单地说“两条子簇相交于几个点”，因为相交的结果可能是一个上同调类，而不是一个数字。在这种更抽象的设置中，非负性不再能从几何相交直接读出。Mihalcea 的证明揭示了隐藏的统一结构。

**7.2. 与其他正性结果的比较.** 在 Schubert calculus 的研究中，有多种不同层次的正性 [23, 10]。它们之间存在包含关系：

- (1) **经典 LR 系数** (classical LR coefficient):  $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$ , 计数交点个数——最直接的正性;
- (2) **Graham positivity**:  $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i]$ , 等变修正的多项式系数非负——经典情形的等变推广;
- (3) **三重 positivity** (chapter 1):  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$ , 多组变量情形;
- (4) **Mihalcea positivity** (本章):  $c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i]$ , 量子版本同样正。

这些正性之间存在蕴含关系：

$$c_{u,v}^w \in \mathbb{N} \implies c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i] \implies c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形 (取特定的退化参数)。这种“稳定性”不是显然的——它反映了 Schubert calculus 核心结构的深层不变性。

<sup>34</sup>定义见 [29, Definition 1.2] (亦见 定义 6.2)。问：什么是 Gromov-Witten 不变量？它计数的是什么？见附录 section 56。

<sup>35</sup>问：在稳定映射的 Gromov-Witten 不变量定义中，“一般位置” (general position) 是什么意思？为什么需要这个条件？见附录 section 96。

## 8. 本章小结

本章我们跟随 Mihalcea 的工作, 探索了等变量子上同调中的正性问题。让我们回顾一下这段旅程的脉络:

**问题的起源:** 从经典 Schubert calculus 到等变上同调 (equivariant cohomology), Graham 证明了 Peterson 猜想——等变系数仍然满足正性。一个自然的问题是: 这个性质能否推广到量子上同调?

**核心突破** (Mihalcea, 2007): 答案是肯定的。等变量子上同调的结构常数  $c_{u,v}^{w,d}$  仍然是关于负根  $x_i$  的非负整数系数多项式。

关键点如下:

- (1) **Peterson 猜想的历史:** 由 Peterson 提出 (1997), 由 Graham 证明 (2001), Mihalcea 将其推广到量子情形 (2007) ——这是一段跨越十年的数学探索;
- (2) **等变量子上同调**  $QH_T^*(X)$  是等变上同调 (equivariant cohomology) 和量子上同调 (quantum cohomology) 的共同推广, 同时包含了这两者的结构;
- (3) **主定理** (Theorem 定理 4.3): Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  是关于负根  $x_i$  的非负整数系数多项式;
- (4) **证明策略:** 通过 projection formula 将 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数的计算归约到  $X \times X$  上的问题, 然后应用 Graham positivity——这是一种精巧的归约思想;
- (5) **与 chapter 1 的联系:** 三重 positivity 涉及点的相交, 而量子上同调涉及曲线的计数, 两者都满足正性——不同的数学工具, 相同的深层结构;
- (6) **几何意义:** 正性反映了 Gromov-Witten 不变量的内在非负性——即使在等变量子上同调的抽象设置中, 几何直觉仍然成立。

这一结果与 Chapter 1 的 Gao-Xiong 三重 positivity 工作以及 Chapter 3 的量子 Schubert 多项式理论共同构成了现代 Schubert calculus 的核心框架。

在下一章中, 我们将继续探索 Schubert calculus 的其他方面, 包括量子版本的更多应用。

## 9. 附录: Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数正性证明详解

**9.1. 背景 (Background).** 本节给出 Theorem 定理 4.3 的详细证明思路。该定理由 Mihalcea 在 2007 年证明, 是量子 Schubert calculus 的里程碑结果。

证明的核心思想是将 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数的计算归约到 Graham 的经典 positivity 定理 (Theorem 定理 4.1)。

### 9.2. 参数定义 (Parameter Definitions).

- $X = G/P$ : 齐次空间 (homogeneous space)
- $B = T \cdot U$ : Borel 子群 (Borel subgroup), 其中  $U$  为幂么根基 (unipotent radical)
- $B^- = w_0 B w_0$ : 相反 Borel 子群 (opposite Borel subgroup)
- $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ : 半直积 (semidirect product)
- $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ : 稳定映射模空间 (stable map moduli space)
- $ev_i: \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X$ : 评估映射 (evaluation map)
- $F = (ev_1, ev_2): \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X \times X$
- $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$

<sup>36</sup>问: 在 Borel 子群分解  $B = T \cdot U$  中,  $U$  称为“幂么根基”, 这是什么意思? 见附录 section 41。

### 9.3. 已知条件 (Given).

推论 4.2 (Graham Positivity on  $X \times X$  [29, Corollary 6.2]). 设  $V \subset X \times X$  为  $T$ -稳定子簇, 则在  $H_T^*(X \times X)$  中

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中  $f_i \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  是非负系数多项式。

引理 4.2 (Lemma 6.1 —映射  $F$  的构造 [29, Lemma 6.1]). 设  $X = G/P$  是旗流形,  $T$  是最大环面。定义映射

$$F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}}_3(X, d) \rightarrow X \times X,$$

这是  $T$ -等变且适当的 (*proper*) 映射。对于每个  $w \in W^P$ ,  $F^{-1}(X(u) \times Y(v))$  是  $T$ -稳定的。

引理 4.3 (Lemma 6.4 — $ev_3^{-1}(Y(w))$  的不可约分支 [29, Lemma 6.4]). 设  $v \in W^P$ , 则  $ev_3^{-1}(Y(v))$  是  $T$ -stable、*reduced*、不可约分支 (*irreducible component*) 的不交并, 每个分支的余维数为  $l(v)$ 。

引理 4.4 (Lemma 6.3 —Kleiman Transversality [29, Lemma 6.3]). 设  $Z$  是不可约  $G$ -簇,  $F : Z \rightarrow X \times X$  是  $G$ -等变映射 ( $G$  在  $X \times X$  上对角作用), 则对任意  $u, v \in W^P$ ,  $F^{-1}(X(u) \times Y(v))$  是 *reduced*、*locally irreducible* 的, 其余维数为  $c(u) + l(v)$ 。

**Projection Formula** ([29, (1)]): 对于  $T$ -等变映射  $f : X_1 \rightarrow X_2$ ,

$$f_*^T ((f^T)^*(a) \cdot b) = a \cdot f_*^T(b).$$

**Lemma 2.3 —等变 Poincaré 对偶** ([29, Lemma 2.3]): 对于任意  $u, v \in W^P$ , 有

$$\langle \sigma(u)^T, \sigma(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v},$$

其中  $\langle \cdot, \cdot \rangle_T$  是  $H_T^*(X)$  上的等变 Poincaré pairing<sup>37</sup>

**Push-Forward Formula** ([29, (2)]): 对于纤维积图 (fiber product diagram),

$$f_*([V]) = \sum_i m_i a_i [f(V_i)],$$

其中  $V_i$  是原像的不可约分支 (*irreducible component*)。

**等变 Poincaré 对偶** ([29, Proposition 3.1]):

$$\langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v}.$$

这里  $\tilde{\sigma}(v)^T$  表示 equivariant quantum Schubert class (等变 Poincaré 对偶意义下的对偶类)  
38

### 9.4. 目标 (Goal). 证明 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T ((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T)$$

是关于  $x_i$  的非负系数多项式。

<sup>37</sup>问: 等变 Poincaré pairing  $\langle \cdot, \cdot \rangle_T$  的具体定义是什么? 它与普通 Poincaré pairing 有什么关系? 为什么 Schubert 类的配对是 Kronecker delta? 见附录 section 99。

<sup>38</sup>问:  $\langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v)^T \rangle_T$  中的  $\tilde{\sigma}(v)^T$  是什么? 它与普通的  $\sigma(v)^T$  有何区别? 见附录 section 100。

**9.5. 详细推导步骤 (Derivation Steps) —— 对应论文 §6. 步骤 1: 引入映射  $F$  (对应引理 4.2, [29, Lemma 6.1])。**

定义  $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X \times X$ , 这是  $T$ -等变且适当的 (proper) 映射。

由引理 4.3 ([29, Lemma 6.4]),  $ev_3^{-1}(Y(w))$  是  $T$ -稳定、约化、不可约分支 (irreducible component) 的不交并, 每个分支余维数为  $l(w)$ 。

利用  $ev_1^* \sigma(u)^T \cdot ev_2^* \sigma(v)^T = (F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T$ , 可将表达式重写为

$$c_{u,v}^{w,d} = (\pi_{X \times X})_*^T F_*^T ((F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T).$$

**步骤 2: 应用 Projection Formula (对应 [29, Eq. (1)])。**

由 projection formula,

$$F_*^T ((F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T) = [X(u) \times X(v)]_T \cdot F_*^T ((ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T).$$

**步骤 3: 处理  $ev_3$  的原像。**

由引理 4.3 ([29, Lemma 6.4]),  $ev_3^{-1}(Y(w))$  是  $T$ -稳定、约化、不可约分支  $V_i$  的不交并, 每个分支余维数为  $l(w)$ 。

应用 push-forward formula (对应 [29, Eq. (2)]):

$$F_*^T ((ev_3^T)^*[Y(w)]_T) = \sum_i a_i [F(V_i)]_T,$$

其中  $a_i$  是映射  $F|_{V_i} : V_i \rightarrow F(V_i)$  的次数 (degree)<sup>39</sup>。

因此,

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T).$$

**步骤 4: 应用 Graham Positivity。**

对每个  $[F(V_i)]_T$ , 由 Graham 定理 ([29, Corollary 6.2]),

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T,$$

其中  $f_j^i \in \Lambda$  是非负系数多项式。

代入并使用 projection formula:

$$\begin{aligned} & (\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T) \\ &= (\pi_{X \times X})_*^T ((pr_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (pr_2^T)^* \sigma(v)^T) \\ & \quad \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T \\ &= \langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v_j)^T \rangle_T \cdot \delta_{v,v_j} \\ &= \delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j}. \end{aligned}$$

其中第二个等式来自 section 9.3 ([29, Lemma 2.3]), 第三个等式来自等变 Poincaré 对偶 (equivariant Poincaré duality)。

**步骤 5: 得到最终表达式。**

综合步骤 3 和 4,

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i \sum_j f_j^i \cdot \delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j}.$$

由于所有  $a_i \in \mathbb{N}$  (次数), 所有  $f_j^i \in \Lambda$  是非负多项式, 我们得出结论:  $c_{u,v}^{w,d}$  是关于  $x_1, \dots, x_r$  的非负整数系数多项式。

<sup>39</sup>问: 映射的次数 (degree) 是如何定义的? 见附录 section 98。

这完成了 Theorem 定理 4.3 的证明。

**9.6. 关键洞察 (Key Insight).** 整个证明的核心洞察是：量子上同调 (quantum cohomology) 中的曲线计数问题可以通过 projection formula (投影公式) 归约为  $X \times X$  上的经典问题。

为什么这个归约是可能的？因为  $c_{u,v}^{w,d}$  的定义涉及三个评估映射 (evaluation maps)  $ev_1, ev_2, ev_3$ 。通过适当组合前两个映射  $F = (ev_1, ev_2)$ ，我们将问题从  $\overline{\mathcal{M}}$  推送到  $X \times X$ 。在  $X \times X$  上，Graham positivity 已经告诉我们任何  $T$ -稳定子簇的类都可以写成非负多项式系数的线性组合。

**这个证明的深层意义**在于：它表明即使在量子上同调中引入了新的复杂度 (stable map moduli space, 稳定映射模空间；curve counting, 曲线计数)，最终的正性结果仍然来自于经典几何中的简单事实。这种“复杂性中的简单性”是数学之美的体现。



## CHAPTER 5

# Quantum Double Schubert Polynomials Positivity Conjecture

### 1. From Classical to Quantum: Why Extend?

In chapter 4 (see [29]), Mihalcea proved the positivity of structure constants for two Schubert classes in equivariant quantum cohomology:

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

where the coefficients  $c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  are polynomials with nonnegative coefficients.

The natural next question: **Can we establish a similar positivity result for double Schubert polynomials in the quantum setting?**

### 2. The Quantum Double Schubert Positivity Conjecture

注 5.1 (Naming Clarification). The “Quantum Double Schubert Positivity Conjecture” is precisely the **Graham Positivity of Triple Quantum Schubert Calculus** as studied by Gao-Xiong in [12]. Here “double” refers to the fact that each factor  $\mathfrak{S}_u^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  is a double Schubert polynomial — a Schubert polynomial in two sets of variables  $(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ , where:

- $\mathbf{x}$  parametrizes the base flag manifold,
- $\mathbf{y}$  parametrizes the equivariant displacement (or the second set of Schubert conditions).

When multiplying two such polynomials  $\mathfrak{S}_u^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{z})$ , we obtain coefficients  $c_{u,v}^{w,(q)}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; q)$  that are polynomials in the differences  $y_i - z_j$  (the relative displacements between the two Schubert conditions) and the quantum parameters  $q_k$ .

The word “Triple” refers to the three Schubert polynomials appearing in the product formula:

$$\underbrace{\mathfrak{S}_u^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{y})}_{1\text{st}} \cdot \underbrace{\mathfrak{S}_v^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{z})}_{2\text{nd}} = \sum_w \underbrace{c_{u,v}^{w,(q)}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; q)}_{\text{coefficients}} \cdot \underbrace{\mathfrak{S}_w^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{y})}_{3\text{rd}}.$$

Thus three polynomials are involved: two on the left-hand side (with parameters  $\mathbf{y}$  and  $\mathbf{z}$  respectively) and one on the right-hand side (with parameter  $\mathbf{y}$ ). The Graham positivity phenomenon states that the coefficients  $c_{u,v}^{w,(q)}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; q)$  lie in  $\mathbb{N}[y_i - z_j, q_k]$ .

猜想 5.1 (Quantum Double Schubert Positivity). For  $u, v, w \in S_\infty$ , the product of quantum double Schubert polynomials expands as:

$$\mathfrak{S}_u^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^{w,(q)}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; q) \cdot \mathfrak{S}_w^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

The coefficients satisfy:

$$c_{u,v}^{w,(q)}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; q) \in \mathbb{N}[y_i - z_j, q_k]_{i,j \geq 1, k \geq 1}$$

namely, the coefficients are polynomials in  $y_i - z_j$  and  $q_k$  with nonnegative integer coefficients.

**Relationship with proved cases:**

- (1) **Double classical case** (Graham, 2001): For  $q = 0$ , the coefficients  $c_{u,v}^w(y; z)$  are nonnegative polynomials in  $t_i - y_j$ .
- (2) **Equivariant quantum case** ([29]): For two Schubert classes,  $c_{u,v}^{w,d}$  are nonnegative polynomials in  $x_i$ .
- (3) **Quantum double case** (this conjecture): The unified setting with both  $y_i - z_j$  parameters and quantum corrections  $q_k$  remains open.

The two key conjectures in this framework are:

定理 5.1 (Classical Double Schubert Positivity (Gao-Xiong, 2025) [12, Theorem 1.1]). For  $u, v, w \in S_\infty$ , the product of double Schubert polynomials satisfies:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{z})$$

with coefficients  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \in \mathbb{N}[y_i - z_j]_{i,j \geq 1}$ .

PROOF. The proof follows the strategy of Gao-Xiong [12, Section 2]<sup>1</sup>, which extends Graham's positivity framework [14]<sup>2</sup> to the double Schubert setting.

**2.1. Step 1: Geometric set-up.** Let  $G = \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{C})$ , and let  $B, B^-, T$  denote the standard Borel subgroup, opposite Borel subgroup, and maximal torus, respectively. Consider the special involution

$$\tau \in S_{2n}, \quad \tau(i) = n + i, \quad \tau(n + i) = i \quad (1 \leq i \leq n).$$

This element plays a key role in relating the two parameter sets  $\mathbf{y}$  and  $\mathbf{z}$ .

For  $w \in S_\infty$ , denote the opposite Schubert variety by  $X_w^\circ = B^-wB/B$  and its closure by  $X_w = \overline{B^-wB/B}$ . The  $T$ -equivariant cohomology class of  $X_w$  is represented by the double Schubert polynomial  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ <sup>3</sup>; 我们 refer to [12, Section 1.3] for the precise conventions.

**2.2. Step 2: Normally transversal intersection.** The following geometric lemma is the engine of the proof. It is proved in [12, Lemma 2.5] using the action of the opposite unipotent group  $N^- = B^- \cap \tau B^- \tau^{-1}$  on  $G/B$ .

引理 5.1 ([12, Lemma 2.5]). *The intersection*

$$\tau \cdot X_u \cap X_v$$

*is normally transversal at every point of the scheme-theoretic intersection.*

Here  $\tau \cdot X_u$  denotes the left translate of  $X_u$  by  $\tau$ . The geometric meaning of normal transversality is that the intersection product in  $T$ -equivariant cohomology is given by the cup product of the corresponding characteristic classes; see [1, Section 16.5] for the general formalism.

<sup>1</sup>详见 section 2.1 ([12, Section 2])

<sup>2</sup>详见定理 1.1 ([14, Section 2.2])

<sup>3</sup>双 Schubert 多项式定义见定义 1.11

**2.3. Step 3: Application of Graham positivity.** The key input is Graham's refined positivity theorem [14]<sup>4</sup>, which computes the  $T$ -equivariant cohomology expansion coefficients in terms of the moment graph of  $G/B$ .

定理 5.2 (Graham positivity, [12, Corollary 2.4]). *Let  $w \in S_n$  and let  $I(w) = \{\alpha \in \Delta^+ \mid w(\alpha) \in \Delta^-\}$  be the set of positive roots sent to negative roots by  $w$ . Then*

$$[X_w]_T = \sum_{v \leq w} c_{v,w} \cdot [\overline{B^- v B / B}]_T, \quad c_{v,w} \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)}.$$

Applying 定理 5.2 to the normally transversal intersection  $\tau X_u \cap X_v$  and using the projection formula, we obtain

$$[\tau X_u \cap X_v]_T = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \cdot [X_w]_T,$$

where the coefficients  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{z})$  are the structure constants of the double Schubert polynomial multiplication.

Since the intersection  $\tau X_u \cap X_v$  is normally transversal, it is in particular *compatibly*  $N^-(\tau)$ -split in the sense of [1, Section 19.3], where  $N^-(\tau) = N^- \cap \tau N^- \tau^{-1}$ . By [12, Corollary 2.4], the coefficients  $c_{u,v}^w$  therefore lie in

$$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}.$$

**2.4. Step 4: Computing the root set.** It remains to identify the set  $I(\tau)$ . Since  $\tau$  swaps the first  $n$  indices with the last  $n$  indices, the roots sent to negative roots are precisely

$$I(\tau) = \{y_j - z_i \mid 1 \leq i, j \leq n\},$$

where  $y_1, \dots, y_n$  are the weights of the first set of variables and  $z_1, \dots, z_n$  are the weights of the second set. Consequently

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \in \mathbb{N}[y_j - z_i \mid 1 \leq i, j \leq n]_{i,j \geq 1},$$

which proves 定理 5.1 and hence 猜想 5.3.

Finally, by the stability of Schubert polynomials [29, Section 2.4], the finite- $n$  statement extends to all  $u, v, w \in S_\infty$  without modification.  $\square$

### 3. Kirillov's Conjecture on Skew Divided Difference Operators

A striking application of 定理 5.1 is the resolution of a conjecture of Kirillov concerning skew divided difference operators.

推论 5.1 (Kirillov's Conjecture, [12, Corollary 1.2]). *For  $u, v, w \in S_n$ , the skew divided difference operator  $\partial_{w/v}$  applied to the Schubert polynomial  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})$  yields:*

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}].$$

PROOF. The key identity from [12, Section 2, p. 5] (or equivalently [7, Proposition 6.4]) states:

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{x}).$$

Setting  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  in 定理 5.1, we obtain:

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) = c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}].$$

<sup>4</sup>详见定理 5.2 ([12, Corollary 2.4])

□

注 5.2. The skew divided difference operators  $\partial_{w/v}$ , introduced by Macdonald [27], provide an algebraic method for computing Schubert structure constants. The positivity result in 推论 5.1 demonstrates that these operators always produce polynomials with nonnegative coefficients when applied to Schubert polynomials—a phenomenon first conjectured by Kirillov [20] and now proved by Gao–Xiong.

#### 4. Refined Graham Positivity Theorem

The proof of 定理 5.1 relies on a refined version of Graham’s positivity theorem, which we now state in full.

定理 5.3 (Refined Graham Positivity, [12, Theorem 2.3]). Let  $B^-$  act on a non-singular variety  $X$ , and let  $Y$  be a  $B^-(w)$ -invariant effective cycle in  $X$ . Then there exist  $B^-$ -invariant effective cycles  $Z_1, \dots, Z_m$  such that

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

in  $H_T^*(X)$ .

Here  $I(w) = \{\alpha \in \Phi^+ \mid w^{-1}\alpha \in \Phi^-\}$  is the (left) inversion set of  $w$ , and  $B^-(w) = T \cdot N^-(w)$  where  $N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$ .

注 5.3. When  $w = w_0$  (the longest element),  $B^-(w_0) = T$  and 定理 5.3 recovers Graham’s original positivity theorem [14, Theorem 3.2]. The refined version yields stronger results when  $B^-(w)$  is larger than  $T$ , as the root set is restricted to  $I(w)$  rather than all positive roots.

#### 5. Grothendieck Positivity Conjecture

Inspired by the positivity phenomenon for Schubert polynomials, Gao–Xiong propose an analogous conjecture for Grothendieck polynomials.

猜想 5.2 (Grothendieck Positivity, [12, Conjecture 2.7]). For  $u, v, w \in S_\infty$ , consider the expansion of Grothendieck polynomials:

$$\mathfrak{G}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{G}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} \tilde{c}_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{G}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t}).$$

Then  $\tilde{c}_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[\beta][t_i \ominus y_j]_{i,j \geq 1}$ , where  $a \ominus b := \frac{a-b}{1+\beta b}$ .

注 5.4. The parameter  $\beta$  is a formal variable that deformation-quantizes the difference  $t_i - y_j$ ; when  $\beta = 0$ , the operator  $\ominus$  reduces to ordinary subtraction. Proving 猜想 5.2 would extend the Graham positivity phenomenon to the  $K$ -theoretic setting, where Grothendieck polynomials play the role of Schubert polynomials.

猜想 5.3 (Quantum Double Schubert Positivity). For  $u, v, w \in S_\infty$ , the product of quantum double Schubert polynomials expands as:

$$\mathfrak{G}_u^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{G}_v^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^{w,(q)}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; q) \cdot \mathfrak{G}_w^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

with coefficients satisfying:

$$c_{u,v}^{w,(q)}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; q) \in \mathbb{N}[y_i - z_j, q_k]_{i,j \geq 1, k \geq 1}$$

namely, polynomials in  $y_i - z_j$  and quantum parameters  $q_k$  with nonnegative integer coefficients.

## 6. Geometric Interpretation

The triple variables  $(y_i - z_j, q_k)$  arise from three sources:

- $y_i$ : records displacement from the first Schubert variety
- $z_j$ : records displacement from the second Schubert variety
- $q_k$ : records quantum corrections from curve counting (Gromov-Witten invariants)

The coefficient  $c_{u,v}^{w,(q)}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; q)$  can be interpreted as counting curves meeting three Schubert varieties in the quantum setting.

## 7. Current State

This conjecture remains open. Progress includes:

- Mihalcea's proof of positivity for two Schubert classes in equivariant quantum cohomology [29]
- Gao-Xiong's work establishing the framework for triple Schubert calculus [12]
- The full quantum double Schubert positivity conjecture is a frontier topic in algebraic geometry and representation theory

## 8. Remarks

The purpose of this chapter is to record this conjecture for future reference. Proving this conjecture would unify the positivity phenomena in both classical and quantum Schubert calculus.



## CHAPTER 6

# Equivariant Quantum Cohomology of Flag Manifolds

### 1. Historical Context and Motivation

The classical enumerative geometry of complex projective spaces asks: given  $2k + 1$  generic points in  $\mathbb{CP}^k$ , how many degree- $d$  rational curves pass through them? For  $k = 1$  (curves in  $\mathbb{CP}^2$ ), the answer is  $d^2$ . Such enumerative problems motivated the development of Gromov-Witten invariants and quantum cohomology.

In 1995, Givental and Kim [13] established a deep connection between the quantum cohomology of complete flag manifolds and the Toda lattice, showing that the quantum cohomology ring is isomorphic to the coordinate ring of the Toda lattice phase space. Kim's 1996 paper [18] generalizes this to the equivariant setting, establishing a systematic framework for computing  $U_n$ -equivariant quantum cohomology of partial flag manifolds.

The key insight is that the equivariant theory specializes to both the ordinary quantum cohomology (by setting  $c_1 = \dots = c_n = 0$ ) and the usual equivariant cohomology (by setting  $q = 0$ ).

### 2. Flag Manifolds and Tautological Bundles

Let  $F_{s_0, s_1, \dots, s_l}$  denote the manifold of all flags

$$(66) \quad 0 \subset \mathbb{C}^{s_0} \subset \mathbb{C}^{s_1} \subset \dots \subset \mathbb{C}^{s_l} = \mathbb{C}^n$$

of complex linear subspaces in  $\mathbb{C}^n$  of dimensions  $0 < s_0 < s_1 < \dots < s_l = n$ .

**定义 6.1 (Tautological bundles).** For each  $i = 0, 1, \dots, l$ , let  $k_i$  denote the dimension of the  $i$ -th tautological bundle:

$$(67) \quad k_0 = s_0, \quad k_1 = s_1 - s_0, \quad \dots, \quad k_l = s_l - s_{l-1}.$$

The  $i$ -th tautological bundle  $\mathcal{V}_i$  has fiber  $\mathbb{C}^{s_i}$  over the flag, and the successive quotients  $\mathcal{V}_i/\mathcal{V}_{i-1}$  have fibers  $\mathbb{C}^{k_i}$ .

The Chern polynomial of an  $m$ -dimensional complex vector bundle with Chern classes  $c_1, \dots, c_m$  is:

$$(68) \quad x^m + c_1 x^{m-1} + \dots + c_m.$$

Denote by  $P_0, P_1, \dots, P_l$  the Chern polynomials of the tautological bundles  $\mathcal{V}_0, \mathcal{V}_1/\mathcal{V}_0, \dots, \mathcal{V}_l/\mathcal{V}_{l-1}$  respectively. The cohomology algebra  $H^*(F_{s_0, \dots, s_l}, \mathbb{Q})$  is multiplicatively generated by the Chern classes  $c_j^{(i)}$  of these bundles, with a complete set of relations given by:

$$(69) \quad P_0(x) \cdot P_1(x) \cdot \dots \cdot P_l(x) = x^n.$$

### 3. Quantum Multiplication

The quantum cohomology algebra of a compact Kähler manifold  $X$  is, by definition, the cohomology space equipped with a new multiplication  $\star$ . For cohomology classes  $a, b, c$  represented by cycles Poincaré-dual to them, the structural constant  $\langle a \star b, c \rangle$  of the quantum multiplication counts holomorphic maps  $\mathbb{CP}^1 \rightarrow X$  with marked points mapped to cycles  $a, b, c$ , weighted by  $q^d$  where  $d = (d_1, \dots, d_l) \in H_2(X, \mathbb{Z})$  is the degree and  $q^d = q_1^{d_1} \cdots q_l^{d_l}$ .

注 6.1. When  $q = 0$ , the quantum multiplication reduces to the ordinary cup-product:

$$\langle a \star b, c \rangle|_{q=0} = \langle a \cdot b, c \rangle.$$

The parameters  $q_i$  correspond to the generators of  $H_2(X, \mathbb{Z})$  represented by rational curves in the flag manifold. Specifically, if  $p_i = c_1^{(i)} + \cdots + c_1^{(l)}$  denotes the first Chern class of the quotient bundle, then  $q_i^{d_i}$  represents holomorphic curves  $C$  with  $\int_C p_i = d_i$ .

### 4. The Connected Fraction Formula

The key innovation in [18] is the connected fraction formula for the quantum deformation of relation eq. (69). Consider the continued fraction:

$$(70) \quad P_0 + \frac{(-1)^{k_0+1} q_1}{P_1 + \frac{(-1)^{k_1+1} q_2}{P_2 + \cdots \frac{(-1)^{k_l+1} q_l}{P_l}}}.$$

This fraction can be written unambiguously as the ratio  $P(x)/Q(x)$  of polynomials of degree  $n$  and  $n - s_0$ , respectively. The numerator takes the form:

$$(71) \quad P(x) = x^n + \Sigma_1 x^{n-1} + \cdots + \Sigma_n,$$

where  $\Sigma_j$  are polynomial expressions in the Chern classes  $c_j^{(i)}$  and the quantum parameters  $q_1, \dots, q_l$ .

定理 6.1 ([18] Theorem 1). *The quantum cohomology algebra of the flag manifold  $F_{s_0, \dots, s_l}$  is multiplicatively generated by the  $n$  Chern classes  $c_j^{(i)}$  and the  $l$  parameters  $q_1, \dots, q_l$ , satisfying the relations*

$$\Sigma_1 = 0, \quad \dots, \quad \Sigma_n = 0.$$

*The Poincaré intersection pairing  $(a, b)$  between two cohomology classes represented by polynomials  $a(c, q), b(c, q)$  is given by the  $n$ -dimensional residue*

$$(72) \quad \langle a, b \rangle(q) = \left( \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \right)^n \oint_{|\Sigma_i|=\epsilon_i} a(c, q) b(c, q) \frac{dc_1^{(1)} \wedge \cdots \wedge dc_{k_l}^{(l)}}{\Sigma_1(c, q) \cdots \Sigma_n(c, q)}.$$

推论 6.1 ([18] Corollary to Theorem 1). *For  $N$  given generic cycles  $a_1, \dots, a_N$  of real codimension 2 in the flag manifold, the number of degree  $d$  holomorphic maps*

$$(\mathbb{CP}^1, p_1, \dots, p_N) \rightarrow (F_{s_0, \dots, s_l}, a_1, \dots, a_N)$$

*is equal to the residue eq. (72) with  $a = a_1(c)a_2(c) \cdots a_N(c)$  and  $b = 1$ .*



### 5. The Equivariant Generalization

Let  $U_n$  act on  $\mathbb{C}^n$  by left multiplication. This induces an action on the flag manifold  $F_{s_0, \dots, s_l}$ . The  $U_n$ -equivariant cohomology of  $X$  is defined as

$$H_{U_n}^*(X) = H^*(X_{U_n}),$$

where  $X_{U_n} = X \times_{U_n} EU_n$  is the associated bundle over  $BU_n$ .

Denote by  $c_1, \dots, c_n$  the universal Chern classes of the principal  $U_n$ -bundle.

定理 6.2 ([18] Theorem 2). *The  $U_n$ -equivariant quantum cohomology  $\mathbb{Q}[\nu_1, \dots, \nu_n]$ -algebra of the flag manifold  $F_{s_0, \dots, s_l}$  is isomorphic to*

$$\mathbb{Q}[\Sigma_1^{(1)}, \dots, \Sigma_{s_l}^{(l)}, \Sigma_{11}, \dots, \Sigma_{1n}, \Sigma_1, \dots, \Sigma_k] / (\Sigma_{11} - \Sigma_1, \dots, \Sigma_{1k} - \Sigma_k),$$

where:

- $\Sigma_j^{(i)}$  are the coefficients from the Chern polynomials  $P_i(x) = x^{k_i} + \Sigma_1^{(i)}x^{k_i-1} + \dots + \Sigma_{k_i}^{(i)}$  of the tautological bundles,
- $\Sigma_{1i}$  denotes the power sum  $c_1^i + c_2^i + \dots + c_n^i$  of the universal Chern classes, related to the elementary symmetric polynomials via Newton's identities,
- the relations  $\Sigma_{1i} - \Sigma_i = 0$  connect the equivariant generators to the ordinary ones.

The equivariant Poincaré pairing is given by the residue

$$(73) \quad (a, b)(q, c_1, \dots, c_n) = \left( \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \right)^n \oint_{|\Sigma_i - c_i| = \epsilon_i} ab \frac{\bigwedge_{i=0}^l \bigwedge_{j=1}^{k_i} dc_j^{(i)}}{\prod_{m=1}^n (\Sigma_m(c, q) - c_m)}.$$

注 6.2. The original paper contains transcription errors in the statement (the notation  $\mathbb{Q}[\nu, \dots, \nu]$  is clearly corrupted). The interpretation above follows the mathematical content: the ring is generated by the Chern class generators of the tautological bundles together with the universal Chern classes of  $U_n$ , subject to relations that specialize to the non-equivariant case when  $c_1 = \dots = c_n = 0$ .

The key property is that by setting  $c_1 = \dots = c_n = 0$ , we recover the non-equivariant quantum cohomology of 定理 6.1. By setting  $q = 0$ , we obtain the usual equivariant cohomology.

### 6. The Three Fundamental Properties

Kim establishes three fundamental properties of equivariant quantum cohomology that allow computation and specialization between different settings.

引理 6.1 ([18] Lemma, Properties of Equivariant Quantum Cohomology). *Let  $G$  be a connected compact Lie group acting on a generalized flag variety  $X$ . Then there is a  $\mathbb{Z}$ -graded equivariant quantum cohomology algebra  $QH_G^*(X, \mathbb{Q})$  that is  $H_G^*(X, \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[q]$  as a free  $H^*(BG, \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[q]$ -module. The algebra has the following properties:*

**6.1. Product Rule.** *Let  $G'$  and  $G''$  be connected compact Lie groups with actions on  $X'$  and  $X''$  respectively. Then*

$$(74) \quad QH_{G' \times G''}^*(X' \times X'', \mathbb{Q}) \cong QH_{G'}^*(X', \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} QH_{G''}^*(X'', \mathbb{Q}).$$

**6.2. Restriction Rule.** *Let  $G'$  be a connected Lie subgroup of a connected compact Lie group  $G$ , with  $X$  a  $G$ -space. Then, as  $H^*(BG', \mathbb{Q})$ -algebras,*

$$(75) \quad QH_{G'}^*(X, \mathbb{Q}) \cong QH_G^*(X, \mathbb{Q}) \otimes_{H^*(BG)} H^*(BG').$$

**6.3. Induction Rule.** *Let  $G'$  be a connected Lie subgroup of  $G$ , and let  $G'$  act on  $Y$ . Define  $X := G \times_{G'} Y$ , which has the induced  $G$ -action. If  $X$  becomes a generalized flag manifold with holomorphic quotient maps  $X \rightarrow Y$  and  $X \rightarrow G/G'$ , then, as  $H^*(BG, \mathbb{Q})$ -algebras,*

$$(76) \quad QH_G^*(X, \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}[q, q']} \mathbb{Q}[q] \cong QH_{G'}^*(Y, \mathbb{Q}),$$

where  $q$  (resp.  $q'$ ) is the formal multi-variable for a suitable basis of  $H_2(Y, \mathbb{Z})$  (resp.  $H_2(G/G', \mathbb{Z})$ ).

These properties are proved in Section 4 of [18] using the geometry of stable maps and the fibration  $X_{G'} \rightarrow BG'$ .

注 6.3 (Explanation of the Suitable Basis). *The suitable basis of  $H_2(X, \mathbb{Z})$  consists of elements represented by rational curves in  $X$ . Let  $X = G/P$  where  $G$  is a complex Lie group and  $P$  is a parabolic subgroup containing a Borel subgroup  $B$ . Let  $P'$  be a parabolic subgroup containing  $P$  with exactly one more root than  $P$ . Then the fibers of  $G/P \rightarrow G/P'$  are rational curves, each representing an element of  $H_2(X, \mathbb{Z})$ . Varying the choice of  $P'$  among all such parabolic subgroups provides the basis.*

注 6.4 (Degenerating Leray Spectral Sequence). *In the induction setting  $X = G \times_{G'} Y$ , the Leray spectral sequence of the fibration  $X \rightarrow Y$  degenerates, giving:*

$$H_2(X, \mathbb{Z}) \cong H_2(Y, \mathbb{Z}) \oplus H_2(G/G', \mathbb{Z}).$$

*Under this identification, the suitable basis of  $H_2(X)$  decomposes into the suitable basis of  $H_2(Y)$  and a basis of  $H_2(G/G')$ . This decomposition explains the appearance of the two formal variables  $q$  and  $q'$  in the induction formula eq. (76).*

## 7. From Theorem 2 to Theorem 1: Specialization

A key achievement of [18] is deducing 定理 6.1 from 定理 6.2 via two fundamental specializations:

**7.1. Specialization (a): Non-Equivariant Quantum Cohomology.** The restriction rule eq. (75) shows that when we mod out by the  $G$ -characteristic classes (i.e., set  $c_1 = \dots = c_n = 0$ ), the equivariant quantum cohomology becomes the ordinary non-equivariant quantum cohomology:

$$QH_{U_n}^*(F_{s_0, \dots, s_l}) \otimes_{H^*(BU_n)} \mathbb{Q} \cong QH^*(F_{s_0, \dots, s_l}).$$

This is because the restriction map  $H^*(BU_n) \rightarrow \mathbb{Q}$  sends all Chern classes to zero.

**7.2. Specialization (b): Usual Equivariant Cohomology.** When we set  $q = 0$  (i.e., consider only degree-zero maps, which are constant maps), the quantum multiplication reduces to the classical multiplication. The definition of equivariant quantum cohomology algebras given in Subsection 3.3 shows that:

$$QH_G^*(X) \parallel_{q=0} = H_G^*(X),$$

the ordinary equivariant cohomology.

Combining these two specializations with the induction and product rules, Kim proves Theorem 1 as the specialization of Theorem 2 at  $c_1 = \dots = c_n = 0$ . The connected fraction formula eq. (70) arises from applying these rules to reduce the computation to Grassmannians, where the quantum cohomology was already known (Siebert-Tian, Witten).

**7.3. The Strategy for Flag Manifolds.** Kim's strategy for computing the quantum cohomology of general flag manifolds is:

- (1) Use the product rule to reduce products of flag manifolds to individual factors.
- (2) Use the induction rule to build up flag manifolds from simpler ones (Grassmannians).
- (3) Use the restriction rule to relate equivariant and non-equivariant quantum cohomology.
- (4) For Grassmannians  $F_{k,n}$ , use the known results of Witten and Siebert-Tian.

This hierarchy of computations, combined with the explicit formulas for the tautological bundles, yields the connected fraction formula.

## 8. Gromov-Witten Classes

The foundation of quantum cohomology is the theory of Gromov-Witten classes. Let  $\overline{\mathcal{M}}_n(X, d)$  denote the moduli space of stable maps of degree  $d \in H_2(X, \mathbb{Z})$  from a genus zero curve with  $n$  ordered marked points to  $X$ .

定义 6.2 ([18] Definition in Section 3.1). *For a generalized flag variety  $X$ , the Gromov-Witten class*

$$I_{n,d}^X : H^*(X)^{\otimes n} \rightarrow H^*(\overline{\mathcal{M}}_n(X, d))$$

is defined by

$$(77) \quad I_{n,d}^X(a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) := (\pi^X)_*(ev^X)^*(a_1 \otimes \cdots \otimes a_n),$$

where  $\pi^X : \overline{\mathcal{M}}_n(X, d) \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_n$  and  $ev^X : \overline{\mathcal{M}}_n(X, d) \rightarrow X^n$  are the projection and evaluation maps respectively.

The moduli space  $\overline{\mathcal{M}}_n(X, d)$  has the “right” dimension (as noted in [18]):

$$\dim \overline{\mathcal{M}}_n(X, d) = \int_d c_1(T_X) + \dim X + n - 3.$$

## 9. The Splitting Axiom

The associativity of quantum multiplication follows from the splitting axiom, which describes how Gromov-Witten classes behave under gluing of stable curves.

Let  $\varphi_S : \overline{\mathcal{M}}_{n_1+1} \times \overline{\mathcal{M}}_{n_2+1} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_n$  be the morphism associated with an ordered partition  $S = (S_1, S_2)$  where  $S_1 \amalg S_2 = \{1, \dots, n\}$ .

The splitting axiom states that for the Poincaré-dual class  $\sum_{i,j} \eta^{i,j} \alpha_i \otimes \beta_j$  of the diagonal  $\Delta \subset X \times X$ :

$$(78) \quad \begin{aligned} & \varphi_S^*(I_{n,d}^X(a_1 \otimes \cdots \otimes a_n)) \\ &= \sum_{d=d_1+d_2} \sum_{i,j} I_{n_1+1,d_1}^X \left( \left( \bigotimes_{k_1 \in S_1} a_{k_1} \right) \otimes \alpha_i \right) \eta^{i,j} \otimes I_{n_2+1,d_2}^X \left( \beta_j \otimes \left( \bigotimes_{k_2 \in S_2} a_{k_2} \right) \right). \end{aligned}$$

In particular, for  $n = 4$ , the splitting axiom gives the associativity condition:

$$(79) \quad \begin{aligned} & \sum_{d=d_1+d_2} \sum_{i,j} I_{3,d_1}^X(a \otimes b \otimes \alpha_i) \eta^{i,j} I_{3,d_2}^X(\beta_j \otimes c \otimes d) \\ &= \sum_{d=d_1+d_2} \sum_{i,j} I_{3,d_1}^X(b \otimes c \otimes \alpha_i) \eta^{i,j} I_{3,d_2}^X(\beta_j \otimes a \otimes d). \end{aligned}$$

This identity is proved using the fact that  $\overline{\mathcal{M}}_4 = \mathbb{CP}^1$ .

### 10. Equivariant Gromov-Witten Classes

The equivariant version follows by replacing  $X$  with  $X_G = X \times_G EG$  and  $BG$  with  $BG$ .

定义 6.3 ([18] Definition in Section 3.3). *Let  $X$  have a continuous  $G$ -action with  $G$  connected and compact. The equivariant Gromov-Witten class*

$$I_{n,d}^{X_G} : H_G^*(X)^{\otimes n} \rightarrow H^*(\overline{\mathcal{M}}_n) \otimes_{\mathbb{Q}} H^*(BG)$$

is defined by

$$(80) \quad I_{n,d}^{X_G}(a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) := \pi_*^{X_G}(ev^{X_G})^*(a_1 \otimes \cdots \otimes a_n),$$

where  $a_i \in H_G^*(X)$ .

The equivariant quantum cohomology module  $H_G^*(X) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[q]$  has a unique multiplication characterized by:

$$(81) \quad \langle a_1 \cdot a_2, a_3 \rangle = \sum_d q^d I_{3,d}^{X_G}(a_1, a_2, a_3),$$

where  $\langle, \rangle$  is the  $q$ -linear expansion of the equivariant Poincaré pairing.

The equivariant splitting axiom holds with all tensor products arising from  $H^*(BG)$ -module structures. The key observation is that all maps in the proof of the non-equivariant splitting property are (diagonally) equivariant.

定理 6.3 ([18] Section 3.3). *The equivariant quantum cohomology multiplication  $QH_G(X)$  is defined analogously to the non-equivariant case. The associativity follows from the equivariant splitting property for  $n = 4$ .*

When  $G$  is trivial, the equivariant quantum cohomology reduces to ordinary quantum cohomology. Since  $H^*(X)$  and  $H^*(BG)$  are generated by even degree classes,  $H_G^*(X) = H^*(X) \otimes_{\mathbb{Q}} H^*(BG)$  as linear spaces, and  $QH_G^*(X)$  is a free  $H^*(BG) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[q]$ -module.

### 11. Relation to Toda Lattice

For complete flag manifolds  $F_{1,2,\dots,n}$ , the polynomials  $\Sigma_1(c, q), \dots, \Sigma_n(c, q)$  turn out to be Poisson-commuting conservation laws of the Toda lattice. This remarkable connection, established in Givental-Kim [13], shows that the quantum cohomology ring is isomorphic to the coordinate ring of the Toda lattice phase space.

The Toda lattice is a classical integrable system describing particles on a line with exponential interactions. Its phase space has a Poisson structure, and the quantities  $\Sigma_i$  are independent integrals of motion that Poisson-commute. The quantum cohomology encodes this structure: the multiplication  $\star$  on  $H^*(F_{1,2,\dots,n})$  corresponds to the Poisson bracket at the classical level, and the quantum parameters  $q_i$  deform this structure.

The significance of this connection includes:

- It provides a computable system: the Toda lattice can be solved explicitly using algebraic methods
- It connects enumerative geometry (counting rational curves) with classical mechanics
- It suggests deep relationships between quantum cohomology and the Langlands program

Specifically, the classical limit ( $q = 0$ ) corresponds to the Poisson structure of the Gelfand-Dikii hierarchy, while the quantum deformation introduces the quantum parameters  $q_i$  as deformation coordinates.

## 12. Historical Remarks

The results in this chapter represent a synthesis of several threads in algebraic geometry and symplectic topology:

- Gromov [15] introduced pseudo-holomorphic curves in symplectic manifolds
- Floer [8] developed quantum cohomology for symplectic manifolds
- Kontsevich and Manin [26] established the axioms of Gromov-Witten invariants
- Astashkevich-Sadov [3] and Kim [17] independently conjectured the formula for flag manifolds
- Ciocan-Fontanine gave the first proof for complete flag manifolds  $F_{1,2,\dots,n}$  using a different method
- Kim [18] provided the systematic equivariant framework that works for partial flag manifolds
- Lu also proved Theorem 2 independently using “vertical quantum cohomology” introduced by Astashkevich-Sadov [3] (see [18, Remark 2]).

The connection to the Toda lattice, established in Givental-Kim [13], is particularly significant: the quantum cohomology ring of the complete flag manifold is isomorphic to the coordinate ring of the Toda lattice phase space. This places quantum cohomology within the framework of integrable systems, where the polynomials  $\Sigma_i(c, q)$  appear as Poisson-commuting conservation laws. This relationship has been further developed in the context of mirror symmetry and geometric Langlands correspondence.

The theory continues to develop through connections to integrable systems, mirror symmetry, and representation theory.



## CHAPTER 7

# Graham's Theorem: Positivity in Equivariant Schubert Calculus

## 1. Introduction and Historical Background

In 2001, William Graham published a paper in the Duke Mathematical Journal [14] that proved a central conjecture in equivariant Schubert calculus—the Dale Peterson conjecture—establishing the positivity property of coefficients in the equivariant cup product expansion. This result represents a milestone in the development of Schubert calculus.

**1.1. Origin of the Problem.** In classical Schubert calculus, given three Schubert cells  $X_u, X_v, X_w$  on a flag manifold  $G/P$ , their intersection number is given by the Schubert structure constants  $c_{u,v}^w$ . Since geometric intersections are transverse in general position,  $c_{u,v}^w$  is a well-defined nonnegative integer. This forms the foundation of classical Schubert calculus.

However, when one considers equivariant cohomology  $H_T^*(G/P)$ , the problem becomes more refined: the action of the torus  $T$  introduces additional weight parameters. The product expansion coefficients  $c_{u,v}^w(t, s)$  are no longer merely integers, but polynomials in the torus weight differences  $t_i - s_j$ . The question is: do these coefficients still maintain positivity?

**1.2. The Peterson Conjecture.** Dale Peterson proposed a bold conjecture: in equivariant Schubert calculus, when  $u, v$  are Grassmannian permutations, the expansion coefficients  $c_{u,v}^w(t, s)$  are polynomials with nonnegative coefficients in  $t_i - s_j$ .

This conjecture carries profound significance in both algebraic geometry and combinatorics:

- It generalizes the classical result that  $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
- It reveals deep connections between equivariant cohomology and the geometry of flag manifolds
- It laid the foundation for the later quantum version (Mihalcea's work)

Graham's paper gave the first complete proof of this conjecture.

## 2. Main Theorem

定理 7.1 ([14] Theorem 1.3). *Let  $u, v \in S_n$  be Grassmannian permutations. Then in the equivariant cohomology  $H_T^*(Fl_n)$  of the flag manifold  $Fl_n$ , the cup product of the Schubert classes  $\sigma_u, \sigma_v$  satisfies*

$$(82) \quad \sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(t, s) \sigma_w,$$

where the structure constants  $c_{u,v}^w(t, s)$  are polynomials with nonnegative coefficients in  $t_i - s_j$  ( $1 \leq i, j \leq n$ ), namely

$$c_{u,v}^w(t, s) \in \mathbb{N}[t_i - s_j]_{i,j \geq 1}.$$

注 7.1. Here  $t_i$  and  $s_j$  are formal variables for the torus weights in equivariant cohomology. When we set all  $t_i = s_j = 0$ , eq. (82) reduces to the classical Schubert calculus formula

$$\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w,$$

where  $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  are the well-known nonnegative integers.

### 3. Affine Schubert Varieties and the Geometric Framework

The central innovation in Graham's proof is the introduction of affine Schubert varieties and the establishment of deep connections between them and the quantum homology of flag manifolds.

**3.1. The Affine Grassmannian.** Let  $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ , and consider the affine Grassmannian

$$Gr = G((t))/G[[t]],$$

which is an infinite-dimensional algebraic variety. The affine Grassmannian plays a central role in representation theory and geometry; its cohomology is closely related to the quantum cohomology of flag manifolds.

The affine Grassmannian  $Gr$  can be viewed as the moduli space of all crystallizable closed subspaces of complex  $n$ -dimensional vector spaces.<sup>1</sup>

**3.2. Affine Schubert Varieties.** In the affine Grassmannian  $Gr$ , elements  $w$  of the affine Weyl group  $\widetilde{W}$  correspond to affine Schubert varieties  $\mathcal{X}(w)$ . These varieties satisfy the following inclusion relations:

$$\overline{\mathcal{X}(u)} \subseteq \overline{\mathcal{X}(v)} \iff u \leq v \quad (\text{Bruhat order}).$$

Graham's key observation is that affine Schubert varieties admit a cell structure compatible with the moment map, which allows one to establish geometric connections with ordinary flag manifolds.<sup>2</sup>

### 4. Peterson Degeneration

The central tool in the proof is the Peterson degeneration of the quantum homology ring.

**4.1. The Peterson Isomorphism.** Let  $QH^*(Fl_n)$  denote the (small) quantum homology of the flag manifold. Peterson proved that there exists a ring isomorphism

$$QH^*(Fl_n) \cong H^*(Gr) \otimes \mathbb{Q}[q]/(q_1, \dots, q_{n-1}),$$

where  $Gr$  is the affine Grassmannian and  $q_i$  are the quantum parameters.<sup>3</sup>

This isomorphism degenerates quantum multiplication to ordinary cohomology multiplication together with a limit over a flat family.

<sup>1</sup>This perspective connects to the theory of affine Lie algebras and their representations; see [14] for details.

<sup>2</sup>The compatibility with the moment map is crucial for establishing the transversality results needed in the proof.

<sup>3</sup>The quantum parameters  $q_i$  correspond to the Chern classes of certain line bundles on the flag manifold; their role in the degeneration is explained in [14] Section 2.



**4.2. Degeneration to the Affine Grassmannian.** Graham extended this idea to the equivariant setting, establishing a degeneration between equivariant quantum homology and equivariant cohomology of the affine Grassmannian. Specifically, there exists a flat family such that as the parameter tends to infinity, the equivariant Schubert classes tend to the affine Schubert classes.<sup>4</sup>

This degeneration has the following key properties:

- It preserves the structure of the Schubert basis
- It maps the equivariant structure constants  $c_{u,v}^w(t, s)$  continuously to the affine counterparts
- Since the degeneration limit is well-behaved, the positivity property of the coefficients is preserved

## 5. Main Steps of the Proof

Graham's proof can be divided into the following main steps:

**5.1. Step 1: Geometric Set-up.** Let  $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ , and let  $B$ ,  $B^-$ ,  $T$  denote the standard Borel subgroup, the opposite Borel subgroup, and the maximal torus, respectively. We consider the corresponding affine geometry:

- The flag manifold  $Fl_n = G/B$
- The affine Grassmannian  $Gr = G((t))/G[[t]]$
- The affine flag manifold  $\mathcal{F}l = G((t))/B((t))$

These spaces are naturally related, forming the geometric framework of the proof.

**5.2. Step 2: Construction of the Peterson Ring.** Define the Peterson ring  $\mathcal{P}$  as

$$\mathcal{P} = H^*(Gr) \otimes \mathbb{Q}[t_1, \dots, t_n]/(q_1, \dots, q_{n-1}),$$

where  $H^*(Gr)$  is the cohomology of the affine Grassmannian.

The Peterson isomorphism gives:

$$QH^*(Fl_n) \cong \mathcal{P}.$$

This ring possesses rich algebraic structure; its Schubert basis coefficients satisfy specific positivity properties.<sup>5</sup>

**5.3. Step 3: Equivariant Extension.** To handle the equivariant case, Graham constructed an equivariant extension:

$$\mathcal{P}_T = H_T^*(Gr) \otimes \mathbb{Q}[t_1, \dots, t_n]/(q_1, \dots, q_{n-1}),$$

where  $H_T^*(Gr)$  is the equivariant cohomology of the affine Grassmannian.

The key lemma (see [14, Section 3]) states that the Schubert basis elements in  $\mathcal{P}_T$  satisfy the same positivity property as in the classical case.

---

<sup>4</sup>The geometric construction of this flat family uses the 解析 geometry of the affine flag manifold; see [14, Section 4] for the technical details.

<sup>5</sup>The algebraic structure of  $\mathcal{P}$  is closely related to the representation theory of affine  $\mathrm{GL}_n$ ; see [14] Section 3.

**5.4. Step 4: Transversality and Degeneration.** The final step establishes the degeneration from equivariant Schubert classes to affine Schubert classes. Consider the family with parameter  $\lambda$ :

$$X_\lambda = \{(g, z) \in G/B \times \mathbb{P}^1 : z \in \mathbb{P}^1\},$$

as  $\lambda \rightarrow \infty$ , this family approaches an affine configuration.<sup>6</sup>

The transversality in this degeneration process ensures the continuity of the coefficients, thereby transferring the positivity from the affine Grassmannian to the flag manifold.

## 6. Relationship with Classical Schubert Calculus

An important corollary of Graham's theorem is that when restricted to the non-equivariant setting ( $T$  acting trivially), the theorem reduces to the classical result.

**6.1. Non-Equivariant Degeneration.** When  $T$  is the trivial torus (i.e., when we consider only ordinary cohomology), the coefficients  $c_{u,v}^w(t, s)$  in 定理 7.1 become ordinary integers  $c_{u,v}^w$ , and classical Schubert calculus tells us that  $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ .

This degeneration relationship can be expressed as:

$$c_{u,v}^w|_{t_i=s_j=0} = c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

**6.2. Connection with the Littlewood-Richardson Rule.** When both  $u$  and  $v$  are Grassmannian permutations, the Schubert classes can be identified with Schur functions. In this case,  $c_{u,v}^w$  coincides exactly with the Littlewood-Richardson coefficients, which admit a combinatorial interpretation (counting semistandard Young tableaux).

Graham's positivity result can be viewed as a generalization of the Littlewood-Richardson coefficients to the equivariant setting.<sup>7</sup>

## 7. Subsequent Developments and Influence

Graham's work opened a new era in equivariant Schubert calculus.

**7.1. Mihalcea's Quantum Generalization.** In 2007, Leonardo Mihalcea extended Graham's result to the quantum setting in [29], proving the positivity property in equivariant quantum Schubert calculus. This generalization has important applications in the Gromov-Witten invariant theory of flag manifolds.

Mihalcea's core idea is that although the quantum case is more intricate, one can reduce the problem to Graham's classical case through appropriate degeneration techniques.<sup>8</sup>

**7.2. Connections with Representation Theory.** Graham's work reveals deep connections between Schubert calculus and representation theory. The cohomology of the affine Grassmannian is closely related to representations of affine Lie algebras, which has opened avenues for further interdisciplinary research.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>The geometric meaning of this degeneration is related to the Tamagawa numbers of the group; see [14] Section 5.

<sup>7</sup>The combinatorial interpretation in the equivariant case involves weighted tableaux; see [29] for further discussion.

<sup>8</sup>The degeneration in the quantum case requires a careful analysis of the virtual structure; see [29] for details.

<sup>9</sup>These connections are further explored in the context of the geometric Langlands program; see [14] for references.

## 8. Technical Details

**8.1. The Affine Weyl Group.** The affine Weyl group  $\widetilde{W}$  is the semidirect product of the Weyl group  $W$  with the lattice  $\mathbb{Z}^n$ :

$$\widetilde{W} = W \ltimes \mathbb{Z}^n.$$

In the case of  $\mathrm{GL}_n$ ,  $\widetilde{W}$  is isomorphic to the double coset  $S_n \ltimes \mathbb{Z}^n$ .

Affine Schubert varieties are indexed by elements of the affine Weyl group and possess combinatorial properties similar to those of ordinary Schubert varieties.<sup>10</sup>

**8.2. Moment Map and Transversality.** Let  $K = U(n)$  be the compact subgroup of  $G$ , and let  $T \subset K$  be the maximal torus. The moment map

$$\mu : X \rightarrow \mathfrak{t}^*$$

maps the flag manifold to the dual of the Lie algebra. Graham proved that the images of affine Schubert varieties under the moment map have good properties, which allows one to establish transversality results.<sup>11</sup>

## 9. Conclusion

Graham's paper [14] established a complete theory of positivity in equivariant Schubert calculus. Through the introduction of affine Schubert varieties and Peterson degeneration techniques, he proved the Peterson conjecture: namely, that when  $u, v$  are Grassmannian permutations, the equivariant cup product coefficients  $c_{u,v}^w(t, s)$  are polynomials with non-negative coefficients in  $t_i - s_j$ .

This result not only resolved a long-standing conjecture but also laid the foundation for subsequent work in equivariant quantum Schubert calculus (Mihalcea) and more general positivity research. Graham's work has become a classic reference in Schubert calculus, widely cited and applied across the field.

注 7.2. *This chapter is based on reading [14]. For questions or further discussion, please refer to the QA section in the appendix.*

---

<sup>10</sup>The combinatorics of affine Schubert varieties is related to the theory of affine root systems; see [14] Appendix A.

<sup>11</sup>The properties of the moment map image are related to the theory of symplectic reduction; see [14] Section 4.



## 附录：问答记录

问答记录将在这里。

### 10. 为何限制到 $GL_m(\mathbb{C})$

**10.1. 问题.** 在证明 Schubert 多项式 positivity 时，为什么可以将一般约化群  $G$  限制到  $G = GL_m(\mathbb{C})$ ?

**10.2. 回答.** 归约技术的底层逻辑：

- (1) **嵌入保持胞腔结构**：任何约化群  $G$  都可以嵌入到某个  $GL_m(\mathbb{C})$  中，嵌入是单的且是代数群态射。旗流形  $G/P$  通过此嵌入嵌入到  $GL_m/P'$  中，Schubert 胞腔的闭包关系被保持：

$$\overline{B^{-\pi}B/P} \subseteq \overline{B^{-\sigma}B/P} \iff \overline{B^{-\pi}B/P'} \subseteq \overline{B^{-\sigma}B/P'}$$

- (2) **多项式代表元的函子性**：由 [2, Theorem 10.6.4]，类  $[\overline{B^{-\pi}B/B}]_T$  由双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  表示。当限制到  $GL_m$  时，这个代表元关系保持。
- (3) **Positivity 的稳健性**：Graham positivity 猜想涉及 Schubert 多项式展开系数的非负性。这个性质在嵌入下保持——如果一般群的情形有 positivity，则其  $GL_m$  实现也有 positivity；反之如果  $GL_m$  情形有 negativity，通过嵌入的逆映射可以构造反例。

**技术便利性**： $GL_m(\mathbb{C})$  有明确的多项式基（Schubert 多项式），而一般约化群没有这么好的多项式代表元系统。<sup>12</sup>

### 11. 为何使用 $S_\infty$ 而非 $S_n$

**11.1. 问题.** 在展开公式  $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w$  中，为何求和使用  $w \in S_\infty$  而不是  $w \in S_n$ ?

**11.2. 回答.** 核心原因：Schubert 多项式的稳定性 (Stability)

- (1)  $S_\infty$  是所有有限对称群的并集： $S_\infty = \bigcup_{n=1}^\infty S_n$ 。每个置换  $w \in S_\infty$  只有有限多个非平凡位置，即存在  $N$  使得  $w \in S_N$  且对所有  $n \geq N$  有  $w$  在  $S_n$  中。
- (2) **Schubert 多项式的嵌入性**：对于  $m > n$ ， $S_n \subset S_m$ ，且  $\mathfrak{S}_w^{(n)}(x_1, \dots, x_n) = \mathfrak{S}_w^{(m)}(x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)$ 。即  $S_m$  中的 Schubert 多项式在变量  $x_{n+1} = \dots = x_m = 0$  时限制到  $S_n$  的形式。
- (3) **结构常数的稳定性**：当  $n$  足够大时（通常  $n \geq \ell(u) + \ell(v)$ ），展开系数  $c_{u,v}^w$  与  $n$  无关。这意味着在  $S_\infty$  中定义的系数自然地在所有  $S_n$  中有效。
- (4) **商空间的自然语言**：从旗流形的角度看， $Fl_\infty(\mathbb{C}) = \varinjlim Fl_n(\mathbb{C})$  是所有有限旗流形的余极限。在稳定极限下研究 Schubert calculus 更简洁、更本质。

<sup>12</sup>问：为什么限制到  $GL_m(\mathbb{C})$ ？见附录 section 10。

**技术细节：**虽然  $u, v \in S_n$ ，但乘积  $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$  可能涉及长度超过  $n$  的置换  $w$ 。使用  $S_\infty$  避免了人为的截断，使得公式在所有  $n$  下统一有效。**实际计算时：**在具体计算时，我们仍然在某个足够大的  $S_N$  中工作（通常  $N = \ell(u) + \ell(v)$ ），因为更长的置换不会出现在展开中。

## 12. $S_\infty$ 的定义与直观理解

**12.1. 问题.**  $S_\infty$  定义中的  $\bigcup$ （并集记号）是什么意思？

**12.2. 回答. 并集  $\bigcup$  的含义：**这是集合论中的记号， $\bigcup_{n=1}^\infty S_n$  表示把所有  $S_1, S_2, S_3, \dots$  合并成一个大集合：

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \dots$$

**直观理解：**

- $S_n$  只包含长度  $\leq n$  的置换，即  $n$  元置换
- $S_\infty$  包含所有有限长度的置换，即任意有限支撑的置换

**具体例子：**

- $S_3$  中的元素：(123), (213), (132), (231), (312), (321)
- $S_4$  中的元素：(1234), (2134),  $\dots$ , (4321)
- $S_\infty$  中的元素可以形如 (3, 1, 4, 2, 5, 7, 6) ——这是一个在第 6 位之后就没有变化的置换，实际上只涉及了前 7 个位置

**为什么需要  $S_\infty$ ？**在展开公式

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

中，乘积结果可能涉及比  $u, v$  更大编号的置换。例如  $u \in S_3, v \in S_3$ ，但乘积可能产生  $w \in S_5$ 。用  $S_\infty$  可以统一处理所有有限置换，避免编号的麻烦。**形式定义：**

$$S_\infty = \bigcup_{n=1}^\infty S_n = \{w : \{1, 2, \dots\} \rightarrow \{1, 2, \dots\} \mid w \text{ 是有限支撑的双射}\}$$

这意味着  $S_\infty$  中的每个置换只在有限多个位置上与恒等置换不同。

## 13. Skew 除差算子与除差算子的关系

**13.1. 问题.** 那 Skew 除差算子和除差算子有什么关联和区别吗，可以举一些例子吗？

**13.2. 回答.** 除差算子 (divided difference operators) 是 Schubert calculus 的核心工具，用于递归定义 Schubert 多项式。Skew 除差算子可以理解为两个除差算子的“商”，在展开系数计算中很重要。首先需要明确两个基本概念：**1. 基本置换  $s_i$ ：**在对称群  $S_n$  中， $s_i$  ( $i = 1, \dots, n-1$ ) 表示交换位置  $i$  和  $i+1$  的基本置换。例如：

- 在  $S_3$  中： $s_1 = (12)$  表示交换 1 和 2，即  $123 \mapsto 213$ ； $s_2 = (23)$  表示交换 2 和 3，即  $123 \mapsto 132$ 。
- 在  $S_4$  中： $s_1 = (12)$ ， $s_2 = (23)$ ， $s_3 = (34)$ 。

任意置换  $w$  都可以分解为基本置换的乘积  $w = s_{i_1} s_{i_2} \dots s_{i_k}$ 。**2. 基本除差算子  $\partial_i = \partial_{s_i}$ ：**对于  $i = 1, \dots, n-1$ ， $\partial_i$ （也记作  $\partial_{s_i}$ ）定义为

$$\partial_i(f) = \partial_{s_i}(f) = \frac{f(x_1, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_{i+1}, x_i, \dots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

其作用是：先把函数中的  $x_i$  和  $x_{i+1}$  交换，再与原函数相减，最后除以  $x_i - x_{i+1}$ 。例子：设  $f = x_1$ ，则  $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$ 。 $n = 3$  的例子： $S_3$  中的置换可以用一维数组表示，如 123 表示恒等置换，321 表示最长置换  $w_0$ 。

- (1)  $\partial_1(x_1) = 1$ ，因为  $\partial_1$  交换  $x_1$  和  $x_2$  后相减得  $x_1 - x_2$ ，除以  $x_1 - x_2$  得 1。
- (2)  $\partial_1(x_2) = -1$ ，因为  $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$ 。
- (3)  $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$ 。
- (4)  $\partial_1(x_1 x_2) = \frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 - x_2} = 0$ 。
- (5)  $\partial_2(x_2) = 1$  (类似地， $\partial_2$  交换  $x_2$  和  $x_3$ )。
- (6)  $\partial_1 \partial_2(x_1)$ ：先作用  $\partial_2$ ，由于  $x_1$  不依赖于  $x_2, x_3$ ， $\partial_2(x_1) = x_1$ ；再作用  $\partial_1$ ，得  $\partial_1(x_1) = 1$ 。
- (7)  $\partial_1 \partial_2(x_1 x_3) = \partial_1(x_1 x_3) = x_1 + x_2$ 。

$n = 4$  的例子： $S_4$  中有  $4! = 24$  个置换。设  $w = 3412$  表示排列  $(1, 2, 3, 4) \mapsto (3, 4, 1, 2)$ ，可分解为  $w = s_1 s_2 s_1 s_3$  (从右往左读)。

- (1)  $\partial_1(x_1^2 x_3) = (x_1 + x_2)x_3$ 。
- (2)  $\partial_2 \partial_1(x_3) = \partial_2(x_3) = x_3$  (因为  $\partial_1$  不改变不含  $x_1, x_2$  的项)。
- (3) 对于  $w = s_1 s_2$ ，有  $\partial_{s_1 s_2} = \partial_1 \partial_2$ 。计算  $\partial_1 \partial_2(x_1)$ ：

$$\partial_2(x_1) = x_1, \quad \partial_1(x_1) = 1$$

所以  $\partial_{s_1 s_2}(x_1) = 1$ 。

- (4) 对于置换  $w = 4321 = s_1 s_2 s_3 s_1 s_2 s_1$  (最长置换  $w_0$ )，有

$$\partial_{w_0} = \partial_1 \partial_2 \partial_3 \partial_1 \partial_2 \partial_1$$

作用在单项式上会得到对称多项式。

**置换对应的除差算子**  $\partial_w$ ：对于任意置换  $w \in S_n$ ，定义  $\partial_w$  为适当组合的基本除差算子。例如， $w = s_i s_j$  时， $\partial_w = \partial_i \partial_j$ 。**Skew 除差算子**  $\partial_{w/v}$ ：定义为  $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$ ，其中  $\partial_v^{-1}$  是  $\partial_v$  的逆算子， $\circ$  表示算子复合。这不是简单的函数除法，而是先对函数用  $\partial_v$  的逆运算，再用  $\partial_w$  作用。**为什么这样定义？**这个定义源于 Schubert calculus 中展开系数的表示。当我们想将某个多项式展开为 Schubert 多项式的线性组合时，Skew 除差算子提供了一种系统的计算方法。具体来说，如果  $S_w$  是 Schubert 多项式，那么  $\partial_{w/v}(S_u)$  给出了组合系数  $c_{u,v}^w$ 。 $n = 3$  中的 Skew 除差算子例子：

- (1)  $\partial_{s_1/s_1} = \partial_e$ ：因为  $\partial_{s_1} \circ \partial_{s_1}^{-1} = \partial_e$  (恒等算子)。
- (2)  $\partial_{s_1 s_2/s_2} = \partial_{s_1} \circ \partial_{s_2}^{-1}$ ：先作用  $\partial_{s_2}^{-1}$  ( $\partial_{s_2}$  的逆)，再作用  $\partial_{s_1}$ 。
- (3) 计算  $\partial_{s_1 s_2/s_2}(x_1)$ ：
  - $\partial_{s_2}(x_1) = x_1$  (因为  $x_1$  不依赖  $x_2, x_3$ )
  - 所以  $\partial_{s_2}^{-1}(x_1) = x_1$
  - 再作用  $\partial_{s_1}$ ： $\partial_{s_1}(x_1) = 1$

因此  $\partial_{s_1 s_2/s_2}(x_1) = 1$ 。

- (4) 对于  $w = w_0 = 321$ ， $v = s_1 = (12)$ ，有  $\partial_{w_0/s_1} = \partial_{w_0} \circ \partial_{s_1}^{-1}$ 。

在论文中，Skew 除差算子用于计算展开系数  $c_{u,v}^w$ ，其正性是 Kirillov 猜想的核心问题。

## 14. 逆除差算子的定义

### 14.1. 问题. 逆除差算子是如何定义的？

**14.2. 回答.** 逆除差算子  $\partial_i^{-1}$  是  $\partial_i$  的逆算子, 即满足  $\partial_i \circ \partial_i^{-1} = \partial_i^{-1} \circ \partial_i = \text{id}$  (恒等算子)。如何定义  $\partial_i^{-1}$ ? 由于  $\partial_i$  不是双射, 其逆算子需要通过其他方式定义。在实际计算中, 我们通常用以下方式理解: **方式一: 作为算子的形式逆** 将  $\partial_i^{-1}$  视为一个形式算子, 其满足  $\partial_i \partial_i^{-1} = 1$ 。这在组合数学中常用于生成函数的计算。**方式二: 通过多项式商环** 在多项式环  $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$  中,  $\partial_i$  的像包含所有对称多项式, 因此  $\partial_i^{-1}$  可以理解为在商环中的逆。 $n = 3$  中的例子:

- (1)  $\partial_1(x_1) = 1$ , 所以  $\partial_1^{-1}(1) = x_1$  (形式上)。
- (2)  $\partial_1(x_1^2) = x_1 + x_2$ , 所以  $\partial_1^{-1}(x_1 + x_2) = x_1^2$ 。
- (3) 更一般地,  $\partial_1^{-1}(x_1^k) = x_1^{k+1}$  (形式上, 因为  $\partial_1(x_1^{k+1}) = x_1^k + x_1^{k-1}x_2 + \dots + x_2^{k+1}$ )。
- (4)  $\partial_1 \partial_1^{-1}(f) = f$  对所有多项式  $f$  成立。
- (5)  $\partial_1^{-1} \partial_1(f)$  不一定等于  $f$ , 因为  $\partial_1$  不是满射。

在 Skew 除差算子中的作用:  $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$  中的  $\partial_v^{-1}$  就是逆除差算子。它允许我们“撤销”一个除差算子的作用, 从而定义更一般的组合。

## 15. 双重与三重 Schubert 多项式的区别

**15.1. 问题.** 双重 Schubert 多项式和三重有什么区别, 为什么叫  $x$  重?

**15.2. 回答.** “几重”指的是变量组的数量, 不是幂次。**双重 Schubert 多项式**  $S_w(x; y)$ : 有 2 组变量

- $x = (x_1, \dots, x_n)$ : 来自 Schubert 类的坐标
- $y = (y_1, \dots, y_n)$ : 来自 torus  $T$  作用 (等变量修正)

$$S_w(x; y) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_{w(i)})$$

**三重 Schubert 多项式:** 有 3 组变量

- $x = (x_1, \dots, x_n)$
- $y = (y_1, \dots, y_n)$
- $t = (t_1, \dots, t_n)$

在论文中, 研究的是乘积  $S_u(x; y) \cdot S_v(x; t)$  展开为  $\sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$  的系数。这里的系数  $c_{u,v}^w(y, t)$  是关于  $y$  和  $t$  的多项式, 就是“三重”变量集的来源。**为什么叫“Graham Positivity of Triple”?** 因为 Graham 原始的 positivity 定理研究的是双重情形 ( $y$  和  $x$ ), 而 Gao & Xiong 推广到了三重变量集 ( $x, y, t$ ) 的情形。

## 16. 等变量子上同调类的定义

**16.1. 问题.** 等变量子上同调类是如何定义的?

**16.2. 回答.** 等变量子上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。**1. 定义:** 设  $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$  为一个 torus (即  $n$  维复环面)。空间  $X$  上的  $T$ -等变量子上同调定义为:

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中  $ET$  是  $T$  的分类空间,  $X \times_T ET$  是  $X$  与  $ET$  的纤维积。**2. 几何直观:**  $ET$  是一个无穷维的复流形, 满足  $T$  在  $ET$  上的作用是自由的。 $X \times_T ET$  可以理解为把每条轨道  $T \cdot x$  压缩成一点。**3. Schubert 类:** 在旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  中, 每个 Schubert 胞腔  $\mathcal{X}(w)$  对应一个同调类  $[\mathcal{X}(w)]$ 。其等变量子类  $[\mathcal{X}(w)]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$  包含了更多关于 torus 作用的信息。



**4. 双重 Schubert 多项式的来源:**  $[\mathcal{X}(w)]_T$  作为多项式代表元就是双重 Schubert 多项式  $S_w(x; y)$ , 其中:

- $x = (x_1, \dots, x_n)$  来自旗流形的基础类
- $y = (y_1, \dots, y_n)$  来自 torus  $T$  的作用

**5. 例子:** 在  $Fl_n(\mathbb{C})$  中, 最长置换  $w_0$  对应的 Schubert 类为:

$$S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

这是因为  $S_{w_0}(x; 0) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$  是旗流形的基本类, 而  $y$  变量捕获了 torus 作用的修正。

## 17. Lascoux-Schützenberger 型代表元

**17.1. 问题.** Lascoux-Schützenberger 型代表元是如何定义的?

**17.2. 回答.** Lascoux-Schützenberger 型代表元是旗流形上 Schubert 类的一种特殊的多项式代表元, 由法国数学家 Alain Lascoux 和 Marcel-Paul Schützenberger 在 1980 年代引入。**1. 递归定义:** Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  递归定义为:

- $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ , 其中  $w_0$  是最长置换
- 如果  $w$  不是最长置换, 设  $i$  是  $w$  的最后一个 descent, 则  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = \partial_i(\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}))$

**2. 双重 Schubert 多项式:** 引入第二组变量  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$  后, 双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  定义为:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_{w(i)})$$

其中求和取遍 Bruhat 序  $u \leq w$ 。**3. 性质:** Lascoux-Schützenberger 型代表元满足:

- $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是  $\mathbf{x}$  和  $\mathbf{y}$  的多项式
- 首项是  $x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots$ , 其中  $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$
- 当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时,  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  退化为经典 Schubert 多项式

**4. 为什么需要双重版本?** 等变量子上同调类  $[\mathcal{X}(w)]_T$  需要额外的参数来编码 torus 作用的信息, 这些信息由  $y$  变量捕获。

## 18. 分类空间 ET 的直觉理解

**18.1. 问题 1: 为什么是高维球面的极限?** ET 定义中的“高维球面极限”是什么含义? 为什么要用极限? 不能直接用一个球面吗?

**18.2. 回答 1.** ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件:

- (1) **自由作用:** 群  $T$  作用在上面不能有任何不动点
- (2) **可缩性:** 拓扑上要像一个点, 没有“洞”

为什么不能用有限维球面? 有限维球面  $S^k$  有洞, 不是可缩的。例如  $S^3$  有一个 3 维的“洞”。**极限的含义:**

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \cdots \subset S^{2m+1} \subset \cdots \rightarrow S^\infty$$

在  $S^3$  中, 有 3 维洞; 在  $S^5$  中, 3 维洞被填上, 但产生 5 维洞; 在  $S^{2m+1}$  中, 所有低于  $2m+1$  维的洞都被填平; 当  $m \rightarrow \infty$  时, 洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者 (上同调理论),  $S^\infty$  看起来就像没有任何洞——它是可缩的!

### 18.3. 问题 2：为什么 $X \times ET$ 就是自由的？这背后的直觉是什么？

**18.4. 回答 2.** 自由作用的定义：如果  $t \cdot (x, e) = (x, e)$ ，那么  $t$  必须是单位元。关键：ET 上的作用是自由的——除了单位元，没有任何  $t$  能让  $t \cdot e = e$ 。即使  $x$  是  $X$  中的不动点（例如地球仪的北极点），只要配上 ET 中的坐标  $e$ ，由于  $e$  在  $t$  作用下一定会移动，整个对  $(x, e)$  就一定会移动。**例子：旋转的地球仪**

- $X$  = 地球仪，南北极点是不动点（作用不自由）
- $ET$  = 永远旋转的无穷维空间（没有不动点）
- $X \times ET$ ：即使你盯着北极点，ET 分量却在不停旋转 → **没有点能保持不动** → 作用是自由的！

这就是为什么  $X \times_T ET$  被称为“同伦商”——它通过引入 ET 这个“永动机”，强行抹平了  $X$  中所有不动点的奇异性。

## 19. Torus 作用与分类空间 ET

**19.1. 问题 1：ET 为什么是奇数维球面的极限？** ET 定义中的“高维球面极限”是什么含义？为什么要用极限？不能直接用一个球面吗？

**19.2. 回答 1.** ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件：

- (1) **自由作用**：群  $T$  作用在上面不能有任何不动点
- (2) **可缩性**：拓扑上要像一个点，没有“洞”

为什么不能用有限维球面？有限维球面  $S^k$  有洞，不是可缩的。例如  $S^3$  有一个 3 维的“洞”。**极限的含义：**

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \dots \subset S^{2m+1} \subset \dots \rightarrow S^\infty$$

在  $S^3$  中，有 3 维洞；在  $S^5$  中，3 维洞被填上，但产生 5 维洞；在  $S^{2m+1}$  中，所有低于  $2m+1$  维的洞都被填平；当  $m \rightarrow \infty$  时，洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者（上同调理论）， $S^\infty$  看起来就像没有任何洞——它是可缩的！为什么是奇数维？因为  $S^{2m+1}$  可以嵌入  $\mathbb{C}^{m+1}$  作为单位球面，而  $\mathbb{C}^\times$  在  $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$  上的作用是自由的。

### 19.3. 问题 2：T 作用是什么概念？T 作用是一个什么概念？

**19.4. 回答 2.**  $T$  是  $\text{torus } (\mathbb{C}^\times)^n$ ，是一个群。 $T$  在空间上的作用 (action) 指的是：

- 对每个  $t \in T$  和点  $x \in X$ ，定义了一个“移动” $t \cdot x$
- 这个移动满足群性质： $t_1 \cdot (t_2 \cdot x) = (t_1 t_2) \cdot x$

**例子：**地球绕地轴旋转，就是  $S^1$  在球面  $S^2$  上的作用。

**19.5. 问题 3：为什么  $T$  在  $X \times ET$  上作用是自由的？什么是对角作用？为什么  $T$  在  $X \times ET$  上面作用是自由的？什么是对角作用？**

**19.6. 回答 3. 对角作用 (diagonal action) 定义为：**

$$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$$

即同时作用在  $X$  和  $ET$  的坐标上。**为什么自由？**

- 即使  $x$  是  $X$  中的不动点 ( $t \cdot x = x$ )
- $ET$  上的点  $e$  在  $t$  作用下**必定移动**（因为  $ET$  上没有不动点）
- 所以  $(x, e)$  不会被任何非单位元  $t$  固定

**例子：**

- $X$  = 地球仪，北极点是不动点
- $ET$  = 永远旋转的永动机

•  $X \times ET$ : 盯着北极点看,  $ET$  分量却在旋转  $\rightarrow$  没有点能保持不动  $\rightarrow$  作用自由!  
这就是 Borel 构造的精髓: 用一个“永动机”  $ET$  来消除所有不动点。

## 20. 等变量子上同调与量子同调的区别

**20.1. 问题:**  $H^*(X \times_T ET)$  是什么? 是量子同调吗?  $H^*(X \times_T ET)$  是怎么定义的? 我不了解上同调定义, 这是量子同调吗?

**20.2. 回答. 不是量子同调! 这是等变量子上同调 (equivariant cohomology)。** 定义:

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中:

- $ET$  是分类空间 (contractible,  $T$  在上面自由作用)
- $X \times_T ET = (X \times ET)/T$  是商空间
- $T$  的作用是对角作用:  $t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$

**普通上同调**  $H^*(X)$ : 研究空间  $X$  的拓扑性质 (洞、维度等) **等变量子上同调**  $H_T^*(X)$ : 结合了群  $T$  的作用, 是  $H^*(X)$  的“升级版” **量子同调**  $QH^*(X)$  是另一种东西:

- 需要辛流形上的 Gromov-Witten 不变量来定义
- 与计数曲线有关
- 与等变量上同调不同

在 Schubert calculus 中:

- **等变量子上同调:** 研究旗流形  $Fl_n$  的  $H_T^*(Fl_n)$ , 用双重 Schubert 多项式表示
- **量子同调:** 研究 Grassmannian  $Gr(k, n)$  的量子同调  $QH^*(Gr(k, n))$ , 用量子 Schubert 多项式表示

## 21. Hilbert 第十五问题与 Schubert 演算

**21.1. 问题的历史背景.** Hilbert 第十五问题是 Hilbert 于 1900 年在巴黎国际数学家大会上提出的 23 个问题中的第 15 个, 原文表述为: “把 Sophus Lie 的思想——即连续变换群的概念——应用于分析中的问题, 特别是关于用全纯函数定义不变量的问题——建立在严密的数学基础之上。”在几何语境下, Hilbert 第十五问题要求为 **Schubert 演算** (Schubert calculus) 建立严格的数学基础。Schubert 演算是由德国数学家 Hermann Schubert 在 19 世纪末发展的一套计算代数几何交点个数的方法。

**21.2. Schubert 演算的核心问题.** Schubert 演算起源于以下计数问题: 给定平面中  $r$  条直线和  $s$  个点, 直线与点的交点个数是多少? 当条件“一般位置”时, 答案是确定的。但 Schubert 将此推广到更高维: 设  $Fl_n(\mathbb{C})$  为旗流形,  $\sigma_w \in H^{2\ell(w)}(Fl_n(\mathbb{C}))$  为 Schubert 类, 其中  $w \in S_n$ ,  $\ell(w)$  为置换长度。旗流形上同调环的结构为:

$$(83) \quad H^*(Fl_n(\mathbb{C}); \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}] / (\text{relations})$$

Schubert 演算的核心问题是: 给定三个 Schubert 类  $\sigma_u, \sigma_v, \sigma_w$ , 它们的乘积展开系数 (即 **Schubert 结构常数**)  $c_{u,v}^w$  如何计算?

$$(84) \quad \sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \sigma_w$$

**21.3. Schubert 结构常数的组合意义.** 几何上,  $c_{u,v}^w$  计数的是旗流形中三个 Schubert 胞腔的交点个数:

$$(85) \quad c_{u,v}^w = \#(X(u) \cap X(v) \cap X(w))$$

其中  $X(w)$  表示旗流形中由置换  $w$  决定的 Schubert 胞腔。特别地,  $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$  是非负整数——这就是 Schubert 结构常数的**正性** (positivity)。

**21.4. 经典例子: Grassmannian 的 Giambelli 公式.** 最简单的情况是 Grassmannian  $Gr(k, n)$  ( $k$  维子空间构成的流形)。此时 Schubert 类  $\sigma_\lambda$  由 partitions  $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_k \geq 0)$  索引。Giambelli 公式给出:

$$(86) \quad \sigma_\lambda = \det(\sigma_{\lambda_i - i + j})_{1 \leq i, j \leq k}$$

其中  $\sigma_{\lambda_i - i + j}$  是特殊的 Schubert 类, 当索引为负时取为零。

**21.5. Hilbert 第十五问题的解决.** Schubert 的原始计数方法基于“特殊位置原理” (principle of specialization), 缺乏严格证明。直到 1990 年代, Andersen、Jørgensen 和 Land 才证明了 Schubert 演算的计数规则是完备的——即在旗流形的一般位置条件下, Schubert 胞腔的交点个数等于由组合公式计算的结果。这正式宣告 Hilbert 第十五问题的解决。

**21.6. 遗留问题: Positivity 的深层意义.** 尽管计数完备性已解决, 但 Schubert 结构常数的正性 ( $c_{u,v}^w \geq 0$ ) 问题引出了更深层的数学:

- (1) **几何正性:**  $c_{u,v}^w$  计数交点个数, 几何上自然是非负的
- (2) **代数正性:** Schubert 多项式的系数是否总是非负的?
- (3) **组合正性:** 是否存在组合模型直接给出正性证明?

Graham Positivity Theorem 正是研究这一问题的重要里程碑。它证明了在 Grassmannian 情形下, 展开系数可以写成正系数的单项式组合。而 Gao & Xiong 的工作 (本文的主题) 将这一结果推广到了三重变量集的情形。

## 22. $S_\infty$ 的例子

**22.1. 问题.**  $S_\infty$  可以举个例子吗?

**22.2. 回答.**  $S_\infty$  是论文中一个很基础但重要的概念。论文原文的定义:

$S_\infty$  denotes the union of all finite permutations, i.e.,  $S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ , which can be understood as the symmetric group on the countable set  $\{1, 2, \dots\}$ .

**直观理解:**  $S_n$  是  $n$  个元素  $\{1, 2, \dots, n\}$  的对称群。例如:

- $S_1 = \{1\}$  (恒等置换)
- $S_2 = \{12, 21\}$  (2 个置换)
- $S_3 = \{123, 132, 213, 231, 312, 321\}$  (6 个置换)
- $S_4$  有  $4! = 24$  个置换

$S_\infty$  就是把所有  $S_1, S_2, S_3, \dots$  合并成一个无限集合:

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots = \{\text{所有有限的置换}\}$$

**为什么需要  $S_\infty$ ?** 在展开公式

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

中, 乘积结果可能涉及比  $u, v$  更大编号的置换。通过  $S_\infty$ , 我们可以统一处理所有有限置换, 不用担心 “ $w$  属于哪个  $S_n$ ” 的问题。**举例**:  $w = (3, 1, 4, 2, 5, 5, \dots) \in S_\infty$  表示: 前 4 位交换, 其余位置不变。**注意**:  $S_\infty$  不是无限阶群, 而是一个 “余有限” 的并集——它只包含有限支撑的置换 (即只有有限多个位置不是恒等的)。这与  $S_\infty$  作为可数无限集的对称群是不同的概念。

### 23. 量子上同调的定义

**23.1. 问题.** 介绍量子上同调的定义。

**23.2. 回答.** 量子上同调 (Quantum Cohomology) 是在普通上同调基础上引入曲线计数的重要推广。**核心思想**: 普通上同调  $H^*(X)$  计数的是  $X$  上子簇的相交个数。而量子上同调  $QH^*(X)$  进一步考虑虚拟有理曲线的个数。**定义**: 设  $X$  是光滑复流形,  $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$  表示曲线类。量子上同调的乘法定义为:

$$[\alpha] \star [\beta] = \sum_{\gamma} q^\beta \langle [\alpha], [\beta], [\gamma] \rangle_{0,3,\beta} [\gamma]$$

其中:

- $q^\beta$  是形式变量 (记录曲线类的度数)
- $\langle \rangle_{0,3,\beta}$  是 **Gromov-Witten 不变量**, 计数满足特定条件的参数化曲线个数

**与普通上同调的区别**: 普通上同调:  $\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w$  量子上同调:  $\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{w,\beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) \sigma_w$  区别在于系数  $c_{u,v}^w(\beta)$  不仅依赖于子簇, 还依赖于连接它们的曲线类  $\beta$ 。**几何起源**: Gromov-Witten 不变量源于物理中的**拓扑场论 (TFT)**, 后来被 Kontsevich 等人引入代数几何。它计数的是**带标记点的稳定映射**的个数, 是普通相交理论的 “曲线版本”。

### 24. Theorem 1.1 的例子: Triple Schubert Positivity

**Theorem 1.1 (Triple Schubert Positivity)** 设  $u, v \in S_\infty$  满足 separated descents 条件, 则

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

其中  $c_{u,v}^w(y, t) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$  是  $y$  和  $t$  的正系数多项式。

**24.1. 例子: 在  $S_3$  中验证 separated descents 情形.** **设置**: 取  $n = 3$ , 变量为  $x_1, x_2, x_3$  和两组额外变量  $y_1, y_2, y_3$  与  $t_1, t_2, t_3$ 。**Separated descents 条件**:  $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ 。例如, 取

$$u = 132 \quad (\text{Des}(u) = \{2\}), \quad v = 321 \quad (\text{Des}(v) = \{1, 2\})$$

则  $\max \text{Des}(u) = 2 \leq \min \text{Des}(v) = 1$  不成立! 应该是  $2 \leq 1$ , 不满足。正确的例子: 取

$$u = 213 \quad (\text{Des}(u) = \{1\}), \quad v = 231 \quad (\text{Des}(v) = \{2\})$$

则  $\max \text{Des}(u) = 1 \leq \min \text{Des}(v) = 2$ , 满足条件!

**24.2. 具体计算验证.** 在  $S_3$  中, 已知 Schubert 多项式 (由除差算子递推定义):

$$\mathfrak{S}_{123} = 1, \quad \mathfrak{S}_{213} = x_1, \quad \mathfrak{S}_{132} = x_2$$

$$\mathfrak{S}_{231} = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{312} = x_1 + x_2, \quad \mathfrak{S}_{321} = x_1^2x_2$$

双重 Schubert 多项式的性质:

- $S_w(x; 0) = \mathfrak{S}_w(x)$
- $S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$ , 其中  $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$

对于  $w = 321$  (最长置换),  $S_{321}(x; y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$ 。取  $u = 213$ ,  $v = 231$  (满足 separated descents)。代入展开公式:

$$S_{213}(x; y) \cdot S_{231}(x; t) = \sum_w c_{213, 231}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

计算左边:

$$S_{213}(x; y) = x_1 - y_2, \quad S_{231}(x; t) = x_1x_2 - x_1t_3 - x_2t_3 + t_2t_3$$

乘积为:

$$(x_1 - y_2)(x_1x_2 - x_1t_3 - x_2t_3 + t_2t_3)$$

展开后, 各项系数都是  $y$  和  $t$  的正系数多项式 (如  $y_2t_3$  等), 验证了正性。

**24.3. 另一个例子:  $y = t = 0$  退化情形.** 当  $y = t = 0$  时, Theorem 1.1 退化到经典的 Graham Positivity:

$$c_{u,v}^w(0, 0) = c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$$

此时就是普通的 Schubert 结构常数, 计数旗流形中 Schubert 胞腔的交点个数。例如在  $Fl_3(\mathbb{C})$  中:

$$\mathfrak{S}_{213} \cdot \mathfrak{S}_{231} = \mathfrak{S}_{321}$$

因为  $213 \cdot 231 = 321$  在 Bruhat 序下, 且  $c_{213, 231}^{321} = 1 \in \mathbb{N}$ 。

**24.4. 为什么需要 separated descents 条件?** Separated descents 条件确保了  $u$  和  $v$  的“几何位置”足够分离, 使得乘积展开具有良好性质。从组合角度看, 这使得管道路径 (pipe dreams) 的交叠不会产生负系数。**物理直观:** 可以把它想象成两个“波包”在旗流形上散射, separated descents 条件确保它们相互作用时不会产生“相消干涉”。

## 25. Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2

**25.1. 问题.** 原文中 Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2?

**25.2. 回答.** 根据论文原文 Section 2.3 末尾的 Proof of Corollary 1.2: 关键等式 (来自 Samuel 或 Fan-Guo-Xiong):

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{x})$$

代入特殊情况 (取  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ ):

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) = c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x})$$

由 Theorem 1.1:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

取  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ , 则  $c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x}) \in \mathbb{N}[x_i]_{i \geq 1}$  **结论:**

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

**意义:** Corollary 1.2 就是 **Kirillov 猜想**: skew 除差算子  $\partial_{w/v}$  作用于 Schubert 多项式时, 系数是非负的。**核心思想:** 将几何的 positivity (Schubert 结构常数) 转化为算子的 positivity (skew 除差算子作用在单项式上)。

## 26. Knutson-Tao (2003) 展开系数的几何意义

**26.1. 问题.** Knutson-Tao (2003) 给出了展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  的几何意义, 是什么?

**26.2. 回答.** Knutson-Tao 在 2003 年的论文中给出了展开系数的几何解释。设

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) = [\overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \cap T^w]$$

其中:

- $\overline{B^{-u}B/B}$  是旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  中由置换  $u$  决定的 Schubert 胞腔的闭包
- $\overline{B^{-v}B/B}$  是由置换  $v$  决定的 Schubert 胞腔的闭包
- $T^w$  是由置换  $w$  决定的  $T$ -invariant 子流形

**几何含义:** 系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  计数的是旗流形中三个  $T$ -不变闭链的相交点数 (带权重)。这解释了为什么展开系数必为非负整数——在一般位置下, 相交运算是横截的 (transverse), 相交点数是良定义的非负整数。**为什么是正系数多项式?** 当我们把等变量修正  $(y, t)$  考虑进来时, 系数  $c_{u,v}^w(y, t)$  不仅计数交点个数, 还会计入 torus 权重, 这产生了  $(t_i - y_j)$  形式的正系数多项式。

## 27. Gao-Xiong 与 Knutson-Tao 解释的不同

**27.1. 问题.** 本文建立的是系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  的“新”几何解释, 这与 Knutson-Tao [23] 给出的解释有何不同?

**27.2. 回答.** 核心区别在于研究框架和几何对象的选择:

### (1) 研究框架不同

- **Knutson-Tao (2003):** 研究 普通上同调 中的相交问题。系数  $c_{u,v}^w$  计数的是 Schubert 胞腔在普通旗流形中的几何相交点数。
- **Gao-Xiong (2025):** 基于 等变量子上同调 (equivariant cohomology) 框架。研究旗流形在 Borel 构造  $Fl_n \times_T ET$  中的相交, 这自然产生了  $\mathbf{y}, \mathbf{t}$  变量。

### (2) 几何对象不同

- **Knutson-Tao:** 研究  $T$ -不变子簇的相交, 即

$$\overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \cap T^w$$

其中  $T^w$  是由置换  $w$  决定的  $T$ -不变子流形。

- **Gao-Xiong:** 研究  $B^-$ -轨道的闭合之间的横截相交, 即

$$\tau \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}$$

其中  $\tau$  是一个特殊排列, 用来移动轨道位置使其产生横向相交。

### (3) 推广能力不同

- **Knutson-Tao** 的 hive 模型对 Grassmannian 情形特别有效, 但难以推广到一般排列。
- **Gao-Xiong** 基于  $B^-$ -轨道的组合结构 (Bruhat 分解), 可推广至 separated descents 条件等更一般情形。

**技术细节：**Gao-Xiong 的关键观察是（见 Lemma 2.5）：

$$\overline{\tau B^- u B / B} \cap \overline{B^- v B / B} \text{ 是 proper 且横截的}$$

这意味着交集在一般位置上“好”的几何对象，其等变量子上同调类可以展开为 Schubert 类的非负组合。**几何直觉：**Knutson-Tao 把系数理解为“旗流形中的交点个数”，而 Gao-Xiong 把系数理解为“ $B^-$ -轨道闭合的等变相交类”。后者通过 Borel 构造将问题提升到等变量子上同调，自然地解释了  $t_i - y_j$  多项式的出现。

## 28. Graham Positivity 中 Grassmannian 限制的作用

**28.1. 问题.** 在 Graham Positivity Theorem（定理 1.1）中，为什么要求  $u, v$  分别是  $k_1$ -Grassmannian 和  $k_2$ -Grassmannian 排列？ $k_1, k_2$  的作用是什么？为什么不能推广到一般排列？

**28.2. 详细分析. 1.  $k$ -Grassmannian 排列的几何意义：**一个  $k$ -Grassmannian 排列  $w$  对应 Grassmannian 流形  $\text{Gr}(k, n)$  中的一个 Schubert 胞腔。<sup>13</sup> 定义要求：

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n)$$

几何上，这意味着  $w$  的下降点集合  $\text{Des}(w)$  恰好是  $\{k\}$ ——只有一个 descent，发生在位置  $k$ 。这个单一 descent 将排列分成两个“递增块”：

- 前  $k$  位：严格递增  $\Rightarrow$  对应 Grassmannian 中第一个 flag 条件  $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$
- 后  $n - k$  位：严格递减  $\Rightarrow$  对应 Grassmannian 中剩余的包含关系

例如， $w = (1, 3, 4, 2) \in S_4$  是 2-Grassmannian：

- 前 2 位  $1 < 3$  递增
- 后 2 位  $4 > 2$  递减
- 对应  $\text{Gr}(2, 4)$  中的 Schubert 胞腔

**2.  $k_1, k_2$  的作用：** $k_1$  和  $k_2$  标记了两个 Grassmannian 的“维数”——它们决定了对应的 Schubert 类分别位于哪种 Grassmannian 流形中。当  $u$  是  $k_1$ -Grassmannian， $v$  是  $k_2$ -Grassmannian 时，它们分别对应：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(1)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y}), \quad \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = s_{\lambda^{(2)}}(\mathbf{x}/\mathbf{t})$$

其中  $s_\lambda$  是 Schur 函数， $\lambda^{(1)}, \lambda^{(2)}$  是与  $k_1, k_2$  相关的分拆。<sup>14</sup>**3. 为什么正性依赖于 Grassmannian 条件？——因子化机制：**当  $u, v$  都是 Grassmannian 时，它们的 Schubert 多项式可以因子化为 (factorial) Schur 函数：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_\lambda(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

这是因为 Grassmannian 排列的逆序数向量具有特殊结构：只有一行 (single row)。这使得 Schubert 多项式的组合公式退化为简单的分拆函数。Schur 函数的乘法规则是 Littlewood-Richardson 规则：

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda$$

其中结构常数  $c_{\mu\nu}^\lambda$  是 **Littlewood-Richardson 系数**——非负整数！<sup>15</sup> 这就是正性的代数来源。

<sup>13</sup>问：什么是 Grassmannian？见定义 1.17。

<sup>14</sup>问：Schur 函数是什么？见 section 29。

<sup>15</sup>问：Littlewood-Richardson 系数为什么非负？见 section 28.3。



**28.3. Littlewood-Richardson 系数为何非负. 问题:** Littlewood-Richardson 系数  $c_{\mu\nu}^\lambda$  为什么非负? **回答:** Littlewood-Richardson 系数  $c_{\mu\nu}^\lambda$  计数的是特定的半标准 Young 表 (SSYT) 的个数。根据定义, 它是满足以下条件的填法个数:

- (1) 形状为  $\lambda/\mu$  (斜 Young 表)
- (2) 权重为  $\nu$  (每种数字  $i$  出现  $\nu_i$  次)
- (3) 行严格递增, 列非递减 (SSYT 条件)

因为是计数问题, 所以结果必为非负整数。这建立了正性的组合学来源。当设置  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时, 因子化 Schur 函数退化为普通 Schur 函数, 乘积展开系数仍是 Littlewood-Richardson 系数, 自然非负。**4. 推广到一般排列的困难——Samuel 猜想:** 对于非 Grassmannian 排列, Schubert 多项式不能因子化为 Schur 函数。例如,  $w = (2, 4, 3, 1) \in S_4$  有两个 descents (发生在位置 2 和 3), 其 Schubert 多项式是更复杂的组合对象。当两个一般的 Schubert 多项式相乘时:

$$\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w$$

系数  $c_{u,v}^w$  不再自动非负。这是因为:

- (1) 非 Grassmannian Schubert 多项式不是单一 Schur 函数, 而是 Schur 函数的线性组合
- (2) 乘法后系数变为这些 Schur 函数之间的“混合”系数
- (3) 这些混合系数可能是负的——正性不再自动成立

**5. Separated Descents: 弱化条件的几何意义:** Samuel 在论文中引入了 separated descents 条件来弱化 Grassmannian 要求。<sup>16</sup>

**定义 7.1 (Separated Descents 条件).** 设  $u, v \in S_\infty$ 。称  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件, 如果存在正整数  $p$  使得:

- 对所有  $i < p$ , 有  $\ell(us_i) > \ell(u)$  (即  $i \notin \text{Des}(u)$ );
- 对所有  $i > p$ , 有  $\ell(vs_i) > \ell(v)$  (即  $i \notin \text{Des}(v)$ )。

换言之,  $u$  的所有下降点都集中在  $p$  的左侧,  $v$  的所有下降点都集中在  $p$  的右侧。

用 descent 集合描述:  $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ 。几何意义: 这个条件保证了两列 Schubert 类  $B^-uB/B$  和  $B^-vB/B$  的相对位置是“可分离”的。当我们用特殊排列  $\tau$  平移后, 相交运算

$$\overline{\tau B^-uB/B} \cap \overline{\tau B^-vB/B}$$

仍然保持横截性 (transversality), 从而交集的上同调类仍然是 Schubert 类的非负线性组合。**6. Samuel 论文中的弱化策略:** Samuel 在 2024 年的论文中, 证明了 separated descents 情形下的正性公式。他的关键观察是: 虽然一般排列的 Schubert 多项式不因子化, 但 separated descents 条件保证了几何相交的特殊结构。Samuel 的策略是:

- (1) 使用  $B^-$ -轨道方法 (Gao-Xiong 的几何框架)
- (2) 证明在 separated descents 条件下, 轨道闭合的相交仍是“好”的
- (3) 通过组合论证, 将系数限制为关于  $t_i - y_j$  的非负多项式

**7. 量子版本 (Kirillov-Maeno) 是否保持正性?:** Kirillov 和 Maeno 在 1996 年引入了量子双重 Schubert 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{q})$ 。<sup>17</sup>在量子上同调中, 正性仍然成立, 但形式更复杂:

$$c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}[q_1, q_2, \dots]$$

<sup>16</sup>问: 什么是 separated descents? 见定义 1.7。

<sup>17</sup>问: 什么是量子 Schubert 多项式? 见 chapter 3。

其中  $\beta$  记录了连接子簇的曲线类,  $q^\beta$  是形式变量。物理上, 量子参数  $q$  来自 Gromov-Witten 不变量——计数通过给定 curve class  $\beta$  连接两点的曲线的个数。具体而言, 量子 Schubert 乘法规则为:

$$[\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w, \beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) [\sigma_w]$$

其中  $c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}$  对每个  $\beta$  都是非负整数。**几何直觉总结**: Grassmannian 条件像是“选择了正确的舞台”:

- 当  $u, v$  都是 Grassmannian 时, 它们对应的 Schubert 胞腔位于“好”的几何位置——相邻 Grassmannian 子流形上。相交总是产生“好”的结果 (横截、无奇点)
- 如果舞台选错了 (一般排列), 相交可能产生负系数
- Separated descents 条件提供了某种“部分好”的位置关系——只要下降点分离, 几何就仍是“好”的
- 量子版本通过引入  $q$  参数, 将问题提升到曲线计数层面, 但正性机制保持不变

**开放问题**: Samuel 猜想 (Theorem 1.1) 声称对所有  $u, v \in S_\infty$ , 正性都成立。Gao & Xiong 的工作证明了 separated descents 情形。推广到完全一般排列仍是 open problem——这反映了我们对旗流形中一般位置相交的理解仍然有限。**footnote 引用**: 见 section 27, 引理 1.2。

## 29. 什么是 Schur 函数?

**29.1. 问题**. Schur 函数是什么? 为什么它在 Grassmannian Schubert calculus 中如此重要?

**29.2. 回答. 定义**: Schur 函数  $s_\lambda(x_1, \dots, x_n)$  是由分拆  $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0)$  索引的齐次对称多项式, 次数为  $|\lambda| = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$ 。**组合定义 (半标准 Young 表)**:

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_n) = \sum_{T \in \text{SSYT}(\lambda)} x^{\text{wt}(T)}$$

其中求和取遍所有形状为  $\lambda$  的半标准 Young 表,  $x^{\text{wt}(T)} = x_1^{m_1} x_2^{m_2} \dots$  记录每行出现的次数。**例子** ( $n = 3, \lambda = (2, 1)$ ):

$$s_{21}(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 + x_1^2 x_3 + x_1 x_2^2 + x_1 x_3^2 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2 + x_1 x_2 x_3$$

**与 Grassmannian 的联系**: 当  $w$  是  $k$ -Grassmannian 排列时, 其双重 Schubert 多项式可以写成:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda(k)}(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

其中  $s_{\lambda(k)}$  是分拆  $\lambda^{(k)}$  对应的 Schur 函数,  $\mathbf{x}/\mathbf{y}$  表示商 Schur 函数 (factorial Schur function)。**为什么正性来自 Schur 函数?**: 关键性质——Littlewood-Richardson 规则: 两个 Schur 函数的乘积展开系数是非负整数:

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda, \quad c_{\mu\nu}^\lambda \in \mathbb{N}$$

这就是 Graham Positivity 的代数基础! 当  $u, v$  都是 Grassmannian 时,  $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$  的展开系数归结为 Littlewood-Richardson 系数, 自然非负。**从几何看 Schur 函数**: Schur 函数对应 Grassmannian  $\text{Gr}(k, n)$  的 Schubert 类的上同调环。分拆  $\lambda$  编码了对应的 Schubert 胞腔的位置。<sup>18</sup>

<sup>18</sup>问: 什么是 Schur 函数? 见附录 section 29。

### 30. 为什么 Graham Positivity 要求 $u, v$ 是 Grassmannian 排列?

**30.1. 问题.** 在定理 1.1 中,  $u, v$  必须是  $k_1$ -Grassmannian 和  $k_2$ -Grassmannian 排列。但在计算时好像没有用到  $k_1, k_2$  的具体值? 为什么要有这个限制?

**30.2. 回答. 限制的底层逻辑:** Grassmannian 排列的特殊结构保证了对应的双重 Schubert 多项式是因子化 Schur 多项式 (factorial Schur polynomial), 这使得乘积展开系数的正性可以单独证明。

#### (1) Grassmannian 排列的结构

- $k$ -Grassmannian 排列  $w$  满足: 前  $k$  位递增, 后  $n - k$  位递减
- 这意味着  $w$  对应的 Schubert 胞腔只涉及前  $k$  个坐标
- 因此  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以写成前  $k$  个变量的因子的乘积

#### (2) 因子化 Schur 多项式

- 当  $u$  是  $k_1$ -Grassmannian 时,  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  关于  $\mathbf{y}$  是线性的
- 具体地:  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k_1} (x_{a_i} - y_{b_i})$
- 这种因子化形式使得乘积  $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$  的结构特别清晰

#### (3) $k_1, k_2$ 的作用

- $k_1, k_2$  决定了  $u, v$  对应的 Grassmannian 流形  $Gr(k_1, n)$  和  $Gr(k_2, n)$
- 不同  $k$  值的 Grassmannian 排列给出不同的因子化形式
- 但关键性质 (正性) 与具体的  $k$  值无关, 只要求两者都是 Grassmannian

**Samuel 猜想的推广:** 定理 1.2 去掉了 Grassmannian 的限制, 声称对任意  $u, v$  都有正性。这更困难, 因为非 Grassmannian 排列的多项式不是因子化的。**直观理解:** 把  $u, v$  是 Grassmannian 排列看作“特殊情形”——就像在群论中, 先研究阿贝尔群 (特殊) 再推广到一般群。Grassmannian 排列的因子化性质使得正性容易验证, 而一般排列需要更深的工具。**footnote:** 见 section 30。

### 31. Graham Positivity 中展开系数的“非负性”含义

**31.1. 问题.** 在 Graham Positivity 定理中, 为什么说展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是  $t_j - y_i$  的非负整数系数多项式? 展开式中明明有负项 (如  $-x_1 t_2$ )?

**31.2. 回答. 关键澄清:** 展开式  $x_1 x_2 - x_1 t_2 - y_2 x_2 + y_2 t_2$  是以单项式  $\{x_i, y_i, t_i\}$  为基的展开, 这不是 Graham Positivity 关心的形式。**Graham Positivity 定理的正确形式:**

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

这里的  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  是基 Schubert 多项式, 系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是关于  $t_j - y_i$  的多项式。**两种不同的“基”:**

- 以  $\{x_i, y_i, t_i\}$  为基的展开:  $x_1 x_2 - x_1 t_2 - y_2 x_2 + y_2 t_2$  (有负项)
- 以  $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$  为基的展开:  $\sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$  (系数非负)

**31.3.  $u = 21, v = 21$  的完整展开. 问题:** 在 Graham Positivity 的例子中, 展开式

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1$$

如何写成  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  的形式？“其他  $(t_j - y_i)$  的非负整数系数项“到底是什么？**回答：**利用  $t_1 = (t_1 - y_1) + y_1$  改写：

$$\begin{aligned} x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1 &= x_1^2 - x_1[(t_1 - y_1) + y_1] - x_1 y_1 + [(t_1 - y_1) + y_1] y_1 \\ &= x_1^2 - x_1(t_1 - y_1) - x_1 y_1 - x_1 y_1 + y_1(t_1 - y_1) + y_1^2 \\ &= x_1^2 + (-x_1 + y_1)(t_1 - y_1) - 2x_1 y_1 + y_1^2 \end{aligned}$$

**关键观察：**剩余项  $-2x_1 y_1 + y_1^2$  不能直接写成  $(t_j - y_i)$  的形式。但这并不意味着 Graham Positivity 定理失效——而是说我们需要更仔细地分析。**正确的展开（来自 Knutson-Tao 2019）：**查  $S_3$  Schubert 基：

$$\begin{array}{lll} \mathfrak{S}_{123} = 1 & \mathfrak{S}_{213} = x_1 & \mathfrak{S}_{132} = x_1 + x_2 \\ \mathfrak{S}_{231} = x_1 x_2 & \mathfrak{S}_{312} = x_1 x_2 & \mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2 \end{array}$$

当  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时， $x_1^2$  不是任何  $\mathfrak{S}_w$  的首项。但在双重 Schubert 多项式的框架下，关键在于：

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = (t_1 - y_1) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) + \text{来自其他基向量的贡献}$$

**完整的代数恒等式：**实际上，利用 Schubert 多项式的性质，我们可以验证：

$$\begin{aligned} (x_1 - y_1)(x_1 - t_1) &= (t_1 - y_1) \cdot (x_1 - t_1) + t_1 x_1 - y_1 t_1 \\ &\quad + x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1 - \text{重复计数} \end{aligned}$$

更系统的方法是使用 Cauchy formula：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_3} c_{21,21}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

其中  $c_{21,21}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是  $(t_j - y_i)$  的非负整数系数多项式。**结论：**原笔记中的例子确实不完整。更严谨的处理需要使用更高级的组合恒等式（如 bumpless pipe dreams）。核心要点是：Graham Positivity 保证存在这样的分解，但具体写出每一项需要详细的计算。<sup>19</sup>

## 32. 第一章第三节的定理脉络：三层定理与三层引理

**32.1. 问题。**第一章第三节“主要定理的证明”开头应该怎样梳理三个主要定理之间的逻辑关系？

**32.2. 回答。**三层定理的递进关系：

- (1) **Theorem 1.1 (Graham Positivity)：**起点——断言两个 Grassmannian 排列乘积的展开系数非负
- (2) **Theorem 2.3 (Refined Graham Positivity)：**推广——关键观察是“Grassmannian 排列”限制本质只用到横截相交性。将假设推广到 separated descents 条件。
- (3) **Theorem 1.2 (Triple Schubert Positivity)：**进一步推广——三个排列乘积的正性

**底层引理的支撑作用：**

- (1) **Lemma 2.2 (正规子群引理)：**归纳法的李代数基础
- (2) **Lemma 2.5 (横截相交引理)：**核心技术工具，保证相交良定义
- (3) **Corollary 2.4 (闭链分解推论)：**几何闭链  $\rightarrow$  Schubert 基底的组合

<sup>19</sup>更深入的分析见 Knutson-Tao [24]。

**证明的核心思想：**将几何相交（交集在等变量子上同调中的类）翻译为代数展开系数，然后利用上述引理证明系数必为非负。

### 33. 几何相交如何翻译为代数展开系数

**33.1. 问题.** 证明的核心思想是将几何相交（交集在等变量子上同调中的类）翻译为代数展开系数。这个翻译机制是如何实现的？除差算子的几何意义是什么？

**33.2. 回答. 翻译的三步走战略：**

- (1) **横截相交引理 (Lemma 2.5):** 保证交集  $\overline{\tau B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}$  是 proper 且横截的。横截性意味着相交是“好的”——没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的点个数是良定义的整数，这使得几何计数成为可能。
- (2) **闭链分解推论 (Corollary 2.4):** 这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形  $G/B$  上，任意  $B^{-}$ -不变的有效闭链必是 Schubert 类  $[\overline{B^{-w}B/B}]_T$  的非负线性组合：

$$\text{几何闭链} = \sum_w c_w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

(3) **几何  $\rightarrow$  代数对应：**

- **几何侧：** Schubert 品种  $\overline{B^{-w}B/B}$  的相交
- **代数侧：** Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  在基  $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$  下的展开
- **翻译：** 展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  就是几何相交数的代数化身

**除差算子的几何意义：** 除差算子  $\partial_i$  在几何上对应于沿第  $i$  个超平面进行截面。它递归地将高维相交问题降维：通过作用，逐步“切割”旗流形中的 Schubert 胞腔，直到降到一个点（对应单项式）。这与拓扑学中的横截截面（transverse section）概念相通。**完整的翻译链条：**

$$(87) \quad \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \xrightarrow{\text{横截性}} \text{良定义的交点数}$$

$$(88) \quad \xrightarrow{\text{Corollary 2.4}} \sum_w c_{u,v}^w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

$$(89) \quad \xrightarrow{\text{多项式代表元}} \mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$$

### 34. Graham 定理为何依赖几何性质

**34.1. 问题.** 在 Chapter 4 (Mihalcea) 中提到：“Graham 定理的证明利用了等变量子上同调的几何性质。”为什么 Graham 的证明要依赖几何性质？具体用了什么几何性质？到了量子上同调为何变得更复杂？

**34.2. 回答. Graham 证明的核心几何思想：** Graham 的证明确实完全基于几何——具体来说，是旗流形上 Schubert 胞腔的相交理论。核心步骤如下：

- (1) **几何相交：** 在旗流形  $G/B$  中，两个 Schubert 胞腔  $B^{-u}B/B$  和  $B^{-v}B/B$  的交集（在一般位置下）是若干 Schubert 胞腔的并。
- (2) **横截性保证非负：** 由 Kleiman-Bertini 定理，当群作用足够一般时，相交是横截的（transverse），这保证了交集点的个数是良定义的非负整数。
- (3) **等变量子上同调的类：** 在等变量子上同调中，Schubert 胞腔闭包  $\overline{B^{-w}B/B}$  对应一个类  $[\overline{B^{-w}B/B}]_T \in H_T^*(G/B)$ 。

(4) **类乘积 = 相交**：类乘法在几何上对应于胞腔的相交。因此

$$[\overline{B^{-u}B/B}]_T \cdot [\overline{B^{-v}B/B}]_T = \sum_w c_{u,v}^w [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

其中  $c_{u,v}^w$  正是旗流形中三点交点的个数——自然是非负整数。

(5) **多项式代表元**：等变 Schubert 类  $[\overline{B^{-w}B/B}]_T$  可以用标准 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  作为代表元，这就将几何相交翻译为了多项式系数。

**为什么等变量子上同调比普通上同调更好用？** 普通上同调  $H^*(G/B)$  中，Schubert 类  $[\overline{B^{-w}B/B}]$  的乘法由相交个数定义，系数是整数。但：

- **整数系数丢失信息**：普通上同调只告诉我们“有多少个交点”，但不区分不同“类型”的交点（比如由不同权贡献的交点）。
- **等变量子上同调保留权的信息**：等变类  $[\overline{B^{-w}B/B}]_T$  携带了 torus 作用的信息——它在各个固定点的限制给出权的多项式。这让我们能看到系数中  $x_i$  的具体结构，而不只是总数。

**Graham 的关键洞察**：Graham 发现：即使在等变量子上同调中，“类是几何对象的代表元”这一事实仍然成立。因此，相交仍然是良定义的（横截相交），系数  $c_{u,v}^w$  作为权的多项式仍然可以由几何相交解释——只不过现在每个交点贡献的不只是一个计数 1，而是一个权的单项式（由该交点在 torus 作用下的权重决定）。**为何量子上同调更复杂？** 当进入量子上同调时，情况发生了本质变化：

- (1) **曲线代替点**：不再是计数点与点的交，而是计数满足特定 Gromov-Witten 不变量的曲线（稳定映射）。
- (2) **额外自由度**：稳定映射空间  $\overline{M}_{g,n}(G/P, d)$  的维数依赖于次数  $d$ ，这引入了额外的形式变量  $q^d$ 。
- (3) **非横截情形出现**：在量子情形中，Schubert 胞腔的“相交”不再是简单的点相交，而是涉及整条曲线的重合。这可能导致非横截情形，需要更精细的分析工具。
- (4) **Gromov-Witten 不变量的正性不显然**：即使稳定映射的个数是正的（这本身需要深入证明），每个映射贡献的权的多项式是否仍然是非负的？这正是 Mihalcea 要回答的问题。

**Mihalcea 的策略**：Mihalcea 的关键思想是：虽然量子上同调更复杂，但我们可以**退化** (degeneration) 到经典情形。具体来说，他利用了量子环面作用的退化：让某些参数趋于无穷大，量子上同调的乘法就退化回经典等变量子上同调的乘法。在这个退化过程中，Graham 的几何论证仍然有效——只是我们需要小心追踪  $q$  变量的行为和新的权结构。**总结**：Graham 的证明依赖几何，因为：

- Schubert 类在几何上对应 Schubert 胞腔
- 类乘法对应胞腔相交
- 横截性保证相交是良定义的
- 相交个数/权多项式就是展开系数

量子上同调之所以更复杂，是因为“点相交”变成了“曲线计数”，这引入了新的技术挑战。但 Mihalcea 的工作表明，核心正性在从点到曲线的推广中仍然保持。

### 35. $B^-(w)$ 与 $B^-$ 的关系

**35.1. 问题**  $B^-(w)$  是什么？它和  $B^-$  有什么关系？

**35.2. 回答. 定义回顾:** 根据定义 1.25 (子群  $N^-(w)$  与  $B^-(w)$ ), 我们有:

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

**各符号的含义:**

- $B^-$ : 相反 Borel 子群 (下三角可逆矩阵群)
- $N^-$ :  $B^-$  的幂幺根基 (单位下三角矩阵)
- $T$ : 极大环面 (对角矩阵群,  $T = B \cap B^-$ )
- $N^-(w)$ :  $N^-$  中 “固定”  $w$  的子群
- $B^-(w)$ : 由  $T$  和  $N^-(w)$  生成的子群 (半直积)

**极端情形:**

- 当  $w = w_0$  (最长元) 时:  $B^-(w_0) = T$  (因为  $N^-(w_0) = \{e\}$ )
- 当  $w = e$  (单位元) 时:  $B^-(e) = B^-$

**几何意义:**  $B^-(w)$ -不变的闭链在 Schubert 胞腔的相交理论中扮演重要角色。直观上:

- (1)  $B^-$  是最大的群条件 (最弱的要求) —— 任意  $B^-$  不变闭链
- (2)  $B^-(w)$  是更小的群条件 (更强的要求) —— 只有  $B^-(w)$  不变的闭链
- (3)  $B^-(w)$  越大 ( $w$  越短),  $B^-(w)$ -不变闭链的条件越弱, 正性越难保证

**为什么 Refined Graham Positivity 更强:** 原始 Graham 要求  $B^-$ -不变闭链, 而 Refined 版本要求  $B^-(w)$ -不变闭链。条件更弱 (更容易满足), 但结论反而更强——根被限制在  $I(w)$  而非所有正根。这似乎矛盾, 但实际上是因为 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性。

### 36. $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)}$ 的含义

**36.1. 问题.** 在 Refined Graham Positivity 的证明中, 系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$  这个符号是什么意思? 为什么用  $-\alpha$  而不是  $\alpha$ ?

**36.2. 回答. 符号分解:** 记号  $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$  表示 “以  $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$  为变量的非负整数系数多项式”。更仔细地:

- $\mathbb{N}[x_1, x_2, \dots, x_k]$ :  $k$  个变量的非负整数系数多项式环
- $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$ : 变量集合

**具体例子:** 由第 3.2 行的计算,  $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ , 因此

$$-\alpha = -(y_j - t_i) = t_i - y_j$$

所以  $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$ , 这正是 Graham Positivity 断言的系数形式。**为什么是  $-\alpha$  ?**:

- (1) **符号约定:** 在等变量子同调中,  $T$  的权通常用负根表示。具体来说,  $H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$  中  $t_i$  对应负根  $-\epsilon_i$ 。
- (2) **Corollary 2.4 的形式:** 第 1.2 行的 Corollary 2.4 给出

$$[Y]_T = \sum_{w \in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^- w B / B}]_T$$

这里  $\mathbb{N}[-\alpha]$  表示系数是关于负根的非负多项式。

- (3) **链式法则:** 在证明中 (第 3.2 行), 因为交集在  $N^-(\tau)$  下闭, 而  $N^-(\tau)$  的李代数与  $I(\tau) = \{y_j - t_i\}$  相关, 所以最终系数出现在  $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$  中。

**直观理解：**这是把“关于  $t_i - y_j$  的非负整数系数多项式”写得更加抽象和紧凑的形式。两种写法完全等价：

$$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

### 37. EQLR 系数的定义与意义

**37.1. 问题.** EQLR 系数是什么？它在等变量量子上同调中扮演什么角色？

**37.2. 回答.** **EQLR = Equivariant Quantum Littlewood-Richardson** (等变量量子 Littlewood-Richardson) EQLR 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  是等变量量子上同调  $QH_T^*(X)$  中的结构常数, 由以下展开式定义：

$$\sigma(u)^T \circ \sigma(v)^T = \sum_{w,d} q^d \cdot c_{u,v}^{w,d} \cdot \sigma(w)^T$$

其中：

- $\sigma(u)^T$  是  $T$ -等变 Schubert 类
- $q^d$  是量子参数 (对应 Gromov-Witten 不变量)
- $d$  是多重次数 (quantum degree)

**几何含义：**从几何上看，EQLR 系数由等变 Gromov-Witten 不变量定义为：

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T ((ev_1^T)^*(\sigma(u)^T) \cdot (ev_2^T)^*(\sigma(v)^T) \cdot (ev_3^T)^*(\tilde{\sigma}(w)^T))$$

其中  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  是稳定映射的模空间， $ev_i$  是评估映射。**Mihalcea 定理 (Theorem 1)：**Mihalcea 证明了：设  $u, v, w \in W^P$  且  $d$  为多重次数，则 EQLR 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  是关于负单根系  $x_1, \dots, x_r$  的非负系数多项式。**与经典 LR 系数的区别：**

- 经典 LR 系数  $c_{u,v}^w$ ：非负整数 (计数的几何相交点数)
- 等变 LR 系数  $c_{u,v}^w(y, t)$ ：关于  $t_j - y_i$  的非负多项式
- EQLR 系数  $c_{u,v}^{w,d}$ ：关于负根  $x_1, \dots, x_r$  的非负多项式 (带量子参数  $q^d$ )

**证明思路：**Mihalcea 的核心思想是**归约**——将 EQLR 系数的计算归约到已经在 Graham Positivity 定理中解决的问题。具体步骤：

- (1) 考虑空间  $X \times X$  及其半直积  $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$  的作用
- (2) 利用投影公式将 EQLR 系数的计算归约到  $X \times X$  上的计算
- (3) 应用 Graham 的正性定理 (Proposition 6.1)： $[V]_T$  可以唯一表示为  $[Y(u) \times Y(v)]_T$  的非负系数线性组合
- (4) 使用等变 Poincaré 对偶完成证明

**为什么重要：**EQLR 系数的正性性质是等变量量子上同调的核心结构。它连接了：

- 经典 Schubert calculus (cohomology)
- 等变上同调 (equivariant cohomology)
- 量子上同调 (quantum cohomology)

这三种理论在旗流形的 Schubert calculus 中统一起来。<sup>20</sup>

### 38. 双重 Schubert 多项式的除差算子定义

**38.1. 问题.** 双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  如何用除差算子定义？

<sup>20</sup>问：EQLR 系数是什么？见附录 section 37。



## 38.2. 回答. 定义 (参考 Kirillov-Maeno [21]):

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$$

其中:

- $\partial_{w^{-1}w_0}^{(x)}$  表示只在  $x$  变量上施加除差算子
- 顶部多项式 (top polynomial)  $\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$  对应最长置换  $w_0$

与单重情形的对比:

| 情形 | 定义公式                                                                               | 顶部多项式                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 单重 | $\mathfrak{S}_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0}(x^\delta)$                               | $x^\delta = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ |
| 双重 | $\mathfrak{S}_w(x, y) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$ | $\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$         |

关键性质:

- (1)  $\partial_i^{(x)}$  只作用在  $x$  变量上,  $y$  变量保持不变
- (2) 递推关系:  $\mathfrak{S}_{ws_i}(x, y) = \partial_i^{(x)} \mathfrak{S}_w(x, y)$  (当  $i$  是  $w$  的 descent 时)
- (3) 对称性:  $\mathfrak{S}_w(x, y) = (-1)^{\ell(w)} \mathfrak{S}_{w_0 w}(y, x)$
- (4) 退化: 当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时,  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

$S_2$  的具体例子: 在  $S_2$  中,  $n = 2$ ,  $w_0 = 21$ , 顶部多项式为  $\prod_{i+j \leq 2} (x_i + y_j) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)$ 。

- $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{12}^{(x)} [(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)] = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{21}^{(x)} [(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)] = x_2 + y_1$

$S_3$  的具体例子 (详细计算): 在  $S_3$  中,  $n = 3$ ,  $w_0 = 321$ , 顶部多项式为

$$\prod_{i+j \leq 3} (x_i + y_j) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$$

(共有  $\binom{3+1}{2} = 6$  个因子, 因为满足  $i+j \leq 3$  的  $(i, j)$  对为:  $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 1)$ ) 通过除差算子计算:

- $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_1^{(x)} \mathfrak{S}_{321} = (x_1 + x_2)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_3 + y_1) + (x_1 + x_2)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_2 + x_3)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1) + (x_1 + x_3)(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + x_2)(x_1 + y_1)(x_1 + y_3)(x_3 + y_1) + (x_1 + x_3)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)$
- $\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + x_2)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1) + (x_2 + x_3)(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1$  (恒等置换)

验证:  $y = 0$  退化检查当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时, 双重 Schubert 多项式应退化为经典 Schubert 多项式:

- $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = x_1^3 x_2^2 x_3$  (经典顶部多项式)
- $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = x_1^2 x_2^2 x_3 + x_1^2 x_2 x_3^2 = x_1^2 x_2 x_3 (x_2 + x_3)$

除差算子的几何意义: 除差算子  $\partial_i$  在几何上对应于沿第  $i$  个超平面进行截面, 递归地将高维相交问题降维。<sup>21</sup>

<sup>21</sup>除差算子的几何意义见附录 section 33。

### 39. $N^-(w)$ 与 Schubert 胞腔 $B^-wB/B$ 的同构

**问题.** 为什么  $N^-(w)$  同构于 Schubert 胞腔  $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ ? 请解释几何直观、代数同构映射的意义, 以及为什么这个同构说明  $N^-(w)$  是连通的。

**回答. 1. 几何直观: 维数公式**  $\dim N^-(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$   $N^-$  是单位下三角矩阵群, 维数为  $\binom{n}{2}$  (下三角矩阵的非对角元有  $\binom{n}{2}$  个自由参数)。作为簇,  $N^-$  同构于  $\mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$ , 因为每个元素可以唯一写为根子群的乘积:

$$N^- \cong \prod_{\alpha \in \Phi^-} U_\alpha$$

其中  $U_\alpha \cong \mathbb{C}$  是对应负根  $\alpha$  的单参子群。  $N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$  的维数取决于哪些负根  $\alpha$  满足  $w(\alpha) > 0$  (即  $w$  把负根变成正根)。关键在于:

$$N^-(w) = \prod_{\substack{\alpha \in \Phi^- \\ w(\alpha) > 0}} U_\alpha$$

负根是  $\Phi^- = \{-\epsilon_i + \epsilon_j : 1 \leq j < i \leq n\}$ , 共  $\binom{n}{2}$  个。  $w(\alpha) > 0$  的负根  $\alpha$  个数等于  $|J(w)| = \binom{n}{2} - \ell(w)$ , 其中  $J(w) = \{(i, j) : i < j, w(i) < w(j)\}$  是  $w$  的非逆序集。因此:

$$\dim N^-(w) = \binom{n}{2} - \ell(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$$

**几何图像:**  $N^-$  本身同构于最大的相反 Schubert 胞腔  $B^-w_0B/B \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$ 。而  $N^-(w)$  是  $N^-$  的一个“切片”, 只保留那些  $w$  不翻转的负根方向。**2. 代数同构:**  $N^-(w) \cong B^-wB/B$  构造同构映射:

$$\phi : N^-(w) \rightarrow B^-wB/B, \quad x \mapsto xwB/B$$

**验证是良好定义的:** 若  $x \in N^-(w)$ , 则  $x \in N^- \subset B^-$ , 所以  $xwB \in B^-wB$ , 陪集  $xwB/B$  落在  $B^-wB/B$  内。**单射性:** 若  $xwB/B = ywB/B$ , 则  $w^{-1}x^{-1}yw \in B$ 。同时  $w^{-1}x^{-1}yw \in w^{-1}N^-w \cap N^- = N^-(w)$ 。但  $B \cap N^-(w) = \{e\}$ , 所以  $x = y$ 。**满射性:** 任取  $B^-wB/B$  中元素。由于  $B^- = N^-T$ , 任意元素可写为  $n_1twB = n_1w(w^{-1}tw)B$ 。但  $w^{-1}tw \in T \subset B$ , 所以实际上  $n_1twB = n_1wB$ , 且  $n_1 \in N^-, n_1 \in N^-(w)$ 。**3. 同构映射  $x \mapsto xwB/B$  的意义**  $G/B$  是齐性空间,  $B^-wB/B$  是过基点  $wB/B$  的胞腔。映射  $x \mapsto xwB/B$  把  $N^-(w)$  中的元素  $x$  看作“旗的位移”——把基旗  $wB/B$  推到旗  $xwB/B$ 。 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$  提供了胞腔  $B^-wB/B$  的自然坐标系。每个  $x \in N^-(w)$  指定了胞腔中一个唯一点。从齐性空间角度看,  $wB/B$  的稳定化子是  $B$ , 而  $N^-(w)$  是那些“与  $w$  的相对位置在  $N^-$  中”的元素构成的子群。**4. 连通性**  $N^-$  是幂么群 (unipotent group), 指数映射  $\exp : \mathfrak{n}^- \rightarrow N^-$  是双射 (代数群情形的对数映射)。因此  $N^-$  微分同胚于其李代数  $\mathfrak{n}^- \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$ , 是连通的。 $N^-(w)$  是  $N^-$  的闭子群, 因此作为代数群也是连通的。同构  $N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$  说明  $N^-(w)$  是仿射空间。仿射空间是连通的 (甚至单连通)。**参考文献:** Humphreys, [16, Section 28]。<sup>22</sup>

### 40. 置换除法记号 $w_0/w$ 的含义

**40.1. 问题.** 在 Corollary 1.2 (Kirillov 猜想) 的证明中, 出现了  $v = w_0/w$  和  $\partial_{w/w_0/w}$  的记号。这里的除法 “/” 是什么意思?

<sup>22</sup>问: 为什么  $N^-(w) \cong B^-wB/B$ ? 见附录 section 39。

**40.2. 回答.** 这个记号在笔记正文中没有明确定义，这是一处需要补充的漏洞。以下是根据上下文和 Schubert calculus 惯例的推测：**组合学来源：**在棋盘 (board) 理论和车多项式 (rook polynomial) 中，“/” 表示斜差 (skew difference) ——即从一个大形状中挖去一个小形状后剩余的部分。**在本定理中的含义 (推测)：**

- $w_0$  是最长置换 (longest element), 在  $S_n$  中是反序置换  $w_0 = n n-1 \cdots 2 1$
- $w$  是任意置换
- $w_0/w$  可能表示：从  $w_0$  对应的方块形状中移除  $w$  对应的方块后剩余的“斜差形状”

**为什么使用这个记号？** 在 skew 除差算子的定义中，

$$\partial_{w/v} = \sum_{\substack{u \\ v \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \partial_u$$

要求  $v \leq u \leq w$  (Bruhat 序)。取  $v = w_0/w$  使得  $w_0$  通过  $w$  和  $w_0/w$  的“夹击”来确定一个特殊的区间。**重要说明：**这个记号的精确定义需要参考原始论文 (Samuel, 2024)。建议查看原始文献或补充定义。

### 40.3. 相关但未定义的概念.

- $\partial_{w/w_0/w}$  是嵌套的 skew 除差算子——先做关于  $w_0/w$  的，再做关于  $w$  的
- $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$  是最长置换的 Schubert 多项式 (单项式)

**40.4. 具体例子 ( $S_3$  的情形).** 取  $n = 3$ , 则  $S_3$  中的置换可以用一行记号表示：**最长置换：** $w_0 = 321$  (逆序置换)，长度为  $\ell(w_0) = 3$  **重要澄清：** $w_0/w$  这个记号在组合数学中有特定含义，但笔记正文中没有给出精确定义。以下是结合除差算子含义的解释：**组合学解释：**在 Schubert calculus 中， $w_0/w$  表示从  $w_0$  对应的“阶梯形”中移除  $w$  对应的形状后剩余的斜差形状 (skew shape)。用置换乘法 (从右到左复合) 的观点来看， $w_0/w$  可以解释为  $w_0 \cdot w^{-1}$  (即先做  $w$ , 再做  $w_0$ )：

- (1)  $w = 123$  (单位置换,  $\ell(w) = 0$ )
  - $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 123 = 321$
  - 因此  $w_0/w$  对应置换 321
- (2)  $w = 213$  (换位 (12),  $\ell(w) = 1$ )
  - $w^{-1} = 213$  (自逆)
  - $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 213$
  - 计算:  $321(2) = 1, 321(1) = 2, 321(3) = 3$ , 即 213
  - 因此  $w_0/w = 213$
- (3)  $w = 132$  (换位 (23),  $\ell(w) = 1$ )
  - $w^{-1} = 132$  (自逆)
  - $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 132$
  - 计算:  $321(1) = 3, 321(3) = 1, 321(2) = 2$ , 即 312
  - 因此  $w_0/w = 312$

**Bruhat 序约束：**在  $\partial_{w/v}$  的定义中要求  $v \leq u \leq w$  (Bruhat 序)。取  $v = w_0/w$  使得我们考虑的区间是：

$$w_0/w \leq u \leq w_0$$

这确保了当作用于  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})$  时，可以提取出与  $w$  相关的信息。**在 Kirillov 猜想证明中的作用：**取  $u = w$  且  $v = w_0/w$ , 则：

$$\partial_{w/v}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})) = \partial_{w/w_0/w}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}))$$

由于  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$  是单项式，作用于其上的除差算子可以显式计算。

#### 41. 幂么根基 $U$ 的含义

**41.1. 问题.** 在 Borel 子群分解  $B = T \cdot U$  中， $U$  称为“幂么根基”，这是什么意思？

**41.2. 回答. 幂么 (Unipotent) 的定义：** 一个代数群元素是幂么的，当且仅当它所有特征值都为 1（对于复代数群，这意味着它是单参数群的乘积，每个单参数群都是形如  $\exp(t \cdot N)$  的指数，其中  $N$  是幂零矩阵）。**几何直观：** 在  $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$  中，幂么矩阵的形式为上三角矩阵，对角线元素全为 1：

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

这种矩阵称为幂么，因为  $(u - I)^n = 0$ （幂零）。**在一般约化群中：** 设  $G$  为连通复约化群， $B \subset G$  为 Borel 子群， $T \subset B$  为极大环面。则

$$B = T \cdot U, \quad B^- = T \cdot U^-$$

其中  $U$  和  $U^-$  分别是包含在  $B$  和  $B^-$  中的极大幂么子群。**为什么叫“根基” (Radical)？** 在群论中，radical (根基) 是最大的可解理想。幂么根基  $U$  是  $B$  的一个闭子群，它是  $B$  的“尾部”——移除了 torus  $T$  的部分后，剩下的就是幂么群。 $U$  和  $U^-$  分别是对应于正根和负根的方向。**在旗流形中的作用：** 在旗流形  $G/B$  中，Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  可以通过幂么群  $U^-$  的作用参数化。具体而言，每个  $u \in U^-$  给出一个群作用  $u \cdot (wB/B) = uwB/B$ ，这正是胞腔上的坐标。**与旗的变化关系：** 当你看到一个旗被“提升”时，实际上是  $U^-$  中的元素在作用。例如在  $\mathrm{GL}_n$  中， $U^-$  是下三角幂么矩阵，它们把标准旗变成一般旗。

#### 42. 为何初始条件是 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$

**42.1. 问题.** 为什么 Schubert 多项式的初始条件是  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ ？这个公式的直观意义是什么？

**42.2. 回答. 核心原因：旗流形的上同调环结构** Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  是旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  上 Schubert 胞腔类的上同调代表元。其次数等于对应胞腔的维度，即  $\ell(w)$ 。**最长置换  $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$  的特殊情况：**

- (1) **几何维度：** 旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  的复维度是  $\binom{n}{2}$ ，恰好等于  $\ell(w_0)$ 。
- (2) **上同调环中的关系：** 在  $H^*(Fl_n)$  中，基本类之间满足关系  $\sum_{i=1}^n x_i = 0$ （因为旗流形是紧致的，Chern 类的和为零）。这意味着在多项式代表元中，变量  $x_n$  可以用其他变量消去。
- (3) **单项式基元的分圆条件：** Schubert 多项式在  $H^*(Fl_n)$  中构成多项式环  $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_{n-1}]$  的自由基。对于每个置换  $w$ ，指数向量  $(c_1, c_2, \dots, c_{n-1})$  满足  $0 \leq c_i \leq n-i$ 。
- (4) **最长置换的指数：**  $w_0$  对应的指数向量取最大值：

$$c_i = \#\{j > i : w_0(j) < w_0(i)\} = n - i$$

$$\text{因此 } \mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}.$$

**具体例子 ( $n=2$ ):** 对于  $S_2$ ,  $w_0 = 21$ :

$$\bullet i=1: c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2 : 1 < 2\} = 1$$

故  $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1^1 = x_1$ 。**具体例子 ( $n=3$ ):** 对于  $S_3$ ,  $w_0 = 321$ :

$$\bullet i=1: c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2, 3 : 1 < 3\} = 2$$

- $i = 2$ :  $c_2 = \#\{j > 2 : w_0(j) < w_0(2)\} = \#\{3 : 1 < 2\} = 1$

故  $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2^1 = x_1^2 x_2$ 。具体例子 ( $n = 4$ ): 对于  $S_4$ ,  $w_0 = 4321$ :

- $i = 1$ :  $c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2, 3, 4 : 3, 2, 1 < 4\} = 3$
- $i = 2$ :  $c_2 = \#\{j > 2 : w_0(j) < w_0(2)\} = \#\{3, 4 : 2, 1 < 3\} = 2$
- $i = 3$ :  $c_3 = \#\{j > 3 : w_0(j) < w_0(3)\} = \#\{4 : 1 < 2\} = 1$

故  $\mathfrak{S}_{4321}(\mathbf{x}) = x_1^3 x_2^2 x_3^1$ 。对比: 非最长置换的例子: 以  $w = 312 \in S_3$  为例, 其 code 为:

- $i = 1$ :  $c_1 = \#\{j > 1 : 312(j) < 312(1)\} = \#\{2, 3 : 1, 2 < 3\} = 0$
- $i = 2$ :  $c_2 = \#\{j > 2 : 312(j) < 312(2)\} = \#\{3 : 2 < 1\} = 0$

对应首项  $x_1^0 x_2^0 = 1$ 。实际计算得  $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$ , 首项是  $x_1$  (对应 Grassmannian 置换的分式)。规律总结: code 向量  $(c_1, \dots, c_{n-1})$  满足  $0 \leq c_i \leq n - i$ , 且  $w_0$  对应最大 code  $(n-1, n-2, \dots, 1)$ 。pipe dream (管道路径) 组合解释: 在 bumpless pipe dreams 模型中,  $w_0$  对应最“拥挤”的管道图, 所有管道都必须尽可能向右拐弯, 权重乘积恰好是  $\prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ 。

矩阵版本. 对于  $n = 3$ , 最长置换  $w_0 = 321$  的矩阵表示为:

$$w_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

即第一行是列指标, 第二行是置换后的行指标。对应的 code  $(c_1, c_2) = (2, 1)$  表示:

- $c_1 = 2$ : 第 1 列下面有 2 个数比 3 小 (2, 1)
- $c_2 = 1$ : 第 2 列下面有 1 个数比 2 小 (1)

Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2$  的指数向量 (2, 1) 恰好是 code 的直接反映。矩阵视角的意义: 在旗流形  $Fl_3(\mathbb{C})$  中,  $w_0$  对应的 Schubert 胞腔是最大维度的闭胞腔, 其上同调类由单项式  $x_1^2 x_2$  代表。

### 43. Humphreys Theorem 13.3 的内容

**43.1. 问题.** 在引理 2.2 的证明中, 引用了 Humphreys [16, Theorems 13.1 and 13.3] 来证明  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。Theorem 13.3 究竟说了什么?

**43.2. 回答. 定理内容 (Humphreys, *Linear Algebraic Groups*, Theorem 13.3, 原文第 2101 页): Theorem 13.3.** Let  $G$  be a connected algebraic group,  $H$  a closed connected subgroup. Then  $\mathfrak{h}$  is an ideal in  $\mathfrak{g}$  if and only if  $H$  is normal in  $G$ 。翻译: 设  $G$  为

连通代数群,  $H$  为闭连通子群。则  $\mathfrak{h}$  是  $\mathfrak{g}$  的理想, 当且仅当  $H$  是  $G$  的正规子群。在引理 2.2 证明中的应用: 该定理的 “easy half” 表明: 如果  $H$  是  $G$  的正规子群, 则  $\mathfrak{h}$  是  $\mathfrak{g}$  的理想。在 Gao-Xiong 的论文中, 我们需要证明: 当  $ws_i > w$  时,  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。通过李代数计算, 我们已经验证了  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想 (通过检查所有李括号  $[F_\alpha, F_\beta]$  是否仍在  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  中)。此时,  $N^-(ws_i)$  和  $N^-(w)$  都是连通交换正规子群 (因为它们都是幂么群的闭子群)。因此, Humphreys Theorem 13.3 保证了  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想这一事实可以提升到群层面—— $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。关键逻辑链条:

$$\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w) \text{ 且是理想} \xrightarrow{\text{Thm 13.3}} N^-(ws_i) \subset N^-(w) \text{ 且是正规子群}$$

references.bib 中的引用:

@book{humphreys1975, author = {Humphreys, James E.}, title = {Linear Algebraic Groups}  
这是代数群理论中的经典参考文献, Theorem 13.3 位于第 13 章 (关于幂么群的结构)。

**43.3. Theorem 13.1 与 Theorem 13.3 的区别.** 在引理 2.2 的证明中, 实际上引用了 Humphreys 的两个定理:

- **Theorem 13.1 (格对应定理, 原文第 2073 页): Theorem 13.1.** Let  $G$  be a connected algebraic group. The correspondence  $H \mapsto \mathfrak{h}$  is 1-1 and inclusion preserving between the collection of closed connected subgroups  $H$  of  $G$  and the collection of their Lie algebras, regarded as subalgebras of  $\mathfrak{g}$ . **翻译:** 设  $G$  为连通代数群。闭连通子群  $H$  与其李代数  $\mathfrak{h}$  之间的对应是一一映射且保持包含关系。此定理保证了我们可以从李代数  $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$  的包含关系提升到群层面  $N^-(ws_i) \subset N^-(w)$ 。
- **Theorem 13.3 (正规子群与理想的等价, 原文第 2101 页): Theorem 13.3.** Let  $G$  be a connected algebraic group,  $H$  a closed connected subgroup. Then  $\mathfrak{h}$  is an ideal in  $\mathfrak{g}$  if and only if  $H$  is normal in  $G$ . **翻译:** 设  $G$  为连通代数群,  $H$  为闭连通子群。则  $\mathfrak{h}$  是  $\mathfrak{g}$  的理想, 当且仅当  $H$  是  $G$  的正规子群。结合使用: 在验证了  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想之后, Theorem 13.3 保证  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。

两者结合使用, 是因为 Theorem 13.1 提供了从群到李代数 (和反向) 的对应, 而 Theorem 13.3 则给出了理想与正规子群的等价关系。<sup>23</sup>

#### 44. $S_{21}(x; y)$ 的计算问题

**44.1. 问题.** 在第一章  $S_2$  的计算例子中, 笔记给出了展开式与简洁公式, 它们看起来不同。这两种表达是否相等? 如果不相等, 哪个是正确的?

(1) 展开式 (错误使用公式导致):

$$S_{21}(x; y) = x_1^2 x_2 - x_1^2 y_1 - x_1 x_2 + x_1 y_1 + x_2 y_2 - y_1 y_2 - x_1 x_2 y_2 + x_1 y_1 y_2$$

(2) 简洁公式 (由定义直接给出):

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

**44.2. 分析. 使用除差算子验证:** 根据双重 Schubert 多项式的除差算子正确定义:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

注意这里是  $(x_i - y_i)$  而非  $(x_i - y_{w_0(i)})$ 。对于  $n = 2$ ,  $w_0 = 21$ , 对于  $w = 21$ :

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e$$

所以  $\partial_{w^{-1}w_0} = \partial_e = \text{id}$  (恒等算子)。因此:

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^2 (x_i - y_i) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

这与正文中的简洁公式一致。**原附录错误的原因:** 原附录使用了错误的公式  $\prod (x_i - y_{w_0(i)})$  而不是正确的  $\prod (x_i - y_i)$ , 导致得到了错误的结果  $(x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$ 。

<sup>23</sup>问: Humphreys Theorem 13.1 和 13.3 的具体内容是什么? 见附录 section 43。

**44.3. 结论.** 正文中的两种表述存在矛盾, 但分析发现: 附录中的除差算子公式写错了。正确的除差算子定义为:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

注意这里是  $\prod (x_i - y_i)$  而非  $\prod (x_i - y_{w_0(i)})$ 。对于  $w = 21$  ( $w_0 = 21$ ):

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e, \quad \partial_e = \text{id}$$

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

数值验证:  $(1-3)(2-4) = 4$ 。因此, 正文中的简洁公式  $\mathfrak{S}_{21} = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$  是正确的, 附录的展开计算有误 (错误地使用了  $y_{w_0(i)}$  而不是  $y_i$ )。

#### 45. $F_\alpha$ 是权为 $-\alpha$ 的根向量——是什么意思?

**问题.** 在第 1056 行,  $\mathfrak{n}^-(w) = \text{span}\{F_\alpha \mid \alpha \in J(w)\}$  中,  $F_\alpha$  是“权为  $-\alpha$  的根向量”。这里的“权”和“根向量”是什么意思?

**回答. 1. 什么是“根向量”?** 在  $\mathfrak{gl}_n$  中, 每个矩阵单位  $E_{ij}$  (第  $i$  行第  $j$  列为 1, 其余为 0) 都是一个根向量——因为它满足:

$$[H, E_{ij}] = \alpha(H) \cdot E_{ij}$$

其中  $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$  是权,  $H = \text{diag}(t_1, \dots, t_n) \in \mathfrak{h}$  是 Cartan 子代数中的任意对角矩阵<sup>24</sup>。2. 什么是“权”? 设  $H = \text{diag}(t_1, \dots, t_n) \in \mathfrak{h}$ , 伴随作用给出:

$$[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$$

这里:

- $[H, E_{ij}] = H \cdot E_{ij} - E_{ij} \cdot H$  是矩阵李括号 (Lie bracket), 衡量  $H$  和  $E_{ij}$  的非对易程度
- $\text{ad}_H(E_{ij}) = [H, E_{ij}]$  称为  $H$  对  $E_{ij}$  的伴随作用 (adjoint action)

**推导:** 由于  $H$  是对角矩阵,  $(H \cdot E_{ij})_{ik} = t_i E_{ijk}$ , 而  $(E_{ij} \cdot H)_{ik} = t_j E_{ijk}$ , 故  $[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$ 。数  $(t_i - t_j)$  就是  $E_{ij}$  的权, 记为  $\epsilon_i - \epsilon_j$ , 即  $\alpha(H) = t_i - t_j$ 。3. 正根 vs 负根在  $\mathfrak{gl}_n$  中:

- **正根**  $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$  ( $i < j$ )  $\rightarrow$  对应  $E_{ij}$  (上三角矩阵)
  - **负根**  $-\alpha = \epsilon_j - \epsilon_i$  ( $i < j$ )  $\rightarrow$  对应  $E_{ij}$  (下三角矩阵)
4.  $F_\alpha$  的含义在记号中,  $F_\alpha$  通常指对应负根  $-\alpha$  的根向量。所以:
- 若  $\alpha = \epsilon_1 - \epsilon_2$  (正根)
  - 则  $F_\alpha = E_{21}$  (下三角矩阵)
  - 且  $F_\alpha$  的权是  $-\alpha = \epsilon_2 - \epsilon_1$  (负根)
5. 具体例子 ( $\mathfrak{gl}_3$ )

| 根                         | 矩阵       | 类型 | 权         |
|---------------------------|----------|----|-----------|
| $\epsilon_1 - \epsilon_2$ | $E_{12}$ | 正根 | $+\alpha$ |
| $\epsilon_2 - \epsilon_1$ | $E_{21}$ | 负根 | $-\alpha$ |
| $\epsilon_1 - \epsilon_3$ | $E_{13}$ | 正根 | $+\beta$  |
| $\epsilon_3 - \epsilon_1$ | $E_{31}$ | 负根 | $-\beta$  |
| $\epsilon_2 - \epsilon_3$ | $E_{23}$ | 正根 | $+\gamma$ |
| $\epsilon_3 - \epsilon_2$ | $E_{32}$ | 负根 | $-\gamma$ |

<sup>24</sup>即 定义 1.21 中的 Cartan 子代数。

**6. 为什么  $\mathfrak{n}^-(w)$  用  $F_\alpha$  (负根向量) ?** 因为  $\mathfrak{n}^- = \text{Lie}(N^-)$ , 而  $N^-$  是下三角幂幺矩阵群, 其李代数由负根空间张成。所以  $\mathfrak{n}^-(w)$  中的  $F_\alpha$  对应负根  $-\alpha$ , 即权为  $-\alpha$ 。<sup>25</sup>

#### 46. $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 与标准 Schubert 多项式的关系

**46.1. 问题.**  $[\overline{B^-wB/B}]_T$  (等变量子上同调类) 和标准 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  有什么关系?

**46.2. 回答. 核心关系:**  $[\overline{B^-wB/B}]_T$  是几何对象 (等变量子上同调类), 而  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是它的多项式代表元。**Theorem 10.6.4 ([2, Theorem 10.6.4], 原文):** 设  $T$  通过字符  $\chi_1, \dots, \chi_n$  作用在  $Fl(\mathbb{C}^n)$  上, 则对任意  $w \in S_n$ , 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  在代入

$$x_i = -c_1^T(\mathbb{S}_i/\mathbb{S}_{i-1}), \quad y_i = -\chi_i$$

时映射到  $\sigma_w = [\overline{B^-wB/B}]_T$ 。即

$$\sigma_w = \mathfrak{S}_w(x; y) \quad \text{in} \quad H_T^* Fl(\mathbb{C}^n)$$

**变量说明:**

- $x_i = -c_1^T(\mathbb{S}_i/\mathbb{S}_{i-1})$  来自旗流形的自丛 (tautological subbundle)
- $y_i = -\chi_i$  来自 torus  $T$  的作用权

**具体对应** (来自 [2, Theorem 10.6.4]):

- (1) 等变量子上同调类:  $[\overline{B^-wB/B}]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$
- (2) 双重 Schubert 多项式代表元:  $[\overline{B^-wB/B}]_T$  由  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  表示
- (3) 退化为标准 Schubert 多项式: 当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时,

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$$

**几何含义:**

- $[\overline{B^-wB/B}]_T$  是旗流形中 Schubert 胞腔闭包  $\overline{B^-wB/B}$  的等变量子上同调类
- $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是这个上同调类的多项式代表元 (方便计算)
- $\mathbf{y}$  变量编码了 torus  $T$  作用的信息

**为什么需要双重版本?** 设  $H_T^*(\text{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$ , 则

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \in H_T^*(Fl_n) \cong \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]^{\mathfrak{S}_n}[t_1, \dots, t_n]/\text{relations}$$

当把  $x_i$  替换为 0 时,  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{0}; \mathbf{y})$  给出了等变量子上同调类在固定点处的 restrictions, 这些 restrictions 编码了 Schubert 胞腔的定位信息。**总结表:**

| 对象              | 记号                                       | 所在空间                                           |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 等变量子上同调类        | $[\overline{B^-wB/B}]_T$                 | $H_T^*(Fl_n)$                                  |
| 双重 Schubert 多项式 | $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ | $\mathbb{Z}[x, y]$                             |
| 标准 Schubert 多项式 | $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$             | $\mathbb{Z}[x]$ (当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ ) |

#### 47. Anderson-Fulton Section 19.3: 横截性方法

Anderson-Fulton 的 [2, Section 19.3] 建立了横截性 (transversality) 方法, 用于证明 Schubert 结构常数的正性。

<sup>25</sup>问:  $F_\alpha$  是权为  $-\alpha$  的根向量是什么意思? 见附录 section 45。



**47.1. 什么是横截性 (Transversality) ?.** **横截相交的定义:** 设  $Y, Z \subseteq X$  是非奇异簇  $X$  的子簇。如果  $Y \cap Z$  要么为空, 要么是纯维数的, 且

$$\operatorname{codim}_X(Y \cap Z) = \operatorname{codim}_X Y + \operatorname{codim}_X Z$$

则称  $Y$  与  $Z$  横截相交 (intersect properly/transversally)。**几何直观:** 想象两条曲线在平面上相交:

- 如果它们在交点处“平滑地”穿过彼此 (切向量线性无关), 则是横截的
- 如果一条曲线在另一点处“相切”或“平滑地接触”, 则不是横截的

**为什么横截性重要?:** 当两个子簇横截相交时, 其相交次数 (intersection number) 是良定义的非负整数。这是因为相交局部上是线性空间的相交, 交叉点可以用重数 (multiplicity) 来计数。

**47.2. 核心定理. Theorem 19.3.1 (Positivity Theorem, 原文):** 设  $Z \subseteq G/P$  是  $T$ -不变子簇, 在 Schubert 基底写下其类为

$$[Z]_T = \sum_{[u]} c_{[u]} x[u]$$

则每个  $c_{[u]}$  属于  $\mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$ , 即简单根的正系数多项式。**Corollary 19.3.2 (Graham, 原文):** 在等变量子同调  $H_T^*(G/P)$  中, 使用相反 Schubert 基  $\{y[w]\}$  时的结构常数  $c_{[u][v]}^{[w]}$  是正根  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  的非负系数多项式:

$$c_{[u][v]}^{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$$

**Lemma 19.3.4 (Kleiman-Bertini 定理, 原文):** 设  $\Gamma$  是连通代数群在不可约簇  $X$  上传递作用,  $Y, Z \subseteq X$  是不可约子簇。存在稠密开子集  $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$  使得对所有  $g \in \Gamma^\circ$ ,  $gY$  与  $Z$  横截相交。**Lemma 19.3.5 (精细版 Kleiman-Bertini, 原文):** 设  $\Gamma$  是连通代数群在非奇异不可约簇  $X$  上作用, 有有限多个轨道  $X_1, \dots, X_n$ 。设  $Y \subseteq X$  是不可约子簇, 假设  $Y$  与每个  $\Gamma$ -轨道横截相交。给定另一个不可约子簇  $Z$ , 存在稠密开子集  $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$  使得对所有  $g \in \Gamma^\circ$ ,  $gY$  与  $Z$  横截相交。

**47.3. 非 equivariant 情形的证明思路.** 在非 equivariant 情形 ( $T$  平凡作用), 正性证明非常简洁:

- (1) 由 Lemma 19.3.4, 存在  $g \in G$  使得  $gY[w]$  与  $Z$  横截相交
- (2) 由基本相交理论 (Proposition A.3.3), 横截相交的类是:

$$[Y] \cdot [Z] = \sum_V m_V [V]$$

其中  $m_V \geq 0$  是相交重数

- (3) Schubert 胞腔的结构常数是:

$$c_{[w]} = \int y[w] \cdot [Z]$$

- (4) 由于  $gY[w]$  与  $Z$  横截相交, 上式化为  $c_{[w]} = \int [gY[w] \cap Z]$
- (5) 由基本性质,  $\int [V]$  在  $V$  是点时为 1, 否则为 0
- (6) 因此  $c_{[w]} \geq 0$  (非负整数)

**47.4. equivariant 情形的证明思路.** equivariant 情形的证明更加精细，因为需要处理 torus 作用带来的权：

- (1) 在 approximation space  $\mathbf{X} = \mathbb{E} \times^T G/P$  上工作
- (2) 使用群  $\Gamma = \Gamma_f \rtimes (GL_m)^r$  在  $\mathbf{X}$  上的作用
- (3) 由 Lemma 19.3.5, 存在  $g \in \Gamma$  使得  $g\mathbf{Y}[w]$  与  $\mathbf{Z}$  横截相交
- (4) 利用 Poincaré 对偶和 Gysin 映射的基本性质
- (5) 由于 Gysin 映射保持有效类 (effective class),  $c_{[w]}$  是有效类
- (6) 因此  $c_{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$

**关键洞察：**在普通上同调中，横截相交给出非负整数；在 equivariant 上同调中，横截相交给出正根多项式的非负系数。

**47.5. 在引理 2.5 证明中的应用.** 在引理 2.5 的证明中，横截性由 Kleiman-Bertini 分析保证：

- 设  $w_0^{(m)} \in S_m$  是最长排列
- 对于  $w, \pi \in S_n$ , 记  $w \times \pi \in S_{2n}$  为直和
- 由  $v \in S_n$  知  $\overline{B^{-v}B/B}$  在  $s_i$  ( $n \leq i < 2n$ ) 下不变
- 因此  $\overline{B^{-v}B/B} = u_0 \overline{B^{-v}B/B}$ , 其中  $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$
- 类似地  $\overline{\tau B^{-u}B/B} = \tau u_0 \overline{B^{-u}B/B}$
- 由于  $u_0^{-1} \tau u_0 = w_0^{(2n)}$ , 交集的横截性由 [2, Lemma 19.3.5] 保证

**Footnote:** Theorem 19.4.4 的退化证明见附录 section 48。

## 48. Anderson-Fulton Theorem 19.4.4: 退化命题

本节内容来自 Anderson & Fulton 的《Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry》[2] 第 19.4 节 (pages 371-377)。这是 Graham 退化证明的详细版本，用于证明 Schubert 结构常数的正性。

**48.1. 预备概念.** 在阅读本节之前，读者需要熟悉以下概念。由于这是大二学生可能未学过的内容，我们在此给出简要说明。

**48.1.1. 代数群与环面.** **线性代数群：**域  $\mathbb{C}$  上的线性代数群是  $GL_n(\mathbb{C})$  的闭子群。例如  $GL_n, SL_n, B_n$  (上三角矩阵群) 等。**连通性：**群  $G$  是连通的，如果它作为拓扑空间 (赋予 Zariski 拓扑) 不能分解为两个非空开集的并。所有 Borel 子群都是连通的。**可解群：**群  $G$  是可解的，如果其导出列最终平凡：

$$G \supseteq [G, G] \supseteq [[G, G], [G, G]] \supseteq \cdots \supseteq \{e\}.$$

例如，所有 Borel 子群  $B$  都是可解的。**最大环面 (Maximal torus):** 设  $G$  是连通线性代数群。 $G$  的一个**最大环面**  $T$  是  $G$  中同构于  $(\mathbb{C}^*)^r$  的极大子群，其中  $r = \text{rank}(G)$  称为  $G$  的秩。直观理解：环面  $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$  是一个“阿贝尔的” (可交换的) 子群，在很多方面像是线性代数群的“坐标系”。例如：

- 在  $GL_n$  中，对角矩阵的集合形成一个最大环面  $T \cong (\mathbb{C}^*)^n$ 。
- 在  $SL_n$  中，对角矩阵中行列式为 1 的子群是最大环面， $T \cong (\mathbb{C}^*)^{n-1}$ 。

**特征标 (Character):** 环面  $T$  的一个特征标是群同态  $\chi: T \rightarrow \mathbb{C}^*$ 。所有特征标构成的群记为  $\hat{T}$ ，在  $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$  时有  $\hat{T} \cong \mathbb{Z}^r$ 。例如，如果  $T = (\mathbb{C}^*)^n$  由对角矩阵  $\text{diag}(t_1, \dots, t_n)$  组成，则  $t_i$  的第  $i$  个坐标给出特征标  $\varepsilon_i: \text{diag}(t_1, \dots, t_n) \mapsto t_i$ 。

48.1.2. 闭链与有效闭链. **闭链 (Cycle)**: 在代数几何中, 闭链是代数簇的闭子簇的整系数线性组合。例如,  $Y$  是  $X$  的闭子簇, 则  $[Y]$  是一个闭链。**有效闭链 (Effective cycle)**: 如果闭链中所有系数都是非负整数, 则称其为有效闭链。也就是说, 有效闭链只是若干闭子簇的“并”(带重数), 没有“负部”。**维数**: 设  $Y$  是复代数簇,  $\dim Y = k$  表示  $Y$  是  $k$  维复簇 (实维数  $2k$ )。

48.1.3. 等变量子上同调. 这是将拓扑的“上同调”与“群作用”结合的理论。**等变量子上同调**  $[Y]_T$ : 设  $T$  在  $X$  上作用。 $X$  的  $T$ -等变量子上同调  $H_T^*(X)$  是一个同时编码了  $X$  的拓扑信息和  $T$  作用信息的环。直观理解: 普通上同调  $H^*(X)$  只关心  $X$  的形状; 等变量子上同调  $H_T^*(X)$  额外记录了  $T$  在  $X$  上怎么动。**类**  $[Y]_T$ : 如果  $Y \subseteq X$  是  $T$ -不变子簇 ( $T$  保持  $Y$ ), 则  $Y$  在等变量子上同调中有一个类  $[Y]_T \in H_T^*(X)$ 。

- 当  $T$  平凡作用时,  $[Y]_T$  就是普通的类  $[Y] \in H^*(X)$ 。
- $[Y]_T$  包含了更多关于  $Y$  与  $T$  轨道关系的信息。

**B-不变**: 如果群  $B$  作用在  $X$  上, 子簇  $Y$  是  $B$ -不变的 ( $B$ -invariant) 意味着对所有  $b \in B$ , 有  $bY = Y$ 。这保证了  $Y$  在  $B$  作用下结构稳定。

48.1.4. 幂么根基. **幂么群 (Unipotent group)**: 一个元素  $g$  是幂么的, 如果  $(g-I)^m = 0$  对某个  $m$  成立。幂么矩阵群由所有特征值都为 1 的矩阵组成。**幂么根基 (Unipotent radical)**: 设  $B$  是连通可解代数群。 $B$  的幂么根基  $U$  (记作  $U = U_N$  或  $U_-$ ) 是  $B$  中所有幂么元素构成的正规子群。它满足:

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

直观理解:  $B$  可以分解为一个“阿贝尔的”“环面子群  $T$  和一个“幂么的”(三角阵对角线以上为 1) 子群  $U$  的半直积。在旗流形  $G/B$  的情形,  $U_-$  (或  $B^-$ ) 是下三角幂么群, 它在旗流形上的轨道正好是 Schubert 胞腔。

48.1.5. 纤维丛与纤维积. **纤维积**  $B \times_{B'} Y$ : 这是集合论中的“拉回”概念。设  $B$  作用在  $Y$  上,  $B' \subseteq B$  是子群。则

$$B \times_{B'} Y = \{(b, y) \in B \times Y : b \text{ 在 } B' \text{ 中的等价类} = \text{某个代表元在 } B' \text{ 中的位置}\}$$

在几何上, 这可以理解为以  $Y$  为纤维、 $B/B'$  为底空间的纤维丛。投影到  $B/B'$  给出丛结构。在 Proposition 19.4.4 的证明中,  $V = B \times_{B'} Y \rightarrow B/B' = \mathbb{A}^1$  是一个纤维丛, 纤维是  $Y$ 。

48.1.6. 交集的几种类型. 在代数几何中, 两个子簇的交有不同的“深度”:**Proper intersection (固有交集)**:  $Y$  与  $Z$  在  $X$  中的交是 proper 的, 如果交簇的维数等于  $\dim Y + \dim Z - \dim X$  (这正是“期望”的维数)。非 proper 交集意味着“维度异常”——可能维数更低了。**横截相交 (Transverse intersection)**: 在光滑点处, 如果两个子簇的切空间张成整个切空间, 则称它们横截相交。横截相交有良好的性质: 交点个数是孤立的 (有限的), 且个数在族中是稳定的。**Scheme-理论上相交**: 这是一种更精细的相交概念, 考虑了子簇的环结构而不只是集合论意义。 $V$  在  $\infty \times X$  中与  $\infty \times Y$  scheme-理论上相交, 意味着它们在无穷远点的相交方式由理想幂决定, 而不是简单的集合包含。直观理解: 这三种相交层层递进——scheme-理论上相交是最精细的, 横截相交是几何意义上“最好”的, proper 相交是维数意义上“正常”的。

48.1.7. 对角紧化. **对角作用**:  $B$  在  $X$  上的对角作用定义为  $b \cdot (x_1, x_2) = (bx_1, bx_2)$ 。这让  $B$  同时作用在积  $X \times X$  的两个分量上。**紧化**  $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$ : 仿射直线  $\mathbb{A}^1$  不是紧致的 (如  $\mathbb{C}$  不是紧致的), 但射影直线  $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$  是紧致的。通过添加无穷远点, 我们得到紧化。在 Proposition 19.4.4 的证明中: 利用  $B$  在  $\mathbb{P}^1$  上的作用 (由引理 19.4.2-19.4.3 给出), 我们将纤维丛  $V \rightarrow \mathbb{A}^1$  紧化到  $\mathbb{P}^1 \times X$ , 然后利用  $\mathbb{P}^1$  上的关系 (19.1) 来“退化”——用 0 和  $\infty$  处的信息来控制整条纤维的信息。

48.1.8. 证明的核心思路总结. 有了以上预备知识, Proposition 19.4.4 的证明思路可以理解为:

- (1) 如果  $Y$  已经  $B$ -不变, 则无需分解。
- (2) 否则, 构造纤维丛  $V = B \times_{B'} Y \rightarrow \mathbb{A}^1$ , 它在  $\mathbb{P}^1$  中紧化。
- (3) 利用  $\mathbb{P}^1$  上的基本关系  $[\infty] = [0] + \chi[\mathbb{P}^1]$ , 与  $[V]$  作交。
- (4) 这将  $[Y]$  的计算“退化”到 0 和  $\infty$  处的纤维, 产生所需的分解  $[Y] = [Z_1] + \chi[Z_2]$ 。

这个技巧本质上是把一个难以直接计算的  $B'$ -不变类, 通过族化的思想 (纤维丛), 分解为更简单的  $B$ -不变类的组合。

## 48.2. 背景: 连通可解群与环面作用. 基本设定:

- $B$ : 复数域  $\mathbb{C}$  上的连通可解线性代数群
- $T \subseteq B$ : 最大环面 (torus)
- $X$ : 复射影簇 (complex projective variety)
- $T$  在  $X$  上作用, 只有有限多个固定点

**退化证明的核心思想:** 将  $B'$ -不变的闭链类  $[Y]_T$  分解为  $B$ -不变闭链类的线性组合, 系数是特征标的多项式。通过逐次应用这个分解, 可以将任意 Schubert 胞腔类的乘积展开系数写成正根的非负多项式。

**48.3. 基本例子:  $\mathbb{P}^1$  上的退化. Example 19.4.1:** 设  $B$  通过同态  $B \rightarrow \mathrm{GL}_2$  作用在  $\mathbb{P}^1$  上:

$$b \mapsto \begin{pmatrix} \chi(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中  $\chi: B \rightarrow \mathbb{C}^*$  是特征标,  $\varphi: B \rightarrow \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$  是满足

$$\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \chi(b_1) \varphi(b_2)$$

的正则函数。注意对  $t \in T$ , 有  $\varphi(t) = 0$  (因为  $T$  由半单元素组成)。此时  $T$  在  $\mathbb{C}^2$  上的权为  $\chi$  和 0。我们有:

$$H_T^* \mathbb{P}^1 = \Lambda[\zeta]/(\zeta + \chi)\zeta,$$

其中  $\zeta = c_1^T(\mathcal{O}(1))$ 。点  $0 = [1, 0]$  被  $B$  固定, 点  $\infty = [0, 1]$  被  $T$  固定, 且

$$[0]_T = \zeta, \quad [\infty]_T = \zeta + \chi.$$

由此得到关键关系 (公式 19.1):

$$(90) \quad [\infty]_T = [0]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1]_T.$$

**48.4. 幂么根基的设置.** 设  $U \subseteq B$  是幂么根基 (unipotent radical), 则  $U$  是  $B$  的正规子群, 且

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

设  $U' \subseteq U$  是  $B$  的正规子群, 满足  $\dim(U/U') = 1$ , 因此  $U/U' \cong \mathbb{G}_a$ 。(由于  $B$  可解, 这样的  $U'$  总是存在的。)  $T$  通过共轭作用在  $U$  上, 这给出  $T$  在  $U/U' \cong \mathbb{A}^1$  上的一个特征标作用。等价地, 如果  $\mathfrak{u} \supset \mathfrak{u}'$  是对应的李代数, 则  $\chi$  是  $T$  在  $\mathfrak{u}/\mathfrak{u}'$  上的权。设  $\theta: U \rightarrow \mathbb{G}_a$  是任意同态, 核为  $U'$ 。

**48.5. 引理 19.4.2 与 19.4.3. Lemma 19.4.2:** 上述  $B$  在  $\mathbb{G}_a$  上的作用由下式给出:

$$b \cdot z = \theta(u) + \chi(t)z,$$

其中  $b = ut$  ( $u \in U, t \in T$ ),  $z \in \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$ 。 **Lemma 19.4.3:** 设  $\chi : T \rightarrow \mathbb{C}^*$  是特征标, 定义  $\tilde{\chi} : B \rightarrow \mathbb{C}^*$  为其在  $B$  上的唯一扩张 ( $\tilde{\chi}(ut) = \chi(t)$ )。令  $\varphi : B \rightarrow \mathbb{C}$  为  $\varphi(ut) = \theta(u)$ 。则:

- (1)  $\varphi$  的零点簇是  $B'$ ;
- (2) 对  $b_1, b_2 \in B$ , 有  $\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \tilde{\chi}(b_1)\varphi(b_2)$ 。

因此映射  $b \mapsto \begin{pmatrix} \tilde{\chi}(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  是  $B$  到  $\mathrm{GL}_2$  的群同态。

**48.6. Proposition 19.4.4: 退化命题 (详细证明). 命题:** 设  $B$  在非奇异簇  $X$  上作用,  $T$  是最大环面。设  $B' \subset B$  是闭子群,  $\chi : T \rightarrow \mathbb{C}^*$  是特征标。假设  $Y \subseteq X$  是  $B'$ -不变的有效闭链,  $\dim Y = k$ 。则存在典则定义的  $B$ -不变有效闭链  $Z_1$  和  $Z_2$  ( $\dim Z_1 = k$ ,  $\dim Z_2 = k + 1$ ), 使得

$$(91) \quad [Y]_T = [Z_1]_T + \chi[Z_2]_T.$$

在  $H_T^{2n-2k} X$  中。

**证明** (来自 Anderson & Fulton, pp. 373-374): 只需对  $Y$  是不可约子簇的情形构造。若  $Y$  已经是  $B$ -不变的, 则取  $Z_1 = Y$ ,  $Z_2 = 0$  即得。否则, 令  $W$  为  $B \cdot Y$  在  $X$  中的闭包; 这是一个维数为  $k + 1$  的子簇。考虑

$$V = B \times_{B'} Y,$$

具有自然的左  $B$  作用。这是以  $Y$  为纤维、 $B/B' = \mathbb{A}^1$  为底空间的纤维丛。映射  $V \rightarrow \mathbb{A}^1 \times X$ ,  $[(b, y)] \mapsto (\varphi(b), b \cdot y)$  是一个  $B$ -等变的闭嵌入, 其中  $B$  在  $\mathbb{A}^1 \times X$  上对角作用。利用从两个引理得到的  $B$  在  $\mathbb{P}^1$  上的作用, 我们有  $B$ -等变的紧化  $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$ 。设  $V$  为  $V$  在  $\mathbb{P}^1 \times X$  中的闭包, 则  $V$  是维数为  $k + 1$  的  $B$ -不变子簇, 通过第二投影  $P^1 \times X \rightarrow X$  映射到  $W \subseteq X$ 。利用第一投影  $P^1 \times X \rightarrow P^1$  拉回关系 (19.1), 我们得到

$$(92) \quad [\infty \times X]_T = [0 \times X]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1 \times X]_T.$$

在  $H_T^2(\mathbb{P}^1 \times X)$  中。将两边与  $[V]_T$  作交:

- 左边:  $\infty \times X$  与  $V$  在  $\infty \times Y \subseteq V$  处有 scheme-理论上相交。这是因为  $\varphi$  的零点簇是  $B'$ , 而  $B'$  保持  $Y$ 。
- 右边:  $V \rightarrow \mathbb{P}^1$  是支配的, 所以  $V$  与  $0 \times X$  的交是形如  $0 \times Z_1$  的正维数为  $k$  的闭链。由于  $V$  和  $0 \times X$  都是  $P^1 \times X$  的  $B$ -不变子簇, 它们的交也是  $B$ -不变的, 因此  $Z_1 \subseteq X$  是一个  $B$ -不变的  $k$ -闭链。

于是得到

$$[\infty \times Y]_T = [0 \times Z_1]_T + \chi \cdot [V]_T$$

在  $H_T^{2n-2k+2}(\mathbb{P}^1 \times X)$  中。通过投影  $\mathbb{P}^1 \times X \rightarrow X$  推出

$$[Y]_T = [Z_1]_T + \chi \cdot d[W]_T,$$

其中  $d$  是映射  $V \rightarrow W$  的次数。故  $Z_1$  和  $Z_2 = dW$  即为所求的  $B$ -不变有效闭链。□

**48.7. Theorem 19.4.5: 链分解.** 在相同设置下, 假设我们选择了正规子群链

$$U = U_N \supset U_{N-1} \supset \cdots \supset U_0,$$

其中每个  $U_i$  被  $T$  正规化,  $U_{i-1}$  在  $U_i$  中正规, 且  $\dim U_i/U_{i-1} = 1$ 。设  $\chi_i$  是  $T$  在李代数  $\mathfrak{u}_i/\mathfrak{u}_{i-1}$  上的权, 记  $B_i = U_i \cdot T$ 。**定理:** 设  $Y$  是  $B_0$ -不变的有效  $k$ -闭链。则对每个  $I \subseteq \{1, \dots, N\}$ , 存在典则定义的  $B$ -不变有效闭链  $Z_I$  ( $\dim Z_I = k + |I|$ ), 使得

$$(93) \quad [Y]_T = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, N\}} \left( \prod_{i \in I} \chi_i \right) [Z_I]_T.$$

在  $H_T^{2n-2k} X$  中。

**证明:** 对  $N$  做归纳。 $N = 0$  的情形平凡。假设对  $N - 1$  的情形已证。对于  $J \subseteq \{1, \dots, N - 1\}$ , 我们有非负闭链  $Z'_J$  (关于  $B' = U_{N-1} \cdot T$  不变), 满足

$$[Y]_T = \sum_{J \subseteq \{1, \dots, N-1\}} \left( \prod_{j \in J} \chi_j \right) [Z'_J]_T.$$

对每个  $Z'_J$  应用 Proposition 19.4.4, 可得

$$[Z'_J]_T = [Z_J]_T + \chi_N [Z_{J \cup \{N\}}]_T,$$

其中  $Z_J$  和  $Z_{J \cup \{N\}}$  是非负的  $B$ -不变闭链。代入即得所求。□

**48.8. Corollary 19.4.7: 正性推论. 推论:** 对于对角嵌入  $\delta: G/P \hookrightarrow G/P \times G/P$ , 有

$$\delta_*(x^{[w]}) = \sum_{[u], [v]} c_{[u][v]}^{[w]} x^{[u]} \times x^{[v]},$$

其中每个系数  $c_{[u][v]}^{[w]}$  是正根的单项式的非负和。

**证明思路:** 将 Theorem 19.4.5 应用到  $B = (U \times U) \cdot T$  在  $X \times X$  上的对角作用。取  $U_0$  为对角  $U \subseteq U \times U$ ,  $U_N = U \times U$ , 则链给出分解。由于  $U$  在  $G/P$  上只有有限多个轨道,  $B$ -不变子簇都形如  $V_I \times W_I$ , 于是系数可写成正根单项式的非负和。特别地, 由于  $\mathfrak{u}$  的权空间都是一维的 (权就是正根), 这些系数是平方自由的。□

**参考文献:** Anderson, David, and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. Cambridge University Press, 2023. Section 19.4, pages 371-377.

## 49. $k$ -Grassmannian 排列与线性因子乘积的等价性

**49.1. 问题.** 正文说:  $k$ -Grassmannian 排列  $w$  的 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以写成线性因子的乘积。反过来是否成立? 即, 如果  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以写成线性因子的乘积, 能否推出  $w$  是  $k$ -Grassmannian 排列?

**49.2. 回答. 结论: 是的, 反过来也成立.** 这实际上是  $k$ -Grassmannian 排列的一个等价刻画。**等价定义:** 一个排列  $w \in S_n$  是  $k$ -Grassmannian 的, 当且仅当其双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以分解为  $k$  个线性因子的乘积:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^k (x_{a_i} - y_{b_i})$$

**证明思路:**

- (1) **充分性 (Grassmannian  $\Rightarrow$  线性因子)**: 已在正文 (例 1.14) 证明。 $k$ -Grassmannian 排列  $w$  对应的 Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  是 Grassmannian  $G/P$  的子簇, 其坐标环是多项式环的商, 故  $\mathfrak{S}_w$  有因子化形式。
- (2) **必要性 (线性因子  $\Rightarrow$  Grassmannian)**: 设  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是  $k$  个线性因子的乘积。则  $\mathfrak{S}_w$  作为  $\mathbf{x}$  的多项式, 每个因子关于  $\mathbf{x}$  都是线性的。这意味着  $w$  对应的旗流形子簇在某些方向上是线性的, 这正是 Grassmannian 子簇的特征。更形式地说, 如果  $w$  不是 Grassmannian, 则  $\mathfrak{S}_w$  包含关于  $\mathbf{x}$  的二次或更高次项。

**具体例子验证:**

- $w = 231$  (非 Grassmannian):  $\mathfrak{S}_{231} = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$ ——不能写成线性因子的乘积
- $w = 21$  (1-Grassmannian):  $\mathfrak{S}_{21} = x_1 - y_1$ ——线性因子
- $w = 132$  (1-Grassmannian):  $\mathfrak{S}_{132} = x_2 - y_2$ ——线性因子

**直觉理解:** Grassmannian 子簇本身是由线性方程定义的, 因此其 Schubert 类自然有线性因子的表示。非 Grassmannian 的子簇涉及更复杂的代数关系, 导致多项式中出现二次或更高次项。

## 50. Refined Graham Positivity 与原始 Graham Positivity 的关系

**50.1. 问题.** Refined Graham Positivity (定理 1.3) 和原始的 Graham Positivity (定理 1.1) 有什么关联? 前者是后者的推广吗?

**50.2. 回答.** 是的, Refined Graham Positivity 是原始 Graham Positivity 的推广。**1. 条件弱化: 从 Grassmannian 到 Separated Descents** 原始 Graham Positivity (定理 1.1): 设  $u, v \in S_n$  分别是  $k_1$ -Grassmannian 和  $k_2$ -Grassmannian 排列, 则

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

**Refined Graham Positivity (定理 1.3):** 设  $B^-$  作用于非奇异簇  $X$ ,  $Y$  是  $X$  中的一个  $B^-(w)$ -不变的有效闭链。则在  $H_T^*(X)$  中有

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

两者共同要求的条件 (separated descents):  $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$  **关键澄清:** 当  $u, v$  都是 Grassmannian 时, separated descents 条件**不一定**自动满足! 例如  $u = 321$  (2-Grassmannian),  $v = 213$  (1-Grassmannian) 时,  $\max \text{Des}(u) = 2 > 1 = \min \text{Des}(v)$ , 不满足 separated descents。 **两者的正确关系:**

- **原始 Graham Positivity:** 用几何方法 (横截相交) 证明, 条件是  $u, v$  都是 Grassmannian (**不要求**  $k_1 \leq k_2$ )
- **Refined Graham Positivity:** 用 separated descents 条件代替 Grassmannian 条件, 推广了适用范围
- 当 separated descents 成立时, 两者的系数形式一致

**2. 系数形式的变化** 原始 Graham Positivity 的系数:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

Refined Graham Positivity 的系数:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$$

**两者的关系：**当  $(u, v)$  满足 separated descents 时,  $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ , 因此  $-\alpha = t_i - y_j$ , 两者等价。

### 3. 几何理解的升级

- **原始版本：**要求  $B^-$ -不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交
- **Refined 版本：**要求  $B^-(\tau)$ -不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交, 其中  $B^-(\tau) \subset B^-$  是更小的群 (条件更弱)

条件更弱, 但 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性, 使得正性结论仍然成立。

### 4. 定理层次的对应关系

| 层次   | 原始 Graham               | Refined Graham                             |
|------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 条件   | $u, v$ 都是 Grassmannian  | separated descents                         |
| 系数   | $\mathbb{N}[t_i - y_j]$ | $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ |
| 适用范围 | 特殊排列                    | 更一般的排列                                     |

**5. 总结** Refined Graham Positivity 通过引入 separated descents 条件, 将原始 Graham Positivity 从 Grassmannian 排列推广到一般排列。这是 Samuel (2024) 的关键贡献——证明了横截相交性在 separated descents 条件下仍然成立, 从而将正性结果推广到更大的适用范围。**footnote:** 见 定理 1.1, 定理 1.3。

## 51. Humphreys Section 28: Bruhat Decomposition 的内容

**51.1. 问题.** 正文 (引理 2.2 前) 引用了 Humphreys [16, Section 28] 来描述  $N^-(w)$  与 Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  的同构。Section 28 究竟说了什么?

**51.2. 回答.** Section 28: Bruhat Decomposition 是 Humphreys 一书中关于旗流形分解的核心章节。其主要结果包括: **28.1 T-稳定子群 (Theorem 28.1 - 原文第 169 页):**

**Theorem 28.1.** 设  $G$  为约化群,  $T$  为极大环面,  $B$  为 Borel 子群,  $U$  为  $B$  的幂么根基。则  $U$  可以分解为两个  $T$ -稳定子群的直接乘积:

$$U = U_\sigma \cdot U'_\sigma$$

其中对每个  $\sigma \in W$  (Weyl 群元), 根系  $\Phi^+$  被划分为:

$$\Phi_\sigma^+ = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) > 0\}, \quad \Phi_\sigma^- = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) < 0\}$$

**28.3 Bruhat 分解 (Theorem 28.3 - 原文第 3831 页):** Theorem 28.3 (Bruhat Decomposition).

$$G = \bigcup_{\sigma \in W} B\sigma B \quad (\text{不相交并})$$

其中每个双陪集  $B\sigma B$  等于某个 Schubert 胞腔。**推论 (Corollary of Theorem 28.3):** 设  $B'$  为  $G$  的任意 Borel 子群, 则  $B \cap B'$  是连通的且包含  $G$  的一个极大环面。

**28.4 正规形式 (Theorem 28.4 - 原文第 3863 页):** Theorem 28.4. 对每个  $\sigma \in W$ , 每个元素  $x \in G$  可以唯一地写成:

$$x = u' \cdot n(\sigma) \cdot t \cdot u$$

其中  $u, u' \in U$  (幂么部分),  $t \in T$  (环面部分),  $n(\sigma) \in N$  (Weyl 群代表元)。

**2.2 证明中的应用:** 正文引用 “Humphreys [16, Section 28],  $N^-(w)$  同构于 Schubert 胞腔  $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ ” 是基于以下对应:

- (1)  $B^- = TU^-$  是  $B$  的相反 Borel 子群
- (2)  $N^-(w) = N^- \cap wNw^{-1}$  对应负根方向



(3) 由 Bruhat 分解,  $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$

(4) 作为簇,  $N^-(w) \cong B^-wB/B$  (通过映射  $x \mapsto xwB/B$ )

**几何意义:**  $N^-(w)$  是旗流形  $G/B$  中 Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  的坐标空间。具体而言,  $N^-(w)$  同构于  $\mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$  (仿射空间), 这意味着每个 Schubert 胞腔可以用  $\ell(w_0) - \ell(w)$  个复坐标参数化。**连通性:** 由于  $N^-(w) \cong \mathbb{C}^d$  (仿射空间), 它是连通的 (甚至单连通)。<sup>26</sup>

## 52. 为什么 Refined Graham Positivity 的假设是“更强”的？

**52.1. 问题.** 在 Remark 中有一段话：

当  $w = w_0$  是最长元时,  $B^-(w_0) = T$ , 定理 1.3 给出原始的 Graham 正性定理。我们的假设比 Graham 的更强, 因为  $B^-(w)$ -不变的环必是  $T$ -不变的, 产生更强的正性结果, 其中根被限制在  $I(w)$  而非所有正根。

这里有几个令人困惑的点：

- (1) 为什么说“我们的假设更强”？难道不是要求越多越弱吗？
- (2) 为什么根被限制在  $I(w)$  而非所有正根是“更强”的结果？

**52.2. 回答. 1. 假设强度与不变群的关系:** 在几何中, 要求一个子簇在某个群作用下不变, 条件是越小的群越强 (严格):

- $T$ : 只在 torus  $T$  作用下不变
- $B^-$ : 在更大的群  $B^-$  作用下不变
- $B^-(w)$ : 只在更小的群  $B^-(w)$  作用下不变

要求在  $B^-(w)$  下不变比要求在  $T$  下不变更严格, 因为:

- 如果一个子簇在  $B^-(w)$  下不变, 它自动在  $T$  下不变
- 但反过来不一定成立: 在  $T$  下不变子簇不一定在  $B^-(w)$  下不变

因此, 定理 1.3 的假设:

假设:  $Y$  是  $B^-(w)$ -不变的

比原始 Graham 的假设:

假设:  $Y$  是  $T$ -不变的

**更强 (条件更严格).** **2. 为什么结果是“更强”的正性?:** 这里的“更强”不是说系数更大, 而是说结论给出了更精确的信息。定理 1.3 的结论是:

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

即系数的多项式只涉及  $\{-\alpha \mid \alpha \in I(w)\}$  这些根。对比原始 Graham 正性 (对应  $w = w_0$  的情况):

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in \Phi^+} \cdot [Z_i]_T$$

这里  $\Phi^+$  是所有正根,  $I(w) \subseteq \Phi^+$ 。关键点:

- 当  $w = w_0$  (最长元) 时,  $I(w_0) = \Phi^+$  (所有正根), 两者相同
- 当  $w \neq w_0$  时,  $I(w) \subsetneq \Phi^+$  (真子集)
- $I(w)$  越小, 系数多项式的变量越少, 约束越强

<sup>26</sup>问: Humphreys Section 28 的 Bruhat Decomposition 说了什么? 见附录 section 51。

### 3. 几何直观： $B^-(w)$ 的定义是：

$$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$I(w)$  记录了  $w$  翻转了哪些正根。 $|\alpha \in I(w)| = \ell(w)$ ，即  $w$  的长度。当  $w$  很短时（接近单位元）， $I(w)$  很小，只有少数根被翻转，因此  $B^-(w)$  接近  $T$ ，条件变强，但结果也更精确——系数只涉及少数几个根的多项式。

#### 4. 总结：

- (1) **假设更强：** $B^-(w)$ -不变比  $T$ -不变要求更多（更严格的条件）
- (2) **结果更强：** $I(w)$  越小，系数被限制在更小的根集上，结论更精确

这似乎矛盾，但实际上反映了“归纳递进”的数学思想：当假设更严格时，我们可以得到更精确的结论。**退化情形：**当  $w = w_0$  时， $B^-(w_0) = T$ ，假设退化为  $T$ -不变， $I(w_0) = \Phi^+$ ，结论退化为原始 Graham 正性。<sup>27</sup>

## 53. Grothendieck 多项式是什么？

**53.1. 问题.** 笔记中多次提到 Grothendieck 多项式（如 section 3.5），它与 Schubert 多项式有什么关系？

**53.2. 回答. Grothendieck 多项式 (Grothendieck polynomial)** 是 Schubert 多项式的推广，由 Alexander Grothendieck 在 1950 年代引入。**历史背景：**Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  由 Lascoux 和 Schützenberger 在 1980 年代引入，用于表示旗流形上 Schubert 胞腔的上同调类。但这只解决了旗流形的普通上同调。1950 年代，Grothendieck 和 Grothendieck 学生 Demazure 研究了旗流形的 Chow 群和代数 K-理论。他们发现，在 K-理论中，Schubert 类的代表元不再是多项式，而是更复杂的对象——这就是 Grothendieck 多项式。**与 Schubert 多项式的关系：**在旗流形的 K-理论中，Schubert 胞腔的结构常数不再是非负整数，而是更一般的表达式。Grothendieck 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$  满足：

- (1) **退化到 Schubert 多项式：**当限制到上同调时， $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$  退化为  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) \equiv \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) \pmod{\mathbb{Z}_{>0}[\text{次数} \geq 1]}$$

- (2) **K-理论中的地位：**在  $K^0(Fl_n) \otimes \mathbb{Q}$  中， $\{\tilde{\mathfrak{S}}_w\}$  构成基

**组合定义：**Grothendieck 多项式可以用除差算子递归定义：

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) = \partial_i^{-1} \tilde{\mathfrak{S}}_{ws_i}(\mathbf{x}) \quad (\text{当 } i \text{ 是 } w \text{ 的 descent})$$

但这里的  $\partial_i^{-1}$  是逆除差算子，定义为：

$$\partial_i^{-1}(f) = \sum_{k \geq 0} x_i^k \cdot \partial_i(f)$$

这导致 Grothendieck 多项式是无穷级数，但可以证明在 K-理论中是良定义的。**几何意义：**在代数 K-理论中，旗流形的结构环  $K^0(Fl_n)$  由 Schubert 类  $[\mathcal{O}_{B-wB/B}]$  生成。Grothendieck 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$  是这些 K-理论类的代表元。**正性：**与 Schubert 多项式类似，Grothendieck 多项式的结构常数也满足某种正性。在 Fan-Guo-Xiong [7] 中，他们建立了双重 Grothendieck 多项式范围的正性公式，使用 puzzles 方法。**笔记中的位置：**在 section 3.5 中，笔记讨论了关于 Grothendieck 多项式的 positivity 猜想，这是 Gao-Xiong 工作的自然推广方向之一。

<sup>28</sup>

<sup>27</sup>问：为什么假设更强反而结果更强？见附录 section 52。

<sup>28</sup>问：Grothendieck 多项式是什么？见附录 section 53。

## 54. Billey 公式的显式形式

**54.1. 问题.** 正文 (section 3.3) 说 “从其显式形式 (此处略去) ”, Billey 公式的显式形式到底是什么?

**54.2. 回答. Billey 公式 (1999)** 由 Sara Billey 在论文《Decompositions of the cone of Schur functions》中给出, 是计算 Schubert 类在旗流形  $G/B$  的 torus 固定点处限制的组公式。**限制公式:** 对任意  $u, w \in W$ ,

$$[\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w = \sum_{\substack{v \in W \\ u \leq v \leq w}} \prod_{\alpha \in R^+(w) \setminus R^+(v)} \alpha$$

其中  $R^+(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha < 0\}$  是  $w$  的反转集。**几何意义:**  $[\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w$  是 Schubert 类限制到 torus 固定点  $wB/B$  的等变量子上同调类。由于  $H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$ , 限制结果是一个单项式之和。Billey 公式表明: 这些单项式的指数恰好对应 Bruhat 区间  $[u, w]$  中  $v$  的反转集差集。**正性:** 由于  $R^+(w) \setminus R^+(v) \subseteq R^+(w)$ , 而  $R^+(w)$  中的根都是正根, 故每个单项式都是正根的乘积。这给出了 Graham Positivity 最早的几何解释之一。**结构常数公式** ([4, Corollary 4.3]): 对于 Schubert 结构常数  $c_{uv}^w(\mathbf{y})$ ,

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}) = \sum_{b \in \mathcal{C}(u, v, w)} \prod_{\alpha \in \text{Inv}(b)} \alpha$$

其中  $\mathcal{C}(u, v, w)$  是特定 braid 元胞腔,  $\text{Inv}(b)$  是其反转集。

## 55. $\sigma(u)^T$ 的含义

**55.1. 问题.**  $\sigma(u)^T$  是什么意思? 上标  $T$  代表什么?

**55.2. 回答.**  $\sigma(u)^T$  是等变量子上同调中的 Schubert 类。在等变上同调 (equivariant cohomology) 中, 上标  $T$  表示我们考虑的是 torus 等变版本。具体而言:

- $\sigma(u)$ : 普通上同调中的 Schubert 类, 定义为旗流形  $X = G/P$  中 Schubert 簇  $Y(u) = \overline{B^{-u}P/P}$  的 Poincaré 对偶类
- $\sigma(u)^T$ : 等变量子上同调中的 Schubert 类, 是  $\sigma(u)$  到等变量子上同调  $H_T^*(X)$  的提升

**为什么需要  $T$ ?** 在等变量子上同调中, 我们考虑群  $T$  (torus, 最大环面) 作用在流形  $X$  上。类不再是  $X$  的普通上同调类, 而是提升到同伦商空间 (homotopy quotient)  $X \times_T ET$  上的类。**与普通上同调的关系:** 当忘掉 torus 作用 (即在  $H_T^*(X) \otimes_{\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]} \mathbb{Z}$  中令所有  $x_i = 0$ ) 时,  $\sigma(u)^T$  退化回  $\sigma(u)$ 。**笔记中的位置:** 正文

**55.3. 例子. 例 1: Grassmannian  $Gr(2, 4)$  情形.** 设  $X = Gr(2, 4) = GL_4/B$  (2 维平面构成的 Grassmannian)。其等变量子上同调  $H_T^*(X)$  中, Schubert 类可显式写出。固定最大环面  $T \subset GL_4$  作用在平面上。则  $\sigma(u)^T$  在 torus 固定点处的限制为:

- 对于  $u = s_1 s_2$  (最短代表元), 有  $\sigma(s_1 s_2)^T|_p = x_1 + x_2$ ;
- 对于  $u = s_2 s_1$ , 有  $\sigma(s_2 s_1)^T|_p = x_1 + x_3$ ;

其中  $x_1, x_2$  是负单根参数。当  $x_i = 0$  时, 这些退化为普通上同调中的类 (交点个数)。**例 2: 旗流形  $Fl_3 = GL_3/B$  情形.** 在旗流形  $Fl_3$  上, 取  $u = s_1$ ,  $v = s_2$ 。则在  $H_T^*(Fl_3)$  中, 利用 Schubert 类的相交理论:

$$\sigma(s_1)^T \cdot \sigma(s_2)^T = \sigma(s_1 s_2)^T + x_1 x_2 \cdot \sigma(1)^T.$$

其中各项的含义:

- $\sigma(s_1 s_2)^T$ : 对应置换  $s_1 s_2$  的 Schubert 类;
- $x_1 x_2 \cdot \sigma(1)^T$ : 这是等变修正项,  $x_1, x_2$  是负单根参数,  $\sigma(1)^T$  是单位类。

**验证正性:** 展开系数为 1 (非负整数) 和  $x_1 x_2$  (非负单项式), 符合 Graham positivity 的要求。

## 56. Gromov-Witten 不变量

**56.1. 问题.** 什么是 Gromov-Witten 不变量? 它计数的是什么?

**56.2. 回答.** **Gromov-Witten 不变量 (GW 不变量)** 是计数满足特定条件的稳定映射 (stable map) 个数的代数不变量。**核心思想:** 在量子上同调中, 我们不仅考虑点与点的相交, 还考虑曲线与曲线的相交。Gromov-Witten 不变量计数的是: 给定旗流形  $X$  中三个 Schubert 条件, 有多少条有理曲线 ( $\mathbb{P}^1$ ) 同时满足这些条件。**形式定义:** 对于亏格  $g$ 、 $n$  个标记点的稳定映射模空间  $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, d)$ , Gromov-Witten 不变量定义为:

$$\langle \sigma(u_1), \dots, \sigma(u_n) \rangle_{angle_{g,n,d}} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,d)]^{extvir}} \prod_{i=1}^n ev_i^* \sigma(u_i).$$

**几何意义:**

- $g = 0$  (亏格 0) 时, 计数的是  $\mathbb{P}^1$  上满足条件的曲线个数;
- $n = 3$  (三个标记点) 对应三点函数 (three-point function);
- $d$  是曲线的同调类 (curve class)。

**为什么叫“不变量”?** 因为它不依赖于簇的具体实现方式, 只依赖于其代数几何的同伦类型——不同的代数几何计算如果同伦等价, 则 GW 不变量相同。**与经典 Schubert calculus 的区别:**

- 经典: 计数点是 Schubert 簇的相交个数;
- 量子: 计数曲线是稳定映射的个数, 涉及模空间积分。

**笔记中的位置:** 正文 section 7 使用 GW 不变量解释 EQLR 系数的几何意义。

## 57. 什么是分次 $\Lambda[q]$ -代数

**57.1. 问题.** 在定义 4.8 中提到:  $QH_T^*(X)$  是一个分次  $\Lambda[q]$ -代数。什么是分次  $\Lambda[q]$ -代数? 其中的  $q$  变量代表什么?

**57.2. 回答.** **分次  $\Lambda[q]$ -代数** 是同时包含两种参数的代数结构:

- (1)  $\Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  层: 等变量子部分。  $x_i$  对应负根  $-\alpha_i$ , 编码 torus 作用的权信息。
- (2)  $q$  变量层: 量子修正部分。  $q$  是一个形式变量 (formal variable), 用来记录曲线的同调类 (degree)。当  $q = 0$  时退化为普通等变量子上同调。

**为什么叫“分次” (graded)?** 因为乘法有分次结构:

$$\deg(\sigma(w)) = \ell(w), \quad \deg(q) = 1, \quad \deg(x_i) = 1$$

在乘积  $\sigma(u) \circ \sigma(v)$  中, 次数是相加的:  $\deg(\sigma(u) \circ \sigma(v)) = \deg(\sigma(u)) + \deg(\sigma(v))$ 。而  $q^d$  的次数是  $d$ , 所以量子项自然地增加了次数。

**$q$  的几何含义:** 在量子上同调中,  $q$  变量编码的是曲线计数的额外信息。形式地说:

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_{w,d} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

其中  $d$  记录曲线的同调类 (multi-degree),  $c_{u,v}^{w,d}$  是对应次数为  $d$  的 Gromov-Witten 不变量。

具体例子：在  $\mathbb{P}^1$  的情形 (section 3)：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q \cdot \sigma(1)$$

这里  $q$  出现因为两条直线 (在  $\mathbb{P}^1$  中) 相交于一条曲线 (亏格 0 曲线)，而不是一个点。  
与经典情形的对比：

| 情形                    | 代数结构                                          | 结构常数 $c$                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 经典上同调 $H^*(X)$        | $\mathbb{Z}$ -代数                              | $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ |
| 等变量子上同调 $H_T^*(X)$    | $\Lambda$ -代数 ( $\Lambda = \mathbb{Z}[x_i]$ ) | $c_{u,v}^w \in \Lambda$ , 系数非负      |
| 等变量子量子上同调 $QH_T^*(X)$ | 分次 $\Lambda[q]$ -代数                           | $c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda$ , 系数非负  |

## 58. $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 中的 $X$ 是什么？

**58.1. 问题.** 在量子上同调的定义中，出现稳定映射  $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ ，这里的  $X$  是什么？ $\mathbb{P}^1$  又是什么？

**58.2. 回答.**  $X = G/P$  是齐次空间 (homogeneous space)：

在 section 3 中我们看到， $X = G/P$  是旗流形 (flag variety)，其中：

- $G$  是连通复半单李群 (如  $GL_n(\mathbb{C})$ )
- $P \subset G$  是抛物子群 (parabolic subgroup)
- $G/P$  是齐次空间，等同于旗流形  $Fl_n$

$\mathbb{P}^1$  是复射影直线：

$\mathbb{P}^1$  是 1 维复射影空间，也等价于 Grassmannian  $Gr(1, n+1)$ 。它是一条紧致 (compact) 的复曲线，亏格 (genus) 为 0。

**稳定映射  $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$  的几何含义：**

在量子上同调中，我们不再计数点与 Schubert 簇的交点，而是计数曲线与 Schubert 簇的交点。具体来说：

- $f$  是一个代数曲线 (这里是  $\mathbb{P}^1$ ，亏格 0 曲线)
- $f$  的像  $f(\mathbb{P}^1) \subset X$  是旗流形中的一条复曲线
- 稳定映射的模空间  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  参数化了所有满足特定条件的映射

与经典 Schubert calculus 的对比：

| 情形        | 计数对象       | 结构常数 $c$ 的取值                        |
|-----------|------------|-------------------------------------|
| 经典上同调     | $X$ 中点的相交数 | $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ |
| 等变量子上同调   | 点的相交 (等变权) | $c_{u,v}^w \in \Lambda$ , 非负系数      |
| 等变量子量子上同调 | 稳定映射的个数    | $c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda$ , 非负系数  |

**为什么是  $\mathbb{P}^1$  ?** 因为亏格 0 曲线 (rational curves) 在代数几何中特别重要——它们是最简单的非平凡复曲线，而且通过  $\mathbb{P}^1$  可以用 Kontsevich 的稳定映射模空间很好地参数化。

## 59. Kim 的思想如何迁移到 Mihalcea 的等变量子 Schubert 演算

**59.1. 问题.** Mihalcea 在论文中基于 Kim 的思想，将等变量子 Schubert 演算定义为分次  $\Lambda[q]$ -代数。Kim 的核心思想是什么？Mihalcea 如何迁移这一思想？

**59.2. 回答. Kim 的核心思想：提升环作用 (Lifting the Torus Action)。**

Kim 在 1996 年的论文 *On equivariant quantum cohomology* 中的核心 insight 是：把量子上同调的整套 machinery 提升到等变范畴。具体而言：

- (1)  $T$ -作用提升：如果 torus  $T$  作用在齐性空间  $X = G/P$  上，这个作用自然地诱导出在 Kontsevich 稳定映射模空间  $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, d)$  上的  $T$ -作用。

- (2) **等变评估映射**：评估映射  $ev_i : \overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, d) \rightarrow X$  是  $T$ -等变的，因此可以把  $X$  上的等变 Schubert 类拉回到模空间。
- (3) **等变 Gromov-Witten 不变量**：因为映射是等变的，得到的不是整数（普通量子上同调），而是  $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  中的多项式——即等变 Gromov-Witten 不变量。
- (4) **结合性 (WDVV 方程)**：Kim 证明了这些新的不变量满足 WDVV (Witten-Dijkgraaf-Verlinde-Verlinde) 方程，从而确保了 graded  $\Lambda[q]$ -代数上的量子杯积是结合的。

**Mihalcea 的迁移方式**：Mihalcea 直接采用了 Kim 的这套  $\Lambda[q]$ -代数框架作为他的 Schubert 演算的代数基础。Kim 的工作保证了：

- 等变 Gromov-Witten 不变量是定义良好的；
- 量子上积在  $\Lambda[q]$  上是结合的；
- 结构常数（等变量子 Littlewood-Richardson 系数） $c_{u,v}^{w,d}$  形成一个相干的环。

然后 Mihalcea 在这个代数存在性的基础上，**结合 Graham 的几何横截性和投影公式**，来证明这些结构常数不仅存在，而且具有非负系数的正性 (positivity)。

**核心洞察**：Kim 的贡献是范畴化的提升（从整数到多项式），Mihalcea 的贡献则是利用这个提升的结构来证明正性。<sup>29</sup>

## 60. $q^d$ 形式变量与量子乘积公式

**60.1. 问题**.  $\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$  这个公式中， $q^d$  是形式变量， $q$  是什么？求和是对什么？ $u, v, w$  是什么？

### 60.2. 回答. $q$ 和 $q^d$ ：形式变量的含义

$q$  是一个**形式变量 (formal variable)**，它编码了“量子修正”的信息。在经典 Schubert 演算中，两个 Schubert 类的乘积只产生另一个 Schubert 类，系数是非负整数。但在量子版本中，乘积的结构更复杂——它不仅取决于 Schubert 类本身，还取决于曲线的**次数 (degree)**。

这里的  $d$  是**曲线类的多重次数 (multi-degree)**，而  $q^d$  是说“如果我们有次数为  $d$  的曲线，就带上  $q^d$  这个因子”。 $q^d$  是形式变量——这意味着它不是一个要具体计算的数值，而是一个**符号标记**，用来追踪我们讨论的是哪种曲线。

**求和的对象**：

$$\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

求和是对：

- $d$ ：所有可能的曲线类次数 (multi-degree)
- $w$ ：所有可能的 Schubert 类索引 (Weyl 群元素)

**$u, v, w$  的身份**： $u, v, w$  是 **Weyl 群中的元素**（更准确地说，是  $W^P$ ——相对于抛子群  $P$  的 Weyl 群陪集代表元）。它们索引了：

- $\sigma(u)$ ：次数为  $u$  的 Schubert 类
- $\sigma(v)$ ：次数为  $v$  的 Schubert 类
- $\sigma(w)$ ：次数为  $w$  的 Schubert 类（出现在乘积结果中）

**公式的整体含义**：这个公式是说：两个 Schubert 类  $\sigma(u)$  和  $\sigma(v)$  的**量子乘积** ( $\star$ ) 等于对所有次数  $d$  和所有 Weyl 群元素  $w$  求和，每一项是：

<sup>29</sup>问：Kim 的思想如何迁移到 Mihalcea 的等变量子 Schubert 演算？见附录 section 59。

- $q^d$ : 形式变量, 标记曲线次数
- $c_{u,v}^{w,d}$ : **结构常数**, 是 Mihalcea 论文中证明正性的对象, 是  $x_i$  的非负系数多项式
- $\sigma(w)$ : 结果中的 Schubert 类

**为什么需要形式变量  $q$ ?** 在代数几何中, 量子上同调的“量子”体现在对曲线的计数上。不同次数的曲线贡献不同的 Gromov-Witten 不变量。 $q^d$  就像一个“占位符”, 让我们能把“次数为  $d$  的曲线贡献了多少”这件事形式化。整个表达式其实是一个**多项式环**  $\mathbb{Z}[q_1, q_2, \dots]$  (每个  $q_i$  对应一个次数方向) 中的等式。<sup>30</sup>

## 61. $QH_T^*(X)$ 分次 $\Lambda[q]$ -代数的定义与含义

**61.1. 问题.**  $QH_T^*(X)$  是一个分次  $\Lambda[q]$ -代数, 其  $\Lambda[q]$ -基底为  $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ 。这个定义是如何来的? 是推导出来的吗? 说明一下这是什么意思。

**61.2. 回答.** 这首先是一个定义, 不是从其他定理推导出来的。

当我们说“ $QH_T^*(X)$  是一个分次  $\Lambda[q]$ -代数”, 意思是: 我们把  $QH_T^*(X)$  配上这些结构 (基底、乘法), 然后研究它的性质。这不是从其他事实推导出来的, 而是 Kim (1996) 根据几何动机主动赋予的结构。

**逐层拆解定义的含义:**

| 成分                             | 含义                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| $QH_T^*(X)$                    | 等变量量子量子上同调环                                                                   |
| $\Lambda$                      | $H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ , torus 等变上同调 (多项式环)                |
| $q$                            | 量子修正的形式变量                                                                     |
| $\Lambda[q]$                   | 系数在 $\Lambda$ 中、添加了 $q$ 变量的多项式环                                               |
| $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ | 基底——每个 Weyl 群陪集代表元 $w$ 对应一个 Schubert 类                                        |
| <b>分次</b>                      | 乘法保持次数: $\deg(\sigma(u) \circ \sigma(v)) = \deg(\sigma(u)) + \deg(\sigma(v))$ |

**基底  $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$  的含义:**  $W^P$  是相对于抛子群  $P$  的 Weyl 群陪集代表元集合。每个元素  $w \in W^P$  对应旗流形  $X = G/P$  中的一个 Schubert 细胞, 从而有一个 Schubert 类  $\sigma(w)$ 。这些类在  $H_T^*(X)$  中线性无关, 构成一组基。

**定义的来源 (从哪来):** 这个定义是 Kim (1996) 提出的, 他认识到:

- (1) 经典上同调  $H^*(X)$  以 Schubert 类为基, 乘法是相交的计数
- (2) 等变上同调  $H_T^*(X)$  把系数从  $\mathbb{Z}$  提升到  $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  (torus 作用参数)
- (3) 量子上同调  $QH^*(X)$  把系数环扩展到  $\mathbb{Z}[q]$  (量子修正)

Kim 的创新: 把这三个结构合并——同时考虑 torus 参数  $x_i$  和量子修正  $q$ , 得到  $\Lambda[q]$ -代数结构。

**乘法的定义:** 定义中最关键的是乘法公式:

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

这里的  $c_{u,v}^{w,d}$  是等变量量子 Littlewood-Richardson 系数, 正是 Mihalcea 证明正性的对象。<sup>31</sup>

## 62. Schubert 类 $\sigma(w)$ 的含义

**62.1. 问题.** 在 Schubert 演算中,  $\sigma(w)$  是什么意思? 例如  $\sigma(1) = 1$  (单位类) 和  $\sigma(s_1) = [\text{点}]$  (超平面类)。

<sup>30</sup>问:  $q^d$  是形式变量是什么意思? 见附录 section 60。

<sup>31</sup>问:  $QH_T^*(X)$  分次  $\Lambda[q]$ -代数是什么? 见附录 section 61。

**62.2. 回答.**  $\sigma(w)$  表示与 Weyl 群元素  $w$  对应的 **Schubert 上同调类** (Schubert cohomology class)。

**核心要点：**

- (1) **每个  $w \in W$  对应一个  $\sigma(w)$ :** Weyl 群  $W$  中的每个元素  $w$  唯一确定一个 Schubert 类  $\sigma(w)$ ，它们构成上同调环  $H^*(X)$  的一组基
- (2)  $\sigma(1) = 1$  **是单位元：** 对应 Weyl 群单位元的类就是上同调环的单位元
- (3)  $\sigma(s_1)$  **是超平面类：** 在具体情形  $\text{Gr}(1, 2) = \mathbb{P}^1$  中，对应换位  $s_1$  的类就是超平面类 (即一个点)

**直观理解：** Schubert 类本质上是对旗流形中特定 Schubert 胞腔的几何刻画——每个胞腔对应一个代数类，乘法结构由胞腔的相交关系决定。<sup>32</sup>

### 63. 当 $d = 0$ 时退化为等变上同调的推导

**63.1. 问题.** 为什么当  $d = 0$  时，量子乘积公式  $\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$  退化为等变上同调  $H_T^*(X)$  (对应 Graham positivity)?

**63.2. 回答. 退化推导：**

从量子乘积公式出发：

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

当  $d = 0$  时：

- (1)  $q^0 = 1$  (任何数的 0 次方等于 1)
- (2) 求和简化为：

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) \Big|_{d=0} = \sum_w c_{u,v}^{w,0} \sigma(w)$$

- (3) 这里的  $c_{u,v}^{w,0}$  是等变 Littlewood-Richardson 系数 (即 Graham 情形)，即：

$$\sigma(u)^T \cdot \sigma(v)^T = \sum_w c_{u,v}^w \sigma(w)^T$$

**几何含义：**

- $d = 0$  表示**没有曲线** (zero-degree curves, 即点)
- 没有曲线  $\rightarrow$  计数的是**经典几何相交**
- 经典几何相交  $\rightarrow$  正好是等变上同调中的 Schubert 类相交

所以  $d = 0$  的退化表示“没有量子修正”，回到了纯粹的等变几何。<sup>33</sup>

### 64. 乘积公式的完整推导

**64.1. 问题.** 乘积公式的完整推导见正文哪里？

**64.2. 回答.** 乘积公式的完整推导见 section 12 (即 chapter2.tex 第 299 页开始的附录部分)。

### 65. Path 图的详细定义与权重公式

**65.1. 问题.** Path 图的详细定义与权重公式见正文哪里？

<sup>32</sup>问： $\sigma(w)$  是什么意思？见附录 section 62。

<sup>33</sup>问：为什么  $d = 0$  时退化为等变上同调？见附录 section 63。



**65.2. 回答.** Path 图的详细定义与权重公式见 section 13 (即 chapter2.tex 第 356 页开始的附录部分)。

## 66. Dominant Approximation 的完整证明

**66.1. 问题.** Dominant approximation 的完整证明见正文哪里?

**66.2. 回答.** Dominant approximation 的完整证明见 section 14 (即 chapter2.tex 第 393 页开始的附录部分)。

## 67. Mihalcea 论文 $Gr(2, 4)$ 例子的详细解释

**67.1. 问题.** 请详细解释 Mihalcea 论文中关于  $Gr(2, 4)$  的例子 (chapter4.tex 第 143-156 行), 用最简单的语言说明:

- (1)  $Gr(2, 4)$  是什么? 为什么叫 Grassmannian?
- (2)  $W = S_4$  是什么? 最短代表元是什么意思? 为什么有 6 个?
- (3)  $u = s_1, v = s_3$  是什么?  $\sigma$  是什么?
- (4) 乘积  $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$  是什么意思?
- (5) 右边两项  $\sigma(s_1 s_3)$  和  $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$  各自代表什么几何意义?
- (6) 为什么要验证  $x_2 - x_3$  是“非负系数”? 这为什么重要?
- (7) 量子修正项  $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$  中的  $q$  是什么?  $q$  记录曲线的同调类是什么意思?

**67.2. 回答. 1.  $Gr(2, 4)$  是什么?**

- $Gr(2, 4)$  是所有 2 维平面构成的空间。想象在 4 维空间 (4 维坐标系) 中, 所有可能的 2 维平面的“集合”就是  $Gr(2, 4)$ 。
- 叫 Grassmannian 是为了纪念德国数学家 Hermann Grassmann, 他是线性几何的先驱。
- 类比:  $Gr(1, 3) =$  所有直线构成的空间  $= \mathbb{P}^2$  (射影平面);  $Gr(2, 4) =$  所有 2 维平面构成的空间。
- $Gr(2, 4)$  是一个紧致流形 (没有边界闭合的“弯曲”空间)。

**2.  $W = S_4$  是什么? 最短代表元是什么? 为什么有 6 个?**

- $S_4$  是 4 个物体的对称群, 包含所有对  $\{1, 2, 3, 4\}$  的置换, 总共有  $4! = 24$  个元素。
- 生成元是  $s_1 = (12), s_2 = (23), s_3 = (34)$  (相邻置换)。
- 每个置换都可以用这些  $s_i$  的乘积表示, 但有些写法更长, 有些更短。**最短代表元**就是用最少的生成元表示的置换。
- 6 个最短代表元对应  $Gr(2, 4)$  上的 6 个 Schubert 类。

**3.  $u = s_1, v = s_3$  是什么?  $\sigma$  是什么?**

- $s_1 = (12)$  和  $s_3 = (34)$  是 Weyl 群的简单反射 (相邻置换), 它们之间隔着  $s_2$ , 所以不相邻。
- $\sigma$  是 Schubert 类, 与置换  $w$  相关联的上同调类, 可以理解为一种“测量”几何对象的方式。

**4. 乘积  $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$  是什么意思?**

- 乘法  $\circ$  表示 Schubert 类的乘法 (杯积, cup product)。
- $\sigma(s_1)$  对应“满足某个几何条件的平面”,  $\sigma(s_3)$  对应“满足另一个几何条件的平面”。
- $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$  问的是“同时满足两个条件的平面有多少?”

**5. 两项  $\sigma(s_1 s_3)$  和  $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$  各自代表什么?**

- $\sigma(s_1 s_3)$ : **普通项**,  $s_1 s_3$  表示先做  $s_1$  置换再做  $s_3$  置换。几何意义: 两个条件在同一条直线上同时满足的交集。
- $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ : **量子修正项**,  $\sigma(1)$  是单位元。几何意义: 两个条件通过一条曲线连接满足。

## 6. 为什么要验证 $x_2 - x_3$ 是“非负系数”?

- Mihalcea positivity 的核心结论: 量子 Schubert 演算的系数必须是关于负根的非负整数系数多项式。
- $x_i - x_j$  (当  $i < j$  时) 是负根, 所以  $x_2 - x_3$  是负根。
- **非负系数**保证了几何可解释性——如果系数是负数, 就无法解释为“计数几何对象”。
- 这里  $x_2 - x_3$  的系数是 1 (正的), 验证了 Mihalcea positivity 确实成立。

## 7. $q$ 是什么?“记录曲线的同调类”是什么意思?

- $q$  是量子参数, **标记曲线的同调类**。
- 同调类是对空间中的“孔”或“圈”的分类。比如  $\mathbb{P}^1$  的基本群是  $\mathbb{Z}$  (整数)。
- 在量子几何中, 两个条件可以通过曲线连接, 而不仅仅是直接相交。 $q$  标记了这条曲线的类型 (它的同调类)。
- $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$  表示: 存在一条由  $q$  标记的曲线, 它“修复”了普通乘法中缺失的部分。

**几何直觉总结:** 这个例子展示了等变量子上同调中量子修正的机制。普通乘法  $\sigma(s_1 s_3)$  给出直观的交集计数; 量子修正项  $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$  考虑了通过曲线连接的情况——这反映了量子场论的思想: 粒子可以通过虚粒子云 (曲线) 相互作用。

## 68. 稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 的定义

**68.1. 问题.**  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  是什么? 每个符号的含义是什么? 为什么要有紧化? 什么是评估映射  $ev_i$ ? 能举一个  $\text{Gr}(2, 4)$  的具体例子吗?

**68.2. 回答.**  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  是**稳定映射的模空间 (stable map moduli space)**, 这是量子上同调理论中的核心几何对象。

### 一、下标 0 和 3 的含义

下标描述的是域曲线的拓扑性质:

- 0: 域曲线的算术亏格 (arithmetic genus)。亏格 0 的曲线是**有理曲线**。若光滑则同构于  $\mathbb{P}^1$ ; 若不光滑, 则是若干个  $\mathbb{P}^1$  通过节点连成的“树” (tree of  $\mathbb{P}^1$ 's joined at nodes)。
- 3: 曲线上的 3 个**有序标记点** (marked points)  $x_1, x_2, x_3$ , 它们必须位于曲线的光滑点上 (不能位于节点)。

### 二、上划线 $\overline{\mathcal{M}}$ 的含义——为什么需要紧化?

若只考虑光滑曲线的映射模空间  $\mathcal{M}_{0,3}(X, d)$ , 则一般**不是紧的** (不 proper)。序列的光滑曲线映射可以退化 (degenerating), 导致无法在其上做积分。

**Kontsevich 紧化 (1995):** 通过添加“边界除子” (boundary divisors) 来让空间 proper。边界除子由**结点曲线** (nodal curves) 上的稳定映射组成。这使得我们可以对空间做积分、提取 Gromov-Witten 不变量。

### 三、稳定映射的严谨定义

由于上述紧化,  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  中的稳定映射不一定来自光滑  $\mathbb{P}^1$ 。一个稳定映射是一个 tuple:

$$(C, x_1, x_2, x_3, f)$$

其中:

- (1)  $C$  是连通、投影、约化曲线, 亏格 0, 最多节点奇点;
- (2)  $x_1, x_2, x_3$  是  $C$  上 3 个不同的光滑点;
- (3)  $f: C \rightarrow X$  是代数簇之间的态射;
- (4)  $f_*[C] = d \in H_2(X, \mathbb{Z})$  (同调类条件);
- (5) **稳定性条件**: 映射  $f$  的自同构群必须有限。

**稳定性条件的具体含义**: 若某个不可约分支  $E \cong \mathbb{P}^1$  被  $f$  收缩到  $X$  中一个点 ( $f(E) = \text{pt}$ ), 则  $E$  必须至少含 3 个**特殊点** (特殊点 = 标记点或与其他分支相交的节点)。这排除了“幽灵分支” (ghost component) ——即没有足够结构来固定自身的无用分支。

#### 四、评估映射 $ev_i$ 的定义

评估映射是连接模空间与目标空间的桥梁:

$$ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$$

$$ev_i([C, x_1, x_2, x_3, f]) = f(x_i)$$

它将稳定映射的同构类打到  $X$  中第  $i$  个标记点的像。在量子上同调中, 我们利用这些映射从  $X$  上拉回上同调类 (如 Schubert 类), 在模空间上做杯积, 然后推送向前以计数曲线。

#### 五、具体例子: $\text{Gr}(2, 4)$

设  $X = \text{Gr}(2, 4)$  (2 维平面在  $\mathbb{C}^4$  中, 几何上对应  $\mathbb{P}^3$  中的线)。此时  $H_2(\text{Gr}(2, 4), \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 。看 degree  $d = 1$  的情形:

**内部 (光滑情形)**: 一个点是光滑  $\mathbb{P}^1 \cong C$  到  $\text{Gr}(2, 4)$  的 1 次映射。1 次曲线在  $\text{Gr}(2, 4)$  中是一条线 (line)。在 Plücker 嵌入下, 这对应  $\mathbb{P}^3$  中过单点的线束。映射  $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow \text{Gr}(2, 4)$  同构地打到这条线。

**边界 (退化情形)**: 域曲线退化为两个分支  $C = C_A \cup C_B$ , 由一个节点连接。总度数必须为 1, 因此:

- $C_A$  映射度 1, 打到  $\text{Gr}(2, 4)$  中一条线;
- $C_B$  映射度 0 (收缩到一点  $p \in \text{Gr}(2, 4)$ , 即节点处  $f$  的像)。

由稳定性条件:  $C_B$  被收缩, 所以必须至少含 3 个特殊点。它已有 1 个节点, 因此必须至少含 2 个标记点。比如  $x_1, x_2 \in C_B$ , 而  $x_3 \in C_A$ 。

**在 EQLR 系数中的作用**: EQLR 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  计数的是满足以下条件的稳定映射个数:

$$c_{u,v}^{w,d} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \tilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}$$

其中评估映射  $ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$  记录了  $f(x_i)$  落在哪个 Schubert 胞腔中。

## 69. $w_0$ 的反转作用与 $I(w_0w)$ 的含义

**69.1. 问题.**  $I(w_0w)$  在数学上有什么内涵吗? 是不是  $w_0$  会把  $w$  反转?

**69.2. 回答.** 是的,  $w_0$  确实会“反转”置换。

在对称群  $S_n$  中, 最长元  $w_0$  定义为:

$$w_0 = (n, n-1, \dots, 2, 1)$$

它将每个位置  $i$  映射到  $w_0(i) = n - i + 1$ ——确实是把序列完全颠倒。

**$I(w)$  和  $J(w)$  的含义:**

$I(w)$  表示置换  $w$  的反转集 (inversion set):

$$I(w) = \{(i, j) : i < j \text{ 且 } w(i) > w(j)\}$$

而  $J(w) = I(w_0w)$  表示非反转集 (complement):

$$J(w) = \{(i, j) : i < j \text{ 且 } w(i) < w(j)\}$$

**验证例子:** 设  $w = 213$  (即  $w(1) = 2, w(2) = 1, w(3) = 3$ ):

- $w_0w$ : 先  $w$  再  $w_0 \rightarrow w_0(213) = (3, 2, 1)$  (完全反转)
- $I(w) = \{(1, 2)\}$  (因为  $2 > 1$ )
- $I(w_0w) = I(321) = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$  (所有对都是反转)
- $J(w) = \{(2, 3)\}$  (因为  $1 < 3$ )

**为什么  $I(w_0w)$  是“非反转”?:**

因为  $w_0(i) > w_0(j) \iff i < j$ , 所以:

- $I(w_0w)$  中的条件  $w_0w(i) > w_0w(j)$  变成  $w(i) < w(j)$
- 这恰好是“顺序对”而非“反转对”

**$w_0$  的代数性质:** 在 Weyl 群中,  $w_0$  是一个特殊的对合 (involution), 满足  $w_0^2 = e$  (恒等变换)。它的作用是反转偏序。对于  $S_n$ ,  $w_0$  将每个排列反转为“逆序”排列。因为  $w_0^2 = e$ , 所以  $I(w_0(w_0w)) = I(w)$ ——两次反转回到原点。<sup>34</sup>

## 70. 什么是三重舒伯特演算?

**70.1. 问题.** 三重舒伯特演算 (Triple Schubert Calculus) 是什么? 它和普通/双重的 Schubert 演算有什么不同? 为什么需要三组变量?

**70.2. 回答. 核心区别在于参与相交的 Schubert 簇的数量:**

**普通 Schubert 演算** (单变量  $\mathbf{x}$ ): 研究旗流形  $G/B$  中两个 Schubert 簇  $X(u), X(v)$  的相交。展开式为  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}) = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ , 系数  $c_{u,v}^w$  是非负整数 (点的相交个数)。

**双重 Schubert 演算** (双变量  $\mathbf{x}; \mathbf{y}$ ): 引入等变修正,  $\mathbf{y}$  记录 torus 作用的位移。展开式为  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ , 系数是关于  $t_i - y_j$  的多项式。

**三重 Schubert 演算** (三变量  $\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t}$ ): 研究三个 Schubert 类的乘积  $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v \cdot \mathfrak{S}_w$ , 几何上是三类 Schubert 胞腔的相继相交。三组变量分别记录三次位移。

**为什么需要三组变量?:** 在旗流形中, 三类 Schubert 簇  $X(u), Y(v), Z(w)$  (分别相对于三个不同 Borel 子群  $B, B^-, B'$ ) 的相继相交产生三个方向的 torus 位移。三组变量  $(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t})$  正是记录这三次位移的代数工具。<sup>35</sup>

## 71. 投影公式 (Projection Formula) 详解

**71.1. 问题.** 什么是投影公式 (projection formula)? 它和上同调中的 pullback ( $f^*$ ), pushforward ( $f_*$ ) 有什么关系? 为什么说它把  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  上的问题归约到  $X \times X$ ?

**71.2. 回答. 一、投影公式的严谨陈述**

设  $f: X \rightarrow Y$  是光滑投影代数簇之间的适当态射 (proper morphism)。记  $H^*(X), H^*(Y)$  为上同调环 (系数通常取  $\mathbb{Q}$  或  $\mathbb{C}$ )。

关键观察:  $f^*$  诱导  $H^*(X)$  成为  $H^*(Y)$ -模。投影公式指出:

$$f_*(f^*(\beta) \cup \alpha) = \beta \cup f_*(\alpha)$$

其中  $\alpha \in H^*(X), \beta \in H^*(Y)$ 。

换句话说,  $f_*$  是一个  $H^*(Y)$ -模同态。

**二、Pullback ( $f^*$ ) vs Pushforward ( $f_*$ ) 的对比**

<sup>34</sup>问:  $w_0$  的反转作用是什么?  $I(w_0w)$  是什么意思? 见附录 section 69。

<sup>35</sup>问: 三重舒伯特演算是什么? 见附录 section 70。

|       | $f^*$ (拉回)                                                              | $f_*$ (前推)                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 名称    | 环同态                                                                     | Gysin map                                          |
| 类型    | 环同态 (保持杯积)                                                              | 群同态 (非环同态)                                         |
| 保持杯积? | $\checkmark f^*(\beta_1 \cup \beta_2) = f^*(\beta_1) \cup f^*(\beta_2)$ | $\times$ 一般不行                                      |
| 度数变化  | $H^k(Y) \rightarrow H^k(X)$ (不变)                                        | $H^k(X) \rightarrow H^{k-\dim X + \dim Y}(Y)$ (改变) |

### 三、为什么需要投影公式?

因为  $f_*$  不是环同态, 一般情况下:

$$f_*(\alpha \cup \gamma) \neq f_*(\alpha) \cup f_*(\gamma)$$

但当我们知道其中一个类来自目标空间  $Y$  (即  $\gamma = f^*(\beta)$ ) 时, 投影公式给出了正确的乘法公式。

### 四、在量子上同调中如何归约问题?

3 点 Gromov-Witten 不变量  $\langle \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \rangle_{0,3,d}$  计数的是: 满足特定条件的亏格 0 稳定映射  $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$  的个数。

直接计算很困难, 因为  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  的结构非常复杂。归约策略如下:

- (1) 通过评估映射  $ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$ , 把  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  上的相交问题拉回到  $X$  上
- (2) 利用投影公式, 将问题前推到  $X \times X$  上
- (3) 在  $X \times X$  上, 我们实际上是在做标准的上同调杯积——这是我们熟悉的 Graham positivity 已经解决的问题

**用人话讲:** 把在“迷宫“ ( $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ ) 里找路, 变成在“大路“ ( $X \times X$ ) 上走路。投影公式告诉你: 只要你知道“大路“上的走法 (Graham positivity), 就能推断出迷宫里的走法 (EQLR 系数)。

**几何直觉:** 评估映射  $ev_3: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$  把稳定映射打到目标空间中的第三个标记点的像。然后我们问: 这个像落在哪个 Schubert 胞腔里? 通过 pushforward ( $ev_{3*}$ ) 把这些信息收集起来, 就得到了 EQLR 系数。

## 72. Torus 作用为何产生 $x_i$ 多项式? 量子修正的含义

**72.1. 问题.** 这一认识的关键在于: 我们可以同时考虑 torus 作用 (产生  $x_i$  多项式) 和量子修正 (产生  $q$  变量)。这里 torus 作用为什么对应的是  $x_i$  多项式? 为什么量子修正产生  $q$  变量? 这个修正到底是什么含义?

### 72.2. 回答. 1. Torus 作用为何产生 $x_i$ 多项式?

极大环面  $T \cong (\mathbb{C}^\times)^r$  作用在旗流形  $X = G/P$  上。在等变上同调  $H_T^*(X)$  中, 基础环 (系数环) 是  $H_T^*(pt) = \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ , 其中每个  $x_i$  对应  $T$  的一个无穷小生成元, 本质上对应负单根  $-\alpha_i$ 。

当在等变框架下做 Schubert 理论时, 结构常数  $c_{u,v}^w$  不再是简单的整数, 而是  $\Lambda$  中的多项式。这是因为在 homotopy quotient  $X \times_T ET$  上而非直接在  $X$  上进行相交运算。 $T$  的参数化 (由  $r$  个权重参数  $x_1, \dots, x_r$  描述) 使得系数成为关于这些参数的多项式。多项式的次数由 Weyl 群的长度差  $\ell(u) + \ell(v) - \ell(w)$  决定。

### 2. 量子修正的具体含义:

普通量子上同调  $QH^*(X)$  引入曲线计数的概念。在经典情形, 结构常数  $c_{u,v}^w$  只计数两个 Schubert 类相交得到的第三个 Schubert 类——这是点的相交 (零维)。但在量子情形, 我们要问: 经过两个 Schubert 类交点的曲线, 有多少条通过给定的一般点?

这种曲线计数引入了一个形式变量  $q$ 。在公式

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

中,  $d$  是曲线的多次数 (multi-degree),  $q^d$  是相应的形式变量。当  $d = 0$  时,  $q^0 = 1$ , 退回到普通等变上同调 (点的相交); 当  $d \neq 0$  时,  $q^d$  记录了曲线的贡献。

### 3. 为什么说等变量子上同调是“公共母体”?

等变量子上同调  $QH_T^*(X)$  同时包含两个自由度:  $x_i$  (来自 torus 作用) 和  $q$  (来自量子修正)。这意味着它同时推广了:

- 等变上同调 (当  $q = 0$  时) —— 对应 Graham positivity
- 普通量子上同调 (当  $x_i = 0$  时) —— 对应普通量子结构常数

这就是 Kim 的核心洞察: 等变量子上同调不是两个独立理论的简单组合, 而是一个统一框架。  $x_i$  encode 了“在哪一点附近做相交”的信息 (torus 固定的权重), 而  $q$  变量 encode 了“用多少维的曲线”来做相交的信息。前者是空间位置, 后者是拓扑维数。

## 73. 当 $x_i = 0$ 时退化为普通量子上同调的机制

**73.1. 问题.** 在定义 4.8 中提到“当所有  $x_i = 0$  时, 退化为普通量子上同调 (quantum cohomology)  $QH^*(X)$ 。”为什么会有这个退化? 请解释其中的数学机制。

### 73.2. 回答. 1. $x_i$ 的数学含义 (作为负根的坐标)

在等变量子上同调中,  $x_i$  是负单根 (negative simple roots) 的坐标:

$$\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$$

其中  $x_i$  对应负单根  $-\alpha_i$ 。这来自以下事实:

- $H_T^*(pt) = H^*(BT)$ , 其中  $BT$  是分类空间
- $H^*(BT) \cong \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_r]$ , 每个  $t_i$  对应 torus  $T \cong (\mathbb{C}^\times)^r$  的一个权
- 在 Schubert 演算的记号中, 我们通常取  $x_i = -\alpha_i$  (负根), 这使得正性结论更自然

### 2. 等变量子上同调 $QH_T^*(X)$ 的结构

等变量子上同调  $QH_T^*(X)$  是一个分次  $\Lambda[q]$ -代数:

- 基础环:  $\Lambda[q] = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r; q_1, \dots, q_{n-1}]$
- 基底:  $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$  (Schubert 类)
- 乘法:  $\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$
- 结构常数:  $c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  是多项式

### 3. 当 $x_i = 0$ 时发生了什么?

当我们令所有  $x_i = 0$  时, 相当于取张量积:

$$QH_T^*(X) \otimes_{\Lambda} \mathbb{Z} = QH_T^*(X) / \langle x_1, \dots, x_r \rangle$$

这相当于在 Kim 的结构定理 (定理 4.2) 中取以下同构:

$$A / \langle \Lambda^+ \cdot A \rangle \simeq QH^*(X)$$

其中  $\Lambda^+ \subset \Lambda$  是由正次数元素 (即所有  $x_i$ ) 生成的真理想。

### 4. 为什么这对应于“忘掉”了 torus 作用?

几何直觉:

- 等变量子上同调  $H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$  是 lift 到 homotopy quotient 上的类
- 当在  $H_T^*(X) \otimes_{\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]} \mathbb{Z}$  中令  $x_i = 0$  时
- 相当于从商空间  $X \times_T ET$  退回原始空间  $X$
- 这正是“忘掉”torus 作用的几何操作

代数解释:

- 在等变量子上同调中, 结构常数  $c_{u,v}^{w,d}$  是  $x_i$  的多项式

- 当  $x_i = 0$  时, 多项式  $c_{u,v}^{w,d}$  退化为整数  $c_{u,v}^{w,d}|_{x_i=0}$
- 这正是普通量子上同调中的结构常数

### 5. 具体例子: $\mathbb{P}^1$

设  $X = \mathbb{P}^1$ , 则:

- $T = \mathbb{C}^\times$  作用在  $\mathbb{P}^1$  上
- $H_T^*(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}[x][H]/(H^2 = xH)$ , 其中  $H$  是超平面类,  $x$  是负根参数
- 等变量量子量子上同调乘法:  $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1)$

当  $x = 0$  时:

- 关系变为  $H^2 = 0$  (这是普通  $\mathbb{P}^1$  的上同调关系)
- $q$  参数保留, 得到普通量子上同调  $QH^*(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}[q][H]/(H^2 = q)$

**总结:**  $x_i = 0$  的退化本质上是将系数环从  $\Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  替换为  $\mathbb{Z}$  (通过取商), 这相当于在几何上从 homotopy quotient  $X \times_T ET$  退回原始空间  $X$ , 从而“忘掉”了 torus 作用, 只保留量子修正结构。<sup>36</sup>

## 74. $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 例子的逐变量映射

**74.1. 问题.** 请详细解释  $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$  的例子 (chapter4.tex 第 168-180 行), 逐变量映射到一般公式, 并验证其性质。

### 74.2. 回答. 例子的完整公式:

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1).$$

#### 第一步: 定位每个几何对象

- (1)  $X = Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ : 这是最简单的 Grassmannian——1 维平面 (即直线) 构成的空间, 等距于射影直线  $\mathbb{P}^1$ 。几何上, 它是 2 维复向量空间  $\mathbb{C}^2$  中所有过原点的直线 (1 维子空间) 的集合。
- (2)  $W = S_2$ :  $S_2$  是 2 元素的对称群, 只有两个元素: 单位元 1 (恒等置换) 和  $s_1 = (12)$  (唯一非平凡置换)。 $W$  的秩 (rank) 为 1, 所以  $T \cong \mathbb{C}^\times$ , 只有一个参数  $x_1$ 。
- (3)  $\sigma(1) = 1$  (**单位类**): 这是上同调环的乘法单位元。在 Schubert 理论中,  $\sigma(w)$  的次数是  $2\ell(w)$ 。对于  $w = 1$  (长度 0),  $\sigma(1)$  位于上同调次数 0, 因此就是常数函数  $1 \in H^0(\mathbb{P}^1) = \mathbb{Z}$ 。
- (4)  $\sigma(s_1) = H$  (**超平面类**): 对于  $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ ,  $s_1$  的长度  $\ell(s_1) = 1$ , 所以  $\sigma(s_1) \in H^2(\mathbb{P}^1)$ 。在  $\mathbb{P}^1$  上,  $H^2$  的生成元就是超平面类  $[H]$  (一个点的上同调类)。这是上同调环中除单位元外唯一的生成元。

#### 第二步: 对照一般公式理解量子乘积

回忆一般量子乘积公式 (eq. (60)):

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w).$$

这里有两个求和:

- 对  $d$  (曲线的同调类) 求和—— $d$  记录曲线的亏格和次数
- 对  $w \in W^P$  (Weyl 群的最短代表元) 求和

<sup>36</sup>问: 为什么  $x_i = 0$  时退化为普通量子上同调? 见附录 section 73。

在  $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$  例子中：

取  $u = s_1, v = s_1$ ，代入公式：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{s_1, s_1}^{w, d} \sigma(w).$$

其中  $W^P = W = \{1, s_1\}$ 。我们需要分别检查  $d = 0$  和  $d = 1$  的情形。

**第三步： $d = 0$  的情形（无量子修正）**

当  $d = 0$  时， $q^0 = 1$ ，公式退化为普通等变 Schubert 乘法：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \cdots + c_{s_1, s_1}^{w, 0} \sigma(w) + \cdots$$

在  $d = 0$  时， $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1)$  的经典结果是什么？在  $\mathbb{P}^1$  上，两个点（ $H$  类）相交是什么？由于  $\mathbb{P}^1$  是一维的，两个点没有理由相交在正维子上——实际上是空的！所以  $d = 0$  时没有非零项。

**为什么  $d = 0$  给出零项？**在经典相交理论中， $\sigma(s_1)$  对应一个点（ $\mathbb{P}^1$  的闭点），两个点只有在它们相同（重合）时才相交。但在一般位置下，两个不同点是不相交的。因此  $c_{s_1, s_1}^{w, 0} = 0$  对所有  $w$  成立。

**第四步： $d = 1$  的情形（量子修正）**

当  $d = 1$  时，公式给出：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q^1 c_{s_1, s_1}^{1, 1} \sigma(1) + q^1 c_{s_1, s_1}^{s_1, 1} \sigma(s_1).$$

几何直觉：在  $\mathbb{P}^1$  上取两个点  $p, q \in \mathbb{P}^1$ 。问：有多少条亏格 0 曲线（ $\mathbb{P}^1$ ）经过  $p$  和  $q$ ？答案是恰好一条——就是  $\mathbb{P}^1$  本身经过任何两点！所以交点由亏格 0 曲线（一条从  $p$  到  $q$  的有理曲线）给出。

这条曲线的同调类是  $d = 1$ （在  $H_2(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}$  中是生成元）。因此  $c_{s_1, s_1}^{1, 1} = 1$ ，而  $c_{s_1, s_1}^{s_1, 1} = 0$ （ $w = s_1$  不可能出现，因为那样次数不对）。

代入得到：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q \cdot 1 \cdot \sigma(1) = q\sigma(1).$$

**第五步：逐变量对应关系表**

| 一般符号              | 在 $Gr(1, 2)$ 中的含义 | 具体值                              |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| $X = G/P$         | 旗流形               | $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$        |
| $W$               | Weyl 群            | $S_2 = \{1, s_1\}$               |
| $T$               | 极大环面              | $\mathbb{C}^\times$ （秩为 1）       |
| $x_i$ 变量          | 等变参数（负根）          | $x_1$ （唯一的 $x$ ）                 |
| $u, v$            | 乘法的 Schubert 类指标  | $u = v = s_1$                    |
| $d$               | 曲线的同调类            | $d = 0$ （点相交）或 $d = 1$ （曲线相交）    |
| $w$               | 结果的 Schubert 类    | $w = 1$ （单位元）                    |
| $q^d$             | 量子修正因子            | $q^0 = 1$ （无修正）或 $q^1 = q$ （有修正） |
| $c_{u, v}^{w, d}$ | 结构常数              | $c_{s_1, s_1}^{1, 1} = 1$        |
| $\sigma(w)$       | Schubert 类        | $\sigma(1) = 1$                  |

**第六步：求和的范围**

公式  $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{s_1, s_1}^{w, d} \sigma(w)$  的完整展开：

- (1) **对  $d$  求和：** $d$  遍历曲线同调类的非负整数组合。在  $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$  中， $H_2(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}$ ，所以  $d \in \mathbb{N}$ （非负整数）。但实际上只有  $d = 0$  和  $d = 1$  有非零贡献。



(2) 对  $w \in W^P$  求和:  $W^P = W = \{1, s_1\}$ 。所以内层求和是对两个指标  $w = 1$  和  $w = s_1$  求和。

完整展开:

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \underbrace{x\sigma(s_1)}_{d=0, w=s_1} + \underbrace{0}_{d=0, w=1} + \underbrace{0}_{d=1, w=s_1} + \underbrace{q\sigma(1)}_{d=1, w=1}.$$

各项解释:

- $d = 0, w = s_1$ : **等变经典项**。在  $H_T^*(\mathbb{P}^1)$  中, 关系  $H^2 = xH$  给出系数  $c_{s_1, s_1}^{s_1, 0} = x$  (不是 0!)。这一项代表经典的超平面类自乘。
- $d = 0, w = 1$ : **消失**。常数项  $c_{s_1, s_1}^{1, 0} = 0$  因为次数不匹配。
- $d = 1, w = s_1$ : **消失**。 $q\sigma(s_1)$  的总次数为  $1 + 1 = 2$  ( $q$  贡献 1 个次数), 但两个  $H$  类乘积只需次数 2, 所以这一项多余。
- $d = 1, w = 1$ : **量子修正项**。Gromov-Witten 不变量计数  $\mathbb{P}^1$  上通过两点的唯一亏格 0 曲线, 故  $c_{s_1, s_1}^{1, 1} = 1$ , 得到  $q\sigma(1)$ 。

**第七步: 正性验证**

在 Mihalcea positivity 中,  $c_{u,v}^{w,d}$  必须是关于  $x_i$  的非负整数系数多项式。这里  $c_{s_1, s_1}^{1, 1} = 1$  是平凡的非负整数 (常数多项式), 符合正性要求。

而在  $d = 0$  的经典情形,  $c_{s_1, s_1}^{s_1, 0} = x$  是非负的 ( $x$  是单项式),  $c_{s_1, s_1}^{1, 0} = 0$  也是符合正性的。

**第八步:  $q$  的几何意义**

$q$  标记的是  $\mathbb{P}^1$  的同调类。几何上: 在  $\mathbb{P}^1$  上,  $[pt] \in H_2(\mathbb{P}^1)$  是生成元。任何从  $p$  到  $q$  的亏格 0 稳定映射都同调于这条基线, 所以  $q$  记录的就是“这条线的存在”。

**几何直觉总结:**

- (1) **普通相交 ( $d = 0$ ) 失败**: 在  $\mathbb{P}^1$  上, 两个不同点的交集为空。
- (2) **量子修正 ( $d = 1$ ) 介入**: 存在唯一一条  $\mathbb{P}^1$  (亏格 0 曲线) 经过这两个点。
- (3) **结果**:  $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1)$  表示“通过亏格 0 曲线 (用  $q$  标记) 相连的两个点, 在量子上相交得到单位类”。

**为什么这是最简单的非平凡例子?:**

因为  $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$  的 Schubert 胞腔只有两层 (0 维点和 2 维超平面), 没有中间维数。这意味着:

- 当  $d = 0$  时, 无法产生非零相交 (两点不相交)
- 必须借助  $d = 1$  的量子修正才能得到非零结果
- 整个公式只包含一项, 结构最为清晰

这就是为什么  $Gr(1, 2)$  是验证等变量量子乘积结构的最理想起点。

## 75. Weyl 群与 $W_P$ 子群的具体例子

**问:** 请为 Weyl 群与  $W_P$  子群 (定义 4.5-4.6) 举一些具体例子, 帮助理解:  $W = S_n$  中当  $P$  是不同类型的抛物子群时  $W_P$  分别是什么?  $\Delta_P$  记录了什么信息? 直观上这些子群如何“忘记”某些反射方向?

**答:**

以  $GL_3/SL_3$  为例, 其 Weyl 群  $W = S_3$  由两个基本反射生成:

- $s_1$ : 交换  $x_1$  和  $x_2$
- $s_2$ : 交换  $x_2$  和  $x_3$

正单根系  $\Delta = \{\alpha_1, \alpha_2\}$ , 其中  $\alpha_1 = x_1 - x_2$ ,  $\alpha_2 = x_2 - x_3$ 。

**不同抛物子群  $P$  对应的  $W_P$  和  $\Delta_P$ :**

- (1) **Borel 子群**  $B$ :  $\Delta_P = \emptyset$  (空集),  $W_P = \{1\}$ 。此时  $P$  包含了全部简单根对应的反射方向, 所以商掉后  $W_P$  只剩单位元。
- (2) **极大抛物**  $P_1$  (第一行 Grassmannian):  $\Delta_P = \{\alpha_2\}$ ,  $W_P = \{1, s_2\}$ 。这意味着  $P_1$  包含了  $\alpha_2$  方向的反射, 所以只剩下  $s_2$  方向的区分能力。
- (3) **极大抛物**  $P_2$  (第二行 Grassmannian):  $\Delta_P = \{\alpha_1\}$ ,  $W_P = \{1, s_1\}$ 。同理。

**直观理解:**  $\Delta_P$  记录了  $P$  (或对应的抛物子群) 包含了哪些简单根。 $W_P$  则是由这些简单根对应的 Weyl 反射生成的子群。当我们从  $G$  过渡到  $G/P$  时, 沿  $W_P$  方向的反射变得平凡——它们把旗变到自身。这些方向被“忘记”了。

**置换的例子:** 在  $S_3$  中考虑  $w = s_1 s_2$ 。如果  $P = B$  ( $W_P = \{1\}$ ), 则  $w \notin W_B$ 。如果  $P = P_1$  ( $W_P = \{1, s_2\}$ ), 则  $w = s_1 s_2 \notin W_P$ , 因为  $s_1 \notin W_P$ 。

\* Insight:  $W_P$  的核心作用是刻画从  $G$  到  $G/P$  的商空间中, 哪些 Weyl 反射变得平凡。 $\Delta_P$  则精确记录了这些“被忘记”的方向。

**75.1. Kim 的等变量子同调结构定理 (Proposition 3.1).** 问: 定理 4.2 引用的 Kim2000 Proposition 3.1 到底说了什么? 证明在哪里? 直观上如何理解两个同构?

答:

**文献来源:** 该引用实际上是指 Bumsig Kim 1999 年在 Annals of Mathematics 上的论文 *Quantum cohomology of flag manifolds  $G/B$  and quantum Toda lattices* (这是该领域的奠基性工作)。

**结构定理的主要内容:**

Kim 的结构定理建立了两个同构, 联系了旗流形的拓扑与 Toda 格子 (一种物理模型):

- (1) **D-模同构 (等变量子/量子):** 旗流形  $G/B$  的等变量子微分模 (量子联络) 等同于量子 Toda 格子的 D-模。
- (2) **代数同构 (非等变量子/经典):** 取半经典极限后, 小量子上同调环

$$QH^*(G/B) \cong \mathbb{C}[p_1, \dots, p_l, e^{q_1}, \dots, e^{q_l}] / \langle H_1, \dots, H_l \rangle$$

即经典 Toda 格子的正则函数代数 (模去守恒量生成的理想)。

**证明思路** (基于 Givental 的框架):

- (1) **构造 J-函数:** 利用稳定映射模空间, 通过 Atiyah-Bott 局部化计算等变 Gromov-Witten 不变量, 封装成 J-函数。
- (2) **微分方程:** J-函数编码量子杯积, 形成量子联络的平展截面。
- (3) **对应 Toda 格子:** 证明 J-函数满足的微分方程恰好是 Whittaker 方程——即量子 Toda 格子的 Schrödinger 方程。
- (4) **半经典极限:** 当等变参数  $\rightarrow 0$  (相当于  $\hbar \rightarrow 0$ ), 非交换 D-模退化为交换代数, 量子方程退化为经典 Hamilton 量。

**直观理解:**

- **代数同构 (几何  $\leftrightarrow$  经典力学):** 计数曲线  $\cong$  求解经典物理问题。量子上同调的代数关系等同于 Toda 格子的守恒律。
- **D-模同构 (等变几何  $\leftrightarrow$  量子力学):** 加入等变参数后, 系统从经典力学升级到量子力学。环面作用的参数扮演 Planck 常数  $\hbar$  的角色。

\* Insight: Kim 的定理揭示了看似不同的两个领域——代数几何中的曲线计数与数学物理中的 Toda 格子——在深层结构上是等价的。这种等价性是数学统一性的又一例证。

## 76. 等变量子上同调中量子修正系数的几何意义

**76.1. 问题.** 在第四步 ( $d = 1$  情形) 的计算中, 笔记直接给出了:

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q_1 c_{s_1, s_1}^{1,1} \sigma(1) + q_1 c_{s_1, s_1}^{s_1, s_1} \sigma(s_1).$$

然后通过几何直觉 ( $\mathbb{P}^1$  上两点之间有且仅有一条有理曲线) 得出  $c_{s_1, s_1}^{1,1} = 1$ ,  $c_{s_1, s_1}^{s_1, s_1} = 0$ 。

**用户的疑问:** 为什么可以直接算出  $c_{s_1, s_1}^{1,1} = 1$ ? 这个系数具体是如何算出来的? 背后的数学机制是什么?

### 76.2. 回答. 1. EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 的定义

在经典上同调中, Littlewood-Richardson 系数告诉你 Schubert cycles 如何相交。在等变量量子情形中, 这些系数  $c_{u,v}^{w,d}$  是等变参数的多项式。乘法公式为:

$$\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{d \geq 0} \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma_w$$

其中:

- $u, v, w$ : 这些表示 Schubert 类 (对应 Schubert varieties  $X_u, X_v, X_w$ )。在  $\mathbb{P}^1$  中,  $\sigma(1)$  是单位类 (整个空间),  $\sigma(s_1)$  是点类。
- $d$ : 这是曲线的次数 (degree), 表示一条复曲线 “缠绕” 空间  $X$  的基本圈的次数。对于  $\mathbb{P}^1$ ,  $d = 1$  意味着我们考虑的是直线 (1 次曲线)。
- $q$ : Novikov 变量, 记录曲线的同调类。

### 2. Gromov-Witten 不变量如何计数曲线

Gromov-Witten (GW) 不变量  $\langle \sigma_u, \sigma_v, \sigma_w^\vee \rangle_d$  是这些系数的基本构建模块。从几何上看, 它们计数从亏格 0 曲线 (球面) 到空间  $X$  的稳定映射  $f: C \rightarrow X$ 。

**几何直观:** 想象有三个固定位置的 Schubert varieties  $X_u, X_v, X_w^\vee$ 。GW 不变量问的是: “有多少条  $d$  次有理曲线同时与这三个 varieties 相交?”

在等变情形下, 我们不仅得到一个数字, 而是得到一个多项式——这个多项式跟踪了 torus 作用  $T$  的不动点如何贡献到计数中。

### 3. 为什么对于 $\mathbb{P}^1$ , $d = 1$ 时 $c_{s_1, s_1}^{1,1} = 1$ ?

这个系数对应于  $q_1 \sigma(1)$  项。几何上, 这个问题变成了: “有多少条 1 次曲线 (直线) 通过两个点 ( $\sigma(s_1)$  和  $\sigma(s_1)$ ) 并与整个空间类 ( $\sigma(1)$ ) 相交?”

答案很简单: 在  $\mathbb{P}^1$  上, 过任意两点的直线恰好有一条。由于  $d = 1$  且条件被唯一曲线满足, 系数为 1。

这就是笔记中 “两点之间有且仅有一条有理曲线” 说法的精确数学表述。

### 4. 为什么 $c_{s_1, s_1}^{s_1, s_1} = 0$ (次数不对是什么意思)?

这个系数对应于  $q_1 \sigma(s_1)$  项。几何上, 这个问题变成了: “有多少条 1 次曲线通过两个点 ( $\sigma(s_1)$  和  $\sigma(s_1)$ ) 并与另一点 ( $\sigma(s_1)$ ) 相交?”

这涉及到上同调中的 **维数平衡原理**。对于一个 GW 不变量非零 (在上同调极限中), 约束条件的维数必须加起来等于曲线模空间的维数。

模空间维数公式:

$$\dim \mathcal{M}_{0,3}(\mathbb{P}^1, d) = \dim(\mathbb{P}^1) + \int_d c_1(T\mathbb{P}^1) + (3 - 3) = 1 + 2(1) + 0 = 3$$

约束条件的 “代价” (余维数):

- $\sigma(1)$ : 余维数为 0 (整个空间)
- $\sigma(s_1)$  (一个点): 余维数为 1

**几何直觉：**“次数不对”意味着你试图把一条曲线放入一个约束太严格或太松散的空间。在  $c_{s_1, s_1}^{s_1, s_1} = 0$  的情形中，你在寻找一条只满足两个点约束的 1 次曲线，而在这个量子世界中，如果维数不能精确填充模空间，对该空间的积分就会消失。

**关键洞察：**在量子上同调中，乘法  $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1)$  的结果必须满足维数平衡。 $\sigma(s_1)$  是余维 1 的类，所以两个  $\sigma(s_1)$  的乘积应该给出余维 2 的类。但在量子修正中， $q$  变量贡献了额外的维数。对于  $d = 1$ ， $q$  贡献了  $c_1(T\mathbb{P}^1) = 2$  个维数。所以  $q_1\sigma(1)$  ( $q$  贡献 2，维数 0，总计 2) 与  $2\sigma(s_1)$  (每个贡献 1) 的维数不匹配！这导致了只有  $q_1\sigma(1)$  项出现。

## 77. $\Lambda[q]$ -代数是什么？

**77.1. 问题.**  $\Lambda[q]$ -代数是什么？

**77.2. 回答.**  $\Lambda[q]$ -代数 (Lambda-q algebra) 在 Schubert 演算中有以下含义：

- (1) **经典语境 (Steenrod):**  $\Lambda$ -代数最初由 Steenrod 引入，是定义 Steenrod 代数时自然出现的代数结构，核心是满足特定余乘和余单位公理的余代数。
- (2) **Schubert 多项式语境：**在量子 Schubert 演算中， $\Lambda[q]$  通常指：

$$\Lambda[q] = \mathbb{Z}[q_1, q_2, \dots, q_n] / (\text{relation})$$

即系数环上的对称多项式环的  $q$ -变形， $q_i$  是量子参数 (quantum parameters)。

- (3) **等变量子上同调语境：**在 equivariant quantum cohomology 中， $q$  对应 equivariant parameter。 $\Lambda[q]$  是配备  $\lambda_q$  运算的分次交换环，是  $\Lambda$ -环 ( $\lambda$ -ring) 的  $q$ -变形。

## 78. ET 分类空间的直观理解

**78.1. 问题.** ET 分类空间有什么直观理解？

**78.2. 回答. ET 的拓扑构造：** $T$  的分类空间 (Classifying space)  $ET$  的定义：一个拓扑空间  $X$ ，配备连续的  $T$  作用，满足：

- (1)  $X$  是 \*\* 可缩的 \*\* ( $\pi_i(X) = 0$  for all  $i \geq 1$ )
- (2)  $T$  在  $X$  上的作用是 \*\* 自由的 \*\* ( $t \cdot x = x \implies t = e$ )

**为什么叫“分类空间”：**任何自由  $T$  空间  $E$  都是某个唯一确定的  $T$ -映射  $E \rightarrow ET$  的纤维——这正是“万有分类”的意义。

**直观理解：**从几何上看， $ET$  可以理解为所有主  $T$  丛的“通用族”。对于紧致 Lie 群  $T$ ， $ET$  可以具体构造为  $S^\infty$  的无穷维球面塔：

$$ET = \bigcup_{n \rightarrow \infty} S^{2n-1}$$

其中  $T = S^1$  作用在  $S^{2n-1}$  上以对角方式。对于高维 torus  $T \cong (S^1)^r$ ， $ET = (S^\infty)^r$ 。

**ET 作为无穷维球面的极限：**注意  $S^{2n-1}$  是  $2n-1$  维 (奇数维) 球面。当  $n \rightarrow \infty$  时，我们得到  $S^\infty$ ，它在拓扑上可缩——这正是极限的妙处：有限维时我们得到的是非平凡的流形，无穷维时却收缩成一点。

**等变上同调中的角色：**在等变上同调  $H_T^*(X)$  的定义中， $ET$  扮演着“坐标环”的角色

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中  $X \times_T ET = (X \times ET)/T$  是扭积 (twisted product)。

## 79. 为何限制到 $GL_m(\mathbb{C})$

**79.1. 问题.** 在证明 Schubert 多项式 positivity 时，为什么可以将一般约化群  $G$  限制到  $G = GL_m(\mathbb{C})$ ？

### 79.2. 回答. 归约技术的底层逻辑:

- (1) **嵌入保持胞腔结构**: 任何约化群  $G$  都可以嵌入到某个  $GL_m(\mathbb{C})$  中, 嵌入是单的且是代数群态射。旗流形  $G/P$  通过此嵌入嵌入到  $GL_m/P'$  中, Schubert 胞腔的闭包关系被保持:

$$\overline{B^{-\pi}B/P} \subseteq \overline{B^{-\sigma}B/P} \iff \overline{B^{-\pi}B/P'} \subseteq \overline{B^{-\sigma}B/P'}$$

- (2) **多项式代表元的函子性**: 由 [2, Theorem 10.6.4], 类  $[\overline{B^{-\pi}B/B}]_T$  由双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  表示。当限制到  $GL_m$  时, 这个代表元关系保持。
- (3) **Positivity 的稳健性**: Graham positivity 猜想涉及 Schubert 多项式展开系数的非负性。这个性质在嵌入下保持——如果一般群的情形有 positivity, 则其  $GL_m$  实现也有 positivity; 反之如果  $GL_m$  情形有 negativity, 通过嵌入的逆映射可以构造反例。

**技术便利性**:  $GL_m(\mathbb{C})$  有明确的多项式基 (Schubert 多项式), 而一般约化群没有这么好的多项式代表元系统。

## 80. Gromov-Witten 不变量的物理起源

**80.1. 问题**. Gromov-Witten 不变量最初是如何从物理中推导出来的? A-model 和 B-model 是什么?

**80.2. 回答. 物理背景**: Gromov-Witten 不变量最初来自 1990 年代物理学家对拓扑场论 (Topological Field Theory, TFT) 的研究。在弦论中, 紧化到一个卡勒流形的 Compactification 会产生一个 2D 共形场论 (CFT)。

**A-model vs B-model**:

- **A-model** (拓扑  $\sigma$ -模型): 依赖辛结构 (symplectic structure)。可观测量是  $TT^*$  型的上同调类。配分函数定义为

$$Z_A(q) = \sum_{d \in H_2(X, \mathbb{Z})} q^d \int_{[\mathcal{M}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{virt}}} 1$$

- **B-model** (拓扑  $\sigma$ -模型): 依赖复结构 (complex structure)。可观测量是  $(p, q)$  型的超荷闭链。

**GW 不变量的物理起源**: Witten 在 1990 年代初期提出, AJ 猜想 (Asymptotic Jacobian) 将模空间上的相交数与某种规范理论的配分函数联系起来。Gromov 和 Witten 的关键贡献是: 将模空间  $\mathcal{M}_{g,n}(X, \beta)$  的虚拟基本类 (virtual fundamental class) 用于定义不变量, 从而在数学上严格化了物理直觉。

**与 Schubert 演算的联系**: 在旗流形  $G/P$  中, GW 不变量恰好编码了量子上同调环的结构常数:

$$\sigma(u) \cup_q \sigma(v) = \sum_w \text{GW}_{u,v}^w \cdot \sigma(w)$$

其中  $\sigma(w)$  是 Schubert 类,  $\cup_q$  是量子乘积。

## 81. 量子 Cauchy 恒等式的物理起源

**81.1. 问题**. 量子 Cauchy 恒等式在数学物理中有什么深刻根源?

### 81.2. 回答. 拓扑场论对偶性：量子 Cauchy 恒等式

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{y}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

在数学物理中源于 **AGT 对偶性** (Alday-Gaiotto-Tachikawa correspondence)。

**关键洞察**：这个恒等式可以理解为某种配分函数的对偶性：左边是  $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  域中两个一级因子的积，右边是在中间变量  $\mathbf{y}$  上求和后的结果——这正是矩阵模型中著名的 Cauchy 公式的量子变形。

**与几何 Langlands 的联系**：在数学物理的更深刻框架下，量子 Schubert 恒等式与 **几何 Langlands 纲领** 有深层联系。量子参数  $q$  对应于 Langlands 对偶群  ${}^L G$  的某个表示参数，而 Cauchy 恒等式编码了这种对偶性下的“层交换” (sheaf exchange)。

## 82. Kirillov-Maeno 1996 工作的背景

**82.1. 问题.** Kirillov-Maeno 1996 年的工作背景及其与先前工作的关系是什么？

**82.2. 回答. 历史脉络：**

- (1) **Lascoux-Schützenberger (1980s)**：首次引入 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  作为旗流形上上同调类的代表元，建立了胞腔分解与多项式之间的对应。
- (2) **Kirillov-Maeno (1996)**：Kirillov 和 Maeno 在 [21] 中引入了**量子双重 Schubert 多项式**  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{q})$ ，这是对 Lascoux-Schützenberger 多项式的量子变形。他们的动机是：
  - 将 Schubert 演算推广到**量子上同调**的框架
  - 研究旗流形  $G/B$  的等变量子乘积结构
  - 探索多项式代表元在量子修正下的行为
- (3) **关键创新**：引入第三组变量  $\mathbf{q}$  (量子参数)，使得多项式可以同时编码经典上同调和量子修正两部分信息。

**与本文的关系**：本文第三章介绍 Kirillov-Maeno 的工作，作为进入量子 Schubert 演算的入门框架。他们的多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{q})$  是理解 Buch, Mihalcea 等人后续工作的基础。

## 83. Molev-Sagan 公式的历史脉络

**83.1. 问题.** Molev 和 Sagan 的原始工作是什么？他们的公式与 Samuel 2024 年的推广有什么关系？

**83.2. 回答. 历史背景**：Molev 和 Sagan 在 1990 年代末期研究了 Grassmannian 情形 (即  $u, v$  都是 Grassmannian 排列) 的展开系数公式。他们的核心贡献是揭示了一个美妙的**组合结构**：系数可以理解为某种路径计数 (path counting)。

**Molev-Sagan 公式 (Grassmannian 情形)**：对于 Grassmannian 排列  $u, v$ ，有

$$c_{u,v}^w = \sum_{\pi} \#\{\text{满足特定条件的东北路径}\}$$

其中路径计数发生在特定的格状区域 (lattice path)。这与经典的 Littlewood-Richardson 规则有深刻的联系。

**Samuel 2024 年的推广** (见 [31])：Samuel 将 Molev-Sagan 的路径计数公式推广到了**\*\* 一般旗流形 \*\***情形 (即  $u, v$  不限于 Grassmannian 排列)。这一定理的证明依赖于：

- (1) 对偶 Chevalley 公式 (Dual Chevalley formula)
- (2) 组合表示论中的甬道模型 (gallery model)
- (3) 等变量子上同调的 Localization 技术

**关系总结:** Molev-Sagan (1990s)  $\xrightarrow{\text{路径计数解释}}$  Samuel (2024)  $\xrightarrow{\text{本文 Theorem 1.1}}$  三重 Schubert Positivity

## 84. 量子上同调的历史发展

**84.1. 问题.** 量子上同调是如何发展起来的？各数学家贡献的顺序和相互关系是什么？

**84.2. 回答. 发展时间线:**

(1) **1995-1997: 开创期**

- Givental 引入量子上同调环的公理化定义
- Kim 将量子上同调与镜面对称联系起来
- Ciocan-Fontanine 确定了一般旗流形的量子乘积结构

(2) **1998-2002: 成熟期**

- P Sharpe, Ruan 等人发展了 orbifold 量子上同调
- Buch, Mihalcea 分别独立证明了量子 Schubert calculus 的 positivity
- Kontsevich 的扭结不变量与 GW 不变量建立了深层联系

**84.3. 问题.** 量子上同调是如何发展起来的？各数学家贡献的顺序和相互关系是什么？

**84.4. 回答. 发展时间线:**

(1) **1995-1997: 开创期**

- Givental 引入量子上同调环的公理化定义
- Kim 将量子上同调与镜面对称联系起来
- Ciocan-Fontanine 确定了一般旗流形的量子乘积结构

(2) **1998-2002: 成熟期**

- P Sharpe, Ruan 等人发展了 orbifold 量子上同调
- Buch, Mihalcea 分别独立证明了量子 Schubert calculus 的 positivity
- Kontsevich 的扭结不变量与 GW 不变量建立了深层联系

(3) **2003-至今: 精密化期**

- Knutson-Tao 的帐篷公式 (tent formula) 给出了结构常数的组合描述
- Graham positivity 定理将问题提升到等变量子上同调层面
- Anderson-Fulton 的工作建立了等变量子上同调的统一框架
- Gao-Xiong (2025) 将 positivity 推广到三重情形

**核心人物关系图:**

- Givental  $\rightarrow$  Kim  $\rightarrow$  Ciocan-Fontanine (旗流形量子上同调)
- Buch  $\leftrightarrow$  Mihalcea (独立发现量子 Positivity)
- Knutson-Tao  $\rightarrow$  Graham  $\rightarrow$  Anderson-Fulton (等变量子框架)
- Anderson-Fulton  $\rightarrow$  Gao-Xiong (2025) (三重推广)

## 85. Classical Double Schubert Positivity 定理

**定理 7.2 (Classical Double Schubert Positivity).** 设  $u, v, w \in S_n$  为任意置换, 则在旗流形  $Fl_n = SL_n/B$  的等变量子上同调中, 结构常数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是关于  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$  和  $\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_n)$  的多项式, 且所有系数均为非负整数。

特别地, 当  $\mathbf{t} = 0$  时,  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, 0) \in \mathbb{N}[y_1, \dots, y_n]$  是非负整数系数的多项式。

**注:** 此定理是 Graham [14] 的经典结果, 本文 Theorem 1.1 给出了其三重推广。

## 86. 仿射 Grassmannian 的记号 $G((t))/G[[t]]$

**86.1. 问题.**  $G((t))/G[[t]]$  这个记号是什么意思？其中的  $G((t))$  和  $G[[t]]$  分别代表什么？

**86.2. 回答.** 这是 \*\* 仿射 Grassmannian \*\* (affine Grassmannian) 的纯数学表述，常见于几何表示论和量子上同调理论。

### 1. 各个符号的含义

- $G((t))$  — 形式 Laurent 级数  $Laurent$   $g(t) = \sum_{k \geq -N} g_k t^k = g_{-N} t^{-N} + \cdots + g_{-1} t^{-1} + g_0 + g_1 t + g_2 t^2 + \cdots$   $Laurent$
- $G[[t]]$  — 形式幂级数子群：只允许非负幂次

$$g(t) = g_0 + g_1 t + g_2 t^2 + \cdots$$

这对应于在形式圆盘 (punctured disk 的对偶) 上的多项式映射。

- $G((t))/G[[t]]$  — **仿射 Grassmannian**  $\mathcal{G}\nabla_G$ ：上述两者的商。这是一个无限维的齐性空间。

### 2. 几何直观

从代数几何角度看：

- $\mathbb{D} = \text{Spec } \mathbb{C}[[t]]$  — 形式圆盘 (一维复盘中挖去原点)
- $\mathbb{D}^\times = \text{Spec } \mathbb{C}((t))$  — 挖去原点的圆盘 (环形邻域)

$G((t))/G[[t]]$  的几何含义是：

- $G$ -丛在  $\mathbb{D}^\times$  上的分类 (模掉在  $\mathbb{D}$  上的平凡化)
- 换言之，它参数化了  $G$ -丛在挖去原点的圆盘上的平凡化类别

### 3. Schubert 胞腔结构

仿射 Grassmannian 有一个 \*\* 仿射 Schubert 胞腔 \*\* 分解，胞腔由仿射 Weyl 群  $\widetilde{W}$  的元素标记：

$$\mathcal{G}\nabla_G = \bigcup_{w \in \widetilde{W}} \mathcal{X}(w)$$

每个仿射 Schubert 胞腔  $\mathcal{X}(w)$  同构于仿射空间  $\mathbb{C}^{\ell(w)}$ 。

### 4. 与旗流形的关系

在量子 Schubert 演算中，仿射 Grassmannian 扮演重要角色：

- 旗流形  $Fl_n = G/B$  可以嵌入到仿射 Grassmannian 中
- 等变量子上同调  $H_T^*(\mathcal{G}\nabla_G)$  与量子 Schubert 多项式、Toda 格子的研究密切相关
- Kim 的工作建立了旗流形的量子上同调与仿射 Grassmannian 的联系

### 5. 与 Mihalcea 量子 Schubert 演算的联系

在笔记的 Chapter 4 中，Mihalcea 的量子 Schubert 演算虽然不直接使用  $G((t))/G[[t]]$ ，但其底层几何涉及：

- 稳定映射模空间  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$
- Gromov-Witten 不变量计数曲线
- 这些概念在仿射 Grassmannian 的语境中有自然的类比

**参考文献：** 见 [29, Chapter 4]，以及 Givental-Lee 的相关工作。<sup>37</sup>

<sup>37</sup>问：  $G((t))/G[[t]]$  记号是什么意思？见附录 section 86。



## 87. 量子乘积公式中的两个求和

**87.1. 问题.** 在等变量子上同调的量子乘积公式

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

中，这两个求和分别是对什么求和的？

**87.2. 回答.** 这个公式中的两个求和分别是：

- (1) **对  $d$  求和：** $d$  是曲线类的**多重次数 (multi-degree)**，即稳定映射  $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$  的 degree。 $d$  遍历所有有效的 degree (通常取值在  $\mathbb{N}^k$ ，其中  $k$  是 Picard 群的秩)。 $q^d$  是形式变量 (quantum parameter)，用于追踪 degree 信息。
- (2) **对  $w \in W^P$  求和：** $W^P$  是 Weyl 群  $W$  对抛物子群  $W_P$  的陪集中的**最短长度代表元集合** (shortest length representatives)。 $w$  遍历  $W^P$  中的所有元素——即 Schubert 基底的指标。

**直观理解：**这个公式表达的是：两个 Schubert 类  $\sigma(u), \sigma(v)$  的量子乘积，是所有 degree  $d$  和所有 Schubert 基底  $\sigma(w)$  的线性组合。当  $d = 0$  时，公式退化为普通等变上同调的 Graham 乘积公式；当  $q$  变量被设置为 1 时，得到普通量子上同调。

**与经典情形的对比：**在普通上同调  $H^*(G/P)$  中，只有对  $w \in W^P$  的求和 (没有  $d$  和  $q$ )，因为不涉及量子修正。

## 88. 次数公式中 $\sum d_i \cdot \deg(q_i)$ 的求和范围

**88.1. 问题.** 在等变量子 Littlewood-Richardson 系数的次数公式

$$c(u) + c(v) - c(w) - \sum d_i \cdot \deg(q_i)$$

中，求和指标  $i$  的范围是什么？

**88.2. 回答.** 这里的  $i$  遍历的是旗流形  $X = G/P$  的 **\*\*Picard 数\*\*** (即  $H_2(X, \mathbb{Z})$  的秩)，记为  $k$ 。

- (1)  $d = (d_1, \dots, d_k)$ : 曲线类的多重次数 (multi-degree),  $k = \text{rank}(H_2(X, \mathbb{Z}))$ ;
- (2)  $q = (q_1, \dots, q_k)$ : 对应的量子参数，每个  $q_i$  对应一个 generator;
- (3)  $\deg(q_i) = 1$  (见 section 57)，因此  $\sum_i d_i \cdot \deg(q_i) = \sum_i d_i$ 。

**次数条件的意义：** $c(u) + c(v) - c(w) - \sum_i d_i \cdot \deg(q_i)$  必须是  $x_i$  的非负次数，以确保  $c_{u,v}^{w,d}$  是齐次多项式。当  $d = 0$  时，此条件退化为  $c(u) + c(v) = c(w)$ ，即普通等变上同调的情形。

## 89. 为什么 $w = s_1$ 在 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1)$ 中不可能出现

**89.1. 问题.** 为什么在量子乘积公式  $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1)$  中， $w = s_1$  不可能出现，而只能是  $w = 1$ ？

**89.2. 回答.** 在量子乘积展开中，次数约束方程为：

$$|u| + |v| = |w| + 2d$$

其中  $|w|$  是 Schubert 类  $\sigma(w)$  的上同调次数。

对于  $\mathbb{P}^1$  的情形：

- $|s_1| = 1$  (超平面类是一次)
- $|1| = 0$  (单位类是零次)

代入次数约束方程  $1 + 1 = |w| + 2d$ ：

- 如果  $w = s_1$  ( $|w| = 1$ ), 则  $2 = 1 + 2d$ , 得  $d = 1/2$  —这不是整数, 所以不可能
- 如果  $w = 1$  ( $|w| = 0$ ), 则  $2 = 0 + 2d$ , 得  $d = 1$  —满足次数约束

**结论:**  $w = s_1$  不可能出现是因为它会导致曲线次数  $d$  不为整数, 而稳定映射的同调类必须是  $H_2(X, \mathbb{Z})$  中的整类。

## 90. $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 的定义详解

**90.1. 问题.** 请详细解释  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  的定义。

**90.2. 回答.**  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  是稳定映射的模空间 (stable map moduli space), 这是量子上同调理论中的核心几何对象。

### 一、下标 0 和 3 的含义

下标描述的是域曲线的拓扑性质:

- **0:** 域曲线的算术亏格 (arithmetic genus)。亏格 0 的曲线是有理曲线。若光滑则同构于  $\mathbb{P}^1$ ; 若不光滑, 则是若干个  $\mathbb{P}^1$  通过节点连成的“树” (tree of  $\mathbb{P}^1$ 's joined at nodes)。
- **3:** 曲线上的 3 个有序标记点 (marked points)  $x_1, x_2, x_3$ , 它们必须位于曲线的光滑点上 (不能位于节点)。

### 二、上划线 $\overline{\mathcal{M}}$ 的含义——为什么需要紧化?

若只考虑光滑曲线的映射模空间  $\mathcal{M}_{0,3}(X, d)$ , 则一般不是紧的 (不 proper)。序列的光滑曲线映射可以退化 (degenerating), 导致无法在其上做积分。

Kontsevich 紧化 (1995): 通过添加“边界除子” (boundary divisors) 来让空间 proper。边界除子由结点曲线 (nodal curves) 上的稳定映射组成。这使得我们可以对空间做积分、提取 Gromov-Witten 不变量。

### 三、稳定映射的严谨定义

一个稳定映射是一个 tuple:

$$(C, x_1, x_2, x_3, f)$$

其中:

- (1)  $C$  是连通、投影、约化曲线, 亏格 0, 最多节点奇点;
- (2)  $x_1, x_2, x_3$  是  $C$  上 3 个不同的光滑点;
- (3)  $f: C \rightarrow X$  是代数簇之间的态射;
- (4)  $f_*[C] = d \in H_2(X, \mathbb{Z})$  (同调类条件);
- (5) **稳定性条件:** 映射  $f$  的自同构群必须有限。

稳定性条件的具体含义: 若某个不可约分支  $E \cong \mathbb{P}^1$  被  $f$  收缩到  $X$  中一个点 ( $f(E) = \text{pt}$ ), 则  $E$  必须至少含 3 个特殊点 (特殊点 = 标记点或与其他分支相交的节点)。这排除了“幽灵分支” (ghost component) ——即没有足够结构来固定自身的无用分支。

## 91. 幽灵分支与稳定性条件的直观解释

**91.1. 问题.** 请详细解释稳定映射中“幽灵分支” (ghost component) 的概念, 以及稳定性条件的动机。

### 91.2. 回答. 一、幽灵分支 (Ghost Component) 的概念

在稳定映射的紧化过程中, 曲线  $C$  可能包含一些被  $f$  收缩到  $X$  中一个点的不可约分支  $E \cong \mathbb{P}^1$ 。这样的分支在几何上没有贡献——它们不提供新的交点信息。

**幽灵分支的例子:** 假设一个树状的结点曲线, 有一个  $\mathbb{P}^1$  分支  $E$ :

- $E$  上只有 2 个特殊点 (与主分支的交点和另一个标记点)

- $f|_E$  是常值映射（把整个  $E$  映到  $X$  中一个点  $pt$ ）

这个  $E$  就是幽灵分支——它对映射没有实质贡献，却会出现在模空间中，如果不加限制，会导致：

- (1) **无限自同构**：常值映射的  $\mathbb{P}^1$  可以被无数个自同构（旋转）而不改变映射
- (2) **序列不紧**：一系列从  $E$  “分裂”出来的映射可能退化到不可列序列

## 二、稳定性条件的动机

稳定性条件要求：若某个不可约分支  $E \cong \mathbb{P}^1$  被  $f$  收缩到  $X$  中一个点，则  $E$  必须至少含 **3 个特殊点**。

特殊点包括：

- 标记点（marked points）
- 与其他分支相交的节点（nodes）

**为什么是 3 个？** 这是为了消除无限自同构：

- $\mathbb{P}^1$  上的自同构群是  $\mathrm{PGL}(2, \mathbb{C})$ ，这是一个 3 参数群
- 给定 3 个一般位置的点， $\mathbb{P}^1$  的自同构就被唯一确定（刚性问题）
- 因此：如果一个分支有  $\geq 3$  个特殊点，其自同构群就被固定

## 三、Kontsevich 紧化的核心洞察

Kontsevich 的天才之处在于：他认识到：

- 不稳定曲线（幽灵分支）导致的问题是**局部的**
- 可以在紧化过程中直接**删除**这些不稳定配置
- 剩下的稳定映射空间  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  是 proper 的，可以在上面做积分

这使得 Gromov-Witten 不变量的定义成为可能——我们需要一个紧的模空间来定义积分。

## 92. Mihalcea 证明符号对照笔记

**92.1. 问题.** 笔记中 Mihalcea 证明的符号（半直积  $B'$ 、投影公式中的  $F(V_i)$  等）与原文是否一致？特别是：

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T)$$

**92.2. 回答.** 经过核对 Mihalcea 原文（Section 6, pages 8-11），**笔记中的符号与原文基本一致。**

| 项目                 | Mihalcea 原文                                                                                 | 笔记 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| $B'$ 定义            | $T \cdot (U^- \times U^-)$                                                                  | 同  |
| $B'$ 作用公式          | $(tu_1 \bar{g}_1, tu_2 \bar{g}_2)$                                                          | 同  |
| Corollary 6.2      | $[V]_T = \sum f_i [Y(u) \times Y(v)]_T$                                                     | 同  |
| Projection formula | $f_*^T((f^T)^*(a) \cdot b) = a \cdot f_*^T(b)$                                              | 同  |
| 主公式                | $c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T)$ | 同  |
| $[F(V_i)]_T$ 含义    | 等变上同调类                                                                                      | 同  |

**用户的困惑来源：** 笔记用了  $X(u)$  和  $Y(u)$  两种记号——这是原文标准记号：

- $X(u)$ : Schubert variety ( $B$  轨道闭包)
- $Y(u)$ : Opposite Schubert variety ( $B^-$  轨道闭包)

整体而言，笔记忠实地再现了 Mihalcea 的证明结构。

### 93. 为什么研究部分旗流形

**93.1. 问题.** 在 Schubert 演算中，我们经常遇到部分旗流形 (partial flag manifolds)  $Fl(V_1, \dots, V_r; n)$ 。为什么要研究它们？它们比 Grassmannians 更一般，但研究起来也更复杂——这样的推广有什么深刻动机？

#### 93.2. 回答. 一、从 Grassmannians 到部分旗流形的自然推广

Grassmannian  $Gr(k, n)$  是  $n$  维空间中所有  $k$  维线性子空间构成的空间。它分类了秩为  $k$  的向量丛的形变。

部分旗流形  $Fl(V_1, \dots, V_r; n)$  是更精细的版本：它分类链

$$0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \dots \subset V_r \subset \mathbb{C}^n$$

其中每个  $V_i$  是指定维度  $d_i$  的子空间， $0 < d_1 < d_2 < \dots < d_r < n$ 。

从几何上讲，部分旗流形是齐性空间  $GL_n/P$ ，其中  $P$  是一个抛物子群 (parabolic subgroup)。Grassmannian 对应的是  $P$  为极大抛物子群的情形——部分旗流形对应一般的抛物子群。

#### 二、表示论的核心地位

部分旗流形  $G/P$  是复 Lie 群表示论的中心对象：

- (1) **旗流形与表示的分类：**Borel-Weil-Bott 定理告诉我们， $G/P$  的上同调群恰好对应  $G$  的某些不可约表示。这建立了几何与表示论之间的深刻联系。
- (2) **万有丛结构：**部分旗流形上存在万有旗丛 (universal flag bundle)，其纤维是旗流形本身。这使得部分旗流形成为了研究向量丛的通用工具。
- (3) **几何不变量：**部分旗流形上的 Schubert 子 variety 分类了各种几何不变量，这些不变量在表示论中有明确含义。

#### 三、Schubert 演算的自然舞台

在 Grassmannian 中，Schubert 多项式由单变量（或者等价地，单个 Grassmannian 排列）参数化。在部分旗流形中：

- (1) **多指标参数化：**Schubert 胞腔由多个“相对维数”参数化——这更自然地反映了旗链中每一步的选择。
- (2) **Pieri 规则与 Cauchy 公式：**部分旗流形上的相交理论包含了 Grassmannian 情形的推广。例如，两个 Schubert 类的乘积展开系数仍然可以用推广的 LR 系数描述。
- (3) **量子化：**部分旗流形的量子上同调包含了曲线计数（通过 Gromov-Witten 不变量）的信息，这是 Grassmannian 情形的一般化。

#### 四、在代数几何中的重要性

- (1) **退化轨迹 (Degeneracy Loci)：**给定一个向量丛  $E$  和一个旗结构  $0 \subset E_1 \subset \dots \subset E_r \subset E$ ，对应的退化轨迹是  $E$  的截面使某些子丛维数退化的点集。这些轨迹是部分旗流形的子 variety，与 Schubert 演算紧密相关。
- (2) **凝结引理 (Thick Spanning Tree)：**部分旗流形提供了研究向量丛之间的态射空间的几何框架。
- (3) **簇的分类：**从几何不变量理论的角度，部分旗流形是理解一般旗流形万有性的基础。

#### 五、统一视角：为什么复杂化是值得的

- (1) **数学的统一性：**Grassmannians、完整旗流形、射影空间都是部分旗流形的特例。理解部分旗流形就理解了所有这些空间的相交理论。

- (2) **表示论的深度**: 部分旗流形上的 Schubert 演算反映了表示论中更深的结构——权重的多重性、晶体的几何实现等。
- (3) **应用广泛性**: 在量子上同调、Gromov-Witten 理论、纽结不变量、几何 Langlands 对应等领域, 部分旗流形都扮演着核心角色。

## 六、从具体例子理解

考虑  $Fl(1, 2; 4)$ ——这是  $\mathbb{C}^4$  中所有链  $0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \mathbb{C}^4$  (其中  $\dim V_1 = 1$ ,  $\dim V_2 = 2$ ) 的空间。

- 这包含了两步的选择: 首先选一条线, 然后选一个包含这条线的二维平面。
- Schubert 胞腔的参数需要两个指标:  $(a_1, a_2)$  满足  $0 \leq a_1 \leq a_2 \leq 2$ 。
- 几何上, 这对应了  $Gr(1, 4) = \mathbb{P}^3$  上的一个  $\mathbb{P}^2$ -丛。

这种“分层选择”的结构使得部分旗流形成为描述更复杂几何现象的自然语言。

**总结**: 研究部分旗流形的动机在于它们同时位于代数几何、表示论和拓扑学的交叉点。它们是理解更一般的旗流形的基础, 同时许多数学物理情境中自然出现。复杂性来自于丰富性——部分旗流形提供了足够一般的框架来统一许多特殊情形, 同时保持足够的结构使得深入研究成为可能。

## 94. $c_{u,v}^{w,d}$ 的系数环 $\mathbb{Z}[x_i]$ 从何而来? 为何 ch4 证明没有“提到”根?

**94.1. 问题**. 为什么说  $c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  是非负系数多项式? ch4 的 Mihalcea Positivity 证明里面似乎并没有提到根系  $x_i$ ——这些根是怎么进来的? 是证明中隐含的吗?

**94.2. 回答. 核心答案**:  $x_i$  是等变量子上同调的基础系数环, 不是证明的产物。

在 ch4 的证明中, 你找不到“现在我们引入  $x_i$  作为负单根”这样的叙述——因为  $x_i$  根本不是证明出来的, 而是建立等变量子上同调框架时就已经定义好的东西。

**1.  $x_i$  的来源**:  $H_T^*(pt) = \Lambda$

极大环面  $T \cong (\mathbb{C}^\times)^r$  作用在旗流形  $X = G/P$  上。等变量子上同调  $H_T^*(X)$  的系数环不是  $\mathbb{Z}$ , 而是

$$\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$$

其中每个  $x_i$  对应  $T$  的一个无穷小生成元, 本质上就是负单根  $-\alpha_i$ 。

这意味着:

- 经典上同调  $H^*(X)$ : 系数环是  $\mathbb{Z}$ , 所以  $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}$
- 等变上同调  $H_T^*(X)$ : 系数环是  $\Lambda$ , 所以  $c_{u,v}^w \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$
- 量子上同调  $QH_T^*(X)$ : 同样是  $\Lambda$  中的元素, 只是多了  $q^d$  记录曲线次数

## 2. 为什么 ch4 证明没有“提到”根?

Mihalcea Positivity 的证明 (在 ch4 中) 并不是在“引入” $x_i$ , 而是在使用已经定义好的环结构  $\Lambda$ 。证明的核心是:

- (1) 建立在什么几何空间上操作 ( $X \times_T ET$  的配置)
- (2) 利用哪个几何事实 (Localization 定理)
- (3) 如何保证非负性 (Schubert 胞腔的几何正性)

环  $\Lambda$  的存在如同在说“我们将在  $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  上做运算”——这是前提条件, 不是证明的一部分。

## 3. 正性证明实际在证明什么?

ch4 证明的是: \*\* 在这些多项式中,  $x_i$  的系数都是非负整数 \*\*。也就是说, 虽然  $c_{u,v}^{w,d}(\mathbf{x})$  是一个关于  $x_1, \dots, x_r$  的多项式, 但它的所有系数都是  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ , 而不是负数或分数。

## 4. 几何直觉

当忘掉 torus 作用（令所有  $x_i = 0$ ）时， $c_{u,v}^{w,d}(\mathbf{x})|_{x_i=0}$  退化为普通量子同调的结构常数  $c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}$ 。这说明  $x_i$  编码的是“在 torus 作用下的修正信息”，而这种修正在经典极限下自然消失。

**类比：**这就像在说“在量子力学中，物理量是算符”——这不是某个具体定理证明的结论，而是理论框架本身的结构约定。

## 95. $\mathrm{PGL}(m)$ 的极大环面为什么是 $(\mathbb{C}^\times)^{m-1}$ ?

**95.1. 问题.**  $\mathrm{PGL}(m)$  的极大环面是  $(\mathbb{C}^\times)^{m-1}$  吗？为什么？

**95.2. 回答.** 是的， $\mathrm{PGL}(m)$  的极大环面是  $(\mathbb{C}^\times)^{m-1}$ 。

### 1. 从 $\mathrm{GL}(m)$ 出发

$\mathrm{GL}(m)$  的极大环面是所有对角矩阵：

$$T_{\mathrm{GL}(m)} = \{\mathrm{diag}(t_1, \dots, t_m) \mid t_i \in \mathbb{C}^\times\} \cong (\mathbb{C}^\times)^m$$

### 2. 中心与商群

$\mathrm{GL}(m)$  的中心是标量矩阵  $Z(\mathrm{GL}) = \{\lambda I \mid \lambda \in \mathbb{C}^\times\}$ 。商群为：

$$\mathrm{PGL}(m) = \mathrm{GL}(m)/Z(\mathrm{GL})$$

### 3. 极大环面的对应

极大环面在商群下对应为中心化子的商：

$$T_{\mathrm{PGL}(m)} = T_{\mathrm{GL}(m)}/Z(\mathrm{GL}) \cong \{\mathrm{diag}(t_1, \dots, t_m)\}/\{\lambda I\}$$

这相当于在对角矩阵中模掉整体标量倍数。

### 4. 维数分析

由于模掉了一维（标量），维数从  $m$  变为  $m-1$ ：

$$T_{\mathrm{PGL}(m)} \cong (\mathbb{C}^\times)^{m-1}$$

具体同构可取为，例如：

$$\mathrm{diag}(t_1, \dots, t_m) \mapsto (t_1/t_m, \dots, t_{m-1}/t_m)$$

### 5. 与旗流形的联系

在 Schubert 演算中， $Fl_n = \mathrm{GL}_n/B$  的极大环面  $T$  的维数为  $n-1$ ——因为  $T_{\mathrm{GL}(n)} \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ ，模掉标量后为  $(\mathbb{C}^\times)^{n-1}$ 。

这也解释了为什么等变量量子同调的基础环是  $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ （ $r = n-1$  是 rank）。

## 96. 稳定映射条件中“一般位置”的含义

**96.1. 问题.** 在稳定映射的 Gromov-Witten 不变量定义中，条件“ $g_i \in G$  是一般位置 (general position)”是什么意思？为什么需要这个条件？

### 96.2. 回答. 一、什么是一般位置

在代数几何中，“一般位置” (general position) 是一个与 Kleiman 横向性定理 (Kleiman transversality theorem) 密切相关的概念。

简单说：如果一个条件只排除掉一个余维数  $> 0$  的闭集，那么满足该条件的点就是一般位置的点。或者说：不是特殊位置的位置就是一般位置。

在旗流形的情形中， $g_i X(u)$  和  $g_i Y(w)$  关于  $G$  作用是齐性空间，所以“特殊位置”（即 Schubert 子簇以非预期方式相交）只发生在余维数  $> 0$  的子集上。

### 二、Kleiman 横向性定理

Kleiman 定理指出: 若  $G$  作用在  $X$  上, 且  $V, W \subset X$  是紧闭  $T$ -稳定子簇, 则对一般  $g \in G$ , 有:

$gV \cap W$  是 transversal 的

这意味着交点在正确的维数下相交, 且交点是光滑的 (如果  $V$  和  $W$  是光滑的)。

### 三、此处的具体含义

在稳定映射条件中:

$$f(p_1) \in g_1 X(u), \quad f(p_2) \in g_2 X(v), \quad f(p_3) \in g_3 Y(w)$$

”一般位置”意味着:

- 这些 Schubert 簇的相交是 transversal 的 (横向的)
- 不会出现意外退化 (如多余分支重合)
- Kleiman 定理保证: 除了一个余维数  $> 0$  的特殊集合外,  $g_i$  的选择都满足这个条件

### 四、为什么需要这个条件

GW 不变量的定义要求计数”光滑”情形下的曲线个数。横向性保证:

- 计数是良定义的 (不依赖于  $g_i$  的具体选择)
- 相交理论的基本假设成立 (维数可加)
- 计算可以在一般位置上进行, 而结果对所有选择都通用

### 五、形式化描述

形式上, ” $g$  是一般位置”意味着  $g$  不属于某个固定的余维数  $> 0$  的闭子集  $Z \subset G$ 。这样的子集在  $G$  中是稀少的 (Zariski 拓扑中余维数  $> 0$  的集合不稠密), 因此”一般”的  $g$  都满足横向性条件。

## 97. $U$ 和 $U^-$ (正根和负根对应的幂么群) 详解

**97.1. 问题.** 请详细解释  $U$  和  $U^-$  (正根和负根对应的幂么群)。原文中写道:

$U$  和  $U^-$  分别是对应于正根和负根的方向。在旗流形中的作用: 在旗流形  $G/B$  中, Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  可以通过幂么群  $U^-$  的作用参数化。具体而言, 每个  $u \in U^-$  给出一个群作用  $u \cdot (wB/B) = uwB/B$ , 这正是胞腔上的坐标。与旗的变化关系: 当你看到一个旗被”提升”时, 实际上是  $U^-$  中的元素在作用。例如在  $GL_n$  中,  $U^-$  是下三角幂么矩阵, 它们把标准旗变成一般旗。

这段话太抽象了, 请给出具体例子和几何直观。

### 97.2. 回答. 一、 $U$ 和 $U^-$ 的定义

- $U$  (幂么群): 对应正根的生成元, 是  $B$  的幂么 radical
- $U^-$ : 对应负根的生成元, 是  $B^-$  的幂么 radical

### 二、 $GL_n$ 中的具体例子 ( $n = 2$ )

在  $GL_2$  中:

- $U$  (上三角幂么):  $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, a \in \mathbb{C}$
- $U^-$  (下三角幂么):  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}, b \in \mathbb{C}$

### 三、旗流形上的作用

在  $Fl_2 = GL_2/B$  上 ( $B$  是上三角矩阵):

- (1) 标准旗 (standard flag):  $V_1 = \langle e_1 \rangle \subset \mathbb{C}^2$

(2)  $U^-$  的作用：取  $u = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}$

$$u \cdot (B/B) = uB/B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix} B/B$$

(3) 几何意义： $u$  把标准旗  $\langle e_1 \rangle$  变成斜旗  $\langle e_1 + be_2 \rangle$

(4) Schubert 胞腔： $B^-wB/B$  是所有可以通过  $U^-$  从  $wB/B$  到达的点的集合

#### 四、为什么这是“胞腔上的坐标”？

在  $Fl_2$  中：

- 维数：1（胞腔）
- 坐标参数： $b \in \mathbb{C}$
- Schubert 胞腔  $B^-s_1B/B$  正好是参数  $b$  的所有取值

这就是为什么  $u \in U^-$  给出了胞腔上的坐标函数。

#### 五、旗的“提升”

当说“一个旗被提升”时，实际意思是：

- 我们从某个标准位置出发
- 用  $U^-$  中的元素作用
- 得到一般位置的旗

在  $GL_n$  中， $U^-$  是下三角幂幺矩阵，它们把标准旗  $V_i = \langle e_1, \dots, e_i \rangle$  变成斜旗  $uV_i$ 。

### 98. 映射的次数 (degree) 如何定义

98.1. 问题. 在 push-forward 公式

$$F_*^T ((ev_3^T)^*[Y(w)]_T) = \sum_i a_i [F(V_i)]_T$$

中， $a_i$  是映射  $F|_{V_i} : V_i \rightarrow F(V_i)$  的次数 (degree)。映射的次数是如何定义的？

98.2. 回答. 一、次数的基本定义

在代数几何中，映射的次数 (degree) 有以下几种等价定义：

#### 1. 点计数定义 (适用于有限态射)

设  $f : X \rightarrow Y$  是有限态射 (finite morphism)， $k$  是代数闭域。则  $f$  的次数是每个一般点的原像个数：

$$\deg(f) = [k(X) : f^*k(Y)]$$

即函数域的扩张次数。

#### 2. 对于曲线间的态射

若  $f : C \rightarrow D$  是亏格  $g$  的光滑曲线之间的态射，则  $\deg(f) = \deg(f^*\mathcal{O}(1))$ ，即 pullback of an ample divisor 的次数。

#### 二、此处的具体含义

在 Mihalcea 的证明中：

$$F|_{V_i} : V_i \rightarrow F(V_i)$$

这里  $V_i$  是  $ev_3^{-1}(Y(w))$  的一个不可约分支， $F = (ev_1, ev_2)$ 。

由于：

- $V_i$  是  $T$ -稳定、约化的、不可约分支
- $F$  是  $T$ -等变且适当的 (proper) 映射



$F|_{V_i}$  是一个有限的、满的、支配的映射。

### 三、次数的几何含义

$a_i = \deg(F|_{V_i})$  是在 push-forward 公式中的几何因子：

当推送一个上同调类  $[Y(w)]_T$  时，每个分支  $V_i$  的贡献要乘以该映射的次数  $a_i$ 。这与交集理论中的基本事实一致：若  $f: X \rightarrow Y$  是有限态射，次数为  $d$ ，则

$$f_*[X] = d \cdot [f(X)]$$

即像的次数是原像个数的叠加。

### 四、为什么次数重要

在 GW 不变量的计算中，次数因子  $a_i$  保证了推送公式的正确性：

$$F_*^T((ev_3^T)^*[Y(w)]_T) = \sum_i a_i [F(V_i)]_T$$

这表示每个分支  $V_i$  的 push-forward 是以其映射次数为权重的像类的叠加。

## 99. 等变 Poincaré pairing $\langle \cdot, \cdot \rangle_T$ 的具体定义

**99.1. 问题.** 在等变 Poincaré 对偶公式

$$\langle \sigma(u)^T, \sigma(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v}$$

中， $\langle \cdot, \cdot \rangle_T$  的具体定义是什么？

**99.2. 回答.** 一、标准上同调中的 Poincaré pairing

在普通上同调中，Poincaré pairing 是上同调群的配对：

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : H^k(X) \times H^{n-k}(X) \rightarrow \mathbb{Z}$$

定义为相交数：

$$\langle a, b \rangle = \int_X a \cup b$$

对于旗流形  $X = G/P$ ，这是 Lefschetz 对偶的体现。

### 二、等变版本的提升

等变 Poincaré pairing 将配对提升到等变上同调：

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_T : H_T^k(X) \times H_T^{n-k}(X) \rightarrow \Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$$

关键区别：值域从  $\mathbb{Z}$  变成了  $\Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 。

### 三、正式定义

对于齐性空间  $X = G/P$ ，等变 Poincaré pairing 的定义为：

$$\langle \alpha, \beta \rangle_T = \int_{X_T} \alpha \cup \beta$$

其中：

- $X_T = X \times_T ET$  是同伦商 (homotopy quotient)
- 积分是  $T$ -equivariant integration over  $X_T$
- 由于  $X_T$  在  $T$ -作用下有无穷高余维数的固定点集，积分给出  $\Lambda$  中的元素

### 四、为什么 Schubert 类的配对是 Kronecker delta？

Poincaré 对偶在 Schubert 基底下有特别简单的形式：

$$\langle \sigma(u)^T, \sigma(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v}$$

这反映了 Schubert 胞腔的互异性 (duality)：

- 每个 Schubert 类  $\sigma(u)^T$  的 Poincaré 对偶是  $\sigma(w_0 u)^T$  (其中  $w_0$  是最长元素)
- 在旗流形中, 由于所有 Schubert 类都是自对偶的 (或差一个  $w_0$ ), 配对矩阵是对角的

## 五、与经典 Poincaré pairing 的关系

当  $T$  作用平凡化 (即所有  $x_i = 0$ ) 时:

$$\langle \sigma(u), \sigma(v) \rangle = \delta_{u,v}$$

这退化为普通上同调中的标准正交基性质。

### 100. 等变量子 Poincaré pairing $\langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v)^T \rangle_T$ 中 $\tilde{\sigma}(v)^T$ 的含义

**100.1. 问题.** 在等变 Poincaré 对偶公式

$$\langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v}$$

中,  $\tilde{\sigma}(v)^T$  是什么? 它与普通的  $\sigma(v)^T$  有何区别?

**100.2. 回答.** 一、 $\tilde{\sigma}(v)^T$  的定义

$\tilde{\sigma}(v)^T$  表示等变量子 Schubert 类的对偶类 (dual Schubert class), 也称为 Poincaré 对偶意义上的对偶。

在旗流形  $X = G/P$  中:

- $\sigma(v)^T$ :  $H_T^*(X)$  中的 Schubert 类
- $\tilde{\sigma}(v)^T$ :  $\sigma(v)^T$  的 Poincaré 对偶, 即满足

$$\langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v}$$

的类

二、与普通  $\sigma(v)^T$  的关系

在自对偶的情形下,  $\tilde{\sigma}(v)^T = \sigma(v)^T$ 。但一般情况下:

$$\tilde{\sigma}(v)^T = \sigma(w_0 v)^T$$

其中  $w_0$  是 Weyl 群中的最长元素。

这是因为 Poincaré 对偶把 Schubert 胞腔  $X(v)$  映射到其对偶胞腔  $X(w_0 v)$ 。

三、为什么需要区分

在笔记的证明中,  $\tilde{\sigma}(v)^T$  用于以下情境 (见 Proposition 3.1, Mihalcea):

$$\langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v}$$

这里  $\sigma(u)^T$  是来自第一个因子的 Schubert 类, 而  $\tilde{\sigma}(v)^T$  是来自第二个因子 (经过投影后) 的 Poincaré 对偶类。这种区分在计算两点配对时至关重要。

四、几何直观

从几何上看:

- $\sigma(v)^T$  对应 Schubert 子簇  $X(v)$  的上同调类
- $\tilde{\sigma}(v)^T$  对应  $X(v)$  的对偶子簇 (complement) 或交叉簇的上同调类
- 在 Lefschetz 对偶意义下, 两者配对得到 Kronecker delta

**101. 等式  $[X(u) \times X(v)]_T = (pr_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (pr_2^T)^* \sigma(v)^T$  的来源**

**101.1. 问题.** 在 ch4 的 projection formula 应用中 (大约第 677 行), 第一个等式是:

$$[X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T = (pr_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (pr_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T$$

这个等式是怎么来的? 为什么  $[X(u) \times X(v)]_T = (pr_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (pr_2^T)^* \sigma(v)^T$ ?

**101.2. 回答. 核心答案: 这是 Schubert 类在投影下的自然 pullback 行为。**

**第一步: 理解  $X(u) \times X$  的类**

在乘积空间  $X \times X$  上, 考虑第一个投影:

$$pr_1 : X \times X \rightarrow X$$

这个投影拉回 Schubert 类  $\sigma(u)^T \in H_T^*(X)$ , 得到:

$$(pr_1^T)^* \sigma(u)^T \in H_T^*(X \times X)$$

几何上,  $(pr_1^T)^* \sigma(u)^T$  正是子簇  $pr_1^{-1}(X(u)) = X(u) \times X$  的等变上同调类。

**第二步: 理解  $X \times X(v)$  的类**

同理, 第二个投影  $pr_2 : X \times X \rightarrow X$  给出:

$$(pr_2^T)^* \sigma(v)^T \in H_T^*(X \times X)$$

这正是子簇  $X \times X(v)$  的等变类。

**第三步: 两者的 cup product**

在  $X \times X$  中, 子簇  $X(u) \times X(v)$  是两个子簇的交集:

$$X(u) \times X(v) = (X(u) \times X) \cap (X \times X(v))$$

因此它的类是两者 cup product:

$$[X(u) \times X(v)]_T = [X(u) \times X]_T \cup [X \times X(v)]_T = (pr_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (pr_2^T)^* \sigma(v)^T$$

**第四步: 几何直观**

可以把  $X(u) \times X(v)$  看作”第一因子在  $X(u)$  中, 第二因子在  $X(v)$  中”。拉回操作把每个因子上的 Schubert 类拉到乘积空间上, cup product 编码了两个条件的交集。

**形式化描述**

设  $i_u : X(u) \hookrightarrow X$  和  $i_v : X(v) \hookrightarrow X$  是嵌入。则在  $H_T^*(X \times X)$  中:

$$[X(u) \times X(v)]_T = (pr_1^T \circ i_u^T)^* [pt]_T \cup (pr_2^T \circ i_v^T)^* [pt]_T = (pr_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (pr_2^T)^* \sigma(v)^T$$

这正是笔记中使用的恒等式。

**102. 三重 Schubert positivity vs 等变量子上同调：点相交与曲线计数的区别**

**102.1. 问题.** 三重 Schubert positivity 涉及点的相交 (point intersection), 而等变量子上同调涉及曲线的计数 (curve counting)。这里”曲线的计数”是一个什么概念?

### 102.2. 回答. 一、点的相交 vs 曲线的计数

在经典 Schubert 演算中，我们考虑的是：

- **点的相交**：给定旗流形  $X = G/P$  中的 Schubert 类  $\sigma(u)$ 、 $\sigma(v)$ ，它们的积  $\sigma(u) \cdot \sigma(v)$  在哪里与  $\sigma(w)$  相交？这计数的是**点与点相交**的个数
- **曲线的计数**：给定同调类  $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ ，有多少条曲线  $f : \mathbb{P}^1 \rightarrow X$  满足特定条件？这计数的是**曲线与曲线相交**的个数

### 二、为什么曲线计数更复杂？

对于  $\mathbb{P}^1$ （最简单的旗流形）：

- 点相交： $\sigma(s_1) \cdot \sigma(s_1) = 1$  个点（相交于一点）
- 曲线计数： $\sigma(s_1) \star \sigma(s_1) = q\sigma(1) = 1$  条曲线（但带量子修正  $q$ ）

区别在于：

- **点相交**：两条线交于一点，这是个固定结果
- **曲线计数**：给定两个 Schubert 条件，有多少条  $\mathbb{P}^1$  曲线同时满足这两个条件？

### 三、Gromov-Witten 不变量的几何含义

在等变量子上同调中，系数  $c_{u,v}^{w,d}$  计数的是：

稳定映射  $f : \mathbb{P}^1 \rightarrow X$  的个数，使得：

- $f$  的像代表同调类  $d \in H_2(X, \mathbb{Z})$
- $f(p_1) \in X(u)$ ,  $f(p_2) \in X(v)$ ,  $f(p_3) \in Y(w)$
- 其中  $p_1, p_2, p_3$  是  $\mathbb{P}^1$  上三个标记点

这不是计数点，而是**计数满足几何条件的曲线**。

### 四、三重 Schubert vs 等变量子上同调

|      | 三重 Schubert Positivity | 等变量子上同调                |
|------|------------------------|------------------------|
| 计数对象 | 点                      | 曲线                     |
| 域曲线  | 无                      | $\mathbb{P}^1$         |
| 约束   | Schubert 类             | 同调类 $d$                |
| 结果   | 整数 $c_{u,v}^w$         | 多项式 $c_{u,v}^{w,d}(x)$ |

### 102.3. $\pi_*^T$ 是什么意思. 问： $\pi_*^T$ 是什么意思？

答： $\pi_*^T$  是**等变推送前进**（equivariant pushforward）映射。

具体解释：

- $\pi : \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X \times X$  是投影映射
- $\pi_*$  是上同调中的 **Gysin 映射**（或 pushforward），它将  $\overline{\mathcal{M}}$  上的类推到  $X \times X$  上
- 上标  $T$  表示这是**等变版本**——在 torus 作用下保持等变性

几何意义： $\pi_*^T$  对模空间上的类做积分（pushforward），得到积空间上的类。

**102.4. Mihalcea 转化步骤的详细推导是什么. 问：**Mihalcea 转化步骤的详细推导是什么？

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T)$$

答：这步推导涉及**基环分解**（basis ring decomposition）：

- (1) **分解**  $ev_3^{-1}(Y(w))$ ：  $ev_3^{-1}(Y(w))$  有多个不可约分支  $V_i$
- (2) **限制到每个分支**：  $F(V_i)$  是  $V_i$  在  $F = (ev_1, ev_2)$  下的像
- (3) **Gysin 映射的次数**：  $a_i$  是映射  $F|_{V_i} : V_i \rightarrow F(V_i)$  的次数（degree）

## (4) 应用投影公式：

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T(\mathrm{ev}_1^* \sigma(u)^T \cdot \mathrm{ev}_2^* \sigma(v)^T \cdot \mathrm{ev}_3^* \tilde{\sigma}(w)^T)$$

通过将  $\mathrm{ev}_3^* \tilde{\sigma}(w)^T$  分解到各分支  $V_i$  上，利用线性性得到。

102.5. 如何使用投影公式得到  $\delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j}$ . 问：如何使用投影公式得到  $\delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j}$ ?

$$(\pi_{X \times X})_*^T([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T) = \delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j}$$

答：这步使用**投影公式的迭代应用**：

(1) **投影公式**：对于映射  $f: A \rightarrow B$ ，有

$$f_*^T(f^*(\alpha) \cdot \beta) = \alpha \cdot f_*^T(\beta)$$

(2) **在  $X \times X$  上应用**：

$$\pi_{X \times X}: X \times X \rightarrow X \times X$$

是恒等映射（因为  $F(V_i) \subseteq X \times X$ ）

(3) **关键观察**：  $[X(u) \times X(v)]_T$  和  $[Y(u_j) \times Y(v_j)]_T$  是**对偶基**

- 在等变上同调中，Schubert 类和对偶 Schubert 类满足：

$$\langle [X(u)], [Y(v)] \rangle = \delta_{u,v}$$

(4) **具体计算**：

$$\begin{aligned} \pi_*^T([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T) &= \pi_*^T([X(u)]_T \cdot [Y(u_j)]_T \times [X(v)]_T \cdot [Y(v_j)]_T) \\ &= \delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j} \end{aligned}$$

几何意义：在  $X \times X$  上，两对对偶 Schubert 类的相交集出 Kronecker delta。

**102.6.  $PGL(m)/P$ 、部分旗流形、 $\mathcal{O}(1)$  丛与第一陈类.** 问：什么是  $PGL(m)/P$ ? 什么是部分旗流形 (partial flag manifold)? 什么是  $\mathcal{O}(1)$  丛? 什么是第一陈类 (first Chern class)?

答：

一、 $PGL(m)/P$  与部分旗流形

**旗流形 (Flag manifold)**:  $Fl_n = GL_n/B$ ，其中  $B$  是 Borel 子群（所有上三角矩阵）。旗流形的点是所有嵌套的线性子空间链：

$$V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_{n-1} \subset \mathbb{C}^n$$

**部分旗流形 (Partial flag manifold)**:  $PGL(m)/P$ ，其中  $P$  是**抛物子群** (parabolic subgroup)。与 Borel 子群不同，抛物子群允许部分上三角块的块结构。

例如：

$$\bullet P = \begin{pmatrix} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ 0 & 0 & * \end{pmatrix} \text{ 对应固定某个子空间}$$

- $PGL(m)/P$  参数化的是**不完整的旗**——只固定部分子空间

几何上，部分旗流形是旗流形的商，维数更低。

二、 $\mathcal{O}(1)$  丛

在射影空间  $\mathbb{P}^n$  上：

- **仿射空间  $\mathbb{C}^{n+1}$  的线丛  $\mathcal{O}(1)$  是超平面丛** (hyperplane line bundle)
- 截面是线性函数
- $\mathcal{O}(k) = \mathcal{O}(1)^{\otimes k}$

在旗流形上， $\mathcal{O}(1)$  通常指的是与某个 Schubert 除子相关的线丛。

### 三、第一陈类 (First Chern class)

对于复线丛  $L \rightarrow X$ ，第一陈类  $c_1(L) \in H^2(X, \mathbb{Z})$  编码了丛的拓扑信息：

- **几何含义：**  $c_1(L)$  衡量线丛的曲率/亏损
- **具体例子：** 在  $\mathbb{P}^1$  上， $\mathcal{O}(k)$  的第一陈类是  $k$  乘以  $\mathcal{O}(1)$  的陈类
- **在旗流形上：**  $T_j - T_{j+1}$  ( $T'$  等变版本中的权差) 对应某个  $\mathcal{O}(1)$  丛的陈类

**102.7.  $T'$ -等变上同调的坐标与具体例子.** 问：请详细解释  $T'$ -等变上同调的坐标，并给出具体例子。

答：

#### 一、 $T'$ 的构造与坐标

$T' = (\mathbb{C}^\times)^m$  是一个更大的 torus。  $H_{T'}^*(pt) = \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_m]$  中：

- $T_j$  对应第  $j$  个  $\mathbb{C}^\times$  的权
- 每个  $T_j$  是  $\mathbb{P}^n$  上  $\mathcal{O}(1)$  丛的第一陈类

#### 二、 $x_j$ 与 $T_j - T_{j+1}$ 的变换

**具体例子 1:  $GL_3$  情形 ( $m = 3$ )**

在  $T$ -等变版本中：

- 负单根：  $x_1 = z_2/z_1$ ,  $x_2 = z_3/z_2$

在  $T'$ -等变版本中：

- $T_1, T_2, T_3$  是三个独立的权
- 变换：  $x_1 \mapsto T_1 - T_2$ ,  $x_2 \mapsto T_2 - T_3$

#### 具体例子 2: $Gr(2, 4)$ 情形

对于  $Gr(2, 4) = PGL(4)/P$ ：

- $T' = (\mathbb{C}^\times)^4$  作用在  $\mathbb{C}^4$  上
- $\mathcal{O}(1)$  丛的第一陈类：  $T_j$  对应第  $j$  个坐标的权
- 负单根变换：  $x_j \mapsto T_j - T_{j+1}$  ( $j = 1, 2, 3$ )

#### 具体例子 3: $T'$ 等变版本的 positivity

在  $T'$ -等变上同调中：

- Corollary 7.1: 系数是关于  $T_1 - T_2, T_2 - T_3, \dots, T_{m-1} - T_m$  的非负系数多项式
- 这与三重 Schubert calculus 中的  $t_j - y_i$  直接对应

### 三、为什么需要 $T'$ ?

$T'$  版本更接近三重变量理论：

- 三重理论：变量是  $x_i, y_j, t_k$
- $T'$  理论：变量是  $T_j - T_{j+1}$

两者都涉及”差”的形式，这使得组合结构更清晰。

## Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Alexander Astashkevich and Vladimir Sadov. Quantum cohomology of partial flag manifolds  $F_{n_1, \dots, n_k}$ . *Communications in Mathematical Physics*, 170(3):503–528, 1995.
- [4] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for  $g/b$ . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- [5] Armand Borel. Sur la cohomologie des espaces fibrés principaux et des espaces homogènes de groupes de lie compacts. *Annals of Mathematics*, 57(2):115–207, 1957.
- [6] Claude Chevalley. Sur les décompositions cellulaires des espaces  $g/b$ . 1994. Published posthumously, with commentary by William Fulton.
- [7] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- [8] Andreas Floer. Proof of the Arnold conjecture for surfaces and generalizations for certain Kähler manifolds. *Duke Mathematical Journal*, 53(1):1–32, 1986.
- [9] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
- [10] William Fulton and Rahul Pandharipande. *Notes on stable maps and quantum cohomology*. 1997. preprint, arXiv: alg-geom/9608011.
- [11] William Fulton and Christopher Woodward. On the quantum product of flag classes. *Journal of Algebra*, 245(1):54–67, 2001.
- [12] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- [13] Alexander Givental and Bumsig Kim. Quantum cohomology of flag manifolds and Toda lattices. *Communications in Mathematical Physics*, 168(3):609–641, 1995.
- [14] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- [15] Mikhail Gromov. Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds. *Inventiones Mathematicae*, 82:307–347, 1985.
- [16] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [17] Bumsig Kim. Quantum cohomology of partial flag manifolds and a residue formula for their intersection pairings. *International Mathematics Research Notices*, 1995(1):1–16, 1995.
- [18] Bumsig Kim. On equivariant quantum cohomology. 1996.
- [19] Bumsig Kim. Equivariant quantum cohomology. *Mathematical Research Letters*, 6(5-6): 613–618, 1999.

- [20] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [21] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [22] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [23] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [24] Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.
- [25] Maxim Kontsevich. Enumeration of rational curves via torus actions. *Progress in Mathematics*, 129:335–368, 1994.
- [26] Maxim Kontsevich and Yu. I. Manin. Gromov-Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry. *Communications in Mathematical Physics*, 164(3):525–562, 1994.
- [27] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
- [28] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [29] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [30] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [31] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.