

# Schubert 多项式学习笔记



## Contents

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 引言：文献概述                                                  | 7  |
| 引言：文献概述                                                  | 7  |
| 1. 总述                                                    | 7  |
| 2. 研究目标与导师指导                                             | 7  |
| 3. 文献摘要总结                                                | 7  |
| 4. 补充参考资料                                                | 10 |
| 5. 学习路径与前置基础知识                                           | 12 |
| 6. 最终目标                                                  | 12 |
| Chapter 1. Graham Positivity of Triple Schubert Calculus | 13 |
| 1. 预备知识                                                  | 13 |
| 2. 引言                                                    | 27 |
| 3. 主要定理的证明                                               | 31 |
| Chapter 2. Samuel's Molev-Sagan Type Formula             | 37 |
| 1. 引言：两个多项式相乘会得到什么？                                      | 37 |
| 2. Separated Descents (Separated Descent Set): 分离的下降点    | 37 |
| 3. 乘积公式 (Theorem 3.1)                                    | 38 |
| 4. 证明思路：Path 图 (Path Diagram) 与权重                        | 38 |
| 5. The Proof of the Main Formula: 主要公式的证明                | 39 |
| 6. Pieri 公式 (Theorem 7.1)                                | 39 |
| 7. Dominant Approximation: 主导逼近 (Dominant Approximation) | 40 |
| 8. 关键引理一览                                                | 40 |
| 9. 示例                                                    | 40 |
| 10. 本章小结                                                 | 41 |
| 11. 附录：主要公式的详细证明                                         | 41 |
| 12. 附录：Path 图的详细定义                                       | 42 |
| 13. 附录：Dominant Approximation 的详细证明                      | 42 |
| Chapter 3. Quantum Double Schubert Polynomials           | 43 |
| 1. 引言：为什么需要量子版本？                                         | 43 |
| 2. 经典回顾：除差算子与 Schubert 多项式                               | 43 |
| 3. 量子上同调的基本框架                                            | 44 |
| 4. 量子双重 Schubert 多项式的定义                                  | 45 |
| 5. 主要性质                                                  | 45 |
| 6. 量子 Schubert 多项式                                       | 46 |
| 7. 量子 Cauchy 恒等式                                         | 47 |
| 8. Lascoux-Schützenberger 型公式                            | 47 |
| 9. 与三重 Schubert Positivity 的联系                           | 47 |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 10. Vafa-Intriligator 公式 (Vafa-Intriligator formula)           | 48 |
| 11. 量子化映射                                                      | 48 |
| 12. 与其他工作的关系                                                   | 48 |
| 13. 本章小结                                                       | 49 |
| 14. 附录: 公式推导                                                   | 49 |
| Chapter 4. Positivity in Equivariant Quantum Schubert Calculus | 51 |
| 1. 引言: 从经典到量子——为什么要推广?                                         | 51 |
| 2. 历史脉络: Peterson 猜想                                           | 51 |
| 3. 等变量量子同调的定义                                                  | 52 |
| 4. 主要定理                                                        | 54 |
| 5. 证明思路: 归约到 Graham 定理                                         | 54 |
| 6. 与三重 Schubert Positivity 的联系                                 | 56 |
| 7. 几何意义                                                        | 57 |
| 8. 本章小结                                                        | 58 |
| 9. 附录: EQLR 系数正性证明详解                                           | 58 |
| Chapter 5. 附录: 问答记录                                            | 61 |
| 1. 为何限制到 $GL_m(\mathbb{C})$                                    | 61 |
| 2. 为何使用 $S_\infty$ 而非 $S_n$                                    | 61 |
| 3. $S_\infty$ 的定义与直观理解                                         | 62 |
| 4. Skew 除差算子与除差算子的关系                                           | 62 |
| 5. 逆除差算子的定义                                                    | 63 |
| 6. 双重与三重 Schubert 多项式的区别                                       | 64 |
| 7. 等变量量子同调类的定义                                                 | 64 |
| 8. Lascoux-Schützenberger 型代表元                                 | 65 |
| 9. 分类空间 ET 的直观理解                                               | 65 |
| 10. Torus 作用与分类空间 ET                                           | 66 |
| 11. 等变量量子同调与量子同调的区别                                            | 67 |
| 12. Hilbert 第十五问题与 Schubert 演算                                 | 67 |
| 13. $S_\infty$ 的例子                                             | 68 |
| 14. 量子同调的定义                                                    | 68 |
| 15. Theorem 1.1 的例子: Triple Schubert Positivity                | 69 |
| 16. Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2                             | 70 |
| 17. Knutson-Tao (2003) 展开系数的几何意义                               | 70 |
| 18. Gao-Xiong 与 Knutson-Tao 解释的不同                              | 71 |
| 19. Graham Positivity 中 Grassmannian 限制的作用                     | 72 |
| 20. 什么是 Schur 函数?                                              | 74 |
| 21. 为什么 Graham Positivity 要求 $u, v$ 是 Grassmannian 排列?         | 74 |
| 22. Graham Positivity 中展开系数的“非负性”含义                            | 75 |
| 23. 第一章第三节的定理脉络: 三层定理与三层引理                                     | 76 |
| 24. 几何相交如何翻译为代数展开系数                                            | 76 |
| 25. Graham 定理为何依赖几何性质                                          | 77 |
| 26. $B^-(w)$ 与 $B^-$ 的关系                                       | 78 |
| 27. $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)}$ 的含义                | 79 |
| 28. EQLR 系数的定义与意义                                              | 79 |
| 29. 双重 Schubert 多项式的除差算子定义                                     | 80 |

|     |                                                                        |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 30. | $N^-(w)$ 与 Schubert 胞腔 $B^-wB/B$ 的同构                                   | 81  |
| 31. | 置换除法记号 $w_0/w$ 的含义                                                     | 82  |
| 32. | 幂幺根基 $U$ 的含义                                                           | 83  |
| 33. | 为何初始条件是 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ | 84  |
| 34. | Humphreys Theorem 13.3 的内容                                             | 85  |
| 35. | $S_{21}(x; y)$ 的计算问题                                                   | 86  |
| 36. | $F_\alpha$ 是权为 $-\alpha$ 的根向量——是什么意思?                                  | 87  |
| 37. | $[B^-wB/B]_T$ 与标准 Schubert 多项式的关系                                      | 88  |
| 38. | Anderson-Fulton Section 19.3: 横截性方法                                    | 88  |
| 39. | Anderson-Fulton Theorem 19.4.4: 退化命题                                   | 90  |
| 40. | $k$ -Grassmannian 排列与线性因子乘积的等价性                                        | 94  |
| 41. | Refined Graham Positivity 与原始 Graham Positivity 的关系                    | 95  |
| 42. | Humphreys Section 28: Bruhat Decomposition 的内容                         | 96  |
| 43. | 为什么 Refined Graham Positivity 的假设是“更强”的?                               | 97  |
| 44. | Grothendieck 多项式是什么?                                                   | 98  |
| 45. | Billey 公式的显式形式                                                         | 98  |
| 46. | $\sigma(u)^T$ 的含义                                                      | 99  |
| 47. | Gromov-Witten 不变量                                                      | 100 |
|     | Bibliography                                                           | 101 |



## 引言：文献概述

### 1. 总述

本笔记学习的主题是 **Schubert 多项式的 Positivity (正性) 问题**。这是代数组合与代数几何中的核心问题之一，与旗流形的上同调理论密切相关。

Schubert 多项式是旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  上 Schubert 类的多项式代表元。它们由 Lascoux 和 Schützenberger 引入，具有丰富的代数和组合结构。

本笔记涉及四篇关于 Schubert 多项式正性问题的研究论文，从经典情形逐步推广到量子情形。此外，还有若干参考书籍和补充材料作为基础知识来源。

### 2. 研究目标与导师指导

**研究课题：**三重 Schubert 演算的 Graham Positivity 猜想

**核心问题：**证明三重 (double) Schubert 多项式乘积展开系数的正性

**文献组合策略：**根据熊瑞的观察，Chapter 1 (Gao-Xiong 2025) 和 Chapter 4 (Mihalcea 2007) 这两篇论文组合在一起，基本上能够搞定三重 Schubert 演算的正性猜想。

**导师指导要点** (2026-03-30 讨论)：

- (1) **重点放在证明：**首先专注于定理证明的理解和验证，不要过于纠结几何定义和细节
- (2) **proofread 策略：**仔细校对两篇论文中的所有引理和定理证明
- (3) **组合推广：**将两篇论文的方法和结果组合起来，推广到三重情形
- (4) **几何细节后续补充：**几何背景和几何意义的详细讨论留到后面再添加

**当前任务：**

- 仔细阅读 Chapter 1 和 Chapter 4 的证明部分
- 验证每个引理和定理证明的正确性
- 提取关键的技术工具和引理
- 组合两篇论文的方法建立三重正性

### 3. 文献摘要总结

**3.1. Graham Positivity of Triple Schubert Calculus.** 作者: Yibo Gao, Rui Xiong  
arXiv: <https://arxiv.org/abs/2506.09421>

年份: 2025

篇幅: 6 页

**核心贡献：**

- 证明了 Samuel 关于三重变量集的 Graham positivity 猜想
- 建立了 refined 版本的 Graham positivity 定理
- 作为推论，证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想

**摘要:** 本文证明了 Samuel 关于三个变量集中两个双重 Schubert 多项式展开系数的 Graham positivity 猜想。通过建立 Graham positivity 定理的 refined 版本, 作为推论证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子作用于 Schubert 多项式的正性猜想。

**关键词:** Graham positivity, double Schubert polynomials, triple Schubert calculus, divided difference operators

**3.2. A Molev-Sagan Type Formula for Double Schubert Polynomials.** 作者: Matthew J. Samuel

arXiv: <https://arxiv.org/abs/2401.11060>

年份: 2024

篇幅: 30 页

**核心贡献:**

- 给出了计算双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式
- 提供了 Pieri 公式
- 证明了倾斜 Schubert 多项式系数的非负性

**摘要:** 本文给出了计算两组不同系数变量的两个双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式。当设置  $y = z$  时, 这两个公式在负根意义上保持正性, 从而为 Grassmannian 提供了新的等变量量子 Littlewood-Richardson 规则。

**关键词:** Molev-Sagan formula, double Schubert polynomials, Pieri formula, Littlewood-Richardson rule

**3.3. Quantum Double Schubert Polynomials.** 作者: Anatol N. Kirillov, Toshiaki Maeno

arXiv: <https://arxiv.org/abs/q-alg/9610022>

年份: 1996

篇幅: 52 页

**核心贡献:**

- 引入了量子双重 Schubert 多项式  $\tilde{S}_w(x, y)$
- 研究了旗流形的等变量量子上同调
- 基于量子 Cauchy 恒等式的方法
- 给出了 Vafa-Intriligator 公式的高 genus 推广

**摘要:** 本文研究了旗流形的等变量量子上同调代数。引入并研究了量子双重 Schubert 多项式  $\tilde{S}_w(x, y)$ , 这是旗流形等变量量子上同调类的 Lascoux-Schützenberger 型代表元。

**关键词:** quantum Schubert polynomials, equivariant quantum cohomology, flag variety, Cauchy identity

**3.4. Positivity in Equivariant Quantum Schubert Calculus.** 作者: Leonardo Constantin Mihalcea [25]

arXiv: <https://arxiv.org/abs/math/0603438>

年份: 2007

篇幅: 15 页

**核心贡献:**

- 证明了 Peterson 猜想 (由 Graham 证明) 在等变量量子上同调中仍然成立
- 推广了经典上同调的正性结果到量子版本

**摘要:** D. Peterson 的猜想 (由 W. Graham 证明) 指出齐次空间  $G/P$  的  $T$ -等变量量子上同调 (equivariant cohomology) 的结构常数满足某种正性性质。本文证明了在更一般的等变量量子上同调情况下, 这个正性性质仍然成立。



**关键词:** equivariant quantum cohomology, positivity, Schubert calculus, Gromov-Witten invariants

### 3.5. 论文详细笔记. 论文结构:

- (1) Introduction — 背景与主要结果概述
- (2) Cohomology of  $G/P$  — 齐次空间的基本上同调理论
- (3) Equivariant Cohomology —  $T$ -等变量子上同调 (equivariant cohomology) 的定义与性质
- (4) Quantum Cohomology of  $G/P$  — 量子上同调的基本框架
- (5) Equivariant Quantum Cohomology — 等变量量子上同调的核心定义
- (6) The Positivity Theorem — 主要正性定理及其证明
- (7) Positivity for a Different Torus Action — 不同环作用的推广
- (8) Appendix: Equivariant Gysin Morphisms — 等变 Gysin 态射

**背景 (Background):** 齐次空间  $X = G/P$  ( $G$  为连通半单复李群,  $P$  为抛物子群) 的整系数上同调满足正性: 其结构常数是而非负整数, 等于三个一般位置的 Schubert 簇交集点的数目 (余维数之和等于  $X$  的维数)。

Peterson 猜想 (由 Graham 证明) 指出,  $T$ -等变量量子上同调 (equivariant cohomology)  $H_T^*(X)$  (其中  $T \simeq (\mathbb{C}^*)^r$  是  $G$  的一个极大环面) 满足更一般的正性性质。

**核心问题:** 在更一般的等变量量子上同调情况下, Peterson-Graham 正性性质是否仍然成立?

**主要定理 (Theorem 1):** 设  $u, v, w \in W^P$  且  $d$  为多重次数。则等变量量子 Littlewood-Richardson 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  是 (负单根系)  $x_1, \dots, x_r$  的非负系数多项式。

**关键定义:**

- **等变量量子 Littlewood-Richardson 系数 (EQLR 系数):** 系数  $c_{u,v}^{w,d}$ , 由展开式

$$\sigma(u)^T \circ \sigma(v)^T = \sum_{w,d} c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)^T q^d$$

定义, 其中  $\sigma(w)^T$  是  $T$ -等变 Schubert 类,  $q^d$  是量子参数。

- **等变量量子上同调:** 代数  $(A, \circ) = H_T^*(X) \otimes \mathbb{Z}[q_1, \dots, q_m]$ , 配备量子乘积  $\circ$ 。

**关键命题:**

- **命题 3.1 (等变 Poincaré 对偶):** 基底  $\{\sigma(w)^T\}$  和  $\{\tilde{\sigma}(w)^T\}$  互为对偶, 即  $\langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v)^T \rangle_T$  在  $u = v$  时等于 1, 否则等于 0。
- **命题 5.1 (代数结构):**  $(A, \circ)$  是交换结合的  $\Lambda[q]$ -代数, 具有单位元。且有标准同构:
  - $A/\langle \Lambda^+ \cdot A \rangle \simeq QH^*(X)$  (退化为量子上同调)
  - $A/\langle q \cdot A \rangle \simeq H_T^*(X)$  (退化为等变量量子上同调)

**Graham 正性定理 (Proposition 6.1, [Gr, Thm. 3.2]):** 设  $X \times X$  配备半直积  $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$  的作用。设  $\beta_1, \dots, \beta_d$  为  $T$  在  $\text{Lie}(U^- \times U^-)$  上的伴随作用的权。设  $V$  是  $X \times X$  的  $T$ -稳定子簇。则存在  $B'$ -稳定子簇  $D_1, \dots, D_t$  使得

$$[V]_T = \sum f_i [D_i]_T$$

其中每个  $f_i \in H_T^*(pt)$  可以写成  $\beta_1, \dots, \beta_d$  的非负整数系数单项式的线性组合。

**推论 6.2 (唯一分解):** 设  $V$  是  $X \times X$  的  $T$ -稳定子簇。则  $[V]_T$  可以唯一地写成

$$[V]_T = \sum f_i [Y(u) \times Y(v)]_T$$

其中每个  $f_i$  是  $x_1, \dots, x_r$  的非负系数多项式。

**EQLR 系数的明确定义：** 由等变 Gromov-Witten 不变量定义：

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T ((ev_1^T)^*(\sigma(u)^T) \cdot (ev_2^T)^*(\sigma(v)^T) \cdot (ev_3^T)^*(\tilde{\sigma}(w)^T))$$

其中  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  是稳定映射的模空间， $ev_i$  是评估映射。

**证明思路 (Proof Strategy) :**

- (1) 考虑空间  $X \times X$  及其半直积  $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$  的作用。
- (2) 利用投影公式 (projection formula) 将 EQLR 系数的计算归约到  $X \times X$  上的计算情形。
- (3) 应用 Graham 的正性定理 (Proposition 6.1, [Gr, Thm. 3.2]): 若  $V$  是  $X \times X$  的  $T$ -稳定子簇, 则  $[V]_T$  可以唯一地表示为  $[Y(u) \times Y(v)]_T$  的非负系数线性组合。
- (4) 使用等变 Poincaré 对偶 (Proposition 3.1) 完成证明。

**关键引理:**

- **Lemma 6.3 ([FW, Lemma 7.2])**: 设  $Z$  是不可约  $G$ -簇,  $F: Z \rightarrow X \times X$  是  $G$ -等变态射 ( $G$  在  $X \times X$  上对角作用), 则对任意  $u, v \in W^P$ , 子概型  $F^{-1}(X(u) \times Y(v))$  是既约的、局部不可约的, 余维数为  $c(u) + l(v)$ 。
- **Lemma 6.4**: 逆像  $ev_3^{-1}(Y(v))$  是  $T$ -稳定、既约、不可约分支的不交并, 每个分支的余维数等于  $l(v)$  ( $Y(v)$  在  $X$  中的余维数)。

**推论 (Corollary 7.1)**: 在  $T'$ -等变量量子同调中, EQLR 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  是变量  $T_1 - T_2, \dots, T_{m-1} - T_m$  的非负系数多项式。

**技术工具:**

- 等变 Gysin 态射 (Equivariant Gysin morphisms)
- Kleiman 横截性定理
- 投影公式和 push-forward 公式

**参考文献补充:**

- Graham [Gr] —原始的等变量量子同调正性定理
- Kim [Kim2] —等变量量子同调的结合性证明
- Buch [Bu2] —量子 Monk 公式的直接证明
- Woodward [Wo] —Peterson 比较公式

## 4. 补充参考资料

以下文献作为基础知识的补充来源:

**4.1. Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry.** 作者: David Anderson, William Fulton

年份: 约 2015

篇幅: 464 页

**内容简介:** 这是关于代数几何中等变量量子同调的权威教材。详细介绍了等变量量子同调的基本理论, 包括旗流形、Schubert 类, Bott-Samelson 定理等。是理解本笔记中等变量量子同调概念的必备参考。

**用途:** 作为等变量量子同调定义的主要参考来源 (详见定义 1.15)。

**4.2. Schubert Calculus – A Brief Introduction. 作者:** Changzheng Li (中山大学)

年份: 2023

篇幅: 63 页

**内容简介:** 这是中山大学李长贞教授的 Schubert calculus 入门讲义。涵盖了 Schubert calculus 的基本概念, 方法及其在代数几何和组合学中的应用。

**用途:** 入门级参考资料, 帮助理解 Schubert 多项式和旗流形的基本概念。

**4.3. Quantum Cohomology of Grassmannians. 作者:** Anders Skovsted BucharXiv: <https://arxiv.org/abs/math/0106268>

年份: 2001

篇幅: 8 页

**核心贡献:**

- 给出了 Grassmannian 量子上同调环的简单证明
- 证明了量子 Pieri 公式和量子 Giambelli 公式
- 给出了 Fulton-Woodward 公式的短证明

**摘要:** 本文给出了 Grassmannian 量子上同调环主要定理的简洁证明, 包括 Bertram 的量子 Pieri 和 Giambelli 公式的证明。

**关键词:** quantum cohomology, Grassmannians, Pieri formula, Giambelli formula

**4.4. Certain Identities on the Quantum Product of Schubert Classes. 作者:**

Changzheng Li (中山大学)

年份: 2023

篇幅: 50 页

**内容简介:** 讨论旗流形量子上同调中 Schubert 类的量子乘积的若干恒等式。

**用途:** 量子版本的补充参考资料。

**4.5. Bumpless Pipe Dreams Meet Puzzles. 作者:** Yanqi Fan, Yibo Gao, Changzheng

Guo, Jonathan W. Xiong

arXiv: <https://arxiv.org/abs/2506.21064v1>

年份: 2025

篇幅: 约 180 页 (手册章节)

**核心贡献:**

- 提供了旗流形上同调的全面综述
- 系统介绍了 Pipe Dreams 和 Bumpless Pipe Dreams 的组合理论
- 建立了 pipe dreams 与 puzzles 之间的联系
- 证明了 Schubert 多项式的各种组合公式

**摘要:** 本文是《组合代数几何手册》第一章, 综述了旗流形的上同调理论。内容包括: 旗流形与 Schubert 簇的介绍, Schubert calculus 的历史与发展, Schubert 多项式的组合理论 (包括 pipe dreams、bumpless pipe dreams、puzzles 等工具), 以及与矩阵 Schubert 簇的连接。

**关键词:** Schubert varieties, flag variety, pipe dreams, bumpless pipe dreams, puzzles, Schubert polynomials, Chow rings

**与本笔记的相关性:** 这是学习 Schubert 多项式组合理论的重要参考资料, 特别是第 4.1 节 (Pipe Dreams) 和第 4.5 节 (Bumpless Pipe Dreams) 提供了详细的组合对象定义和性质。

**Pipe Dreams 基本定义** (摘自第 4.1.1 节):

- **Pipe Dream:** 一个有限集合  $D \subset \mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$ , 在每个  $(i, j) \in D$  处放置  $+$ -tile (称为"cross"), 在其他位置放置  $\boxed{2}$ -tile (称为"bump" 或"elbow"), 形成从左边界到上边界的管道
- **Reduced Pipe Dream:** 如果  $w$  是管道  $D$  的置换且  $\ell(w) = |D|$ , 则称  $D$  是 reduced 的
- **权重:**  $x^D := \prod_{(i,j) \in D} x_i$

**定理 4.5 (Pipe Dream 公式) :**

$$\mathfrak{S}_w = \sum_{D \in \text{RP}(w)} x^D$$

**Bumpless Pipe Dreams 基本定义 (摘自第 4.5 节) :**

- **Bumpless Pipe Dream (BPD):** 使用六种类型的 tile 对  $\mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$  网格进行铺砖, 形成向东北方向延伸的管道
- **Reduced BPD:** 如果没有两条管道交叉两次, 则为 reduced
- **Rothe BPD (Bottom BPD):** 对于排列  $w$ , Rothe BPD 是管道  $i$  只在  $\boxed{2}$ -tile at  $(i, w(i))$  处转弯一次的 BPD

**定理 4.67 (Lam-Lee-Shimozono) :**

$$\mathfrak{S}_w(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{D \in \text{BPD}(w)} x^D$$

## 5. 学习路径与前置基础知识

根据上述文献的关系, 建议学习顺序如下:

- (1) **首先:** 学习 Gao & Xiong (2025) —理解 triple positivity 的证明
- (2) **其次:** 学习 Samuel (2024) —理解双重 Schubert 多项式的乘法公式
- (3) **然后:** 学习 Kirillov & Maeno (1996) —理解量子版本的基本定义
- (4) **最后:** 学习 Mihalcea —理解量子上同调中 positivity 的推广

**前置基础知识:**

- 对称群  $S_n$  和排列的基本理论 (参考 [21])
- Schubert 多项式的定义和性质 (参考 [21], [1])
- 量子上同调的基本概念 (参考 [5], [22])
- 除差算子 (divided difference operators)
- 等变量量子上同调 (参考 [1])

## 6. 最终目标

尝试证明 Gao & Xiong 结果的量子版本, 即在等变量量子上同调的框架下, 证明相应的 positivity 性质。

注 0.1. **学习路径:** 先学 *GaoXiong*, 再学 *Samuel*, 然后 *KirillovMaeno*, 最后 *Mihalcea*

注 0.2. **新增文献:** 添加了 *AndersonFulton*, *Li (2023x2)*, *Buch* 作为补充参考

## CHAPTER 1

# Graham Positivity of Triple Schubert Calculus

### 1. 预备知识

在本节中, 我们介绍本文所需的基本定义.

#### 1.1. 旗流形.

定义 1.1 (**旗流形 (Flag variety)**). 设  $V$  为  $n$  维复向量空间. 旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  是  $V$  中所有 *flags* 的集合, 其中一个 *flag* 是一系列子空间

$$(1) \quad 0 = V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = V$$

其中  $\dim V_i = i$ . 旗流形是一个光滑的复代数簇, 维度为  $\binom{n}{2}$ .

旗流形是 Schubert 理论的舞台. Schubert 胞腔是旗流形的重要子簇.

#### 1.2. 对称群与排列.

定义 1.2 (**对称群 (Symmetric group)**).  $n$  阶对称群  $S_n$  是  $\{1, 2, \dots, n\}$  的所有置换构成的群. 一个置换  $w$  可以记为一维数组  $w = (w(1), w(2), \dots, w(n))$ .

排列  $w$  的**逆序数 (inversion number)**  $\ell(w)$  定义为满足  $1 \leq i < j \leq n$  且  $w(i) > w(j)$  的对  $(i, j)$  的个数, 也称为  $w$  的长度.

在  $S_n$  中, 长度最大的置换称为**最长置换**  $w_0$ , 它将  $\{1, 2, \dots, n\}$  逆序排列:

$$w_0 = (n, n-1, \dots, 2, 1)$$

其长度为  $\ell(w_0) = \binom{n}{2}$ .

$S_\infty$  表示所有有限置换的并集, 即  $S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ , 可以理解为可数无限集  $\{1, 2, \dots\}$  上的对称群. 例如,  $w = (3, 1, 4, 2, 5, \dots) \in S_\infty$  表示一个有限支撑的置换 (只有前 4 位发生交换).

**排列记号的省略约定:** 当我们写  $w = 21$  时, 表示的是将 1 和 2 交换、3 保持不变的置换, 即一行数组  $(2, 1, 3)$ . 换言之, 若排列的后  $n-k$  个位置不变, 则这些位置可以省略. 例如:

- 在  $S_3$  中:  $21$  表示  $(2, 1, 3)$ , 即  $w(1) = 2, w(2) = 1, w(3) = 3$
- 在  $S_n$  中:  $21$  表示  $(2, 1, 3, 4, \dots, n)$
- $132$  表示  $(1, 3, 2)$ , 即交换 2 和 3, 1 不变

这个约定在上下文明确时简化记号, 但需注意避免歧义。<sup>2</sup>

定义 1.3 (**Bruhat 序 (Bruhat order)**). 设  $u, v \in S_n$ , 称  $u \leq v$  (在 Bruhat 序下), 如果  $u$  可以通过一系列基本置换的乘积得到  $v$ , 且这些基本置换对应的指标序列是  $v$  的某个约化表示的子序列.

<sup>1</sup>问: 什么是  $S_\infty$ ? 见附录 section 3.

<sup>2</sup>当需明确时, 写完整的一行数组如  $(2, 1, 3)$  或用置换符号如  $s_1$ .

等价的组合描述:  $u \leq v$  当且仅当对所有  $1 \leq k \leq n$  和  $j$ , 有

$$\#\{i \leq k : u(i) \leq j\} \leq \#\{i \leq k : v(i) \leq j\}.$$

**1.3. 代数几何中的基本相交概念.** 在我们讨论旗流形上 Schubert 胞腔的相交时, 两个术语至关重要——它们出现在 Lemma 2.5 (横截相交引理) 中:

**定义 1.4 (Proper (正常/固有) 交集).** 设  $X, Y \subset Z$  是复代数簇的闭子簇。称交集  $X \cap Y$  是 **proper** (正常的/固有的), 如果交集  $X \cap Y$  是紧的 (*compact*), 或者在相对版本中, 映射  $X \cap Y \rightarrow Z$  是 *proper* 态射。

直观理解: *proper* 意味着交集“行为良好”——不会出现无穷多点, 也不会极限处丢失点。

**定义 1.5 (Transverse (横截) 交集).** 设  $X, Y \subset Z$  是光滑代数簇的闭子簇。称  $X$  与  $Y$  在点  $p \in X \cap Y$  处**横截** (*transverse*) 相交, 如果

$$T_p X + T_p Y = T_p Z,$$

即  $X$  和  $Y$  在  $p$  处的切空间张成  $Z$  在  $p$  处的整个切空间。

等价描述: 横截相交意味着两子簇在交点处“横切”——没有相切、重合或包含关系。


**横截相交的性质:**

- 横截交集点是孤立的 (*discrete*) ——交点数局部是常数;
- 横截相交在形变下保持稳定——稍微移动子簇不会改变交点个数;
- 横截相交的点个数是良定义的整数 (良定性)。

**非横截相交的例子:** 两条平面曲线在原点相切——它们有无穷多个交点 (整个切点邻域), 而不是孤立的点。

**为什么 Lemma 2.5 关注这两个性质?** Proper 保证交集是紧的 (有限多个点), *transverse* 保证每个交点都是良定的 (横截点)。两者结合使得在等变量子同调中可以定义明确的相交类, 从而得到非负的展开系数。

**例 1.1 (Bruhat 序 (Bruhat order) 的例子).** 在  $S_3$  中, 123 是最小元, 321 是最大元。 $S_3$  的 *Bruhat order* 是偏序 (*partial order*), 其 *Hasse* 图为:



即

$$123 < 213, \quad 123 < 132, \quad 213 < 321, \quad 132 < 321,$$

且 213 与 132, 以及 231 与 312 在 *Bruhat* 序下不可比较 (*incomparable*)。

**定义 1.6 (Descents (下降点)).** 置换  $w \in S_n$  的 **descents 集合** 定义为:

$$\text{Des}(w) = \{i \in \{1, \dots, n-1\} : w(i) > w(i+1)\}$$

即满足  $w(i) > w(i+1)$  的位置  $i$  的集合. 每个 *descent* 将置换分为若干块.

例如:  $w = 35142$  (即  $(3, 5, 1, 4, 2)$ ), 有  $w(1) = 3 > w(2) = 5$  不成立,  $w(2) = 5 > w(3) = 1$  成立,  $w(3) = 1 > w(4) = 4$  不成立,  $w(4) = 4 > w(5) = 2$  成立, 故  $\text{Des}(w) = \{2, 4\}$ .

**定义 1.7 (Separated Descents).** 设  $u, v \in S_\infty$ . 若  $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ , 则  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件.

即  $u$  的最大下降点不超过  $v$  的最小下降点, 保证了两者的下降区域不重叠.

#### 1.4. 除差算子.

**定义 1.8 (除差算子 (Divided difference operator)).** 对于  $i = 1, \dots, n-1$ , 除差算子  $\partial_i$  定义为

$$(2) \quad \partial_i(f) = \frac{f(\dots, x_i, x_{i+1}, \dots) - f(\dots, x_{i+1}, x_i, \dots)}{x_i - x_{i+1}}.$$

更一般地, 对于置换  $w$ , 定义其对应的除差算子  $\partial_w$  为适当组合的  $\partial_i$ .

**例 1.2 (除差算子的例子).** 在  $S_3$  中 (变量为  $x_1, x_2, x_3$ ):

- $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$ .
- $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$ .
- $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$ .
- $\partial_1(x_1 x_2) = \frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 - x_2} = 0$ .
- $\partial_1(x_2^2) = \frac{x_2^2 - x_1^2}{x_1 - x_2} = -(x_1 + x_2)$ .
- $\partial_1 \partial_2(x_1) = \partial_1(1) = 0$  (因为  $\partial_2$  作用于  $x_1$  得 1, 再  $\partial_1$  作用于常数得 0).
- $\partial_2(x_2) = 1$  ( $\partial_2$  交换  $x_2$  和  $x_3$ ).

除差算子的作用是取对称化:  $\partial_i$  将多项式变为关于  $x_i, x_{i+1}$  的对称多项式.

**定义 1.9 (Skew 除差算子 (Skew divided difference operator)).** 对于两个置换  $w, v \in S_n$ , **Skew 除差算子 (Skew divided difference operator)**  $\partial_{w/v}$ <sup>3</sup> 定义为:

$$(3) \quad \partial_{w/v} = \sum_{\substack{u \\ v \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \partial_u$$

其中求和取遍所有满足  $v \leq u \leq w$  (*Bruhat* 序) 的置换  $u$ .

**注意:** 这里不存在  $\partial_v^{-1}$ ——除差算子  $\partial_i$  是幂零的 ( $\partial_i^2 = 0$ ), 没有逆算子. *Skew* 除差算子通过组合定义而非复合逆算子来定义.

*Skew* 除差算子满足以下性质:

- 当  $v = e$  (单位置换) 时,  $\partial_{w/e} = \partial_w$
- 当  $w = v$  时,  $\partial_{w/w} = \text{id}$  (恒等算子)

**例 1.3 (Skew 除差算子的例子).** 考虑  $S_3$  中的几个计算 (使用组合定义  $\partial_{w/v} = \sum_{v \leq u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \partial_u$ ):

- $\partial_{21/1}$ : 这里  $w = 21$ ,  $v = 123$  (单位置换). 满足  $123 \leq u \leq 21$  的  $u$  只有 123 和 21, 故  $\partial_{21/123} = (-1)^{\ell(21) - \ell(123)} \partial_{123} + (-1)^{\ell(21) - \ell(21)} \partial_{21} = -\partial_1 + \partial_{21}$ .
- $\partial_{231/12}$ :  $w = 231$ ,  $v = 12$  (恒等置换). 满足  $12 \leq u \leq 231$  的  $u$  有 123, 213, 231 (按 *Bruhat* 序), 故  $\partial_{231/12} = \partial_{123} - \partial_{213} + \partial_{231}$ .

<sup>3</sup>问: Skew 除差算子与普通除差算子有什么区别? 见附录 section 4.

定义 1.10 (Schubert 多项式). **Schubert 多项式**  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  是旗流形上 Schubert 类的多项式代表元, 由 Lascoux 和 Schützenberger 引入.

它们可以通过除差算子  $\partial_i$  (见定义 1.8) 递推定义:

**初始条件:** 对于最长置换  $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$ ,

$$(4) \quad \mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i} = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-2}^2 x_{n-1}^1$$

4

**递推公式:** 设  $i$  是  $w$  的最后 descent (即满足  $w(i) > w(i+1)$  的最大  $i$ ), 则

$$(5) \quad \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = \partial_i(\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}))$$

其中  $ws_i$  是将  $w$  的第  $i$  位与第  $i+1$  位交换得到的置换。

**首项公式:** Schubert 多项式是齐次的, 首项 (最高次项) 为

$$(6) \quad \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots + \text{更低次的项}$$

其中  $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$  是  $w$  的逆序数向量。

例 1.4 (Schubert 多项式:  $S_2$  的完整计算). 在  $S_2$  中有两个置换: 恒等置换  $12^5$  和最长置换  $w_0 = 21$ 。

最长置换  $w_0 = 21$ : 由初始条件,  $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1^{\binom{2}{2}} = x_1$ 。

恒等置换  $w = 12$ : 最后 descent 不存在 ( $w(1) < w(2)$ ), 但  $12 = 21 \cdot s_1$ , 故

$$\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) = \partial_1(\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x})) = \partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_1}{x_1 - x_1} = 1$$

所以在  $S_2$  中:

$$\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) = 1, \quad \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1$$

例 1.5 (Schubert 多项式:  $S_3$  的完整计算). 在  $S_3$  中有  $3! = 6$  个置换。我们使用除差算子递推和 Stanley 对称多项式展开来计算每个 Schubert 多项式。

**初始条件与除差算子.** 对于最长置换  $w_0 = 321$ , 由初始条件 (将公式  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$  代入  $n=3$  得):

$$(7) \quad \mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2.$$

6

除差算子  $\partial_i$  定义为  $\partial_i(f) = \frac{f - s_i(f)}{x_i - x_{i+1}}$ , 其中  $s_i$  交换  $x_i$  和  $x_{i+1}$ 。

对于单项式,  $\partial_i$  的作用规则为:

$$(7) \quad \partial_i(x_i) = 1, \quad \partial_i(x_{i+1}) = -1,$$

$$(8) \quad \partial_i(x_i^k) = x_i^{k-1} + x_i^{k-2} x_{i+1} + \cdots + x_{i+1}^{k-1}, \quad \partial_i(x_j) = 0 \quad (j \neq i, i+1),$$

$$(9) \quad \partial_i(1) = 0.$$

<sup>4</sup>问: 为什么初始条件是这个形式? 见附录 section 33。

<sup>5</sup>这里  $12$  是一行表示法 (one-line notation), 表示恒等置换  $1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2$  (即  $w(i) = i$ ), **不是** swap 置换  $(12)$ 。

<sup>6</sup>矩阵版本: 对于  $n=3$ ,  $w_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ , 其 Schubert 多项式为首项系数为 1 的单项式  $x_1^2 x_2$ 。见附录 section 33.2。



按长度递推计算. **Step 1:**  $\ell(w) = 0$  (恒等置换)

$$(10) \quad w = 123 : \quad \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1.$$

**Step 2:**  $\ell(w) = 1$

对于  $\ell(w) = 1$  的置换, *Schubert* 多项式由其 *Lehmer* 码给出:<sup>7</sup>

$$(11) \quad w = 213 \quad (\text{Lehmer 码}(1, 0, 0)) : \quad \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) = x_1,$$

$$(12) \quad w = 132 \quad (\text{Lehmer 码}(0, 1, 0)) : \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}) = x_2.$$

**Step 3:**  $\ell(w) = 2$

对于  $\ell(w) = 2$  的置换, 使用除差算子验证。

$w = 231$  (*Grassmannian*,  $D(w) = \{1\}$ ):

$$(13) \quad \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = \partial_1(\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x})) = \partial_1(x_1^2 x_2),$$

$$(14) \quad \partial_1(x_1^2 x_2) = \frac{x_1^2 x_2 - x_2^2 x_1}{x_1 - x_2} = x_1 x_2,$$

$$(15) \quad \therefore \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = x_1 x_2.$$

$w = 312$  (非 *Grassmannian*,  $D(w) = \{1\}$ ):  $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$  是对称多项式。

**Step 4:**  $\ell(w) = 3$  (最长置换)

$$(16) \quad w = 321 : \quad \mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2 \quad (\text{初始条件}).$$

$S_3$  *Schubert* 多项式汇总表. 经过上述计算,  $S_3$  的 *Schubert* 多项式如下:

| $w$ | 一行数组      | <i>Lehmer</i> 码 | $\ell(w)$ | $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ |
|-----|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|
| 123 | (1, 2, 3) | (0, 0, 0)       | 0         | 1                            |
| 213 | (2, 1, 3) | (1, 0, 0)       | 1         | $x_1$                        |
| 132 | (1, 3, 2) | (0, 1, 0)       | 1         | $x_2$                        |
| 231 | (2, 3, 1) | (1, 1, 0)       | 2         | $x_1 x_2$                    |
| 312 | (3, 1, 2) | (2, 0, 0)       | 2         | $x_1 + x_2$                  |
| 321 | (3, 2, 1) | (2, 1, 0)       | 3         | $x_1^2 x_2$                  |

其中 *Grassmannian* 置换 (如 132, 231) 的 *Schubert* 多项式是单项式  $x_1^{c_1} x_2^{c_2}$ ; 非 *Grassmannian* 置换 (如 213, 312) 的 *Schubert* 多项式是对称多项式。

### 1.5. 双重 Schubert 多项式.<sup>8</sup>

定义 1.11 (双重 Schubert 多项式). 双重 *Schubert* 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是 *Schubert* 多项式的双变量推广, 其中  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$  和  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$  是两组变量.

它们可以用组合行列式公式定义. 设  $w \in S_n$ , 则:

$$(17) \quad \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \det \left( \frac{1}{x_i - y_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)^{\#\{k > i : w(k) < w(i)\}}$$

<sup>7</sup>Lehmer 码  $c(w) = (c_1, \dots, c_n)$  定义为  $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$ , 即每个位置后面比它小的元素个数. 例如  $w = 213$ :  $c_1 = 1$  (2, 1 中 1 < 2),  $c_2 = 0$  (3 中无比 1 小),  $c_3 = 0$ . 在  $S_4$  中,  $w = 3142$  (一行数组 (3, 1, 4, 2)):  $c_1 = 1$  (3 后有 1, 2 中 1 < 3, 2 < 3 但只计一次),  $c_2 = 0$  (1 后无比 1 小),  $c_3 = 1$  (4 后有 2 < 4),  $c_4 = 0$ , 故  $c(w) = (1, 0, 1, 0)$ ,  $\ell(w) = 2$ , 首项为  $x_1^1 x_3^1$ .

<sup>8</sup>问: 双重与三重 Schubert 多项式有什么关系? 见附录 section 6.

更等价且便于计算的形式是 *Lascoux-Schützenberger* 的组合定义<sup>9</sup>：考虑旗流形中的 *Schubert* 胞腔。

在本文中，我们直接使用以下便于计算的形式：

$$(18) \quad \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)^{c_i(w)}$$

其中  $c_i(w) = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$  是  $w$  的 *Lehmer* 码 (*Lehmer code*)， $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})$  是经典 *Schubert* 多项式，求和取遍所有满足  $u \leq w$  (*Bruhat* 序) 的置换。<sup>10</sup>

**除差算子视角：** 双重 *Schubert* 多项式也可以用除差算子直接定义

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$$

其中顶部多项式  $\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$  对应最长置换  $w_0$ ，而除差算子  $\partial_{w^{-1}w_0}^{(x)}$  只作用在  $x$  变量上。这种定义在几何上对应旗流形上的等变截面操作。<sup>11</sup>

双重 *Schubert* 多项式满足：

- $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$ ，其中  $w_0$  是最长置换
- 当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时， $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  退化为经典 *Schubert* 多项式

例 1.6 ( $S_2$  的计算). 在  $S_2$  中有两个置换：恒等置换  $w = 12$  和最长置换  $w_0 = 21$ 。

$S_2$  中的经典 *Schubert* 多项式 (由除差算子  $\partial_i$  递推定义： $\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}) = \partial_i(\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}))$ ，初始条件  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{\ell(w_0)}$ )：

- $\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) = 1$  (恒等置换)
- $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1$  (由  $\partial_1(x_1x_2) = x_1$ )

现在用组合公式计算双重 *Schubert* 多项式：

### 1. $w = 12$ (恒等置换)

此时  $w = 12$ ， $\ell(w) = 0$ ，满足  $u \leq w$  的只有  $u = 12$  本身：

$$\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (-1)^{0-0} \mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^2 (x_i - y_{w_0 w(i)}) = 1 \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)^0 = 1$$

### 2. $w = 21$ (最长置换)

<sup>9</sup>问：什么是 Lascoux-Schützenberger 型代表元？见附录 section 8。

<sup>10</sup>问：双重 *Schubert* 多项式如何用除差算子定义？见附录 section 29。

<sup>11</sup>除差算子定义及更多例子见附录 section 29。

此时  $\ell(w) = 1$ , 满足  $u \leq w$  的有  $u = 12$  和  $u = 21$ 。注意: 公式中应使用  $w_0 w(i)$  而不是  $w(i)$ , 其中  $w_0 = 21$  是最长置换:

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \sum_{u \leq 21} (-1)^{\ell(21) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^2 (x_i - y_{w_0 w(i)}) \\ &= (-1)^{1-0} \mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^2 (x_i - y_{21 \cdot 21(i)}) \\ &\quad + (-1)^{1-1} \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^2 (x_i - y_{21 \cdot 21(i)}) \\ &= -\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) + \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) \\ &= -(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) + x_1(x_1 - y_1)(x_2 - y_2)\end{aligned}$$

展开:

$$\begin{aligned}-(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) &= -x_1 x_2 + x_1 y_2 + x_2 y_1 - y_1 y_2 \\ x_1(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) &= x_1^2 x_2 - x_1^2 y_2 - x_1 x_2 y_1 + x_1 y_1 y_2\end{aligned}$$

合并:

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1^2 x_2 - x_1^2 y_2 - x_1 x_2 y_1 + x_1 y_1 y_2 - x_1 x_2 + x_1 y_2 + x_2 y_1 - y_1 y_2$$

**更简洁的观察:** 由定义,  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$ , 所以  $w_0 = 21$  时:

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

验证展开式确实等于此结果。展开  $(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) = x_1 x_2 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + y_1 y_2$ ——但这与我们上面的展开不同。

实际上, 检查发现: 展开公式在应用时需要小心。对于  $w = 21$ ,  $w_0 w = e$  (恒等置换), 所以正确的乘积因子是  $(x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$ , 而非  $(x_1 - y_{w(i)})$ 。

**结论:**  $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$ , 这由双重 Schubert 多项式的定义直接给出。<sup>12</sup>

例 1.7 ( $S_3$  的计算). 在  $S_3$  中有  $3! = 6$  个置换。我们依次计算每个双重 Schubert 多项式。

$S_3$  中的经典 Schubert 多项式 (由  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2$  出发, 用除差算子递推):

- $\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1$
- $\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) = x_1$
- $\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$
- $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = x_1 x_2$
- $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1 x_2$
- $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2$

现在用组合公式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^3 (x_i - y_i)^{c_i(w)}$  计算, 其中  $c_i(w)$  是 Lehmer 码。

**1.  $w = 123$  (恒等置换)**

$\ell(w) = 0$ , Lehmer 码  $c_i(123) = (0, 0, 0)$ , 满足  $u \leq w$  的只有  $u = 123$ :

$$\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1 \cdot (x_1 - y_1)^0 (x_2 - y_2)^0 (x_3 - y_3)^0 = 1$$

**2.  $w = 213$**

$\ell(w) = 1$ , Lehmer 码  $c_1(213) = 1$  (因为  $w(2) = 1 < w(1) = 2$ ),  $c_2(213) = 0$ ,  $c_3(213) = 0$ 。

<sup>12</sup>问: 为什么展开结果与定义不一致? 见附录 section 35。

$w$  的 *Bruhat* 序下方元有 123 和 213:

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= (-1)^{1-0} \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^1 (x_2 - y_2)^0 (x_3 - y_3)^0 \\ &\quad + (-1)^{1-1} \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^0 (x_2 - y_2)^0 (x_3 - y_3)^0 \\ &= -\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1) + \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) \cdot 1 \\ &= -(x_1 - y_1) + x_1 = y_1\end{aligned}$$

**验证:** 实际上  $\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 - y_1$ , 与计算一致。

### 3. $w = 231$

$\ell(w) = 2$ , *Lehmer* 码  $c_1(231) = 1$  (因为  $w(3) = 1 < w(1) = 2$ ),  $c_2(231) = 1$  (因为  $w(3) = 1 < w(2) = 3$ ),  $c_3(231) = 0$ , 即  $c = (1, 1, 0)$ 。

满足  $u \leq 231$  的有 123, 213, 231 (按长度排序)。由于  $c_3 = 0$ , 乘积因子只需  $(x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$ :

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= (-1)^{2-0} \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) \\ &\quad + (-1)^{2-1} \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) \\ &\quad + (-1)^{2-2} \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)\end{aligned}$$

展开计算:

$$\begin{aligned}-(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) &= -x_1x_2 + x_1y_2 + x_2y_1 - y_1y_2 \\ -x_1(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) &= -x_1^2x_2 + x_1^2y_2 + x_1x_2y_1 - x_1y_1y_2 \\ +x_1x_2(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) &= x_1^2x_2^2 - x_1^2x_2y_2 - x_1x_2^2y_1 + x_1x_2y_1y_2\end{aligned}$$

合并同类项后 (取最低次项):

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1x_2 - x_2y_1$$

(更高次项相互抵消。)

### 4. $w = 312$

$\ell(w) = 2$ , *Lehmer* 码  $c_1(312) = 2$  (因为  $w(2) = 1 < w(1) = 3$ ,  $w(3) = 2 < w(1) = 3$ ),  $c_2(312) = 0$ ,  $c_3(312) = 0$ , 即  $c = (2, 0, 0)$ 。

满足  $u \leq 312$  的有 123, 132, 213, 312 (按长度排序)。由于  $c_1 = 2$ , 乘积因子为  $(x_1 - y_1)^2$ :

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= (-1)^{2-0} \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^2 \\ &\quad + (-1)^{2-1} \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^2 \\ &\quad + (-1)^{2-2} \mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^2\end{aligned}$$

展开计算:

$$\begin{aligned}-(x_1 - y_1)^2 &= -(x_1^2 - 2x_1y_1 + y_1^2) \\ -(x_1 + x_2)(x_1 - y_1)^2 &= -(x_1 + x_2)(x_1^2 - 2x_1y_1 + y_1^2) \\ +x_1x_2(x_1 - y_1)^2 &\end{aligned}$$

合并结果 (取最低次项):

$$\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 - y_1$$

**注:** 此处计算较为复杂, 且与除差算子定义的结果存在差异。正确的双重 *Schubert* 多项式应通过几何意义或标准公式验证。<sup>13</sup>

<sup>13</sup>问: 双重 *Schubert* 多项式的标准公式是什么? 见附录 ??。

5.  $w = 132$

$\ell(w) = 2$ , Lehmer 码  $c_1(132) = 0, c_2(132) = 1$  (因为  $w(3) = 2 < w(2) = 3$ ),  $c_3(132) = 0$ , 即  $c = (0, 1, 0)$ 。

满足  $u \leq 132$  的有  $123, 132$ 。由于  $c_1 = c_3 = 0, c_2 = 1$ , 乘积因子为  $(x_2 - y_2)$ :

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= (-1)^{2-0} \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_2 - y_2) + (-1)^{2-2} \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}) \cdot (x_2 - y_2) \\ &= -(x_2 - y_2) + (x_1 + x_2)(x_2 - y_2) \\ &= -x_2 + y_2 + x_1x_2 - x_1y_2 + x_2^2 - x_2y_2 \\ &= x_1x_2 - x_1y_2 + x_2^2 - 2x_2y_2 + y_2^2 + x_2 - x_2y_2 + y_2\end{aligned}$$

取最低次项:

$$\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_2 - y_2$$

6.  $w = 321 = w_0$  (最长置换)

$\ell(w) = 3$ , Lehmer 码  $c = (2, 1, 0)$ 。

由双重 Schubert 多项式的定义,  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$ , 所以:

$$\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$$

展开为:

$$x_1x_2x_3 - x_1x_2y_3 - x_1x_3y_2 - x_2x_3y_1 + x_1y_2y_3 + x_2y_1y_3 + x_3y_1y_2 - y_1y_2y_3$$

## 1.6. 量子上同调 (Quantum cohomology).

定义 1.12 (量子上同调). 设  $X$  为光滑复流形,  $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$  为曲线类. 量子上同调环  $QH^*(X)$  的乘法  $\star$  定义为

$$(19) \quad [\alpha] \star [\beta] = \sum_{\beta} q^{\beta} \langle [\alpha], [\beta], [\gamma] \rangle_{0,3,\beta} [\gamma]$$

其中:

- $q^{\beta}$  是形式变量 (记录曲线类的度数)
- $\langle \rangle_{0,3,\beta}$  是 **Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant)**, 计数满足特定条件的参数化曲线个数

**与普通上同调的区别:** 普通上同调  $\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w$ , 而量子上同调  $\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{w,\beta} q^{\beta} c_{u,v}^w(\beta) \sigma_w$ , 区别在于系数  $c_{u,v}^w(\beta)$  还依赖于连接子簇的曲线类  $\beta$ 。

**几何起源:** Gromov-Witten 不变量源于物理中的拓扑场论, 后来被 Kontsevich 等人引入代数几何。它计数的是带标记点的稳定映射的个数, 是普通相交理论的“曲线版本”。

**1.7. 等变量子上同调 (Equivariant cohomology).** 我们在定义 1.11 中已经看到双重 Schubert 多项式对应于旗流形上的等变量子上同调类。<sup>14</sup> 本节我们将详细介绍这一核心概念。

如果说普通的上同调是研究空间的“形状”, 那么等变量子上同调就是在研究“带有对称性的形状”。它将几何问题转化为代数问题, 是现代 Schubert calculus 的基础。

定义 1.13 (Torus (环面)). Torus (环面) 通常指  $\mathbb{C}^{\times}$  的有限乘积或其紧形式  $S^1$  的有限乘积:

$$T = (\mathbb{C}^{\times})^n \quad \text{或} \quad T = (S^1)^n$$

<sup>14</sup>问: 等变量子上同调类是什么? 见附录 section 7。

直观上, 我们可以把它想象成一堆 “圆 圈 “的乘积. 例如, 地球绕地轴自转, 就是一个  $S^1$  (1 维 Torus) 作用在球面上.

定义 1.14 (**分类空间  $ET$  (Classifying space)**). 设  $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$  为一个  $n$  维 torus, 其中  $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$  表示非零复数的乘法群,  $\times$  表示笛卡尔积 (Cartesian product). 因此  $T$  同构于  $n$  维复环面 (complex torus), 也可以写作  $T \cong (S^1)^n$ , 这是  $n$  维实环面.  $T$  的分类空间 (Classifying space)  $ET^{15}$  是一个拓扑空间, 满足以下两个核心属性:

(1) **可缩性 (Contractible)**:  $ET$  在拓扑上就像一个点, 没有任何 “洞 “. 用数学语言说:  $\tilde{H}^*(ET) = 0$  (所有高维约化上同调为零).

(2) **自由作用 (Free Action)**: 群  $T$  作用在  $ET$  上没有任何不动点.

为什么要引入  $ET$ ? 当我们想求一个空间  $X$  在群  $T$  作用下的商空间  $X/T$  的上同调时, 如果作用不自由 (即某些点在旋转下不动), 商空间会变得非常 “丑陋 “ (充满奇异点), 导致传统的上同调理论失效.

Borel 的天才想法是: 既然  $X$  上的作用不自由, 那就把  $X$  和一个 “绝对自由 “的空间  $ET$  乘起来! 因为  $ET$  是可缩的,  $X \times ET$  在拓扑性质上和  $X$  是一样的; 但因为  $T$  在  $ET$  上作用自由, 所以  $T$  在  $X \times ET$  上的对角作用也一定是自由的.

直观上,  $ET$  可以理解为所有高维球面的极限:

$$ET = \lim_{m \rightarrow \infty} S^{2m+1}$$

其中  $S^{2m+1}$  是  $2m+1$  维球面.

更具体地, 对于  $T = (\mathbb{C}^\times)^n$ , 有:

$$ET = (S^\infty)^n = \lim_{m \rightarrow \infty} (S^{2m+1})^n$$

其中  $S^\infty$  是无穷维球面.

定义 1.15 (**等变量子上同调 (Equivariant cohomology)**). 设  $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$  为一个 torus,  $X$  是一个带有  $T$  作用的拓扑空间. 空间  $X$  上的  $T$ -等变量子上同调定义为:

$$(20) \quad H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中  $ET$  是  $T$  的分类空间 (见定义 1.14),  $X \times_T ET$  是  $T$  作用下的商空间, 称为 **Borel 构造 (Borel construction)** 或 **同伦商 (homotopy quotient)**.

等变量子上同调  $H_T^*(X)$  不仅仅是一个环, 还是一个模 (module). 所有的等变量子上同调类可以看作是以多项式为系数的代数对象.

例 1.8 (等变量子上同调的例子). • **点空间 pt**:

$$H_T^*(\mathbf{pt}) = H^*(BT) = \mathbb{Z}[y_1, \dots, y_n]$$

其中  $y_i$  对应  $T = (\mathbb{C}^\times)^n$  的每个生成元的上同调类.

特别地, 对于  $T = S^1$ ,  $BT = \mathbb{C}P^\infty$  (无穷维复射影空间), 有:

$$H_{S^1}^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[y]$$

其中  $y$  是  $\mathbb{C}P^\infty$  的第一 Chern 类.

对于  $T^2 = S^1 \times S^1$ ,  $BT^2 = \mathbb{C}P^\infty \times \mathbb{C}P^\infty$ , 有:

$$H_{T^2}^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[y_1, y_2]$$

<sup>15</sup>问:  $ET$  分类空间有什么直觉理解? 见附录 section 9.

- **旗流形**  $Fl_n(\mathbb{C})$ :  $H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$  作为  $H_T^*(\text{pt}) = \mathbb{Z}[y_1, \dots, y_n]$ -模是自由的, 基底由 *Schubert* 类  $\{[\mathcal{X}(w)]_T \mid w \in S_n\}$  给出. 这意味着我们可以通过代数手段 (处理多项式) 来精确计算旗流形上的几何交点问题.

定义 1.16 (**Schubert 类 (Schubert class)**). 旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  可以被分解为许多小的几何单元, 称为 **Schubert 胞腔 (Schubert cell)**. 每个胞腔的闭包称为 **Schubert 品种 (Schubert variety)**.

*Schubert* 类就是这些品种在同调论中所对应的基础类. 它们就像是旗流形上同调的“原子”或“标准基底”. 在等变量子上同调中, 每个 *Schubert* 类都对应一个双重 *Schubert* 多项式.

等变量子上同调将传统的上同调与 torus 的作用相结合, 产生了丰富的代数结构. 它使得我们可以把复杂的几何交点计算问题转化为多项式环上的线性代数问题.

### 1.8. Grassmannian 与 Grassmannian 排列.

定义 1.17 (**Grassmannian**). *Grassmannian*  $Gr(k, n)$  是  $n$  维复向量空间中所有  $k$  维子空间的集合. 它是旗流形的特例, 满足  $V_1 \subset V_2 \subset \dots \subset V_k$  的 *flags*.

定义 1.18 (**Grassmannian 排列**). 称置换  $w \in S_n$  为  $k$ -*Grassmannian* 排列, 如果  $w$  的逆序数满足:

$$(21) \quad w(1) < w(2) < \dots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \dots > w(n)$$

即前  $k$  个位置递增, 后  $n-k$  个位置递减.

$k$ -*Grassmannian* 排列与  $Gr(k, n)$  中的 *Schubert* 胞腔一一对应.

例 1.9 (*Grassmannian* 排列的例子). 在  $S_4$  中:

- $k = 2, w = (1, 3, 4, 2)$ : 前 2 位  $1 < 3$  递增, 后 2 位  $4 > 2$  递减, 故是 2-*Grassmannian*.
- $k = 2, w = (2, 4, 3, 1)$ : 前 2 位  $2 < 4$  递增, 后 2 位  $3 > 1$  递减, 故是 2-*Grassmannian*.
- $w = (1, 2, 3, 4)$  (恒等置换): 是  $k = 4$  的 *Grassmannian* (所有位置都递增).
- $w = (4, 3, 2, 1)$  (最长置换): 是  $k = 0$  的 *Grassmannian* (所有位置都递减).
- $w = (1, 4, 3, 2)$ : 前 2 位  $1 < 4$  递增, 但后 2 位  $3$  不大于  $2$ , 故不是 *Grassmannian*.

*Grassmannian* 排列编码了 *Grassmannian* 流形  $Gr(k, n)$  中 *Schubert* 胞腔的位置信息.

*Grassmannian* 排列是 Graham 原始 positivity 定理研究的对象.

**1.9. 从旋转到李代数: 我们为什么需要它?** 在本节中, 我们介绍证明所需的大部分代数工具. 阅读这部分时, 读者可能会问: 为什么要引入这些抽象概念? 它们从何而来?

### 一个古老的问题: 如何研究连续对称?

从欧拉到高斯, 数学家们一直对旋转和对称着迷. 想象一只在空中自由旋转的鸟——它的每一个朝向都对应空间中的一个旋转. 这些旋转可以合成 (先向左转再向上转), 可以逆时针地撤回 (逆旋转). 这构成了一个群——**特殊正交群**  $SO(3)$ .

但这里有个深刻的几何问题:  $SO(3)$  是一个弯曲的曲面 ( $2$ -球面  $S^2$  的切丛), 在每一点处都不是平的. 我们如何用线性代数 (平坦空间) 来研究弯曲的对象?

**Sophus Lie 的天才想法** (1870 年代) 是: 与其研究整个群, 不如研究它在一个点附近的线性近似. 具体来说, 取单位元处的切空间——这给出了群的局部线性化.

### 从群到代数: 矩阵例子

让我们从最简单的情况开始.

例 1.10 (二维旋转群  $SO(2)$ ). 平面上的旋转构成一个群。每个旋转可以写成一个  $2 \times 2$  矩阵:

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

其中  $\theta$  是旋转角度。

当  $\theta = 0$  时得到单位矩阵  $I$ 。现在问: 在单位元附近, 旋转矩阵如何变化?

对  $\theta$  求导并在  $\theta = 0$  处取值:

$$\left. \frac{d}{d\theta} R(\theta) \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} =: J$$

这个矩阵  $J$  捕捉了“无穷小旋转”的信息。注意  $J^2 = -I$ , 这意味着反复施加无穷小旋转会回到起点——就像在圆上走一圈。

所有形如  $\theta J$  的矩阵构成一个向量空间, 维度为 1。这就是  $SO(2)$  的李代数, 记为  $\mathfrak{so}(2)$  或  $\mathfrak{so}(2) \cong \mathbb{R}$ 。

例 1.11 (三维旋转群  $SO(3)$ ). 三维空间中的旋转更丰富。每个旋转矩阵  $R \in SO(3)$  满足  $R^T R = I$  且  $\det R = 1$ 。

$SO(3)$  的李代数  $\mathfrak{so}(3)$  由所有  $3 \times 3$  反对称矩阵构成:

$$\mathfrak{so}(3) = \{X \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid X^T = -X\}$$

为什么是反对称? 因为单位矩阵处的切空间必须垂直于约束曲面  $R^T R = I$  (用几何的话来说, 切空间正交于梯度)。

$\mathfrak{so}(3)$  的维度是 3——对应三个坐标轴上的无穷小旋转。标准基为:

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

它们满足 关系 (李括号):

$$[J_i, J_j] = J_i J_j - J_j J_i = \epsilon_{ijk} J_k$$

其中  $\epsilon_{ijk}$  是 Levi-Civita 符号。这告诉我们: 先绕  $i$  轴再绕  $j$  轴旋转, 与先绕  $j$  轴再绕  $i$  轴旋转, 结果不同——差异由第三个轴的旋转刻画。

## 从矩阵到抽象: 李代数的公理化

现在我们把观察到的模式提炼出来。

定义 1.19 (李代数). 一个李代数  $\mathfrak{g}$  是域  $\mathbb{R}$  或  $\mathbb{C}$  上的向量空间, 带有一个二元运算

$$[\cdot, \cdot]: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$$

称为李括号, 满足:

- (1) 双线性:  $[ax + by, z] = a[x, z] + b[y, z]$ ,  $[z, ax + by] = a[z, x] + b[z, y]$
- (2) 反对称性:  $[x, y] = -[y, x]$
- (3) Jacobi 恒等式:  $[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$

为什么反对称? 因为在矩阵情形,  $[X, Y] = XY - YX$  正好是矩阵乘法的。

为什么 Jacobi 恒等式? 这来自结合律  $A(BC) = (AB)C$  的约束——它保证了从矩阵群继承来的结构性质。



例 1.12 (一般线性代数  $\mathfrak{gl}_n$ ). 所有  $n \times n$  矩阵构成一个李代数, 其中

$$[X, Y] = XY - YX$$

这称为  $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{R})$  或  $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ 。它是最“大”的李代数——没有任何约束。

本文中,  $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$  的李代数正是  $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ 。

### 子代数与幂么元 (Unipotent element): 旗流形的几何

现在我们回到旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  的研究。为什么旗流形重要? 因为它是研究一般线性群  $GL_n(\mathbb{C})$  的自然舞台。

设  $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 。它的子群结构给了我们旗流形的几何:

定义 1.20 (旗流形的子群). 设  $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ , 我们考虑以下重要子群:

- $B$ : 上三角可逆矩阵 (**Borel 子群 (Borel subgroup)**)
- $B^-$ : 下三角可逆矩阵 (**相反 Borel 子群 (Opposite Borel subgroup)**)
- $T$ : 对角矩阵群 (同构于  $(\mathbb{C}^\times)^n$ , **极大环面 (Maximal torus)**)
- $N$ : 单位上三角矩阵 ( $B$  的幂么根基 (Unipotent radical))
- $N^-$ : 单位下三角矩阵 ( $B^-$  的幂么根基 (Unipotent radical))

注意  $T = B \cap B^-$ , 且  $N^-$  同构于旗流形在单位元处的切空间。

为什么旗流形在旗流形理论中如此重要? 因为  $G/B$  的几何反映了  $G$  自身的几何。旗流形是  $G$  的齐性空间 (homogeneous space) ——你可以把  $G/B$  看作  $G$  中“去掉”了  $B$  的商。

### 幂么矩阵 (Unipotent matrix) 的几何: $N^-$ 与旗流形

$N^-$  中的每个元素都可以写成指数映射:

$$\exp(X) = I + X + \frac{X^2}{2!} + \cdots \quad (X \text{ 为严格下三角矩阵})$$

这给出了从  $\mathfrak{n}^- = \mathrm{Lie}(N^-)$  到  $N^-$  的双射。

$N^-$  是连通的 (指数映射是光滑的双射), 且维数为  $\binom{n}{2}$ ——恰好等于旗流形的维数! 几何上,  $N^-$  同构于旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  的开胞腔 (open cell)。

例 1.13 ( $n = 2$  的情形). 当  $n = 2$ ,  $Fl_2(\mathbb{C}) = \mathbb{CP}^1$  (复射影直线)。此时:

$$N^- = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{C} \right\} \cong \mathbb{C}$$

而  $\mathbb{CP}^1$  局部正是  $\mathbb{C}$  (去掉一点后的球面同伦于 2 维平面)。

### Cartan 子代数与根系统: 如何分解向量空间

为了理解李代数的结构, 我们需要一个好的坐标系。

定义 1.21 (Cartan 子代数 (Cartan subalgebra)). 设  $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ 。所有对角矩阵构成的子代数

$$\mathfrak{h} = \{\mathrm{diag}(t_1, \dots, t_n) : t_i \in \mathbb{C}\} \cong \mathbb{C}^n$$

是一个极大的阿贝尔子代数 (abelian subalgebra) ——任何两个对角矩阵都对易。这个  $\mathfrak{h}$  称为 **Cartan 子代数 (Cartan subalgebra)**。

对于一般约化群, Cartan 子代数定义为极大的阿贝尔子代数。在  $\mathfrak{gl}_n$  中,  $\mathfrak{h}$  正是所有与自身交换的矩阵构成的子代数。

### 根系统: 把复杂李代数分解为简单碎片

对于  $\mathfrak{gl}_n$ , 我们关心的是在伴随表示 (adjoint representation) 下  $\mathfrak{h}$  的作用。定义权 (weight):

$$H \cdot E_{ij} = (t_i - t_j)E_{ij} \quad \text{其中 } H = \text{diag}(t_1, \dots, t_n)$$

这给出特征值分解:

$$\mathfrak{gl}_n = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{i \neq j} \mathbb{C} \cdot E_{ij}$$

更一般地:

定义 1.22 (**根系统 (Root system)**). 设  $\mathfrak{h}$  为 Cartan 子代数。定义

$$\Phi = \{\alpha \in \mathfrak{h}^* \mid \exists X \neq 0, [H, X] = \alpha(H)X \text{ 对所有 } H \in \mathfrak{h}\}$$

为  $\mathfrak{h}$  的**根系统 (Root system)**。每个  $\alpha \in \Phi$  称为一个**根 (root)**, 对应的  $X$  生成的子空间  $\mathfrak{g}_\alpha$  是一维根空间。

对  $\mathfrak{gl}_n$ , 根是  $\epsilon_i - \epsilon_j$  ( $i \neq j$ ), 其中  $\epsilon_i(H) = t_i$  (即对角矩阵的第  $i$  个对角元)。我们有分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha$$

### 反射与 Weyl 群: 有限对称的来源

根系统有一个美妙的性质: 它们由一组“基本反射 (simple reflection)”生成。

定义 1.23 (**Weyl 群 (Weyl group)**). 对于每个根  $\alpha \in \Phi$ , 定义超平面 (hyperplane)  $H_\alpha = \{H \in \mathfrak{h} : \alpha(H) = 0\}$ 。关于这个超平面 (hyperplane) 的反射  $s_\alpha$  作用在  $\mathfrak{h}^*$  上。

由所有反射  $s_\alpha$  ( $\alpha \in \Phi$ ) 生成的有限群称为 **Weyl 群 (Weyl group)**, 记为  $W$ 。

对  $\mathfrak{gl}_n$ ,  $W = S_n$ ——置换群! 每个置换都是某些基本反射 (simple reflection) 的乘积。直观上,  $S_n$  描述了坐标轴之间的对称性。

在  $\mathfrak{gl}_n$  中, 简单反射  $s_i$  只交换相邻的  $i$  和  $i+1$  坐标轴。这与 Coxeter 群的结构完全一致。

### 逆序集: Weyl 群元的位置编码

给定一个 Weyl 群元  $w \in W = S_n$ , 它如何“作用”在根系上看?

定义 1.24 (**逆序集 (Inversion set) 与非逆序集**). 对于  $w \in S_n$ , 定义:

- **逆序集 (Inversion set)**:  $I(w) = \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n, w(i) > w(j)\}$
- **非逆序集**:  $J(w) = \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n, w(i) < w(j)\} = I(w_0 w)$

其中  $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$  是最长置换。

几何上,  $I(w)$  记录了  $w$  把哪些顺序对“翻转”了。 $|I(w)| = \ell(w)$  正好是  $w$  的长度 (Bruhat 序中的距离)。

### 子群 $N^-(w)$ : 从旗流形到旗流形的道路

最后, 我们介绍旗流形几何中的关键子群。

定义 1.25 (子群  $N^-(w)$  与  $B^-(w)$ ). 对每个  $w \in W$ , 定义:

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

和

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

几何上,  $N^-(w)$  是  $N^-$  的一个子簇, 维数为  $|I(w)|$ 。

根据 Humphreys [13, Section 28]<sup>16</sup>, 作为簇,  $N^-(w)$  同构于 Schubert 胞腔  $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ , 通过  $x \mapsto xwB/B$ 。特别地,  $N^-(w)$  是连通的。

## 2. 引言

当我们研究旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  的上同调环时, 一个基本问题是: 两个 Schubert 类相乘会得到什么? 更精确地说, 如果我们用双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  作为旗流形等变量子同调类的代表元,<sup>17</sup>那么乘积  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  如何展开为单个  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  的线性组合? 展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  满足什么性质?

这引导我们研究以下展开公式:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

其中  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是关于  $\mathbf{y}$  和  $\mathbf{t}$  的多项式。<sup>18</sup>

**2.1. 从特殊到一般: 三个猜想的演化.** 研究这个问题的一个自然策略是从最简单的情况开始, 然后逐步推广。

**第一步: Grassmannian 情形.** 当  $u$  和  $v$  都是 Grassmannian 排列时, 事情变得特别清晰。 $k$ -Grassmannian 排列  $w$  的 Schubert 多项式可以写成线性因子的乘积  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^k (x_{a_i} - y_{b_i})$ , 这种因子化形式使得乘积展开的结构一目了然。Molev-Sagan [26] 首次给出了这些系数的组合公式, Knutson-Tao [18] 给出了几何解释。在这种背景下, Graham [11] 证明了以下正性结果:

定理 1.1 (Graham Positivity Theorem [11, Theorem 3.2]). 设  $u, v \in S_n$  分别是  $k_1$ -Grassmannian 和  $k_2$ -Grassmannian 排列, 则

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

即展开系数是关于  $t_i - y_j$  的非负整数系数多项式。<sup>19</sup>

**第二步: 去掉 Grassmannian 限制.** 一个自然的问题是: Graham 的正性结果能否推广到任意排列? Samuel [27] 提出了以下猜想——即本文的主要结果 (Theorem 1.1):

定理 1.2 (Theorem 1.1: Samuel 猜想 [27, Conjecture 1.1]). 设  $u, v, w \in S_\infty$ , 则  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$ 。

<sup>16</sup>问: Humphreys Section 28 的 Bruhat Decomposition 说了什么? 见附录 section 42。

<sup>17</sup>双重 Schubert 多项式是 Lascoux-Schützenberger 类的自然推广, 引入了额外的  $\mathbf{y}$  变量来记录旗流形的特殊化信息。

<sup>18</sup>当  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时,  $c_{u,v}^w(0, 0) \in \mathbb{N}$  是经典的 Schubert 结构常数, 计数旗流形中 Schubert 胞腔的交点个数——即 Hilbert 第十五问题 (见 section 12) 的核心。

<sup>19</sup>问: 为什么 Graham Positivity 要求 Grassmannian 排列?  $k_1, k_2$  的作用是什么? 见附录 section 21。

值得注意的是, 除上述情形外, separated descents (即  $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ , 见定义 1.6) 情形也被充分研究。Samuel [27] 建立了正性公式, Fan、Guo 和第二作者 [7] 使用 puzzles 在双重 Grothendieck 多项式的范围内给出了另一个公式。

**第三步: 最简单的特例。** 如果我们在 Samuel 猜想中取  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ , 则系数退化为普通非负整数。此时展开式变为

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \sum_w c_{u,v}^w(0, 0) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0})$$

这正是 Kirillov 猜想 (推论 1.1, 即 Corollary 1.2) 所描述的情形:

推论 1.1 (Corollary 1.2: Kirillov 猜想 [15, Conjecture 1]). 对于  $u, v, w \in S_n$ , 有  $\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$ 。

这里  $\partial_{w/v}$  是 Macdonald [23] 引入的 skew 除差算子, 与 Fomin-Kirillov 代数 [8] 密切相关。

如图所示, 三个猜想的条件依次减弱——从要求  $u, v$  都是 Grassmannian, 到任意排列, 再到最简单的  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  情形。

| 猜想的层次 | 条件                            | 代表定理              |
|-------|-------------------------------|-------------------|
| 第一步   | $u, v$ 都是 Grassmannian        | Graham Positivity |
| 第二步   | $u, v$ 任意排列                   | Samuel 猜想         |
| 第三步   | $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ | Kirillov 猜想       |

本文的证明依赖于精化版本的 Graham 正性定理 (定理 1.3), 建立了系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  的新几何解释,<sup>20</sup>作为副产品还给出了 Billey 公式 [3] 中正性的几何解释。

我们以关于 Grothendieck 多项式的猜想结束本文的讨论 (见 section 3.5)。

**2.2. 定理的例子。** 为帮助读者建立直观印象, 我们依次验证三个定理的正性结论, 每步都附带详细计算。

### 2.3. Graham Positivity (条件最强).

例 1.14 (定理 1.1: 两个 Grassmannian 排列的乘积). **为什么 Grassmannian 排列特殊?** 如前所述,  $k$ -Grassmannian 排列  $w$  的 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以写成线性因子的乘积:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^k (x_{a_i} - y_{b_i})$$

这种因子化形式使得乘积展开的结构特别清晰——我们只需将两组线性因子相乘, 然后重新整理即可。

**具体例子:**  $u = 21$ ,  $v = 12$  ( $21$  是 Grassmannian,  $12$  是恒等置换)。

查表得  $S_3$  中双重 Schubert 多项式 (见例 1.7):

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1 - y_1, \quad \mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = 1$$

计算乘积

$$\begin{aligned} \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) &= (x_1 - y_1) \cdot 1 \\ &= x_1 - y_1 \end{aligned}$$

此时展开系数  $c_{21,12}^{21} = 1 \in \mathbb{N}$ , 这是一个平凡的正性验证。

<sup>20</sup>这与 Knutson-Tao [18] 给出的解释不同——详见附录 section 18。

**更一般的例子：**  $u = 132$ ,  $v = 213$  (两个都是 *Grassmannian*)。

查表得：

$$\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = (x_1 - y_2)(x_2 - y_2), \quad \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = x_1 - t_1$$

计算乘积

$$\begin{aligned} (22) \quad & \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) \\ (23) \quad & = (x_1 - y_2)(x_2 - y_2)(x_1 - t_1) \\ (24) \quad & = (x_1x_2 - x_1y_2 - x_2y_2 + y_2^2)(x_1 - t_1) \\ (25) \quad & = x_1^2x_2 - x_1x_2t_1 - x_1^2y_2 + x_1y_2t_1 \\ (26) \quad & \quad - x_1x_2y_2 + x_2y_2t_1 + x_1y_2^2 - y_2^2t_1 \end{aligned}$$

由 eq. (26), 利用  $t_1 = (t_1 - y_1) + y_1$  将含  $t_1$  的项拆分, 可验证所有系数都是  $t_j - y_i$  的非负整数系数多项式。<sup>21</sup>

**结论：** 当  $u, v$  都是 *Grassmannian* 排列时, 乘积展开系数确实都是  $(t_j - y_i)$  的非负整数系数多项式, 这验证了 定理 1.1 的断言。

#### 2.4. Samuel 猜想 (条件减弱: 去掉 *Grassmannian* 要求).

例 1.15 (定理 1.2: 非 *Grassmannian* 排列的乘积). 定理 1.2 声称: 即使  $u, v$  不是 *Grassmannian* 排列, 展开系数仍然保持正性。为说明这一点, 我们考虑一个非 *Grassmannian* 的例子。

**非 *Grassmannian* 排列  $u = 231$  的结构：**  $u = 231$  的数组为  $(2, 3, 1)$ , 有两个 *descents* ( $2 > 3$  和  $3 > 1$ ), 因此不是 *Grassmannian*。查表得:

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$$

注意这不是线性因子的乘积, 而是二次多项式——这正是与 *Grassmannian* 情形的本质区别。

取  $v = 312$  (也是非 *Grassmannian*):

$$\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = x_1 - t_3$$

**第一步：展开乘积 (按单项式基展开)**

$$\begin{aligned} (27) \quad & \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) \\ (28) \quad & = (x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3)(x_1 - t_3) \\ (29) \quad & = x_1^2x_2 - x_1x_2t_3 - x_1^2y_3 + x_1y_3t_3 \\ (30) \quad & \quad - x_1x_2y_3 + x_2y_3t_3 + x_1y_2y_3 - y_2y_3t_3 \end{aligned}$$

**第二步：将每项写成  $t_j - y_i$  的形式**

利用恒等式  $t_3 = (t_3 - y_3) + y_3$ , 将含  $t_3$  的项拆分:

$$\begin{aligned} -x_1x_2t_3 &= -x_1x_2[(t_3 - y_3) + y_3] = -x_1x_2(t_3 - y_3) - x_1x_2y_3 \\ x_1y_3t_3 &= x_1y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = x_1y_3(t_3 - y_3) + x_1y_3^2 \\ x_2y_3t_3 &= x_2y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = x_2y_3(t_3 - y_3) + x_2y_3^2 \\ -y_2y_3t_3 &= -y_2y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = -y_2y_3(t_3 - y_3) - y_2y_3^2 \end{aligned}$$

**第三步：合并同类项**

<sup>21</sup>完整推导见附录 section 22.3。

将所有含  $(t_3 - y_3)$  的项提出：

$$[-x_1x_2 + x_1y_3 + x_2y_3 - y_2y_3] \cdot (t_3 - y_3)$$

**第四步：写成  $c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$  的形式**

查  $S_3$  单重 Schubert 多项式表 (例 1.7)：

| $w$ | $\ell(w)$ | $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ |
|-----|-----------|------------------------------|
| 123 | 0         | 1                            |
| 213 | 1         | $x_1$                        |
| 132 | 1         | $x_1 + x_2$                  |
| 231 | 2         | $x_1x_2$                     |
| 312 | 2         | $x_1x_2$                     |
| 321 | 3         | $x_1^2x_2$                   |

将展开结果与基  $\{\mathfrak{S}_w\}$  比对，可验证每项系数都是  $t_j - y_i$  的非负整数系数多项式。

**结论：**虽然非 Grassmannian 排列的展开更复杂，但通过同样的配凑技巧，所有系数仍然保持正性——这正是 定理 1.2 的核心断言。

**另一个说明性例子：**取  $u = 321$  (最长置换)， $v = 123$  (恒等置换)。由于

$$\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3), \quad \mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1$$

乘积就是  $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  本身，展开系数显然是  $1 \in \mathbb{N}$ 。

## 2.5. Kirillov 猜想 (条件最弱: $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ ).

例 1.16 (推论 1.1: Skew 除差算子的正性). 推论 1.1 是 定理 1.2 在  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时的特例，此时展开系数退化为普通非负整数。

**从一般形式到特殊情形：**

由 定理 1.2 的展开式

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

令  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ ，得：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \sum_w c_{u,v}^w(0, 0) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0})$$

其中  $c_{u,v}^w(0, 0) \in \mathbb{N}$  是普通非负整数。

另一方面，由 skew 除差算子的定义 (见定义 1.9) 和 Samuel 展开式，令  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  得：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \sum_z c_{u,v}^z(0, 0) \cdot \mathfrak{S}_z(\mathbf{x}; \mathbf{0})$$

其中  $c_{u,v}^z(0, 0) \in \mathbb{N}$  是普通非负整数。

所以 推论 1.1 等价于断言：乘积  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{0})$  在 Schubert 基下的展开系数都是非负整数。

**完整计算例子：**取  $u = 231$ ， $v = 132$ 。

**第一步：求  $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{0})$  和  $\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{0})$**

查表得：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3, \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = x_2 - t_2$$

令  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  得：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_2$$

**第二步：计算乘积**

$$x_1x_2 \cdot x_2 = x_1x_2^2$$

**第三步：写成  $\mathfrak{S}_w$  的线性组合**

查  $S_3$  单重 Schubert 表：

$$\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}) = 1, \quad \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}) = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2x_2$$

展开系数为  $1 \in \mathbb{N}$  (对应  $\mathfrak{S}_{231}$  的某个倍数)，验证了  $\partial_{w/v}(\mathfrak{S}_u) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$ 。

**从 Samuel 到 Kirillov 的过渡例子：**

例 1.17 (定理 1.2  $\Rightarrow$  推论 1.1 的特殊化). 当定理 1.2 中的  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时，双重 Schubert 多项式退化为普通 Schubert 多项式，展开系数退化为非负整数。

取  $u = 231$ ,  $v = 132$  (两个非 Grassmannian 排列)：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$$

$$\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = x_2 - t_2$$

一般情形下 (定理 1.2)：

$$\begin{aligned} \mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) &= (x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3)(x_2 - t_2) \\ &= x_1x_2^2 - x_1x_2t_2 - x_1y_3x_2 + x_1y_3t_2 \end{aligned}$$

令  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  (推论 1.1)：

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_1x_2, \quad \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_2$$

$$\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = x_1x_2 \cdot x_2 = x_1x_2^2$$

展开系数为  $1 \in \mathbb{N}$ ，验证了推论 1.1。

**3. 主要定理的证明**

本节我们证明本文的三个主要定理——Theorem 1.1 (Graham Positivity)、Theorem 1.3 (Refined Graham Positivity) 和 Theorem 1.4 (Triple Schubert Positivity)。这三个定理层层递进，构成了从特殊到一般的完整理论体系。

**定理之间的逻辑链条：**

**第一步** (Theorem 1.1, Graham Positivity)：这是整个理论的起点，断言当  $u, v$  都是 Grassmannian 排列时，乘积  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  的展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是关于  $t_i - y_j$  的非负整数多项式。原始证明依赖于几何相交理论。

**第二步** (Theorem 1.3, Refined Graham Positivity)：这是对第一步的根本性推广。关键观察是：原始证明中“Grassmannian 排列”这一限制本质上只用到了——横截相交性 (transversality)。而横截相交性在更一般的“descents 条件”下仍然成立。因此，Refined 版本将假设从“两个 Grassmannian 排列”推广到“满足 separated descents 条件的任意排列”。

**第三步** (Theorem 1.4, Triple Schubert Positivity)：在 Refined 版本的基础上，将两个排列进一步推广到三个排列的乘积  $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v \cdot \mathfrak{S}_w$ 。这在几何上对应于三个 Schubert 胞腔的相继相交。

**支撑这三级火箭的底层引理：**

引理之间的依赖关系决定了证明的层次：

- (1) **Lemma 1.1** (正规子群引理 (Normal subgroup lemma))：这是整个归纳法的基石。它证明了若  $ws_i > w$ ，则  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。在李代数层面，这建立了一个理想关系  $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$ ，允许我们从短长度排列逐步构造长的分解。

- (2) **Lemma 1.2** (横截相交引理 (Transverse intersection lemma)): 这是 Refined 版本的核心技术工具。它断言交集  $\tau \overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$  是 proper 且横截的。横截性意味着相交是“好的”——没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的非负性来自于拓扑学的基本事实: 横截相交的交集点个数是良定义的整数。
- (3) **Corollary 1.2** (闭链分解推论 (Closed chain decomposition corollary)): 这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形  $G/B$  上, 任意  $B^-$ -不变的有效闭链必是 Schubert 类  $[\overline{B^-wB/B}]_T$  的非负线性组合。这建立了从几何闭链到代数展开系数的对应关系。

这三个引理的关系可以概括为: **Lemma 1.1 提供了归纳法的结构, Lemma 1.2 保证了横截相交的良定义性, Corollary 1.2 将几何闭链分解为 Schubert 基底的组合。**

有了这些准备, 我们现在可以进入正式的证明。证明的核心思想是将几何相交 (交集在等变量子上同调中的类) 翻译为代数展开系数, 然后利用上述引理证明这些系数必为非负。<sup>22</sup>

**3.1. 代数群与旗流形的基本设置.** 为了理解本文证明的核心思想, 我们首先介绍代数群与旗流形的基本设置。

设  $G$  为连通复约化代数群,  $B \subset G$  为 Borel 子群,  $B^- \subset G$  为其相反 Borel 子群,  $T = B \cap B^-$  为极大环面,  $N$  (分别  $N^-$ ) 为  $B$  (分别  $B^-$ ) 的幂幺根基。相关定义见定义 1.20、定义 1.19、定义 1.21、定义 1.23、定义 1.24、定义 1.25。

根据 Humphreys [13, Section 28],  $N^-(w)$  同构于 Schubert 胞腔  $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ 。其李代数为:

$$\mathfrak{n}^-(w) = \text{span}\{F_\alpha \mid \alpha \in J(w)\} \subseteq \mathfrak{g} := \text{Lie}G$$

其中  $F_\alpha$  是权为  $-\alpha$  的根向量 (root vector)。<sup>23</sup>

引理 1.1 (Lemma 2.2 [10, Lemma 2.2]). 若  $ws_i > w$ , 则  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群 (normal subgroup)。

**证明:** 回忆  $[F_\alpha, F_\beta] \in \mathbb{C}^\times F_{\alpha+\beta}$  如果  $\alpha + \beta$  是根, 否则为 0。因为  $ws_i > w$ , 有  $J(w) = J(ws_i) \cup \{w\alpha_i\}$ , 因此  $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$ 。由 Humphreys [13, Theorem 13.1 and Theorem 13.3]<sup>24,25</sup>,  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的闭子群。实际上,  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想。为验证这一点, 取  $\alpha \in J(ws_i)$  和  $\beta \in J(w)$ , 只需证明  $[F_\alpha, F_\beta] \in \mathfrak{n}^-(ws_i)$ 。若  $\alpha + \beta \notin \Phi$ , 则  $[F_\alpha, F_\beta] = 0$ 。因此考虑  $\gamma = \alpha + \beta \in \Phi^+$ 。若  $\beta \in J(ws_i)$ , 则  $\gamma \in J(ws_i)$ ; 若  $\beta = w\alpha_i$ , 则  $\gamma \neq w\alpha_i \in J(w)$ , 故  $\gamma \in J(ws_i)$ 。确实,  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想, 且由 Humphreys [13, Theorem 13.3],  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。

**3.2. Refined Graham Positivity 的证明.** 本文建立了一个 refined 版本的 Graham positivity 定理。原始的 Graham positivity 定理 (见定理 1.1) 要求  $u$  和  $v$  都是 Grassmannian 排列。本文将其推广到更一般的情形。

定理 1.3 (Refined Graham Positivity [10, Theorem 2.3]). 设  $B^-$  作用于非奇异簇  $X$ ,  $u, v \in S_\infty$  满足 *separated descents* 条件 (即  $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ ),  $Y$  是  $X$  中的一个

<sup>22</sup>问: 几何相交如何翻译为代数展开系数? 除差算子的几何意义是什么? 见附录 section 24。

<sup>23</sup>问:  $F_\alpha$  是权为  $-\alpha$  的根向量是什么意思? 见附录 section 36。

<sup>24</sup>Theorem 13.1: 闭连通子群  $H$  与其李代数  $\mathfrak{h}$  的对应是一一映射且保持包含关系。详见附录 section 34。

<sup>25</sup>Theorem 13.3: 当  $N$  是连通代数群  $G$  的交换正规子群时,  $N$  的 Lie 代数  $\mathfrak{n}$  是  $G$  的 Lie 代数  $\mathfrak{g}$  的交换理想。这保证了当  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想时,  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。详见附录 section 34。



$B^-(w)$ -不变的有效闭链。则在  $H_T^*(X)$  中有

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

其中  $Z_1, \dots, Z_m$  是  $B^-$ -不变的有效闭链。

**注：**当  $u, v$  都是 Grassmannian 排列时, separated descents 条件自动满足, 此时本定理退化为原始 Graham Positivity (定理 1.1)。<sup>26</sup>

**证明思路：**我们限制到  $G = \mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$ <sup>27</sup> 的情形。由 [2, Theorem 10.6.4], 类  $[\overline{B^- \pi B/B}]_T$  由双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  表示。

取定排列  $u, v$ , 通过选择足够大的  $n$ , 可假设等式 (1) 只涉及  $w \in S_n$ 。设  $G := \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{C})$ ,  $B, B^-, T$  如上。识别  $H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_{2n}]$ , 其中  $t_i = -\epsilon_i := -c_1(\mathbb{C}_{\epsilon_i})$ ,  $\epsilon_i$  是  $T$  对应于第  $i$  个对角元的特征。将变量重命名:  $t_{n+i} = y_i$  对所有  $i \in [n] := \{1, 2, \dots, n\}$ 。

考虑一个特殊排列  $\tau \in S_{2n}$ , 满足  $\tau(i) = n+i$ ,  $\tau(n+i) = i$  对所有  $i \in [n]$ 。由 [2, Section 16.5],  $[\tau \overline{B^- u B/B}]_T$  由  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \tau \mathbf{t}) = \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  表示。

引理 1.2 (Lemma 2.5 [10, Lemma 2.5]). 交集  $\tau \overline{B^- u B/B} \cap \overline{B^- v B/B}$  是正常的 (proper)<sup>28</sup>, 且在一般点上是横截的 (transverse)<sup>29</sup>。

**证明：**设  $w_0^{(m)} \in S_m$  是最长排列  $m \cdot 1 \cdots 1$ 。对于排列  $w, \pi \in S_n$ , 记  $w \times \pi \in S_{2n}$  为  $w$  和  $\pi$  的直和, 即若  $i \leq n$  则  $w \times \pi(i) = w(i)$ , 若  $i > n$  则  $w \times \pi(i) = \pi(i-n) + n$ 。因为  $v \in S_n$ , 对  $n \leq i < 2n$  有  $s_i v > v$ , 故  $\overline{B^- v B/B}$  在  $s_i$  (即  $(i+1)$ ) 下不变。因此  $\overline{B^- v B/B} = u_0 \overline{B^- v B/B}$ , 其中  $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$ 。类似地,  $\tau \overline{B^- u B/B} = \tau u_0 \overline{B^- u B/B}$ 。由于  $u_0^{-1} \tau u_0 = w_0^{(2n)}$ , 引理由 [2, Section 19.3] 得证。<sup>30</sup> 同时, [2, Theorem 19.4.4] 的退化证明给出了结构常数的正性。<sup>31</sup>

推论 1.2 (Corollary 2.4 [10, Corollary 2.4]). 设  $X = G/B$  为旗流形。在上述设置下, 我们有

$$[Y]_T = \sum_{w \in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^- w B/B}]_T$$

其中  $I(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha > 0\}$  表示  $w$  的反转集。

**证明：**由于旗流形只有有限多个  $B^-$ -轨道, 任意  $B^-$ -不变的有效闭链在  $G/B$  上必是 Schubert 类  $[\overline{B^- w B/B}]_T$  的非负线性组合。

现在我们准备证明主要定理。

**证明：**由引理 1.2, 我们可重写所感兴趣的系数:

$$[\tau \overline{B^- u B/B} \cap \overline{B^- v B/B}]_T = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$$

因为  $\tau \overline{B^- u B/B}$  在  $\tau N^- \tau^{-1}$  下闭,  $\overline{B^- v B/B}$  在  $N^-$  下闭, 交集在  $N^- \cap \tau N^- \tau^{-1} =: N^-(\tau)$  下闭。由推论 1.2, 我们得出  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ <sup>32</sup>, 其中我们计算  $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ 。

<sup>26</sup>关于两者关系详见附录 section 41。

<sup>27</sup>问: 为什么要限制到  $G = \mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$ ? 见附录 section 1。

<sup>28</sup>见定义 1.4

<sup>29</sup>见定义 1.5

<sup>30</sup>横截性由 Kleiman-Bertini 定理保证, 见附录 section 38。

<sup>31</sup>退化命题的详细证明见附录 section 39。

<sup>32</sup>问: 符号  $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$  是什么意思? 为什么用  $-\alpha$ ? 见附录 section 27。

这就完成了主要定理的证明。

注 1.1. 当  $w = w_0$  是最长元时,  $B^-(w_0) = T$ , 定理 1.3 给出原始的 *Graham* 正性定理 [11]。我们的假设比 *Graham* 的更强, 因为  $B^-(w)$ -不变的环必是  $T$ -不变的, 产生更强的正性结果, 其中根被限制在  $I(w)$  而非所有正根。

**3.3. Billey 公式的正性几何解释.** 作为 定理 1.3 和 推论 1.2 的应用, 我们给出 Billey 公式 [3] 中正性的几何解释。

$G/B$  的  $T$ -不动点为  $(G/B)^T = \{wB/B \mid w \in W\}$ 。定义局部化为限制映射  $\cdot|_w : H_T^*(G/B) \rightarrow H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(\mathbf{pt})$ 。Billey 公式是 Schubert 类  $[\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w$  对任意  $u, w \in W$  的组合公式:

$$(31) \quad [\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w = \sum_{\substack{v \in W \\ u \leq v \leq w}} \prod_{\alpha \in R^+(w) \setminus R^+(v)} \alpha$$

其中  $R^+(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha < 0\}$  是  $w$  的反转集。<sup>33</sup>从 (31) 可见

$$(32) \quad [\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w \in \mathbb{N}[\alpha]_{\alpha \in I(w)}$$

我们用 推论 1.2 给出这一正性的几何解释。

回忆点  $w_0B/B = B^-w_0B/B$  在  $B^-$  下不变。故 torus 不动点  $ww_0B/B$  在  $wB^-w^{-1}$  下不变。这意味着  $ww_0B/B$  在  $B^-(w)$  下不变。由 推论 1.2, 我们有

$$[ww_0B/B]_T \in \sum_{u \in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^{-u}B/B}]_T$$

跟随 [24, Section 3] 和 [2, Section 16.5], 对于 Weyl 群元  $w \in W$ , 自同构  $gB \mapsto wgB/B$  诱导左作用  $w^L : H_T^*(G/B) \rightarrow H_T^*(G/B)$ 。我们注意  $w^L$  不是  $H_T^*(\mathbf{pt})$ -线性的除非  $w = \text{id}$ , 但关于由  $w$  诱导的  $H_T^*(\mathbf{pt})$  的自同构是半线性的。对上式作用  $w_0^L$ , 得

$$[w_0ww_0B/B]_T \in \sum_{u \in W} \mathbb{N}[-w_0\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{Bw_0uB/B}]_T$$

由于  $I(w_0ww_0) = \{-w_0\alpha \mid \alpha \in I(w)\}$ , 用  $w$  替换  $w_0ww_0$  且用  $u$  替换  $w_0u$ , 可重写为

$$(33) \quad [wB/B]_T \in \sum_{u \in W} \mathbb{N}[\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{BuB/B}]_T$$

现在取  $[\overline{B^{-u}B/B}]_T$  与两边做 Poincaré 对偶。左边是  $[\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w$ , 右边是 (33) 中  $[\overline{BuB/B}]_T$  的系数, 由 [2, Proposition 7.3], 这就给出 (31)。

Billey 公式是计算等变量 Schubert 系数的重要工具。具体而言, 对于 Schubert 结构常数  $c_{uv}^w(\mathbf{y})$ , 由 [3, Corollary 4.3] 有

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}) = \sum_{b \in \mathcal{C}(u, v, w)} \prod_{\alpha \in \text{Inv}(b)} \alpha$$

其中  $\mathcal{C}(u, v, w)$  是特定 braid 元胞腔,  $\text{Inv}(b)$  是其反转集。本文给出了这一几何解释的新证明。

<sup>33</sup>关于 Billey 公式的完整背景、几何意义及结构常数版本, 见附录 section 45。

**3.4. 定理 1.4 的证明：应用到 Triple Schubert Calculus.** 本文的第二个主要结果是证明了 Samuel 猜想 (定理 1.2)，即在三重变量集情形下的 Graham positivity.

定理 1.4 (Theorem 1.1 - Triple Schubert Positivity (Samuel 猜想)). 设  $u, v \in S_\infty$  满足 descents 条件, 则

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

其中  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$  是  $\mathbf{y}$  和  $\mathbf{t}$  的正系数多项式.

例子: 见 section 15.

**证明:** 我们限制到  $G = \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{C})$  的情形. 设  $u, v \in S_n$  满足 separated descents 条件. 考虑特殊排列  $\tau \in S_{2n}$  满足  $\tau(i) = n + i$ ,  $\tau(n + i) = i$ .

由 [2, Section 16.5],  $[\tau B^{-u}B/B]_T$  由  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  表示,  $[B^{-v}B/B]_T$  由  $\mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  表示.

由引理 1.2, 交集  $\tau B^{-u}B/B \cap B^{-v}B/B$  是 proper 且 transverse 的. 因此我们可以在等变量子上同调中写:

$$[\tau B^{-u}B/B \cap B^{-v}B/B]_T = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$$

由于  $\tau B^{-u}B/B$  在  $\tau N^- \tau^{-1}$  下闭,  $B^{-v}B/B$  在  $N^-$  下闭, 交集在  $N^- \cap \tau N^- \tau^{-1} =: N^-(\tau)$  下闭. 由推论 1.2, 我们得出

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$$

其中  $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ . 由于每个  $-(y_j - t_i)$  都是  $t_i - y_j$  的非负整数倍, 我们有  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$ .

这就完成了定理 1.4 的证明.

**3.5. 推论 1.3 的证明：Grothendieck 多项式的 Positivity 猜想.** 作为应用, 我们证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想.

推论 1.3 (Corollary 1.2 - Kirillov 猜想). 对于任意置换  $w$ , skew 除差算子  $\partial_{w/v}$  作用于 Schubert 多项式时, 系数是非负的.

**证明:** 该定理是定理 1.4 在  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时的直接推论.

**第一步: 建立从 triple Schubert 系数到 skew 除差算子的联系.**

回忆 skew 除差算子的定义 (定义 1.9):

$$\partial_{w/v} = \sum_{\substack{u \\ v \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \partial_u$$

在双重 Schubert 多项式的乘法公式 (定理 1.4) 中, 取特殊情形  $u = \pi$ ,  $v = \sigma$  并令  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ , 得到

$$\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot \mathfrak{S}_\sigma(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \sum_w c_{\pi,\sigma}^w(0, 0) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0})$$

由 Schubert 多项式的性质 (定义 1.10), 当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时  $\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x})$ , 即退化为普通的 Schubert 多项式.

另一方面, skew 除差算子  $\partial_{w/\sigma}$  作用于  $\mathfrak{S}_\pi$  时, 其系数与 section 3.5 中的系数有如下关系 (见 Macdonald [23, Section 5]):

$$\partial_{w/\sigma}(\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x})) = \sum_\tau c_{\pi,\sigma}^\tau(0, 0) \cdot \mathfrak{S}_\tau(\mathbf{x})$$

section 3.5 表明:  $\partial_{w/\sigma}(\mathfrak{S}_\pi)$  在 Schubert 基下的展开系数, 等于 triple Schubert 系数  $c_{\pi,\sigma}^\tau$  在  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时的特殊值。

**第二步: 从 定理 1.4 推出系数的非负性。**

由 定理 1.4, 我们有

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$$

当  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时,  $t_i - y_j$  的多项式环退化为  $\mathbb{Z}$ , 因此

$$c_{u,v}^w(0, 0) \in \mathbb{N}$$

将这一结论代入 section 3.5, 得到

$$\partial_{w/v}(\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})) = \sum_{w'} c_{u,v}^{w'}(0, 0) \cdot \mathfrak{S}_{w'}(\mathbf{x})$$

其中每个系数  $c_{u,v}^{w'}(0, 0) \in \mathbb{N}$  都是非负整数。这正是 推论 1.3 所要证明的。

**第三步: 关于嵌套除差算子  $\partial_{w/w_0/w}$  的说明。**

在上述证明中, 我们实际上不需要嵌套记号  $\partial_{w/w_0/w}$ 。取  $v = w_0/w$  时,  $\partial_{w/(w_0/w)}$  按定义是

$$\partial_{w/(w_0/w)} = \sum_{\substack{u \\ w_0/w \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \partial_u$$

注意到当  $u = w_0$  时,  $\ell(w_0) - \ell(u) = 0$ , 故  $(-1)^0 = 1$ , 这一项在求和中以正号出现。

由于  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$  是单项式 (定义 1.10), 对它的除差算子作用可以显式计算:

$$\partial_{w/(w_0/w)}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})) = \sum_{\substack{u \\ w_0/w \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \partial_u(x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots)$$

由 Billey 公式 (见 section 3.3),

$$\partial_u(x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

即对单项式施加除差算子的结果仍是非负整数系数的多项式。

而  $\partial_{w/(w_0/w)}$  中的系数  $(-1)^{\ell(w) - \ell(u)}$  恰好与 定理 1.4 中系数的符号变化规律一致, 因此两者结合后, 所有出现的系数仍为非负整数。

这就完成了 推论 1.3 的证明。

## CHAPTER 2

### Samuel's Molev-Sagan Type Formula

#### 1. 引言：两个多项式相乘会得到什么？

在第一章中，我们遇到了三重变量集的 Graham positivity 问题——即研究形如

$$(34) \quad \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

的展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  的正性。

但如果我们退后一步，问一个更基本的问题：**两个双重 Schubert 多项式相乘，会得到什么？**

这并非一个纯粹的技术性问题。当我们取  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时，系数  $c_{u,v}^w(0, 0)$  计数旗流形 (flag manifold) 中 Schubert 胞腔 (Schubert cells) 的相交个数——这正是 Hilbert 第十五问题的核心（涉及射影空间的相交理论）。

Molev 和 Sagan 在 1990 年代末期首次给出了 Grassmannian 情形（即  $u, v$  都是 Grassmannian 排列）的组合公式。他们的工作揭示了一个美妙的结构：系数可以理解为某种**路径计数**。Samuel 在 2024 年的工作中将这一公式推广到更一般的情形。

#### 2. Separated Descents (Separated Descent Set): 分离的下降点

在我们陈述主要公式之前，需要引入一个关键概念。

当我们把两个 Schubert 多项式相乘时，系数  $e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$  的结构并非任意——它受到排列  $u$  和  $v$  的**下降点** (descents [27, Definition 1.1]) 位置的深刻影响。

直观上，如果  $u$  和  $v$  的下降点彼此“分离”——存在某个整数  $p$  将它们分开——那么乘积的结构会变得格外清晰。

定义 2.1 (Separated Descent Set [27, Definition 2.1]). 设  $u, v \in S_\infty$ 。定义

$$(35) \quad \text{SD}(u, v) = \{i \in \mathbb{Z}_{>0} : \ell(us_i) > \ell(u) \text{ 且 } \ell(vs_i) > \ell(v)\}$$

即所有满足： $i$  不是  $u$  的下降点，且  $i$  不是  $v$  的下降点的正整数集合。

定义 2.2 (Separated Descents 条件 [27, Definition 2.1]). 设  $u, v \in S_\infty$ 。称  $(u, v)$  满足 **separated descents 条件**，如果存在正整数  $p$  使得：

- 对所有  $i < p$ ，有  $\ell(us_i) > \ell(u)$ （即  $i \notin \text{Des}(u)$ ， $i$  不是  $u$  的下降点）；
- 对所有  $i > p$ ，有  $\ell(vs_i) > \ell(v)$ （即  $i \notin \text{Des}(v)$ ， $i$  不是  $v$  的下降点）。

换言之， $u$  的所有下降点都集中在  $p$  的左侧， $v$  的所有下降点都集中在  $p$  的右侧。

引理 2.1 (Lemma 2.2 [27, Lemma 2.2]). 设  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件。则存在唯一的整数  $p$  使得：

- (1) 对所有  $i < p$ ，有  $i \in \text{SD}(u, v)$ ；
- (2) 对所有  $i > p$ ，有  $i \notin \text{SD}(u, v)$ 。

引理 2.2 (Lemma 2.3 [27, Lemma 2.3]). 设  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件, 并设  $p$  是满足上述条件的唯一整数。则

$$(36) \quad \text{SD}(u, v) = \{1, 2, \dots, p-1\}$$

引理 2.3 (Lemma 2.5 [27, Lemma 2.5]). 设  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件, 并设  $p$  是相关的整数。则对任意  $i \leq p$  和任意  $j > p$ , 有

$$(37) \quad \text{SD}(us_i, vs_j) = \text{SD}(u, v) \setminus \{i\}$$

其中  $us_i$  和  $vs_j$  表示在相应位置进行乘法。

这一观察的根源在于旗流形的几何: Schubert 胞腔的相交性质与它们在旗流形中的相对位置密切相关。当两个胞腔的”朝向”足够分离时, 它们的交集会呈现出一种正则的结构。

### 3. 乘积公式 (Theorem 3.1)

这是本文的核心定理——Samuel 给出的 Molev-Sagan 类型公式。

定理 2.1 (Theorem 3.1: 乘积公式 (Product Formula) [27, Theorem 3.1]). 设  $u, v \in S_\infty$  满足 *separated descents* 条件, 则

$$(38) \quad \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_{w \in S_\infty} e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

其中系数  $e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$  是关于  $\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j$  的非负整数系数多项式。

**这为什么重要?** 当  $\mathbf{y} = \mathbf{z}$  时, (38) 简化为

$$(39) \quad \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \sum_w c_{uv}^w(\mathbf{y}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

此时系数  $c_{uv}^w(\mathbf{y})$  恰好是 Graham positivity 研究的对象。换言之, 定理 38 是 Graham positivity 的源头——它告诉我们**为什么**展开系数会是正多项式。<sup>1</sup>

注 2.1. 当  $u$  和  $v$  不满足 *separated descents* 条件时, 公式 (38) 不再成立——系数  $e_{uv}^w$  可能不再是正多项式。

### 4. 证明思路: Path 图 (Path Diagram) 与权重

公式的证明依赖于一种组合模型——**path 图** (path diagram)。

想象一个网格, 起点在左下角, 终点在右上角。每条从起点到终点的单调路径对应一种”行走方式”。对于给定的排列  $u, v$ , 我们可以构造特定的 path 图集合, 而系数  $e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$  正是这些路径的**权重之和**。

权重的计算涉及  $\mathbf{y}$  和  $\mathbf{z}$  变量的巧妙分配——每一个”拐角” (corner) 处都可能贡献一个因子  $(\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$ 。

**核心洞察:** path 图模型揭示了多重 Schubert 多项式的乘法与旗流形中的相交理论之间存在一一对应。几何相交  $\Leftrightarrow$  路径计数。<sup>2</sup>

引理 2.4 (Lemma 3.2 [27, Lemma 3.2]). 设  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件。则对任意  $w$ , 如果  $e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \neq 0$ , 则  $w$  可以通过一系列特定的 *path* 图操作从  $u$  和  $v$  构造出来。

引理 2.5 (Lemma 3.3 [27, Lemma 3.3]). 对任意满足条件的  $u, v, w$ , 系数  $e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$  等于连接  $u$  到  $w$  的所有合法 *path* 图的权重之和。

<sup>1</sup>乘积公式的完整推导见附录 section 11。

<sup>2</sup>Path 图的详细定义与权重公式见附录 section 12。

### 5. The Proof of the Main Formula: 主要公式的证明

本节给出定理 38 的完整证明。证明分为几个关键步骤。

**5.1. Step 1: 归纳基础 (Induction Basis).** 我们首先考虑最基本的情形。设  $p$  是满足 separated descents 条件的整数。

当  $u = \text{id}$  (单位排列, identity permutation) 且  $v = \text{id}$  时,

$$(40) \quad \mathfrak{S}_{\text{id}}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_{\text{id}}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = 1 = \mathfrak{S}_{\text{id}}(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

故  $e_{\text{id}, \text{id}}^{\text{id}} = 1$ , 其他系数为零。

#### 5.2. Step 2: 提升引理 (Lifting Lemma).

引理 2.6 (Lemma 4.3 [27, Lemma 4.3]). 若  $\ell(ws_i) < \ell(w)$  且  $\ell(us_i) > \ell(u)$ ,  $\ell(vs_i) > \ell(v)$ , 则  $e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = 0$ 。

引理 2.7 (Lemma 4.4: 提升引理 (Lifting Lemma) [27, Lemma 4.4]). 若  $\ell(ws_i) > \ell(w)$ , 则  $e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = e_{u, vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$ 。

这两个引理告诉我们: 在 separated descents 条件下, 系数  $e_{uv}^w$  的结构受到 Bruhat 序 (Bruhat order) 的强烈约束——不满足特定下降条件的情形系数必为零。

#### 5.3. Step 3: 递归结构 (Recursive Structure).

引理 2.8 (Lemma 4.5 [27, Lemma 4.5]). 设  $(u, v)$  满足 separated descents 条件, 并设  $p$  是相关整数。则对任意  $i \leq p$  和  $j > p$ , 有

$$(41) \quad e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = \sum_k e_{us_i, v}^{u_k}(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \cdot e_{u_k, vs_j}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

其中求和遍历所有中间排列  $u_k$ 。

引理 2.9 (Lemma 4.6 [27, Lemma 4.6]). *Path* 图的权重满足类似的递归关系: 每个“拐角”处的权重因子  $(\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$  被分配到相应项中。

**5.4. Step 4: 归纳完成 (Induction Completion).** 现在假设对所有长度小于  $\ell(u) + \ell(v)$  的情形, 定理已成立。对任意  $w$ , 考虑两种情形:

**情形 1:**  $\ell(w) < \ell(u) + \ell(v)$ 。此时由 Lemma 2.6, 如果  $w$  不满足特定条件, 则系数为零。否则, 我们可以应用 Lemma 2.7 将问题转化为较短的排列。

**情形 2:**  $\ell(w) = \ell(u) + \ell(v)$ 。此时应用递归公式 Lemma 2.8, 将乘积分解为两个较短的乘积, 然后利用归纳假设。

通过这两种情形的分析, 我们完成了定理的归纳证明。<sup>3</sup>

### 6. Pieri 公式 (Theorem 7.1)

当公式中取  $v = c_{p,k}$  (即特定循环排列) 时, 我们得到一个重要的特殊情形:

定理 2.2 (Theorem 7.1: Pieri 公式 (Pieri Formula) [27, Theorem 7.1]). 当  $v = c_{p,k} = s_{k-p+1}s_{k-p+2} \cdots s_k$  (循环排列, *cycloidal permutation*) 时, 乘积公式简化为

$$(42) \quad \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_{c_{p,k}}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_{\substack{w \\ \ell(w) = \ell(u) + k}} e_{u, c_{p,k}}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

Pieri 公式在 Schubert calculus 中有着悠久的历史——它对应于旗流形 (flag manifold) 中 Grassmannian 子流形的相交性质。

<sup>3</sup>详细推导见附录 section 11。

## 7. Dominant Approximation: 主导逼近 (Dominant Approximation)

本文的另一个关键贡献是 **dominant approximation** (主导逼近) 概念。

对于每个排列  $v$ , 存在一个唯一的”最简单”的排列  $\mu_v$ , 使得

$$(43) \quad \mathfrak{S}_{\mu_v}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \prod_{i=1}^{\infty} E_{\lambda_i(v)}(\mathbf{x}; \mathbf{z}_i)$$

其中  $E_{\lambda}(\mathbf{x}; \mathbf{z})$  是所谓的主导 (dominant) Schubert 多项式 (dominant Schubert polynomial), 具有特别简洁的形式。

这一结果的深刻之处在于: 它告诉我们每个 Schubert 多项式都可以”近似”为一个主导多项式, 而这种近似的误差项具有某种可控的结构。<sup>4</sup>

## 8. 关键引理一览

本文证明过程中使用的关键引理汇总如下:

引理 2.10 (Lemma 4.1 [27, Lemma 4.1]). (消减条件的另一种表述) 设  $w$  满足  $\ell(ws_i) < \ell(w)$ , 则

$$(44) \quad e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = e_{us_i, vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

引理 2.11 (Lemma 4.2 [27, Lemma 4.2]). (提升引理的另一种表述) 设  $w$  满足  $\ell(ws_i) > \ell(w)$ , 则

$$(45) \quad e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = e_{us_i, v}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z}) + e_{u, vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

引理 2.12 (Lemma 4.8 [27, Lemma 4.8]). (系数非负性, *nonnegative coefficients*) 对所有  $u, v, w$ , 系数  $e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$  是关于变量  $(\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$  的非负整数系数 (*nonnegative integer coefficients*) 多项式。

## 9. 示例

为了更具体地理解乘积公式的应用, 本节给出几个例子。

例 2.1 (例 8.1: 基本情形). 设  $u = s_1$  (换位, *transposition*),  $v = s_2$  (另一个换位)。此时  $\text{Des}(u) = \{1\}$ ,  $\text{Des}(v) = \{2\}$ , 故  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件 (取  $p = 2$ )。

直接计算可得

$$(46) \quad \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_{s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{s_1 s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) + (\mathbf{y}_1 - \mathbf{z}_2) \mathfrak{S}_{s_2}(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

其中  $s_1 s_2$  是长度为 2 的排列。

例 2.2 (例 8.2: Pieri 特殊情形). 取  $u = s_1$ ,  $v = c_{2,1} = s_1$ 。则由 *Pieri* 公式,

$$(47) \quad \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{s_1 s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) + (\mathbf{y}_1 - \mathbf{z}_1) \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

注意到  $s_1 s_1 = s_1$  (因为  $s_1^2 = 1$ ), 但这里指的是不同的路径图配置。

例 2.3 (例 8.3: 非 separated descents 情形). 取  $u = s_1$ ,  $v = s_1$ 。此时  $\text{Des}(u) = \text{Des}(v) = \{1\}$ , 不满足 *separated descents* 条件。

直接展开可得

$$(48) \quad \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot (\mathfrak{S}_{s_1}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) + (\mathbf{y}_1 - \mathbf{z}_1))$$

这个展开包含常数项, 不符合一般乘积公式的形式。

<sup>4</sup>Dominant approximation 的完整证明见附录 section 13。



## 10. 本章小结

本章介绍了 Samuel 的 Molev-Sagan 类型公式的核心内容。关键点如下：

- (1) **Separated descents 条件** (separated descents condition) 是公式成立的本质条件——它反映了旗流形 (flag manifold) 中 Schubert 胞腔 (Schubert cells) 相交的正则性；
- (2) **乘积公式** (product formula) (eq. (38)) 将双重 Schubert 多项式的乘积展开为系数非负的 Schubert 多项式线性组合；
- (3) **Path 图模型** (path diagram model) 提供了系数几何含义的组合解释——路径计数；
- (4) **Dominant approximation** (主导逼近) 提供了将一般排列“化简”为主导排列的系统方法；
- (5) **提升引理** (lifting lemma) 和**消减引理** (reduction lemma) 是证明的结构性工具。

作为推论，当  $y = z$  时，本章的公式直接给出 Graham positivity 猜想的证明——这将是下一章的主题。

## 11. 附录：主要公式的详细证明

**背景 (Background).** 本节给出定理 38 的完整证明细节。证明采用对  $\ell(u) + \ell(v)$  的归纳法。

### 参数定义 (Parameter Definitions).

- $u, v \in S_\infty$ : 两个无穷排列 (有限排列的并)
- $\ell(w)$ : 排列  $w$  的长度 (inversion 个数)
- $\text{Des}(w) = \{i : \ell(ws_i) < \ell(w)\}$ : 下降点集合
- $p$ : separated descents 条件中的分界整数

### 已知条件 (Given).

- $(u, v)$  满足 separated descents 条件
- 归纳假设：对所有  $\ell(u') + \ell(v') < \ell(u) + \ell(v)$  的情形，公式成立

### 目标 (Goal). 证明

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_w e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

**详细推导步骤 (Derivation Steps).** **步骤 1:** 考虑  $w$  满足  $\ell(ws_i) < \ell(w)$  的情形。由 Schubert 多项式的基本性质 (见第一章)，有

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \frac{\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) - \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})}{x_i - y_j}$$

其中  $j$  是某个特定指标。

**步骤 2:** 应用引理 44 和引理 45 进行递归。

当  $\ell(ws_i) < \ell(w)$  时，

$$e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = e_{us_i, vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

当  $\ell(ws_i) > \ell(w)$  时，

$$e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = e_{us_i, v}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z}) + e_{u, vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

**步骤 3:** 利用 separated descents 条件控制下降点位置。

由定义，存在  $p$  使得：

- 对  $i < p$ :  $i \in \text{SD}(u, v)$
- 对  $i > p$ :  $i \notin \text{SD}(u, v)$

**步骤 4:** 构造递归公式。

对任意  $i \leq p$  和  $j > p$ , 定义

$$e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = \sum_k e_{us_i, v}^{u_k}(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \cdot e_{u_k, vs_j}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

**步骤 5:** 完成归纳。

通过步骤 1-4 的递归结构, 可以验证展开系数恰好由 path 图的权重给出。详细证明见论文 [27, Section 5]。

## 12. 附录: Path 图的详细定义

**Path 图的定义 (Definition 4.1).**

定义 2.3 (**Path Diagram** [27, Definition 4.1]). 设  $u, v$  满足 *separated descents* 条件。一个从  $(u, v)$  到  $w$  的 **path 图** 是一个满足以下条件的有限有向图:

- (1) 顶点集为  $S_\infty$  的一个有限子集;
- (2) 边由  $(u', v') \rightarrow (u's_i, v')$  或  $(u', v's_i)$  给出;
- (3) 起点为  $(u, v)$ , 终点为  $(w, w)$  或类似终态;
- (4) 路径上的“拐角” (*corner*) 处标记权重因子。

**权重函数 (Definition 4.4).**

定义 2.4 (**Weight Function** [27, Definition 4.4]). 设  $P$  为一个 *path* 图。定义其 **权重** 为

$$(49) \quad \text{wt}(P) = \prod_{(\text{拐角} \rightarrow i, j)} (\mathbf{y}_i - \mathbf{z}_j)$$

其中乘积遍历路径上所有拐角,  $i$  和  $j$  是与该拐角相关的指标。

**非零区域 (Definition 4.7).**

定义 2.5 (**Non-zero Region** [27, Definition 4.7]). 设  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件。定义

$$(50) \quad \mathcal{R}(u, v) = \{w \in S_\infty : e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \neq 0\}$$

即所有展开系数非零的  $w$  构成的集合。

## 13. 附录: Dominant Approximation 的详细证明

**背景.** Dominant approximation 告诉我们, 每个排列  $v$  都可以通过某种“最简单”的代表  $\mu_v$  来近似, 其中  $\mu_v$  是唯一的 Grassmannian 排列。

**主要结论.** 对每个  $v$ , 存在唯一的  $\mu_v$  和非负整数  $a_i$  (仅有限多个非零), 使得

$$(51) \quad \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \mathfrak{S}_{\mu_v}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) + \sum_i (\mathbf{z}_i - \mathbf{z}_{i+1}) \cdot \mathfrak{S}_{v_i}(\mathbf{x}; \mathbf{z})$$

其中  $v_i$  是某些中间排列。

**证明思路.** 证明基于对排列长度的归纳。关键观察是: 每个非-dominant 排列都可以通

过一系列“局部变换”化简为 dominant 排列, 而这些变换恰好由引理 44 和 45 控制。

详细证明见论文 [27, Section 6]。

## Quantum Double Schubert Polynomials

### 1. 引言：为什么需要量子版本？

在前两章中，我们研究了经典双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  的性质，以及三重变量集情形下的 Graham positivity。

但当我们研究旗流形 (flag manifold) 上曲线的个数时，普通的相交理论遇到了根本性的困难。

设想我们想要计数  $\mathbb{P}^1$  到旗流形的稳定映射个数。在经典相交理论中，我们只能计数点与点的交集——这是一种静态的计数。但带参数的曲线涉及额外的自由度：每条曲线有自己的“度数” (degree)，这对应于同调类  $\beta \in H_2(Fl_n, \mathbb{Z})$ 。

这引导我们进入量子上同调 (quantum cohomology) 的世界——一个源于物理中拓扑场论 (topological field theory) 的思想，由 Kontsevich 和 Manin 系统化。

**核心观察：**在量子上同调 (quantum cohomology) 中，Schubert 类的乘法不再是普通的乘积，而是一种带有形式变量  $q^\beta$  的新运算

$$(3.1) \quad [\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w, \beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) [\sigma_w],$$

其中  $\beta$  记录了连接子簇的曲线类 (curve class)， $q^\beta$  是形式变量。这一公式最初来自物理中的 **A-twisted topological field theory**，它揭示了曲线计数与多项式结构常数之间的深层联系。

Kirillovov 和 Maeno 在 1996 年的工作中引入了量子双重 Schubert 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{q})$ ，这是旗流形等变量量子上同调类的 Lascoux-Schützenberger 型代表元。本文介绍这一工作的核心内容。

### 2. 经典回顾：除差算子与 Schubert 多项式

在引入量子版本之前，我们先简要回顾经典理论的核心定义——这些内容在 Chapter 1 中已有详细讨论，这里做快速梳理以保持连贯性。

**2.1. 除差算子。**除差算子 (divided difference operator) 是 Schubert 演算的核心工具。我们在 Chapter 1 中已经看到， $\partial_i$  测量了多项式在交换两个变量时的变化率：

定义 3.1 (**除差算子**). 对于  $i = 1, \dots, n-1$ ，除差算子  $\partial_i$  定义为：

$$(52) \quad \partial_i f = \frac{f(x_1, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots) - f(x_1, \dots, x_{i+1}, x_i, \dots)}{x_i - x_{i+1}}.$$

**关键性质：** $\partial_i$  满足 Leibniz 法则

$$(53) \quad \partial_i(fg) = (\partial_i f)g + (s_i f)(\partial_i g),$$

其中  $s_i f = f(x_1, \dots, x_{i+1}, x_i, \dots)$  表示交换  $x_i$  和  $x_{i+1}$ 。

**2.2. 经典 Schubert 多项式.** 正如 Chapter 1 中所定义, Schubert 多项式通过除差算子作用在特殊多项式  $x^\delta$  上得到:

定义 3.2 (**Schubert 多项式**). 设  $\delta = (n-1, n-2, \dots, 1, 0)$ ,  $w_0$  为  $S_n$  的最长置换. **Schubert 多项式** 定义为:

$$(54) \quad \mathfrak{S}_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0}(x^\delta),$$

其中  $x^\delta = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_n^0$ .

当引入  $y$  变量后, 我们得到双重版本——这正是 Chapter 2 研究乘积公式时使用的工具:

定义 3.3 (**双重 Schubert 多项式**). **双重 Schubert 多项式** 定义为:

$$(55) \quad \mathfrak{S}_w(x, y) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j).$$

### 3. 量子上同调的基本框架

为什么量子上同调是自然的? 这需从几何学中寻求解释。

在经典相交理论中, 我们计算子流形  $X, Y \subset V$  的交集  $X \cap Y$  的点数。但在旗流形的情形, 当我们要计数**连接两点的曲线**时, 普通的相交理论失效了——因为这不是点与点的交集, 而是曲线与曲线的交汇。

Kontsevich 和 Manin 的伟大贡献在于, 他们意识到这种计数可以系统化——通过引入 Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant)。

**3.1. Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant).** 设  $V$  是光滑复流形,  $\beta \in H_2(V, \mathbb{Z})$  是曲线类 (curve class)。**Gromov-Witten 不变量**

$$(3.2) \quad \langle I_{0,m,\beta}^V \rangle : H^*(V, \mathbb{Q})^{\otimes m} \longrightarrow \mathbb{Q}$$

计数满足特定条件的参数化曲线个数。

**直观理解:**  $\langle I_{0,m,\beta}^V \rangle (X_1^* \otimes \cdots \otimes X_m^*)$  是满足以下条件的稳定映射 (stable map)  $f : \mathbb{P}^1 \rightarrow V$  的“虚拟个数”:

- $f$  的像代表同调类  $\beta$ ;
- $f(p_i) \in X_i$  (其中  $p_1, \dots, p_m \in \mathbb{P}^1$  是标记点)。

这些不变量最初来自物理中的拓扑场论, 后来被严格化——这又是数学从物理学汲取营养的又一经典案例。

**3.2. 小量子上同调环 (small quantum cohomology ring).** 对于旗流形 (flag manifold)  $Fl_n = SL_n/B$ , 小量子上同调环 (small quantum cohomology ring) 的结构由 Givental、Kim 以及 Ciocan-Fontanine 确定。

定理 3.1 (小量子上同调环 [16, Theorem 8]). 小量子上同调环  $QH^*(Fl_n)$  同构于

$$(3.3) \quad \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n; q_1, \dots, q_{n-1}] / (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n),$$

其中  $\tilde{e}_i(x|q)$  是量子初等对称函数, 由以下行列式生成:

$$(3.4) \quad \det \begin{pmatrix} x_1 + t & q_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & x_2 + t & q_2 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & x_3 + t & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & x_n + t \end{pmatrix} = t^n + \tilde{e}_1 t^{n-1} + \cdots + \tilde{e}_n.$$

当  $q_1 = \cdots = q_{n-1} = 0$  时, (3.3) 退化为经典上同调环——这体现了量子版本与经典版本之间的深刻联系。

**几何含义：**量子初等对称函数  $\tilde{e}_i$  对应于旗流形中特定子流形的类。它们的零点描述了旗流形的量子修正结构。

#### 4. 量子双重 Schubert 多项式的定义

有了量子上同调框架后, 我们现在可以正式定义量子双重 Schubert 多项式。

**4.1. 顶部多项式 (top polynomial).** 设  $x = (x_1, \dots, x_n)$  和  $y = (y_1, \dots, y_n)$  是两组变量,  $q = (q_1, \dots, q_{n-1})$  是量子变量。

**顶部多项式 (top polynomial)** 定义为

$$(3.5) \quad \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y) := \prod_{i=1}^{n-1} \Delta_i(y_{n-i} \mid x_1, \dots, x_i),$$

其中

$$(3.6) \quad \Delta_k(t \mid x_1, \dots, x_k) := \sum_{j=0}^k t^{k-j} e_j(x_1, \dots, x_k \mid q_1, \dots, q_{k-1})$$

是关于  $x_1, \dots, x_k$  的量子初等对称函数的生成函数。

**为什么叫”顶部多项式”?** 当  $q = 0$  时,  $\tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y) = \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$ , 这正是对应最长置换  $w_0$  的 Schubert 多项式——在 Bruhat 序 (Bruhat order) 中, 它是旗流形的”最大维” Schubert 胞腔。

**4.2. 量子双重 Schubert 多项式.** 有了顶部多项式, 我们通过对它施加除差算子来生成所有量子双重 Schubert 多项式:

**定义 3.4** (量子双重 Schubert 多项式 [16, Definition 4]). 对于每个置换  $w \in S_n$ , 定义 **量子双重 Schubert 多项式** 为

$$(3.7) \quad \tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y) = \partial_{ww_0}^{(y)} \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y),$$

其中除差算子  $\partial_{ww_0}^{(y)}$  作用于  $y$  变量。

**与经典版本的关系:** 当  $q = 0$  时,

$$(3.8) \quad \tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y) \Big|_{q=0} = \mathfrak{S}_w(x, y),$$

即经典双重 Schubert 多项式。这是”经典极限”的一个典型例子——量子理论在  $q \rightarrow 0$  时退化为经典理论。

**验证:** 设  $q = 0$ , 则  $\Delta_i(y_{n-i} \mid x_1, \dots, x_i) = \prod_{j=1}^i (x_j + y_{n-i+j})$ , 而

$$\prod_{i=1}^{n-1} \prod_{j=1}^i (x_j + y_{n-i+j}) = \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j) = \mathfrak{S}_{w_0}(x, y).$$

然后由除差算子的性质可得 (3.7)。

#### 5. 主要性质

量子双重 Schubert 多项式具有一系列重要性质。

**5.1. 稳定性 (stability).** 与经典版本类似 (见 Chapter 1 的稳定性 (stability) 讨论), 量子双重 Schubert 多项式也具有稳定性:

命题 3.1 (稳定性). 设  $m > n$  且  $i: S_n \hookrightarrow S_m$  是自然嵌入, 则

$$(3.9) \quad \tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y) = \tilde{\mathfrak{S}}_{i(w)}(x, y).$$

这意味着量子双重 Schubert 多项式在嵌入下保持不变——我们可以将其定义在  $S_\infty$  上, 这对于理论研究非常便利。

**5.2.  $S_3$  的例子.** 为了建立直观感受, 我们展示  $S_3$  的量子双重 Schubert 多项式:

例 3.1 ( $S_3$  的量子双重 Schubert 多项式). 在  $S_3$  中, 量子双重 Schubert 多项式为:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathfrak{S}}_{s_1 s_2 s_1}(x, y) &= (x_1 + y_2)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1) + q_1(x_1 + y_2), \\ \tilde{\mathfrak{S}}_{s_2 s_1}(x, y) &= (x_1 + y_1)(x_1 + y_2) - q_1, \\ \tilde{\mathfrak{S}}_{s_1 s_2}(x, y) &= (x_1 + y_1)(x_2 + y_1) + q_1, \\ \tilde{\mathfrak{S}}_{s_1}(x, y) &= x_1 + y_1, \\ \tilde{\mathfrak{S}}_{s_2}(x, y) &= x_1 + x_2 + y_1 + y_2, \\ \tilde{\mathfrak{S}}_{\text{id}}(x, y) &= 1. \end{aligned}$$

**观察:** 每个多项式都由一个经典部分加上一到两个  $q$  修正项组成。当  $q_1 = 0$  时, 这些公式退化为经典双重 Schubert 多项式。

**关键洞察:** 第一个公式 (对应最长元  $w_0 = s_1 s_2 s_1$ ) 包含了  $q_1$  项, 这反映了在量子上同调中, 最高维 Schubert 类的乘法会涉及量子修正——这正是量子与经典理论的核心差异所在。

## 6. 量子 Schubert 多项式

除了量子双重版本, Kirillov 和 Maeno 还定义了不含  $y$  变量的量子 Schubert 多项式。

**6.1. 量子配对 (quantum pairing).** 在经典理论中, 我们用标量积  $\langle f, g \rangle = \partial_{w_0}(fg)$  来定义 Schubert 多项式的正交性 (orthogonality)。在量子情形, 我们需要用量子配对 (quantum pairing) 来替代:

定义量子配对 (quantum pairing) 为 Grothendieck 留数 (Grothendieck residue):

$$(3.10) \quad \langle f, g \rangle_Q = \text{Res}_{\tilde{I}}(fg).$$

其中  $\tilde{I}$  是由量子初等对称函数生成的理想。这个配对对应于量子上同调环中的相交形式 (intersection form)。

**为什么使用 Grothendieck 留数 (Grothendieck residue)?** 这是因为在商环  $QH^*(Fl_n)$  中, 普通的积分被留数公式所替代——这反映了量子版本与经典版本的本质差异。

### 6.2. 定义.

定义 3.5 (量子 Schubert 多项式 [16, Definition 5]). 量子 **Schubert 多项式**  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(x)$  是将字典序排列的单项式  $\{x^I \mid I \subset \delta\}$  关于量子配对  $\langle, \rangle_Q$  进行 Gram-Schmidt 正交化 (Gram-Schmidt orthogonalization) 得到的。

这一定义在结构上与经典 Schubert 多项式的刻画像（见 Chapter 2 的讨论）完全对应——只是将普通标量积替换为了量子标量积。

量子 Schubert 多项式满足以下正交性（orthogonality）条件：

$$(3.11) \quad \langle \tilde{\mathfrak{S}}_u, \tilde{\mathfrak{S}}_v \rangle_Q = \begin{cases} 1 & \text{若 } v = w_0 u, \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

## 7. 量子 Cauchy 恒等式

这是本文的核心结果之一——它建立了量子与经典 Schubert 多项式之间的对偶关系。

定理 3.2 (量子 Cauchy 恒等式 [16, Theorem B]). 设  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(x) = \tilde{\mathfrak{S}}_w(x, 0)$ , 则

$$(3.12) \quad \sum_{w \in S_n} \tilde{\mathfrak{S}}_w(x) \mathfrak{S}_{ww_0}(y) = \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y).$$

**这为什么重要？** 这一恒等式将量子 Schubert 多项式与经典 Schubert 多项式联系起来。当  $q = 0$  时, (3.12) 退化为经典的 Cauchy 公式

$$(3.13) \quad \sum_{w \in S_n} \mathfrak{S}_w(x) \mathfrak{S}_{ww_0}(y) = \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j),$$

这正是 Chapter 2 中研究乘积公式时的基础。

**几何意义：** (3.12) 建立了量子 Schubert 多项式（对应量子上同调类）与经典 Schubert 多项式（对应普通上同调类）之间的对偶关系。这种对偶性在数学物理中有深刻的根源。

## 8. Lascoux-Schützenberger 型公式

作为量子 Cauchy 恒等式的一个直接推论, 我们得到量子 Schubert 多项式的 Lascoux-Schützenberger 型公式。

推论 3.1 (Lascoux-Schützenberger 型公式 [16, Theorem C]). 设  $\tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y)$  如上定义, 则

$$(3.14) \quad \tilde{\mathfrak{S}}_w(x) = \partial_{ww_0}^{(y)} \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y) \Big|_{y=0}.$$

**这告诉我们什么？** 量子 Schubert 多项式可以通过对量子双重 Schubert 多项式施加除差算子, 然后取  $y = 0$  来得到。这与经典情形

$$(3.15) \quad \mathfrak{S}_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0} \mathfrak{S}_{w_0}(x)$$

的结构完全类似——量子版本只是经典版本的自然推广。

## 9. 与三重 Schubert Positivity 的联系

在 Chapter 1 中, 我们研究了 Gao-Xiong 关于三重 Schubert Positivity (triple Schubert positivity) 的结果。现在我们揭示量子双重 Schubert 多项式与这一结果的联系。

回顾 Chapter 1 的核心问题：研究展开系数

$$(3.16) \quad \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

的正性。

**关键联系：** 当我们考虑量子上同调时, 同样的乘法在量子配对下有更丰富的结构。量子双重 Schubert 多项式提供了这些乘法结构的代数代表元。

具体而言, 等变量量子上同调 (equivariant quantum cohomology) 环  $QH_{U_n}^*(Fl_n)$  同构于

$$(3.17) \quad \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n; q_1, \dots, q_{n-1}] / \tilde{J},$$

其中理想  $\tilde{J}$  由

$$(3.18) \quad e_i(x \mid q_1, \dots, q_{n-1}) - e_i(y_1, \dots, y_n), \quad 1 \leq i \leq n$$

生成。

量子双重 Schubert 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y)$  在这个环中扮演的角色, 与经典双重 Schubert 多项式在经典等变量量子上同调中扮演的角色完全类似。

**三重版本的关键洞察:** 当 Gao-Xiong 研究三重变量集  $(x, y, t)$  时, 他们实际上是在研究等变量量子上同调 (equivariant quantum cohomology) 的一个精化版本。量子双重 Schubert 多项式的结构常数提供了这些精化的代数解释。

### 10. Vafa-Intriligator 公式 (Vafa-Intriligator formula)

本文的另一重要贡献是给出了 Vafa-Intriligator 公式 (Vafa-Intriligator formula) 的高维推广。

Vafa-Intriligator 公式最初来自物理, 它给出了某些余维一子流形上交点数的显式计算。在旗流形的情形, 这涉及 Gromov-Witten 不变量的显式公式。

Kirillov 和 Maeno 在 Section 8 中给出了旗流形的 Vafa-Intriligator 公式的高维推广。这一公式在量子上同调中的地位, 如同经典 Schubert 多项式在普通上同调中的地位——它提供了计算结构常数的组合工具。

我们将在附录中给出这一公式的详细推导 (见 section 14)。

### 11. 量子化映射

Kirillov 和 Maeno 还引入了量子化映射, 这是理解量子与经典关系的关键工具。

定义量子化映射  $P_n \rightarrow \bar{P}_n$  为

$$(3.19) \quad \tilde{f}(x) = \sum_{w \in S^{(n)}} \partial_w^{(y)} f(y) \tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y) \big|_{\bar{P}_n}.$$

命题 3.2 (配对保持 (pairing preservation)). 量子化映射保持配对 (pairing preservation):

$$(3.20) \quad \langle \tilde{f}, \tilde{g} \rangle_Q = \langle f, g \rangle, \quad f, g \in P_n.$$

这意味着量子化是配对保持的线性映射, 但**不保持乘法** (见 [16, Remark 5(i)]). 量子化保持初等多项式和完全齐次对称多项式, 但将单形式映射到量子单形式。

### 12. 与其他工作的关系

本文与 Fomin、Gelfand 和 Postnikov 的独立工作有部分重叠, 但采用了完全不同的方法。

Postnikov 等人基于一类交换算子  $X_i$  发展了量子 Schubert 多项式理论, 得到了量子 Monk 公式、正交性和量子乘法的定义等结果。

Kirillov-Maeno 的方法则基于量子 Cauchy 恒等式和留数配对, 提供了另一种理解量子 Schubert 结构常数的途径。这两种方法互为补充, 共同构成了量子 Schubert calculus (quantum Schubert calculus) 的基础。



### 13. 本章小结

本章介绍了 Kirillov 和 Maeno 关于量子双重 Schubert 多项式的工作。关键点如下：

- (1) 量子初等对称函数  $\tilde{e}_i(x|q)$  由行列式生成函数定义，它们生成了小量子上同调环的 Relations；
- (2) 量子双重 Schubert 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y)$  通过对顶部多项式施加除差算子定义；
- (3) 经典极限：当  $q = 0$  时， $\tilde{\mathfrak{S}}_w(x, y)$  退化为经典双重 Schubert 多项式；
- (4) 量子 Cauchy 恒等式建立了量子 Schubert 多项式与经典 Schubert 多项式之间的对偶关系；
- (5) 量子化映射是配对保持的线性映射，但不保持乘法；
- (6) 这些结果与 Chapter 1 的 Gao-Xiong 三重 Schubert positivity 工作有深刻的联系。

在下一章中，我们将继续探讨量子 Schubert calculus 的其他方面，以及这些多项式在更广泛的几何背景下的应用。

### 14. 附录：公式推导

**14.1. 量子初等对称函数的行列式展开. 背景 (Background)：** 量子初等对称函数  $\tilde{e}_i(x|q)$  通过行列式生成函数定义。本节给出其显式展开形式，这对于理解量子上同调环的结构至关重要。

**参数定义 (Parameter Definitions)：**

- $x = (x_1, \dots, x_n)$ ：变量
- $q = (q_1, \dots, q_{n-1})$ ：量子变量
- $e_i(x_1, \dots, x_m \mid q_1, \dots, q_{m-1})$ ：量子初等对称函数

**已知条件 (Given)：** 生成函数 (行列式形式)：

$$\det \begin{pmatrix} x_1 + t & q_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & x_2 + t & q_2 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & x_3 + t & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & x_n + t \end{pmatrix} = t^n + \tilde{e}_1 t^{n-1} + \cdots + \tilde{e}_n.$$

**目标 (Goal)：** 给出  $\tilde{e}_k(x|q)$  的显式形式。

**推导步骤 (Derivation Steps)：**

**步骤 1：识别矩阵结构。** 该矩阵是  $(n+1) \times (n+1)$  的三对角矩阵，其特征值问题可以通过递推解决。

**步骤 2：建立递推关系。** 定义  $D_m(t) = \det(A_m)$ ，其中  $A_m$  是  $m \times m$  的主子矩阵。则  $D_m(t)$  满足：

$$(3.21) \quad D_m(t) = (x_m + t)D_{m-1}(t) - q_{m-1}D_{m-2}(t),$$

其中  $D_0(t) = 1$ ,  $D_1(t) = x_1 + t$ 。

**步骤 3：比较系数。** 比较  $t^n + \tilde{e}_1 t^{n-1} + \cdots + \tilde{e}_n$  的系数，可得：

$$(3.22) \quad \tilde{e}_k(x|q) = e_k(x_1, \dots, x_k) + \text{涉及 } q_1, \dots, q_{k-1} \text{ 的修正项}.$$

更精确地，通过递推可证：

$$(3.23) \quad \tilde{e}_k(x|q) = \sum_{j=0}^{\lfloor k/2 \rfloor} (-1)^j \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_j \leq k-1} q_{i_1} q_{i_2} \cdots q_{i_j} \cdot e_{k-2j}(x_1, \dots, x_{k-j}).$$

**验证:** 当  $q = 0$  时, (3.23) 简化为  $e_k(x_1, \dots, x_k)$ 。当  $n = 3, k = 1$  时,  $\tilde{e}_1 = x_1 + x_2 + x_3$ 。当  $n = 3, k = 2$  时,

$$(3.24) \quad \tilde{e}_2 = e_2(x_1, x_2, x_3) - q_1(x_1 + x_2) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 - q_1(x_1 + x_2).$$

**14.2. 量子配对与 Grothendieck 留数. 背景 (Background):** 量子配对  $\langle f, g \rangle_Q$  通过 Grothendieck 留数定义, 它对应于量子上同调环中的相交形式。理解这一配对对于掌握量子 Schubert 多项式的正交性至关重要。

**参数定义 (Parameter Definitions):**

- $\tilde{I}_n \subset \bar{P}_n = \mathbf{Z}[q_1, \dots, q_{n-1}][x_1, \dots, x_n]$ : 由量子初等对称函数生成的理想
- $\mathcal{H} = \det \left( \frac{\partial \tilde{e}_i}{\partial x_j} \right)$ : Hessian

**已知条件 (Given):** Grothendieck 留数定义: 对于  $f \in \bar{P}_n$ , 若  $\deg f < d_0 = \deg \mathcal{H}$ , 则  $\text{Res}_{\tilde{I}}(f) = 0$ ; 若  $\deg f = d_0$ , 则  $f \equiv \frac{\alpha}{n!} \mathcal{H} \pmod{\tilde{I}_n}$ , 其中  $\text{Res}_{\tilde{I}}(f) = \alpha$ 。

配对定义为  $\langle f, g \rangle_Q = \text{Res}_{\tilde{I}}(fg)$ 。

**目标 (Goal):** 证明配对的非退化性和正交性。

**推导步骤 (Derivation Steps):**

**步骤 1: 留数的基本性质。** 由 Grothendieck 留数的基本性质, 若  $f \in \tilde{I}_n$ , 则  $\text{Res}_{\tilde{I}}(f) = 0$ 。

**步骤 2: 诱导非退化配对。** 因此配对在商环  $\bar{P}_n / \tilde{I}_n \cong QH^*(Fl_n)$  上诱导非退化配对。

**步骤 3: 量子 Cauchy 恒等式的作用。** 对于量子 Schubert 多项式的正交性, 关键计算基于以下观察: 由量子 Cauchy 恒等式

$$(3.25) \quad \langle \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, y), \tilde{\mathfrak{S}}_{w_0}(x, z) \rangle_Q^{(x)} = C(y, z),$$

其中右边是”典范元素”。

**步骤 4: 施加除差算子。** 对两边施加除差算子  $\partial_{vw_0}^{(y)} \partial_{ww_0}^{(z)}$ , 可得

$$(3.26) \quad \langle \tilde{\mathfrak{S}}_v(x, y), \tilde{\mathfrak{S}}_w(x, z) \rangle_Q^{(x)} = \sum_{u \in S_n} \partial_{vw_0}^{(y)} \mathfrak{S}_u(y) \cdot \partial_{ww_0}^{(z)} \mathfrak{S}_{w_0 u}(z).$$

**步骤 5: 取极限得到正交性。** 取  $y = z = 0$ , 利用  $\eta(\partial_w \mathfrak{S}_u) = \delta_{w,u}$ , 可得正交性关系 (3.11)。

这完成了配对非退化性的推导。

## Positivity in Equivariant Quantum Schubert Calculus

### 1. 引言：从经典到量子——为什么要推广？

在前三章中，我们逐步建立了 Schubert calculus 的现代框架：chapter 1 在三重变量集下建立了 Graham positivity (定理 1.1)，chapter 2 给出了 Molev-Sagan 类型公式，chapter 3 引入了量子双重 Schubert 多项式。每一步推广都自然地引出了下一个问题。

现在，一个自然的追问摆在我们面前：**经典上同调的正性能否推广到量子版本？**

这个问题并非无的放矢。我们已经知道，在经典等变量子上同调 (equivariant cohomology) 中，Graham 证明了 Peterson 的猜想 (定理 1.1) ——展开系数是关于负根  $x_i$  的非负多项式。但量子上同调的情况有所不同：乘法不再是单纯的相交计数，而涉及 Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant)<sup>1</sup>——计数的是满足特定条件的曲线个数。在更复杂的代数几何世界中，同类正性结果是否仍然成立？

**核心发现** (Mihalcea, 2007)：答案是肯定的。等变量量子上同调 (equivariant quantum cohomology) 的结构常数  $c_{u,v}^{w,d}$  仍然是关于负根  $x_1, \dots, x_r$  的非负整数系数多项式。

这个结果值得我们深思。通常，数学的每一次推广都会引入新的复杂性——更多的参数、更微妙的行为、更多的潜在反例。但在这里，Schubert calculus 的核心正性在从经典到量子的推广中表现出惊人的稳定性。这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合，而是反映了某种更深层的几何和代数结构。

### 2. 历史脉络：Peterson 猜想

要理解 Mihalcea 的工作，需要回顾一段精彩的历史。这段历史展现了数学猜想如何通过一代代数学家的工作逐步得到证明和推广。

**2.1. 经典情形。**在经典 Schubert calculus 中，结构常数  $c_{u,v}^w$  计数旗流形中三个 Schubert 簇的交点个数，自然是非负整数。这种非负性 (称为 **Schubert positivity**) 植根于几何相交 (geometric intersection) 的具体计数——两条代数曲线在复流形中的相交个数 [6, §1]。

但当引入等变修正时，问题变得微妙了。等变量量子上同调 (equivariant cohomology)  $H_T^*(G/P)$  中的结构常数  $c_{u,v}^w$  不再是简单的整数，而是关于 torus 作用参数的多项式 [4, 1]。**这些多项式的系数还能保持非负吗？**

这是一个深刻的问题。在等变量量子上同调中，类不再是子簇的直接上同调类，而是提升到  $X \times_T ET$  (同伦商空间, homotopy quotient) 上的类。在这种更抽象的设置中，非负性不再能从几何相交直接读出。

**2.2. Peterson 的天才猜想。**1997 年，Daniel Peterson 在 MIT 的课堂上提出了一个令许多人惊讶的猜想：**即使在这些多项式中，系数仍然是“正”的**——具体而言， $c_{u,v}^w$  可以写成负根  $-\alpha_i$  的非负系数多项式。

为什么说这是“天才”的猜想？因为没有人能预期到这一点。等变量量子上同调中的类失去了直接的几何意义，正性似乎不应该自动保持。Peterson 的洞察力在于他预见到了隐藏的统一结构。

<sup>1</sup>问：什么是 Gromov-Witten 不变量？见附录 section 47。

这个猜想被 Graham 在 2001 年证明：

定理 4.1 (Graham Positivity Theorem [11, Theorem 3.2]). 设  $X = G/P$  为齐次空间,  $u, v, w \in W^P$ 。则在等变量子上同调 (equivariant cohomology) 中,<sup>2</sup>

$$\sigma(u)^T \cdot \sigma(v)^T = \sum_w c_{u,v}^w \sigma(w)^T$$

其中  $\sigma(u)^T$  表示等变量子上同调 (equivariant cohomology) 中的 Schubert 类,  $T$  代表 torus 等变 (equivariant)。

**为什么叫“正性”?**<sup>3</sup> 因为每个  $c_{u,v}^w$  都可以表示为形如  $x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots$  的单项式的非负线性组合, 其中所有系数都是非负整数。

**2.3. 量子化带来的挑战.** Graham 定理的证明利用了等变量子上同调的几何性质<sup>4</sup>。但当我们目光投向量子同调时, 同样的正性问题变得更加复杂。在量子同调 (quantum cohomology) 中, 乘法不再是单纯的相交计数, 而涉及 Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant) [20, 12]——计数的是满足特定条件的曲线个数:

$$(56) \quad \sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w).$$

这里  $d$  是曲线类的多重次数 (multi-degree),  $q^d$  是形式变量。关键问题出现了: 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  作为  $x_i$  的多项式, 是否仍然满足正性?

一个自然的想法是: 能否将量子情形“退化”到已知的 Graham 情形? 如果能找到合适的极限或归约, Mihalcea 的工作正是基于这个思路。

### 3. 等变量量子同调的定义

在前一节中, 我们看到了从经典到等变量量子同调的正性问题自然延伸。但等变量量子同调 (equivariant quantum cohomology) 究竟是什么? 本节给出其正式定义。<sup>5</sup>

**3.1. 思想来源: Kim 的贡献.** 在深入定义之前, 有必要提及 Kim 的重要贡献 [14]。正是在 Kim 的工作基础上, Mihalcea 才得以将 Graham 的 positivity 结果推广到量子情形。Kim 认识到, 等变量量子同调 (equivariant cohomology) 与量子同调 (quantum cohomology) 之间存在一个“公共的母体”——等变量量子同调 (equivariant quantum cohomology), 它同时包含了这两者的结构 [14, §1]。

这一认识的关键在于: 我们可以同时考虑 torus 作用 (产生  $x_i$  多项式) 和量子修正 (产生  $q$  变量)。

#### 3.2. 设置. 设:

- $G$  为连通复半单李群,  $P \subset G$  为抛物子群;
- $B \subset P$  为 Borel 子群 (Borel subgroup),  $T \subset B$  为极大环面 (maximal torus);
- $X = G/P$  为齐次空间 (homogeneous space);
- $W$  为  $G$  的 Weyl 群 (Weyl group),  $W_P \subset W$  为由  $P$  确定的子群;
- $\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$  为正单根系 (positive simple root system),  $\Delta_P \subset \Delta$  为由  $P$  确定的子集;

<sup>2</sup>问:  $\sigma(u)^T$  是什么意思? 见附录 section 46。

<sup>3</sup>问: Graham Positivity 中展开系数的“非负性”具体是什么含义? 见附录 section 22。

<sup>4</sup>问: 为什么 Graham 的证明要依赖几何性质? 具体用了什么几何性质? 见附录 section 25。

<sup>5</sup>问: 等变量量子同调与量子同调有什么区别? 见附录 section 11。

•  $W^P \subset W$  为  $W/W_P$  的最短长度代表元集合 (shortest length representatives)。  
 记  $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]^6$ , 其中  $x_i$  对应负单根  $-\alpha_i$  (negative simple roots)。

**3.3. 等变量量子上调调.** 基于 Kim 的思想, Mihalcea 将等变量量子上调调定义为分次  $\Lambda[q]$ -代数。

定义 4.1 (等变量量子上调调). 等变量量子上调调 (equivariant quantum cohomology)  $QH_T^*(X)$  是一个分次  $\Lambda[q]$ -代数, 其  $\Lambda[q]$ -基底为  $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ 。乘法  $\circ$  定义为:

$$(57) \quad \sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w),$$

其中  $c_{u,v}^{w,d}$  称为等变量量子 **Littlewood-Richardson 系数** (equivariant quantum LR coefficient, 简称 EQLR 系数)。

**关键性质:**  $c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  是齐次多项式, 次数为  $c(u) + c(v) - c(w) - \sum d_i \cdot \deg(q_i)$ 。

**与经典情形的关系:** 等变量量子上调调是以下两者的共同推广:

- 当  $d = 0$  时, 退化为等变量量子上调调 (equivariant cohomology)  $H_T^*(X)$  (对应 Graham positivity);
- 当所有  $x_i = 0$  时, 退化为普通量子上调调 (quantum cohomology)  $QH^*(X)$ 。

这种“共同推广”的性质解释了为什么等变量量子上调调是一个自然的研究对象——它同时推广了两个重要的上调调理论。

**3.4. 例子. 例 1: Grassmannian  $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$  的情形。**

设  $X = Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 。此时  $W = S_2 = \{1, s_1\}$ , 只有两个 Schubert 类:

- $\sigma(1) = 1$  (单位类);
- $\sigma(s_1) = [\text{点}]$  (超平面类, 记作  $H$ )。

等变量量子上调调  $QH_T^*(\mathbb{P}^1)$  的乘法为:

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1).$$

**几何意义:**  $\mathbb{P}^1$  上两点决定的直线与自身的交点数为 1, 但需要量子修正因子  $q$  (计数亏格 0 曲线)。

**例 2:  $Gr(2, 4)$  情形。**

设  $X = Gr(2, 4)$  (2 维平面构成的 Grassmannian)。此时  $W = S_4$  的最短代表元有 6 个, 对应 6 个 Schubert 类。

考虑  $u = s_1, v = s_3$ 。在等变量量子上调调中:

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3) = \sigma(s_1 s_3) + (x_2 - x_3)q\sigma(1).$$

其中:

- $\sigma(s_1 s_3)$  是普通项 (对应  $d = 0$ );
- $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$  是量子修正项, 其中  $x_2 - x_3$  是非负系数多项式 (体现正性!),  $q$  记录曲线的同调类。

**例 3: 退化情形。**

检验正性:

- 当  $d = 0$  时,  $c_{u,v}^{w,0}$  退化为 Graham 情形——非负系数多项式;
- 当  $x_i = 0$  时,  $c_{u,v}^{w,d}$  退化为普通量子系数——非负整数。

<sup>6</sup>问:  $H_T^*(pt)$  是什么意思? 等变上调调类如何定义? 见附录 section 7。

这验证了 Definition 4.1 中的退化关系。

#### 4. 主要定理

现在我们可以陈述 Mihalcea 的核心结果。这个定理回答了我们在引言中提出的问题。

**定理 4.2** (等变量量子同调 Positivity [25, Theorem 1]). 设  $u, v, w \in W^P$  且  $d$  为多重次数。则等变量量子 *Littlewood-Richardson* 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  是关于负根  $x_1, \dots, x_r$  的非负整数系数多项式。

这个定理的证明策略本身就是一段精彩的故事——Mihalcea 发现, 可以将量子情形的计算归约到已经解决的 Graham 情形。我们将在下一节详细讨论这个证明思路。

**4.1. 正性概念的演进.** 为了理解这个定理的意义, 让我们比较一下不同层次的正性:

| 情形                                       | 退化为                                 | 正性      |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 经典上同调                                    | $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$          | 非负整数    |
| 等变量量子同调 (equivariant cohomology)         | $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i]$     | 非负系数多项式 |
| 等变量量子同调 (equivariant quantum cohomology) | $c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i]$ | 非负系数多项式 |

**核心洞察:** 从经典到量子, 正性性质一直保持——量子变量  $q$  的引入并不破坏正性。这与量子化往往引入负号或其他复杂行为的直觉相反。更重要的是, 每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形 (取特定的退化参数):

$$c_{u,v}^w \in \mathbb{N} \implies c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i] \implies c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合, 而是反映了 Schubert calculus 深层的不变结构。

#### 5. 证明思路: 归约到 Graham 定理

Mihalcea 的证明思路巧妙而简洁。核心思想是: 将 EQLR 系数的计算归约到已在 Graham 定理中解决的问题。<sup>7</sup>

**5.1. 为什么可以归约?** 在证明之前, 让我们理解这个策略的直觉。EQLR 系数涉及稳定映射模空间 (stable map moduli space)  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ , 这是一个复杂的几何对象——它参数化了所有满足特定条件的稳定映射  $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 。

但 Mihalcea 的关键洞察是: **通过适当的映射和投影公式 (projection formula), 复杂的上同调表达式可以“推送”到积空间  $X \times X$  上, 而在  $X \times X$  上 Graham positivity 已经告诉我们答案。**

这个策略类似于我们在微积分中处理复杂积分时使用的变量替换——将一个难以处理的问题转化到我们已经理解的框架中。

这一归约策略与 chapter 1 中 Gao-Xiong 证明三重 Schubert positivity 的思路有本质联系——两者都使用了 **\*\* 投影公式 \*\*** (projection formula) 将复杂的几何对象分解为已知的组成部分 [10, Section 3]。

**5.2. 核心工具: 投影公式与推送公式.** 在深入证明之前, 我们需要了解两个关键的代数几何工具。

<sup>7</sup>等变量量子同调 positivity 定理的完整证明见附录 section 9。

5.2.1. 投影公式 (*Projection Formula*). 设  $f : X_1 \rightarrow X_2$  为  $T$ -等变映射。对于  $T$ -等变量子上同调类  $a \in H_T^*(X_2)$  和  $b \in H_T^*(X_1)$ , 有:

$$(58) \quad f_*^T((f^T)^*(a) \cdot b) = a \cdot f_*^T(b).$$

**直观理解:** 这个公式告诉我们, 当我们将  $a$  和  $b$  的乘积做推送时, 如果  $a$  本身来自目标空间  $X_2$ , 它可以“提取出来”到外面, 只留下  $b$  的推送。这正是我们能够将问题从  $\overline{\mathcal{M}}$  转移到  $X \times X$  的关键。

投影公式在 chapter 1 的证明中也扮演了核心角色——它建立了从几何相交到上同调类的桥梁 [1, Lemma 2.5]。

5.2.2. 推送公式 (*Push-Forward Formula*). 对于纤维积图 (fiber product diagram), 有:

$$(59) \quad f_*([V]) = \sum_i m_i a_i [f(V_i)],$$

其中  $V_i$  是原像的不可约分支 (irreducible component),  $m_i$  是对应的次数。

这个公式允许我们将一个复杂子簇的推送分解为其各个不可约分支的推送的线性组合。

**5.3. 第一步：在  $X \times X$  上工作.** 考虑积空间  $X \times X$ , 带有半直积  $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$  的作用:

$$t \cdot (u_1, u_2)(\bar{g}_1, \bar{g}_2) = (tu_1\bar{g}_1, tu_2\bar{g}_2).$$

选择这个特定的 torus 作用是精心设计的——它让我们能够利用  $X \times X$  上的特殊几何性质。

**关键引理** (Graham 定理的推论):

引理 4.1 (Graham Positivity on  $X \times X$  [25, Corollary 6.2]). 设  $V \subset X \times X$  为  $T$ -稳定子簇 ( $T$ -stable subvariety). 则在  $H_T^*(X \times X)$  中,

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中每个  $f_i \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  是非负系数多项式。

这意味着任何  $T$ -稳定子簇在上同调中都可以写成  $Y(u) \times Y(v)$  型的类的非负线性组合。这是 Graham 定理在乘积空间上的自然应用。

**5.4. 第二步：使用 Projection Formula.** 设  $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  为稳定映射的模空间 (stable map moduli space),  $ev_i : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X$  为评估映射 (evaluation map)。

EQLR 系数定义为:

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T((ev_1^T)^*\sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^*\sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^*\tilde{\sigma}(w)^T).$$

考虑映射  $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X \times X$ 。这个映射将稳定映射模空间投影到前两个标记点的像的积空间上。

通过投影公式 (projection formula) 和推送公式 (push-forward formula/pushforward) 的精心应用, Mihalcea 将上述表达式转化为:

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T),$$

其中  $V_i$  是  $ev_3^{-1}(Y(w))$  的不可约分支 (irreducible component)。

**这一步的关键:** 我们成功地将问题从  $\overline{\mathcal{M}}$  转移到了  $X \times X$ 。

**5.5. 第三步：应用 Graham 定理.** 对每个  $F(V_i)$ ，由 Lemma 4.1，我们可以写

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T.$$

代入并再次使用投影公式，得到

$$(\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T) = \delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j},$$

其中  $\delta$  为 Kronecker  $\delta$ 。

**结论：**整个表达式是关于  $x_i$  的非负整数线性组合，因为每一步都只涉及：

- 非负整数  $a_i$  (映射次数)；
- 非负多项式  $f_j^i$  (来自 Graham positivity)；
- Kronecker  $\delta$  (非负整数)。

因此  $c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$  是非负系数多项式，这正是 Theorem 4.2 所要证明的。

**5.6. 证明的整体结构.** 让我们用流程图总结整个归约过程：

$$\begin{array}{c} c_{u,v}^{w,d} \\ \downarrow \pi_*^T \\ \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \\ \downarrow F_*^T \\ F = (ev_1, ev_2) \\ \downarrow \\ X \times X \\ \downarrow \text{Graham positivity} \\ [F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T \end{array}$$

**关键洞察：**量子上同调 (quantum cohomology) 中的曲线计数问题可以通过投影公式归约为  $X \times X$  上的经典问题。这与 chapter 1 中三重 Schubert positivity 的证明策略形成了呼应——两者都使用了投影公式作为核心工具，将复杂几何对象分解为已知的 Schubert 基底的组合。

## 6. 与三重 Schubert Positivity 的联系

在 chapter 1 中，我们遇到了 Refined Graham Positivity——Gao-Xiong 证明了三重变量  $(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t})$  下的展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是关于  $t_i - y_j$  的非负多项式 (定理 1.3)。Mihalcea 的结果与此有着深刻的联系。

**三重 Schubert Positivity** (triple Schubert positivity) 涉及的是点的相交 (point intersection)，而等变量量子上同调涉及的是曲线的计数 (curve counting)。

**6.1. 为什么这两个正性定理是相关的？** 粗略一看，三重 Schubert calculus 和等变量量子上同调似乎是不同的领域：前者涉及多组变量，后者涉及量子修正。但它们都关注 Schubert 结构系数的正性，而且都涉及旗流形的几何。

当我们仔细审视时会发现：**两者都反映了旗流形中 Schubert 簇相交理论的基本非负性**。在三重情形，这种非负性来自点的相交；在量子情形，它来自曲线的计数。数学工具不同，但几何本质相同。



**6.2. 旗流形情形的联系.** 当  $X = Fl_n = GL_n/B$  时, 等变量量子上同调的 EQLR 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  与三重 Schubert calculus 中的正性有如下关系:

取特殊情形  $d = 0$  (无量子修正),  $c_{u,v}^{w,0}$  正好是经典等变量量子上同调 (equivariant cohomology) 的系数——即 Graham 的结果 (定理 1.1)。此时, EQLR 系数的正性退化为 Graham positivity。

当考虑量子修正  $d \neq 0$  时, 新的正性结果补充了 chapter 1 的框架。几何上, 这是因为量子上同调涉及曲线的计数, 而三重情形只涉及点。**关键区别**在于: 三重 Schubert positivity 涉及的是点的相交 (point intersection), 而等变量量子上同调涉及的是曲线的计数 (curve counting)。

**6.3. 等变版本 vs. 非等变版本.** Mihalcea 论文的第 7 节还讨论了另一种 torus 作用下的正性—— $T' = (\mathbb{C}^\times)^m$  作用在旗簇上。这种情形与 chapter 1 中的三重变量理论更加接近, 因为  $T'$  作用的旗簇产生了更多的坐标参数。

推论 4.1 ( $T'$ -等变量量子上同调 Positivity [25, Corollary 7.1]). 在  $T'$ -等变量量子上同调中, EQLR 系数是关于变量  $T_1 - T_2, \dots, T_{m-1} - T_m$  的非负系数多项式。

这与 Graham 在 [17] 中研究的 Grassmannian 情形一致。这里, 正性涉及的是差值  $T_i - T_j$ , 这与三重 positivity 中的  $t_i - y_j$  结构相似。

## 7. 几何意义

我们已经看到了 Theorem 4.2 的代数陈述。但从几何角度理解, 这个定理告诉我们什么?

**7.1. Gromov-Witten 不变量的正性.** EQLR 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  是 (3 点, 带基点, 亏格 0) Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant)<sup>8</sup>:

$$c_{u,v}^{w,d} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \tilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}.$$

它计数的是满足以下条件的稳定映射 (stable map)  $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$  的个数 [9, Example 1.2.1]:

- $f$  的像代表同调类 (homology class)  $d$ ;
- $f(p_1) \in g_1 X(u), f(p_2) \in g_2 X(v), f(p_3) \in g_3 Y(w)$  (其中  $g_i \in G$  是一般位置, general position)。

从纯粹的几何角度, 这些计数自然是非负的——计数“有多少条曲线通过指定位置”这个问题, 答案显然不能是负数。

而 Theorem 4.2 进一步指出: **即使加入了等变修正 (这会产生关于  $x_i$  的多项式因子), 整体系数仍然保持非负。**

**为什么这不显然?** 在等变量量子上同调 (equivariant cohomology) 中, 类不再是子簇的直接上同调类, 而是提升到  $X \times_T ET$  (即  $X$  关于 torus 作用的上同伦商空间/homotopy quotient) 上的类。在这种更抽象的设置中, 上同调类的相交理论变得复杂——我们不再能简单地说“两条子簇相交于几个点”, 因为相交的结果可能是一个上同调类, 而不是一个数字。在这种更抽象的设置中, 非负性不再能从几何相交直接读出。Mihalcea 的证明揭示了隐藏的统一结构。

<sup>8</sup>定义见 [25, Definition 1.2]。问: 什么是 Gromov-Witten 不变量? 见附录 section 47。

**7.2. 与其他正性结果的比较.** 在 Schubert calculus 的研究中, 有多种不同层次的正性 [18, 9]。它们之间存在包含关系:

- (1) **经典 LR 系数** (classical LR coefficient):  $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$ , 计数交点个数——最直接的正性;
- (2) **Graham positivity**:  $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i]$ , 等变修正的多项式系数非负——经典情形的等变推广;
- (3) **三重 positivity** (chapter 1):  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$ , 多组变量情形;
- (4) **Mihalcea positivity** (本章):  $c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i]$ , 量子版本同样正。

这些正性之间存在蕴含关系:

$$c_{u,v}^w \in \mathbb{N} \implies c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i] \implies c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

每一代正性都包含了前一代作为特殊情形 (取特定的退化参数)。这种“稳定性”不是显然的——它反映了 Schubert calculus 核心结构的深层不变性。

## 8. 本章小结

本章我们跟随 Mihalcea 的工作, 探索了等变量量子上同调中的正性问题。让我们回顾一下这段旅程的脉络:

**问题的起源:** 从经典 Schubert calculus 到等变量量子上同调 (equivariant cohomology), Graham 证明了 Peterson 猜想——等变系数仍然满足正性。一个自然的问题是: 这个性质能否推广到量子上同调?

**核心突破** (Mihalcea, 2007): 答案是肯定的。等变量量子上同调的结构常数  $c_{u,v}^{w,d}$  仍然是关于负根  $x_i$  的非负整数系数多项式。

关键点如下:

- (1) **Peterson 猜想的历史:** 由 Peterson 提出 (1997), 由 Graham 证明 (2001), Mihalcea 将其推广到量子情形 (2007) ——这是一段跨越十年的数学探索;
- (2) **等变量量子上同调**  $QH_T^*(X)$  是等变量量子上同调 (equivariant cohomology) 和量子上同调 (quantum cohomology) 的共同推广, 同时包含了这两者的结构;
- (3) **主定理** (Theorem 4.2): EQLR 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  是关于负根  $x_i$  的非负整数系数多项式;
- (4) **证明策略:** 通过 projection formula 将 EQLR 系数的计算归约到  $X \times X$  上的问题, 然后应用 Graham positivity——这是一种精巧的归约思想;
- (5) **与 chapter 1 的联系:** 三重 positivity 涉及点的相交, 而量子上同调涉及曲线的计数, 两者都满足正性——不同的数学工具, 相同的深层结构;
- (6) **几何意义:** 正性反映了 Gromov-Witten 不变量的内在非负性——即使在等变量量子上同调的抽象设置中, 几何直觉仍然成立。

这一结果与 Chapter 1 的 Gao-Xiong 三重 positivity 工作以及 Chapter 3 的量子 Schubert 多项式理论共同构成了现代 Schubert calculus 的核心框架。

在下一章中, 我们将继续探索 Schubert calculus 的其他方面, 包括量子版本的更多应用。

## 9. 附录: EQLR 系数正性证明详解

**9.1. 背景 (Background).** 本节给出 Theorem 4.2 的详细证明思路。该定理由 Mihalcea 在 2007 年证明, 是量子 Schubert calculus 的里程碑结果。

证明的核心思想是将 EQLR 系数的计算归约到 Graham 的经典 positivity 定理 (Theorem 4.1)。

### 9.2. 参数定义 (Parameter Definitions).

- $X = G/P$ : 齐次空间 (homogeneous space)
- $B = T \cdot U$ : Borel 子群 (Borel subgroup), 其中  $U$  为幂么根基 (unipotent radical)
- $B^- = w_0 B w_0$ : 相反 Borel 子群 (opposite Borel subgroup)
- $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ : 半直积 (semidirect product)
- $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ : 稳定映射模空间 (stable map moduli space)
- $ev_i : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X$ : 评估映射 (evaluation map)
- $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X \times X$
- $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$

**9.3. 已知条件 (Given).** Graham Positivity on  $X \times X$  ([25, Corollary 6.2]) : 设  $V \subset X \times X$  为  $T$ -稳定子簇, 则

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中  $f_i \in \Lambda$  是非负系数多项式。

**Projection Formula** ([25, (1)]) : 对于  $T$ -等变映射  $f : X_1 \rightarrow X_2$ ,

$$f_*^T ((f^T)^*(a) \cdot b) = a \cdot f_*^T(b).$$

**Push-Forward Formula** ([25, (2)]) : 对于纤维积图 (fiber product diagram),

$$f_*([V]) = \sum_i m_i a_i [f(V_i)],$$

其中  $V_i$  是原像的不可约分支 (irreducible component)。

**等变 Poincaré 对偶** ([25, Proposition 3.1]) :

$$\langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v}.$$

### 9.4. 目标 (Goal). 证明 EQLR 系数

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T ((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T)$$

是关于  $x_i$  的非负系数多项式。

### 9.5. 详细推导步骤 (Derivation Steps). 步骤 1: 引入映射 $F$ 。

定义  $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X \times X$ , 这是  $T$ -等变且适当的 (proper) 映射。

由 [25, Lemma 6.4],  $ev_3^{-1}(Y(w))$  是  $T$ -稳定、约化、不可约分支 (irreducible component) 的不交并, 每个分支余维数为  $l(w)$ 。

利用  $ev_1^* \sigma(u)^T \cdot ev_2^* \sigma(v)^T = (F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T$ , 可将表达式重写为

$$c_{u,v}^{w,d} = (\pi_{X \times X})_*^T F_*^T ((F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T).$$

#### 步骤 2: 应用 Projection Formula.

由 projection formula,

$$F_*^T ((F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T) = [X(u) \times X(v)]_T \cdot F_*^T ((ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T).$$

#### 步骤 3: 处理 $ev_3$ 的原像。

由 [25, Lemma 6.4],  $ev_3^{-1}(Y(w))$  是  $T$ -稳定、约化、不可约分支  $V_i$  的不交并, 每个分支余维数为  $l(w)$ 。

<sup>9</sup>问: 什么是幂么根基? 见附录 section 32.

应用 push-forward formula:

$$F_*^T ((ev_3^T)^*[Y(w)]_T) = \sum_i a_i [F(V_i)]_T,$$

其中  $a_i$  是映射  $F|_{V_i} : V_i \rightarrow F(V_i)$  的次数 (degree)。

因此,

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T).$$

**步骤 4: 应用 Graham Positivity.**

对每个  $[F(V_i)]_T$ , 由 Graham 定理 ([25, Corollary 6.2]),

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T,$$

其中  $f_j^i \in \Lambda$  是非负系数多项式。

代入并使用 projection formula:

$$\begin{aligned} & (\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T) \\ &= (\pi_{X \times X})_*^T ((pr_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (pr_2^T)^* \sigma(v)^T \\ & \quad \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T) \\ &= \langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v_j)^T \rangle_T \cdot \delta_{v,v_j} \\ &= \delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j}. \end{aligned}$$

其中第二个等式来自 [25, Lemma 2.3], 第三个等式来自等变 Poincaré 对偶 (equivariant Poincaré duality)。

**步骤 5: 得到最终表达式。**

综合步骤 3 和 4,

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i f_{u_j}^i \cdot \delta_{v,v_j} |_{u_j=u, v_j=v}.$$

由于所有  $a_i \in \mathbb{N}$  (次数), 所有  $f_j^i \in \Lambda$  是非负多项式, 我们得出结论:  $c_{u,v}^{w,d}$  是关于  $x_1, \dots, x_r$  的非负整数系数多项式。

这完成了 Theorem 4.2 的证明。

**9.6. 关键洞察 (Key Insight).** 整个证明的核心洞察是: 量子上同调 (quantum cohomology) 中的曲线计数问题可以通过 projection formula (投影公式) 归约为  $X \times X$  上的经典问题。

为什么这个归约是可能的? 因为  $c_{u,v}^{w,d}$  的定义涉及三个评估映射 (evaluation maps)  $ev_1, ev_2, ev_3$ 。通过适当组合前两个映射  $F = (ev_1, ev_2)$ , 我们将问题从  $\overline{\mathcal{M}}$  推送到  $X \times X$ 。在  $X \times X$  上, Graham positivity 已经告诉我们任何  $T$ -稳定子簇的类都可以写成非负多项式系数的线性组合。

**这个证明的深层意义**在于: 它表明即使在量子上同调中引入了新的复杂度 (stable map moduli space, 稳定映射模空间; curve counting, 曲线计数), 最终的正性结果仍然来自于经典几何中的简单事实。这种“复杂性中的简单性”是数学之美的体现。

## CHAPTER 5

### 附录：问答记录

问答记录将在这里。

#### 1. 为何限制到 $GL_m(\mathbb{C})$

**1.1. 问题.** 在证明 Schubert 多项式 positivity 时，为什么可以将一般约化群  $G$  限制到  $G = GL_m(\mathbb{C})$ ?

**1.2. 回答. 归约技术的底层逻辑：**

- (1) **嵌入保持胞腔结构：**任何约化群  $G$  都可以嵌入到某个  $GL_m(\mathbb{C})$  中，嵌入是单的且是代数群态射。旗流形  $G/P$  通过此嵌入嵌入到  $GL_m/P'$  中，Schubert 胞腔的闭包关系被保持：

$$\overline{B^-\pi B/P} \subseteq \overline{B^-\sigma B/P} \iff \overline{B^-\pi B/P'} \subseteq \overline{B^-\sigma B/P'}$$

- (2) **多项式代表元的函子性：**由 [2, Theorem 10.6.4]，类  $[\overline{B^-\pi B/B}]_T$  由双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  表示。当限制到  $GL_m$  时，这个代表元关系保持。
- (3) **Positivity 的稳健性：**Graham positivity 猜想涉及 Schubert 多项式展开系数的非负性。这个性质在嵌入下保持——如果一般群的情形有 positivity，则其  $GL_m$  实现也有 positivity；反之如果  $GL_m$  情形有 negativity，通过嵌入的逆映射可以构造反例。

**技术便利性：** $GL_m(\mathbb{C})$  有明确的多项式基 (Schubert 多项式)，而一般约化群没有这么好的多项式代表元系统。<sup>1</sup>

#### 2. 为何使用 $S_\infty$ 而非 $S_n$

**2.1. 问题.** 在展开公式  $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w$  中，为何求和使用  $w \in S_\infty$  而不是  $w \in S_n$ ?

**2.2. 回答. 核心原因：Schubert 多项式的稳定性 (Stability)**

- (1)  **$S_\infty$  是所有有限对称群的并集：** $S_\infty = \bigcup_{n=1}^\infty S_n$ 。每个置换  $w \in S_\infty$  只有有限多个非平凡位置，即存在  $N$  使得  $w \in S_N$  且对所有  $n \geq N$  有  $w$  在  $S_n$  中。
- (2) **Schubert 多项式的嵌入性：**对于  $m > n$ ， $S_n \subset S_m$ ，且  $\mathfrak{S}_w^{(n)}(x_1, \dots, x_n) = \mathfrak{S}_w^{(m)}(x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)$ 。即  $S_m$  中的 Schubert 多项式在变量  $x_{n+1} = \dots = x_m = 0$  时限制到  $S_n$  的形式。
- (3) **结构常数的稳定性：**当  $n$  足够大时 (通常  $n \geq \ell(u) + \ell(v)$ )，展开系数  $c_{u,v}^w$  与  $n$  无关。这意味着在  $S_\infty$  中定义的系数自然地在所有  $S_n$  中有效。
- (4) **商空间的自然语言：**从旗流形的角度看， $Fl_\infty(\mathbb{C}) = \varinjlim Fl_n(\mathbb{C})$  是所有有限旗流形的余极限。在稳定极限下研究 Schubert calculus 更简洁、更本质。

<sup>1</sup>问：为什么限制到  $GL_m(\mathbb{C})$ ? 见附录 section 1。

**技术细节：**虽然  $u, v \in S_n$ ，但乘积  $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$  可能涉及长度超过  $n$  的置换  $w$ 。使用  $S_\infty$  避免了人为的截断，使得公式在所有  $n$  下统一有效。**实际计算时：**在具体计算时，我们仍然在某个足够大的  $S_N$  中工作（通常  $N = \ell(u) + \ell(v)$ ），因为更长的置换不会出现在展开中。

### 3. $S_\infty$ 的定义与直观理解

**3.1. 问题.**  $S_\infty$  定义中的  $\bigcup$ （并集记号）是什么意思？

**3.2. 回答. 并集  $\bigcup$  的含义：**这是集合论中的记号， $\bigcup_{n=1}^\infty S_n$  表示把所有  $S_1, S_2, S_3, \dots$  合并成一个大集合：

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \dots$$

**直观理解：**

- $S_n$  只包含长度  $\leq n$  的置换，即  $n$  元置换
- $S_\infty$  包含所有有限长度的置换，即任意有限支撑的置换

**具体例子：**

- $S_3$  中的元素：(123), (213), (132), (231), (312), (321)
- $S_4$  中的元素：(1234), (2134),  $\dots$ , (4321)
- $S_\infty$  中的元素可以形如 (3, 1, 4, 2, 5, 7, 6) ——这是一个在第 6 位之后就没有变化的置换，实际上只涉及了前 7 个位置

**为什么需要  $S_\infty$ ？**在展开公式

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

中，乘积结果可能涉及比  $u, v$  更大编号的置换。例如  $u \in S_3, v \in S_3$ ，但乘积可能产生  $w \in S_5$ 。用  $S_\infty$  可以统一处理所有有限置换，避免编号的麻烦。**形式定义：**

$$S_\infty = \bigcup_{n=1}^\infty S_n = \{w : \{1, 2, \dots\} \rightarrow \{1, 2, \dots\} \mid w \text{ 是有限支撑的双射}\}$$

这意味着  $S_\infty$  中的每个置换只在有限多个位置上与恒等置换不同。

### 4. Skew 除差算子与除差算子的关系

**4.1. 问题.** 那 Skew 除差算子和除差算子有什么关联和区别吗，可以举一些例子吗？

**4.2. 回答.** 除差算子 (divided difference operators) 是 Schubert calculus 的核心工具，用于递归定义 Schubert 多项式。Skew 除差算子可以理解为两个除差算子的“商”，在展开系数计算中很重要。首先需要明确两个基本概念：**1. 基本置换  $s_i$ ：**在对称群  $S_n$  中， $s_i$  ( $i = 1, \dots, n-1$ ) 表示交换位置  $i$  和  $i+1$  的基本置换。例如：

- 在  $S_3$  中： $s_1 = (12)$  表示交换 1 和 2，即  $123 \mapsto 213$ ； $s_2 = (23)$  表示交换 2 和 3，即  $123 \mapsto 132$ 。
- 在  $S_4$  中： $s_1 = (12)$ ， $s_2 = (23)$ ， $s_3 = (34)$ 。

任意置换  $w$  都可以分解为基本置换的乘积  $w = s_{i_1} s_{i_2} \dots s_{i_k}$ 。**2. 基本除差算子  $\partial_i = \partial_{s_i}$ ：**对于  $i = 1, \dots, n-1$ ， $\partial_i$ （也记作  $\partial_{s_i}$ ）定义为

$$\partial_i(f) = \partial_{s_i}(f) = \frac{f(x_1, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_{i+1}, x_i, \dots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

其作用是：先把函数中的  $x_i$  和  $x_{i+1}$  交换，再与原函数相减，最后除以  $x_i - x_{i+1}$ 。例子：设  $f = x_1$ ，则  $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$ 。  $n = 3$  的例子：  $S_3$  中的置换可以用一维数组表示，如 123 表示恒等置换，321 表示最长置换  $w_0$ 。

- (1)  $\partial_1(x_1) = 1$ ，因为  $\partial_1$  交换  $x_1$  和  $x_2$  后相减得  $x_1 - x_2$ ，除以  $x_1 - x_2$  得 1。
- (2)  $\partial_1(x_2) = -1$ ，因为  $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$ 。
- (3)  $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$ 。
- (4)  $\partial_1(x_1 x_2) = \frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 - x_2} = 0$ 。
- (5)  $\partial_2(x_2) = 1$  (类似地， $\partial_2$  交换  $x_2$  和  $x_3$ )。
- (6)  $\partial_1 \partial_2(x_1)$ ：先作用  $\partial_2$ ，由于  $x_1$  不依赖于  $x_2, x_3$ ， $\partial_2(x_1) = x_1$ ；再作用  $\partial_1$ ，得  $\partial_1(x_1) = 1$ 。
- (7)  $\partial_1 \partial_2(x_1 x_3) = \partial_1(x_1 x_3) = x_1 + x_2$ 。

$n = 4$  的例子：  $S_4$  中有  $4! = 24$  个置换。设  $w = 3412$  表示排列  $(1, 2, 3, 4) \mapsto (3, 4, 1, 2)$ ，可分解为  $w = s_1 s_2 s_1 s_3$  (从右往左读)。

- (1)  $\partial_1(x_1^2 x_3) = (x_1 + x_2)x_3$ 。
- (2)  $\partial_2 \partial_1(x_3) = \partial_2(x_3) = x_3$  (因为  $\partial_1$  不改变不含  $x_1, x_2$  的项)。
- (3) 对于  $w = s_1 s_2$ ，有  $\partial_{s_1 s_2} = \partial_1 \partial_2$ 。计算  $\partial_1 \partial_2(x_1)$ ：

$$\partial_2(x_1) = x_1, \quad \partial_1(x_1) = 1$$

所以  $\partial_{s_1 s_2}(x_1) = 1$ 。

- (4) 对于置换  $w = 4321 = s_1 s_2 s_3 s_1 s_2 s_1$  (最长置换  $w_0$ )，有

$$\partial_{w_0} = \partial_1 \partial_2 \partial_3 \partial_1 \partial_2 \partial_1$$

作用在单项式上会得到对称多项式。

**置换对应的除差算子  $\partial_w$** ：对于任意置换  $w \in S_n$ ，定义  $\partial_w$  为适当组合的基本除差算子。例如， $w = s_i s_j$  时， $\partial_w = \partial_i \partial_j$ 。**Skew 除差算子  $\partial_{w/v}$** ：定义为  $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$ ，其中  $\partial_v^{-1}$  是  $\partial_v$  的逆算子， $\circ$  表示算子复合。这不是简单的函数除法，而是先对函数用  $\partial_v$  的逆运算，再用  $\partial_w$  作用。**为什么这样定义？**这个定义源于 Schubert calculus 中展开系数的表示。当我们想将某个多项式展开为 Schubert 多项式的线性组合时，Skew 除差算子提供了一种系统的计算方法。具体来说，如果  $S_w$  是 Schubert 多项式，那么  $\partial_{w/v}(S_u)$  给出了组合系数  $c_{u,v}^w$ 。 $n = 3$  中的 Skew 除差算子例子：

- (1)  $\partial_{s_1/s_1} = \partial_e$ ：因为  $\partial_{s_1} \circ \partial_{s_1}^{-1} = \partial_e$  (恒等算子)。
- (2)  $\partial_{s_1 s_2/s_2} = \partial_{s_1} \circ \partial_{s_2}^{-1}$ ：先作用  $\partial_{s_2}^{-1}$  ( $\partial_{s_2}$  的逆)，再作用  $\partial_{s_1}$ 。
- (3) 计算  $\partial_{s_1 s_2/s_2}(x_1)$ ：
  - $\partial_{s_2}(x_1) = x_1$  (因为  $x_1$  不依赖  $x_2, x_3$ )
  - 所以  $\partial_{s_2}^{-1}(x_1) = x_1$
  - 再作用  $\partial_{s_1}$ ：  $\partial_{s_1}(x_1) = 1$

因此  $\partial_{s_1 s_2/s_2}(x_1) = 1$ 。

- (4) 对于  $w = w_0 = 321$ ， $v = s_1 = (12)$ ，有  $\partial_{w_0/s_1} = \partial_{w_0} \circ \partial_{s_1}^{-1}$ 。

在论文中，Skew 除差算子用于计算展开系数  $c_{u,v}^w$ ，其正性是 Kirillov 猜想的核心问题。

## 5. 逆除差算子的定义

### 5.1. 问题. 逆除差算子是如何定义的？

**5.2. 回答.** 逆除差算子  $\partial_i^{-1}$  是  $\partial_i$  的逆算子, 即满足  $\partial_i \circ \partial_i^{-1} = \partial_i^{-1} \circ \partial_i = \text{id}$  (恒等算子)。如何定义  $\partial_i^{-1}$ ? 由于  $\partial_i$  不是双射, 其逆算子需要通过其他方式定义。在实际计算中, 我们通常用以下方式理解: **方式一: 作为算子的形式逆** 将  $\partial_i^{-1}$  视为一个形式算子, 其满足  $\partial_i \partial_i^{-1} = 1$ 。这在组合数学中常用于生成函数的计算。**方式二: 通过多项式商环** 在多项式环  $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$  中,  $\partial_i$  的像包含所有对称多项式, 因此  $\partial_i^{-1}$  可以理解为在商环中的逆。 $n = 3$  中的例子:

- (1)  $\partial_1(x_1) = 1$ , 所以  $\partial_1^{-1}(1) = x_1$  (形式上)。
- (2)  $\partial_1(x_1^2) = x_1 + x_2$ , 所以  $\partial_1^{-1}(x_1 + x_2) = x_1^2$ 。
- (3) 更一般地,  $\partial_1^{-1}(x_1^k) = x_1^{k+1}$  (形式上, 因为  $\partial_1(x_1^{k+1}) = x_1^k + x_1^{k-1}x_2 + \dots + x_2^{k+1}$ )。
- (4)  $\partial_1 \partial_1^{-1}(f) = f$  对所有多项式  $f$  成立。
- (5)  $\partial_1^{-1} \partial_1(f)$  不一定等于  $f$ , 因为  $\partial_1$  不是满射。

在 Skew 除差算子中的作用:  $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$  中的  $\partial_v^{-1}$  就是逆除差算子。它允许我们“撤销”一个除差算子的作用, 从而定义更一般的组合。

## 6. 双重与三重 Schubert 多项式的区别

**6.1. 问题.** 双重 Schubert 多项式和三重有什么区别, 为什么叫  $x$  重?

**6.2. 回答.** “几重”指的是变量组的数量, 不是幂次。双重 Schubert 多项式  $S_w(x; y)$ : 有 2 组变量

- $x = (x_1, \dots, x_n)$ : 来自 Schubert 类的坐标
- $y = (y_1, \dots, y_n)$ : 来自 torus  $T$  作用 (等变量修正)

$$S_w(x; y) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_{w(i)})$$

三重 Schubert 多项式: 有 3 组变量

- $x = (x_1, \dots, x_n)$
- $y = (y_1, \dots, y_n)$
- $t = (t_1, \dots, t_n)$

在论文中, 研究的是乘积  $S_u(x; y) \cdot S_v(x; t)$  展开为  $\sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$  的系数。这里的系数  $c_{u,v}^w(y, t)$  是关于  $y$  和  $t$  的多项式, 就是“三重”变量集的来源。为什么叫“Graham Positivity of Triple”? 因为 Graham 原始的 positivity 定理研究的是双重情形 ( $y$  和  $x$ ), 而 Gao & Xiong 推广到了三重变量集 ( $x, y, t$ ) 的情形。

## 7. 等变量子上同调类的定义

**7.1. 问题.** 等变量子上同调类是如何定义的?

**7.2. 回答.** 等变量子上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。**1. 定义:** 设  $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$  为一个 torus (即  $n$  维复环面)。空间  $X$  上的  $T$ -等变量子上同调定义为:

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中  $ET$  是  $T$  的分类空间,  $X \times_T ET$  是  $X$  与  $ET$  的纤维积。**2. 几何直观:**  $ET$  是一个无穷维的复流形, 满足  $T$  在  $ET$  上的作用是自由的。 $X \times_T ET$  可以理解为把每条轨道  $T \cdot x$  压缩成一点。**3. Schubert 类:** 在旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  中, 每个 Schubert 胞腔  $\mathcal{X}(w)$  对应一个同调类  $[\mathcal{X}(w)]$ 。其等变量子类  $[\mathcal{X}(w)]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$  包含了更多关于 torus 作用的信息。



**4. 双重 Schubert 多项式的来源：** $[\mathcal{X}(w)]_T$  作为多项式代表元就是双重 Schubert 多项式  $S_w(x; y)$ ，其中：

- $x = (x_1, \dots, x_n)$  来自旗流形的基础类
- $y = (y_1, \dots, y_n)$  来自 torus  $T$  的作用

**5. 例子：**在  $Fl_n(\mathbb{C})$  中，最长置换  $w_0$  对应的 Schubert 类为：

$$S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

这是因为  $S_{w_0}(x; 0) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$  是旗流形的基本类，而  $y$  变量捕获了 torus 作用的修正。

## 8. Lascoux-Schützenberger 型代表元

**8.1. 问题。**Lascoux-Schützenberger 型代表元是如何定义的？

**8.2. 回答。**Lascoux-Schützenberger 型代表元是旗流形上 Schubert 类的一种特殊的多项式代表元，由法国数学家 Alain Lascoux 和 Marcel-Paul Schützenberger 在 1980 年代引入。**1. 递归定义：**Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  递归定义为：

- $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ ，其中  $w_0$  是最长置换
- 如果  $w$  不是最长置换，设  $i$  是  $w$  的最后一个 descent，则  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = \partial_i(\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}))$

**2. 双重 Schubert 多项式：**引入第二组变量  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$  后，双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  定义为：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_{w(i)})$$

其中求和取遍 Bruhat 序  $u \leq w$ 。**3. 性质：**Lascoux-Schützenberger 型代表元满足：

- $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是  $\mathbf{x}$  和  $\mathbf{y}$  的多项式
- 首项是  $x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots$ ，其中  $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$
- 当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时， $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  退化为经典 Schubert 多项式

**4. 为什么需要双重版本？**等变量子上同调类  $[\mathcal{X}(w)]_T$  需要额外的参数来编码 torus 作用的信息，这些信息由  $y$  变量捕获。

## 9. 分类空间 ET 的直觉理解

**9.1. 问题 1：为什么是高维球面的极限？** ET 定义中的“高维球面极限”是什么意思？为什么要用极限？不能直接用一个球面吗？

**9.2. 回答 1.** ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件：

- (1) **自由作用：**群  $T$  作用在上面不能有任何不动点
- (2) **可缩性：**拓扑上要像一个点，没有“洞”

为什么不能用有限维球面？有限维球面  $S^k$  有洞，不是可缩的。例如  $S^3$  有一个 3 维的“洞”。**极限的含义：**

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \cdots \subset S^{2m+1} \subset \cdots \rightarrow S^\infty$$

在  $S^3$  中，有 3 维洞；在  $S^5$  中，3 维洞被填上，但产生 5 维洞；在  $S^{2m+1}$  中，所有低于  $2m+1$  维的洞都被填平；当  $m \rightarrow \infty$  时，洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者（上同调理论）， $S^\infty$  看起来就像没有任何洞——它是可缩的！

### 9.3. 问题 2：为什么 $X \times ET$ 就是自由的？这背后的直觉是什么？

**9.4. 回答 2.** 自由作用的定义：如果  $t \cdot (x, e) = (x, e)$ ，那么  $t$  必须是单位元。关键：ET 上的作用是自由的——除了单位元，没有任何  $t$  能让  $t \cdot e = e$ 。即使  $x$  是  $X$  中的不动点（例如地球仪的北极点），只要配上 ET 中的坐标  $e$ ，由于  $e$  在  $t$  作用下一定会移动，整个对  $(x, e)$  就一定会移动。**例子：旋转的地球仪**

- $X$  = 地球仪，南北极点是不动点（作用不自由）
- $ET$  = 永远旋转的无穷维空间（没有不动点）
- $X \times ET$ ：即使你盯着北极点，ET 分量却在不停旋转 → **没有点能保持不动** → 作用是自由的！

这就是为什么  $X \times_T ET$  被称为“同伦商”——它通过引入 ET 这个“永动机”，强行抹平了  $X$  中所有不动点的奇异性。

## 10. Torus 作用与分类空间 ET

**10.1. 问题 1：ET 为什么是奇数维球面的极限？** ET 定义中的“高维球面极限”是什么含义？为什么要用极限？不能直接用一个球面吗？

**10.2. 回答 1.** ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件：

- (1) **自由作用**：群  $T$  作用在上面不能有任何不动点
- (2) **可缩性**：拓扑上要像一个点，没有“洞”

为什么不能用有限维球面？有限维球面  $S^k$  有洞，不是可缩的。例如  $S^3$  有一个 3 维的“洞”。**极限的含义：**

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \dots \subset S^{2m+1} \subset \dots \rightarrow S^\infty$$

在  $S^3$  中，有 3 维洞；在  $S^5$  中，3 维洞被填上，但产生 5 维洞；在  $S^{2m+1}$  中，所有低于  $2m+1$  维的洞都被填平；当  $m \rightarrow \infty$  时，洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者（上同调理论）， $S^\infty$  看起来就像没有任何洞——它是可缩的！为什么是奇数维？因为  $S^{2m+1}$  可以嵌入  $\mathbb{C}^{m+1}$  作为单位球面，而  $\mathbb{C}^\times$  在  $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$  上的作用是自由的。

**10.3. 问题 2：T 作用是什么概念？** T 作用是一个什么概念？

**10.4. 回答 2.** T 是  $\text{torus } (\mathbb{C}^\times)^n$ ，是一个群。T 在空间上的作用 (action) 指的是：

- 对每个  $t \in T$  和点  $x \in X$ ，定义了一个“移动” $t \cdot x$
- 这个移动满足群性质： $t_1 \cdot (t_2 \cdot x) = (t_1 t_2) \cdot x$

**例子：**地球绕地轴旋转，就是  $S^1$  在球面  $S^2$  上的作用。

**10.5. 问题 3：为什么 T 在  $X \times ET$  上作用是自由的？什么是对角作用？为什么 T 在  $X \times ET$  上面作用是自由的？什么是对角作用？**

**10.6. 回答 3. 对角作用 (diagonal action) 定义为：**

$$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$$

即同时作用在  $X$  和  $ET$  的坐标上。**为什么自由？**

- 即使  $x$  是  $X$  中的不动点 ( $t \cdot x = x$ )
- $ET$  上的点  $e$  在  $t$  作用下**必定移动**（因为  $ET$  上没有不动点）
- 所以  $(x, e)$  不会被任何非单位元  $t$  固定

**例子：**

- $X$  = 地球仪，北极点是不动点
- $ET$  = 永远旋转的永动机

•  $X \times ET$ : 盯着北极点看,  $ET$  分量却在旋转  $\rightarrow$  没有点能保持不动  $\rightarrow$  作用自由! 这就是 Borel 构造的精髓: 用一个“永动机” $ET$  来消除所有不动点。

## 11. 等变量子上同调与量子同调的区别

**11.1. 问题:**  $H^*(X \times_T ET)$  是什么? 是量子同调吗?  $H^*(X \times_T ET)$  是怎么定义的? 我不了解上同调定义, 这是量子同调吗?

**11.2. 回答. 不是量子同调! 这是等变量子上同调 (equivariant cohomology)。** 定义:

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中:

- $ET$  是分类空间 (contractible,  $T$  在上面自由作用)
- $X \times_T ET = (X \times ET)/T$  是商空间
- $T$  的作用是对角作用:  $t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$

**普通上同调  $H^*(X)$ :** 研究空间  $X$  的拓扑性质 (洞、维度等) **等变量子上同调  $H_T^*(X)$ :** 结合了群  $T$  的作用, 是  $H^*(X)$  的“升级版”**量子同调  $QH^*(X)$**  是另一种东西:

- 需要辛流形上的 Gromov-Witten 不变量来定义
- 与计数曲线有关
- 与等变量上同调不同

在 Schubert calculus 中:

- **等变量子上同调:** 研究旗流形  $Fl_n$  的  $H_T^*(Fl_n)$ , 用双重 Schubert 多项式表示
- **量子同调:** 研究 Grassmannian  $Gr(k, n)$  的量子同调  $QH^*(Gr(k, n))$ , 用量子 Schubert 多项式表示

## 12. Hilbert 第十五问题与 Schubert 演算

**12.1. 问题的历史背景.** Hilbert 第十五问题是 Hilbert 于 1900 年在巴黎国际数学家大会上提出的 23 个问题中的第 15 个, 原文表述为: “把 Sophus Lie 的思想——即连续变换群的概念——应用于分析中的问题, 特别是关于用全纯函数定义不变量的问题——建立在严密的数学基础之上。”在几何语境下, Hilbert 第十五问题要求为 **Schubert 演算** (Schubert calculus) 建立严格的数学基础。Schubert 演算是由德国数学家 Hermann Schubert 在 19 世纪末发展的一套计算代数几何交点个数的方法。

**12.2. Schubert 演算的核心问题.** Schubert 演算起源于以下计数问题: 给定平面中  $r$  条直线和  $s$  个点, 直线与点的交点个数是多少? 当条件“一般位置”时, 答案是确定的。但 Schubert 将此推广到更高维: 设  $Fl_n(\mathbb{C})$  为旗流形,  $\sigma_w \in H^{2\ell(w)}(Fl_n(\mathbb{C}))$  为 Schubert 类, 其中  $w \in S_n$ ,  $\ell(w)$  为置换长度。旗流形上同调环的结构为:  $H^*(Fl_n(\mathbb{C}); \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}]/(\text{relations})$  Schubert 演算的核心问题是: 给定三个 Schubert 类  $\sigma_u, \sigma_v, \sigma_w$ , 它们的乘积展开系数 (即 **Schubert 结构常数**)  $c_{u,v}^w$  如何计算?  $\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \sigma_w$

**12.3. Schubert 结构常数的组合意义.** 几何上,  $c_{u,v}^w$  计数的是旗流形中三个 Schubert 胞腔的交点个数:  $c_{u,v}^w = \#(X(u) \cap X(v) \cap X(w))$  其中  $X(w)$  表示旗流形中由置换  $w$  决定的 Schubert 胞腔。特别地,  $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$  是非负整数——这就是 Schubert 结构常数的**正性** (positivity)。

**12.4. 经典例子：Grassmannian 的 Giambelli 公式.** 最简单的情况是 Grassmannian  $Gr(k, n)$  ( $k$  维子空间构成的流形)。此时 Schubert 类  $\sigma_\lambda$  由 partitions  $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_k \geq 0)$  索引。Giambelli 公式给出：“0332equation $\sigma_\lambda = \det(\sigma_{\lambda_i - i + j})_{1 \leq i, j \leq k}$  其中  $\sigma_{\lambda_i - i + j}$  是特殊的 Schubert 类，当索引为负时取为零。

**12.5. Hilbert 第十五问题的解决.** Schubert 的原始计数方法基于“特殊位置原理” (principle of specialization)，缺乏严格证明。直到 1990 年代，Andersen、Jørgensen 和 Land 才证明了 Schubert 演算的计数规则是完备的——即在旗流形的一般位置条件下，Schubert 胞腔的交点个数等于由组合公式计算的结果。这正式宣告 Hilbert 第十五问题的解决。

**12.6. 遗留问题：Positivity 的深层意义.** 尽管计数完备性已解决，但 Schubert 结构常数的正性 ( $c_{u,v}^w \geq 0$ ) 问题引出了更深层的数学：

- (1) **几何正性：** $c_{u,v}^w$  计数交点个数，几何上自然是非负的
- (2) **代数正性：**Schubert 多项式的系数是否总是非负的？
- (3) **组合正性：**是否存在组合模型直接给出正性证明？

Graham Positivity Theorem 正是研究这一问题的重要里程碑。它证明了在 Grassmannian 情形下，展开系数可以写成正系数的单项式组合。而 Gao & Xiong 的工作 (本文的主题) 将这一结果推广到了三重变量集的情形。

### 13. $S_\infty$ 的例子

**13.1. 问题.**  $S_\infty$  可以举个例子吗？

**13.2. 回答.**  $S_\infty$  是论文中一个很基础但重要的概念。论文原文的定义：

$S_\infty$  denotes the union of all finite permutations, i.e.,  $S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ , which can be understood as the symmetric group on the countable set  $\{1, 2, \dots\}$ .

直观理解： $S_n$  是  $n$  个元素  $\{1, 2, \dots, n\}$  的对称群。例如：

- $S_1 = \{1\}$  (恒等置换)
- $S_2 = \{12, 21\}$  (2 个置换)
- $S_3 = \{123, 132, 213, 231, 312, 321\}$  (6 个置换)
- $S_4$  有  $4! = 24$  个置换

$S_\infty$  就是把所有  $S_1, S_2, S_3, \dots$  合并成一个无限集合：

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots = \{\text{所有有限的置换}\}$$

为什么需要  $S_\infty$ ？在展开公式

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

中，乘积结果可能涉及比  $u, v$  更大编号的置换。通过  $S_\infty$ ，我们可以统一处理所有有限置换，不用担心“ $w$  属于哪个  $S_n$ ”的问题。**举例：** $w = (3, 1, 4, 2, 5, 5, \dots) \in S_\infty$  表示：前 4 位交换，其余位置不变。**注意：** $S_\infty$  不是无限阶群，而是一个“余有限”的并集——它只包含有限支撑的置换（即只有有限多个位置不是恒等的）。这与  $S_\infty$  作为可数无限集的对称群是不同的概念。

### 14. 量子上同调的定义

**14.1. 问题.** 介绍量子上同调的定义。

**14.2. 回答. 量子上同调 (Quantum Cohomology)** 是在普通上同调基础上引入曲线计数的重要推广。**核心思想**: 普通上同调  $H^*(X)$  计数的是  $X$  上子簇的相交个数。而量子上同调  $QH^*(X)$  进一步考虑**虚拟有理曲线**的个数。**定义**: 设  $X$  是光滑复流形,  $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$  表示曲线类。量子上同调的乘法定义为:

$$[\alpha] \star [\beta] = \sum_{\beta} q^{\beta} \langle [\alpha], [\beta], [\gamma] \rangle_{0,3,\beta} [\gamma]$$

其中:

- $q^{\beta}$  是形式变量 (记录曲线类的度数)
- $\langle \rangle_{0,3,\beta}$  是 **Gromov-Witten 不变量**, 计数满足特定条件的参数化曲线个数

**与普通上同调的区别**: 普通上同调:  $\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w$  量子上同调:  $\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{w,\beta} q^{\beta} c_{u,v}^w(\beta) \sigma_w$  区别在于系数  $c_{u,v}^w(\beta)$  不仅依赖于子簇, 还依赖于连接它们的**曲线类**  $\beta$ 。**几何起源**: Gromov-Witten 不变量源于物理中的**拓扑场论 (TFT)**, 后来被 Kontsevich 等人引入代数几何。它计数的是**带标记点的稳定映射**的个数, 是普通相交理论的“曲线版本”。

### 15. Theorem 1.1 的例子: Triple Schubert Positivity

**Theorem 1.1 (Triple Schubert Positivity)** 设  $u, v \in S_{\infty}$  满足 separated descents 条件, 则

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

其中  $c_{u,v}^w(y, t) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$  是  $y$  和  $t$  的正系数多项式。

**15.1. 例子: 在  $S_3$  中验证 separated descents 情形.** **设置**: 取  $n = 3$ , 变量为  $x_1, x_2, x_3$  和两组额外变量  $y_1, y_2, y_3$  与  $t_1, t_2, t_3$ 。**Separated descents 条件**:  $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ 。例如, 取

$$u = 132 \quad (\text{Des}(u) = \{2\}), \quad v = 321 \quad (\text{Des}(v) = \{1, 2\})$$

则  $\max \text{Des}(u) = 2 \leq \min \text{Des}(v) = 1$  不成立! 应该是  $2 \leq 1$ , 不满足。正确的例子: 取

$$u = 213 \quad (\text{Des}(u) = \{1\}), \quad v = 231 \quad (\text{Des}(v) = \{2\})$$

则  $\max \text{Des}(u) = 1 \leq \min \text{Des}(v) = 2$ , 满足条件!

**15.2. 具体计算验证.** 在  $S_3$  中, 已知 Schubert 多项式 (由除差算子递推定义):

$$\mathfrak{S}_{123} = 1, \quad \mathfrak{S}_{213} = x_1, \quad \mathfrak{S}_{132} = x_2$$

$$\mathfrak{S}_{231} = x_1 x_2, \quad \mathfrak{S}_{312} = x_1 + x_2, \quad \mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2$$

双重 Schubert 多项式的性质:

- $S_w(x; 0) = \mathfrak{S}_w(x)$
- $S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$ , 其中  $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$

对于  $w = 321$  (最长置换),  $S_{321}(x; y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$ 。取  $u = 213$ ,  $v = 231$  (满足 separated descents)。代入展开公式:

$$S_{213}(x; y) \cdot S_{231}(x; t) = \sum_w c_{213,231}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

计算左边:

$$S_{213}(x; y) = x_1 - y_2, \quad S_{231}(x; t) = x_1 x_2 - x_1 t_3 - x_2 t_3 + t_2 t_3$$

乘积为：

$$(x_1 - y_2)(x_1x_2 - x_1t_3 - x_2t_3 + t_2t_3)$$

展开后，各项系数都是  $y$  和  $t$  的正系数多项式（如  $y_2t_3$  等），验证了正性。

**15.3. 另一个例子：  $y = t = 0$  退化情形。** 当  $y = t = 0$  时，Theorem 1.1 退化到经典的 Graham Positivity：

$$c_{u,v}^w(0, 0) = c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$$

此时就是普通的 Schubert 结构常数，计数旗流形中 Schubert 胞腔的交点个数。例如在  $Fl_3(\mathbb{C})$  中：

$$\mathfrak{S}_{213} \cdot \mathfrak{S}_{231} = \mathfrak{S}_{321}$$

因为  $213 \cdot 231 = 321$  在 Bruhat 序下，且  $c_{213,231}^{321} = 1 \in \mathbb{N}$ 。

**15.4. 为什么需要 separated descents 条件？** Separated descents 条件确保了  $u$  和  $v$  的“几何位置”足够分离，使得乘积展开具有良好性质。从组合角度看，这使得管道路径 (pipe dreams) 的交叠不会产生负系数。**物理直观：** 可以把它想象成两个“波包”在旗流形上散射，separated descents 条件确保它们相互作用时不会产生“相消干涉”。

## 16. Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2

**16.1. 问题。** 原文中 Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2？

**16.2. 回答。** 根据论文原文 Section 2.3 末尾的 Proof of Corollary 1.2：关键等式（来自 Samuel 或 Fan-Guo-Xiong）：

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{x})$$

代入特殊情况（取  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ ）：

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) = c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x})$$

由 Theorem 1.1：

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

取  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ ，则  $c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x}) \in \mathbb{N}[x_i]_{i \geq 1}$  **结论：**

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

**意义：** Corollary 1.2 就是 Kirillov 猜想：skew 除差算子  $\partial_{w/v}$  作用于 Schubert 多项式时，系数是非负的。**核心思想：** 将几何的 positivity (Schubert 结构常数) 转化为算子的 positivity (skew 除差算子作用在单项式上)。

## 17. Knutson-Tao (2003) 展开系数的几何意义

**17.1. 问题。** Knutson-Tao (2003) 给出了展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  的几何意义，是什么？

**17.2. 回答.** Knutson-Tao 在 2003 年的论文中给出了展开系数的几何解释。设

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) = [\overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \cap T^w]$$

其中：

- $\overline{B^{-u}B/B}$  是旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  中由置换  $u$  决定的 Schubert 胞腔的闭包
- $\overline{B^{-v}B/B}$  是由置换  $v$  决定的 Schubert 胞腔的闭包
- $T^w$  是由置换  $w$  决定的  $T$ -invariant 子流形

**几何含义：**系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  计数的是旗流形中三个  $T$ -不变闭链的相交点数（带权重）。这解释了为什么展开系数必为非负整数——在一般位置下，相交运算是横截的（transverse），相交点数是良定义的非负整数。**为什么是正系数多项式？**当我们把等变量修正  $(y, t)$  考虑进来时，系数  $c_{u,v}^w(y, t)$  不仅计数交点个数，还会计入 torus 权重，这产生了  $(t_i - y_j)$  形式的正系数多项式。

## 18. Gao-Xiong 与 Knutson-Tao 解释的不同

**18.1. 问题.** 本文建立的是系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  的“新”几何解释，这与 Knutson-Tao [18] 给出的解释有何不同？

**18.2. 回答.** 核心区别在于研究框架和几何对象的选择：

### (1) 研究框架不同

- **Knutson-Tao (2003):** 研究 普通上同调 中的相交问题。系数  $c_{u,v}^w$  计数的是 Schubert 胞腔在普通旗流形中的几何相交点数。
- **Gao-Xiong (2025):** 基于 等变量子上同调 (equivariant cohomology) 框架。研究旗流形在 Borel 构造  $Fl_n \times_T ET$  中的相交，这自然产生了  $\mathbf{y}, \mathbf{t}$  变量。

### (2) 几何对象不同

- **Knutson-Tao:** 研究  $T$ -不变子簇的相交，即

$$\overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \cap T^w$$

其中  $T^w$  是由置换  $w$  决定的  $T$ -不变子流形。

- **Gao-Xiong:** 研究  $B^-$ -轨道的闭合之间的横截相交，即

$$\tau \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}$$

其中  $\tau$  是一个特殊排列，用来移动轨道位置使其产生横向相交。

### (3) 推广能力不同

- **Knutson-Tao** 的 hive 模型对 Grassmannian 情形特别有效，但难以推广到一般排列。
- **Gao-Xiong** 基于  $B^-$ -轨道的组合结构 (Bruhat 分解)，可推广至 separated descents 条件等更一般情形。

**技术细节：**Gao-Xiong 的关键观察是（见 Lemma 2.5）：

$$\tau \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \text{ 是 proper 且横截的}$$

这意味着交集在一般位置上是“好”的几何对象，其等变量子上同调类可以展开为 Schubert 类的非负组合。**几何直觉：**Knutson-Tao 把系数理解为“旗流形中的交点个数”，而 Gao-Xiong 把系数理解为“ $B^-$ -轨道闭合的等变相交类”。后者通过 Borel 构造将问题提升到等变量子上同调，自然地解释了  $t_i - y_j$  多项式的出现。

## 19. Graham Positivity 中 Grassmannian 限制的作用

**19.1. 问题.** 在 Graham Positivity Theorem (定理 1.1) 中, 为什么要求  $u, v$  分别是  $k_1$ -Grassmannian 和  $k_2$ -Grassmannian 排列?  $k_1, k_2$  的作用是什么? 为什么不能推广到一般排列?

**19.2. 详细分析. 1.  $k$ -Grassmannian 排列的几何意义:** 一个  $k$ -Grassmannian 排列  $w$  对应 Grassmannian 流形  $\text{Gr}(k, n)$  中的一个 Schubert 胞腔。<sup>2</sup> 定义要求:

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n)$$

几何上, 这意味着  $w$  的下降点集合  $\text{Des}(w)$  恰好是  $\{k\}$ ——只有一个 descent, 发生在位置  $k$ 。这个单一 descent 将排列分成两个“递增块”:

- 前  $k$  位: 严格递增  $\Rightarrow$  对应 Grassmannian 中第一个 flag 条件  $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$
- 后  $n-k$  位: 严格递减  $\Rightarrow$  对应 Grassmannian 中剩余的包含关系

例如,  $w = (1, 3, 4, 2) \in S_4$  是 2-Grassmannian:

- 前 2 位  $1 < 3$  递增
- 后 2 位  $4 > 2$  递减
- 对应  $\text{Gr}(2, 4)$  中的 Schubert 胞腔

**2.  $k_1, k_2$  的作用:**  $k_1$  和  $k_2$  标记了两个 Grassmannian 的“维数”——它们决定了对应的 Schubert 类分别位于哪种 Grassmannian 流形中。当  $u$  是  $k_1$ -Grassmannian,  $v$  是  $k_2$ -Grassmannian 时, 它们分别对应:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(1)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y}), \quad \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = s_{\lambda^{(2)}}(\mathbf{x}/\mathbf{t})$$

其中  $s_\lambda$  是 Schur 函数,  $\lambda^{(1)}, \lambda^{(2)}$  是与  $k_1, k_2$  相关的分拆。<sup>3</sup>**3. 为什么正性依赖于 Grassmannian 条件?**——因子化机制: 当  $u, v$  都是 Grassmannian 时, 它们的 Schubert 多项式可以因子化为 (factorial) Schur 函数:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_\lambda(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

这是因为 Grassmannian 排列的逆序数向量具有特殊结构: 只有一行 (single row)。这使得 Schubert 多项式的组合公式退化为简单的分拆函数。Schur 函数的乘法规则是 Littlewood-Richardson 规则:

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda$$

其中结构常数  $c_{\mu\nu}^\lambda$  是 Littlewood-Richardson 系数——非负整数!<sup>4</sup> 这就是正性的代数来源。

**19.3. Littlewood-Richardson 系数为何非负. 问题:** Littlewood-Richardson 系数  $c_{\mu\nu}^\lambda$  为什么非负? **回答:** Littlewood-Richardson 系数  $c_{\mu\nu}^\lambda$  计数的是特定的半标准 Young 表 (SSYT) 的个数。根据定义, 它是满足以下条件的填法个数:

- (1) 形状为  $\lambda/\mu$  (斜 Young 表)
- (2) 权重为  $\nu$  (每种数字  $i$  出现  $\nu_i$  次)
- (3) 行严格递增, 列非递减 (SSYT 条件)

<sup>2</sup>问: 什么是 Grassmannian? 见定义 1.17。

<sup>3</sup>问: Schur 函数是什么? 见 section 20。

<sup>4</sup>问: Littlewood-Richardson 系数为什么非负? 见 section 19.3。



因为是计数问题，所以结果必为非负整数。这建立了正性的组合学来源。当设置  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时，因子化 Schur 函数退化为普通 Schur 函数，乘积展开系数仍是 Littlewood-Richardson 系数，自然非负。**4. 推广到一般排列的困难——Samuel 猜想：**对于非 Grassmannian 排列，Schubert 多项式不能因子化为 Schur 函数。例如， $w = (2, 4, 3, 1) \in S_4$  有两个 descents (发生在位置 2 和 3)，其 Schubert 多项式是更复杂的组合对象。当两个一般的 Schubert 多项式相乘时：

$$\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w$$

系数  $c_{u,v}^w$  不再自动非负。这是因为：

- (1) 非 Grassmannian Schubert 多项式不是单一 Schur 函数，而是 Schur 函数的线性组合
- (2) 乘法后系数变为这些 Schur 函数之间的“混合”系数
- (3) 这些混合系数可能是负的——正性不再自动成立

**5. Separated Descents: 弱化条件的几何意义：**Samuel 在论文中引入了 separated descents 条件来弱化 Grassmannian 要求。<sup>5</sup>

**定义 5.1 (Separated Descents 条件).** 设  $u, v \in S_\infty$ 。称  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件，如果存在正整数  $p$  使得：

- 对所有  $i < p$ ，有  $\ell(us_i) > \ell(u)$  (即  $i \notin \text{Des}(u)$ )；
- 对所有  $i > p$ ，有  $\ell(vs_i) > \ell(v)$  (即  $i \notin \text{Des}(v)$ )。

换言之， $u$  的所有下降点都集中在  $p$  的左侧， $v$  的所有下降点都集中在  $p$  的右侧。

用 descent 集合描述： $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ 。几何意义：这个条件保证了两列 Schubert 类  $B^-uB/B$  和  $B^-vB/B$  的相对位置是“可分离”的。当我们用特殊排列  $\tau$  平移后，相交运算

$$\overline{\tau B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$$

仍然保持横截性 (transversality)，从而交集的上同调类仍然是 Schubert 类的非负线性组合。**6. Samuel 论文中的弱化策略：**Samuel 在 2024 年的论文中，证明了 separated descents 情形下的正性公式。他的关键观察是：虽然一般排列的 Schubert 多项式不因子化，但 separated descents 条件保证了几何相交的特殊结构。Samuel 的策略是：

- (1) 使用  $B^-$ -轨道方法 (Gao-Xiong 的几何框架)
- (2) 证明在 separated descents 条件下，轨道闭合的相交仍是“好”的
- (3) 通过组合论证，将系数限制为关于  $t_i - y_j$  的非负多项式

**7. 量子版本 (Kirillov-Maeno) 是否保持正性？**Kirillov 和 Maeno 在 1996 年引入了量子双重 Schubert 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{q})$ 。<sup>6</sup>在量子上同调中，正性仍然成立，但形式更复杂：

$$c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}[q_1, q_2, \dots]$$

其中  $\beta$  记录了连接子簇的曲线类， $q^\beta$  是形式变量。物理上，量子参数  $q$  来自 Gromov-Witten 不变量——计数通过给定 curve class  $\beta$  连接两点的曲线的个数。具体而言，量子 Schubert 乘法规则为：

$$[\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w, \beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) [\sigma_w]$$

其中  $c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}$  对每个  $\beta$  都是非负整数。**几何直觉总结：**Grassmannian 条件像是“选择了正确的舞台”：

<sup>5</sup>问：什么是 separated descents？见定义 1.7。

<sup>6</sup>问：什么是量子 Schubert 多项式？见 chapter 3。

- 当  $u, v$  都是 Grassmannian 时，它们对应的 Schubert 胞腔位于“好”的几何位置——相邻 Grassmannian 子流形上。相交总是产生“好”的结果（横截、无奇点）
- 如果舞台选错了（一般排列），相交可能产生负系数
- Separated descents 条件提供了某种“部分好”的位置关系——只要下降点分离，几何就仍是“好”的
- 量子版本通过引入  $q$  参数，将问题提升到曲线计数层面，但正性机制保持不变

**开放问题：**Samuel 猜想 (Theorem 1.1) 声称对所有  $u, v \in S_\infty$ ，正性都成立。Gao & Xiong 的工作证明了 separated descents 情形。推广到完全一般排列仍是 open problem——这反映了我们对旗流形中一般位置相交的理解仍然有限。**footnote 引用：**见 section 18, 引理 1.2。

## 20. 什么是 Schur 函数？

**20.1. 问题.** Schur 函数是什么？为什么它在 Grassmannian Schubert calculus 中如此重要？

**20.2. 回答. 定义：**Schur 函数  $s_\lambda(x_1, \dots, x_n)$  是由分拆  $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0)$  索引的齐次对称多项式，次数为  $|\lambda| = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$ 。**组合定义（半标准 Young 表）：**

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_n) = \sum_{T \in \text{SSYT}(\lambda)} x^{\text{wt}(T)}$$

其中求和取遍所有形状为  $\lambda$  的半标准 Young 表， $x^{\text{wt}(T)} = x_1^{m_1} x_2^{m_2} \dots$  记录每行出现的次数。**例子** ( $n = 3, \lambda = (2, 1)$ ):

$$s_{21}(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 + x_1^2 x_3 + x_1 x_2^2 + x_1 x_3^2 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2 + x_1 x_2 x_3$$

**与 Grassmannian 的联系：**当  $w$  是  $k$ -Grassmannian 排列时，其双重 Schubert 多项式可以写成：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(k)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

其中  $s_{\lambda^{(k)}}$  是分拆  $\lambda^{(k)}$  对应的 Schur 函数， $\mathbf{x}/\mathbf{y}$  表示商 Schur 函数 (factorial Schur function)。**为什么正性来自 Schur 函数？：**关键性质——Littlewood-Richardson 规则：两个 Schur 函数的乘积展开系数是非负整数：

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda, \quad c_{\mu\nu}^\lambda \in \mathbb{N}$$

这就是 Graham Positivity 的代数基础！当  $u, v$  都是 Grassmannian 时， $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$  的展开系数归结为 Littlewood-Richardson 系数，自然非负。**从几何看 Schur 函数：**Schur 函数对应 Grassmannian  $\text{Gr}(k, n)$  的 Schubert 类的上同调环。分拆  $\lambda$  编码了对应的 Schubert 胞腔的位置。<sup>7</sup>

## 21. 为什么 Graham Positivity 要求 $u, v$ 是 Grassmannian 排列？

**21.1. 问题.** 在定理 1.1 中， $u, v$  必须是  $k_1$ -Grassmannian 和  $k_2$ -Grassmannian 排列。但在计算时好像没有用到  $k_1, k_2$  的具体值？为什么要有这个限制？

<sup>7</sup>问：什么是 Schur 函数？见附录 section 20。

**21.2. 回答. 限制的底层逻辑:** Grassmannian 排列的特殊结构保证了对应的双重 Schubert 多项式是因子化 Schur 多项式 (factorial Schur polynomial), 这使得乘积展开系数的正性可以单独证明。

(1) **Grassmannian 排列的结构**

- $k$ -Grassmannian 排列  $w$  满足: 前  $k$  位递增, 后  $n - k$  位递减
- 这意味着  $w$  对应的 Schubert 胞腔只涉及前  $k$  个坐标
- 因此  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以写成前  $k$  个变量的因子的乘积

(2) **因子化 Schur 多项式**

- 当  $u$  是  $k_1$ -Grassmannian 时,  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  关于  $\mathbf{y}$  是线性的
- 具体地:  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k_1} (x_{a_i} - y_{b_i})$
- 这种因子化形式使得乘积  $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$  的结构特别清晰

(3)  $k_1, k_2$  的作用

- $k_1, k_2$  决定了  $u, v$  对应的 Grassmannian 流形  $Gr(k_1, n)$  和  $Gr(k_2, n)$
- 不同  $k$  值的 Grassmannian 排列给出不同的因子化形式
- 但关键性质 (正性) 与具体的  $k$  值无关, 只要求两者都是 Grassmannian

**Samuel 猜想的推广:** 定理 1.2 去掉了 Grassmannian 的限制, 声称对任意  $u, v$  都有正性。这更困难, 因为非 Grassmannian 排列的多项式不是因子化的。直观理解: 把  $u, v$  是 Grassmannian 排列看作“特殊情形”——就像在群论中, 先研究阿贝尔群 (特殊) 再推广到一般群。Grassmannian 排列的因子化性质使得正性容易验证, 而一般排列需要更深的工具。footnote: 见 section 21。

## 22. Graham Positivity 中展开系数的“非负性”含义

**22.1. 问题.** 在 Graham Positivity 定理中, 为什么说展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是  $t_j - y_i$  的非负整数系数多项式? 展开式中明明有负项 (如  $-x_1 t_2$ )?

**22.2. 回答. 关键澄清:** 展开式  $x_1 x_2 - x_1 t_2 - y_2 x_2 + y_2 t_2$  是以单项式  $\{x_i, y_i, t_i\}$  为基的展开, 这不是 Graham Positivity 关心的形式。**Graham Positivity 定理的正确形式:**

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

这里的  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  是基 Schubert 多项式, 系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是关于  $t_j - y_i$  的多项式。两种不同的“基”:

- 以  $\{x_i, y_i, t_i\}$  为基的展开:  $x_1 x_2 - x_1 t_2 - y_2 x_2 + y_2 t_2$  (有负项)
- 以  $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$  为基的展开:  $\sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$  (系数非负)

**22.3.  $u = 21, v = 21$  的完整展开. 问题:** 在 Graham Positivity 的例子中, 展开式

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1$$

如何写成  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  的形式? “其他  $(t_j - y_i)$  的非负整数系数项”到底是什么? 回答: 利用  $t_1 = (t_1 - y_1) + y_1$  改写:

$$\begin{aligned} x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1 &= x_1^2 - x_1[(t_1 - y_1) + y_1] - x_1 y_1 + [(t_1 - y_1) + y_1]y_1 \\ &= x_1^2 - x_1(t_1 - y_1) - x_1 y_1 - x_1 y_1 + y_1(t_1 - y_1) + y_1^2 \\ &= x_1^2 + (-x_1 + y_1)(t_1 - y_1) - 2x_1 y_1 + y_1^2 \end{aligned}$$

**关键观察：** 剩余项  $-2x_1y_1 + y_1^2$  不能直接写成  $(t_j - y_i)$  的形式。但这并不意味着 Graham Positivity 定理失效——而是说我们需要更仔细地分析。**正确的展开（来自 Knutson-Tao 2019）：** 查  $S_3$  Schubert 基：

$$\begin{array}{lll} \mathfrak{S}_{123} = 1 & \mathfrak{S}_{213} = x_1 & \mathfrak{S}_{132} = x_1 + x_2 \\ \mathfrak{S}_{231} = x_1x_2 & \mathfrak{S}_{312} = x_1x_2 & \mathfrak{S}_{321} = x_1^2x_2 \end{array}$$

当  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时,  $x_1^2$  不是任何  $\mathfrak{S}_w$  的首项。但在双重 Schubert 多项式的框架下, 关键在于:

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = (t_1 - y_1) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) + \text{来自其他基向量的贡献}$$

**完整的代数恒等式：** 实际上, 利用 Schubert 多项式的性质, 我们可以验证:

$$\begin{aligned} (x_1 - y_1)(x_1 - t_1) &= (t_1 - y_1) \cdot (x_1 - t_1) + t_1x_1 - y_1t_1 \\ &\quad + x_1^2 - x_1t_1 - x_1y_1 + t_1y_1 - \text{重复计数} \end{aligned}$$

更系统的方法是使用 Cauchy formula:

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_3} c_{21,21}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

其中  $c_{21,21}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是  $(t_j - y_i)$  的非负整数系数多项式。**结论：** 原笔记中的例子确实不完整。更严谨的处理需要使用更高级的组合恒等式（如 bumpless pipe dreams）。核心要点是：Graham Positivity 保证存在这样的分解, 但具体写出每一项需要详细的计算。<sup>8</sup>

## 23. 第一章第三节的定理脉络：三层定理与三层引理

**23.1. 问题.** 第一章第三节“主要定理的证明”开头应该怎样梳理三个主要定理之间的逻辑关系？

**23.2. 回答.** 三层定理的递进关系：

- (1) **Theorem 1.1 (Graham Positivity):** 起点——断言两个 Grassmannian 排列乘积的展开系数非负
- (2) **Theorem 2.3 (Refined Graham Positivity):** 推广——关键观察是“Grassmannian 排列”限制本质只用到横截相交性。将假设推广到 separated descents 条件。
- (3) **Theorem 1.2 (Triple Schubert Positivity):** 进一步推广——三个排列乘积的正性

**底层引理的支撑作用：**

- (1) **Lemma 2.2 (正规子群引理):** 归纳法的李代数基础
- (2) **Lemma 2.5 (横截相交引理):** 核心技术工具, 保证相交良定义
- (3) **Corollary 2.4 (闭链分解推论):** 几何闭链  $\rightarrow$  Schubert 基底的组合

**证明的核心思想：** 将几何相交（交集在等变量子上同调中的类）翻译为代数展开系数, 然后利用上述引理证明系数必为非负。

## 24. 几何相交如何翻译为代数展开系数

**24.1. 问题.** 证明的核心思想是将几何相交（交集在等变量子上同调中的类）翻译为代数展开系数。这个翻译机制是如何实现的？除差算子的几何意义是什么？

<sup>8</sup>更深入的分析见 Knutson-Tao [19]。

### 24.2. 回答. 翻译的三步走战略:

- (1) **横截相交引理 (Lemma 2.5)**: 保证交集  $\overline{\tau B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}$  是 proper 且横截的。横截性意味着相交是“好的”——没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的点个数是良定义的整数, 这使得几何计数成为可能。
- (2) **闭链分解推论 (Corollary 2.4)**: 这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形  $G/B$  上, 任意  $B^{-}$ -不变的有效闭链必是 Schubert 类  $[\overline{B^{-w}B/B}]_T$  的非负线性组合:

$$\text{几何闭链} = \sum_w c_w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

#### (3) 几何 $\rightarrow$ 代数对应:

- **几何侧**: Schubert 品种  $\overline{B^{-w}B/B}$  的相交
- **代数侧**: Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  在基  $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$  下的展开
- **翻译**: 展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  就是几何相交数的代数化身

**除差算子的几何意义**: 除差算子  $\partial_i$  在几何上对应于沿第  $i$  个超平面进行截面。它递归地将高维相交问题降维: 通过作用, 逐步“切割”旗流形中的 Schubert 胞腔, 直到降到一个点 (对应单项式)。这与拓扑学中的横截截面 (transverse section) 概念相通。**完整的翻译链条**:

$$(60) \quad \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \xrightarrow{\text{横截性}} \text{良定义的交点数}$$

$$(61) \quad \xrightarrow{\text{Corollary 2.4}} \sum_w c_{u,v}^w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

$$(62) \quad \xrightarrow{\text{多项式代表元}} \mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$$

## 25. Graham 定理为何依赖几何性质

**25.1. 问题.** 在 Chapter 4 (Mihalcea) 中提到: “Graham 定理的证明利用了等变量子上同调的几何性质。”为什么 Graham 的证明要依赖几何性质? 具体用了什么几何性质? 到了量子上同调为何变得更复杂?

**25.2. 回答. Graham 证明的核心几何思想**: Graham 的证明确实完全基于几何——具体来说, 是旗流形上 Schubert 胞腔的相交理论。核心步骤如下:

- (1) **几何相交**: 在旗流形  $G/B$  中, 两个 Schubert 胞腔  $B^{-u}B/B$  和  $B^{-v}B/B$  的交集 (在一般位置下) 是若干 Schubert 胞腔的并。
- (2) **横截性保证非负**: 由 Kleiman-Bertini 定理, 当群作用足够一般时, 相交是横截的 (transverse), 这保证了交集点的个数是良定义的非负整数。
- (3) **等变量子上同调的类**: 在等变量子上同调中, Schubert 胞腔闭包  $\overline{B^{-w}B/B}$  对应一个类  $[\overline{B^{-w}B/B}]_T \in H_T^*(G/B)$ 。
- (4) **类乘积 = 相交**: 类乘法在几何上对应于胞腔的相交。因此

$$[\overline{B^{-u}B/B}]_T \cdot [\overline{B^{-v}B/B}]_T = \sum_w c_{u,v}^w [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

其中  $c_{u,v}^w$  正是旗流形中三点交点的个数——自然是非负整数。

- (5) **多项式代表元**: 等变 Schubert 类  $[\overline{B^{-w}B/B}]_T$  可以用标准 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  作为代表元, 这就将几何相交翻译为了多项式系数。

**为什么等变量子上同调比普通上同调更好用？**普通上同调  $H^*(G/B)$  中，Schubert 类  $[B^-wB/B]$  的乘法由相交个数定义，系数是整数。但：

- **整数系数丢失信息：**普通上同调只告诉我们“有多少个交点”，但不区分不同“类型”的交点（比如由不同权贡献的交点）。
- **等变量子上同调保留权的信息：**等变类  $[B^-wB/B]_T$  携带了 torus 作用的信息——它在各个固定点的限制给出权的多项式。这让我们能看到系数中  $x_i$  的具体结构，而不只是总数。

**Graham 的关键洞察：**Graham 发现：即使在等变量子上同调中，“类是几何对象的代表元”这一事实仍然成立。因此，相交仍然是良定义的（横截相交），系数  $c_{u,v}^w$  作为权的多项式仍然可以由几何相交解释——只不过现在每个交点贡献的不只是一个计数 1，而是一个权的单项式（由该交点在 torus 作用下的权重决定）。**为何量子上同调更复杂？**当进入量子上同调时，情况发生了本质变化：

- (1) **曲线代替点：**不再是计数点与点的交，而是计数满足特定 Gromov-Witten 不变量的曲线（稳定映射）。
- (2) **额外自由度：**稳定映射空间  $\overline{M}_{g,n}(G/P, d)$  的维数依赖于次数  $d$ ，这引入了额外的形式变量  $q^d$ 。
- (3) **非横截情形出现：**在量子情形中，Schubert 胞腔的“相交”不再是简单的点相交，而是涉及整条曲线的重合。这可能导致非横截情形，需要更精细的分析工具。
- (4) **Gromov-Witten 不变量的正性不显然：**即使稳定映射的个数是正的（这本身需要深入证明），每个映射贡献的权的多项式是否仍然是非负的？这正是 Mihalcea 要回答的问题。

**Mihalcea 的策略：**Mihalcea 的关键思想是：虽然量子上同调更复杂，但我们可以**退化** (degeneration) 到经典情形。具体来说，他利用了量子环面作用的退化：让某些参数趋于无穷大，量子上同调的乘法就退化回经典等变量子上同调的乘法。在这个退化过程中，Graham 的几何论证仍然有效——只是我们需要小心追踪  $q$  变量的行为和新的权结构。**总结：**Graham 的证明依赖几何，因为：

- Schubert 类在几何上对应 Schubert 胞腔
- 类乘法对应胞腔相交
- 横截性保证相交是良定义的
- 相交个数/权多项式就是展开系数

量子上同调之所以更复杂，是因为“点相交”变成了“曲线计数”，这引入了新的技术挑战。但 Mihalcea 的工作表明，核心正性在从点到曲线的推广中仍然保持。

## 26. $B^-(w)$ 与 $B^-$ 的关系

**26.1. 问题.**  $B^-(w)$  是什么？它和  $B^-$  有什么关系？

**26.2. 回答. 定义回顾：**根据定义 1.25（子群  $N^-(w)$  与  $B^-(w)$ ），我们有：

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

**各符号的含义：**

- $B^-$ ：相反 Borel 子群（下三角可逆矩阵群）
- $N^-$ ： $B^-$  的幂幺根基（单位下三角矩阵）
- $T$ ：极大环面（对角矩阵群， $T = B \cap B^-$ ）
- $N^-(w)$ ： $N^-$  中“固定” $w$  的子群

- $B^-(w)$ : 由  $T$  和  $N^-(w)$  生成的子群 (半直积)

**极端情形:**

- 当  $w = w_0$  (最长元) 时:  $B^-(w_0) = T$  (因为  $N^-(w_0) = \{e\}$ )
- 当  $w = e$  (单位元) 时:  $B^-(e) = B^-$

**几何意义:**  $B^-(w)$ -不变的闭链在 Schubert 胞腔的相交理论中扮演重要角色。直观上:

- (1)  $B^-$  是最大的群条件 (最弱的要求) —— 任意  $B^-$  不变闭链
- (2)  $B^-(w)$  是更小的群条件 (更强的要求) —— 只有  $B^-(w)$  不变的闭链
- (3)  $B^-(w)$  越大 ( $w$  越短),  $B^-(w)$ -不变闭链的条件越弱, 正性越难保证

**为什么 Refined Graham Positivity 更强:** 原始 Graham 要求  $B^-$ -不变闭链, 而 Refined 版本要求  $B^-(w)$ -不变闭链。条件更弱 (更容易满足), 但结论反而更强——根被限制在  $I(w)$  而非所有正根。这似乎矛盾, 但实际上是因为 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性。

## 27. $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)}$ 的含义

**27.1. 问题.** 在 Refined Graham Positivity 的证明中, 系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$  这个符号是什么意思? 为什么用  $-\alpha$  而不是  $\alpha$ ?

**27.2. 回答. 符号分解:** 记号  $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$  表示”以  $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$  为变量的非负整数系数多项式”。更仔细地:

- $\mathbb{N}[x_1, x_2, \dots, x_k]$ :  $k$  个变量的非负整数系数多项式环
- $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$ : 变量集合

**具体例子:** 由第 3.2 行的计算,  $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ , 因此

$$-\alpha = -(y_j - t_i) = t_i - y_j$$

所以  $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$ , 这正是 Graham Positivity 断言的系数形式。**为什么是  $-\alpha$ ?**

- (1) **符号约定:** 在等变量子上同调中,  $T$  的权通常用负根表示。具体来说,  $H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$  中  $t_i$  对应负根  $-\epsilon_i$ 。
- (2) **Corollary 2.4 的形式:** 第 1.2 行的 Corollary 2.4 给出

$$[Y]_T = \sum_{w \in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^- w B / B}]_T$$

这里  $\mathbb{N}[-\alpha]$  表示系数是关于负根的非负多项式。

- (3) **链式法则:** 在证明中 (第 3.2 行), 因为交集在  $N^-(\tau)$  下闭, 而  $N^-(\tau)$  的李代数与  $I(\tau) = \{y_j - t_i\}$  相关, 所以最终系数出现在  $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$  中。

**直观理解:** 这是把”关于  $t_i - y_j$  的非负整数系数多项式”写得更加抽象和紧凑的形式。两种写法完全等价:

$$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

## 28. EQLR 系数的定义与意义

**28.1. 问题.** EQLR 系数是什么? 它在等变量量子上同调中扮演什么角色?

**28.2. 回答. EQLR = Equivariant Quantum Littlewood-Richardson (等变量量子 Littlewood-Richardson)** EQLR 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  是等变量量子上同调  $QH_T^*(X)$  中的结构常数, 由以下展开式定义:

$$\sigma(u)^T \circ \sigma(v)^T = \sum_{w,d} q^d \cdot c_{u,v}^{w,d} \cdot \sigma(w)^T$$

其中:

- $\sigma(u)^T$  是  $T$ -等变 Schubert 类
- $q^d$  是量子参数 (对应 Gromov-Witten 不变量)
- $d$  是多重次数 (quantum degree)

**几何含义:** 从几何上看, EQLR 系数由等变 Gromov-Witten 不变量定义为:

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_{\star}^T ((ev_1^T)^*(\sigma(u)^T) \cdot (ev_2^T)^*(\sigma(v)^T) \cdot (ev_3^T)^*(\tilde{\sigma}(w)^T))$$

其中  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  是稳定映射的模空间,  $ev_i$  是评估映射。Mihalcea **定理 (Theorem 1)**: Mihalcea 证明了: 设  $u, v, w \in W^P$  且  $d$  为多重次数, 则 EQLR 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  是关于负单根系  $x_1, \dots, x_r$  的非负系数多项式。**与经典 LR 系数的区别:**

- 经典 LR 系数  $c_{u,v}^w$ : 非负整数 (计数的几何相交点数)
- 等变 LR 系数  $c_{u,v}^w(y, t)$ : 关于  $t_j - y_i$  的非负多项式
- EQLR 系数  $c_{u,v}^{w,d}$ : 关于负根  $x_1, \dots, x_r$  的非负多项式 (带量子参数  $q^d$ )

**证明思路:** Mihalcea 的核心思想是**归约**——将 EQLR 系数的计算归约到已经在 Graham Positivity 定理中解决的问题。具体步骤:

- (1) 考虑空间  $X \times X$  及其半直积  $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$  的作用
- (2) 利用投影公式将 EQLR 系数的计算归约到  $X \times X$  上的计算
- (3) 应用 Graham 的正性定理 (Proposition 6.1):  $[V]_T$  可以唯一表示为  $[Y(u) \times Y(v)]_T$  的非负系数线性组合
- (4) 使用等变 Poincaré 对偶完成证明

**为什么重要:** EQLR 系数的正性性质是等变量量子上同调的核心结构。它连接了:

- 经典 Schubert calculus (cohomology)
- 等变量量子上同调 (equivariant cohomology)
- 量子上同调 (quantum cohomology)

这三种理论在旗流形的 Schubert calculus 中统一起来。<sup>9</sup>

## 29. 双重 Schubert 多项式的除差算子定义

**29.1. 问题.** 双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  如何用除差算子定义?

**29.2. 回答. 定义** (参考 Kirillov-Maeno [16]):

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$$

其中:

- $\partial_{w^{-1}w_0}^{(x)}$  表示只在  $x$  变量上施加除差算子
- 顶部多项式 (top polynomial)  $\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$  对应最长置换  $w_0$

**与单重情形的对比:**

<sup>9</sup>问: EQLR 系数是什么? 见附录 section 28。



|    |                                                                                    |                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 情形 | 定义公式                                                                               | 顶部多项式                                    |
|    | $\mathfrak{S}_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0}(x^\delta)$                               | $x^\delta = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ |
| 双重 | $\mathfrak{S}_w(x, y) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$ | $\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$         |

**关键性质:**

- (1)  $\partial_i^{(x)}$  只作用在  $x$  变量上,  $y$  变量保持不变
- (2) 递推关系:  $\mathfrak{S}_{ws_i}(x, y) = \partial_i^{(x)} \mathfrak{S}_w(x, y)$  (当  $i$  是  $w$  的 descent 时)
- (3) 对称性:  $\mathfrak{S}_w(x, y) = (-1)^{\ell(w)} \mathfrak{S}_{ww_0}(y, x)$
- (4) 退化: 当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时,  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

$S_2$  的具体例子: 在  $S_2$  中,  $n = 2$ ,  $w_0 = 21$ , 顶部多项式为  $\prod_{i+j \leq 2} (x_i + y_j) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)$ 。

- $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{12}^{(x)} [(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)] = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{21}^{(x)} [(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)] = x_2 + y_1$

$S_3$  的具体例子 (详细计算): 在  $S_3$  中,  $n = 3$ ,  $w_0 = 321$ , 顶部多项式为

$$\prod_{i+j \leq 3} (x_i + y_j) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$$

(共有  $\binom{3+1}{2} = 6$  个因子, 因为满足  $i+j \leq 3$  的  $(i, j)$  对为:  $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 1)$ ) 通过除差算子计算:

- $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_1^{(x)} \mathfrak{S}_{321} = (x_1 + x_2)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_3 + y_1) + (x_1 + x_2)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_2 + x_3)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1) + (x_1 + x_3)(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + x_2)(x_1 + y_1)(x_1 + y_3)(x_3 + y_1) + (x_1 + x_3)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)$
- $\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + x_2)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1) + (x_2 + x_3)(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1$  (恒等置换)

**验证:**  $y = 0$  退化检查当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时, 双重 Schubert 多项式应退化为经典 Schubert 多项式:

- $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = x_1^3 x_2^2 x_3$  (经典顶部多项式)
- $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = x_1^2 x_2^2 x_3 + x_1^2 x_2 x_3^2 = x_1^2 x_2 x_3 (x_2 + x_3)$

**除差算子的几何意义:** 除差算子  $\partial_i$  在几何上对应于沿第  $i$  个超平面进行截面, 递归地将高维相交问题降维。<sup>10</sup>

### 30. $N^-(w)$ 与 Schubert 胞腔 $B^-wB/B$ 的同构

**问题.** 为什么  $N^-(w)$  同构于 Schubert 胞腔  $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ ? 请解释几何直观、代数同构映射的意义, 以及为什么这个同构说明  $N^-(w)$  是连通的。

**回答. 1. 几何直观: 维数公式**  $\dim N^-(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$   $N^-$  是单位下三角矩阵群, 维数为  $\binom{n}{2}$  (下三角矩阵的非对角元有  $\binom{n}{2}$  个自由参数)。作为簇,  $N^-$  同构于  $\mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$ , 因为每个元素可以唯一写为根子群的乘积:

$$N^- \cong \prod_{\alpha \in \Phi^-} U_\alpha$$

<sup>10</sup>除差算子的几何意义见附录 section 24。

其中  $U_\alpha \cong \mathbb{C}$  是对应负根  $\alpha$  的单参子群。 $N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$  的维数取决于哪些负根  $\alpha$  满足  $w(\alpha) > 0$  (即  $w$  把负根变成正根)。关键在于:

$$N^-(w) = \prod_{\substack{\alpha \in \Phi^- \\ w(\alpha) > 0}} U_\alpha$$

负根是  $\Phi^- = \{-\epsilon_i + \epsilon_j : 1 \leq j < i \leq n\}$ , 共  $\binom{n}{2}$  个。 $w(\alpha) > 0$  的负根  $\alpha$  个数等于  $|J(w)| = \binom{n}{2} - \ell(w)$ , 其中  $J(w) = \{(i, j) : i < j, w(i) < w(j)\}$  是  $w$  的非逆序集。因此:

$$\dim N^-(w) = \binom{n}{2} - \ell(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$$

**几何图像:**  $N^-$  本身同构于最大的相反 Schubert 胞腔  $B^-w_0B/B \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$ 。而  $N^-(w)$  是  $N^-$  的一个”切片”, 只保留那些  $w$  不翻转的负根方向。**2. 代数同构:**  $N^-(w) \cong B^-wB/B$  构造同构映射:

$$\phi : N^-(w) \rightarrow B^-wB/B, \quad x \mapsto xwB/B$$

**验证是良好定义的:** 若  $x \in N^-(w)$ , 则  $x \in N^- \subset B^-$ , 所以  $xwB \in B^-wB$ , 陪集  $xwB/B$  落在  $B^-wB/B$  内。**单射性:** 若  $xwB/B = ywB/B$ , 则  $w^{-1}x^{-1}yw \in B$ 。同时  $w^{-1}x^{-1}yw \in w^{-1}N^-w \cap N^- = N^-(w)$ 。但  $B \cap N^-(w) = \{e\}$ , 所以  $x = y$ 。**满射性:** 任取  $B^-wB/B$  中元素。由于  $B^- = N^-T$ , 任意元素可写为  $n_1twB = n_1w(w^{-1}tw)B$ 。但  $w^{-1}tw \in T \subset B$ , 所以实际上  $n_1twB = n_1wB$ , 且  $n_1 \in N^-, n_1 \in N^-(w)$ 。**3. 同构映射  $x \mapsto xwB/B$  的意义**  $G/B$  是齐性空间,  $B^-wB/B$  是过基点  $wB/B$  的胞腔。映射  $x \mapsto xwB/B$  把  $N^-(w)$  中的元素  $x$  看作”旗的位移”——把基旗  $wB/B$  推到旗  $xwB/B$ 。 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$  提供了胞腔  $B^-wB/B$  的自然坐标系。每个  $x \in N^-(w)$  指定了胞腔中一个唯一点。从齐性空间角度看,  $wB/B$  的稳定化子是  $B$ , 而  $N^-(w)$  是那些”与  $w$  的相对位置在  $N^-$  中”的元素构成的子群。**4. 连通性**  $N^-$  是幂么群 (unipotent group), 指数映射  $\exp : \mathfrak{n}^- \rightarrow N^-$  是双射 (代数群情形的对数映射)。因此  $N^-$  微分同胚于其李代数  $\mathfrak{n}^- \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$ , 是连通的。 $N^-(w)$  是  $N^-$  的闭子群, 因此作为代数群也是连通的。同构  $N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$  说明  $N^-(w)$  是仿射空间。仿射空间是连通的 (甚至单连通)。**参考文献:** Humphreys, [13, Section 28]。<sup>11</sup>

### 31. 置换除法记号 $w_0/w$ 的含义

**31.1. 问题.** 在 Corollary 1.2 (Kirillov 猜想) 的证明中, 出现了  $v = w_0/w$  和  $\partial_{w/w_0/w}$  的记号。这里的除法”/”是什么意思?

**31.2. 回答.** 这个记号在笔记正文中没有明确定义, 这是一处需要补充的漏洞。以下是根据上下文和 Schubert calculus 惯例的推测:**组合学来源:** 在棋盘 (board) 理论和车多项式 (rook polynomial) 中, ”/” 表示斜差 (skew difference) ——即从一个大形状中挖去一个小形状后剩余的部分。**在本定理中的含义 (推测):**

- $w_0$  是最长置换 (longest element), 在  $S_n$  中是反序置换  $w_0 = n n-1 \cdots 2 1$
- $w$  是任意置换
- $w_0/w$  可能表示: 从  $w_0$  对应的方块形状中移除  $w$  对应的方块后剩余的”斜差形状”

<sup>11</sup>问: 为什么  $N^-(w) \cong B^-wB/B$ ? 见附录 section 30。

为什么使用这个记号？在 skew 除差算子的定义中，

$$\partial_{w/v} = \sum_{\substack{u \\ v \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \partial_u$$

要求  $v \leq u \leq w$  (Bruhat 序)。取  $v = w_0/w$  使得  $w_0$  通过  $w$  和  $w_0/w$  的”夹击”来确定一个特殊的区间。**重要说明**：这个记号的精确定义需要参考原始论文 (Samuel, 2024)。建议查看原始文献或补充定义。

### 31.3. 相关但未定义的概念.

- $\partial_{w/w_0/w}$  是嵌套的 skew 除差算子——先做关于  $w_0/w$  的，再做关于  $w$  的
- $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$  是最长置换的 Schubert 多项式 (单项式)

**31.4. 具体例子 ( $S_3$  的情形).** 取  $n = 3$ ，则  $S_3$  中的置换可以用一行记号表示：**最长置换**： $w_0 = 321$  (逆序置换)，长度为  $\ell(w_0) = 3$  **重要澄清**： $w_0/w$  这个记号在组合数学中有特定含义，但笔记正文中没有给出精确定义。以下是结合除差算子含义的解释：**组合学解释**：在 Schubert calculus 中， $w_0/w$  表示从  $w_0$  对应的”阶梯形”中移除  $w$  对应的形状后剩余的**斜差形状 (skew shape)**。用置换乘法 (从右到左复合) 的观点来看， $w_0/w$  可以解释为  $w_0 \cdot w^{-1}$  (即先做  $w$ ，再做  $w_0$ )：

- (1)  $w = 123$  (单位置换,  $\ell(w) = 0$ )
  - $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 123 = 321$
  - 因此  $w_0/w$  对应置换 321
- (2)  $w = 213$  (换位 (12),  $\ell(w) = 1$ )
  - $w^{-1} = 213$  (自逆)
  - $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 213$
  - 计算：321(2) = 1, 321(1) = 2, 321(3) = 3, 即 213
  - 因此  $w_0/w = 213$
- (3)  $w = 132$  (换位 (23),  $\ell(w) = 1$ )
  - $w^{-1} = 132$  (自逆)
  - $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 132$
  - 计算：321(1) = 3, 321(3) = 1, 321(2) = 2, 即 312
  - 因此  $w_0/w = 312$

**Bruhat 序约束**：在  $\partial_{w/v}$  的定义中要求  $v \leq u \leq w$  (Bruhat 序)。取  $v = w_0/w$  使得我们考虑的区间是：

$$w_0/w \leq u \leq w_0$$

这确保了当作用于  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})$  时，可以提取出与  $w$  相关的信息。在 Kirillov 猜想证明中的作用：取  $u = w$  且  $v = w_0/w$ ，则：

$$\partial_{w/v}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})) = \partial_{w/w_0/w}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}))$$

由于  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$  是单项式，作用于其上的除差算子可以显式计算。

## 32. 幂么根基 $U$ 的含义

**32.1. 问题.** 在 Borel 子群分解  $B = T \cdot U$  中， $U$  称为”幂么根基”，这是什么意思？

**32.2. 回答. 幂么 (Unipotent) 的定义：**一个代数群元素是幂么的，当且仅当它所有特征值都为 1（对于复代数群，这意味着它是单参数群的乘积，每个单参数群都是形如  $\exp(t \cdot N)$  的指数，其中  $N$  是幂零矩阵）。**几何直观：**在  $GL_n(\mathbb{C})$  中，幂么矩阵的形式为上三角矩阵，对角线元素全为 1：

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

这种矩阵称为幂么，因为  $(u - I)^n = 0$ （幂零）。**在一般约化群中：**设  $G$  为连通复约化群， $B \subset G$  为 Borel 子群， $T \subset B$  为极大环面。则

$$B = T \cdot U, \quad B^- = T \cdot U^-$$

其中  $U$  和  $U^-$  分别是包含在  $B$  和  $B^-$  中的极大幂么子群。**为什么叫“根基” (Radical) ？**在群论中，radical（根基）是最大的可解理想。幂么根基  $U$  是  $B$  的一个闭子群，它是  $B$  的“尾部”——移除了 torus  $T$  的部分后，剩下的就是幂么群。 $U$  和  $U^-$  分别是对应于正根和负根的方向。**在旗流形中的作用：**在旗流形  $G/B$  中，Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  可以通过幂么群  $U^-$  的作用参数化。具体而言，每个  $u \in U^-$  给出一个群作用  $u \cdot (wB/B) = uwB/B$ ，这正是胞腔上的坐标。**与旗的变化关系：**当你看到一个旗被“提升”时，实际上是  $U^-$  中的元素在作用。例如在  $GL_n$  中， $U^-$  是下三角幂么矩阵，它们把标准旗变成一般旗。

### 33. 为何初始条件是 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$

**33.1. 问题.** 为什么 Schubert 多项式的初始条件是  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ ？这个公式的直观意义是什么？

**33.2. 回答. 核心原因：旗流形的上同调环结构** Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  是旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  上 Schubert 胞腔类的上同调代表元。其次数等于对应胞腔的维度，即  $\ell(w)$ 。**最长置换  $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$  的特殊情况：**

- (1) **几何维度：**旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  的复维度是  $\binom{n}{2}$ ，恰好等于  $\ell(w_0)$ 。
- (2) **上同调环中的关系：**在  $H^*(Fl_n)$  中，基本类之间满足关系  $\sum_{i=1}^n x_i = 0$ （因为旗流形是紧致的，Chern 类的和为零）。这意味着在多项式代表元中，变量  $x_n$  可以用其他变量消去。
- (3) **单项式基元的分圆条件：**Schubert 多项式在  $H^*(Fl_n)$  中构成多项式环  $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_{n-1}]$  的自由基。对于每个置换  $w$ ，指数向量  $(c_1, c_2, \dots, c_{n-1})$  满足  $0 \leq c_i \leq n-i$ 。
- (4) **最长置换的指数：** $w_0$  对应的指数向量取最大值：

$$c_i = \#\{j > i : w_0(j) < w_0(i)\} = n - i$$

$$\text{因此 } \mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}.$$

**具体例子 ( $n=2$ ):** 对于  $S_2$ ,  $w_0 = 21$ :

$$\bullet i=1: c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2 : 1 < 2\} = 1$$

故  $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1^1 = x_1$ 。**具体例子 ( $n=3$ ):** 对于  $S_3$ ,  $w_0 = 321$ :

$$\bullet i=1: c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2, 3 : 1 < 3\} = 2$$

$$\bullet i=2: c_2 = \#\{j > 2 : w_0(j) < w_0(2)\} = \#\{3 : 1 < 2\} = 1$$

故  $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2^1 = x_1^2 x_2$ 。**具体例子 ( $n=4$ ):** 对于  $S_4$ ,  $w_0 = 4321$ :

$$\bullet i=1: c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2, 3, 4 : 1 < 4\} = 3$$

$$\bullet i=2: c_2 = \#\{j > 2 : w_0(j) < w_0(2)\} = \#\{3, 4 : 2 < 3\} = 2$$

- $i = 3$ :  $c_3 = \#\{j > 3 : w_0(j) < w_0(3)\} = \#\{4 : 1 < 2\} = 1$

故  $\mathfrak{S}_{4321}(\mathbf{x}) = x_1^3 x_2^2 x_3^1$ 。对比：非最长置换的例子：以  $w = 312 \in S_3$  为例，其 code 为：

- $i = 1$ :  $c_1 = \#\{j > 1 : 312(j) < 312(1)\} = \#\{2, 3 : 1, 2 < 3\} = 0$
- $i = 2$ :  $c_2 = \#\{j > 2 : 312(j) < 312(2)\} = \#\{3 : 2 < 1\} = 0$

对应首项  $x_1^0 x_2^0 = 1$ 。实际计算得  $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$ ，首项是  $x_1$ （对应 Grassmannian 置换的分式）。**规律总结**：code 向量  $(c_1, \dots, c_{n-1})$  满足  $0 \leq c_i \leq n - i$ ，且  $w_0$  对应最大 code  $(n-1, n-2, \dots, 1)$ 。**pipe dream (管道路径) 组合解释**：在 bumpless pipe dreams 模型中， $w_0$  对应最“拥挤”的管道图，所有管道都必须尽可能向右拐弯，权重乘积恰好是  $\prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ 。

**矩阵版本**。对于  $n = 3$ ，最长置换  $w_0 = 321$  的矩阵表示为：

$$w_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

即第一行是列指标，第二行是置换后的行指标。对应的 code  $(c_1, c_2) = (2, 1)$  表示：

- $c_1 = 2$ ：第 1 列下面有 2 个数比 3 小 (2, 1)
- $c_2 = 1$ ：第 2 列下面有 1 个数比 2 小 (1)

Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2$  的指数向量  $(2, 1)$  恰好是 code 的直接反映。矩阵视角的意义：在旗流形  $Fl_3(\mathbb{C})$  中， $w_0$  对应的 Schubert 胞腔是最大维度的闭胞腔，其上同调类由单项式  $x_1^2 x_2$  代表。

### 34. Humphreys Theorem 13.3 的内容

**34.1. 问题**。在引理 2.2 的证明中，引用了 Humphreys [13, Theorems 13.1 and 13.3] 来证明  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。Theorem 13.3 究竟说了什么？

**34.2. 回答. 定理内容 (Humphreys, *Linear Algebraic Groups*, Theorem 13.3, 原文第 2101 页) : Theorem 13.3.** Let  $G$  be a connected algebraic group,  $H$  a closed connected subgroup. Then  $\mathfrak{h}$  is an ideal in  $\mathfrak{g}$  if and only if  $H$  is normal in  $G$ . **翻译**：设  $G$  为

连通代数群， $H$  为闭连通子群。则  $\mathfrak{h}$  是  $\mathfrak{g}$  的理想，当且仅当  $H$  是  $G$  的正规子群。**在引理 2.2 证明中的应用**：该定理的“easy half”表明：如果  $H$  是  $G$  的正规子群，则  $\mathfrak{h}$  是  $\mathfrak{g}$  的理想。在 Gao-Xiong 的论文中，我们需要证明：当  $ws_i > w$  时， $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。通过李代数计算，我们已经验证了  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想（通过检查所有李括号  $[F_\alpha, F_\beta]$  是否仍在  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  中）。此时， $N^-(ws_i)$  和  $N^-(w)$  都是连通交换正规子群（因为它们都是幂么群的闭子群）。因此，Humphreys Theorem 13.3 保证了  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想这一事实可以提升到群层面—— $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。**关键逻辑链条**：

$$\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w) \text{ 且是理想} \xrightarrow{\text{Thm 13.3}} N^-(ws_i) \subset N^-(w) \text{ 且是正规子群}$$

references.bib 中的引用：

@book{humphreys1975, author = {Humphreys, James E.}, title = {Linear Algebraic Groups}}

这是代数群理论中的经典参考文献，Theorem 13.3 位于第 13 章（关于幂么群的结构）。

**34.3. Theorem 13.1 与 Theorem 13.3 的区别.** 在引理 2.2 的证明中, 实际上引用了 Humphreys 的两个定理:

- **Theorem 13.1 (格对应定理, 原文第 2073 页): Theorem 13.1.** Let  $G$  be a connected algebraic group. The correspondence  $H \mapsto \mathfrak{h}$  is 1-1 and inclusion preserving between the collection of closed connected subgroups  $H$  of  $G$  and the collection of their Lie algebras, regarded as subalgebras of  $\mathfrak{g}$ . **翻译:** 设  $G$  为连通代数群。闭连通子群  $H$  与其李代数  $\mathfrak{h}$  之间的对应是一一映射且保持包含关系。此定理保证了我们可以从李代数  $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$  的包含关系提升到群层面  $N^-(ws_i) \subset N^-(w)$ 。
- **Theorem 13.3 (正规子群与理想的等价, 原文第 2101 页): Theorem 13.3.** Let  $G$  be a connected algebraic group,  $H$  a closed connected subgroup. Then  $\mathfrak{h}$  is an ideal in  $\mathfrak{g}$  if and only if  $H$  is normal in  $G$ . **翻译:** 设  $G$  为连通代数群,  $H$  为闭连通子群。则  $\mathfrak{h}$  是  $\mathfrak{g}$  的理想, 当且仅当  $H$  是  $G$  的正规子群。结合使用: 在验证了  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想之后, Theorem 13.3 保证  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。

两者结合使用, 是因为 Theorem 13.1 提供了从群到李代数 (和反向) 的对应, 而 Theorem 13.3 则给出了理想与正规子群的等价关系。<sup>12</sup>

### 35. $S_{21}(x; y)$ 的计算问题

**35.1. 问题.** 在第一章  $S_2$  的计算例子中, 笔记给出了展开式与简洁公式, 它们看起来不同。这两种表达是否相等? 如果不相等, 哪个是正确的?

(1) 展开式 (错误使用公式导致):

$$S_{21}(x; y) = x_1^2 x_2 - x_1^2 y_1 - x_1 x_2 + x_1 y_1 + x_2 y_2 - y_1 y_2 - x_1 x_2 y_2 + x_1 y_1 y_2$$

(2) 简洁公式 (由定义直接给出):

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

**35.2. 分析. 使用除差算子验证:** 根据双重 Schubert 多项式的除差算子正确定义:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

注意这里是  $(x_i - y_i)$  而非  $(x_i - y_{w_0(i)})$ 。对于  $n = 2$ ,  $w_0 = 21$ , 对于  $w = 21$ :

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e$$

所以  $\partial_{w^{-1}w_0} = \partial_e = \text{id}$  (恒等算子)。因此:

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^2 (x_i - y_i) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

这与正文中的简洁公式一致。**原附录错误的原因:** 原附录使用了错误的公式  $\prod (x_i - y_{w_0(i)})$  而不是正确的  $\prod (x_i - y_i)$ , 导致得到了错误的结果  $(x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$ 。

<sup>12</sup>问: Humphreys Theorem 13.1 和 13.3 的具体内容是什么? 见附录 section 34.

**35.3. 结论.** 正文中的两种表述存在矛盾, 但分析发现: 附录中的除差算子公式写错了。正确的除差算子定义为:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

注意这里是  $\prod (x_i - y_i)$  而非  $\prod (x_i - y_{w_0(i)})$ 。对于  $w = 21$  ( $w_0 = 21$ ):

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e, \quad \partial_e = \text{id}$$

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

数值验证:  $(1-3)(2-4) = 4$ 。因此, 正文中的简洁公式  $\mathfrak{S}_{21} = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$  是正确的, 附录的展开计算有误 (错误地使用了  $y_{w_0(i)}$  而不是  $y_i$ )。

### 36. $F_\alpha$ 是权为 $-\alpha$ 的根向量——是什么意思?

**问题.** 在第 1056 行,  $\mathfrak{n}^-(w) = \text{span}\{F_\alpha \mid \alpha \in J(w)\}$  中,  $F_\alpha$  是“权为  $-\alpha$  的根向量”。这里的“权”和“根向量”是什么意思?

**回答. 1. 什么是“根向量”?** 在  $\mathfrak{gl}_n$  中, 每个矩阵单位  $E_{ij}$  (第  $i$  行第  $j$  列为 1, 其余为 0) 都是一个根向量——因为它满足:

$$[H, E_{ij}] = \alpha(H) \cdot E_{ij}$$

其中  $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$  是权,  $H = \text{diag}(t_1, \dots, t_n) \in \mathfrak{h}$  是 Cartan 子代数中的任意对角矩阵<sup>13</sup>。2. 什么是“权”? 设  $H = \text{diag}(t_1, \dots, t_n) \in \mathfrak{h}$ , 伴随作用给出:

$$[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$$

这里:

- $[H, E_{ij}] = H \cdot E_{ij} - E_{ij} \cdot H$  是矩阵李括号 (Lie bracket), 衡量  $H$  和  $E_{ij}$  的非对易程度
- $\text{ad}_H(E_{ij}) = [H, E_{ij}]$  称为  $H$  对  $E_{ij}$  的伴随作用 (adjoint action)

**推导:** 由于  $H$  是对角矩阵,  $(H \cdot E_{ij})_{ik} = t_i E_{ijk}$ , 而  $(E_{ij} \cdot H)_{ik} = t_j E_{ijk}$ , 故  $[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$ 。数  $(t_i - t_j)$  就是  $E_{ij}$  的权, 记为  $\epsilon_i - \epsilon_j$ , 即  $\alpha(H) = t_i - t_j$ 。3. 正根 vs 负根在  $\mathfrak{gl}_n$  中:

- **正根**  $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$  ( $i < j$ )  $\rightarrow$  对应  $E_{ij}$  (上三角矩阵)
  - **负根**  $-\alpha = \epsilon_j - \epsilon_i$  ( $i < j$ )  $\rightarrow$  对应  $E_{ij}$  (下三角矩阵)
4.  $F_\alpha$  的含义在记号中,  $F_\alpha$  通常指对应负根  $-\alpha$  的根向量。所以:
- 若  $\alpha = \epsilon_1 - \epsilon_2$  (正根)
  - 则  $F_\alpha = E_{21}$  (下三角矩阵)
  - 且  $F_\alpha$  的权是  $-\alpha = \epsilon_2 - \epsilon_1$  (负根)
5. 具体例子 ( $\mathfrak{gl}_3$ )

| 根                         | 矩阵       | 类型 | 权         |
|---------------------------|----------|----|-----------|
| $\epsilon_1 - \epsilon_2$ | $E_{12}$ | 正根 | $+\alpha$ |
| $\epsilon_2 - \epsilon_1$ | $E_{21}$ | 负根 | $-\alpha$ |
| $\epsilon_1 - \epsilon_3$ | $E_{13}$ | 正根 | $+\beta$  |
| $\epsilon_3 - \epsilon_1$ | $E_{31}$ | 负根 | $-\beta$  |
| $\epsilon_2 - \epsilon_3$ | $E_{23}$ | 正根 | $+\gamma$ |
| $\epsilon_3 - \epsilon_2$ | $E_{32}$ | 负根 | $-\gamma$ |

<sup>13</sup>即 定义 1.21 中的 Cartan 子代数。

**6. 为什么  $\mathfrak{n}^-(w)$  用  $F_\alpha$  (负根向量) ?** 因为  $\mathfrak{n}^- = \text{Lie}(N^-)$ , 而  $N^-$  是下三角幂么矩阵群, 其李代数由负根空间张成。所以  $\mathfrak{n}^-(w)$  中的  $F_\alpha$  对应负根  $-\alpha$ , 即权为  $-\alpha$ 。<sup>14</sup>

### 37. $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 与标准 Schubert 多项式的关系

**37.1. 问题.**  $[\overline{B^-wB/B}]_T$  (等变量子上同调类) 和标准 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  有什么关系?

**37.2. 回答. 核心关系:**  $[\overline{B^-wB/B}]_T$  是几何对象 (等变量子上同调类), 而  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是它的多项式代表元。**Theorem 10.6.4 ([2, Theorem 10.6.4], 原文):** 设  $T$  通过字符  $\chi_1, \dots, \chi_n$  作用在  $Fl(\mathbb{C}^n)$  上, 则对任意  $w \in S_n$ , 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  在代入

$$x_i = -c_1^T(\mathbb{S}_i/\mathbb{S}_{i-1}), \quad y_i = -\chi_i$$

时映射到  $\sigma_w = [\overline{B^-wB/B}]_T$ 。即

$$\sigma_w = \mathfrak{S}_w(x; y) \quad \text{in} \quad H_T^* Fl(\mathbb{C}^n)$$

**变量说明:**

- $x_i = -c_1^T(\mathbb{S}_i/\mathbb{S}_{i-1})$  来自旗流形的自丛 (tautological subbundle)
- $y_i = -\chi_i$  来自 torus  $T$  的作用权

**具体对应** (来自 [2, Theorem 10.6.4]):

- (1) 等变量子上同调类:  $[\overline{B^-wB/B}]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$
- (2) 双重 Schubert 多项式代表元:  $[\overline{B^-wB/B}]_T$  由  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  表示
- (3) 退化为标准 Schubert 多项式: 当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时,

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$$

**几何含义:**

- $[\overline{B^-wB/B}]_T$  是旗流形中 Schubert 胞腔闭包  $\overline{B^-wB/B}$  的等变量子上同调类
- $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是这个上同调类的多项式代表元 (方便计算)
- $\mathbf{y}$  变量编码了 torus  $T$  作用的信息

**为什么需要双重版本?** 设  $H_T^*(\text{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$ , 则

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \in H_T^*(Fl_n) \cong \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]^{\mathfrak{S}_n}[t_1, \dots, t_n]/\text{relations}$$

当把  $x_i$  替换为 0 时,  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{0}; \mathbf{y})$  给出了等变量子上同调类在固定点处的 restrictions, 这些 restrictions 编码了 Schubert 胞腔的定位信息。**总结表:**

| 对象              | 记号                                       | 所在空间                                           |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                 | $[\overline{B^-wB/B}]_T$                 | $H_T^*(Fl_n)$                                  |
| 双重 Schubert 多项式 | $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ | $\mathbb{Z}[x, y]$                             |
| 标准 Schubert 多项式 | $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$             | $\mathbb{Z}[x]$ (当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ ) |

### 38. Anderson-Fulton Section 19.3: 横截性方法

Anderson-Fulton 的 [2, Section 19.3] 建立了横截性 (transversality) 方法, 用于证明 Schubert 结构常数的正性。

<sup>14</sup>问:  $F_\alpha$  是权为  $-\alpha$  的根向量是什么意思? 见附录 section 36。



**38.1. 什么是横截性 (Transversality) ?.** **横截相交的定义:** 设  $Y, Z \subseteq X$  是非奇异簇  $X$  的子簇。如果  $Y \cap Z$  要么为空, 要么是纯维数的, 且

$$\operatorname{codim}_X(Y \cap Z) = \operatorname{codim}_X Y + \operatorname{codim}_X Z$$

则称  $Y$  与  $Z$  横截相交 (intersect properly/transversally)。**几何直观:** 想象两条曲线在平面上相交:

- 如果它们在交点处”平滑地”穿过彼此 (切向量线性无关), 则是横截的
- 如果一条曲线在另一点处”相切”或”平滑地接触”, 则不是横截的

**为什么横截性重要?:** 当两个子簇横截相交时, 其相交次数 (intersection number) 是良定义的非负整数。这是因为相交局部上是线性空间的相交, 交叉点可以用重数 (multiplicity) 来计数。

**38.2. 核心定理. Theorem 19.3.1 (Positivity Theorem, 原文):** 设  $Z \subseteq G/P$  是  $T$ -不变子簇, 在 Schubert 基底写下其类为

$$[Z]_T = \sum_{[u]} c_{[u]} x[u]$$

则每个  $c_{[u]}$  属于  $\mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$ , 即简单根的正系数多项式。**Corollary 19.3.2 (Graham, 原文):** 在等变量子同调  $H_T^*(G/P)$  中, 使用相反 Schubert 基  $\{y[w]\}$  时的结构常数  $c_{[u][v]}^{[w]}$  是正根  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  的非负系数多项式:

$$c_{[u][v]}^{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$$

**Lemma 19.3.4 (Kleiman-Bertini 定理, 原文):** 设  $\Gamma$  是连通代数群在不可约簇  $X$  上传递作用,  $Y, Z \subseteq X$  是不可约子簇。存在稠密开子集  $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$  使得对所有  $g \in \Gamma^\circ$ ,  $gY$  与  $Z$  横截相交。**Lemma 19.3.5 (精细版 Kleiman-Bertini, 原文):** 设  $\Gamma$  是连通代数群在非奇异不可约簇  $X$  上作用, 有有限多个轨道  $X_1, \dots, X_n$ 。设  $Y \subseteq X$  是不可约子簇, 假设  $Y$  与每个  $\Gamma$ -轨道横截相交。给定另一个不可约子簇  $Z$ , 存在稠密开子集  $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$  使得对所有  $g \in \Gamma^\circ$ ,  $gY$  与  $Z$  横截相交。

**38.3. 非 equivariant 情形的证明思路.** 在非 equivariant 情形 ( $T$  平凡作用), 正性证明非常简洁:

- (1) 由 Lemma 19.3.4, 存在  $g \in G$  使得  $gY[w]$  与  $Z$  横截相交
- (2) 由基本相交理论 (Proposition A.3.3), 横截相交的类是:

$$[Y] \cdot [Z] = \sum_V m_V [V]$$

其中  $m_V \geq 0$  是相交重数

- (3) Schubert 胞腔的结构常数是:

$$c_{[w]} = \int y[w] \cdot [Z]$$

- (4) 由于  $gY[w]$  与  $Z$  横截相交, 上式化为  $c_{[w]} = \int [gY[w] \cap Z]$
- (5) 由基本性质,  $\int [V]$  在  $V$  是点时为 1, 否则为 0
- (6) 因此  $c_{[w]} \geq 0$  (非负整数)

**38.4. equivariant 情形的证明思路.** equivariant 情形的证明更加精细，因为需要处理 torus 作用带来的权：

- (1) 在 approximation space  $\mathbf{X} = \mathbb{E} \times^T G/P$  上工作
- (2) 使用群  $\Gamma = \Gamma_f \rtimes (GL_m)^r$  在  $\mathbf{X}$  上的作用
- (3) 由 Lemma 19.3.5, 存在  $g \in \Gamma$  使得  $g\mathbf{Y}[w]$  与  $\mathbf{Z}$  横截相交
- (4) 利用 Poincaré 对偶和 Gysin 映射的基本性质
- (5) 由于 Gysin 映射保持有效类 (effective class),  $c_{[w]}$  是有效类
- (6) 因此  $c_{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$

**关键洞察：**在普通上同调中，横截相交给出非负整数；在 equivariant 上同调中，横截相交给出正根多项式的非负系数。

**38.5. 在引理 2.5 证明中的应用.** 在引理 2.5 的证明中，横截性由 Kleiman-Bertini 分析保证：

- 设  $w_0^{(m)} \in S_m$  是最长排列
- 对于  $w, \pi \in S_n$ , 记  $w \times \pi \in S_{2n}$  为直和
- 由  $v \in S_n$  知  $\overline{B^{-v}B/B}$  在  $s_i$  ( $n \leq i < 2n$ ) 下不变
- 因此  $\overline{B^{-v}B/B} = u_0 \overline{B^{-v}B/B}$ , 其中  $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$
- 类似地  $\overline{\tau B^{-u}B/B} = \tau u_0 \overline{B^{-u}B/B}$
- 由于  $u_0^{-1} \tau u_0 = w_0^{(2n)}$ , 交集的横截性由 [2, Lemma 19.3.5] 保证

**Footnote:** Theorem 19.4.4 的退化证明见附录 section 39。

### 39. Anderson-Fulton Theorem 19.4.4: 退化命题

本节内容来自 Anderson & Fulton 的《Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry》[2] 第 19.4 节 (pages 371-377)。这是 Graham 退化证明的详细版本，用于证明 Schubert 结构常数的正性。

**39.1. 预备概念.** 在阅读本节之前，读者需要熟悉以下概念。由于这是大二学生可能未学过的内容，我们在此给出简要说明。

39.1.1. 代数群与环面. **线性代数群:** 域  $\mathbb{C}$  上的线性代数群是  $GL_n(\mathbb{C})$  的闭子群。例如  $GL_n, SL_n, B_n$  (上三角矩阵群) 等。**连通性:** 群  $G$  是连通的，如果它作为拓扑空间 (赋予 Zariski 拓扑) 不能分解为两个非空开集的并。所有 Borel 子群都是连通的。**可解群:** 群  $G$  是可解的，如果其导出列最终平凡：

$$G \supseteq [G, G] \supseteq [[G, G], [G, G]] \supseteq \cdots \supseteq \{e\}.$$

例如，所有 Borel 子群  $B$  都是可解的。**最大环面 (Maximal torus):** 设  $G$  是连通线性代数群。 $G$  的一个**最大环面**  $T$  是  $G$  中同构于  $(\mathbb{C}^*)^r$  的极大子群，其中  $r = \text{rank}(G)$  称为  $G$  的秩。直观理解：环面  $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$  是一个“阿贝尔的” (可交换的) 子群，在很多方面像是线性代数群的“坐标系”。例如：

- 在  $GL_n$  中，对角矩阵的集合形成一个最大环面  $T \cong (\mathbb{C}^*)^n$ 。
- 在  $SL_n$  中，对角矩阵中行列式为 1 的子群是最大环面， $T \cong (\mathbb{C}^*)^{n-1}$ 。

**特征标 (Character):** 环面  $T$  的一个特征标是群同态  $\chi: T \rightarrow \mathbb{C}^*$ 。所有特征标构成的群记为  $\hat{T}$ ，在  $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$  时有  $\hat{T} \cong \mathbb{Z}^r$ 。例如，如果  $T = (\mathbb{C}^*)^n$  由对角矩阵  $(t_1, \dots, t_n)$  组成，则  $t_i$  的第  $i$  个坐标给出特征标  $\varepsilon_i: (t_1, \dots, t_n) \mapsto t_i$ 。

39.1.2. 闭链与有效闭链. **闭链 (Cycle)**: 在代数几何中, 闭链是代数簇的闭子簇的整系数线性组合。例如,  $Y$  是  $X$  的闭子簇, 则  $[Y]$  是一个闭链。**有效闭链 (Effective cycle)**: 如果闭链中所有系数都是非负整数, 则称其为有效闭链。也就是说, 有效闭链只是若干闭子簇的“并”(带重数), 没有“负部”。**维数**: 设  $Y$  是复代数簇,  $\dim Y = k$  表示  $Y$  是  $k$  维复簇 (实维数  $2k$ )。

39.1.3. 等变量子上同调. 这是将拓扑的“上同调”与“群作用”结合的理论。**等变量子上同调**  $[Y]_T$ : 设  $T$  在  $X$  上作用。 $X$  的  $T$ -等变量子上同调  $H_T^*(X)$  是一个同时编码了  $X$  的拓扑信息和  $T$  作用信息的环。直观理解: 普通上同调  $H^*(X)$  只关心  $X$  的形状; 等变量子上同调  $H_T^*(X)$  额外记录了  $T$  在  $X$  上怎么动。**类**  $[Y]_T$ : 如果  $Y \subseteq X$  是  $T$ -不变子簇 ( $T$  保持  $Y$ ), 则  $Y$  在等变量子上同调中有一个类  $[Y]_T \in H_T^*(X)$ 。

- 当  $T$  平凡作用时,  $[Y]_T$  就是普通的类  $[Y] \in H^*(X)$ 。
- $[Y]_T$  包含了更多关于  $Y$  与  $T$  轨道关系的信息。

**B-不变**: 如果群  $B$  作用在  $X$  上, 子簇  $Y$  是  $B$ -不变的 ( $B$ -invariant) 意味着对所有  $b \in B$ , 有  $bY = Y$ 。这保证了  $Y$  在  $B$  作用下结构稳定。

39.1.4. 幂么根基. **幂么群 (Unipotent group)**: 一个元素  $g$  是幂么的, 如果  $(g-I)^m = 0$  对某个  $m$  成立。幂么矩阵群由所有特征值都为 1 的矩阵组成。**幂么根基 (Unipotent radical)**: 设  $B$  是连通可解代数群。 $B$  的幂么根基  $U$  (记作  $U = U_N$  或  $U_-$ ) 是  $B$  中所有幂么元素构成的正规子群。它满足:

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

直观理解:  $B$  可以分解为一个“阿贝尔的”环面子群  $T$  和一个“幂么的”(三角阵对角线以上为 1) 子群  $U$  的半直积。在旗流形  $G/B$  的情形,  $U_-$  (或  $B^-$ ) 是下三角幂么群, 它在旗流形上的轨道正好是 Schubert 胞腔。

39.1.5. 纤维丛与纤维积. **纤维积**  $B \times_{B'} Y$ : 这是集合论中的“拉回”概念。设  $B$  作用在  $Y$  上,  $B' \subseteq B$  是子群。则

$$B \times_{B'} Y = \{(b, y) \in B \times Y : b \text{ 在 } B' \text{ 中的等价类} = \text{某个代表元在 } B' \text{ 中的位置}\}$$

在几何上, 这可以理解为以  $Y$  为纤维、 $B/B'$  为底空间的纤维丛。投影到  $B/B'$  给出丛结构。在 Proposition 19.4.4 的证明中,  $V = B \times_{B'} Y \rightarrow B/B' = \mathbb{A}^1$  是一个纤维丛, 纤维是  $Y$ 。

39.1.6. 交集的几种类型. 在代数几何中, 两个子簇的交有不同的“深度”:**Proper intersection (固有交集)**:  $Y$  与  $Z$  在  $X$  中的交是 proper 的, 如果交簇的维数等于  $\dim Y + \dim Z - \dim X$  (这正是“期望”的维数)。非 proper 交集意味着“维度异常”——可能维数更低了。**横截相交 (Transverse intersection)**: 在光滑点处, 如果两个子簇的切空间张成整个切空间, 则称它们横截相交。横截相交有良好的性质: 交点个数是孤立的 (有限的), 且个数在族中是稳定的。**Scheme-理论上相交**: 这是一种更精细的相交概念, 考虑了子簇的环结构而不只是集合论意义。 $V$  在  $\infty \times X$  中与  $\infty \times Y$  scheme-理论上相交, 意味着它们在无穷远点的相交方式由理想幂决定, 而不是简单的集合包含。直观理解: 这三种相交层层递进——scheme-理论上相交是最精细的, 横截相交是几何意义上“最好”的, proper 相交是维数意义上“正常”的。

39.1.7. 对角紧化. **对角作用**:  $B$  在  $X$  上的对角作用定义为  $b \cdot (x_1, x_2) = (bx_1, bx_2)$ 。这让  $B$  同时作用在积  $X \times X$  的两个分量上。**紧化**  $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$ : 仿射直线  $\mathbb{A}^1$  不是紧致的 (如  $\mathbb{C}$  不是紧致的), 但射影直线  $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$  是紧致的。通过添加无穷远点, 我们得到紧化。在 Proposition 19.4.4 的证明中: 利用  $B$  在  $\mathbb{P}^1$  上的作用 (由引理 19.4.2-19.4.3 给出), 我们将纤维丛  $V \rightarrow \mathbb{A}^1$  紧化到  $\mathbb{P}^1 \times X$ , 然后利用  $\mathbb{P}^1$  上的关系 (19.1) 来“退化”——用 0 和  $\infty$  处的信息来控制整条纤维的信息。

39.1.8. 证明的核心思路总结. 有了以上预备知识, Proposition 19.4.4 的证明思路可以理解为:

- (1) 如果  $Y$  已经  $B$ -不变, 则无需分解。
- (2) 否则, 构造纤维丛  $V = B \times_{B'} Y \rightarrow \mathbb{A}^1$ , 它在  $\mathbb{P}^1$  中紧化。
- (3) 利用  $\mathbb{P}^1$  上的基本关系  $[\infty] = [0] + \chi[\mathbb{P}^1]$ , 与  $[V]$  作交。
- (4) 这将  $[Y]$  的计算“退化”到 0 和  $\infty$  处的纤维, 产生所需的分解  $[Y] = [Z_1] + \chi[Z_2]$ 。

这个技巧本质上是把一个难以直接计算的  $B'$ -不变类, 通过族化的思想 (纤维丛), 分解为更简单的  $B$ -不变类的组合。

### 39.2. 背景：连通可解群与环面作用. 基本设定:

- $B$ : 复数域  $\mathbb{C}$  上的连通可解线性代数群
- $T \subseteq B$ : 最大环面 (torus)
- $X$ : 复射影簇 (complex projective variety)
- $T$  在  $X$  上作用, 只有有限多个固定点

**退化证明的核心思想:** 将  $B'$ -不变的闭链类  $[Y]_T$  分解为  $B$ -不变闭链类的线性组合, 系数是特征标的多项式。通过逐次应用这个分解, 可以将任意 Schubert 胞腔类的乘积展开系数写成正根的非负多项式。

**39.3. 基本例子:  $\mathbb{P}^1$  上的退化.** Example 19.4.1: 设  $B$  通过同态  $B \rightarrow \mathrm{GL}_2$  作用在  $\mathbb{P}^1$  上:

$$b \mapsto \begin{pmatrix} \chi(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中  $\chi: B \rightarrow \mathbb{C}^*$  是特征标,  $\varphi: B \rightarrow \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$  是满足

$$\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \chi(b_1) \varphi(b_2)$$

的正则函数。注意对  $t \in T$ , 有  $\varphi(t) = 0$  (因为  $T$  由半单元素组成)。此时  $T$  在  $\mathbb{C}^2$  上的权为  $\chi$  和 0。我们有:

$$H_T^* \mathbb{P}^1 = \Lambda[\zeta]/(\zeta + \chi)\zeta,$$

其中  $\zeta = c_1^T(\mathcal{O}(1))$ 。点  $0 = [1, 0]$  被  $B$  固定, 点  $\infty = [0, 1]$  被  $T$  固定, 且

$$[0]_T = \zeta, \quad [\infty]_T = \zeta + \chi.$$

由此得到关键关系 (公式 19.1):  $[\infty]_T = [0]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1]_T$ .

**39.4. 幂么根基的设置.** 设  $U \subseteq B$  是幂么根基 (unipotent radical), 则  $U$  是  $B$  的正规子群, 且

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

设  $U' \subseteq U$  是  $B$  的正规子群, 满足  $\dim(U/U') = 1$ , 因此  $U/U' \cong \mathbb{G}_a$ 。(由于  $B$  可解, 这样的  $U'$  总是存在的。)  $T$  通过共轭作用在  $U$  上, 这给出  $T$  在  $U/U' \cong \mathbb{A}^1$  上的一个特征标作用。等价地, 如果  $\mathfrak{u} \supset \mathfrak{u}'$  是对应的李代数, 则  $\chi$  是  $T$  在  $\mathfrak{u}/\mathfrak{u}'$  上的权。设  $\theta: U \rightarrow \mathbb{G}_a$  是任意同态, 核为  $U'$ 。

**39.5. 引理 19.4.2 与 19.4.3. Lemma 19.4.2:** 上述  $B$  在  $\mathbb{G}_a$  上的作用由下式给出:

$$b \cdot z = \theta(u) + \chi(t)z,$$

其中  $b = ut$  ( $u \in U, t \in T$ ),  $z \in \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$ 。 **Lemma 19.4.3:** 设  $\chi: T \rightarrow \mathbb{C}^*$  是特征标, 定义  $\tilde{\chi}: B \rightarrow \mathbb{C}^*$  为其在  $B$  上的唯一扩张 ( $\tilde{\chi}(ut) = \chi(t)$ )。令  $\varphi: B \rightarrow \mathbb{C}$  为  $\varphi(ut) = \theta(u)$ 。则:

- (1)  $\varphi$  的零点簇是  $B'$ ;
- (2) 对  $b_1, b_2 \in B$ , 有  $\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \tilde{\chi}(b_1)\varphi(b_2)$ 。

因此映射  $b \mapsto \begin{pmatrix} \tilde{\chi}(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  是  $B$  到  $\mathrm{GL}_2$  的群同态。

**39.6. Proposition 19.4.4: 退化命题 (详细证明). 命题:** 设  $B$  在非奇异簇  $X$  上作用,  $T$  是最大环面。设  $B' \subset B$  是闭子群,  $\chi: T \rightarrow \mathbb{C}^*$  是特征标。假设  $Y \subseteq X$  是  $B'$ -不变的有效闭链,  $\dim Y = k$ 。则存在典则定义的  $B$ -不变有效闭链  $Z_1$  和  $Z_2$  ( $\dim Z_1 = k$ ,  $\dim Z_2 = k+1$ ), 使得  $[\infty \times Y]_T = [Z_1]_T + \chi[Z_2]_T$  在  $H_T^{2n-2k} X$  中。 **证明** (来自 Anderson & Fulton, pp. 373-374): 只需对  $Y$  是不可约子簇的情形构造。若  $Y$  已经是  $B$ -不变的, 则取  $Z_1 = Y$ ,  $Z_2 = 0$  即得。否则, 令  $W$  为  $B \cdot Y$  在  $X$  中的闭包; 这是一个维数为  $k+1$  的子簇。考虑

$$V = B \times_{B'} Y,$$

具有自然的左  $B$  作用。这是以  $Y$  为纤维、 $B/B' = \mathbb{A}^1$  为底空间的纤维丛。映射  $V \rightarrow \mathbb{A}^1 \times X$ ,  $[(b, y)] \mapsto (\varphi(b), b \cdot y)$  是一个  $B$ -等变的闭嵌入, 其中  $B$  在  $\mathbb{A}^1 \times X$  上对角作用。利用从两个引理得到的  $B$  在  $\mathbb{P}^1$  上的作用, 我们有  $B$ -等变的紧化  $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$ 。设  $V$  为  $V$  在  $\mathbb{P}^1 \times X$  中的闭包, 则  $V$  是维数为  $k+1$  的  $B$ -不变子簇, 通过第二投影  $\mathbb{P}^1 \times X \rightarrow X$  映射到  $W \subseteq X$ 。利用第一投影  $\mathbb{P}^1 \times X \rightarrow \mathbb{P}^1$  拉回关系 (19.1), 我们得到  $[\infty \times X]_T = [0 \times X]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1 \times X]_T$  在  $H_T^2(\mathbb{P}^1 \times X)$  中。将两边与  $[V]_T$  作交:

- 左边:  $\infty \times X$  与  $V$  在  $\infty \times Y \subseteq V$  处有 scheme-理论上相交。这是因为  $\varphi$  的零点簇是  $B'$ , 而  $B'$  保持  $Y$ 。
- 右边:  $V \rightarrow \mathbb{P}^1$  是支配的, 所以  $V$  与  $0 \times X$  的交是形如  $0 \times Z_1$  的正维数为  $k$  的闭链。由于  $V$  和  $0 \times X$  都是  $\mathbb{P}^1 \times X$  的  $B$ -不变子簇, 它们的交也是  $B$ -不变的, 因此  $Z_1 \subseteq X$  是一个  $B$ -不变的  $k$ -闭链。

于是得到

$$[\infty \times Y]_T = [0 \times Z_1]_T + \chi \cdot [V]_T$$

在  $H_T^{2n-2k+2}(\mathbb{P}^1 \times X)$  中。通过投影  $\mathbb{P}^1 \times X \rightarrow X$  推出

$$[Y]_T = [Z_1]_T + \chi \cdot d[W]_T,$$

其中  $d$  是映射  $V \rightarrow W$  的次数。故  $Z_1$  和  $Z_2 = dW$  即为所求的  $B$ -不变有效闭链。□

**39.7. Theorem 19.4.5: 链分解.** 在相同设置下, 假设我们选择了正规子群链

$$U = U_N \supset U_{N-1} \supset \cdots \supset U_0,$$

其中每个  $U_i$  被  $T$  正规化,  $U_{i-1}$  在  $U_i$  中正规, 且  $\dim U_i/U_{i-1} = 1$ 。设  $\chi_i$  是  $T$  在李代数  $\mathfrak{u}_i/\mathfrak{u}_{i-1}$  上的权, 记  $B_i = U_i \cdot T$ 。 **定理:** 设  $Y$  是  $B_0$ -不变的有效  $k$ -闭链。则对每个  $I \subseteq \{1, \dots, N\}$ , 存在典则定义的  $B$ -不变有效闭链  $Z_I$  ( $\dim Z_I = k + |I|$ ), 使得  $[\infty \times Y]_T = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, N\}} (\prod_{i \in I} \chi_i) [Z_I]_T$  在  $H_T^{2n-2k} X$  中。 **证明:** 对  $N$  做归纳。

$N = 0$  的情形平凡。假设对  $N - 1$  的情形已证。对于  $J \subseteq \{1, \dots, N - 1\}$ ，我们有非负闭链  $Z'_J$ （关于  $B' = U_{N-1} \cdot T$  不变），满足

$$[Y]_T = \sum_{J \subseteq \{1, \dots, N-1\}} \left( \prod_{j \in J} \chi_j \right) [Z'_J]_T.$$

对每个  $Z'_J$  应用 Proposition 19.4.4，可得

$$[Z'_J]_T = [Z_J]_T + \chi_N [Z_{J \cup \{N\}}]_T,$$

其中  $Z_J$  和  $Z_{J \cup \{N\}}$  是非负的  $B$ -不变闭链。代入即得所求。□

**39.8. Corollary 19.4.7: 正性推论. 推论：**对于对角嵌入  $\delta: G/P \hookrightarrow G/P \times G/P$ ，有

$$\delta_*(x^{[w]}) = \sum_{[u], [v]} c_{[u][v]}^{[w]} x^{[u]} \times x^{[v]},$$

其中每个系数  $c_{[u][v]}^{[w]}$  是正根的单项式的非负和。**证明思路：**将 Theorem 19.4.5 应用到  $B = (U \times U) \cdot T$  在  $X \times X$  上的对角作用。取  $U_0$  为对角  $U \subseteq U \times U$ ， $U_N = U \times U$ ，则链给出分解。由于  $U$  在  $G/P$  上只有有限多个轨道， $B$ -不变子簇都形如  $V_I \times W_I$ ，于是系数可写成正根单项式的非负和。特别地，由于  $u$  的权空间都是一维的（权就是正根），这些系数是平方自由的。□ **参考文献：**Anderson, David, and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. Cambridge University Press, 2023. Section 19.4, pages 371-377.

#### 40. k-Grassmannian 排列与线性因子乘积的等价性

**40.1. 问题.** 正文说： $k$ -Grassmannian 排列  $w$  的 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以写成线性因子的乘积。反过来是否成立？即，如果  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以写成线性因子的乘积，能否推出  $w$  是  $k$ -Grassmannian 排列？

**40.2. 回答. 结论：**是的，反过来也成立。这实际上是  $k$ -Grassmannian 排列的一个等价刻画。**等价定义：**一个排列  $w \in S_n$  是  $k$ -Grassmannian 的，当且仅当其双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以分解为  $k$  个线性因子的乘积：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^k (x_{a_i} - y_{b_i})$$

**证明思路：**

- (1) **充分性 (Grassmannian  $\Rightarrow$  线性因子)：**已在正文 (例 1.14) 证明。 $k$ -Grassmannian 排列  $w$  对应的 Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  是 Grassmannian  $G/P$  的子簇，其坐标环是多项式环的商，故  $\mathfrak{S}_w$  有因子化形式。
- (2) **必要性 (线性因子  $\Rightarrow$  Grassmannian)：**设  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是  $k$  个线性因子的乘积。则  $\mathfrak{S}_w$  作为  $\mathbf{x}$  的多项式，每个因子关于  $\mathbf{x}$  都是线性的。这意味着  $w$  对应的旗流形子簇在某些方向上是线性的，这正是 Grassmannian 子簇的特征。更形式地说，如果  $w$  不是 Grassmannian，则  $\mathfrak{S}_w$  包含关于  $\mathbf{x}$  的二次或更高次项。

**具体例子验证：**

- $w = 231$  (非 Grassmannian):  $\mathfrak{S}_{231} = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$ ——不能写成线性因子的乘积
- $w = 21$  (1-Grassmannian):  $\mathfrak{S}_{21} = x_1 - y_1$ ——线性因子
- $w = 132$  (1-Grassmannian):  $\mathfrak{S}_{132} = x_2 - y_2$ ——线性因子

**直觉理解：**Grassmannian 子簇本身是由线性方程定义的，因此其 Schubert 类自然有线性因子的表示。非 Grassmannian 的子簇涉及更复杂的代数关系，导致多项式中出现二次或更高次项。

#### 41. Refined Graham Positivity 与原始 Graham Positivity 的关系

**41.1. 问题.** Refined Graham Positivity (定理 1.3) 和原始的 Graham Positivity (定理 1.1) 有什么关联？前者是后者的推广吗？

**41.2. 回答.** 是的，Refined Graham Positivity 是原始 Graham Positivity 的推广。**1. 条件弱化：从 Grassmannian 到 Separated Descents** 原始 Graham Positivity (定理 1.1)：设  $u, v \in S_n$  分别是  $k_1$ -Grassmannian 和  $k_2$ -Grassmannian 排列，则

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

**Refined Graham Positivity (定理 1.3)：** 设  $B^-$  作用于非奇异簇  $X$ ， $Y$  是  $X$  中的一个  $B^-(w)$ -不变的有效闭链。则在  $H_T^*(X)$  中有

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

两者共同要求的条件 (separated descents)： $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$  **关键澄清：** 当  $u, v$  都是 Grassmannian 时，separated descents 条件**不一定**自动满足！例如  $u = 321$  (2-Grassmannian)， $v = 213$  (1-Grassmannian) 时， $\max \text{Des}(u) = 2 > 1 = \min \text{Des}(v)$ ，不满足 separated descents。**两者的正确关系：**

- **原始 Graham Positivity：** 用几何方法（横截相交）证明，条件是  $u, v$  都是 Grassmannian（不要求  $k_1 \leq k_2$ ）
- **Refined Graham Positivity：** 用 separated descents 条件代替 Grassmannian 条件，推广了适用范围
- 当 separated descents 成立时，两者的系数形式一致

#### 2. 系数形式的变化原始 Graham Positivity 的系数：

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

Refined Graham Positivity 的系数：

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$$

**两者的关系：** 当  $(u, v)$  满足 separated descents 时， $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ ，因此  $-\alpha = t_i - y_j$ ，两者等价。**3. 几何理解的升级**

- **原始版本：** 要求  $B^-$ -不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交
- **Refined 版本：** 要求  $B^-(\tau)$ -不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交，其中  $B^-(\tau) \subset B^-$  是更小的群（条件更弱）

条件更弱，但 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性，使得正性结论仍然成立。**4. 定理层次的对应关系**

|      |                         |                                            |
|------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 层次   | 原始 Graham               | Refined Graham                             |
|      | $u, v$ 都是 Grassmannian  | separated descents                         |
| 系数   | $\mathbb{N}[t_i - y_j]$ | $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ |
| 适用范围 | 特殊排列                    | 更一般的排列                                     |

**5. 总结** Refined Graham Positivity 通过引入 separated descents 条件，将原始 Graham Positivity 从 Grassmannian 排列推广到一般排列。这是 Samuel (2024) 的关键贡献——证明了横截相交性在 separated descents 条件下仍然成立，从而将正性结果推广到更大的适用范围。**footnote**: 见 定理 1.1, 定理 1.3.

## 42. Humphreys Section 28: Bruhat Decomposition 的内容

**42.1. 问题.** 正文 (引理 2.2 前) 引用了 Humphreys [13, Section 28] 来描述  $N^-(w)$  与 Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  的同构。Section 28 究竟说了什么？

**42.2. 回答.** Section 28: Bruhat Decomposition 是 Humphreys 一书中关于旗流形分解的核心章节。其主要结果包括：**28.1 T-稳定子群 (Theorem 28.1 - 原文第 169 页):**

**Theorem 28.1.** 设  $G$  为约化群,  $T$  为极大环面,  $B$  为 Borel 子群,  $U$  为  $B$  的幂么根基。则  $U$  可以分解为两个  $T$ -稳定子群的直接乘积:

$$U = U_\sigma \cdot U'_\sigma$$

其中对每个  $\sigma \in W$  (Weyl 群元), 根系  $\Phi^+$  被划分为:

$$\Phi_\sigma^+ = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) > 0\}, \quad \Phi_\sigma^- = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) < 0\}$$

**28.3 Bruhat 分解 (Theorem 28.3 - 原文第 3831 页) : Theorem 28.3 (Bruhat Decomposition).**

$$G = \bigcup_{\sigma \in W} B\sigma B \quad (\text{不相交并})$$

其中每个双陪集  $B\sigma B$  等于某个 Schubert 胞腔。**推论 (Corollary of Theorem 28.3):** 设  $B'$  为  $G$  的任意 Borel 子群, 则  $B \cap B'$  是连通的且包含  $G$  的一个极大环面。**28.4 正规形**

**式 (Theorem 28.4 - 原文第 3863 页): Theorem 28.4.** 对每个  $\sigma \in W$ , 每个元素  $x \in G$  可以唯一地写成:

$$x = u' \cdot n(\sigma) \cdot t \cdot u$$

其中  $u, u' \in U$  (幂么部分),  $t \in T$  (环面部分),  $n(\sigma) \in N$  (Weyl 群代表元)。**在引理**

**2.2 证明中的应用:** 正文引用 "Humphreys [13, Section 28],  $N^-(w)$  同构于 Schubert 胞腔  $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ " 是基于以下对应:

- (1)  $B^- = TU^-$  是  $B$  的相反 Borel 子群
- (2)  $N^-(w) = N^- \cap wNw^{-1}$  对应负根方向
- (3) 由 Bruhat 分解,  $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$
- (4) 作为簇,  $N^-(w) \cong B^-wB/B$  (通过映射  $x \mapsto xwB/B$ )

**几何意义:**  $N^-(w)$  是旗流形  $G/B$  中 Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  的坐标空间。具体而言,  $N^-(w)$  同构于  $\mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$  (仿射空间), 这意味着每个 Schubert 胞腔可以用  $\ell(w_0) - \ell(w)$  个复坐标参数化。**连通性:** 由于  $N^-(w) \cong \mathbb{C}^d$  (仿射空间), 它是连通的 (甚至单连通)。<sup>15</sup>

<sup>15</sup>问: Humphreys Section 28 的 Bruhat Decomposition 说了什么? 见附录 section 42.



### 43. 为什么 Refined Graham Positivity 的假设是“更强”的？

**43.1. 问题.** 在 Remark 中有一段话：

当  $w = w_0$  是最长元时， $B^-(w_0) = T$ ，定理 1.3 给出原始的 Graham 正性定理。我们的假设比 Graham 的更强，因为  $B^-(w)$ -不变的环必是  $T$ -不变的，产生更强的正性结果，其中根被限制在  $I(w)$  而非所有正根。

这里有几个令人困惑的点：

- (1) 为什么说“我们的假设更强”？难道不是要求越多越弱吗？
- (2) 为什么根被限制在  $I(w)$  而非所有正根是“更强”的结果？

**43.2. 回答. 1. 假设强度与不变群的关系：**在几何中，要求一个子簇在某个群作用下不变，条件是越小的群越强（严格）：

- $T$ ：只在 torus  $T$  作用下不变
- $B^-$ ：在更大的群  $B^-$  作用下不变
- $B^-(w)$ ：只在更小的群  $B^-(w)$  作用下不变

要求在  $B^-(w)$  下不变比要求在  $T$  下不变更严格，因为：

- 如果一个子簇在  $B^-(w)$  下不变，它自动在  $T$  下不变
- 但反过来不一定成立：在  $T$  下不变子簇不一定在  $B^-(w)$  下不变

因此，定理 1.3 的假设：

假设： $Y$  是  $B^-(w)$ -不变的

比原始 Graham 的假设：

假设： $Y$  是  $T$ -不变的

**更强（条件更严格）。2. 为什么结果是“更强”的正性？** 这里的“更强”不是说系数更大，而是说结论给出了更精确的信息。定理 1.3 的结论是：

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

即系数的多项式只涉及  $\{-\alpha \mid \alpha \in I(w)\}$  这些根。对比原始 Graham 正性（对应  $w = w_0$  的情况）：

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in \Phi^+} \cdot [Z_i]_T$$

这里  $\Phi^+$  是所有正根， $I(w) \subseteq \Phi^+$ 。关键点：

- 当  $w = w_0$ （最长元）时， $I(w_0) = \Phi^+$ （所有正根），两者相同
- 当  $w \neq w_0$  时， $I(w) \subsetneq \Phi^+$ （真子集）
- $I(w)$  越小，系数多项式的变量越少，约束越强

**3. 几何直观：** $B^-(w)$  的定义是：

$$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$I(w)$  记录了  $w$  翻转了哪些正根。 $|\alpha \in I(w)| = \ell(w)$ ，即  $w$  的长度。当  $w$  很短时（接近单位元）， $I(w)$  很小，只有少数根被翻转，因此  $B^-(w)$  接近  $T$ ，条件变强，但结果也更精确——系数只涉及少数几个根的多项式。**4. 总结：**

- (1) **假设更强：** $B^-(w)$ -不变比  $T$ -不变要求更多（更严格的条件）
- (2) **结果更强：** $I(w)$  越小，系数被限制在更小的根集上，结论更精确

这似乎矛盾，但实际上反映了“归纳递进”的数学思想：当假设更严格时，我们可以得到更精确的结论。**退化情形**：当  $w = w_0$  时， $B^-(w_0) = T$ ，假设退化为  $T$ -不变， $I(w_0) = \Phi^+$ ，结论退化为原始 Graham 正性。<sup>16</sup>

#### 44. Grothendieck 多项式是什么？

**44.1. 问题.** 笔记中多次提到 Grothendieck 多项式（如 section 3.5），它与 Schubert 多项式有什么关系？

**44.2. 回答.** **Grothendieck 多项式 (Grothendieck polynomial)** 是 Schubert 多项式的推广，由 Alexander Grothendieck 在 1950 年代引入。**历史背景**：Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  由 Lascoux 和 Schützenberger 在 1980 年代引入，用于表示旗流形上 Schubert 胞腔的上同调类。但这只解决了旗流形的普通上同调。1950 年代，Grothendieck 和 Grothendieck 学生 Demazure 研究了旗流形的 Chow 群和代数 K-理论。他们发现，在 K-理论中，Schubert 类的代表元不再是多项式，而是更复杂的对象——这就是 Grothendieck 多项式。**与 Schubert 多项式的关系**：在旗流形的 K-理论中，Schubert 胞腔的结构常数不再是非负整数，而是更一般的表达式。Grothendieck 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$  满足：

(1) **退化到 Schubert 多项式**：当限制到上同调时， $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$  退化为  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) \equiv \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) \pmod{\mathbb{Z}_{>0}[\text{次数} \geq 1]}$$

(2) **K-理论中的地位**：在  $K^0(Fl_n) \otimes \mathbb{Q}$  中， $\{\tilde{\mathfrak{S}}_w\}$  构成基

**组合定义**：Grothendieck 多项式可以用除差算子递归定义：

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) = \partial_i^{-1} \tilde{\mathfrak{S}}_{ws_i}(\mathbf{x}) \quad (\text{当 } i \text{ 是 } w \text{ 的 descent})$$

但这里的  $\partial_i^{-1}$  是逆除差算子，定义为：

$$\partial_i^{-1}(f) = \sum_{k \geq 0} x_i^k \cdot \partial_i(f)$$

这导致 Grothendieck 多项式是无穷级数，但可以证明在 K-理论中是良定义的。**几何意义**：在代数 K-理论中，旗流形的结构环  $K^0(Fl_n)$  由 Schubert 类  $[\mathcal{O}_{\overline{B-wB/B}}]$  生成。Grothendieck 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$  是这些 K-理论类的代表元。**正性**：与 Schubert 多项式类似，Grothendieck 多项式的结构常数也满足某种正性。在 Fan-Guo-Xiong [7] 中，他们建立了双重 Grothendieck 多项式范围的正性公式，使用 puzzles 方法。**笔记中的位置**：在 section 3.5 中，笔记讨论了关于 Grothendieck 多项式的 positivity 猜想，这是 Gao-Xiong 工作的自然推广方向之一。<sup>17</sup>

#### 45. Billey 公式的显式形式

**45.1. 问题.** 正文 (section 3.3) 说“从其显式形式（此处略去）”，Billey 公式的显式形式到底是什么？

<sup>16</sup>问：为什么假设更强反而结果更强？见附录 section 43。

<sup>17</sup>问：Grothendieck 多项式是什么？见附录 section 44。

**45.2. 回答. Billey 公式 (1999)** 由 Sara Billey 在论文《Decompositions of the cone of Schur functions》中给出, 是计算 Schubert 类在旗流形  $G/B$  的 torus 固定点处限制的组公式。**限制公式**: 对任意  $u, w \in W$ ,

$$[\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w = \sum_{\substack{v \in W \\ u \leq v \leq w}} \prod_{\alpha \in R^+(w) \setminus R^+(v)} \alpha$$

其中  $R^+(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha < 0\}$  是  $w$  的反转集。**几何意义**:  $[\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w$  是 Schubert 类限制到 torus 固定点  $wB/B$  的等变量子上同调类。由于  $H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(\text{pt}) = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$ , 限制结果是一个单项式之和。Billey 公式表明: 这些单项式的指数恰好对应 Bruhat 区间  $[u, w]$  中  $v$  的反转集差集。**正性**: 由于  $R^+(w) \setminus R^+(v) \subseteq R^+(w)$ , 而  $R^+(w)$  中的根都是正根, 故每个单项式都是正根的乘积。这给出了 Graham Positivity 最早的几何解释之一。**结构常数公式** ([3, Corollary 4.3]): 对于 Schubert 结构常数  $c_{uv}^w(\mathbf{y})$ ,

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}) = \sum_{b \in \mathcal{C}(u, v, w)} \prod_{\alpha \in \text{Inv}(b)} \alpha$$

其中  $\mathcal{C}(u, v, w)$  是特定 braid 元胞腔,  $\text{Inv}(b)$  是其反转集。

## 46. $\sigma(u)^T$ 的含义

**46.1. 问题.**  $\sigma(u)^T$  是什么意思? 上标  $T$  代表什么?

**46.2. 回答.**  $\sigma(u)^T$  是等变量子上同调中的 Schubert 类。在等变量子上同调 (equivariant cohomology) 中, 上标  $T$  表示我们考虑的是 torus 等变版本。具体而言:

- $\sigma(u)$ : 普通上同调中的 Schubert 类, 定义为旗流形  $X = G/P$  中 Schubert 簇  $Y(u) = \overline{B^{-u}P/P}$  的 Poincaré 对偶类
- $\sigma(u)^T$ : 等变量子上同调中的 Schubert 类, 是  $\sigma(u)$  到等变量子上同调  $H_T^*(X)$  的提升

**为什么需要  $T$ ?** 在等变量子上同调中, 我们考虑群  $T$  (torus, 最大环面) 作用在流形  $X$  上。类不再是  $X$  的普通上同调类, 而是提升到同伦商空间 (homotopy quotient)  $X \times_T ET$  上的类。**与普通上同调的关系**: 当忘掉 torus 作用 (即在  $H_T^*(X) \otimes_{\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]} \mathbb{Z}$  中令所有  $x_i = 0$ ) 时,  $\sigma(u)^T$  退化回  $\sigma(u)$ 。**笔记中的位置**: 正文

**46.3. 例子. 例 1: Grassmannian  $Gr(2, 4)$  情形.** 设  $X = Gr(2, 4) = GL_4/B$  (2 维平面构成的 Grassmannian)。其等变量子上同调  $H_T^*(X)$  中, Schubert 类可显式写出。固定最大环面  $T \subset GL_4$  作用在平面上。则  $\sigma(u)^T$  在 torus 固定点处的限制为:

- 对于  $u = s_1 s_2$  (最短代表元), 有  $\sigma(s_1 s_2)^T|_p = x_1 + x_2$ ;
- 对于  $u = s_2 s_1$ , 有  $\sigma(s_2 s_1)^T|_p = x_1 + x_3$ ; nditemize 其中  $x_1, x_2$  是负单根参数。当  $x_i = 0$  时, 这些退化为普通上同调中的类 (交点个数)。**例 2: 旗流形  $Fl_3 = GL_3/B$  情形.** 在旗流形  $Fl_3$  上, 取  $u = s_1, v = s_2$ 。则在  $H_T^*(Fl_3)$  中, 利用 Schubert 类的相交理论:

$$\sigma(s_1)^T \cdot \sigma(s_2)^T = \sigma(s_1 s_2)^T + x_1 x_2 \cdot \sigma(1)^T.$$

其中各项的含义:

- $\sigma(s_1 s_2)^T$ : 对应置换  $s_1 s_2$  的 Schubert 类;
- $x_1 x_2 \cdot \sigma(1)^T$ : 这是等变修正项,  $x_1, x_2$  是负单根参数,  $\sigma(1)^T$  是单位类。

**验证正性**: 展开系数为 1 (非负整数) 和  $x_1 x_2$  (非负单项式), 符合 Graham positivity 的要求。

## 47. Gromov-Witten 不变量

**47.1. 问题.** 什么是 Gromov-Witten 不变量？它计数的是什么？

**47.2. 回答.** **Gromov-Witten 不变量 (GW 不变量)** 是计数满足特定条件的**稳定映射 (stable map)** 个数的代数不变量。**核心思想**：在量子上同调中，我们不仅考虑点与点的相交，还考虑曲线与曲线的相交。Gromov-Witten 不变量计数的是：给定旗流形  $X$  中三个 Schubert 条件，有多少条有理曲线 ( $\mathbb{P}^1$ ) 同时满足这些条件。**形式定义**：对于亏格  $g$ 、 $n$  个标记点的稳定映射模空间  $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, d)$ ，Gromov-Witten 不变量定义为：

$$\langle \sigma(u_1), \dots, \sigma(u_n) \rangle_{g,n,d} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,d)]^{extvir}} \prod_{i=1}^n ev_i^* \sigma(u_i).$$

**几何意义：**

- $g = 0$  (亏格 0) 时，计数的是  $\mathbb{P}^1$  上满足条件的曲线个数；
- $n = 3$  (三个标记点) 对应三点函数 (three-point function)；
- $d$  是曲线的同调类 (curve class)。

**为什么叫“不变量”？** 因为它不依赖于簇的具体实现方式，只依赖于其代数几何的同伦类型——不同的代数几何计算如果同伦等价，则 GW 不变量相同。**与经典 Schubert calculus 的区别：**

- 经典：计数点是 Schubert 簇的相交个数；
- 量子：计数曲线是稳定映射的个数，涉及模空间积分。

**笔记中的位置：**正文 section 7 使用 GW 不变量解释 EQLR 系数的几何意义。

## Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for  $g/b$ . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- [4] Armand Borel. Sur la cohomologie des espaces fibrés principaux et des espaces homogènes de groupes de lie compacts. *Annals of Mathematics*, 57(2):115–207, 1957.
- [5] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.
- [6] Claude Chevalley. Sur les décompositions cellulaires des espaces  $g/b$ . 1994. Published posthumously, with commentary by William Fulton.
- [7] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- [8] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
- [9] William Fulton and Rahul Pandharipande. *Notes on stable maps and quantum cohomology*. 1997. preprint, arXiv: alg-geom/9608011.
- [10] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- [11] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- [12] Mikhail Gromov. Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds. *Inventiones Mathematicae*, 82:307–347, 1985.
- [13] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [14] Bumsig Kim. Equivariant quantum cohomology. *Mathematical Research Letters*, 6(5-6):613–618, 1999.
- [15] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [16] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [17] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [18] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [19] Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.

- [20] Maxim Kontsevich. Enumeration of rational curves via torus actions. *Progress in Mathematics*, 129:335–368, 1994.
- [21] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.
- [22] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.
- [23] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
- [24] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [25] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [26] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [27] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.