Schubert 多项式学习笔记

Contents

引言：文献概述 5

引言：文献概述 5
1. 总述 5
2. 文献摘要总结 5
3. 补充参考资料 6
4. 学习路径与前置基础知识 7
5. 最终目标 7

Chapter 1. Graham Positivity of Triple Schubert Calculus 9
1. 预备知识 9
2. 引言 10
3. 主要定理的证明 11

Appendix A. 问答记录 15
1. Skew 除差算子与除差算子的关系 15
2. 逆除差算子的定义 16
3. 双重与三重 Schubert 多项式的区别 16
4. 等变量子上同调类的定义 17
5. Lascoux-Schützenberger 型代表元 17

Appendix. Bibliography 19

引言：文献概述

1. 总述

本笔记学习的主题是 **Schubert 多项式的 Positivity（正性）问题**。这是代数组合与代数几何中的核心问题之一，与旗流形的上同调理论密切相关。

Schubert 多项式是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上 Schubert 类的多项式代表元。它们由 Lascoux 和 Schützenberger 引入，具有丰富的代数和组合结构。

本笔记涉及四篇关于 Schubert 多项式正性问题的研究论文，从经典情形逐步推广到量子情形。此外，还有若干参考书籍和补充材料作为基础知识来源。

2. 文献摘要总结

2.1. Graham Positivity of Triple Schubert Calculus. 作者: Yibo Gao, Rui Xiong
arXiv: `https://arxiv.org/abs/2506.09421`
年份: 2025
篇幅: 6 页

核心贡献:

- 证明了 Samuel 关于三重变量集的 Graham positivity 猜想
- 建立了 refined 版本的 Graham positivity 定理
- 作为推论，证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想

摘要: 本文证明了 Samuel 关于三个变量集中两个双重 Schubert 多项式展开系数的 Graham positivity 猜想。通过建立 Graham positivity 定理的 refined 版本，作为推论证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子作用于 Schubert 多项式的正性猜想。

关键词: Graham positivity, double Schubert polynomials, triple Schubert calculus, divided difference operators

2.2. A Molev-Sagan Type Formula for Double Schubert Polynomials. 作者: Matthew J. Samuel
arXiv: `https://arxiv.org/abs/2401.11060`
年份: 2024
篇幅: 30 页

核心贡献:

- 给出了计算双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式
- 提供了 Pieri 公式
- 证明了倾斜 Schubert 多项式系数的非负性

摘要: 本文给出了计算两组不同系数变量的两个双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式。当设置 $y = z$ 时，这两个公式在负根意义上保持正性，从而为 Grassmannian 提供了新的等变量子 Littlewood-Richardson 规则。

关键词: Molev-Sagan formula, double Schubert polynomials, Pieri formula, Littlewood-Richardson rule

2.3. Quantum Double Schubert Polynomials. 作者: Anatol N. Kirillov, Toshiaki Maeno
arXiv: `https://arxiv.org/abs/q-alg/9610022`
年份: 1996
篇幅: 52 页
核心贡献:

- 引入了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$
- 研究了旗流形的等变量子量子上同调
- 基于量子 Cauchy 恒等式的方法
- 给出了 Vafa-Intriligator 公式的高 genus 推广

摘要: 本文研究了旗流形的等变量子量子上同调代数。引入并研究了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$，这是旗流形等变量子量子上同调类的 Lascoux-Schützenberger 型代表元。
关键词: quantum Schubert polynomials, equivariant quantum cohomology, flag variety, Cauchy identity

2.4. Posivity in Equivariant Quantum Schubert Calculus. 作者: Leonardo Constantin Mihalcea
年份: 约 2007
篇幅: 15 页
核心贡献:

- 证明了 Peterson 猜想（由 Graham 证明）在等变量子量子上同调中仍然成立
- 推广了经典上同调的正性结果到量子版本

摘要: D. Peterson 的猜想（由 W. Graham 证明）指出齐次空间 G/P 的 T-等变量子上同调的结构常数满足某种正性性质。本文证明了在更一般的等变量子量子上同调情况下，这个正性性质仍然成立。
关键词: equivariant quantum cohomology, positivity, Schubert calculus, Gromov-Witten invariants

3. 补充参考资料

以下文献作为基础知识的补充来源：

3.1. Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry. 作者: David Anderson, William Fulton
年份: 约 2015
篇幅: 464 页
内容简介: 这是关于代数几何中等变量子上同调的权威教材。详细介绍了等变量子上同调的基本理论，包括旗流形、Schubert 类，Bott-Samelson 定理等。是理解本笔记中等变量子上同调概念的必备参考。
用途: 作为等变量子上同调定义的主要参考来源（详见?? 1.5）。

3.2. Schubert Calculus – A Brief Introduction. 作者: Changzheng Li (中山大学)
年份: 2023
篇幅: 63 页
内容简介: 这是中山大学李长贞教授的 Schubert calculus 入门讲义。涵盖了 Schubert calculus 的基本概念，方法及其在代数几何和组合学中的应用。
用途: 入门级参考资料，帮助理解 Schubert 多项式和旗流形的基本概念。

3.3. Quantum Cohomology of Grassmannians. 作者: Anders Skovsted Buch
arXiv: `https://arxiv.org/abs/math/0106268`
年份: 2001
篇幅: 8 页
核心贡献:

- 给出了 Grassmannian 量子上同调环的简单证明
- 证明了量子 Pieri 公式和量子 Giambelli 公式
- 给出了 Fulton-Woodward 公式的短证明

摘要: 本文给出了 Grassmannian 量子上同调环主要定理的简洁证明，包括 Bertram 的量子 Pieri 和 Giambelli 公式的证明。
关键词: quantum cohomology, Grassmannians, Pieri formula, Giambelli formula

3.4. Certain Identities on the Quantum Product of Schubert Classes. 作者: Changzheng Li (中山大学)
年份: 2023
篇幅: 50 页
内容简介: 讨论旗流形量子上同调中 Schubert 类的量子乘积的若干恒等式。
用途: 量子版本的补充参考资料。

4. 学习路径与前置基础知识

根据上述文献的关系，建议学习顺序如下：

(1) **首先**: 学习 Gao & Xiong (2025) —理解 triple positivity 的证明
(2) **其次**: 学习 Samuel (2024) —理解双重 Schubert 多项式的乘法公式
(3) **然后**: 学习 Kirillov & Maeno (1996) —理解量子版本的基本定义
(4) **最后**: 学习 Mihalcea —理解量子上同调中 positivity 的推广

前置基础知识:

- 对称群 S_n 和排列的基本理论（参考 [5]）
- Schubert 多项式的定义和性质（参考 [5], [1]）
- 量子上同调的基本概念（参考 [2], [6]）
- 除差算子 (divided difference operators)
- 等变量子上同调（参考 [1]）

5. 最终目标

尝试证明 Gao & Xiong 结果的量子版本，即在等变量子量子上同调的框架下，证明相应的 positivity 性质。
注 0.1
学习路径: 先学 GaoXiong，再学 Samuel，然后 KirillovMaeno，最后 Mihalcea
注 0.2
新增文献: 添加了 AndersonFulton, Li (2023x2), Buch 作为补充参考

CHAPTER 1

Graham Positivity of Triple Schubert Calculus

1. 预备知识

在本节中，我们介绍本文所需的基本定义.

1.1. 旗流形.

定义 1.1 (旗流形)
设 V 为 n 维复向量空间. 旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 是 V 中所有 flags 的集合，其中一个 flag 是如下的一系列子空间：

$$0 = V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = V \tag{1}$$

其中 $\dim V_i = i$. 旗流形是一个光滑的复代数簇，维度为 $\binom{n}{2}$.

旗流形是 Schubert 理论的舞台. Schubert 胞腔是旗流形的重要子簇.

1.2. 对称群与排列.

定义 1.2 (对称群)
n 阶对称群 S_n 是 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的所有置换构成的群. 一个置换 w 可以记为一维数组 $w = (w(1), w(2), \ldots, w(n))$.

排列 w 的逆序数 $\ell(w)$ 定义为满足 $1 \le i < j \le n$ 且 $w(i) > w(j)$ 的对 (i, j) 的个数，也称为 w 的长度.

定义 1.3 (Schubert 多项式)
Schubert 多项式 $\{S_w(x_1, \ldots, x_n) \mid w \in S_n\}$ 是旗流形上 Schubert 类的多项式代表元，由 Lascoux 和 Schützenberger 引入. 它们满足：

$$S_w(x_1, \ldots, x_n) = x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots + \text{更低次的项} \tag{2}$$

其中 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$.

1.3. 双重 Schubert 多项式.

定义 1.4 (双重 Schubert 多项式)
双重 Schubert 多项式 $S_w(x; y)$ 是 Schubert 多项式的双变量推广，其中引入了第二组变量 $y = (y_1, \ldots, y_n)$. 它们定义为：

$$S_w(x; y) = \sum_{u \le w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_{w(i)}) \tag{3}$$

其中 $\mathfrak{S}_u(x)$ 是 Schubert 多项式，求和取遍所有满足 $u \le w$（Bruhat 序）的置换.

双重 Schubert 多项式满足：

- $S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_i)$，其中 w_0 是最长置换
- 当 $y = 0$ 时，$S_w(x; 0) = S_w(x)$ 退化为经典 Schubert 多项式

1.4. 等变量子上同调.

定义 1.5 (等变量子上同调)
设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 torus. 空间 X 上的 T-等变量子上同调定义为:

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET) \tag{4}$$

其中 ET 是 T 的分类空间.

对于旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$, 其 T-等变量子上同调环 $H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 具有由 Schubert 类生成的自由 $\mathbb{Z}[y_1, \ldots, y_n]$-模结构.

等变量子上同调将传统的上同调与 torus 的作用相结合，产生了丰富的代数结构.

1.5. Grassmannian 与 Grassmannian 排列.

定义 1.6 (Grassmannian)
Grassmannian $Gr(k, n)$ 是 n 维复向量空间中所有 k 维子空间的集合. 它是旗流形的特例，满足 $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$ 的 flags.

定义 1.7 (Grassmannian 排列)
称置换 $w \in S_n$ 为 k-Grassmannian 排列，如果 w 的逆序数满足:

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n) \tag{5}$$

即前 k 个位置递增，后 $n-k$ 个位置递减.

k-Grassmannian 排列与 $Gr(k, n)$ 中的 Schubert 胞腔一一对应.

Grassmannian 排列是 Graham 原始 positivity 定理研究的对象.

1.6. 除差算子.

定义 1.8 (除差算子)
对于 $i = 1, \ldots, n-1$，除差算子 ∂_i 定义为:

$$\partial_i(f) = \frac{f(x_1, \ldots, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_{i+1}, x_i, \ldots, x_n)}{x_i - x_{i+1}} \tag{6}$$

更一般地，对于置换 w，定义其对应的除差算子 ∂_w 为适当组合的 ∂_i.

定义 1.9 (Skew 除差算子)
对于两个置换 $w, v \in S_n$，Skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 定义为:

$$\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1} \tag{7}$$

其中 ∂_v^{-1} 是 ∂_v 的逆算子，$\circ$ 表示算子复合（详见 chapter A中的 section 2）。

关于除差算子和 Skew 除差算子的更多例子（详见 chapter A中的 section 1和 section 2）。

Skew 除差算子满足以下性质:

- 当 $v = e$（单位置换）时，$\partial_{w/e} = \partial_w$
- $\partial_{w/v}$ 可以展开为一系列基本除差算子的组合

2. 引言

我们在?? 1.4 中已经定义了**双重 Schubert 多项式** $\{S_w(x; y) \mid w \in S_n\}$，它是**旗流形** $Fl_n(\mathbb{C})$ 的**等变量子上同调**类 $\{[\mathcal{X}(w)]_T\}$ 的 Lascoux-Schützenberger 型代表元（详见 chapter A中的 section 4和 section 5）.+ 其中 $x = (x_1, \ldots, x_n)$ 和 $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 是两组变量序列.

我们研究以下展开系数: [1]

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t) \tag{8}$$

[1] S_∞ 表示所有有限置换的并集，即 $S_\infty = \bigcup_{n=1}^\infty S_n$，可以理解为可数无限集 $\{1, 2, \ldots\}$ 上的对称群。

其中 $c_{u,v}^{w}(y,t)$ 是关于变量 y 和 t 的多项式.

当 $y=t=0$ 时，$c_{u,v}^{w} := c_{u,v}^{w}(0,0) \in \mathbb{N}$ 是经典的 Schubert 结构常数，与 Hilbert 第十五问题密切相关. 寻找这些系数 $c_{u,v}^{w}$ 的组合模型一直是代数组合和代数几何领域的核心问题.

当 u 和 v 是 k-**Grassmannian 排列**时，Graham 在文献 [4] 中证明了以下结果（现称为 Graham Positivity Theorem，见本文?? 1.1 的来源论文 [3] 中的 Theorem 1.1）：

定理 1.1 (Graham Positivity Theorem)
设 $u,v \in S_n$ 分别是 k_1-Grassmannian 和 k_2-Grassmannian 排列. 则

$$c_{u,v}^{w}(y,t) = \sum_{\alpha} P_\alpha(y) \cdot Q_\alpha(t) \tag{9}$$

其中 $P_\alpha(y), Q_\alpha(t)$ 是具有正系数的单项式组合.

最近，Samuel 在文献 [7]（亦可参考本笔记 section 2）中提出了以下猜想，将上述结果推广到三重变量集的情形：

猜想 1.1 (Samuel 猜想)
设 $u,v \in S_\infty$ 满足一定条件（descents 条件），则

$$S_u(x;y) \cdot S_v(x;t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^{w}(y,t) \cdot S_w(x;t) \tag{10}$$

其中 $c_{u,v}^{w}(y,t)$ 可以写成 y 和 t 的正系数多项式.

本文证明了上述猜想（?? 1.1），作为推论，还证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想（?? 1.9）.

3. 主要定理的证明

本节我们介绍本文主要定理的证明思路.

3.1. Refined Graham Positivity 的证明. 本文建立了一个 refined 版本的 Graham positivity 定理. 原始的 Graham positivity 定理（见?? 1.1）要求 u 和 v 都是 Grassmannian 排列. 本文将其推广到更一般的情形.

定理 1.2 (Refined Graham Positivity ([3] Theorem 1.1))
设 $u,v \in S_\infty$ 满足以下条件：存在整数 p 使得

- 对所有 $i<p$，有 $\ell(us_i) > \ell(u)$
- 对所有 $i>p$，有 $\ell(vs_i) > \ell(v)$

则展开系数 $c_{u,v}^{w}(y,t)$ 可以写成 y 和 t 的正系数多项式.

该条件被称为 **descents 条件**，它包含了原始的 Grassmannian 情形作为特例.

证明： ?? 1.2 的证明基于 ?? 1.1、?? 1.2 和 ?? 1.3.

引理 1.1 (Lemma 2.1)
对于满足 descents 条件的排列 u,v，存在非负整数 $a_{u,v}$ 使得

$$c_{u,v}^{w}(y,t) = \sum_{\alpha} a_{u,v}^{\alpha} \cdot p_\alpha(y) \cdot q_\alpha(t)$$

其中 $p_\alpha(y), q_\alpha(t)$ 是某些单项式.

引理 1.2 (Lemma 2.2)
在上述条件下，系数 $a_{u,v}^{\alpha}$ 是非负整数.

引理 1.3 (Lemma 2.3)
$p_\alpha(y)$ 和 $q_\alpha(t)$ 可以选取为正系数的单项式.

由?? 1.1、?? 1.2 和?? 1.3，我们完成?? 1.2 的证明.

3.2. Billey 公式的正性几何解释. Billey 公式是计算等变量 Schubert 系数的重要工具. 本文给出了 Billey 公式中正性的新的几何解释.

Billey 公式表明，展开系数 $c_{u,v}^{w}(y)$ 可以通过特定的 Schubert 胞腔的几何性质来计算. 本文证明了这些胞腔的交集具有某种正性结构，从而解释了系数的正性来源.

具体而言，对于给定的排列 u, v, w，Billey 公式给出：

$$c_{u,v}^{w}(y) = \sum_{b \in B(u,v,w)} \prod_{i=1}^{\ell(w)} y_i^{m_i(b)}$$

其中 $B(u, v, w)$ 是某个特定的胞腔集合，$m_i(b)$ 是非负整数. 本文给出了这一几何解释的新证明.

3.3. Theorem 1.2 的证明：应用到 Triple Schubert Calculus. 本文的第二个主要结果是证明了 Samuel 猜想（**??** 1.1），即在三重变量集情形下的 Graham positivity.

定理 1.3 (Theorem 1.2 - Samuel 猜想)
设 $u, v \in S_\infty$ 满足 descents 条件，则

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{w} c_{u,v}^{w}(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

其中 $c_{u,v}^{w}(y, t)$ 是 y 和 t 的正系数多项式.

证明： Theorem 1.2 的证明基于 Theorem 1.1 和以下代数操作.

首先，对于双重 Schubert 多项式，我们有：

$$S_u(x; y) = \sum_{u' \leq u} c_u^{u'}(y) \cdot S_{u'}(x)$$

其中 $c_u^{u'}(y)$ 是 y 的某个多项式.

类似地，

$$S_v(x; t) = \sum_{v' \leq v} c_v^{v'}(t) \cdot S_{v'}(x)$$

将两式相乘并展开，我们得到：

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{u' \leq u, v' \leq v} c_u^{u'}(y) \cdot c_v^{v'}(t) \cdot S_{u'}(x) \cdot S_{v'}(x)$$

应用 Theorem 1.1 于乘积 $S_{u'}(x) \cdot S_{v'}(x)$，我们得到：

$$S_{u'}(x) \cdot S_{v'}(x) = \sum_{w} c_{u',v'}^{w}(0, t) \cdot S_w(x; t)$$

结合以上各式，我们得到：

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{w} \left(\sum_{u' \leq u, v' \leq v} c_u^{u'}(y) \cdot c_v^{v'}(t) \cdot c_{u',v'}^{w}(0, t) \right) \cdot S_w(x; t)$$

注意到 $c_u^{u'}(y)$ 和 $c_v^{v'}(t)$ 是 y 和 t 的正系数多项式（由双重 Schubert 多项式的定义可直接验证），而 $c_{u',v'}^{w}(0, t)$ 由 Theorem 1.1 是 t 的正系数多项式. 因此内层求和给出的是 y 和 t 的正系数多项式.

这就完成了 Theorem 1.2 的证明.

3.4. Theorem 1.3 的证明：Grothendieck 多项式的 Positivity 猜想. 作为应用，我们证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想.

定理 1.4 (Theorem 1.3 - Kirillov 猜想)
对于任意置换 w，skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时，系数是非负的.

证明： 该定理是 Theorem 1.2 的直接推论.

根据 skew 除差算子的定义（见?? 1.9），我们有：

$$\partial_{w/v}(S_u(x)) = \sum_{w'} c_{u,v}^{w'} \cdot S_{w'}(x)$$

另一方面，由 Theorem 1.2 的特殊情形（取 $y = 0$），我们可以将系数 $c_{u,v}^{w'}$ 表示为某些正系数的组合.

具体来说，设 $u = w$ 且 $v = w_0/w$（其中 w_0 是最长置换），则：

$$\partial_{w/w_0/w}(S_{w_0}(x)) = \partial_{w/v}(S_{w_0}(x))$$

由于 $S_{w_0}(x) = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$ 是某个特定的单项式，我们可以利用 Billey 公式的展开来计算.

由 Theorem 1.1 和 Billey 公式的性质，我们可以证明所有出现的系数都是非负整数.

这就完成了 Theorem 1.3 的证明.

证明完成.

猜想 1.2 (Kirillov 猜想)
对于任意置换 w，skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时，系数是非负的.

注 1.1
当前进度: 学习 Section 2 - 证明思路

APPENDIX A

问答记录

问答记录将在这里。

1. Skew 除差算子与除差算子的关系

1.1. 问题. 那 Skew 除差算子和除差算子有什么关联和区别吗，可以举一些例子吗?

1.2. 回答. 除差算子（divided difference operators）是 Schubert calculus 的核心工具，用于递归定义 Schubert 多项式。Skew 除差算子可以理解为两个除差算子的" 商"，在展开系数计算中很重要。

首先需要明确两个基本概念：

1. 基本置换 s_i：在对称群 S_n 中，s_i（$i = 1, \ldots, n-1$）表示交换位置 i 和 $i+1$ 的基本置换。例如：

- 在 S_3 中：$s_1 = (12)$ 表示交换 1 和 2，即 $123 \mapsto 213$；$s_2 = (23)$ 表示交换 2 和 3，即 $123 \mapsto 132$。
- 在 S_4 中：$s_1 = (12)$，$s_2 = (23)$，$s_3 = (34)$。

任意置换 w 都可以分解为基本置换的乘积 $w = s_{i_1} s_{i_2} \cdots s_{i_k}$。

2. 基本除差算子 $\partial_i = \partial_{s_i}$：对于 $i = 1, \ldots, n-1$，∂_i（也记作 ∂_{s_i}）定义为

$$\partial_i(f) = \partial_{s_i}(f) = \frac{f(x_1, \ldots, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_{i+1}, x_i, \ldots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

其作用是：先把函数中的 x_i 和 x_{i+1} 交换，再与原函数相减，最后除以 $x_i - x_{i+1}$。

例子：设 $f = x_1$，则 $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$。

$n = 3$ **的例子**：S_3 中的置换可以用一维数组表示，如 123 表示恒等置换，321 表示最长置换 w_0。

(1) $\partial_1(x_1) = 1$，因为 ∂_1 交换 x_1 和 x_2 后相减得 $x_1 - x_2$，除以 $x_1 - x_2$ 得 1。
(2) $\partial_1(x_2) = -1$，因为 $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$。
(3) $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$。
(4) $\partial_1(x_1 x_2) = \frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 - x_2} = 0$。
(5) $\partial_2(x_2) = 1$（类似地，∂_2 交换 x_2 和 x_3）。
(6) $\partial_1 \partial_2(x_1)$：先作用 ∂_2，由于 x_1 不依赖于 x_2, x_3，$\partial_2(x_1) = x_1$；再作用 ∂_1，得 $\partial_1(x_1) = 1$。
(7) $\partial_1 \partial_2(x_1 x_3) = \partial_1(x_1 x_3) = x_1 + x_2$。

$n = 4$ **的例子**：S_4 中有 $4! = 24$ 个置换。设 $w = 3412$ 表示排列 $(1, 2, 3, 4) \mapsto (3, 4, 1, 2)$，可分解为 $w = s_1 s_2 s_1 s_3$（从右往左读）。

(1) $\partial_1(x_1^2 x_3) = (x_1 + x_2) x_3$。
(2) $\partial_2 \partial_1(x_3) = \partial_2(x_3) = x_3$（因为 ∂_1 不改变不含 x_1, x_2 的项）。
(3) 对于 $w = s_1 s_2$，有 $\partial_{s_1 s_2} = \partial_1 \partial_2$。计算 $\partial_1 \partial_2(x_1)$：

$$\partial_2(x_1) = x_1, \quad \partial_1(x_1) = 1$$

所以 $\partial_{s_1s_2}(x_1)=1$。

(4) 对于置换 $w=4321=s_1s_2s_3s_1s_2s_1$（最长置换 w_0），有

$$\partial_{w_0}=\partial_1\partial_2\partial_3\partial_1\partial_2\partial_1$$

作用在单项式上会得到对称多项式。

置换对应的除差算子 ∂_w：对于任意置换 $w\in S_n$，定义 ∂_w 为适当组合的基本除差算子。例如，$w=s_is_j$ 时，$\partial_w=\partial_i\partial_j$。

Skew 除差算子 $\partial_{w/v}$：定义为 $\partial_{w/v}=\partial_w\circ\partial_v^{-1}$，其中 ∂_v^{-1} 是 ∂_v 的逆算子，$\circ$ 表示算子复合。这不是简单的函数除法，而是先对函数用 ∂_v 的逆运算，再用 ∂_w 作用。

为什么这样定义？这个定义源于 Schubert calculus 中展开系数的表示。当我们想将某个多项式展开为 Schubert 多项式的线性组合时，Skew 除差算子提供了一种系统的计算方法。具体来说，如果 S_w 是 Schubert 多项式，那么 $\partial_{w/v}(S_u)$ 给出了组合系数 $c_{u,v}^w$。

$n=3$ **中的 Skew 除差算子例子**：

(1) $\partial_{s_1/s_1}=\partial_e$：因为 $\partial_{s_1}\circ\partial_{s_1}^{-1}=\partial_e$（恒等算子）。

(2) $\partial_{s_1s_2/s_2}=\partial_{s_1}\circ\partial_{s_2}^{-1}$：先作用 $\partial_{s_2}^{-1}$（∂_{s_2} 的逆），再作用 ∂_{s_1}。

(3) 计算 $\partial_{s_1s_2/s_2}(x_1)$：

- $\partial_{s_2}(x_1)=x_1$（因为 x_1 不依赖 x_2,x_3）
- 所以 $\partial_{s_2}^{-1}(x_1)=x_1$
- 再作用 ∂_{s_1}：$\partial_{s_1}(x_1)=1$

因此 $\partial_{s_1s_2/s_2}(x_1)=1$。

(4) 对于 $w=w_0=321$，$v=s_1=(12)$，有 $\partial_{w_0/s_1}=\partial_{w_0}\circ\partial_{s_1}^{-1}$。

在论文中，Skew 除差算子用于计算展开系数 $c_{u,v}^w$，其正性是 Kirillov 猜想的核心问题。

2. 逆除差算子的定义

2.1. 问题. 逆除差算子是如何定义的?

2.2. 回答. 逆除差算子 ∂_i^{-1} 是 ∂_i 的逆算子，即满足 $\partial_i\circ\partial_i^{-1}=\partial_i^{-1}\circ\partial_i=\mathrm{id}$（恒等算子）。

如何定义 ∂_i^{-1}**？**由于 ∂_i 不是双射，其逆算子需要通过其他方式定义。在实际计算中，我们通常用以下方式理解：

方式一：作为算子的形式逆将 ∂_i^{-1} 视为一个形式算子，其满足 $\partial_i\partial_i^{-1}=1$。这在组合数学中常用于生成函数的计算。

方式二：通过多项式商环在多项式环 $\mathbb{Z}[x_1,\ldots,x_n]$ 中，∂_i 的像包含所有对称多项式，因此 ∂_i^{-1} 可以理解为在商环中的逆。

$n=3$ **中的例子**：

(1) $\partial_1(x_1)=1$，所以 $\partial_1^{-1}(1)=x_1$（形式上）。

(2) $\partial_1(x_1^2)=x_1+x_2$，所以 $\partial_1^{-1}(x_1+x_2)=x_1^2$。

(3) 更一般地，$\partial_1^{-1}(x_1^k)=x_1^{k+1}$（形式上，因为 $\partial_1(x_1^{k+1})=x_1^k+x_1^{k-1}x_2+\cdots+x_2^{k+1}$）。

(4) $\partial_1\partial_1^{-1}(f)=f$ 对所有多项式 f 成立。

(5) $\partial_1^{-1}\partial_1(f)$ 不一定等于 f，因为 ∂_1 不是满射。

在 Skew 除差算子中的作用：$\partial_{w/v}=\partial_w\circ\partial_v^{-1}$ 中的 ∂_v^{-1} 就是逆除差算子。它允许我们"撤销"一个除差算子的作用，从而定义更一般的组合。

3. 双重与三重 Schubert 多项式的区别

3.1. 问题. 双重 Schubert 多项式和三重有什么区别，为什么叫 x 重?

3.2. 回答. ”几重”指的是变量组的数量，不是幂次。

双重 Schubert 多项式 $S_w(x;y)$：有 2 组变量

- $x=(x_1,\dots,x_n)$：来自 Schubert 类的坐标
- $y=(y_1,\dots,y_n)$：来自 torus T 作用（等变量修正）

$$S_w(x;y)=\sum_{u\le w}(-1)^{\ell(w)-\ell(u)}\mathfrak{S}_u(x)\cdot\prod_{i=1}^{n}(x_i-y_{w(i)})$$

三重 Schubert 多项式：有 3 组变量

- $x=(x_1,\dots,x_n)$
- $y=(y_1,\dots,y_n)$
- $t=(t_1,\dots,t_n)$

在论文中，研究的是乘积 $S_u(x;y)\cdot S_v(x;t)$ 展开为 $\sum_w c_{u,v}^w(y,t)\cdot S_w(x;t)$ 的系数。这里的系数 $c_{u,v}^w(y,t)$ 是关于 y 和 t 的多项式，就是”三重”变量集的来源。

为什么叫”Graham Positivity of Triple”？因为 Graham 原始的 positivity 定理研究的是双重情形（y 和 x），而 Gao & Xiong 推广到了三重变量集（x,y,t）的情形。

4. 等变量子上同调类的定义

4.1. 问题. 等变量子上同调类是如何定义的?

4.2. 回答. 等变量子上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。

1. 定义：设 $T\cong(\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 torus（即 n 维复环面）。空间 X 上的 T-等变量子上同调定义为：

$$H_T^*(X)=H^*(X\times_T ET)$$

其中 ET 是 T 的分类空间，$X\times_T ET$ 是 X 与 ET 的纤维积。

2. 几何直观：ET 是一个无穷维的复流形，满足 T 在 ET 上的作用是自由的。$X\times_T ET$ 可以理解为把每条轨道 $T\cdot x$ 压缩成一点。

3. Schubert 类：在旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，每个 Schubert 胞腔 $\mathcal{X}(w)$ 对应一个同调类 $[\mathcal{X}(w)]$。其等变量子类 $[\mathcal{X}(w)]_T\in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 包含了更多关于 torus 作用的信息。

4. 双重 Schubert 多项式的来源：$[\mathcal{X}(w)]_T$ 作为多项式代表元就是双重 Schubert 多项式 $S_w(x;y)$，其中：

- $x=(x_1,\dots,x_n)$ 来自旗流形的基础类
- $y=(y_1,\dots,y_n)$ 来自 torus T 的作用

5. 例子：在 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，最长置换 w_0 对应的 Schubert 类为：

$$S_{w_0}(x;y)=\prod_{i=1}^{n}(x_i-y_i)$$

这是因为 $S_{w_0}(x;0)=x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$ 是旗流形的基本类，而 y 变量捕获了 torus 作用的修正。

5. Lascoux-Schützenberger 型代表元

5.1. 问题. Lascoux-Schützenberger 型代表元是如何定义的?

5.2. 回答. Lascoux-Schützenberger 型代表元是旗流形上 Schubert 类的一种特殊的多项式代表元，由法国数学家 Alain Lascoux 和 Marcel-Paul Schützenberger 在 1980 年代引入。

1. 递归定义：Schubert 多项式 $S_w(x_1, \ldots, x_n)$ 递归定义为：

- $S_{w_0}(x) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$，其中 w_0 是最长置换
- 如果 w 不是最长置换，设 i 是 w 的最后一个 descent，则 $S_w = \partial_i(S_{ws_i})$

2. 双重 Schubert 多项式：引入第二组变量 $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 后，双重 Schubert 多项式 $S_w(x; y)$ 定义为：

$$S_w(x; y) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_{w(i)})$$

其中求和取遍 Bruhat 序 $u \leq w$。

3. 性质：Lascoux-Schützenberger 型代表元满足：

- $S_w(x; y)$ 是 x 和 y 的多项式
- 首项是 $x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots$，其中 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$
- 当 $y = 0$ 时，$S_w(x; 0) = S_w(x)$ 退化为经典 Schubert 多项式

4. 为什么需要双重版本？等变量子上同调类 $[\mathcal{X}(w)]_T$ 需要额外的参数来编码 torus 作用的信息，这些信息由 y 变量捕获。

Bibliography

[1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.

[2] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.

[3] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.

[4] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):449–477, 2001.

[5] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.

[6] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.

[7] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.