

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ } \text{ } 3 :$

回答. 1. 几何直观: 维数公式 $\dim N(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$
 N 是单位下三角矩阵群, 维数为 $\frac{n}{2}$ (下三角矩阵的非对角元有 $\frac{n}{2}$ 个自由参数)。作为簇, N 同构于 $\mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$, 因为每个元素可以唯一写为根子群的乘积:

$$N = \prod_{\alpha \in \Phi^-} U_\alpha$$

其中 $U_\alpha = \mathbb{C}$ 是对应负根 α 的单参子群。

$N(w) = N \cap wNw^{-1}$ 的维数取决于哪些负根 α 满足 $w(\alpha) > 0$ (即 w 把负根变成正根)。关键在于:

$$N(w) = \prod_{\substack{\alpha \in \Phi^- \\ w(\alpha) > 0}} U_\alpha$$

负根是 $\Phi^- = \{f_{i+j} : 1 \leq j < i \leq n\}$, 共 $\frac{n}{2}$ 个。 $w(\alpha) > 0$ 的负根 α 个数等于 $jJ(w)j = \frac{n}{2} - \ell(w)$, 其中 $J(w) = \{i; j : i < j; w(i) < w(j)\}$ 是 w 的非逆序集。

因此:

$$\dim N(w) = \frac{n}{2} - \ell(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$$

几何图像: N 本身同构于最大的相反 Schubert 胞腔 $Bw_0B/B = \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$ 。而 $N(w)$ 是 N 的一个“切片”, 只保留那些 w 不翻转的负根方向。

2. 代数同构: $N(w) = BwB/B$

构造同构映射:

$$x \mapsto xwB/B; \quad x \in N(w)$$

验证是良好定义的: 若 $x \in N(w)$, 则 $x \in N \cap B$, 所以 $xwB \subset BwB$, 陪集 xwB/B 落在 BwB/B 内。

单射性: 若 $xwB/B = ywB/B$, 则 $w^{-1}x^{-1}yw \in B$ 。同时 $w^{-1}x^{-1}yw \in w^{-1}Nw \cap N = N(w)$ 。但 $B \cap N(w) = \{e\}$, 所以 $x = y$ 。

满射性: 任取 BwB/B 中元素。由于 $B = NT$, 任意元素可写为 $n_1twB = n_1w(w^{-1}tw)B$ 。但 $w^{-1}tw \in T \subset B$, 所以实际上 $n_1twB = n_1wB$, 且 $n_1 \in N$, $n_1 \in N(w)$ 。

3. 同构映射 $x \mapsto xwB/B$ 的意义

G/B 是齐性空间, BwB/B 是过基点 wB/B 的胞腔。映射 $x \mapsto xwB/B$ 把 $N(w)$ 中的元素 x 看作“旗的位移”——把基旗 wB/B 推到旗 xwB/B 。

$N(w) = \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ 提供了胞腔 BwB/B 的自然坐标系。每个 $x \in N(w)$ 指定了胞腔中一个唯一点。

从齐性空间角度看, wB/B 的稳定化子是 B , 而 $N(w)$ 是那些“与 w 的相对位置在 N 中”的元素构成的子群。

4. 连通性

N 是幂么群 (unipotent group), 指数映射 $\exp: \mathfrak{n} \rightarrow N$ 是双射 (代数群情形的对数映射)。因此 N 微分同胚于其李代数 $\mathfrak{n} = \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$, 是连通的。

$N(w)$ 是 N 的闭子群, 因此作为代数群也是连通的。

同构 $N(w) = \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ 说明 $N(w)$ 是仿射空间。仿射空间是连通的 (甚至单连通)。

参考文献: Humphreys, [9, Section 28]。¹¹

¹¹问: 为什么 $N(w) = BwB/B$? 见附录 section 29。

Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- [4] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.
- [5] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- [6] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
- [7] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- [8] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- [9] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [10] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [11] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [12] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [13] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [14] Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.
- [15] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.
- [16] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.
- [17] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
- [18] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [19] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [20] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [21] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.