~H\«@O}§ 多项式学习笔记

* Q M i 2 M i b

引言：文献概述

ou 总述

本笔记学习的主题是 ~H\«@O}§ **多项式的** pn _§_®_§´ **（正性）问题**。这是代数组合与代数几何中的核心问题之一，与旗流形的上同调理论密切相关。

Schubert 多项式是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上 Schubert 类的多项式代表元。它们由 Lascoux 和 Schützenberger 引入，具有丰富的代数和组合结构。

本笔记涉及四篇关于 Schubert 多项式正性问题的研究论文，从经典情形逐步推广到量子情形。此外，还有若干参考书籍和补充材料作为基础知识来源。

©u 研究目标

研究课题：三重 Schubert 演算的 Graham Positivity 猜想

核心问题：证明三重（double）Schubert 多项式乘积展开系数的正性

文献组合策略：根据熊瑞的观察，Chapter 1（Gao-Xiong 2025）和 Chapter 4（Mihalcea 2007）这两篇论文组合在一起，基本上能够搞定三重 Schubert 演算的正性猜想。

¨u 术语对照表

为统一全笔记的术语使用，本节建立以下术语对照表：

术语	含义	参考文献
W}9\9h pn _§_®_§´	原始情形，要求 u, v 都是 Grassmannian 排列，系数 $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[t_i - y_j]$	[y]
|O»jOL W}9\9h pn _§_®_§´	推广到满足 separated descents 条件的任意排列	[y]
¦}_qeO ~H\«@O}§ pn _§_®_§´	Gao-Xiong 2025 的主要结果，处理三组变量 $(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t})$ 情形	[y]
~Oq9}9§OL KO HOj§	条件 $\max \mathrm{Des}(u) \leq \min \mathrm{Des}(v)$	[y]

变量约定：

- $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots)$：旗流形 Fl_n 的坐标变量
- $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \ldots)$：来源 Schubert 类的等变参数
- $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \ldots)$：目标 Schubert 类的等变参数

Vu 文献摘要总结

Vuou W9n]±_njX ©·©UI ¦}_qeO ~H\«@O}§ pn _§_®_§´u **作者**: Yibo Gao, Rui Xiong

9}±_® : https://arxiv.org/abs/2506.09421

年份: 2025

篇幅: 6 页

核心贡献:

- 证明了 Samuel 关于三重变量集的 Graham positivity 猜想
- 建立了 refined 版本的 Graham positivity 定理
- 作为推论，证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想

摘要: 本文证明了 Samuel 关于三个变量集中两个双重 Schubert 多项式展开系数的 Graham positivity 猜想。通过建立 Graham positivity 定理的 refined 版本，作为推论证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子作用于 Schubert 多项式的正性猜想。

关键词: Graham positivity, double Schubert polynomials, triple Schubert calculus, divided difference operators

Vu©u ~9h«0e ©·©VI gne0@]~9X9j Sn}h«e9u **作者**: Matthew J. Samuel

9}±_@ : https://arxiv.org/abs/2401.11060

年份: 2024

篇幅: 30 页

核心贡献:

- 给出了计算双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式
- 提供了 Pieri 公式
- 证明了倾斜 Schubert 多项式系数的非负性

摘要: 本文给出了计算两组不同系数变量的两个双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式。当设置 $y = z$ 时，这两个公式在负根意义上保持正性，从而为 Grassmannian 提供了新的等变量子 Littlewood-Richardson 规则。

关键词: Molev-Sagan formula, double Schubert polynomials, Pieri formula, Littlewood-Richardson rule

Vu¨u b_}_een@]g90jn okk£I w«9j§«h ~H\«@0}§ pne´jnh_9e u **作者**: Anatol N. Kirillov, Toshiaki Maeno

9}±_@ : https://arxiv.org/abs/q-alg/9610022

年份: 1996

篇幅: 52 页

核心贡献:

- 引入了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$
- 研究了旗流形的等变量量子上同调
- 基于量子 Cauchy 恒等式的方法
- 给出了 Vafa-Intriligator 公式的高 genus 推广

摘要: 本文研究了旗流形的等变量量子上同调代数。引入并研究了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$，这是旗流形等变量量子上同调类的 Lascoux-Schützenberger 型代表元。

关键词: quantum Schubert polynomials, equivariant quantum cohomology, flag variety, Cauchy identity

VuVu g_\9eH09 ©··¢I Nx«_@9}_9j§ w«9j§«h pn _§_@_§´u **作者**: Leonardo Constantin Mihalcea [y]

9}±_@ : https://arxiv.org/abs/math/0603438

年份: 2007

篇幅: 15 页

核心贡献:

- 证明了 Peterson 猜想（由 Graham 证明）在等变量量子上同调中仍然成立
- 推广了经典上同调的正性结果到量子版本

摘要: D. Peterson 的猜想（由 W. Graham 证明）指出齐次空间 G/P 的 T-等变上同调（equivariant cohomology）的结构常数满足某种正性性质。本文证明了在更一般的等变量量子上同调情况下，这个正性性质仍然成立。

关键词: equivariant quantum cohomology, positivity, Schubert calculus, Gromov-Witten invariants

详见 yy （Chapter 4）。

Uu 补充参考资料

以下文献作为基础知识的补充来源：

Uuou 8jLO} nj]S«e§njI Nx«_@9}_9j§ Gn\nhnenX´ _j 8eXO@}9_H WOnhO§}´u **作者**: David Anderson, William Fulton
年份: 约 2015
篇幅: 464 页

内容简介: 这是关于代数几何中等变量子上同调的权威教材。详细介绍了等变量子上同调的基本理论，包括旗流形、Schubert 类，Bott-Samelson 定理等。是理解本笔记中等变量子上同调概念的必备参考。

用途: 作为等变量子上同调定义的主要参考来源（详见 Chapter 4）。

Uu©u d_ ©·©¨I ~H\«@O}§ G9eH«e« Ś 8 ?}_OT ^j§}nL«H§_nju **作者**: Changzheng Li (中山大学)
年份: 2023
篇幅: 63 页

内容简介: 这是中山大学李长贞教授的 Schubert calculus 入门讲义。涵盖了 Schubert calculus 的基本概念，方法及其在代数几何和组合学中的应用。

用途: 入门级参考资料，帮助理解 Schubert 多项式和旗流形的基本概念。

Uu¨u ?«H\ ©··oI w«9j§«h Gn\nhnenX´ nT W}9 h9jj_9j u **作者**: Anders Skovsted Buch
9}±_@ : https://arxiv.org/abs/math/0106268
年份: 2001
篇幅: 8 页

核心贡献:

- 给出了 Grassmannian 量子上同调环的简单证明
- 证明了量子 Pieri 公式和量子 Giambelli 公式
- 给出了 Fulton-Woodward 公式的短证明

用途: 量子版本的补充参考资料。

UuVu d_ ©·©¨I GO}§9_j ^LOj§_§_O nj §\O w«9j§«h p}nL«H§ nT ~H\«@O}§ Ge9 O u
作者: Changzheng Li (中山大学)
年份: 2023
篇幅: 50 页

内容简介: 讨论旗流形量子上同调中 Schubert 类的量子乘积的若干恒等式。

用途: 量子版本的补充参考资料。

UuUu 9j]W9n]W«]±_njX ©·©UI ?«hqe0 p_q0 K}O9h gOO§ p«¶¶e0 u **作者**: Yanqi Fan, Yibo Gao, Changzheng Guo, Jonathan W. Xiong
9}±_@ : https://arxiv.org/abs/2506.21064v1
年份: 2025
篇幅: 约 180 页（手册章节）

核心贡献:

- 提供了旗流形上同调的全面综述
- 系统介绍了 Pipe Dreams 和 Bumpless Pipe Dreams 的组合理论
- 建立了 pipe dreams 与 puzzles 之间的联系
- 证明了 Schubert 多项式的各种组合公式

内容简介: 本文是《组合代数几何手册》第一章，综述了旗流形的上同调理论。内容包括：旗流形与 Schubert 簇的介绍，Schubert calculus 的历史与发展，Schubert 多项式的组合理论（包括 pipe dreams、bumpless pipe dreams、puzzles 等工具），以及与矩阵 Schubert 簇的连接。

用途: Pipe Dreams 和 Bumpless Pipe Dreams 的详细定义（详见 Chapter 2）。

£u 学习路径与前置基础知识

根据上述文献的关系，建议学习顺序如下：

(1) **首先**: 学习 Gao & Xiong (2025) —理解 triple positivity 的证明
(2) **其次**: 学习 Samuel (2024) —理解双重 Schubert 多项式的乘法公式
(3) **然后**: 学习 Kirillov & Maeno (1996) —理解量子版本的基本定义
(4) **最后**: 学习 Mihalcea —理解量子上同调中 positivity 的推广

前置基础知识:

- 对称群 S_n 和排列的基本理论
- Schubert 多项式的定义和性质
- 量子上同调的基本概念
- 除差算子 (divided difference operators)
- 等变量子上同调

¢u 最终目标

尝试证明 Gao & Xiong 结果的量子版本，即在等变量量子上同调的框架下，证明相应的 positivity 性质。

注 0.1. **学习路径**: : QsBQðM; a KmðlÍ EB`BHHQðJ ÏMQ? H+2

注 0.2. **新增文献**: →¹ M/2`bQM6mHiQM- GB Ukykljt'kÜV- "m+?

CHAPTER 1

W}9\9h pn _§_®_§´ nT ¦}_qe0 ~H\«@0}§ G9eH«e«

ou 预备知识

在本节中，我们介绍本文所需的基本定义.

ouou 旗流形u

定义 1.1 (旗流形（Flag variety）). ﻝ V n ẽ ĩ ١ ∫ Xﻉ g $Fl_n(\mathbb{C})$ سر V ڤﻫ ~ ; bﻝ ₦ ă ŏ ط "A ~ ;سر ɷ ١ ∫

$$0 = V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = V \tag{1}$$

ط $\dim V_i = i$ Xﻉ g سر "A ώ ὼ ﻝ ẽ ß ﺝ И ŏ Ę̃ $\binom{n}{2}$ X

旗流形是 Schubert 理论的舞台. Schubert 胞腔是旗流形的重要子簇.

ou©u 对称群与排列u

定义 1.2 (对称群（Symmetric group）). n **阶对称群** S_n سر $\{1, 2, \ldots, n\}$ ﻝ ڤﻫ ï ﻝ قﻲ X "A w e ﺝ $w = (w(1), w(2), \ldots, w(n))$ X

ﻉگ w ﻝ **逆序数（*inversion number*）** $\ell(w)$ ´ ؛ $1 \le i < j \le n$ ﺋ $w(i) > w(j)$ ﻝ Ḧ (i, j) ﻝ "A ﺝ ŏ ¨ w ﻝ ̂ Ę̃ X

S_n ŏ ̂ Ę̃ ᵖ ﻝ ¨ **最长置换** w_0 ŏ كمي ╟ $\{1, 2, \ldots, n\}$ پ ﻉگ ŝ

$$w_0 = (n, n-1, \ldots, 2, 1)$$

ط ̂ Ę̃ $\ell(w_0) = \binom{n}{2}$ X

S_∞ ʜ ص ڤﻫ ﻝ Ч ₦ ŏ ₫ $S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$[1] ŏ ˣ ﻉ ⱶ ˣ ﺝ ₦ $\{1, 2, \ldots\}$ ضﺝ ﻝ Ḧ ¨ قﻲ ˊ ﺑﻢ ŏ $w = (3, 1, 4, 2, 5, \ldots) \in S_\infty$ ʜ ص "A ¨ ﻝ ŋ و 9 Ő ﺋﻫ ▉ Ō

排列记号的省略约定 ŝ ɾ ˢ $w = 21$ عي ŏ ʜ ص ﻝ سر ╟ 1 ̃Ω 2 ▉ ~3 ħ : ă Ƙ ﻝ ŏ ₫ ﺝ $(2, 1, 3)$ **ŏ 若排列的后 $n-k$ 个位置不变，则这些位置可以省略** ˊ ﺑﻢ ŝ

- S_3 ŝ 21 ʜ ص $(2, 1, 3)$ ŏ ₫ $w(1) = 2, w(2) = 1, w(3) = 3$
- S_n ŝ 21 ʜ ص $(2, 1, 3, 4, \ldots, n)$
- 132 ʜ ص $(1, 3, 2)$ ŏ ₫ ▉ 2 ̃Ω 3 ŏ 1 ă Ƙ

"A ´ ضﺝ ذ عي قح ┐ ω̃ e ὼ ŏ ƀ Ɓ ظ ت [2]

定义 1.3 (Bruhat 序（Bruhat order）). ﻝ $u, v \in S_n$ ŏ ¨ $u \le v$ ŋ " ` m ? i Ō ŏ ﺑﻢ ὼ u ˣ ᾳ ɷ ₁ V̂ ﻝ ˛ ₅ ķ ʉ v ŏ ﺋ ₁ V̂ Ḧ ﻝ Ң ɷ سر v ﻝ ق "A ω̃ ʜ ص ﻝ ɷ X

ɾ ∏ ﻝ ă ت ﺝ ŝ $u \le v$ ɾ ﺋ ң ɾ Ḧ ڤﻫ $1 \le k \le n$ ̃Ω j ŏ

$$\#\{i \le k : u(i) \le j\} \le \#\{i \le k : v(i) \le j\}.$$

[1] 问：S_∞ 定义中的 $\bigcup$（并集记号）是什么意思？见附录 **??**。

[2] 当需明确时，写完整的一行数组如 $(2, 1, 3)$ 或用置换符号如 s_1。

代数几何中的基本相交概念 在我们讨论旗流形上 Schubert 胞腔的相交时，两个术语至关重要——它们出现在 Lemma 2.5（横截相交引理）中：

定义 1.4 (Proper（正常/固有）交集). 设 $X, Y \subset Z$ 是 $\mathbb{C}$ 上的代数簇。如果交集 $X \cap Y$ 是 **proper** 的，即 $X \cap Y$ 的每个不可约分支 W 都满足 $\dim W = \dim X + \dim Y - \dim Z$，则称 $X \cap Y$ 是 proper 的。

如果 $X \cap Y \to Z$ 是 proper 的，则可以定义交积 $[X] \cdot [Y] \in A^*(Z)$，其中 $A^*(Z)$ 是 Z 的 Chow 环。

定义 1.5 (Transverse（横截）交集). 设 $X, Y \subset Z$ 是光滑簇，X 与 Y 在点 $p \in X \cap Y$ 处**横截（*transverse*）**，如果

$$T_p X + T_p Y = T_p Z,$$

其中 $T_p X \subset T_p Z$ 是 X 在 p 处的切空间。等价地，p 是 $X \cap Y$ 的光滑点，且 $\dim_p (X \cap Y) = \dim X + \dim Y - \dim Z$。

横截相交的性质

- 若 X 与 Y 在 $X \cap Y$ 的每个点处都横截，则 $X \cap Y$ 是光滑的，且 $\operatorname{codim}(X \cap Y) = \operatorname{codim} X + \operatorname{codim} Y$。
- 若 X 与 Y 横截，则 $[X \cap Y] = [X] \cdot [Y]$ 在 $A^*(Z)$ 中成立。
- 若 X 与 Y 横截，则 $X \cap Y$ 的不可约分支个数为 $\deg([X] \cdot [Y])$。

非横截相交的例子 设 X 是 xy-平面，Y 是 xz-平面，则 $X \cap Y$ 是 x-轴，且 $T_p X + T_p Y \subsetneq T_p \mathbb{A}^3$ 对 x-轴上每个点成立，故不横截。

为什么关注这两个性质？ Proper 保证交集是紧的（有限多个点），transverse 保证每个交点都是良定的（横截点）。两者结合使得在等变量子上同调中可以定义明确的相交类，从而得到非负的展开系数。

例 1.1 (Bruhat 序（Bruhat order）的例子). S_3 中 $\sigma = 123$ 与 $\tau = 321$ 的 Bruhat 序关系如下图所示：



即

$$123 < 213, \quad 123 < 132, \quad 213 < 321, \quad 132 < 321,$$

而 213 与 132 在 Bruhat 序下**不可比较（*incomparable*）**。

定义 1.6 (Descents（下降点）). 设 $w \in S_n$，其 ***descents* 集合**定义为

$$\operatorname{Des}(w) = \{ i \in \{1, \dots, n-1\} : w(i) > w(i+1) \}.$$

即 $w(i) > w(i+1)$ 的位置 i 的集合。例如 $w = 35142$ 的 descents 为 $\operatorname{Des}(w) = \{2, 4\}$，因为 $w(1) = 3 > w(2) = 5$，$w(2) = 5 > w(3) = 1$，$w(3) = 1 > w(4) = 4$，$w(4) = 4 > w(5) = 2$。

ç l R X d U a 2 T ` i 2 / X 2 b u ÷ v 2 2 M S b ¥ Ï K t . 2 (u) K B M (v 2) b 5 (u ; v)
¡ @ b 2 T ` i 2 / / 2 b H + q 2 b M i b
' u ¥ K v / † Ä , Ñ V v ¥ K l / † Ä £ € ¥ / † u × , × ß b

R X 9 ' ¼ µ Ø 0 X

ç l R X 3 µ U Ø 0 . B p B / 2 / / B z 2 ` 2 M + 2 V X Q ¿ 2 i ` = 1 Q ` : ; n 1 " µ Ø 0 @
ç l ¹

U k V @ (f) = $\frac{f(:::;x_i;x_{i+1};:::) \quad f(:::;x_{i+1};x_i;:::)}{x_i \quad x_{i+1}}$:

÷ B î ¹ ¿ Â Ð w ç l ‹ ¥ " µ Ø 0 @ ¹ a ' F † ¥ @ X

è R X k µ U Ø 0 ¥ è 0 V X S_3 Ï M ¹ $x_1; x_2; x_3$

$@(x_1) = \frac{x_1 \ x_2}{x_1 \ x_2} = 1$ b
$@(x_2) = \frac{x_2 \ x_1}{x_1 \ x_2} = \ 1$ b
$@(x_1^2) = \frac{x_1^2 \ x_2^2}{x_1 \ x_2} = x_1 + x_2$ b
$@(x_1x_2) = \frac{x_1x_2 \ x_2x_1}{x_1 \ x_2} = 0$ b
$@(x_2^2) = \frac{x_2^2 \ x_1^2}{x_1 \ x_2} = \ (x_1 + x_2)$ b
@ @ (x_1) = @ (1) = 0 y ¹ @ T ¨ ¿ x_1 ¤ R @ T ¨ ¿ È " ¤ y b
@ (x_2) = 1 @ Œ Ð x_2 „ x_3 b

" µ Ø 0 ¥ T ¨ ^ | ë Ä @ | [T M ¹ 1 ¿ $x_i; x_{i+1}$ ¥ ë [T b

ç l R X N U ä F Ø r 0 a F 2 r / B p B / 2 / / B z 2 ` 2 M ¥ V X 2 ¿ Q ¯ ì Â Ð i Q w ; v 2 S_n
a F 2 r " µ Ø 0 a F 2 r / B p B / 2 / / B z 2 ` 2 M + 2 Q @ T 2 ¹ j ` ç i l Q ` ———————————————————— @ T ¿ ¥ 2 ¹ j ` ç i l Q `

U j V $@_{w/v} = \sum_{v \ u \ w} (\ 1)^{`(w) \ `(u)} @_u$

Ï p „ | R î µ ¡ @ v u w " ` m ? ½ ¥ Â Ð u b
ÿ i ƒ Ú , i @ ¹ i i " µ Ø 0 @ ^ â , ¥ @ = 0 À µ l Ø 0 b a F 2 ' ¼ µ Ø 0 Y V F † ç l 7 d ¯ † l Ø 0 Ÿ ç l b
a F 2 ' ¼ µ Ø 0 ¡ @ [/ Ÿ É

' v = e † Ê Â Ð H @ $_{w/e}$ = @ $_w$
' w = v H @ $_{w/w}$ = B / š © Ø 0

P è R X j U a F ¼ µ Ø 0 ¥ è 0 V X l n S_3 Ï ¥ + ñ 9 Ø P ¨ F † ç l @ $_{w/v}$ = $\sum_{v \ u \ w} (\ 1)^{`(w) \ `(u)} @_u$

@ $_{21/1}$ ƒ Ú w = 21 v = 123 † Ê Â Ð b ¡ @ 123 u 21 ¥ u º µ 123 „ 21 # @ $_{21/123}$ = (1) $^{`(21) \ `(123)}$ @ $_{123}$ + (1) $^{`(21) \ `(21)}$ @ $_{21}$ = @ + @ $_{21}$ b
@ $_{231/12}$ w = 231 v = 12 š © Â Ð b ¡ @ 12 u 231 ¥ u µ 123 ; 213 ; 231 ¿ " ` m ? ½ # @ $_{231/12}$ = @ $_{123}$ @ $_{213}$ + @ $_{231}$ b

ç l R X R y U a + ? [m # 2 X a + ? m # 2 [T $S_w(t)$ ^ @ ™ a + ? m # Ë 2 ¥ i [T } V í ® G b + Q m a t + ? C i x 2 M „ # Æ ` X ¿ 2 `
ñ Ì V [Y V " µ Ø 0 @ n \ \ ¾ w ç l

¹ Ù a F 2 ' ¼ µ Ø 0 „ " µ Ø 0 µ l ¹ 1 ó „ u Y — V [B t è 0 — $ n ¸ c \ \ b

按长度递推计算 *Step 1:* $\ell(w)=0$**（恒等置换）**

$$w=123:\quad S_{123}(\mathbf{x})=1. \tag{11}$$

Step 2: $\ell(w)=1$

$\ell(w)=1$

$$w=213\quad (\text{对应 } (1,0,0)):\quad S_{213}(\mathbf{x})=x_1, \tag{12}$$

$$w=132\quad (\text{对应 } (0,1,0)):\quad S_{132}(\mathbf{x})=x_2. \tag{13}$$

Step 3: $\ell(w)=2$

$\ell(w)=2$

$w=231$ 的下降位置集合 $\mathrm{Des}(w)=\{1\}$

$$S_{231}(\mathbf{x})=\partial_1(S_{321}(\mathbf{x}))=\partial_1(x_1^2x_2), \tag{14}$$

$$\partial_1(x_1^2x_2)=\frac{x_1^2x_2-x_2^2x_1}{x_1-x_2}=x_1x_2, \tag{15}$$

$$\therefore S_{231}(\mathbf{x})=x_1x_2. \tag{16}$$

$w=312$ 的下降位置集合 $\mathrm{Des}(w)=\{1\}$，$S_{312}(\mathbf{x})=x_1+x_2$

Step 4: $\ell(w)=3$**（最长置换）**

$$w=321:\quad S_{321}(\mathbf{x})=x_1^2x_2. \tag{17}$$

S_3 **多项式汇总表**

w	$c(w)$	$\mathrm{Des}(w)$	$\ell(w)$	$S_w(\mathbf{x})$
123	$(1,2,3)$	$(0,0,0)$	0	1
213	$(2,1,3)$	$(1,0,0)$	1	x_1
132	$(1,3,2)$	$(0,1,0)$	1	x_2
231	$(2,3,1)$	$(1,1,0)$	2	x_1x_2
312	$(3,1,2)$	$(2,0,0)$	2	x_1+x_2
321	$(3,2,1)$	$(2,1,0)$	3	$x_1^2x_2$

$132,231$ 的下降位置集合 $\{1\}$ 对应 $x_1^{c_1}x_2^{c_2}$ 型项；$213,312$ 的下降位置集合 $\{2\}$ 对应 X 型项。

双重 Schubert 多项式[8]

定义 1.11 (双重 Schubert 多项式). **双重 *Schubert* 多项式** $S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 是 $\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)$ 与 $\mathbf{y}=(y_1,\dots,y_n)$ 的多项式，满足

$w\in S_n$

$$S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})=\det\left(\frac{1}{x_i-y_j}\right)_{1\le i,j\le n}\cdot\prod_{i=1}^{n}(x_i-y_i)^{\#\{k>i:w(k)<w(i)\}}$$

[7] 写 $c(w)=(c_1,\dots,c_n)$ 定义为 $c_i=\#\{j>i:w(j)<w(i)\}$，即每个位置后面比它小的元素个数。例如 $w=213$：$c_1=1$（2,1 中 $1<2$），$c_2=0$（3 中无比 1 小），$c_3=0$。在 S_4 中，$w=3142$（一行数组 $(3,1,4,2)$）：$c_1=1$（3 后有 1,2 中 $1<3$，$2<3$ 但只计一次），$c_2=0$（1 后无比 1 小），$c_3=1$（4 后有 $2<4$），$c_4=0$，故 $c(w)=(1,0,1,0)$，$\ell(w)=2$，首项为 $x_1^1x_3^1$。

[8] 问：双重 和多项式和三重有什么区别，为什么叫 t 重？见附录 **??**。

ë ɾ ∏ ŧ ĸ Ω بخي ⌋ سر خي G b + Q m t @ a + ? C i x ⌋ 2 M ŏ # 2 ` ; 2 ŝ ˊ ع g ⌋ a + ? m # ƹ ` ǀ X
V̀ ŏ ˋ ح ي ĸ Ω بخي ⌋ خي ŝ

$$S_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \sum_{u \le w} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} S_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^{c_i(w)} \tag{19}$$

ط $c_i(w) = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$ سر w ⌋ G 2 ? K 2 g ` ŋ G 2 ? K 2 ` ŌŐ S 2 $_u(\mathbf{x})$ سر ⁱ ˈ a + ? m # ƹ ` i خي ŏ ج ̃ Ω سح ĸ ف ؛ $u \le w$ ŋ " ` m ? i Ō ⌋
除差算子视角 ŝ صح a + ? m # ƹ ` i خي ˜ æ Ɔ بخي ح ˊ

$$S_w(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{w^{-1}w_0} \prod_{i+j \le n} (x_i + y_j)$$

ط ˊ æ Ķ خي $\prod_{i+j\le n}(x_i+y_j)$ Ḧ w_0 ŏ N̂ æ Ɔ بخي $\partial^{(x)}_{w^{-1}w_0}$ x ĸ ĩ ضج ˊ D ρ ̃ Ω ضج Ḧ ع g ضج ⌋ ɾ ĸ ◦ ت ȳ [11]
صح a + ? m # ƹ ` i خي ؛ ŝ

- $S_{w_0}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$ ŏ ط w_0 سر
- ɬ $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ عي ŏ $S_w(\mathbf{x};\mathbf{0}) = S_w(\mathbf{x})$ õ ⁱ ˆ ˈ a + ? m # ƹ ` i خي

例 1.6 (S_2 的计算). S_2 ŭ ̈ A ŝ ñ ɾ $w = 12$ ̃ Ω $w_0 = 21$ S_2 ⌋ ⁱ ˈ a + ? m # ƹ ` i خي ŋ æ Ɔ بخي ∂_i ð ˊ ŝ $S_{ws_i}(\mathbf{x}) = \partial_i(S_w(\mathbf{x}))$ ŏ Ո خي ╔ $S_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{\ell(w_0)}$ ŌŜ

- $S_{12}(\mathbf{x}) = 1$ ŋ ñ ɾ Ō
- $S_{21}(\mathbf{x}) = x_1$ ŋ $\partial_1(x_1x_2) = x_1$ Ō

ŏ ŋ̈ خي Ω بخي صح a + ? m # ƹ ` i خي ŝ

1. $w = 12$**（恒等置换）**
ʙ عي $w = 12$ ŏ $\ell(w) = 0$ ŏ ؛ $u \le w$ ⌋ $u = 12$ V̀ نج ŝ

$$S_{12}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (-1)^{0-0} S_{12}(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^{2} (x_i - y_{w_0 w(i)}) = 1 \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)^0 = 1$$

2. $w = 21$**（最长置换）**

[9] 问： G b + Q m t @ a + ? C i x 2 2 M 表示是如何定义的？见附录 **??**。
[10] 问：双重 a + ? m # 多项式 $S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 如何用除差算子定义？见附录 **??**。
[11] 除差算子定义及更多例子见附录 **??**。

ʙ عي $\ell(w)=1$ ŏ ⁝ $u\le w$ ⌋ $u=12$ ̃Ω $u=21$ ŝ ŋ̈ خي حي $w_0w(i)$ N̰ ă سر $w(i)$ ŏ ط $w_0=21$ سر ̊ ŝ

$$\begin{aligned}S_{21}(\mathbf{x},\mathbf{y}) &= \sum_{u\le 21}(-1)^{\ell(21)-\ell(u)}S_u(\mathbf{x})\cdot\prod_{i=1}^{2}(x_i-y_{w_0w(i)})\\ &= (-1)^{1-0}S_{12}(\mathbf{x})\cdot\prod_{i=1}^{2}(x_i-y_{21\cdot 21(i)})\\ &\quad+(-1)^{1-1}S_{21}(\mathbf{x})\cdot\prod_{i=1}^{2}(x_i-y_{21\cdot 21(i)})\\ &= -S_{12}(\mathbf{x})\cdot(x_1-y_1)(x_2-y_2)+S_{21}(\mathbf{x})\cdot(x_1-y_1)(x_2-y_2)\\ &= -(x_1-y_1)(x_2-y_2)+x_1(x_1-y_1)(x_2-y_2)\end{aligned}$$

` ŝ

$$\begin{aligned}-(x_1-y_1)(x_2-y_2) &= -x_1x_2+x_1y_2+x_2y_1-y_1y_2\\ x_1(x_1-y_1)(x_2-y_2) &= x_1^2x_2-x_1^2y_2-x_1x_2y_1+x_1y_1y_2\end{aligned}$$

ă Ч ŝ

$$S_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y})=x_1^2x_2-x_1^2y_2-x_1x_2y_1+x_1y_1y_2-x_1x_2+x_1y_2+x_2y_1-y_1y_2$$

更简洁的观察 ŝ ˊ ŏ $S_{w_0}(\mathbf{x};\mathbf{y})=\prod_{i=1}^{n}(x_i-y_i)$ ŏ قط $w_0=21$ عي ŝ

$$S_{21}(\mathbf{x},\mathbf{y})=(x_1-y_1)(x_2-y_2)$$

` خي قح سي ɾ ʙ ɬ ώ ` $(x_1-y_1)(x_2-y_2)=x_1x_2-x_1y_2-x_2y_1+y_1y_2$ § § ƀ ˚ ⌋ ت ضجِ ` ă

سي ⅓ضجِ ŏ ⌐ ✶ Ő ŝ ` ŋ̈ خي عي Ḧ $w=21$ ŏ $w_0w=e$ ŋ ñ ɾ Ōŏ قط قح ⌋ ˛ ⁵ سر $(x_1-y_1)(x_2-y_2)$ ŏ N̰ ų̇ $(x_1-y_{w(i)})$

结论 ŝ $S_{21}(\mathbf{x},\mathbf{y})=(x_1-y_1)(x_2-y_2)$ ŏ صحح a + ? m # ⱪ ` i خي ⌋ˊ ◕ ̃A ıı [12]

例 1.7 (S_3 的计算). S_3 $3!=6$ ̈A ˚ ᴱ Ω بخي ٥ ̈A صحح a + ? m # ⱪ ` i خي

S_3 ⌋ ⁱ ı a + ? m # ⱪ ` i خي ŋ $S_{w_0}(\mathbf{x})=x_1^2x_2$ ıı Ő ŏ æ ʔ بخي ð Ōŝ

- $S_{123}(\mathbf{x})=1$
- $S_{213}(\mathbf{x})=x_1$
- $S_{132}(\mathbf{x})=x_1+x_2$
- $S_{231}(\mathbf{x})=x_1x_2$
- $S_{312}(\mathbf{x})=x_1x_2$
- $S_{321}(\mathbf{x})=x_1^2x_2$

ă ŋ̈ خي $S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})=\sum_{u\le w}(-1)^{\ell(w)-\ell(u)}S_u(\mathbf{x})\cdot\prod_{i=1}^{3}(x_i-y_i)^{c_i(w)}$ Ω بخي ŏط $c_i(w)$ سر G 2 ? K ⱪ g `

1. $w=123$**（恒等置换）**

$\ell(w)=0$ ŏ G 2 ? K ⱪ g ` $c_i(123)=(0,0,0)$ ŏ ⁝ $u\le w$ ⌋ $u=123$ ŝ

$$S_{123}(\mathbf{x},\mathbf{y})=1\cdot(x_1-y_1)^0(x_2-y_2)^0(x_3-y_3)^0=1$$

2. $w=213$

[12]问：在第一章 S_2 的计算例子中，笔记给出了展开式与简洁公式，它们看起来不同。这两种表达是否相等？如果不相等，哪个是正确的？见附录 **??**。

$\ell(w) = 1$ ŏ G 2 ? K Ż g ` $c_1(213) = 1$ η $w(2) = 1 < w(1) = 2$ Ō ŏ $c_2(213) = 0$ ŏ $c_3(213) = 0$
w ȷ " ` m ? i ţ 123 ˜ Ǫ 213 ŝ

$$\begin{aligned} S_{213}(\mathbf{x},\mathbf{y}) &= (-1)^{1-0} S_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^1 (x_2 - y_2)^0 (x_3 - y_3)^0 \\ &\quad + (-1)^{1-1} S_{213}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^0 (x_2 - y_2)^0 (x_3 - y_3)^0 \\ &= -S_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1) + S_{213}(\mathbf{x}) \cdot 1 \\ &= -(x_1 - y_1) + x_1 = y_1 \end{aligned}$$

验证 ŝ سي ⅓ ضد $S_{213}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = x_1 - y_1$ ŏ Ω بخي

3. $w = 231$
$\ell(w) = 2$ ŏ G 2 ? K Ż g ` $c_1(231) = 1$ η $w(3) = 1 < w(1) = 2$ Ō ŏ $c_2(231) = 1$ η $w(3) = 1 < w(2) = 3$ Ō ŏ $c_3(231) = 0$ ŏ ḓ $c = (1, 1, 0)$
: $u \le 231$ ȷ 123, 213, 231 η Ў ˛ Ę گ Ō $c_3 = 0$ ŏ ˛ 5 $(x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$ ŝ

$$\begin{aligned} S_{231}(\mathbf{x},\mathbf{y}) &= (-1)^{2-0} S_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) \\ &\quad + (-1)^{2-1} S_{213}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) \\ &\quad + (-1)^{2-2} S_{231}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) \end{aligned}$$

` Ω بخي ŝ

$$\begin{aligned} -(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) &= -x_1x_2 + x_1y_2 + x_2y_1 - y_1y_2 \\ -x_1(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) &= -x_1^2x_2 + x_1^2y_2 + x_1x_2y_1 - x_1y_1y_2 \\ +x_1x_2(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) &= x_1^2x_2^2 - x_1^2x_2y_2 - x_1x_2^2y_1 + x_1x_2y_1y_2 \end{aligned}$$

ă Ч ʌ Ĭ η ج ʒ ᴱ Ōŝ

$$S_{231}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = x_1x_2 - x_2y_1$$

η ë Ự ᴱ Ȳ ϱ Ō

4. $w = 312$
$\ell(w) = 2$ ŏ G 2 ? K Ż g ` $c_1(312) = 2$ η $w(2) = 1 < w(1) = 3$ ŏ $w(3) = 2 < w(1) = 3$ Ō ŏ $c_2(312) = 0$ ŏ $c_3(312) = 0$ ŏ ḓ $c = (2, 0, 0)$
: $u \le 312$ ȷ 123, 132, 213, 312η Ў ˛ Ę گ Ō $c_1 = 2$ ŏ ˛ 5 $(x_1 - y_1)^2$ ŝ

$$\begin{aligned} S_{312}(\mathbf{x},\mathbf{y}) &= (-1)^{2-0} S_{123}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^2 \\ &\quad + (-1)^{2-1} S_{132}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^2 \\ &\quad + (-1)^{2-2} S_{312}(\mathbf{x}) \cdot (x_1 - y_1)^2 \end{aligned}$$

` Ω بخي ŝ

$$\begin{aligned} -(x_1 - y_1)^2 &= -(x_1^2 - 2x_1y_1 + y_1^2) \\ -(x_1 + x_2)(x_1 - y_1)^2 &= -(x_1 + x_2)(x_1^2 - 2x_1y_1 + y_1^2) \\ +x_1x_2(x_1 - y_1)^2 & \end{aligned}$$

ă Ч ɬ ώ η ج ʒ ᴱ Ōŝ

$$S_{312}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = x_1 - y_1$$

ç l RXRj UhÌQë`mbVXhQ`mbë YÈ· C ¥µKð Å™T S^1 ¥µKð ,

$$T = (C)^n \qquad T = (S^1)^n$$

°4 -áÌV[Üñ X`îB óõ• ó¥ð XèÂ-¹o¡¹à1 -ü^Bñ $S^1$ URx hQ`mTb¨Voë X

ç l RXRs9ËbW ET *H bbB7vBMVXbTT±2C)^n ¹Bñ n»iQ`mb Ï C = Cnf0g VUd,¯"¥ðE• VU²5: *`i2bB MTbQ'Nm+Ti]¿ n»¯Ìë +QKTH2t i9Q'[mTb T = $(S^1)^n$ ƒ^ n»LÌëb T ¥s ËbW *H bbB7vBM£;Tb¨T^B+2‰êbW -¡@[/ ñ,•‹Ÿ ,

URWêŸ U*QMi` +iB,EETH2‰ê ü^Bñ Ä -À µ©… óó óX¨"Đ Ôý

ª ,H (ET) = 0 Ù µÚ»ÿÄ]Ø¹, VX

Uk1V®T¨ U6`22 +iB,QMTVT¨ ET À µ©…,îÄ X

¹l¹1„Æ ET\'áÌXpBñbW X • T T¨/¥ bW X/T ¥]ØH -ÂTT¨,1® U tÄ È /,î V-bWöM¤dÈ óQ óUi sÄ V•Á .d¥]ØØ,>r X

"Q`2H+?ŒXE^ ,;– X ¥T¨,1® -*üÜ X „Bñ ó'1® ó¥bW ET ð Ÿ 5y¹ ET ^Vê¥ -X ET ‰êŸÉ „ X ^B"¥ cŒy¹ T ET T¨1® -î[T X ET ¥ ˜T¨9Bç^1®¥ X

°4 -ET V[Ø³¹îµÚ»oë¥ K ,

$$ET = \underset{m!1}{H} BS^{2m+1}$$

Ï S^{2m+1} ^ 2m+1 »oë X

÷ 8¹ - ¿ T = $(C)^n$ -µ ,

$$ET = (S^1)^n = \underset{m!1}{H} B(S^{2m+1})^n$$

Ï S^1 ^ík»oë X

ç l RXR©8MU 0]Ø 1[mBp`B Mi+Q?VQ!KTQ+HQC;y$^n$ ¹Bñ iQ`mb-X ^B ñ{µ T T¨¥‰êbW XbWX ¥ T@M 0]Ø çl¹ ,

UkRV $$H_T(X) = H(X \;_T ET)$$

Ï ET ^ T ¥sËbW Uh\\VX $_T$ ET ^ T T¨/¥ bW -ë¹ "Q`2H/ "Q`2H +QMbi`m+i]B-QM ?QKQiQTv[mQ'XB2Mi

©M 0]Ø $H_T(X)$,ÇÇ^Bñ Ì -Î^B ñ UKQ/mTµ2¥V©XM 0] ØËV[AT^[[T¹""¥}"` X

è RX8©M 0]Ø¥è0 VX ÄbW pt ,

$$H_T(pt) = H(BT) = Z[y_1;::::;y_n]$$

Ï y_i ‹ T = $(C)^n$ ¥Äñ3îí¥]ØË X
+Y¹ - ¿ T = S^1 -BT = CP^1 Ù k»¯ •bW V µ ,

$$H_{S^1}(pt) = Z[y]$$

Ï y ^ CP^1 ¥»B *?2`MX
¿ $T^2 = S^1$ S^1 -BT^2 = CP^1 CP^1 -µ ,

$$H_{T^2}(pt) = Z[y_1; y_2]$$

R8U 1hsËbWµl¹°$Ø³$n¸c \\b

例 1.12 (一般线性代数 gl_n). فقد $n \times n$ ذ ï ¸ "A ﻥ β حج ŏ ط

$$[X, Y] = XY - YX$$

¨ $gl_n(\mathbb{R})$ ⁵ $gl_n(\mathbb{C})$ سركمي óᵖ ó ﻉ ﻥ β حج § § ك مي ̃Ω تحد
Ṽ ŏ $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ ﻉ ﻥ β حج سر $g = gl_n(\mathbb{C})$

子代数与幂幺元（ª j_qn§0j§ 0e0h0j§ ）：旗流形的几何

现在我们回到旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的研究。为什么旗流形重要？因为它是研究一般线性群 $GL_n(\mathbb{C})$ 的自然舞台。

设 $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$。它的子群结构给了我们旗流形的几何：

定义 1.20 (旗流形的子群). ﻝ $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ ŏ ̊ . ̃ قي ŝ

- B ŝ ىكى ضجـ ►̃ ذ پ ŋ ***Borel* 子群（*Borel subgroup*）**Ō
- B^- ŝ ىكى ►̃ ذ پ ŋ **相反** ***Borel* 子群（*Opposite Borel subgroup*）**Ō
- T ŝ Ḧ ► ذ قي ŋ ï $(\mathbb{C}^\times)^n$ ŏ **极大环面（*Maximal torus*）**Ō
- N ŝ β ىكى ضجـ ► ذ ŋ B ﻉ ⋆ ė ₁ ŋ l M B T Q i 2 M i Ō Ō / B + H
- N^- ŝ β ىكى ► ذ ŋ B^- ﻉ ⋆ ė ₁ ŋ l M B T Q i 2 M i Ō Ō / B + H

$T = B \cap B^-$ ŏ ﻍ N^- ï ع g β ! ﻉ ۔ ﻦ ∫

为什么旗流形在旗流形理论中如此重要？因为 G/B 的几何反映了 G 自身的几何。旗流形是 G 的齐性空间（homogeneous space）——你可以把 G/B 看作 G 中“去掉“了 B 的商。

幂幺矩阵（ª j_qn§0j§ h9§}_² ）的几何：N^- 与旗流形

N^- 中的每个元素都可以写成指数映射：

$$\exp(X) = I + X + \frac{X^2}{2!} + \cdots \quad (X \text{ 为严格下三角矩阵})$$

这给出了从 $\mathfrak{n}^- = \mathrm{Lie}(N^-)$ 到 N^- 的双射。

N^- 是连通的（指数映射是光滑的双射），且维数为 $\binom{n}{2}$——恰好等于旗流形的维数！几何上，N^- 同构于旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的开胞腔（open cell）。

例 1.13 ($n = 2$ 的情形). ﻍ $n = 2$ ŏ $Fl_2(\mathbb{C}) = \mathbb{CP}^1$ ŋ ẽ لج Ō ʙ عي ŝ

$$N^- = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{C} \right\} \cong \mathbb{C}$$

N̂ $\mathbb{CP}^1$ ﻙ æ سر ℂ ŋ صم ŧ ﻩ Ǐ ﻉ ت تي ɦu k ﺫ ت Ō

⑨}§9j 子代数与根系统：如何分解向量空间

为了理解李代数的结构，我们需要一个好的坐标系。

定义 1.21 (Cartan 子代数（Cartan subalgebra）). ﻝ $\mathfrak{g} = gl_n(\mathbb{C})$ فقد Ḧ ► ذ ï ¸ ﻉ β حج

$$\mathfrak{h} = \{\mathrm{diag}(t_1, \ldots, t_n) : t_i \in \mathbb{C}\} \cong \mathbb{C}^n$$

سر "A Ȼ ᵖ ﻉ ɋ ɦ ő β حج ŋ # 2 H B M b m ⊕ §H§ ﻉ ő Ω ŭ "A Ḧ ► ذ Ḍ Ḧ "A $\mathfrak{h}$
¨ ***Cartan* 子代数（*Cartan subalgebra*）**

对于一般约化群，Cartan 子代数定义为极大的阿贝尔子代数。在 gl_n 中，h 正是所有与自身交换的矩阵构成的子代数。

根系统：把复杂李代数分解为简单碎片

对于 gl_n，我们关心的是在伴随表示（adjoint representation）下 h 的作用。定义权（weight）：

$$H \cdot E_{ij} = (t_i - t_j)E_{ij} \quad \text{其中} H = \mathrm{diag}(t_1, \ldots, t_n)$$

这给出特征值分解：

$$gl_n = h \oplus \bigoplus_{i \neq j} \mathbb{C} \cdot E_{ij}$$

更一般地：

定义 1.22 (根系统（Root system）). ﻝ h * ` i M β ﺝ ˉ

$$\Phi = \{\alpha \in h^* \mid \exists X \neq 0, [H, X] = \alpha(H)X \ \text{Ḧ ﻓ} \quad H \in h\}$$

h ﻟ **根系统（*Root system*）** ﻫ ‴A $\alpha \in \Phi$ ¨ ‴A **根（*root*）** ŏ Ḧ ﻟ X ﻫ ¨ ﻟ ﻯ ∫ g_α ﺱ ė ﻯ ∫

Ḧ gl_n ŏ ė ﺱ $\epsilon_i - \epsilon_j$ ɳ $i \neq j$ Ōŏ ﻁ $\epsilon_i(H) = t_i$ ɳ ₫ Ḧ ▶ ɜ ﻟ ᵖ i ‴A Ḧ ▶ Ō ˢ Ẇ ᵸ

$$g = h \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} g_\alpha$$

反射与 ℧ˊe 群：有限对称的来源

根系统有一个美妙的性质：它们由一组 “基本反射（simple reflection）“生成。

定义 1.23 (Weyl 群（Weyl group）). Ḧ ﻫ ‴A ė $\alpha \in \Phi$ ŏˊ ` ﺛ ت ɳ ? v T 2 ` T Ō M 2 $H_\alpha = \{H \in h : \alpha(H) = 0\}$ Ŭ ‴À ﺛ ت ɳ ? v T 2 ` T Ō ﻝM Š2 ﺟ $s_\alpha$ $h^*$ ﺿ ﻓ Š ﺟ $s_\alpha$ ɳ $\alpha \in \Phi$ Ō ﻫ ¨ ﻟ ﻗ ¨ ***Weyl* 群（*Weyl group*）** ŏ e $W$ Ḧ $gl_n$ ŏ $W = S_n$ § § ﻗ ń ﻫ ‴A Ḍ ﺱ ﻕ ₁ V̀ Š ﺟ ɳ b B K T H 2 ` 2 Ō2 ﻝ ÷ i Ƀ Q M ˙Y ﺿ ŏ S_n ت ﺝ ₁ Ḥ ∫ ﻟ Ḧ ¨

在 gl_n 中，简单反射 s_i 只交换相邻的 i 和 $i+1$ 坐标轴。这与 Coxeter 群的结构完全一致。

逆序集：℧ˊe 群元的位置编码

给定一个 Weyl 群元 $w \in W = S_n$，它如何 “作用 “在根系上看？

定义 1.24 (逆序集（Inversion set）与非逆序集). Ḧ $w \in S_n$ ŏˊ ŝ

- **逆序集（*Inversion set*）** ŝ $I(w) = \{(i,j) : 1 \le i < j \le n, w(i) > w(j)\}$
- **非逆序集** ŝ $J(w) = \{(i,j) : 1 \le i < j \le n, w(i) < w(j)\} = I(w_0 w)$[16]

ﻁ $w_0 = (n, n-1, \ldots, 1)$ ﺱ

Ⅾ℘ ̃Ω ﺿ ŏ $I(w)$ e S₁ w Ы ن ﺷ Ḧ óf̄ ɸ $|I(w)| = \ell(w)$ ﻱ ﺱ w ﻟ ̣ Ę ɳ " ` m ? i ﻟ ﺯ ﾉ Ō

子群 $N^-(w)$：从旗流形到旗流形的道路

最后，我们介绍旗流形几何中的关键子群。

[16] 问：$I(w_0 w)$ 在数学上有什么内涵吗？是不是 w_0 会把 w 反转？见附录 **??**。

定义 1.25 (子群 $N^-(w)$ 与 $B^-(w)$). 设 $w \in W$，定义

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

令

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

则 $N^-(w)$ 是 N^- 的闭连通子群，其维数为 $|I(w)|$。

根据 Humphreys [, Section 28][17]，作为簇，$N^-(w)$ 同构于 Schubert 胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$，通过 $x \mapsto xwB/B$。特别地，$N^-(w)$ 是连通的。

引言

当我们研究旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的上同调环时，一个基本问题是：两个 Schubert 类相乘会得到什么？更精确地说，如果我们用双重 Schubert 多项式 $S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 作为旗流形等变量子上同调类的代表元，[18]那么乘积 $S_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot S_v(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 如何展开为单个 $S_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 的线性组合？展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 满足什么性质？

这引导我们研究以下展开公式：

$$S_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot S_v(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) \cdot S_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

其中 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 是关于 $\mathbf{y}$ 和 $\mathbf{t}$ 的多项式。[19]

从特殊到一般：三个猜想的演化 研究这个问题的一个自然策略是从最简单的情况开始，然后逐步推广。

第一步：Grassmannian 情形。 当 u 和 v 都是 Grassmannian 排列时，事情变得特别清晰。k-Grassmannian 排列 w 的 Schubert 多项式可以写成线性因子的乘积 $S_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k}(x_{a_i} - y_{b_i})$，这种因子化形式使得乘积展开的结构一目了然。Molev-Sagan [ ] 首次给出了这些系数的组合公式，Knutson-Tao [ ] 给出了几何解释。在这种背景下，Graham [ ] 证明了以下正性结果：

定理 1.1 (Graham Positivity Theorem [, Theorem 3.2]). 设 $u, v \in S_n$，则存在 k_1 使得对所有 k_2，

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[t_1 - y_1, t_1 - y_2, \ldots]$$

这里 $t_i - y_j$ 是 T 的特征标。[20]

第二步：去掉 Grassmannian 限制。 一个自然的问题是：Graham 的正性结果能否推广到任意排列？Samuel [ ] 提出了以下猜想——即本文的主要结果（Theorem 1.1）：

定理 1.2 (Theorem 1.1: Samuel 猜想 [, Conjecture 1.1]). 设 $u, v, w \in S_\infty$，则 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[t_1 - y_1, t_1 - y_2, \ldots]$

---

[17] 问：正文（引理 kX 前）引用了 >mKT?`22?vb(2+iBQ 对描述 $N^-(w)$ 与 a+?m#2 胞腔 B^-wB/B 的同构。a2+iBQ 对证明说了什么？见附录 ??。

[18] 双重 a+?m#2 多项式是 Gb+Qmt@a+?Cix 类似的自然推广，引入了额外的 $\mathbf{y}$ 变量来记录旗流形的特殊化信息。

[19] 当 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时，$c_{u,v}^w(0,0) \in \mathbb{N}$ 是经典的 a+?m#2 结构常数，计数旗流形中 a+?m#2 胞腔的交点个数——即 >BH# 第十五问题（见??）的核心。

[20] 问：在?? 中，u, v 必须是 k_1@:`bbK MMB $k_2$@:`bbK MB 对吗？但在计算时好像没有用到 k_1, k_2 的具体值？为什么要有这个限制？见附录 ??。

值得注意的是，除上述情形外，separated descents（即 $\max \mathrm{Des}(u) \le \min \mathrm{Des}(v)$，见yy ）情形也被充分研究。Samuel [y] 建立了正性公式，Fan、Guo 和第二作者 [y] 使用 puzzles 在双重 Grothendieck 多项式的范围内给出了另一个公式。

第三步：最简单的特例。如果我们在 Samuel 猜想中取 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$，则系数退化为普通非负整数。此时展开式变为

$$S_u(\mathbf{x}; \mathbf{0}) \cdot S_v(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \sum_w c_{u,v}^w (0,0) S_w(\mathbf{x}; \mathbf{0})$$

这正是 Kirillov 猜想（yy ，即 Corollary 1.2）所描述的情形：

推论 1.1 (Corollary 1.2: Kirillov 猜想 [y , Conjecture 1]). Ḧ $u, v, w \in S_n$ ŏ $\partial_{w/v} S_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$

这里 $\partial_{w/v}$ 是 Macdonald [y] 引入的 skew 除差算子，与 Fomin-Kirillov 代数 [y] 密切相关。

如图所示，三个猜想的条件依次减弱——从要求 u, v 都是 Grassmannian，到任意排列，再到最简单的 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 情形。

猜想的层次	条件	代表定理
第一步	u, v 都是 Grassmannian	Graham Positivity
第二步	u, v 任意排列	Samuel 猜想
第三步	$\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$	Kirillov 猜想

本文的证明依赖于精化版本的 Graham 正性定理（yy ），建立了系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 的新几何解释，[21]作为副产品还给出了 Billey 公式 [y] 中正性的几何解释。

我们以关于 Grothendieck 多项式的猜想结束本文的讨论（见yy ）。

©u©u **定理的例子**u 为帮助读者建立直观印象，我们依次验证三个定理的正性结论，每步都附带详细计算。

©u¨u W}9\9h pn _§_@_§´ **（条件最强）**u

例 1.14 (yy ：两个 Grassmannian 排列的乘积). **为什么 *Grassmannian* 排列特殊？** بم فقد و تحت ŏ k @ : ` b b K M M̄ B $u$ M ⌋ a + ? m # ⌧ ` i خي $S_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ ˜ ˙ ⌋ ˙ 5 ŝ

$$S_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k} (x_{a_i} - y_{b_i})$$

õ خي حي ⌧ ˙ 5 ` ⌋ ♭ ï Œ ئى § § ˚ ╠ ŭ ˙ ŏ ⌘ Ĭ ⌟ đ˜

具体例子：$u = 21$，$v = 12$（21 是 *Grassmannian*，12 是恒等置换）。

ж н ⌧ a3 تحت a + ? m # ⌧ ` i خي ŋ ‖ yy Ōŝ

$$S_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = x_1 - y_1, \quad S_{12}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = 1$$

Ω يخي 5

$$\begin{aligned} S_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot S_{12}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) &= (x_1 - y_1) \cdot 1 \\ &= x_1 - y_1 \end{aligned}$$

в عي ` تحت $c_{21,12}^{21} = 1 \in \mathbb{N}$ ŏ سر ¨A ṯ Ṣ ⌋

更一般的例子：$u = 132$，$v = 213$ ŋ ŭ ¨A Ḍ سر : ` b b K M M̄ B M

[21]这与 E M m i b Q M ? @) k 给出的解释不同——详见附录 ??。

$$S_{132}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = (x_1 - y_2)(x_2 - y_2), \quad S_{213}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = x_1 - t_1$$

$$S_{132}(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot S_{213}(\mathbf{x};\mathbf{t}) \tag{23}$$

$$= (x_1 - y_2)(x_2 - y_2)(x_1 - t_1) \tag{24}$$

$$= (x_1x_2 - x_1y_2 - x_2y_2 + y_2^2)(x_1 - t_1) \tag{25}$$

$$= x_1^2x_2 - x_1x_2t_1 - x_1^2y_2 + x_1y_2t_1 \tag{26}$$

$$- x_1x_2y_2 + x_2y_2t_1 + x_1y_2^2 - y_2^2t_1 \tag{27}$$

$t_1 = (t_1 - y_1) + y_1$ t_1 [22]

结论： u, v $(t_j - y_i)$

猜想（条件减弱：去掉要求）

例 1.15 (非 Grassmannian 排列的乘积). u, v

非 *Grassmannian* 排列 $u = 231$ 的结构： $u = 231$ $(2,3,1)$ $2 > 3$ $3 > 1$

$$S_{231}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$$

$v = 312$

$$S_{312}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = x_1 - t_3$$

第一步：展开乘积

$$S_{231}(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot S_{312}(\mathbf{x};\mathbf{t}) \tag{28}$$

$$= (x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3)(x_1 - t_3) \tag{29}$$

$$= x_1^2x_2 - x_1x_2t_3 - x_1^2y_3 + x_1y_3t_3 \tag{30}$$

$$- x_1x_2y_3 + x_2y_3t_3 + x_1y_2y_3 - y_2y_3t_3 \tag{31}$$

第二步：将每项写成 $t_j - y_i$ 的形式

$t_3 = (t_3 - y_3) + y_3$ t_3

$$-x_1x_2t_3 = -x_1x_2[(t_3 - y_3) + y_3] = -x_1x_2(t_3 - y_3) - x_1x_2y_3$$

$$x_1y_3t_3 = x_1y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = x_1y_3(t_3 - y_3) + x_1y_3^2$$

$$x_2y_3t_3 = x_2y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = x_2y_3(t_3 - y_3) + x_2y_3^2$$

$$-y_2y_3t_3 = -y_2y_3[(t_3 - y_3) + y_3] = -y_2y_3(t_3 - y_3) - y_2y_3^2$$

第三步：合并同类项

$(t_3 - y_3)$

$$[-x_1x_2 + x_1y_3 + x_2y_3 - y_2y_3] \cdot (t_3 - y_3)$$

[22]完整推导见附录 ??。

第四步：写成 $c_{u,v}^{w} \cdot S_{w}$ 的形式

ж aვ β a + ? m # ⱪ ` i خي н ŋ yy Ō Ŝ

w	$\ell(w)$	$S_{w}(\mathbf{x})$
123	0	1
213	1	x_1
132	1	$x_1 + x_2$
231	2	x_1x_2
312	2	x_1x_2
321	3	$x_1^2x_2$

╟ ` ь ώ ₁ $\{S_{w}\}$ Ç Ḧ ŏ ˜ ο ججDسر $t_j - y_i$ ⌋ ụ i ججججK خي

结论：تجي كا ụ : ` b b K M M Ⱪ Ꞵ Ɱ ` ë ê ŏ ƀ ṷ ⌋ ۏ └ ₳ ₓ ŏ فمد ججني ججѓ ћ : § § سر yy ⌋ Ѿ ḡ

另一个说明性例子：سح $u = 321$ ŋ ˛ Ōŏ $v = 123$ ŋ ñ ɾ Ō

$$S_{321}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3), \quad S_{123}(\mathbf{x}) = 1$$

˛ ₅ ƛ سر $S_{321}(\mathbf{x},\mathbf{y})$ V̈ نج ŏ ` ججѓ كا سر $1 \in \mathbb{N}$

©uUu b_}_een® **猜想（条件最弱：$\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$）**u

例 1.16 (yy ： Skew 除差算子的正性). yy سر yy $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ عي ⌋ ˝ ŏ ᴮ عي ` ججѓ ω̃ ѕѕ ụ i ججѓ

从一般形式到特殊情形：

yy ⌋ ` خي

$$S_{u}(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot S_{v}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_{w} c_{u,v}^{w}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \cdot S_{w}(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

ж $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ ŏ ķ ŝ

$$S_{u}(\mathbf{x};\mathbf{0}) \cdot S_{v}(\mathbf{x};\mathbf{0}) = \sum_{w} c_{u,v}^{w}(0,0) \cdot S_{w}(\mathbf{x};\mathbf{0})$$

ь $c_{u,v}^{w}(0,0) \in \mathbb{N}$ ѕѕѕ ụ i ججѓ

ъ ṭ ت ŏ b F 2æ ϡ بخي ⌋ ˆ ŋ ‖ yy Ō Ѿ a K m 2 Ḧ خي ŏ ж $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ ķ ŝ

$$S_{u}(\mathbf{x};\mathbf{0}) \cdot S_{v}(\mathbf{x};\mathbf{0}) = \sum_{z} c_{u,v}^{z}(0,0) \cdot S_{z}(\mathbf{x};\mathbf{0})$$

ь $c_{u,v}^{z}(0,0) \in \mathbb{N}$ ѕѕѕ ụ i ججѓ

فمد yy ɾ ∏ ḡ ŝ ˛ ₅ $S_{u}(\mathbf{x};\mathbf{0}) \cdot S_{v}(\mathbf{x};\mathbf{0})$ a + ? m # ⱬ ` i ⌋ ` ججѓ Ḏ سر ụ i ججѓ

完整计算例子：سح $u = 231$ ŏ $v = 132$

第一步：求 $S_{231}(\mathbf{x};\mathbf{0})$ 和 $S_{132}(\mathbf{x};\mathbf{0})$

ж н ķ ŝ

$$S_{231}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3, \quad S_{132}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = x_2 - t_2$$

ж $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ ķ ŝ

$$S_{231}(\mathbf{x};\mathbf{0}) = x_1x_2, \quad S_{132}(\mathbf{x};\mathbf{0}) = x_2$$

第二步：计算乘积

$$x_1x_2 \cdot x_2 = x_1x_2^2$$

第三步：写成 S_{w} 的线性组合

ж a₃ β a + ? m # ₽ r ` Ŝ

$$S_{123}(\mathbf{x}) = 1, \quad S_{231}(\mathbf{x}) = x_1x_2, \quad S_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2x_2$$

` ڜ 1 ∈ ℕ ŋ Ḧ S_{231} ⌋ ق Ä Ǯ ڜ Ō ŏ ı $\partial_{w/v}(S_u) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$

从 ~9h«0e **到** b_}_een® **的过渡例子**：

例 1.17 (yy ⇒ yy 的特殊化). ɾ yy ⌋ $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ عي ŏ ڝ a + ? m # ₽ ` i خي ũ ىس a + ? m # ₽ ` i خي ŏ ` ڜ ũ ụ ị ڜ ڜ $u = 231$ ŏ $v = 132$ ŋ ŭ Ä ụ : ` b b K M M ₽ ₽ Ō Ŝ

$$S_{231}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$$

$$S_{132}(\mathbf{x};\mathbf{t}) = x_2 - t_2$$

H ċ ŋ yy Ō Ŝ

$$\begin{aligned} S_{231}(\mathbf{x},\mathbf{y}) \cdot S_{132}(\mathbf{x},\mathbf{t}) &= (x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3)(x_2 - t_2) \\ &= x_1x_2^2 - x_1x_2t_2 - x_1y_3x_2 + x_1y_3t_2 \end{aligned}$$

Ж $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ ŋ yy Ō Ŝ

$$S_{231}(\mathbf{x};\mathbf{0}) = x_1x_2, \quad S_{132}(\mathbf{x};\mathbf{0}) = x_2$$

$$S_{231}(\mathbf{x};\mathbf{0}) \cdot S_{132}(\mathbf{x};\mathbf{0}) = x_1x_2 \cdot x_2 = x_1x_2^2$$

` ڜ 1 ∈ ℕ ŏ ı yy

¨u 主要定理的证明

本节我们证明本文的三个主要定理——Theorem yy （Graham Positivity）、Theorem yy （Refined Graham Positivity） 和 Theorem yy （Triple Schubert Positivity）。这三个定理层层递进，构成了从特殊到一般的完整理论体系。

定理之间的逻辑链条：

第一步（Theorem yy ，Graham Positivity）：这是整个理论的起点，断言当 u, v 都是 Grassmannian 排列时，乘积 $S_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot S_v(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 的展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 是关于 $t_i - y_j$ 的非负整数多项式。原始证明依赖于几何相交理论。

第二步（Theorem yy ，Refined Graham Positivity）：这是对第一步的根本性推广。关键观察是：原始证明中 “Grassmannian 排列 “ 这一限制本质上只用到了一点——横截相交性（transversality）。而横截相交性在更一般的 “descents 条件 “ 下仍然成立。因此，Refined 版本将假设从 “两个 Grassmannian 排列 “ 推广到 “满足 separated descents 条件的任意排列 “。

第三步（Theorem yy ，Triple Schubert Positivity）：在 Refined 版本的基础上，将两个排列进一步推广到三个排列的乘积 $S_u \cdot S_v \cdot S_w$。这在几何上对应于三个 Schubert 胞腔的相继相交。

支撑这三级火箭的底层引理：

引理之间的依赖关系决定了证明的层次：

(1) d0hh9 yy （正规子群引理（Normal subgroup lemma））：这是整个归纳法的基石。它证明了若 $ws_i > w$，则 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。在李代数层面，这建立了一个理想关系 $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$，允许我们从短长度排列逐步构造长的分解。

(2) d0hh9 yy （横截相交引理（Transverse intersection lemma））：这是 Refined 版本的核心技术工具。它断言交集 $\tau\overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$ 是 proper 且横截的。横截性意味着相交是 “好的 “——没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的非负性来自于拓扑学的基本事实：横截相交的交集点个数是良定义的整数。

(3) Gn}nee9}´ yy （闭链分解推论（Closed chain decomposition corollary））：这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形 G/B 上，任意 B^--不变的有效闭链必是 Schubert 类 $[\overline{B^- wB/B}]_T$ 的非负线性组合。这建立了从几何闭链到代数展开系数的对应关系。

这三个引理的关系可以概括为：dOhh9 yy **提供了归纳法的结构，** dOhh9 yy **保证了横截相交的良定义性，** Gn}nee9}´ yy **将几何闭链分解为** ~H\w@O}§ **基底的组合**。

有了这些准备，我们现在可以进入正式的证明。证明的核心思想是将几何相交（交集在等变量子上同调中的类）翻译为代数展开系数，然后利用上述引理证明这些系数必为非负。[23]

¨uou **代数群与旗流形的基本设置**u 为了理解本文证明的核心思想，我们首先介绍代数群与旗流形的基本设置.

设 G 为连通复约化代数群，$B \subset G$ 为 Borel 子群，$B^- \subset G$ 为其相反 Borel 子群，$T = B \cap B^-$ 为极大环面，N（分别 N^-）为 B（分别 B^-）的幂幺根基。相关定义见yy 、yy 、yy 、yy 、yy 、yy 。

根据 Humphreys [y , Section 28]，$N^-(w)$ 同构于 Schubert 胞腔 $B^- wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$。其李代数为：

$$\mathfrak{n}^-(w) = \mathrm{span}\{F_\alpha \mid \alpha \in J(w)\} \subseteq \mathfrak{g} := \mathrm{Lie}G$$

其中 F_α 是权为 $-\alpha$ 的根向量（root vector）。[24]

引理 1.1 (Lemma 2.2 [y , Lemma 2.2]). ش $ws_i > w$ ŏ $N^-(ws_i)$ سر $N^-(w)$ ļ õ̃ ي ŋ M Q ` K H b mḠ#; ` Q m T

证明： ‡ $[F_\alpha, F_\beta] \in \mathbb{C}^\times F_{\alpha+\beta}$ بم ù $\alpha+\beta$ سر ε ŏ Á 0 X $ws_i > w$ ŏ $J(w) = J(ws_i) \cup \{w\alpha_i\}$ ŏ B $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$ X > m K T ? ` 2 j v Þ (h ? 2 Q ` 2 K R j X R M / h ? 2 Q ` 2 K R j X ŏ j $N^-(ws_i)$ سر $N^-(w)$ ļ Þ ي X سي ⅓ ضج ŏ $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ سر $\mathfrak{n}^-(w)$ ļ ﻫ X ¡ ŏ سح $\alpha \in J(ws_i)$ ˚Q $\beta \in J(w)$ ŏ ڎ $[F_\alpha, F_\beta] \in \mathfrak{n}^-(ws_i)$ X ش $\alpha+\beta \notin \Phi$ ŏ $[F_\alpha, F_\beta] = 0$ X B ´ $\gamma = \alpha+\beta \in \Phi^+$ X ش $\beta \in J(ws_i)$ ŏ $\gamma \in J(ws_i)$ Ş ش $\beta = w\alpha_i$ ŏ $\gamma \neq w\alpha_i \in J(w)$ ŏ ö $\gamma \in J(ws_i)$ X ق سي ŏ $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ سر $\mathfrak{n}^-(w)$ ļ ﻫ ŏ ŀ > m K T ? ` 2 j v Þ ( h ? 2 Q ` 2 K R ŏ j X j $N^-(ws_i)$ سر $N^-(w)$ ļ õ̃ ي X

¨u©u |O»j0L W}9\9h pm _§_®_§´ **的证明**u 本文建立了一个 refined 版本的 Graham positivity 定理. 原始的 Graham positivity 定理（见yy ）要求 u 和 v 都是 Grassmannian 排列. 本文将其推广到更一般的情形.

定理 1.3 (Refined Graham Positivity [y , Theorem 2.3]). ﻝ B^- ų ط ﻥ X ŏ $u, v \in S_\infty$! b 2 T ` i 2 / / 2 b + 2 ╔ M j i Φ $\max \mathrm{Des}(u) \leq \min \mathrm{Des}(v)$ Õ ŏ Y سر X ļ Ï A $B^-(w)$ @ K ļ Þ ï $H_T^*(X)$

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^{m} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

ط $Z_1, \ldots, Z_m$ سر B^- @ K ļ Þ ï X

---

[23] 问：证明的核心思想是将几何相交（交集在等变量子上同调中的类）翻译为代数展开系数。这个翻译机制是如何实现的？除差算子的几何意义是什么？见附录 ??。

[24] 问：在第 R y 8 ę，$n^-(w) = \mathfrak{b}$ T {M $_\alpha \mid \alpha \in J(w)\}$ 中，F_α 是 ô权为 $-\alpha$ 的根向量 ô。这里的 ô权 ô和 ô根向量 ô是什么意思？见附录 ??。

[25] h ? 2 Q ` 2 K R j X R 通子群 H 与其李代数 $\mathfrak{h}$ 的对应是一一映射且保持包含关系。详见附录 ??。

[26] h ? 2 Q ` 2 K R j X j N 是连通代数群 G 的交换正规子群时，N 的 G B 代数 n 是 G 的 G B 代数 g 的交换理想。这保证了当 $n^-(ws_i)$ 是 $n^-(w)$ 的理想时，$N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。详见附录 ??。

注：当 u, v 都是 Grassmannian 排列时，separated descents 条件自动满足，此时本定理退化为原始 Graham Positivity（yy ）。[27]

证明思路：我们限制到 $G = \mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$[28] 的情形。由 [y , Theorem 10.6.4]，类 $[\overline{B^- \pi B/B}]_T$ 由双重 Schubert 多项式 $S_\pi(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 表示。

取定排列 u, v，通过选择足够大的 n，可假设等式 (1) 只涉及 $w \in S_n$。设 $G := \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{C})$，$B, B^-, T$ 如上。识别 $H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[t_1, \ldots, t_{2n}]$，其中 $t_i = -\epsilon_i := -c_1(\mathbb{C}_{\epsilon_i})$，$\epsilon_i$ 是 T 对应于第 i 个对角元的特征。将变量重命名：$t_{n+i} = y_i$ 对所有 $i \in [n] := \{1, 2, \ldots, n\}$。

考虑一个特殊排列 $\tau \in S_{2n}$，满足 $\tau(i) = n + i$，$\tau(n + i) = i$ 对所有 $i \in [n]$。由 [y , Section 16.5]，$[\tau \overline{B^- uB/B}]_T$ 由 $S_u(\mathbf{x}; \tau \mathbf{t}) = S_u(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 表示。

引理 1.2 (Lemma 2.5 [y , Lemma 2.5]). [redacted] $\tau \overline{B^- uB/B} \cap \overline{B^- vB/B}$ [redacted][29] [redacted][30]

证明： [redacted] $w_0^{(m)} \in S_m$ [redacted] $m \cdot 1 \cdots 1$ [redacted] $w, \pi \in S_n$ [redacted] $w \times \pi \in S_{2n}$ [redacted] $w \times \pi(i) = w(i)$ [redacted] $i \le n$ $w \times \pi(i) = \pi(i - n) + n$ [redacted] $v \in S_n$ [redacted] $n \le i < 2n$ $s_i v > v$ [redacted] $\overline{B^- vB/B}$ [redacted] s_i [redacted] $(i + 1)$ [redacted] $\overline{B^- vB/B} = u_0 \overline{B^- vB/B}$ [redacted] $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$ [redacted] $\tau \overline{B^- uB/B} = \tau u_0 \overline{B^- uB/B}$ $u_0^{-1} \tau u_0 = w_0^{(2n)}$ [redacted][31] [redacted][32]

推论 1.2 (Corollary 2.4 [y , Corollary 2.4]). [redacted] $X = G/B$ [redacted]

$$[Y]_T = \sum_{w \in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^- wB/B}]_T$$

[redacted] $I(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha > 0\}$ [redacted]

证明： [redacted] B^- [redacted] G/B [redacted] $[\overline{B^- wB/B}]_T$ [redacted]

现在我们准备证明主要定理。

证明：由 yy ，我们可重写所感兴趣的系数：

$$[\tau \overline{B^- uB/B} \cap \overline{B^- vB/B}]_T = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$$

因为 $\tau \overline{B^- uB/B}$ 在 $\tau N^- \tau^{-1}$ 下闭，$\overline{B^- vB/B}$ 在 N^- 下闭，交集在 $N^- \cap \tau N^- \tau^{-1} =: N^-(\tau)$ 下闭。由 yy ，我们得出 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$[33]，其中我们计算 $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \le i, j \le n\}$。

这就完成了主要定理的证明。

注 1.1. [redacted] $w = w_0$ [redacted] $B^-(w_0) = T$ [redacted] $B^-(w)$ [redacted] T [redacted] $I(w)$ [redacted]

---

[27] 关于两者关系详见附录 ??。

[28] 问：在证明 [redacted] 多项式 [redacted] 为什么可以将一般约化群 G 限制到 $G = \mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$？见附录 ??。

[29] 见 ??

[30] 见 ??

[31] 横截性由 [redacted] 保证，见附录 ??。

[32] 退化命题的详细证明见附录 ??。

[33] 问：在 [redacted] 的证明中，系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 这个符号是什么意思？为什么用 $-\alpha$ 而不是 α？见附录 ??。

¨u¨u ?_ee0´ **公式的正性几何解释**u 作为 yy 和 yy 的应用，我们给出 Billey 公式 [y] 中正性的几何解释.

G/B 的 T-不动点为 $(G/B)^T = \{wB/B \mid w \in W\}$。定义局部化为限制映射 $\cdot|_w : H_T^*(G/B) \to H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(pt)$。Billey 公式是 Schubert 类 $[\overline{B^- uB/B}]_T|_w$ 对任意 $u, w \in W$ 的组合公式：

$$[\overline{B^- uB/B}]_T|_w = \sum_{\substack{v \in W \\ u \le v \le w}} \prod_{\alpha \in R^+(w) \setminus R^+(v)} \alpha \tag{32}$$

其中 $R^+(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha < 0\}$ 是 w 的反转集。[34]从 (yy) 可见

$$[\overline{B^- uB/B}]_T|_w \in \mathbb{N}[\alpha]_{\alpha \in I(w)} \tag{33}$$

我们用 yy 给出这一正性的几何解释。

回忆点 $w_0B/B = B^- w_0 B/B$ 在 B^- 下不变。故 torus 不动点 ww_0B/B 在 wB^-w^{-1} 下不变。这意味着 ww_0B/B 在 $B^-(w)$ 下不变。由 yy ，我们有

$$[ww_0B/B]_T \in \sum_{u \in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^- uB/B}]_T$$

跟随 [y , Section 3] 和 [y , Section 16.5], 对于 Weyl 群元 $w \in W$, 自同构 $gB \mapsto wgB/B$ 诱导左作用 $w^L : H_T^*(G/B) \to H_T^*(G/B)$。我们注意 w^L 不是 $H_T^*(pt)$-线性的除非 $w = \mathrm{id}$, 但关于由 w 诱导的 $H_T^*(pt)$ 的自同构是半线性的。对上式作用 w_0^L，得

$$[w_0ww_0B/B]_T \in \sum_{u \in W} \mathbb{N}[-w_0\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{Bw_0uB/B}]_T$$

由于 $I(w_0ww_0) = \{-w_0\alpha \mid \alpha \in I(w)\}$，用 w 替换 w_0ww_0 且用 u 替换 w_0u，可重写为

$$[wB/B]_T \in \sum_{u \in W} \mathbb{N}[\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{BuB/B}]_T \tag{34}$$

现在取 $[\overline{B^- uB/B}]_T$ 与两边做 Poincaré 对偶。左边是 $[\overline{B^- uB/B}]_T|_w$，右边是 (yy) 中 $[\overline{BuB/B}]_T$ 的系数，由 [y , Proposition 7.3]，这就给出 (yy)。

Billey 公式是计算等变量 Schubert 系数的重要工具。具体而言，对于 Schubert 结构常数 $c_{uv}^w(\mathbf{y})$，由 [y , Corollary 4.3] 有

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}) = \sum_{b \in \mathcal{C}(u,v,w)} \prod_{\alpha \in \mathrm{Inv}(b)} \alpha$$

其中 $\mathcal{C}(u, v, w)$ 是特定 braid 元胞腔，$\mathrm{Inv}(b)$ 是其反转集。本文给出了这一几何解释的新证明。

¨uVu yy **的证明：应用到** ¦}_qe0 ~H\«@O}§ G9eH«e« u 本文的第二个主要结果是证明了 Samuel 猜想（yy ），即在三重变量集情形下的 Graham positivity.

定理 1.4 (Theorem 1.1 - Triple Schubert Positivity (Samuel 猜想)). ﻻ $u, v \in S_\infty$ ： / 2 b + 2 M iﷺðŏ

$$S_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot S_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot S_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

ط $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{Z}_{\ge 0}[t_1 - y_1, t_1 - y_2, \ldots]$ سر Ŭ $t_i - y_j$ ﻝ ﻊ ﺇ ﺟﺞ ﺟﺞ K ﺧﻲ

例子 ŝ ‖ yy

[34]关于 " B H 的公式的完整背景、几何意义及结构常数版本，见附录 **??**。

证明：我们限制到 $G = \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{C})$ 的情形。设 $u, v \in S_n$ 满足 separated descents 条件。考虑特殊排列 $\tau \in S_{2n}$ 满足 $\tau(i) = n+i$，$\tau(n+i) = i$。

由 [y ，Section 16.5]，$[\tau\overline{B^- uB/B}]_T$ 由 $S_u(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 表示，$[\overline{B^- vB/B}]_T$ 由 $S_v(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 表示。

由 yy ，交集 $\tau\overline{B^- uB/B} \cap \overline{B^- vB/B}$ 是 proper 且 transverse 的。因此我们可以在等变量子上同调中写：

$$[\tau\overline{B^- uB/B} \cap \overline{B^- vB/B}]_T = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$$

由于 $\tau\overline{B^- uB/B}$ 在 $\tau N^-\tau^{-1}$ 下闭，$\overline{B^- vB/B}$ 在 N^- 下闭，交集在 $N^- \cap \tau N^-\tau^{-1} =: N^-(\tau)$ 下闭。由 yy ，我们得出

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$$

其中 $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \le i,j \le n\}$。由于每个 $-(y_j - t_i)$ 都是 $t_i - y_j$ 的非负整数倍，我们有 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\ge 1}$。

这就完成了 yy 的证明。

¨uUu yy **的证明：**W}n§\0jL_0Hc **多项式的** pm _§_®_§´ **猜想**u 作为应用，我们证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想.

推论 1.3 (Corollary 1.2 - Kirillov 猜想). Ḧ ﻣﻲ w ŏ b F 2æ Ɔ ﺑﺨﻲ $\partial_{w/v}$ a + ? m # Ⱪ ` i ﻋﻲ ﺧﻲ ŏ ﺣﺞ ﺳﺮ ﻳ ̣ ̣ ⌋ X

证明：该定理是 yy 在 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时的直接推论.

第一步：建立从 §}_qe0 ~H\«@0}§ **系数到** c0° **除差算子的联系。**

回忆 skew 除差算子的定义（yy ）：

$$\partial_{w/v} = \sum_{\substack{u \\ v \le u \le w}} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \partial_u$$

在双重 Schubert 多项式的乘法公式（yy ）中，取特殊情形 $u = \pi$，$v = \sigma$ 并令 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$，得到

$$S_\pi(\mathbf{x};\mathbf{0}) \cdot S_\sigma(\mathbf{x};\mathbf{0}) = \sum_w c_{\pi,\sigma}^w(0,0) \cdot S_w(\mathbf{x};\mathbf{0})$$

由 Schubert 多项式的性质（yy ），当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时 $S_\pi(\mathbf{x};\mathbf{0}) = S_\pi(\mathbf{x})$，即退化为普通的 Schubert 多项式。

另一方面，skew 除差算子 $\partial_{w/\sigma}$ 作用于 S_π 时，其系数与 yy 中的系数有如下关系（见 Macdonald [y ，Section 5]）：

$$\partial_{w/\sigma}(S_\pi(\mathbf{x})) = \sum_\tau c_{\pi,\sigma}^\tau(0,0) \cdot S_\tau(\mathbf{x})$$

yy 表明：$\partial_{w/\sigma}(S_\pi)$ 在 Schubert 基下的展开系数，等于 triple Schubert 系数 $c_{\pi,\sigma}^\tau$ 在 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时的特殊值。

第二步：从 yy **推出系数的非负性。**

由 yy ，我们有

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$$

当 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时，$t_i - y_j$ 的多项式环退化为 $\mathbb{Z}$，因此

$$c_{u,v}^w(0,0) \in \mathbb{N}$$

将这一结论代入 yy ，得到

$$\partial_{w/v}(S_u(\mathbf{x})) = \sum_{w'} c_{u,v}^{w'}(0,0) \cdot S_{w'}(\mathbf{x})$$

其中每个系数 $c_{u,v}^{w'}(0,0) \in \mathbb{N}$ 都是非负整数。这正是 yy 所要证明的。

第三步：关于嵌套除差算子 $\partial_{w/w_0/w}$ 的说明。

在上述证明中，我们实际上不需要嵌套记号 $\partial_{w/w_0/w}$。取 $v = w_0/w$ 时，$\partial_{w/(w_0/w)}$ 按定义是

$$\partial_{w/(w_0/w)} = \sum_{\substack{u \\ w_0/w \le u \le w}} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \partial_u$$

注意到当 $u = w_0$ 时，$\ell(w_0) - \ell(u) = 0$，故 $(-1)^0 = 1$，这一项在求和中以正号出现。

由于 $S_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$ 是单项式（yy ），对它的除差算子作用可以显式计算：

$$\partial_{w/(w_0/w)}(S_{w_0}(\mathbf{x})) = \sum_{\substack{u \\ w_0/w \le u \le w}} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \partial_u(x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots)$$

由 Billey 公式（见yy ），

$$\partial_u(x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

即对单项式施加除差算子的结果仍是非负整数系数的多项式。

而 $\partial_{w/(w_0/w)}$ 中的系数 $(-1)^{\ell(w)-\ell(u)}$ 恰好与 yy 中系数的符号变化规律一致，因此两者结合后，所有出现的系数仍为非负整数。

这就完成了 yy 的证明。

CHAPTER 2

~9h«0e gne0@]~9X9j ¦´q0 Sn}h«e9

ou 引言：两个多项式相乘会得到什么？

在第一章中，我们遇到了三重变量集的 Graham positivity 问题——即研究形如

$$S_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\cdot S_v(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) S_w(\mathbf{x};\mathbf{t}) \tag{35}$$

的展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 的正性。

但如果我们退后一步，问一个更基本的问题：**两个双重 ~H\«@0}§ 多项式相乘，会得到什么？**

这并非一个纯粹的技术性问题。当我们取 $\mathbf{y}=\mathbf{t}=0$ 时，系数 $c_{u,v}^w(0,0)$ 计数旗流形（flag manifold）中 Schubert 胞腔（Schubert cells）的相交个数——这正是 Hilbert 第十五问题的核心（涉及射影空间的相交理论）。

Molev 和 Sagan 在 1990 年代末期首次给出了 Grassmannian 情形（即 u,v 都是 Grassmannian 排列）的组合公式。他们的工作揭示了一个美妙的结构：系数可以理解为某种**路径计数**。Samuel 在 2024 年的工作中将这一公式推广到更一般的情形。

©u ~0q9}9§0L K0 H0j§ (~0q9}9§0L K0 H0j§ ~0§)：分离的下降点

在我们陈述主要公式之前，需要引入一个关键概念。

当我们把两个 Schubert 多项式相乘时，系数 $e_{uv}^w(\mathbf{y};\mathbf{z})$ 的结构并非任意——它受到排列 u 和 v 的**下降点**（descents [y , Definition 1.1]）位置的深刻影响。

直观上，如果 u 和 v 的下降点彼此" 分离"——存在某个整数 p 将它们分开——那么乘积的结构会变得格外清晰。

定义 2.1 (~0q9}9§0L K0 H0j§ ~0§ [y , Definition 2.1]). ل $u,v\in S_\infty$ ˆ

$$\mathrm{SD}(u,v) = \{i\in\mathbb{Z}_{>0} : \ell(us_i)>\ell(u) \text{ ﻟ } \ell(vs_i)>\ell(v)\} \tag{36}$$

ƌ قمد : ŝ i ă سر u ļ ﷺ ǐ ŏ ﻟ i ă سر v ļ ﷺ ǐ ļ ﺟﺟ ₦ ă

定义 2.2 (~0q9}9§0L K0 H0j§ **条件** [y , Definition 2.1]). ل $u,v\in S_\infty$ ¨ (u,v) : ***separated descents* 条件** ŏ ﺑم ù e ﺟﺟ p حي ķ ŝ

- Ḧ قمد $i<p$ ŏ $\ell(us_i)>\ell(u)$ ŋ ƌ $i\notin \mathrm{Des}(u)$ ŏ i ă سر u ļ ﷺ ǐ ŌŞ
- Ḧ قمد $i>p$ ŏ $\ell(vs_i)>\ell(v)$ ŋ ƌ $i\notin \mathrm{Des}(v)$ ŏ i ă سر v ļ ﷺ ǐ Ō

ŏ u ļ قمد ﷺ ǐ Ḍ ₦ p ļ Ţ ŏ v ļ قمد ﷺ ǐ Ḍ ₦ p ļ Ţ

引理 2.1 (Lemma 2.2 [y , Lemma 2.2]). ل (u,v) : b 2 T ` i 2 / / 2 b + 2 ╔ M i b e ļ ﺟﺟ p حي ķ ŝ

(1) Ḧ قمد $i<p$ ŏ $i\in \mathrm{SD}(u,v)$ Ş
(2) Ḧ قمد $i>p$ ŏ $i\notin \mathrm{SD}(u,v)$

~~

R y XcI²

'c º a K m¥¥ HJ Q H 2 p @ ëÉ ~; TM¥ , • = ¸ b 1 o 1 Ä Â /

U RaV2 T ` i 2 / / 2 b + 2 HMq i bb 2 T ` i 2 / / 2 b + 2 M i b^+ TQîM¥ ¥B ÉEBHQ M
i i ñ Q ~ @ ™ ~ ; K M B Ï Q a¥ + ? m # 2 B ` i a + ? m # 2 ` i M+ QEH¥ Ï b
5 Ÿ

U k ØV T T ` Q / m + i 7 Q ` WK m H+ a + ? m # 2 T i¥ ð Z 7 ¹ " " d µ
¥ a + ? m # 2 T iL Ÿ F †

U j WS i ? m ~ T i ? / B ; ` K K Q / 2 "H + ... c l ¥ F † ³ d i i ^ å 9
"

U 9 .VQ K B M M i T T ` Q t B K ö • i/ BÍ Q 4M | B î † ô Ä e ô ¹ ö • †
¥ " d Z E

U 8 4V 6 „ Ø H B 7 i B M ; „H 2 hKK „ Ø ` 2 / m + i B Q M ^ H £ ü K¥ K Ÿ ý b

T ¹ w , ' y = z H 'c¥ T ° ¤ ó : ` ? K T Q b B ¥ B X ¥ £ ü i i ƒ |
^ / B c ¥ ö 5 b

R R¸Xc ö 1 T¥W%£ü

ß " + F ; ` Q m X 'K « ó ç Ø \ \ ¥ › œ £ ü % « b £ ü • ¨ `(u) + `(v) ¥ B
, E b

• " ç l S ` K 2 i 2 ` . 2 } M B i B Q M b
u; v 2 S$_1$ ñ í k † µ K † ¥ i
`(w) † w ¥ É B M p 2 ` ñ ' B Q M
. 2 (w) = f i : `(ws$_i$) < `(w) g / † Ä " †
p b 2 T ` i 2 / / 2 b H + o 2 Ï ¥ i s ¸ œ "

X © H q : B p 2 M
(u; v) ¡ @ b 2 T ` i 2 / / 2 b H + o 2 M i b
B , L ! î µ `(u$^0$) + `(v^0) < `(u) + `(v) ¥ f ™ T î ë

" S : Q H X £ ü

$$S_u(t;v)S_v(t;x) = \sum_w e^w_{uv}(v;x)S_w(t;v)$$

W % w • „ ç . 2 ` B p i B Q M a X i „ 2 ç T b R I n w ¡ @ `(ws$_i$) < `(w) ¥ f ™ b
® a + ? m # 2 T i¥ 'Ÿ É n » B c µ

$$S_w(t;v) = \frac{S_{ws_i}(t;v) \quad S_w(t;v)}{x_i \quad y_j}$$

Ï j ^ ñ + ç · S b
„ ç k ‹ ¨ „ Ø \ \ „ „ Ø \ \ É › ¾ B b
' `(ws$_i$) < `(w) H

$$e^w_{uv}(v;x) = e^{ws_i}_{us_i;vs_i}(v;x)$$

' `(ws$_i$) > `(w) H

$$e^w_{uv}(v;x) = e^{ws_i}_{us_i;v}(v;x) + e^{ws_i}_{u;vs_i}(v;x)$$

„ ç j æ ¨ b 2 T ` i 2 / / 2 b H + o 2 e V Å i / b † Ä Ê Â b
® ç l i p P ¤

℅u℅u **经典** ~H\«@O}§ **多项式**u 正如 Chapter 1 中所定义，Schubert 多项式通过除差算子作用在特殊多项式 x^δ 上得到：

定义 3.2 (~H\«@O}§ **多项式**). ⊌ $\delta = (n-1, n-2, \ldots, 1, 0)$ ŏ w_0 S_n ⌋ 。 ***Schubert* 多项式** ŝ

$$S_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0}(x^\delta), \tag{55}$$

ь $x^\delta = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_n^0$

当引入 y 变量后，我们得到双重版本——这正是 Chapter 2 研究乘积公式时使用的工具：

定义 3.3 (**双重** ~H\«@O}§ **多项式**). **双重 *Schubert* 多项式** ŝ

$$S_w(x, y) = \partial^{(x)}_{w^{-1}w_0} \prod_{i+j\le n} (x_i + y_j). \tag{56}$$

¨u 量子上同调的基本框架

为什么量子上同调是自然的？这需要从几何学中寻求解释。

在经典相交理论中，我们计算子流形 $X, Y \subset V$ 的交集 $X \cap Y$ 的点数。但在旗流形的情形，当我们要计数**连接两点的曲线**时，普通的相交理论失效了——因为这不是点与点的交集，而是曲线与曲线的交汇。

Kontsevich 和 Manin 的伟大贡献在于，他们意识到这种计数可以系统化——通过引入 Gromov-Witten 不变量（Gromov-Witten invariant）。

¨uou W}nhn®]¯_§§0j **不变量**（W}nhn®]¯_§§0j _j®9}_9j§)u 设 V 是光滑复流形，$\beta \in H_2(V, \mathbb{Z})$ 是曲线类（curve class）。W}nhn®]¯_§§0j **不变量**

$$\langle I^V_{0,m,\beta} \rangle : H^*(V, \mathbf{Q})^{\otimes m} \longrightarrow \mathbf{Q}.$$

计数满足特定条件的参数化曲线个数。

直观理解：$\langle I^V_{0,m,\beta}\rangle(X_1^* \otimes \cdots \otimes X_m^*)$ 是满足以下条件的稳定映射 (stable map) $f : \mathbb{P}^1 \to V$ 的" 虚拟个数"：

- f 的像代表同调类 β；
- $f(p_i) \in X_i$（其中 $p_1, \ldots, p_m \in \mathbb{P}^1$ 是标记点）。

这些不变量最初来自物理中的拓扑场论，后来被严格化——这又是数学从物理学汲取营养的又一经典案例。

¨u℅u **小量子上同调环**（h9ee x«9j§«h Hn\nhnenX´ }_jX)u 对于旗流形 (flag manifold) $Fl_n = SL_n/B$，小量子上同调环 (small quantum cohomology ring) 的结构由 Givental、Kim 以及 Ciocan-Fontanine 确定。

定理 3.1 (小量子上同调环 [y ， Theorem 8]). ĩ ضج ∪ ' $QH^*(Fl_n)$ ĩ

$$\mathbf{Z}[x_1, \ldots, x_n; q_1, \ldots, q_{n-1}]/(\widetilde{e}_1, \ldots, \widetilde{e}_n).$$

ь $\widetilde{e}_i(x|q)$ س**量子初等对称函数** ŏ ۶ ڤي ŝ

$$\det \begin{pmatrix} x_1+t & q_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & x_2+t & q_2 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & x_3+t & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & x_n+t \end{pmatrix} = t^n + \widetilde{e}_1 t^{n-1} + \cdots + \widetilde{e}_n.$$

当 $q_1 = \cdots = q_{n-1} = 0$ 时，(yy) 退化为经典上同调环——这体现了量子版本与经典版本之间的深刻联系。

几何含义：量子初等对称函数 $\widetilde{e}_i$ 对应于旗流形中特定子流形的类。它们的零点描述了旗流形的量子修正结构。

Vu 量子双重 ~H\w@O}§ 多项式的定义

有了量子上同调框架后，我们现在可以正式定义量子双重 Schubert 多项式。

Vuou **顶部多项式**（§nq qne´jnh_9e)u 设 $x = (x_1, \ldots, x_n)$ 和 $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 是两组变量，$q = (q_1, \ldots, q_{n-1})$ 是量子变量。

顶部多项式（top polynomial）定义为

$$\widetilde{S}_{w_0}(x, y) := \prod_{i=1}^{n-1} \Delta_i(y_{n-i} \mid x_1, \ldots, x_i).$$

其中

$$\Delta_k(t \mid x_1, \ldots, x_k) := \sum_{j=0}^{k} t^{k-j} e_j(x_1, \ldots, x_k \mid q_1, \ldots, q_{k-1}).$$

是关于 $x_1, \ldots, x_k$ 的量子初等对称函数的生成函数。

为什么叫Ÿ 顶部多项式Ÿ ？当 $q = 0$ 时，$\widetilde{S}_{w_0}(x, y) = \prod_{i+j \le n}(x_i + y_j)$，这正是对应最长置换 w_0 的 Schubert 多项式——在 Bruhat 序（Bruhat order）中，它是旗流形的" 最大维" Schubert 胞腔。

Vu@u **量子双重** ~H\w@O}§ **多项式**u 有了顶部多项式，我们通过对它施加除差算子来生成所有量子双重 Schubert 多项式：

定义 3.4 (量子双重 Schubert 多项式 [y ， Definition 4]). Ë Ï o ¨A $w \in S_n$ ðˆ **量子双重 *Schubert* 多项式**

$$\widetilde{S}_w(x, y) = \partial^{(y)}_{ww_0} \widetilde{S}_{w_0}(x, y).$$

Ь æ ϽبيÞ $\partial^{(y)}_{ww_0}$ y K ¯Ï

与经典版本的关系：当 $q = 0$ 时，

$$\widetilde{S}_w(x, y)\Big|_{q=0} = S_w(x, y).$$

即经典双重 Schubert 多项式。这是" 经典极限" 的一个典型例子——量子理论在 $q \to 0$ 时退化为经典理论。

验证：设 $q = 0$，则 $\Delta_i(y_{n-i} \mid x_1, \ldots, x_i) = \prod_{j=1}^{i}(x_j + y_{n-i+j})$，而

$$\prod_{i=1}^{n-1} \prod_{j=1}^{i} (x_j + y_{n-i+j}) = \prod_{i+j \le n} (x_i + y_j) = S_{w_0}(x, y).$$

然后由除差算子的性质可得 (yy)。

Uu 主要性质

量子双重 Schubert 多项式具有一系列重要性质。

稳定性（§9@_e_§´ ）

与经典版本类似（见 Chapter 1 的稳定性（stability）讨论），量子双重 Schubert 多项式也具有稳定性：

命题 3.1 (稳定性). 当 $m > n$ 时 $i : S_n \hookrightarrow S_m$ 满足

$$\widetilde{S}_w(x, y) = \widetilde{S}_{i(w)}(x, y).$$

这意味着量子双重 Schubert 多项式在嵌入下保持不变——我们可以将其定义在 S_∞ 上，这对于理论研究非常便利。

S_3 的例子

为了建立直观感受，我们展示 S_3 的量子双重 Schubert 多项式：

例 3.1 (S_3 的量子双重 Schubert 多项式). S_3 a + ? m # ` i

$$\begin{aligned}
\widetilde{S}_{s_1s_2s_1}(x, y) &= (x_1 + y_2)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1) + q_1(x_1 + y_2),\\
\widetilde{S}_{s_2s_1}(x, y) &= (x_1 + y_1)(x_1 + y_2) - q_1,\\
\widetilde{S}_{s_1s_2}(x, y) &= (x_1 + y_1)(x_2 + y_1) + q_1,\\
\widetilde{S}_{s_1}(x, y) &= x_1 + y_1,\\
\widetilde{S}_{s_2}(x, y) &= x_1 + x_2 + y_1 + y_2,\\
\widetilde{S}_{\mathrm{id}}(x, y) &= 1.
\end{aligned}$$

观察：每个多项式都由一个经典部分加上一到两个 q 修正项组成。当 $q_1 = 0$ 时，这些公式退化为经典双重 Schubert 多项式。

关键洞察：第一个公式（对应最长元 $w_0 = s_1s_2s_1$）包含了 q_1 项，这反映了在量子上同调中，最高维 Schubert 类的乘法会涉及量子修正——这正是量子与经典理论的核心差异所在。

量子 ~H\«@0}§ 多项式

除了量子双重版本，Kirillov 和 Maeno 还定义了不含 y 变量的量子 Schubert 多项式。

量子配对（x«9j§«h q9_}_jX ）

在经典理论中，我们用标量积 $\langle f, g\rangle = \partial_{w_0}(fg)$ 来定义 Schubert 多项式的正交性（orthogonality）。在量子情形，我们需要用量子配对（quantum pairing）来替代：

定义量子配对（quantum pairing）为 Grothendieck 留数（Grothendieck residue）：

$$\langle f, g\rangle_Q = \mathrm{Res}_{\widetilde{I}}(fg).$$

其中 $\widetilde{I}$ 是由量子初等对称函数生成的理想。这个配对对应于量子上同调环中的相交形式（intersection form）。

为什么使用留数（W}n§\0jL_0Hc }0 _L«0 ）？这是因为在商环 $QH^*(Fl_n)$ 中，普通的积分被留数公式所替代——这反映了量子版本与经典版本的本质差异。

定义

定义 3.5 (量子 Schubert 多项式 [y , Definition 5]). **量子 *Schubert* 多项式** $\widetilde{S}_w(x)$ 满足 $\{x^I \mid I \subset \delta\}$ $\langle , \rangle_Q$ K @ a + ? K B i

这一定义在结构上与经典 Schubert 多项式的刻画像（见 Chapter 2 的讨论）完全对应——只是将普通标量积替换为了量子标量积。

量子 Schubert 多项式满足以下正交性（orthogonality）条件：

$$\langle \widetilde{S}_u, \widetilde{S}_v \rangle_Q = \begin{cases} 1 & \text{若} v = w_0 u, \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

¢u 量子 G9«H\´ 恒等式

这是本文的核心结果之一——它建立了量子与经典 Schubert 多项式之间的对偶关系。

定理 3.2 (量子 Cauchy 恒等式 [y ， Theorem B]). ⊬ $\widetilde{S}_w(x) = \widetilde{S}_w(x, 0)$ ŏ

$$\sum_{w \in S_n} \widetilde{S}_w(x) S_{ww_0}(y) = \widetilde{S}_{w_0}(x, y).$$

这为什么重要？这一恒等式将量子 Schubert 多项式与经典 Schubert 多项式联系起来。当 $q = 0$ 时，(yy) 退化为经典的 Cauchy 公式

$$\sum_{w \in S_n} S_w(x) S_{ww_0}(y) = \prod_{i+j \le n} (x_i + y_j).$$

这正是 Chapter 2 中研究乘积公式时的基础。

几何意义：(yy) 建立了量子 Schubert 多项式（对应量子上同调类）与经典 Schubert 多项式（对应普通上同调类）之间的对偶关系。这种对偶性在数学物理中有深刻的根源。

Pu d9 Hn«²]~H\ʁ§¶Oj@O}XO} 型公式

作为量子 Cauchy 恒等式的一个直接推论，我们得到量子 Schubert 多项式的 Lascoux-Schützenberger 型公式。

推论 3.1 (Lascoux-Schützenberger 型公式 [y ， Theorem C]). ⊬ $\widetilde{S}_{w_0}(x, y)$ ضجبم ŏ

$$\widetilde{S}_w(x) = \partial^{(y)}_{ww_0} \widetilde{S}_{w_0}(x, y)\big|_{y=0}.$$

这告诉我们什么？量子 Schubert 多项式可以通过对量子双重 Schubert 多项式施加除差算子，然后取 $y = 0$ 来得到。这与经典情形

$$S_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0} S_{w_0}(x).$$

的结构完全类似——量子版本只是经典版本的自然推广。

ku 与三重 ~H\«@O}§ pn _§_®_§´ 的联系

在 Chapter 1 中，我们研究了 Gao-Xiong 关于三重 Schubert Positivity（triple Schubert positivity）的结果。现在我们揭示量子双重 Schubert 多项式与这一结果的联系。

回顾 Chapter 1 的核心问题：研究展开系数

$$S_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot S_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c^w_{u,v}(\mathbf{y}, \mathbf{t}) S_w(\mathbf{x}; \mathbf{t}).$$

的正性。

关键联系：当我们考虑量子上同调时，同样的乘法在量子配对下有更丰富的结构。量子双重 Schubert 多项式提供了这些乘法结构的代数代表元。

验证：当 $q=0$ 时，(yy) 简化为 $e_k(x_1,\ldots,x_k)$。当 $n=3$，$k=1$ 时，$\widetilde{e}_1=x_1+x_2+x_3$。当 $n=3$，$k=2$ 时，

$$\widetilde{e}_2=e_2(x_1,x_2,x_3)-q_1(x_1+x_2)=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3-q_1(x_1+x_2).$$

oVu©u **量子配对与** W}n§\0jL_0Hc **留数u 背景（**?9HcX}n«jL **）**：量子配对 $\langle f,g\rangle_Q$ 通过 Grothendieck 留数定义，它对应于量子上同调环中的相交形式。理解这一配对对于掌握量子 Schubert 多项式的正交性至关重要。

参数定义（p9}9h0§0} K0»j_§_nj **）**：

- $\widetilde{I}_n\subset\overline{P}_n=\mathbf{Z}[q_1,\ldots,q_{n-1}][x_1,\ldots,x_n]$：由量子初等对称函数生成的理想
- $\mathcal{H}=\det\left(\frac{\partial\widetilde{e}_i}{\partial x_j}\right)$：Hessian

已知条件（W_@0j **）**：Grothendieck 留数定义：对于 $f\in\overline{P}_n$，若 $\deg f<d_0=\deg\mathcal{H}$，则 $\mathrm{Res}_{\widetilde{I}}(f)=0$；若 $\deg f=d_0$，则 $f\equiv\frac{\alpha}{n!}\mathcal{H}\pmod{\widetilde{I}_n}$，其中 $\mathrm{Res}_{\widetilde{I}}(f)=\alpha$。

配对定义为 $\langle f,g\rangle_Q=\mathrm{Res}_{\widetilde{I}}(fg)$。

目标（Wn9e **）**：证明配对的非退化性和正交性。

推导步骤（K0}_@9§_nj ~§0q **）**：

步骤 0 **：留数的基本性质。**由 Grothendieck 留数的基本性质，若 $f\in\widetilde{I}_n$，则 $\mathrm{Res}_{\widetilde{I}}(f)=0$。

步骤 @ **：诱导非退化配对。**因此配对在商环 $\overline{P}_n/\widetilde{I}_n\cong QH^*(Fl_n)$ 上诱导非退化配对。

步骤 ¨ **：量子** G9«hN´ **恒等式的作用。**对于量子 Schubert 多项式的正交性，关键计算基于以下观察：由量子 Cauchy 恒等式

$$\langle\widetilde{S}_{w_0}(x,y),\widetilde{S}_{w_0}(x,z)\rangle_Q^{(x)}=C(y,z).$$

其中右边是" 典范元素"。

步骤 V **：施加除差算子。**对两边施加除差算子 $\partial_{vw_0}^{(y)}\partial_{ww_0}^{(z)}$，可得

$$\langle\widetilde{S}_v(x,y),\widetilde{S}_w(x,z)\rangle_Q^{(x)}=\sum_{u\in S_n}\partial_{vw_0}^{(y)}S_u(y)\cdot\partial_{ww_0}^{(z)}S_{w_0u}(z).$$

步骤 U **：取极限得到正交性。**取 $y=z=0$，利用 $\eta(\partial_wS_u)=\delta_{w,u}$，可得正交性关系 (yy)。

这完成了配对非退化性的推导。

*> Sh1_ 9

SQbBiBpBiv BM 1[mBp `B Mi Zm MimK a+?m#2`i *

RX„ý VÜÅž 0ii¹I¹1w<$

-ØcÏ áÌï„yë a+?m#2`i + ¥HO+}m•Hmb\\ Ø×M "/y
ë :` ? K TQbBiBpBiv\ ó JQH2p@ÆË˜; TM \\ „Æ 0 ×
a+?m#2`TibÄB„w<û1–¹„ /BñÙ5b
C Bñ1–¥ Ùå áÌë- ÜÅ]Ø¥žŸ?Žw<ž 0ñ'$
ƒñÙ5idí¥bObáÌXÜ©¡ ÜÅ©M]Ø 2[mBp `B Mi+Q?QKQHQ
Ï :` ? K£ü S2i2`b¥QMK \\ iiZ7""^1¿µô x_i ¥dµ [TbŒ
0]Ø¥fƒµî,] ðE, ^†B¥MŒ9" 7 # :`QKQp@qBMi2M
:`QKQp@qBii2M BM9"¥B¡M@i+çHq¥wLñ"b ÷¯ ¥}"+
…W¸Ï]ËžŸ²T^Ž¯–îë$
,•?C JB? H+2 -kÃ¥Ndç¥b©M 0]Ø 2[mBp `B Mi[m MimK
+Q?QKQ¥HQÈ¸ï $c^{w;d}_{u;v}$ ¯–^1¿µô $x_1;::::;x_r$ ¥dµœ""" [Tb
ƒñ²T´¤áÌ'±bYÈ "Ð¥ÄBQw<ûö„Æ•¥¯ Ÿii÷ ¥•
"a÷±ó¥›¹a÷ ¥. QèbŒ ƒÚ a+?m#2`i + ¥H+žmŸHMÜÅ
ž 0¥w<ÏVC Ù¦¥×çŸbƒÀU"žŸ,ÇÇ^/ŒŸ¥F† 7^Q˜
Õ÷'ª¥+…„}"² b

kXåN•Ž S2i2`bQMK

1Ø³ JB? H¥2T ³1í$B Ú'¥åNbƒ åNZC "Ð‰XÂ…Y
VB}}"ÐE¥ýTï„¤ž£ü„w<b

kXRÜXÅf™X ÜÅ a+?m#2`i + ÏH+Èm"Hmb $c^{w}_{u;v}$ 9" @™ÏØñ a+?m#2`i
[¥ŒÄñ" 1–^dµœ"bƒÕdµŸ ë¹ a+?m#2`i TQbBiôB¿p+Bi.vM
Œ ;2QK2i`B+BMi¥`8Q2"+iiBHQ}MwL ¯@™Ï¥MŒñ" (\ - Pb)
Œ'„Æ©M©žHÙ5M¤±ó b©M]Ø 2[mBp `B Mi+QH+TQKPHQ;v
Ï¥² È" $c^{w}_{u;v}$, ^e†¥œ" 7^1¿ iQ`mTb•"¥ [T (\ \)bƒt
[T¥""Î? ûdµ—$
ƒ^Bñ'Y¥Ù5b ©M 0]ØÏ Ë, ^0[¥°¤]ØË 7^46
ž X TET]~ bW ?QKQiQTv [m¥QËBb2ƒMÕ÷`¥!ÂÏ dµŸ
, ?V+…MŒ°¤ b

kXkX S2i2¥bQEM‰XXRNMd . MB2H S2i2JbAQ¥[4 Bñ7
¸ ¦Ùñ¥‰X 'P ƒt [TÏ ""¯–^ óž ô¥ii 87ý $c^{w}_{u;v}$ V[
•îµô ¡ ¥dµ"" [Tb
¹I¹aƒ^ ó?Œô¥‰X$y¹Àµ¦?çùžƒBÄb©M 0]ØÏ¥Ë>
€ °¤¥+…il žŸ»¬,‹¾1î ûb S2i2`b¥QMi ¿ðçnž …Ÿ
¥dB² b

RÙ I¹^ :`QKQp@qBMi2M9"¥^I¹$n¸c \\b

这个猜想被 Graham 在 2001 年证明：

定理 4.1 (Graham Positivity Theorem [y , Theorem 3.2]). ₰ $X = G/P$ ɛ ᴱ ヽ ʃ ð $u, v, w \in W^P$ ɾ ₭ ض ᵘ ŋ 2[mBp `B Mi +QŌ?QQ₭²QHQ;v

$$\sigma(u)^T \cdot \sigma(v)^T = \sum_w c_{u,v}^w \sigma(w)^T$$

ь $\sigma(u)^T$ ʜ ص ʃ ₭ ض ᵘ ŋ 2[mBp `B Mi +QŌ?QQ₭QaHQm#2`ðT β ʜ iQ`mɟb ₭ ŋ 2[mBp ŌB³Mi

为什么叫 ð 正性Ÿ？[4] 因为每个 $c_{u,v}^w$ 都可以表示为形如 $x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots$ 的单项式的非负线性组合，其中所有系数都是非负整数。

℅u¨u **量子化带来的挑战**u Graham 定理的证明利用了等变量子上同调的几何性质[5]。但当我们将目光投向量子上同调时，同样的正性问题变得更加复杂。在量子上同调（quantum cohomology）中，乘法不再是单纯的相交计数，而涉及 Gromov-Witten 不变量（Gromov-Witten invariant）[y y]——计数的是满足特定条件的曲线个数：

$$\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w). \tag{57}$$

这里 d 是曲线类的多重次数（multi-degree），q^d 是形式变量。[6]关键问题出现了：系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 作为 x_i 的多项式，是否仍然满足正性？

一个自然的想法是：能否将量子情形“退化”到已知的 Graham 情形？如果能找到合适的极限或归约，Mihalcea 的工作正是基于这个思路。

¨u 等变量子上同调的定义

在前一节中，我们看到了从经典到等变量子上同调的正性问题自然延伸。但等变量子上同调（equivariant quantum cohomology）究竟是什么？本节给出其正式定义。[7]

¨uou **思想来源：**b_h **的贡献**u 在深入定义之前，有必要提及 Kim 的重要贡献 [y]。正是在 Kim 的工作基础上，Mihalcea 才得以将 Graham 的 positivity 结果推广到量子情形。Kim 认识到，等变上同调（equivariant cohomology）与量子上同调（quantum cohomology）之间存在一个“公共的母体”——等变量子上同调（equivariant quantum cohomology），它同时包含了这两者的结构 [y , §1]。

这一认识的关键在于：我们可以同时考虑 torus 作用（产生 x_i 多项式）和量子修正（产生 q 变量）。[8]

---

[2]问：$\sigma(u)^T$ 是什么意思？上标 T 代表什么？见附录 **??**。

[3]问：在 a+?m#2演算中，$\sigma(w)$ 是什么意思？例如 $\sigma(1) = 1$（单位类）和 $\sigma(s_1) =$ [点]（超平面类）。见附录 **??**。

[4]问：在 :` ? K SQbBi定理中v 为什么说展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式？展开式中明明有负项（如 $-x_1 t_2$）？见附录 **??**。

[5]问：在 *? Ti2` 9 UJB? 中提到:Vô:` ? K定理的证明利用了等变量子上同调的几何性质。ô为什么 :` ? K的证明要依赖几何性质？具体用了什么几何性质？到了量子上同调为何变得更复杂？见附录 **??**。

[6]问：$\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$ 这个公式中，q^d 是形式变量，q 是什么？求和是对什么？u, v, w 是什么？见附录 **??**。

[7]问：$H^*(X \times_T ET)$ 是什么？是量子同调吗？$H^*(X \times_T ET)$ 是怎么定义的？我不了解上同调定义，这是量子同调吗？见附录 **??**。

[8]问：这里 iQ`m的作用为什么对应的是 x_i 多项式？为什么量子修正产生 q 变量？这个修正到底是什么含义？见附录 **??**。

¨u©u **设置**u 以下 Setup 列出本文所需的核心几何对象。带

定义 4.1 (**连通复半单李群**). G **连通复半单李群**ŋ +Q M M 2+i 2/ +Q K T H 2t b 2K B b B K T ;`Q nŌT ŝ

(1) G سر ẽ g ŏ عي ᵛ ώ ὼ قي ♭ ï Ş

(2) سي g ŏ G سر ở ⌋ Ş

(3) ط ۸ β ججہ g سر x β ŋ b 2 K B b BŌKJTSHS2 ₫ g ك ų ὶ Ş˝ ᵸ ۸

ı ˊ ŝ $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) \sim \mathrm{SL}_n(\mathbb{C}) \sim \mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{C}) \sim \mathrm{SO}_n(\mathbb{C})$ ɾ

定义 4.2 (**抛物子群**). $P \subset G$ **抛物子群**ŋ T ` #Q H B + bŌm #;`ɻQ m T ŝ e ¨A "Q`2 Hقي $B \subset G$ŋ Ꞓ ᵖ ở ˝ ᵸ قي Ō حي ķ $B \subset P$ Ɗ ρ ˜Ɋ ضج ŏ $G/P$ سر ⁄′ ɐ ᴱ ۷ ſ ŋ +Q K T +i ?Q K Q;2 M ŌŌ ą m b ɹ ŏ g +ŋ ~ ; p `BŌ i ļ v ώ

定义 4.3 (**子群与极大环面**). $B \subset P$ ***Borel* 子群**ŋ "Q`2 H b m #Ō ŏ` Q ą G T ⌋ Ꞓ ᵖ ở ˝ ᵸ قي $T \subset B$ **极大环面**ŋ K tB K H iŌŏ` m b $T \cong (\mathbb{C}^\times)^r$ ŏ ط $r = (G)$ $G$ ⌋ ŋ ` MŌF T G ⌋ ♭ ï ۸ ð c ►ني ŝ كس ˘ˊ ı ɐ ⌋ Ɗ ρ ˜Ɋ

定义 4.4 (**齐次空间**). $X = G/P$ **齐次空间**ŋ ?Q K Q;2 M 2 Q nŌb b T +2 قي G ą ᴎ ð ų X ضج ŏ P Ő ⌋ ɛ قي ŋ B b Q i`Q T v bŌm #; `Ɋ Q m Ɗ عي ŏ $X = G/B$ سر ع g ŋ ~ ; p `BŌ Ş i ᵛ $P$ Ḧ :` b b K M M B Ɋ عي ŏ X سر æ Ẇ ع g

定义 4.5 (**群与 W_P 子群**). W G ⌋ ***Weyl* 群**ŋ q 2 v H ;`Q ŏ m ‖ T yy ŋ *? T i 2` RŌ $W_P \subset W$ P ق ˊ ⌋ قي ŝ سر كس W ضج حي Δ_P ŋ ‖ Ō ħ : ă K ⌋ q 2 v H Š ɹ ھ ˛ ⌋ قي

定义 4.6 (**正单根系与 Δ_P**). $\Delta = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\}$ **正单根系**ŋ T Q b B i B p 2 b B K T H Ō ŏ` Q Q i b v b i ‖ yy ŋ *? T i 2 ŌR ججہ ¨A "Q`2 Hقي B Ḧ ¨A ɛ ⌋ $\Delta_P \subset \Delta$ P ق ˊ ⌋ ₦ ŝ سر كس Δ ө Pŋ ⁵ ɾ ∏ ų ŏ ө ط Ḧ ⌋ ھ قي Ō i ¨Ạ ⌋ ┐ β ɛ ⌋ ₦ ă ˙Y ضج ŏ Δ_P e Ş ı P q 2 v Ḧ ŏ ô e ô ı ن Ś ɹ ţ

定义 4.7 (**最短长度代表元 W^P**). $W^P \subset W$ W/W_P ⌋ **最短长度代表元集合**ŋ b ?Q`i 2 b i H 2 M ;i? `2 T `2 b Ō M ₫ i ŝ B ï 2 g ₦ $wW_P \in W/W_P$ ⌋ ¸ Ę Ḟ ججہ حي ũ ų ŏ

$$W^P = \{w \in W \mid \ell(w) \leqslant \ell(w') \text{ Ḧ ضج } w' \in wW_P\}$$

ط $\ell(w)$ سر q 2 v Ḧ ŏ ⌋ ¸ Ę ṇ ججہ ŋ w ⌋ B M p 2 `ẂA ججہ Q M $W^P$ a +? m #2 ɹ ŏ c ŭ ۴ ►ني ŝ $G/P$ ⌋ a +? m #2 `ŝ W^P Ẅ ججہ ũ

记 $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$[9]，其中 x_i 对应负单根 $-\alpha_i$（negative simple roots）。

¨u¨u **等变量子上同调**u 基于 Kim 的思想，Mihalcea 将等变量子上同调定义为分次 $\Lambda[q]$-代数。

定义 4.8 (**等变量子上同调**). **等变量子上同调**ŋ 2 [m B p `B M i [m M i m K Ō $QH_T^*(X)$ K Q H Q;v سر ¨A Ẇ ᴱ $\Lambda[q]$ @ ججہ ŏ ط $\Lambda[q]$ @ ſ $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ ˛ Ṙ ○ ˊ ŝ

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w), \tag{58}$$

ط $c_{u,v}^{w,d}$ ₙ **等变量子 *Littlewood-Richardson* 系数**ŋ 2 [m B p `B M i [m M i m K G _ +Q 2 + B 2 ŏ M ą i ¸ 1 Z G _ ججہ Ō [10]

[9]问：等变量子上同调类是如何定义的？见附录 **??**。

[10]问：在 **??** 中提到：$QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ 代数。什么是分次 $\Lambda[q]$ 代数？其中的 q 变量代表什么？见附录 **??**。

关键性质：$c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 是齐次多项式，次数为 $c(u) + c(v) - c(w) - \sum d_i \cdot \deg(q_i)$。

与经典情形的关系：等变量子上同调是以下两者的共同推广：

- 当 $d = 0$ 时，退化为等变上同调（equivariant cohomology）$H_T^*(X)$（对应 Graham positivity）[11]；
- 当所有 $x_i = 0$ 时，退化为普通量子上同调（quantum cohomology）$QH^*(X)$。

这种“共同推广”的性质解释了为什么等变量子上同调是一个自然的研究对象——它同时推广了两个重要的上同调理论。

¨uVu b_h **的结构定理**u 在前一节的定义之后，Kim 证明了等变量子上同调具有代数结构：

定理 4.2 (等变量子上同调的结构 [y , Proposition 3.1]). ₰ $X = G/P$ ₹ E ヽ ∫ ŏ $(A, \circ)$ س ~ ♭ ă ǰ $\Lambda[q]$ @ ج ŏ ط $A = QH_T^*(X)$ ķ ä ŏ Ң ï ŝ

(1) $A/\langle \Lambda^+ \cdot A \rangle \simeq QH^*(X)$ $\mathbb{Z}[q]$ @ ج Ş

(2) $A/\langle q \cdot A \rangle \simeq H_T^*(X)$ Λ @ ج

ط $\Lambda^+ \subset \Lambda$ ᴎ ص E ج ج ï ¸ ǰ ⊿

意义解读：这个命题告诉我们，等变量子上同调 $QH_T^*(X)$ 同时包含两个重要退化的代数结构：

- 第一个同构表明，当我们“忘掉” x_i（即取 Λ^+ 理想商），只剩下量子参数 q，得到普通量子上同调 $QH^*(X)$；
- 第二个同构表明，当我们“忘掉” q（即取 q 生成的理想商），只剩下 x_i 参数，得到等变上同调 $H_T^*(X)$。

为什么这个定理重要？它证明了等变量子上同调的乘法确实良定义且满足交换律和结合律——这是 Mihalcea 整个 positivity 证明的基础。

与 Nwd| **系数的关系**：由这些同构可以推出，当 $d = 0$ 时，$c_{u,v}^{w,d}$ 退化为等变 LR 系数 $c_{u,v}^{w}$；当 $c_{u,v}^{w,d}$ 的多项式次数为 0 时（即 $c(u) + c(v) = c(w) + \sum d_i \cdot \deg q_i$），它等于普通量子 LR 系数。

¨uUu **例子**u **例** o **：**W}9 h9jj_9j $Gr(1,2) = \mathbb{P}^1$ **的情形。**

设 $X = Gr(1,2) = \mathbb{P}^1$。此时 $W = S_2 = \{1, s_1\}$，只有两个 Schubert 类：

- $\sigma(1) = 1$（单位类）；
- $\sigma(s_1) = [\text{点}]$（超平面类，记作 H）。

等变量子上同调 $QH_T^*(\mathbb{P}^1)$ 的乘法为：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1).$$

几何意义：$\mathbb{P}^1$ 上两点决定的直线与自身的交点数为 1，但需要量子修正因子 q（计数亏格 0 曲线）。

例 @ **：**$Gr(2,4)$ **情形。**[12]

---

[11] 问：为什么当 $d = 0$ 时，量子乘积公式 $\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$ 退化为等变上同调 $H_T^*(X)$（对应 :` ? K T Q b B i)B pJ附录 ??。

[12] 问：请详细解释 JB？ H 论文中关于 $Gr(2,4)$ 的例子（ + ? T i 2 ` 9 X i R t 9 j @ K 8 e 用最简单的语言说明：R X $Gr(2,4)$ 是什么？为什么叫 :` b b K M M B k X $W = S_4$ 是什么？最短代表元是什么意思？为什么有 e 个？ j X $u = s_1$ -$v = s_3$ 是什么？σ 是什么？ 9 X 乘积 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 是什么意思？ 8 X 右边两项 $\sigma(s_1 s_3)$ 和 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 各自代表什么几何意义？ e X 为什么要验证 $x_2 - x_3$ 是 ô 非负系数 ô？这为什么重要？ d X 量子修正项 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 中的 q 是什么？q 记录曲线的同调类是什么意思？请见附录 ??。

设 $X = Gr(2,4)$ (2 维平面构成的 Grassmannian)。此时 $W = S_4$ 的最短代表元有 6 个，对应 6 个 Schubert 类。

考虑 $u = s_1$，$v = s_3$。在等变量子上同调中：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3) = \sigma(s_1 s_3) + (x_2 - x_3) q \sigma(1).$$

正性验证：这里 $x_2 - x_3$ 是非负系数多项式（系数为 1），体现了 Mihalcea positivity 的核心结论。这正是我们在 yy 中要证明的性质——EQLR 系数是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式。

其中：

- $\sigma(s_1 s_3)$ 是普通项（对应 $d = 0$）；
- $(x_2 - x_3) q \sigma(1)$ 是量子修正项，其中 $x_2 - x_3$ 是非负系数多项式（体现正性!），q 记录曲线的同调类。

例 ¨ ：退化情形。

检验正性：

- 当 $d = 0$ 时，$c_{u,v}^{w,0}$ 退化为 Graham 情形——非负系数多项式；
- 当 $x_i = 0$ 时，$c_{u,v}^{w,d}$ 退化为普通量子系数——非负整数。

这验证了 yy 中的退化关系。

Vu 主要定理

现在我们可以陈述 Mihalcea 的核心结果。这个定理回答了我们在引言中提出的问题。

定理 4.3 (等变量子上同调 Positivity [y , Theorem 1]). ﻻ $u, v, w \in W^P$ ﺗ d Ķ E ﺟ ɾ Ⱪ ĩ G B i i H 2 r Q Q / @ _ B ﺟ? $c_{u,v}^{w,d}$ ﺟ bﺳQŰM ị ɛ́ $x_1, \ldots, x_r$ ﻝ ụ ị ﺟ ﺟ Ķ خي

这个定理的证明策略本身就是一段精彩的故事——Mihalcea 发现，可以将量子情形的计算归约到已经解决的 Graham 情形。我们将在下一节详细讨论这个证明思路。

Vuou 正性概念的演进u

为了理解这个定理的意义，让我们比较一下不同层次的正性：

情形	退化为	正性
经典上同调	$c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$	非负整数
等变量子上同调	$c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i]$	非负系数多项式
等变量子上同调（带量子修正）	$c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i]$	非负系数多项式

核心洞察：从经典到量子，正性性质一直保持——量子变量 q 的引入并不破坏正性。这与量子化往往引入负号或其他复杂行为的直觉相反。更重要的是，每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形（取特定的退化参数）：

$$c_{u,v}^w \in \mathbb{N} \Longrightarrow c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i] \Longrightarrow c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合，而是反映了 Schubert calculus 深层的不变结构。

4.1.1. ﻙﻯ ﺍ ﻝ ﺧﻲ ﺗﺞ X

定理 4.4 (Schubert Positivity). ﻻ $X = G/P$ ﻉ E ﻧ ∫ ŏ $u, v, w \in W^P$ ị ı a + ? m # 2 ` i + H + m Hȷmbï w ﺟ

$$c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$$

سر ụ ị ﺟ

定理 4.5 (Graham Positivity [y , Theorem 3.2]). ⏭ $X = G/P$ ⏭ E ⅄ ∫ ŏ $u, v, w \in W^P$ ɾ ⅋ Ĩ ضج ∪ ŏ ♭ Ĩ W جج

$$c_{u,v}^{w} \in \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$$

سر Ụ ị جج جج ⌋ Ķ خي

定理 4.6 (Mihalcea Positivity [y , Theorem 1]). ⏭ $X = G/P$ ⏭ E ⅄ ∫ ŏ$u, v, w \in W^P$ ŧ d Ķ E جج ɾ ⅋ Ĩ ضج ∪ ŏ ♭ Ĩ W جج

$$c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$$

سر Ụ ị جج جج ⌋ Ķ خي

这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合，而是反映了 Schubert calculus 深层的不变结构。

Ⅼu 证明思路：归约到 W}9\9h 定理

Mihalcea 的证明思路巧妙而简洁。核心思想是：将 EQLR 系数的计算归约到已在 Graham 定理中解决的问题。

论文的核心——ȸ£ 证明结构（[y , §6, 第 9-12 页]）：Mihalcea 的论文 §6（第 9-12 页）包含了 positivity 定理的完整证明。[13]整个证明的灵魂是**归约思想**：将 EQLR 系数计算归约到已知的 Graham positivity。

证明分为两部分：

（0 ）ȸ£u0 准备工作——两个核心要素：

- 在 $X \times X$ 上定义半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用
- 通过投影公式，将 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 上的曲线计数问题归约到 $X \times X$

（@ ）ȸ£u@ 定理证明——三层逻辑链：

d0hh9 £uV	$ev_3^{-1}(Y(w))$ 的不可约分支：$ev_3^{-1}(Y(v))$ 是 T-stable、reduced、不可约分支的不交并，每个分支的余维数为 $l(v)$
Gn}nee9}′ £u@	$X \times X$ 上的 Graham Positivity：T-stable 子簇的等变上同调类可以唯一写成 $\sum f_j[Y(u_j) \times Y(v_j)]_T$，其中 f_j 是非负多项式
d0hh9 £u¨	Kleiman transversality：$F : Z \to X \times X$ 是 G-等变映射，则 $F^{-1}(X(u) \times Y(v))$ 是 reduced、locally irreducible，余维数为 $c(u) + l(v)$

证明的关键步骤：先用 Lemma 6.4 将 $ev_3^{-1}(Y(w))$ 分解为不可约分支 V_i，再用 Lemma 6.3（Kleiman transversality）处理每个 V_i 通过 $F = (ev_1, ev_3)$ 在 $X \times X$ 上的像，最后由 Corollary 6.2（Graham Positivity）保证每个 $[F(V_i)]_T$ 都是非负组合。投影公式则将这些结果“推送”回 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 上的 EQLR 系数。

d0hh9 £u¨ **的正式陈述**（[y , Lemma 7.2]）：设 Z 是不可约 G-簇，$F : Z \to X \times X$ 是 G-等变映射（G 在 $X \times X$ 上对角作用）。则对任意 $u, v \in W^P$，$F^{-1}(X(u) \times Y(v))$ 是 reduced、locally irreducible 的，其余维数为 $c(u) + l(v)$。

整个证明的灵魂是 **归约思想**：通过投影公式，将 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$[14] 上的曲线计数问题归约到 $X \times X$ 上的已知正性。[15]

---

[13]问：JB？ H 论文 e的页码是否正确？它在第几页到第几页？实际阅读后确认。

[14]问：$\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 是什么？每个符号的含义是什么？为什么要有紧化？什么是评估映射 ev_i？能举一个 :`(2, 4) 的具体例子吗？见附录 **??**。

[15]等变量子上同调 TQbBi 定理的完整证明见附录 **??**。

为什么可以归约？ 在证明之前，让我们理解这个策略的直觉。EQLR 系数涉及稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X,d)$——它参数化了满足特定条件的稳定映射 $f:\mathbb{P}^1\to X$[16]。

但 Mihalcea 的关键洞察是：**通过投影公式，复杂的上同调表达式可以推送到 $X\times X$ 上，而 已经告诉我们答案。**

这个策略类似于我们在微积分中处理复杂积分时使用的变量替换——将一个难以处理的问题转化到我们已经理解的框架中。

这一归约策略与 中 Gao-Xiong 证明三重 Schubert positivity 的思路有本质联系——两者都使用了**投影公式**（projection formula）将复杂的几何对象分解为已知的组成部分 [, Section 3]。

核心工具：投影公式与推送公式 在深入证明之前，我们需要了解两个关键的代数几何工具。

5.2.1. 设 $f:X_1\to X_2$ 为 T-等变映射。对于 $a\in H_T^*(X_2)$、$b\in H_T^*(X_1)$，有：

$$f_*^T\left((f^T)^*(a)\cdot b\right)=a\cdot f_*^T(b). \tag{59}$$

直观理解：想象你有两个房间 X_1 和 X_2，中间有一扇门（映射 f）。现在你站在 X_2 里有一张纸条 a，在 X_1 里有一张组合纸条 b。如果你想把 X_1 里所有东西都搬到 X_2，那么纸条 b 上那些" 来自 X_2 的部分"（即 $(f^T)^*(a)$）会在搬运过程中保持不变，只需要对 b 的其余部分做推送。这个公式就是说：**来自目标空间的类 a 在推送过程中可以穿过整个运算，单独留在外面**。

为什么这很有用？：在量子上同调的证明中，我们需要计算

$$c_{u,v}^{w,d}=\pi_*^T\left((ev_1^T)^*\sigma(u)^T\cdot(ev_2^T)^*\sigma(v)^T\cdot(ev_3^T)^*\widetilde{\sigma}(w)^T\right).$$

这里 $\sigma(u)^T$ 和 $\sigma(v)^T$ 是来自旗流形 X 的类，而 ev_1,ev_2 是从模空间 $\overline{\mathcal{M}}$ 到 X 的映射。通过投影公式，我们可以把来自 X 的因子" 提取" 出来，只对复杂的模空间部分做推送——这就是从 $\overline{\mathcal{M}}$ 转移到 $X\times X$ 的关键。

生活中的类比：想象你在整理行李。你有一个大箱子 X_1（模空间 $\overline{\mathcal{M}}$），要把它所有东西都转移到小箱子 X_2（积空间 $X\times X$）。你知道有些东西（a）本来就是从 X_2 带来的，所以它们在转移后还是一样。而那些真正属于 X_1 的东西（b）则需要被" 压缩" 或" 重新打包"。投影公式就是描述这个打包规则的数学语言。

投影公式在 的证明中也扮演了核心角色——它建立了从几何相交到上同调类的桥梁 [, Lemma 2.5]。

5.2.2. 设 $f:X\to Y$ 是光滑簇之间的固有映射，$V\subset X$ 是不可约闭子簇，$\dim V=\dim Y$，则 $f(V)\subset Y$ 也是不可约闭子簇。设 $K(V)/K(f(V))$ 是函数域的扩张，定义 $f_*[V]=m[f(V)]$，其中 $m=[K(V):K(f(V))]$ 是扩张的次数（若 $\dim V>\dim f(V)$ 则 $m=0$）。

对于一般的可约闭子簇 $V=\sum_i m_i V_i$（V_i 不可约），线性扩张 $f_*[V]=\sum_i m_i f_*[V_i]$。

推送公式：设 $f:X\to Y$ 是光滑簇之间的固有映射，$Z\subset X$ 是闭子簇，$W\subset Y$ 是闭子簇，考虑纤维积图（fiber product diagram），有：

$$f_*([V])=\sum_i m_i a_i[f(V_i)], \tag{60}$$

其中 V_i 是原像的不可约分支（irreducible component），m_i 是对应的次数。

这个公式允许我们将一个复杂子簇的推送分解为其各个不可约分支的推送的线性组合。

第一步：在 $X\times X$ 上工作 考虑积空间 $X\times X$，带有半直积 $B'=T\cdot(U^-\times U^-)$ 的作用：

$$t\cdot(u_1,u_2)(\bar{g}_1,\bar{g}_2)=(tu_1\bar{g}_1,tu_2\bar{g}_2).$$

选择这个特定的 torus 作用是精心设计的——它让我们能够利用 $X\times X$ 上的特殊几何性质。

关键引理（[, Corollary 6.2]）：

[16] 问：在量子上同调的定义中，出现稳定映射 $f:\mathbb{P}^1\to X$，这里的 X 是什么？$\mathbb{P}^1$ 又是什么？见附录 **??**。

引理 4.1 (Graham Positivity on $X \times X$). $V \subset X \times X$ T $H_T^*(X \times X)$

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

$f_i \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$

这意味着任何 T-稳定子簇在上同调中都可以写成 $Y(u) \times Y(v)$ 型的类的非负线性组合。这是 Graham 定理在乘积空间上的自然应用。

第二步：使用 设 $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 为稳定映射的模空间（stable map moduli space），$ev_i : \overline{\mathcal{M}} \to X$ 为评估映射（evaluation map）。

EQLR 系数定义为：

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T \left((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T \right).$$

考虑映射 $F = (ev_1, ev_2)$，以及映射 $\overline{\mathcal{M}} \to X \times X$，它将模空间投影到前两标记点的积空间上。

利用投影与推送公式，Mihalcea 将表达式转化为：

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X \times X})_*^T \left([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T \right),$$

其中 V_i 是 $ev_3^{-1}(Y(w))$ 的不可约分支（irreducible component），由 [, Lemma 6.4] 给出。

这一步的关键：我们成功地将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 转移到了 $X \times X$。

第三步：应用 **定理** 对每个 $F(V_i)$，由 Lemma ，我们可以写

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T.$$

代入并再次使用投影公式，得到

$$(\pi_{X \times X})_*^T \left([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T \right) = \delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j},$$

其中 δ 为 Kronecker δ。

结论：整个表达式是关于 x_i 的非负整数线性组合，因为每一步都只涉及：

- 非负整数 a_i（映射次数）；
- 非负多项式 f_j^i（来自 Graham positivity）；
- Kronecker δ（非负整数）。

因此 $c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 是非负系数多项式，这正是 所要证明的。

证明的整体结构 让我们用流程图总结整个归约过程：



关键洞察：量子上同调（quantum cohomology）中的曲线计数问题可以通过投影公式归约为 $X \times X$ 上的经典问题。这与 yy 中三重 Schubert positivity 的证明策略形成了呼应——两者都使用了投影公式作为核心工具，将复杂几何对象分解为已知的 Schubert 基底的组合。

£u 与三重 ~H\«@O}§ pn _§_@_§´ 的联系

在 yy 中，我们遇到了 Refined Graham Positivity——Gao-Xiong 证明了三重变量 $(\mathbf{x};\mathbf{y};\mathbf{t})$ 下的展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 是关于 $t_i - y_j$ 的非负多项式（yy ）。Mihalcea 的结果与此有着深刻的联系。

三重 ~H\«@O}§ pn _§_@_§´ （triple Schubert positivity）涉及的是点的相交（point intersection），而等变量子上同调涉及的是曲线的计数（curve counting）。

£uou **为什么这两个正性定理是相关的？**u

粗略一看，三重 Schubert calculus 和等变量子上同调似乎是不同的领域：前者涉及多组变量，后者涉及量子修正。但它们都关注 Schubert 结构系数的正性，而且都涉及旗流形的几何。

当我们仔细审视时会发现：**两者都反映了旗流形中** ~H\«@O}§ **簇相交理论的基本非负性**。在三重情形，这种非负性来自点的相交；在量子情形，它来自曲线的计数。数学工具不同，但几何本质相同。

£u@u **旗流形情形的联系**u

当 $X = Fl_n = GL_n/B$ 时，等变量子上同调的 EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 与三重 Schubert calculus 中的正性有如下关系：

取特殊情形 $d = 0$（无量子修正），$c_{u,v}^{w,0}$ 正好是经典等变上同调（equivariant cohomology）的系数——即 Graham 的结果（yy ）。此时，EQLR 系数的正性退化为 Graham positivity。

当考虑量子修正 $d \neq 0$ 时，新的正性结果补充了 yy 的框架。几何上，这是因为量子上同调涉及曲线的计数，而三重情形只涉及点。**关键区别**在于：三重 Schubert positivity 涉及的是点的相交（point intersection），而等变量子上同调涉及的是曲线的计数（curve counting）。

£u¨u **另一种** §n}« **作用：T']等变版本**u Mihalcea 论文的第 7 节还讨论了另一种 torus 作用下的正性——$T' = (\mathbb{C}^\times)^m$ 作用在旗簇上。这种情形与 yy 中的三重变量理论更加接近。

6.3.1. T' ⌋ ï X设 $X = PGL(m)/P$ 是部分旗流形。$T' = (\mathbb{C}^\times)^m$ 通过以下方式作用在 X 上：

对 $t' \in T'$ 和 $x \in X$，

$$t' \cdot x = \varphi(t')x,$$

其中 $\varphi : (\mathbb{C}^\times)^m \to (\mathbb{C}^\times)^m/\mathbb{C}^\times \cong T$ 是商态射。

注意：T 是 $PGL(m)$ 的极大环面，而 T' 是更大的 torus。两者的关系是 $T = T'/\mathbb{C}^\times$。

6.3.2. T' @ Kضج ∪ ⌋ H X在 T'-等变上同调中，$H^*_{T'}(pt) = \mathbb{Z}[T_1, \ldots, T_m]$，其中每个 T_j 是某个 $\mathbb{P}^n$ 上 $\mathcal{O}(1)$ 丛的第一陈类。

6.3.3. J T ⊎ T' ⌋ K f̈ K X关键事实是：T-等变量子上同调中的负单根 x_j（对应字符 z_{j+1}/z_j）在 T'-等变版本中变为 $T_j - T_{j+1}$。

推论 4.1 (T'-等变量子上同调 Positivity [y , Corollary 7.1]). T' @ K f̈ ضج ∪ ŏ 1 Z G _ سرجج Ŭ K f̈ $T_1 - T_2, \ldots, T_{m-1} - T_m$ ⌋ u i جج Ḳ خي

与三重 qn _§_0_§´ **的联系**：这与 Graham 在 [y] 中研究的 Grassmannian 情形一致。这里，正性涉及的是差值 $T_i - T_j$，这与三重 positivity 中的 $t_i - y_j$ 结构惊人地相似——两者都涉及同类变量之间的差值。

几何直觉：$T_j - T_{j+1}$ 测量的是旗流形上相邻坐标的相对位置。这种相对坐标的选择是自然的，因为绝对值在物理上不可观测量（只有相对差值才有意义）。

¢u 几何意义

我们已经看到了 Theorem yy 的代数陈述。但从几何角度理解，这个定理告诉我们什么？

¢uou W}nhn0]¯_§§0j **不变量的正性**u EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是（3 点，带基点，亏格 0）Gromov-Witten 不变量（Gromov-Witten invariant）[17]：

$$c_{u,v}^{w,d} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \widetilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}.$$

它计数的是满足以下条件的稳定映射（stable map）$f : \mathbb{P}^1 \to X$ 的个数 [y , Example 1.2.1]：

- f 的像代表同调类 $d \in H_2(X, \mathbb{Z})$；
- $f(p_1) \in g_1 X(u)$, $f(p_2) \in g_2 X(v)$, $f(p_3) \in g_3 Y(w)$（其中 $g_i \in G$ 是一般位置，general position）。

其中 p_1, p_2, p_3 是 $\mathbb{P}^1$ 上的三个标记点（marked points）。

从纯粹的几何角度，这些计数自然是非负的——计数“有多少条曲线通过指定位置”这个问题，答案显然不能是负数。

而 Theorem yy 进一步指出：**即使加入了等变修正（这会产生关于 x_i 的多项式因子），整体系数仍然保持非负**。

为什么这不显然？在等变上同调（equivariant cohomology）中，类不再是子簇的直接上同调类，而是提升到 $X \times_T ET$（即 X 关于 torus 作用的同伦商空间/homotopy quotient）上的类。在这种更抽象的设置中，上同调类的相交理论变得复杂——我们不再能简单地说”两条子簇相交于几个点”，因为相交的结果可能是一个上同调类，而不是一个数字。在这种更抽象的设置中，非负性不再能从几何相交直接读出。Mihalcea 的证明揭示了隐藏的统一结构。

[17]定义见 (? - .2 } M B i B Q M 何 R 体 么 是 :`Q K Q p @ q B 不 变 量? 它计数的是什么？见附录 ??。

¢u©u **与其他正性结果的比较**u 在 Schubert calculus 的研究中，有多种不同层次的正性[y y]。它们之间存在包含关系：

(1) **经典** d| **系数**（classical LR coefficient）：$c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$，计数交点个数——最直接的正性；
(2) W}9\9h qn _§_®_§´ ：$c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i]$，等变修正的多项式系数非负——经典情形的等变推广；
(3) **三重** qn _§_®_§´ （yy ）：$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$，多组变量情形；
(4) g_\9eHO9 qn _§_®_§´ （本章）：$c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i]$，量子版本同样正。

这些正性之间存在蕴含关系：

$$c_{u,v}^w \in \mathbb{N} \Longrightarrow c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i] \Longrightarrow c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形（取特定的退化参数）。这种“稳定性”不是显然的——它反映了 Schubert calculus 核心结构的深层不变性。

Pu 本章小结

本章我们跟随 Mihalcea 的工作，探索了等变量子上同调中的正性问题。让我们回顾一下这段旅程的脉络：

问题的起源：从经典 Schubert calculus 到等变上同调（equivariant cohomology），Graham 证明了 Peterson 猜想——等变系数仍然满足正性。一个自然的问题是：这个性质能否推广到量子上同调？

核心突破（Mihalcea, 2007）：答案是肯定的。等变量子上同调的结构常数 $c_{u,v}^{w,d}$ 仍然是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式。

关键要点如下：

(1) p0§0} nj **猜想的历史**：由 Peterson 提出（1997），由 Graham 证明（2001），Mihalcea 将其推广到量子情形（2007）——这是一段跨越十年的数学探索；
(2) **等变量子上同调** $QH_T^*(X)$ 是等变上同调（equivariant cohomology）和量子上同调（quantum cohomology）的共同推广，同时包含了这两者的结构；
(3) **主定理**（Theorem yy ）：EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式；
(4) **证明策略**：通过 projection formula 将 EQLR 系数的计算归约到 $X \times X$ 上的问题，然后应用 Graham positivity——这是一种精巧的归约思想；
(5) **与** yy **的联系**：三重 positivity 涉及点的相交，而量子上同调涉及曲线的计数，两者都满足正性——不同的数学工具，相同的深层结构；
(6) **几何意义**：正性反映了 Gromov-Witten 不变量的内在非负性——即使在等变量子上同调的抽象设置中，几何直觉仍然成立。

这一结果与 Chapter 1 的 Gao-Xiong 三重 positivity 工作以及 Chapter 3 的量子 Schubert 多项式理论共同构成了现代 Schubert calculus 的核心框架。

在下一章中，我们将继续探索 Schubert calculus 的其他方面，包括量子版本的更多应用。

ku 附录：Nwd| 系数正性证明详解

kuou **背景（**?9HcX}n«jL **）**u 本节给出 Theorem yy 的详细证明思路。该定理由 Mihalcea 在 2007 年证明，是量子 Schubert calculus 的里程碑结果。

证明的核心思想是将 EQLR 系数的计算归约到 Graham 的经典 positivity 定理（Theorem yy ）。

ku©u **参数定义**（p9}9hO§0} KO»j_§_nj)u

- $X = G/P$：齐次空间（homogeneous space）
- $B = T \cdot U$：Borel 子群（Borel subgroup），其中 U 为幂幺根基（unipotent radical）[18]
- $B^- = w_0 B w_0$：相反 Borel 子群（opposite Borel subgroup）
- $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$：半直积（semidirect product）
- $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$：稳定映射模空间（stable map moduli space）
- $ev_i : \overline{\mathcal{M}} \to X$：评估映射（evaluation map）
- $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \to X \times X$
- $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$

ku¨u **已知条件**（W_@0j)u W}9\9h pn _§_@_§´ nj $X \times X$（[y , Corollary 6.2]）：设 $V \subset X \times X$ 为 T-稳定子簇，则

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中 $f_i \in \Lambda$ 是非负系数多项式。

p}na0H§_nj Sn}h«e9 ([y , (1)])：对于 T-等变映射 $f : X_1 \to X_2$，

$$f_*^T \left((f^T)^*(a) \cdot b \right) = a \cdot f_*^T(b).$$

p« \]Sn}°9}L Sn}h«e9 ([y , (2)])：对于纤维积图（fiber product diagram），

$$f_*([V]) = \sum_i m_i a_i [f(V_i)],$$

其中 V_i 是原像的不可约分支（irreducible component）。

等变 pn_jH9}Ĺ **对偶**（[y , Proposition 3.1]）：

$$\langle \sigma(u)^T, \widetilde{\sigma}(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v}.$$

kuVu **目标**（Wn9e)u 证明 EQLR 系数

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T \left((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T \right)$$

是关于 x_i 的非负系数多项式。

kuVu **详细推导步骤**（KO}_@9§_nj ~§0q ）——**对应论文** ›£u **步骤** 0 **：引入映射** F（**对应** Ey J dOhh9 £uoF)。

定义 $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \to X \times X$，这是 T-等变且适当的（proper）映射。

由 [y , Lemma 6.4]，$ev_3^{-1}(Y(w))$ 是 T-稳定、约化、不可约分支（irreducible component）的不交并，每个分支余维数为 $l(w)$。

利用 $ev_1^* \sigma(u)^T \cdot ev_2^* \sigma(v)^T = (F^T)^* [X(u) \times X(v)]_T$，可将表达式重写为

$$c_{u,v}^{w,d} = (\pi_{X \times X})_*^T F_*^T \left((F^T)^* [X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T \right).$$

步骤 © **：应用** p}na0H§_nj Sn}h«e9 **（对应** Ey J Nxu rosF)。

由 projection formula，

$$F_*^T \left((F^T)^* [X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T \right) = [X(u) \times X(v)]_T \cdot F_*^T \left((ev_3^T)^* \widetilde{\sigma}(w)^T \right).$$

步骤 ¨ **：处理** ev_3 **的原像。**

[18] 问：在 "Q`2H群分解 $B = T \cdot U$ 中，U 称为 ô幂幺根基ô，这是什么意思？见附录 ??。

由 [y , Lemma 6.4]，$ev_3^{-1}(Y(w))$ 是 T-稳定、约化、不可约分支 V_i 的不交并，每个分支余维数为 $l(w)$。

应用 push-forward formula（对应 [y , Eq. (2)]）：

$$F_*^T\left((ev_3^T)^*[Y(w)]_T\right)=\sum_i a_i[F(V_i)]_T,$$

其中 a_i 是映射 $F|_{V_i}:V_i\to F(V_i)$ 的次数（degree）。

因此，

$$c_{u,v}^{w,d}=\sum_i a_i(\pi_{X\times X})_*^T\left([X(u)\times X(v)]_T\cdot[F(V_i)]_T\right).$$

步骤 V ：应用 W}9\9h pn _§_0_§´ 。

对每个 $[F(V_i)]_T$，由 Graham 定理（[y , Corollary 6.2]），

$$[F(V_i)]_T=\sum_j f_j^i[Y(u_j)\times Y(v_j)]_T,$$

其中 $f_j^i\in\Lambda$ 是非负系数多项式。

代入并使用 projection formula：

$$\begin{aligned}&(\pi_{X\times X})_*^T\left([X(u)\times X(v)]_T\cdot[Y(u_j)\times Y(v_j)]_T\right)\\&=(\pi_{X\times X})_*^T\big((pr_1^T)^*\sigma(u)^T\cdot(pr_2^T)^*\sigma(v)^T\\&\quad\cdot[Y(u_j)\times Y(v_j)]_T\big)\\&=\langle\sigma(u)^T,\widetilde{\sigma}(v_j)^T\rangle_T\cdot\delta_{v,v_j}\\&=\delta_{u,u_j}\cdot\delta_{v,v_j}.\end{aligned}$$

其中第二个等式来自 [y , Lemma 2.3]，第三个等式来自等变 Poincaré 对偶（equivariant Poincaré duality）。

步骤 U ：得到最终表达式。

综合步骤 3 和 4，

$$c_{u,v}^{w,d}=\sum_i a_i\sum_j f_j^i\cdot\delta_{u,u_j}\cdot\delta_{v,v_j}.$$

由于所有 $a_i\in\mathbb{N}$（次数），所有 $f_j^i\in\Lambda$ 是非负多项式，我们得出结论：$c_{u,v}^{w,d}$ 是关于 $x_1,\dots,x_r$ 的非负整数系数多项式。

这完成了 Theorem yy 的证明。

ku£u **关键洞察（**b0´ ^j _X\§ **）**u 整个证明的核心洞察是：**量子上同调（**x«9j§«h Hn] \nhnenX´ **）中的曲线计数问题可以通过** q}na0H§_nj Tn}h«e9 **（投影公式）归约为** $X\times X$ **上的经典问题**。

为什么这个归约是可能的？因为 $c_{u,v}^{w,d}$ 的定义涉及三个评估映射（evaluation maps）ev_1,ev_2,ev_3。通过适当组合前两个映射 $F=(ev_1,ev_2)$，我们将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 推送到 $X\times X$。在 $X\times X$ 上，Graham positivity 已经告诉我们任何 T-稳定子簇的类都可以写成非负多项式系数的线性组合。

这个证明的深层意义在于：它表明即使在量子上同调中引入了新的复杂度（stable map moduli space，稳定映射模空间；curve counting，曲线计数），最终的正性结果仍然来自于经典几何中的简单事实。这种 “复杂性中的简单性” 是数学之美的体现。

CHAPTER 5

w«9j§«h Kn«@e0 ~H\«@0}§ pne´jnh_9e pn _§_®_§´ Gnja0H§«}0

ou S}nh Ge9 _H9e §n w«9j§«hI ¯\´ N²§0jLy

In yy , Mihalcea proved the positivity of structure constants for two Schubert classes in equivariant quantum cohomology [y]:

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

where the coefficients $c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ are polynomials with nonnegative coefficients.

The natural next question: G9j °0 0 §9@e_ \ 9 _h_e9} qn _§_®_§´ }0 «e§ Tn} Ln«@e0 ~H\«@0}§ qne´jnh_9e _j §\0 x«9j§«h 0§§_jXy

©u ¦\0 w«9j§«h Kn«@e0 ~H\«@0}§ pn _§_®_§´ Gnja0H§«}0

猜想 5.1 (Quantum Double Schubert Positivity). 6Q ù, $u, v, w \in S_\infty$ - i ? 2 T `Q / m + i Q 7 [m M@ i m K / Q m # H 2 a + ? m # 2 ` i T Q H v M Q K B Hb 2 t T M / b b ,

$$S_u^{(q)}(x; y) \cdot S_v^{(q)}(x; z) = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^{w,(q)}(y; z; q) \cdot S_w^{(q)}(x; y)$$

h ? 2 + Q 2 { + B 2 M i b b i B b 7 v ,

$$c_{u,v}^{w,(q)}(y; z; q) \in \mathbb{N}[y_i - z_j, q_k]_{i,j \geq 1, k \geq 1}$$

M K 2 H v - i ? 2 + Q 2 { + B 2 M i b ` 2 $y_i$ T Q H v M $q_k$ r B B ? H b Q B M M 2 ; i B p 2 B M i 2 ; 2 ` + Q 2 { +

|0e9§_nj _q °_§\ q}n@0L H9 0 :

(1) Kn«@e0 He9 _H9e H9 0 (Graham, 2001): For $q = 0$, the coefficients $c_{u,v}^w(y; z)$ are nonnegative polynomials in $t_i - y_j$.

(2) Nx«_®9}_9j§ x«9j§«h H9 0 ([y]): For two Schubert classes, $c_{u,v}^{w,d}$ are nonnegative polynomials in x_i.

(3) w«9j§«h Ln«@e0 H9 0 (this conjecture): The unified setting with both $y_i - z_j$ parameters and quantum corrections q_k remains open.

The two key conjectures in this framework are:

定理 5.1 (Classical Double Schubert Positivity (Gao-Xiong, 2025) [y , Theorem 1.1]). 6Q ù, $u, v, w \in S_\infty$ - i ? 2 T `Q / m + i Q 7 / Q m # H 2 a + ? m # 2 ` i T Q H v M Q K B Hb b i B b } 2 b

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; z) = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(y; z) \cdot S_w(x; z)$$

r B i ? + Q 2 { + B 2 M i b $c_{u,v}^{w,d}(y, z) \in \mathbb{N}[y_i - z_j]_{i,j \geq 1}$ X

˘ q

猜想 5.2 (Quantum Double Schubert Positivity). 6Q ù, v, w ∈ S_∞ - i ? 2 T ` Q / m + i Q 7 [ m M @ i m K / Q m # H 2 a + ? m # 2 ` i T Q H v M Q K B H b 2 t T M / b b ,

$$S_u^{(q)}(x;y) \cdot S_v^{(q)}(x;z) = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^{w,(q)}(y;z;q) \cdot S_w^{(q)}(x;y)$$

r B i ? + Q 2 { + B 2 M i b b i B b 7 v B M ; ,

$$c_{u,v}^{w,(q)}(y;z;q) \in \mathbb{N}[y_i - z_j, q_k]_{i,j \geq 1, k \geq 1}$$

M K 2 H v - T Q H v M y_i Q − K z $_j$ B M H b B m M M i m K T ` $q_k$ K 2 i B 2 i ` ? b M Q M M 2 ; i B p 2 B M i 2 ; 2 ` + C + B 2 M i b X

¨u W O n h O § } _ H ^ j § 0 } q } O § 9 § _ n j

The triple variables $(y_i - z_j, q_k)$ arise from three sources:

- y_i: records displacement from the first Schubert variety
- z_j: records displacement from the second Schubert variety
- q_k: records quantum corrections from curve counting (Gromov-Witten invariants)

The coefficient $c_{u,v}^{w,(q)}(y;z;q)$ can be interpreted as counting curves meeting three Schubert varieties in the quantum setting.

Vu G « } } O j § ~ § 9 § 0

This conjecture remains open. Progress includes:

- Mihalcea's proof of positivity for two Schubert classes in equivariant quantum cohomology [y]
- Gao-Xiong's work establishing the framework for triple Schubert calculus [y]
- The full quantum double Schubert positivity conjecture is a frontier topic in algebraic geometry and representation theory

Uu | O h 9 } c

The purpose of this chapter is to record this conjecture for future reference. Proving this conjecture would unify the positivity phenomena in both classical and quantum Schubert calculus.

附录：问答记录

问答记录将在这里。

为何限制到 $\mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$

问题 在证明 Schubert 多项式 positivity 时，为什么可以将一般约化群 G 限制到 $G=\mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$?

回答 归约技术的底层逻辑：

(1) **嵌入保持胞腔结构**：任何约化群 G 都可以嵌入到某个 $\mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$ 中，嵌入是单的且是代数群态射。旗流形 G/P 通过此嵌入嵌入到 GL_m/P' 中，Schubert 胞腔的闭包关系被保持：

$$\overline{B^-\pi B/P}\subseteq\overline{B^-\sigma B/P}\iff\overline{B^-\pi B/P'}\subseteq\overline{B^-\sigma B/P'}$$

(2) **多项式代表元的函子性**：由 [y ，Theorem 10.6.4]，类 $[\overline{B^-\pi B/B}]_T$ 由双重 Schubert 多项式 $S_\pi(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 表示。当限制到 GL_m 时，这个代表元关系保持。

(3) **的稳健性**：Graham positivity 猜想涉及 Schubert 多项式展开系数的非负性。这个性质在嵌入下保持——如果一般群的情形有 positivity，则其 GL_m 实现也有 positivity；反之如果 GL_m 情形有 negativity，通过嵌入的逆映射可以构造反例。

技术便利性：$\mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$ 有明确的多项式基（Schubert 多项式），而一般约化群没有这么好的多项式代表元系统。[1]

为何使用 S_∞ 而非 S_n

问题 在展开公式 $S_u\cdot S_v=\sum_w c_{u,v}^w S_w$ 中，为何求和使用 $w\in S_\infty$ 而不是 $w\in S_n$?

回答 核心原因：多项式的稳定性（ ）

(1) **S_∞ 是所有有限对称群的并集**：$S_\infty=\bigcup_{n=1}^\infty S_n$。每个置换 $w\in S_\infty$ 只有有限多个非平凡位置，即存在 N 使得 $w\in S_N$ 且对所有 $n\geq N$ 有 w 在 S_n 中。

(2) **多项式的嵌入性**：对于 $m>n$，$S_n\subset S_m$，且 $S_w^{(n)}(x_1,\dots,x_n)=S_w^{(m)}(x_1,\dots,x_n,0,\dots,0)$。即 S_m 中的 Schubert 多项式在变量 $x_{n+1}=\cdots=x_m=0$ 时限制到 S_n 的形式。

(3) **结构常数的稳定性**：当 n 足够大时（通常 $n\geq\ell(u)+\ell(v)$），展开系数 $c_{u,v}^w$ 与 n 无关。这意味着在 S_∞ 中定义的系数自然地在所有 S_n 中有效。

(4) **商空间的自然语言**：从旗流形的角度看，$Fl_\infty(\mathbb{C})=\varinjlim Fl_n(\mathbb{C})$ 是所有有限旗流形的余极限。在稳定极限下研究 Schubert calculus 更简洁、更本质。

[1] 问：为什么限制到 $:\mathrm{G}_m(\mathbb{C})$? 见附录 **??**。

技术细节：虽然 $u, v \in S_n$，但乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 可能涉及长度超过 n 的置换 w。使用 S_∞ 避免了人为的截断，使得公式在所有 n 下统一有效。**实际计算时**：在具体计算时，我们仍然在某个足够大的 S_N 中工作（通常 $N = \ell(u) + \ell(v)$），因为更长的置换不会出现在展开中。

Pu S_∞ 的定义与直观理解

Puou **问题**u S_∞ 定义中的 $\bigcup$（并集记号）是什么意思?

Pu©u **回答**u **并集 $\bigcup$ 的含义**：这是集合论中的记号，$\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ 表示把所有 $S_1, S_2, S_3, \ldots$ 合并成一个大集合：

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots$$

直观理解：

- S_n 只包含长度 $\leq n$ 的置换，即 n 元置换
- S_∞ 包含所有有限长度的置换，即任意有限支撑的置换

具体例子：

- S_3 中的元素：$(123), (213), (132), (231), (312), (321)$
- S_4 中的元素：$(1234), (2134), \ldots, (4321)$
- S_∞ 中的元素可以形如 $(3, 1, 4, 2, 5, 7, 6)$ ——这是一个在第 6 位之后就没有变化的置换，实际上只涉及了前 7 个位置

为什么需要 S_∞？在展开公式

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

中，乘积结果可能涉及比 u, v 更大编号的置换。例如 $u \in S_3, v \in S_3$，但乘积可能产生 $w \in S_5$。用 S_∞ 可以统一处理所有有限置换，避免编号的麻烦。**形式定义**：

$$S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n = \{w : \{1, 2, \ldots\} \to \{1, 2, \ldots\} \mid w \text{ 是有限支撑的双射}\}$$

这意味着 S_∞ 中的每个置换只在有限多个位置上与恒等置换不同。

ku ~c0° 除差算子与除差算子的关系

kuou **问题**u 那 Skew 除差算子和除差算子有什么关联和区别吗，可以举一些例子吗?

ku©u **回答**u 除差算子（divided difference operators）是 Schubert calculus 的核心工具，用于递归定义 Schubert 多项式。Skew 除差算子可以理解为两个除差算子的 “商 “，在展开系数计算中很重要。首先需要明确两个基本概念：ou **基本置换** s_i：在对称群 S_n 中，s_i $(i = 1, \ldots, n-1)$ 表示交换位置 i 和 $i+1$ 的基本置换。例如：

- 在 S_3 中：$s_1 = (12)$ 表示交换 1 和 2，即 $123 \mapsto 213$；$s_2 = (23)$ 表示交换 2 和 3，即 $123 \mapsto 132$。
- 在 S_4 中：$s_1 = (12)$，$s_2 = (23)$，$s_3 = (34)$。

任意置换 w 都可以分解为基本置换的乘积 $w = s_{i_1} s_{i_2} \cdots s_{i_k}$。©u **基本除差算子** $\partial_i = \partial_{s_i}$：对于 $i = 1, \ldots, n-1$，∂_i（也记作 ∂_{s_i}）定义为

$$\partial_i(f) = \partial_{s_i}(f) = \frac{f(x_1, \ldots, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_{i+1}, x_i, \ldots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

其作用是：先把函数中的 x_i 和 x_{i+1} 交换，再与原函数相减，最后除以 $x_i - x_{i+1}$。**例子**：设 $f = x_1$，则 $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$。$n = 3$ **的例子**：S_3 中的置换可以用一维数组表示，如 123 表示恒等置换，321 表示最长置换 w_0。

(1) $\partial_1(x_1) = 1$，因为 ∂_1 交换 x_1 和 x_2 后相减得 $x_1 - x_2$，除以 $x_1 - x_2$ 得 1。
(2) $\partial_1(x_2) = -1$，因为 $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$。
(3) $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$。
(4) $\partial_1(x_1 x_2) = \frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 - x_2} = 0$。
(5) $\partial_2(x_2) = 1$（类似地，∂_2 交换 x_2 和 x_3）。
(6) $\partial_1\partial_2(x_1)$：先作用 ∂_2，由于 x_1 不依赖于 x_2, x_3，$\partial_2(x_1) = x_1$；再作用 ∂_1，得 $\partial_1(x_1) = 1$。
(7) $\partial_1\partial_2(x_1 x_3) = \partial_1(x_1 x_3) = x_1 + x_2$。

$n = 4$ **的例子**：S_4 中有 $4! = 24$ 个置换。设 $w = 3412$ 表示排列 $(1, 2, 3, 4) \mapsto (3, 4, 1, 2)$，可分解为 $w = s_1 s_2 s_1 s_3$（从右往左读）。

(1) $\partial_1(x_1^2 x_3) = (x_1 + x_2)x_3$。
(2) $\partial_2\partial_1(x_3) = \partial_2(x_3) = x_3$（因为 ∂_1 不改变不含 x_1, x_2 的项）。
(3) 对于 $w = s_1 s_2$，有 $\partial_{s_1 s_2} = \partial_1\partial_2$。计算 $\partial_1\partial_2(x_1)$：

$$\partial_2(x_1) = x_1, \quad \partial_1(x_1) = 1$$

所以 $\partial_{s_1 s_2}(x_1) = 1$。
(4) 对于置换 $w = 4321 = s_1 s_2 s_3 s_1 s_2 s_1$（最长置换 w_0），有

$$\partial_{w_0} = \partial_1\partial_2\partial_3\partial_1\partial_2\partial_1$$

作用在单项式上会得到对称多项式。

置换对应的除差算子 ∂_w：对于任意置换 $w \in S_n$，定义 ∂_w 为适当组合的基本除差算子。例如，$w = s_i s_j$ 时，$\partial_w = \partial_i\partial_j$。~@° **除差算子** $\partial_{w/v}$：定义为 $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$，其中 ∂_v^{-1} 是 ∂_v 的逆算子，$\circ$ 表示算子复合。这不是简单的函数除法，而是先对函数用 ∂_v 的逆运算，再用 ∂_w 作用。**为什么这样定义？**这个定义源于 Schubert calculus 中展开系数的表示。当我们想将某个多项式展开为 Schubert 多项式的线性组合时，Skew 除差算子提供了一种系统的计算方法。具体来说，如果 S_w 是 Schubert 多项式，那么 $\partial_{w/v}(S_u)$ 给出了组合系数 $c_{u,v}^w$。$n = 3$ **中的** ~@° **除差算子例子**：

(1) $\partial_{s_1/s_1} = \partial_e$：因为 $\partial_{s_1} \circ \partial_{s_1}^{-1} = \partial_e$（恒等算子）。
(2) $\partial_{s_1 s_2/s_2} = \partial_{s_1} \circ \partial_{s_2}^{-1}$：先作用 $\partial_{s_2}^{-1}$（∂_{s_2} 的逆），再作用 ∂_{s_1}。
(3) 计算 $\partial_{s_1 s_2/s_2}(x_1)$：
   - $\partial_{s_2}(x_1) = x_1$（因为 x_1 不依赖 x_2, x_3）
   - 所以 $\partial_{s_2}^{-1}(x_1) = x_1$
   - 再作用 ∂_{s_1}：$\partial_{s_1}(x_1) = 1$

   因此 $\partial_{s_1 s_2/s_2}(x_1) = 1$。
(4) 对于 $w = w_0 = 321$，$v = s_1 = (12)$，有 $\partial_{w_0/s_1} = \partial_{w_0} \circ \partial_{s_1}^{-1}$。

在论文中，Skew 除差算子用于计算展开系数 $c_{u,v}^w$，其正性是 Kirillov 猜想的核心问题。

0·u 逆除差算子的定义

0·u0u **问题**u 逆除差算子是如何定义的?

o·u©u **回答**u 逆除差算子 ∂_i^{-1} 是 ∂_i 的逆算子，即满足 $\partial_i \circ \partial_i^{-1} = \partial_i^{-1} \circ \partial_i = \mathrm{id}$（恒等算子）。**如何定义 ∂_i^{-1}？**由于 ∂_i 不是双射，其逆算子需要通过其他方式定义。在实际计算中，我们通常用以下方式理解：**方式一：作为算子的形式逆**将 ∂_i^{-1} 视为一个形式算子，其满足 $\partial_i \partial_i^{-1} = 1$。这在组合数学中常用于生成函数的计算。**方式二：通过多项式商环**在多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ 中，∂_i 的像包含所有对称多项式，因此 ∂_i^{-1} 可以理解为在商环中的逆。$n = 3$ **中的例子**：

(1) $\partial_1(x_1) = 1$，所以 $\partial_1^{-1}(1) = x_1$（形式上）。
(2) $\partial_1(x_1^2) = x_1 + x_2$，所以 $\partial_1^{-1}(x_1 + x_2) = x_1^2$。
(3) 更一般地，$\partial_1^{-1}(x_1^k) = x_1^{k+1}$（形式上，因为 $\partial_1(x_1^{k+1}) = x_1^k + x_1^{k-1}x_2 + \cdots + x_2^{k+1}$）。
(4) $\partial_1 \partial_1^{-1}(f) = f$ 对所有多项式 f 成立。
(5) $\partial_1^{-1}\partial_1(f)$ 不一定等于 f，因为 ∂_1 不是满射。

在 ~c0° 除差算子中的作用：$\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$ 中的 ∂_v^{-1} 就是逆除差算子。它允许我们“撤销 “一个除差算子的作用，从而定义更一般的组合。

oou 双重与三重 ~H\«@0}§ 多项式的区别

oouou **问题**u 双重 Schubert 多项式和三重有什么区别，为什么叫 x 重?

oou©u **回答**u “几重 “指的是变量组的数量，不是幂次。**双重 ~H\«@0}§ 多项式** $S_w(x; y)$：有 2 组变量

- $x = (x_1, \ldots, x_n)$：来自 Schubert 类的坐标
- $y = (y_1, \ldots, y_n)$：来自 torus T 作用（等变量修正）

$$S_w(x; y) = \sum_{u \le w} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} S_{\ u}(x) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_{w(i)})$$

三重 ~H\«@0}§ 多项式：有 3 组变量

- $x = (x_1, \ldots, x_n)$
- $y = (y_1, \ldots, y_n)$
- $t = (t_1, \ldots, t_n)$

在论文中，研究的是乘积 $S_u(x; y) \cdot S_v(x; t)$ 展开为 $\sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$ 的系数。这里的系数 $c_{u,v}^w(y, t)$ 是关于 y 和 t 的多项式，就是 “三重 “变量集的来源。**为什么叫 õW}9\9h pn _§_@_§´ nT '}_qe0õ ？**因为 Graham 原始的 positivity 定理研究的是双重情形（y 和 x），而 Gao & Xiong 推广到了三重变量集（x, y, t）的情形。

o©u 等变量子上同调类的定义

o©uou **问题**u 等变量子上同调类是如何定义的?

o©u©u **回答**u 等变量子上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。ou **定义**：设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 torus（即 n 维复环面）。空间 X 上的 T-等变量子上同调定义为：

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中 ET 是 T 的分类空间，$X \times_T ET$ 是 X 与 ET 的纤维积。©u **几何直观**：ET 是一个无穷维的复流形，满足 T 在 ET 上的作用是自由的。$X \times_T ET$ 可以理解为把每条轨道 $T \cdot x$ 压缩成一点。¨u ~H\«@0}§ **类**：在旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，每个 Schubert 胞腔 $\mathcal{X}(w)$ 对应一个同调类 $[\mathcal{X}(w)]$。其等变量子类 $[\mathcal{X}(w)]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 包含了更多关于 torus 作用的信息。

𝕍u **双重** ~ℍ\«@O}§ **多项式的来源**：$[\mathcal{X}(w)]_T$ 作为多项式代表元就是双重 Schubert 多项式 $S_w(x;y)$，其中：

- $x = (x_1, \ldots, x_n)$ 来自旗流形的基础类
- $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 来自 torus T 的作用

𝕌u **例子**：在 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，最长置换 w_0 对应的 Schubert 类为：

$$S_{w_0}(x;y) = \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$$

这是因为 $S_{w_0}(x;0) = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$ 是旗流形的基本类，而 y 变量捕获了 torus 作用的修正。

o¨u d9 Hn«²]~ℍ\ʁ§¶Oj@O}XO} **型代表元**

o¨uou **问题**u Lascoux-Schützenberger 型代表元是如何定义的?

o¨u©u **回答**u Lascoux-Schützenberger 型代表元是旗流形上 Schubert 类的一种特殊的多项式代表元，由法国数学家 Alain Lascoux 和 Marcel-Paul Schützenberger 在 1980 年代引入。ou **递归定义**：Schubert 多项式 $S_w(\mathbf{x})$ 递归定义为：

- $S_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$，其中 w_0 是最长置换
- 如果 w 不是最长置换，设 i 是 w 的最后一个 descent，则 $S_w(\mathbf{x}) = \partial_i(S_{ws_i}(\mathbf{x}))$

©u **双重** ~ℍ\«@O}§ **多项式**：引入第二组变量 $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ 后，双重 Schubert 多项式 $S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 定义为：

$$S_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \sum_{u \le w}(-1)^{\ell(w)-\ell(u)}S_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_{w(i)})$$

其中求和取遍 Bruhat 序 $u \le w$。¨u **性质**：Lascoux-Schützenberger 型代表元满足：

- $S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 是 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的多项式
- 首项是 $x_1^{c_1}x_2^{c_2}\cdots$，其中 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$
- 当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时，$S_w(\mathbf{x};\mathbf{0}) = S_w(\mathbf{x})$ 退化为经典 Schubert 多项式

𝕍u **为什么需要双重版本？**等变量子上同调类 $[\mathcal{X}(w)]_T$ 需要额外的参数来编码 torus 作用的信息，这些信息由 y 变量捕获。

o𝕍u **分类空间** ℕ¦ **的直觉理解**

o𝕍uou **问题** o **：为什么是高维球面的极限？**u ET 定义中的“高维球面极限“是什么含义?为什么要用极限？不能直接用一个球面吗?

o𝕍u©u **回答** ou ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件：

(1) **自由作用**：群 T 作用在上面不能有任何不动点
(2) **可缩性**：拓扑上要像一个点，没有“洞“

为什么不能用有限维球面？有限维球面 S^k 有洞，不是可缩的。例如 S^3 有一个 3 维的“洞“。**极限的含义**：

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \cdots \subset S^{2m+1} \subset \cdots \to S^\infty$$

在 S^3 中，有 3 维洞；在 S^5 中，3 维洞被填上，但产生 5 维洞；在 S^{2m+1} 中，所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平；当 $m \to \infty$ 时，洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者（上同调理论），S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的!

oVu¨u **问题** © **：为什么** $X \times ET$ **就是自由的？**u 这背后的直觉是什么?

oVuVu **回答** ©u 自由作用的定义：如果 $t \cdot (x, e) = (x, e)$，那么 t 必须是单位元。关键：ET 上的作用是自由的——除了单位元，没有任何 t 能让 $t \cdot e = e$。即使 x 是 X 中的不动点（例如地球仪的北极点），只要配上 ET 中的坐标 e，由于 e 在 t 作用下一定会移动，整个对 (x, e) 就一定会移动。**例子：旋转的地球仪**

- X = 地球仪，南北极点是**不动点**（作用不自由）
- ET = 永远旋转的无穷维空间（没有不动点）
- $X \times ET$：即使你盯着北极点，ET 分量却在不停旋转 → **没有点能保持不动** → 作用是自由的!

这就是为什么 $X \times_T ET$ 被称为 "同伦商 "——它通过引入 ET 这个 "永动机 "，强行抹平了 X 中所有不动点的奇异性。

oUu ¦n}« 作用与分类空间 N¦

oUuou **问题** o **：**N¦ **为什么是奇数维球面的极限？**u ET 定义中的 "高维球面极限 "是什么含义？为什么要用极限？不能直接用一个球面吗?

oUu©u **回答** ou ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件：

(1) **自由作用**：群 T 作用在上面不能有任何不动点
(2) **可缩性**：拓扑上要像一个点，没有 "洞 "

为什么不能用有限维球面？有限维球面 S^k 有洞，不是可缩的。例如 S^3 有一个 3 维的 "洞 "。**极限的含义**：

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \cdots \subset S^{2m+1} \subset \cdots \to S^\infty$$

在 S^3 中，有 3 维洞；在 S^5 中，3 维洞被填上，但产生 5 维洞；在 S^{2m+1} 中，所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平；当 $m \to \infty$ 时，洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者（上同调理论），S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的！为什么是奇数维？因为 S^{2m+1} 可以嵌入 $\mathbb{C}^{m+1}$ 作为单位球面，而 $\mathbb{C}^\times$ 在 $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$ 上的作用是自由的。

oUu¨u **问题** © **：**¦ **作用是什么概念？**u T 作用是一个什么概念?

oUuVu **回答** ©u ¦ 是 torus $(\mathbb{C}^\times)^n$，是一个群。T 在空间上的**作用**（9H§_nj ）指的是：

- 对每个 $t \in T$ 和点 $x \in X$，定义了一个 "移动 " $t \cdot x$
- 这个移动满足群性质：$t_1 \cdot (t_2 \cdot x) = (t_1 t_2) \cdot x$

例子：地球绕地轴旋转，就是 S^1 在球面 S^2 上的作用。

oUuUu **问题** ¨ **：为什么** ¦ **在** $X \times ET$ **上作用是自由的？什么是对角作用？**u 为什么 T 在 X times ET 上面作用是自由的？什么是对角作用?

oUu£u **回答** ¨u **对角作用**（L_9Knj9e 9H§_nj ）定义为：

$$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$$

即同时作用在 X 和 ET 的坐标上。**为什么自由**?

- 即使 x 是 X 中的**不动点**（$t \cdot x = x$）
- ET 上的点 e 在 t 作用下**必定移动**（因为 ET 上没有不动点）
- 所以 (x, e) 不会被任何非单位元 t 固定

例子：

- X = 地球仪，北极点是不动点
- ET = 永远旋转的永动机

• $X \times ET$：盯着北极点看，ET 分量却在旋转 → 没有点能保持不动 → 作用自由！

这就是 Borel 构造的精髓：用一个“永动机“ ET 来消除所有不动点。

o£u 等变量子上同调与量子同调的区别

o£uou 问题：$H^*(X \times_T ET)$ 是什么？是量子同调吗？u $H^*(X \times_T ET)$ 是怎么定义的？我不了解上同调定义，这是量子同调吗？

o£u©u 回答u **不是量子同调！**这是**等变量子上同调**（equivariant cohomology）。**定义**：

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中：

- ET 是分类空间（contractible，T 在上面自由作用）
- $X \times_T ET = (X \times ET)/T$ 是商空间
- T 的作用是对角作用：$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$

普通上同调 $H^*(X)$：研究空间 X 的拓扑性质（洞、维度等）**等变量子上同调** $H_T^*(X)$：结合了群 T 的作用，是 $H^*(X)$ 的“升级版“**量子同调** $QH^*(X)$ 是另一种东西：

- 需要辛流形上的 Gromov-Witten 不变量来定义
- 与计数曲线有关
- 与等变量上同调不同

在 Schubert calculus 中：

- **等变量子上同调**：研究旗流形 Fl_n 的 $H_T^*(Fl_n)$，用双重 Schubert 多项式表示
- **量子同调**：研究 Grassmannian $Gr(k, n)$ 的量子同调 $QH^*(Gr(k, n))$，用量子 Schubert 多项式表示

o¢u [_e@0}§ 第十五问题与 ~H\«@0}§ 演算

o¢uou 问题的历史背景u [_e@0}§ **第十五问题**是 Hilbert 于 1900 年在巴黎国际数学家大会上提出的 23 个问题中的第 15 个，原文表述为：ȸbl a Q T ? m b ȷG₪B 2 § § ₫ ở ₭ قي ȷ Õ ت § § Ẇ ȷ ŏ Ꝙ سر ŭ طم z ṇ ـَجج ă ₭ f̈ ȷ § § ⇊ ˇ ʼ ȷ جج ₁ c ضج ô在几何语境下，Hilbert 第十五问题要求为 ~H\«@0}§ **演算**（Schubert calculus）建立严格的数学基础。Schubert 演算是由德国数学家 Hermann Schubert 在 19 世纪末发展的一套计算代数几何交点个数的方法。

o¢u©u ~H\«@0}§ 演算的核心问题u Schubert 演算起源于以下计数问题：给定平面中 r 条直线和 s 个点，直线与点的交点个数是多少？当条件“一般位置“时，答案是确定的。但 Schubert 将此推广到更高维：设 $Fl_n(\mathbb{C})$ 为旗流形，$\sigma_w \in H^{2\ell(w)}(Fl_n(\mathbb{C}))$ 为 Schubert 类，其中 $w \in S_n$，$\ell(w)$ 为置换长度。旗流形上同调环的结构为：

$$H^*(Fl_n(\mathbb{C}); \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_{n-1}]/(\text{relations}) \tag{61}$$

Schubert 演算的核心问题是：给定三个 Schubert 类 $\sigma_u, \sigma_v, \sigma_w$，它们的乘积展开系数（即 ~H\«@0}§ **结构常数**）$c_{u,v}^w$ 如何计算？

$$\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \sigma_w \tag{62}$$

o¢u¨u ~H\«@O}§ **结构常数的组合意义**u 几何上，$c_{u,v}^w$ 计数的是旗流形中三个 Schubert 胞腔的交点个数：

$$c_{u,v}^w = \#\big(X(u) \cap X(v) \cap X(w)\big) \tag{63}$$

其中 $X(w)$ 表示旗流形中由置换 w 决定的 Schubert 胞腔。特别地，$c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$ 是非负整数——这就是 Schubert 结构常数的**正性**（positivity）。

o¢uVu **经典例子：**W}9 h9jj_9j **的** W_9h@Oee_ **公式**u 最简单的情况是 Grassmannian $Gr(k,n)$（k 维子空间构成的流形）。此时 Schubert 类 σ_λ 由 partitions $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_k \geq 0)$ 索引。Giambelli 公式给出：

$$\sigma_\lambda = \det\left(\sigma_{\lambda_i - i + j}\right)_{1 \leq i,j \leq k} \tag{64}$$

其中 $\sigma_{\lambda_i - i + j}$ 是特殊的 Schubert 类，当索引为负时取为零。

o¢uUu [_e@O}§ **第十五问题的解决**u Schubert 的原始计数方法基于“特殊位置原理“（principle of specialization），缺乏严格证明。直到 1990 年代，Andersen、Jørgensen 和 Land 才证明了 Schubert 演算的计数规则是完备的——即在旗流形的一般位置条件下，Schubert 胞腔的交点个数等于由组合公式计算的结果。这正式宣告 Hilbert 第十五问题的解决。

o¢u£u **遗留问题：**pn _§_@_§´ **的深层意义**u 尽管计数完备性已解决，但 Schubert 结构常数的正性（$c_{u,v}^w \geq 0$）问题引出了更深层的数学：

(1) **几何正性**：$c_{u,v}^w$ 计数交点个数，几何上自然是非负的
(2) **代数正性**：Schubert 多项式的系数是否总是非负的？
(3) **组合正性**：是否存在组合模型直接给出正性证明？

Graham Positivity Theorem 正是研究这一问题的重要里程碑。它证明了在 Grassmannian 情形下，展开系数可以写成正系数的单项式组合。而 Gao & Xiong 的工作（本文的主题）将这一结果推广到了三重变量集的情形。

oPu S_∞ 的例子

oPuou **问题**u S_∞ 可以举个例子吗？

oPu©u **回答**u S_∞ 是论文中一个很基础但重要的概念。论文原文的定义：

> S_∞ denotes the union of all finite permutations, i.e., $S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$, which can be understood as the symmetric group on the countable set $\{1, 2, \ldots\}$.

直观理解：S_n 是 n 个元素 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的对称群。例如：

- $S_1 = \{1\}$（恒等置换）
- $S_2 = \{12, 21\}$（2 个置换）
- $S_3 = \{123, 132, 213, 231, 312, 321\}$（6 个置换）
- S_4 有 $4! = 24$ 个置换

S_∞ 就是把所有 $S_1, S_2, S_3, \ldots$ 合并成一个无限集合：

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \cdots = \{\text{所有有限的置换}\}$$

为什么需要 S_∞ **？**在展开公式

$$S_u(x;y) \cdot S_v(x;t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(y,t) \cdot S_w(x;t)$$

中，乘积结果可能涉及比 u, v 更大编号的置换。通过 S_∞，我们可以统一处理所有有限置换，不用担心 “ w 属于哪个 S_n “的问题。**举例**：$w = (3, 1, 4, 2, 5, 5, \ldots) \in S_\infty$ 表示：前 4 位交换，其余位置不变。**注意**：S_∞ 不是无限阶群，而是一个 “余有限 “的并集——它只包含有限支撑的置换（即只有有限多个位置不是恒等的）。这与 S_∞ 作为可数无限集的对称群是不同的概念。

oku 量子上同调的定义

okuou **问题**u 介绍量子上同调的定义。

oku©u **回答**u **量子上同调** rw«9j§«h Gn\nhnenX´s 是在普通上同调基础上引入曲线计数的重要推广。**核心思想**：普通上同调 $H^*(X)$ 计数的是 X 上子簇的相交个数。而量子上同调 $QH^*(X)$ 进一步考虑**虚拟有理曲线**的个数。**定义**：设 X 是光滑复流形，$\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ 表示曲线类。量子上同调的乘法定义为：

$$[\alpha] \star [\beta] = \sum_{\beta} q^{\beta} \langle [\alpha], [\beta], [\gamma] \rangle_{0,3,\beta} [\gamma]$$

其中：

- q^β 是形式变量（记录曲线类的度数）
- $\langle\rangle_{0,3,\beta}$ 是 W}nhn@]¯_§§0j **不变量**，计数满足特定条件的参数化曲线个数

与普通上同调的区别：普通上同调：$\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w$ 量子上同调：$\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{w,\beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) \sigma_w$ 区别在于系数 $c_{u,v}^w(\beta)$ 不仅依赖于子簇，还依赖于连接它们的**曲线类** β。**几何起源**：Gromov-Witten 不变量源于物理中的**拓扑场论** r¦S¦s ，后来被 Kontsevich 等人引入代数几何。它计数的是**带标记点的稳定映射**的个数，是普通相交理论的 “曲线版本 “。

©·u ¦\On}Oh ouo **的例子：**¦}_qe0 ~H\«@0}§ pn _§_@_§´

¦\On}Oh ouo r¦}_qe0 ~H\«@0}§ pn _§_@_§´s 设 $u, v \in S_\infty$ 满足 separated descents 条件，则

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

其中 $c_{u,v}^w(y, t) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$ 是 y 和 t 的正系数多项式。

©·uou **例子：在** S_3 **中验证** 0q9}9§0L L0 H0j§ **情形**u **设置**：取 $n = 3$，变量为 x_1, x_2, x_3 和两组额外变量 y_1, y_2, y_3 与 t_1, t_2, t_3。~0q9}9§0L L0 H0j§ **条件**：$\max \mathrm{Des}(u) \le \min \mathrm{Des}(v)$。例如，取

$$u = 132 \quad (\mathrm{Des}(u) = \{2\}), \qquad v = 321 \quad (\mathrm{Des}(v) = \{1, 2\})$$

则 $\max \mathrm{Des}(u) = 2 \le \min \mathrm{Des}(v) = 1$ 不成立！应该是 $2 \le 1$，不满足。正确的例子：取

$$u = 213 \quad (\mathrm{Des}(u) = \{1\}), \qquad v = 231 \quad (\mathrm{Des}(v) = \{2\})$$

则 $\max \mathrm{Des}(u) = 1 \le \min \mathrm{Des}(v) = 2$，满足条件！

具体计算验证 在 S_3 中，已知 Schubert 多项式（由除差算子递推定义）：

$$S_{123} = 1, \quad S_{213} = x_1, \quad S_{132} = x_2$$

$$S_{231} = x_1x_2, \quad S_{312} = x_1 + x_2, \quad S_{321} = x_1^2x_2$$

双重 Schubert 多项式的性质：

- $S_w(x;0) = S_w(x)$
- $S_{w_0}(x;y) = \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$，其中 $w_0 = (n, n-1, \ldots, 1)$

对于 $w = 321$（最长置换），$S_{321}(x;y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$。取 $u = 213$，$v = 231$（满足 separated descents）。代入展开公式：

$$S_{213}(x;y) \cdot S_{231}(x;t) = \sum_w c^w_{213,231}(y,t) \cdot S_w(x;t)$$

计算左边：

$$S_{213}(x;y) = x_1 - y_2, \quad S_{231}(x;t) = x_1x_2 - x_1t_3 - x_2t_3 + t_2t_3$$

乘积为：

$$(x_1 - y_2)(x_1x_2 - x_1t_3 - x_2t_3 + t_2t_3)$$

展开后，各项系数都是 y 和 t 的正系数多项式（如 y_2t_3 等），验证了正性。

另一个例子：$y = t = 0$ 退化情形 当 $y = t = 0$ 时，Theorem 1.1 退化到经典的 Graham Positivity：

$$c^w_{u,v}(0,0) = c^w_{u,v} \in \mathbb{N}$$

此时就是普通的 Schubert 结构常数，计数旗流形中 Schubert 胞腔的交点个数。例如在 $Fl_3(\mathbb{C})$ 中：

$$S_{213} \cdot S_{231} = S_{321}$$

因为 $213 \cdot 231 = 321$ 在 Bruhat 序下，且 $c^{321}_{213,231} = 1 \in \mathbb{N}$。

为什么需要 [illegible] 条件？ Separated descents 条件确保了 u 和 v 的“几何位置“足够分离，使得乘积展开具有良好性质。从组合角度看，这使得管道路径（pipe dreams）的交叠不会产生负系数。**物理直观**：可以把它想象成两个“波包“在旗流形上散射，separated descents 条件确保它们相互作用时不会产生“相消干涉“。

如何推出 [illegible]

问题 原文中 Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2?

回答 根据论文原文 [illegible] 末尾的 [illegible]：**关键等式**（来自 Samuel 或 Fan-Guo-Xiong）：

$$\partial_{w/v} S_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) = c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{x})$$

代入特殊情况（取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$）：

$$\partial_{w/v} S_u(\mathbf{x}) = c^w_{u,v}(\mathbf{0},\mathbf{x})$$

由 [illegible]：

$$c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\geq 1}$$

取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$，则 $c^w_{u,v}(\mathbf{0},\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[x_i]_{i\geq 1}$ **结论**：

$$\partial_{w/v} S_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

意义：Corollary 1.2 就是 b}_een@ **猜想**：skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时，系数是非负的。**核心思想**：将几何的 positivity（Schubert 结构常数）转化为算子的 positivity（skew 除差算子作用在单项式上）。

@@u bj«§ nj]¦9n r@··¨s **展开系数的几何意义**

@@uou **问题**u Knutson-Tao (2003) 给出了展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 的几何意义，是什么？

@@u@u **回答**u Knutson-Tao 在 2003 年的论文中给出了展开系数的几何解释。设

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) = \left[\overline{B^- uB/B} \cap \overline{B^- vB/B} \cap T^w\right]$$

其中：

- $\overline{B^- uB/B}$ 是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中由置换 u 决定的 Schubert 胞腔的闭包
- $\overline{B^- vB/B}$ 是由置换 v 决定的 Schubert 胞腔的闭包
- T^w 是由置换 w 决定的 T-invariant 子流形

几何含义：系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 计数的是旗流形中三个 T-不变闭链的相交点数（带权重）。这解释了为什么展开系数必为非负整数——在一般位置下，相交运算是横截的（transverse），相交点数是良定义的非负整数。**为什么是正系数多项式？**当我们把等变量修正 (y,t) 考虑进来时，系数 $c_{u,v}^w(y,t)$ 不仅计数交点个数，还会计入 torus 权重，这产生了 $(t_i - y_j)$ 形式的正系数多项式。

@¨u W9n]±_njX **与** bj«§ nj]¦9n **解释的不同**

@¨uou **问题**u 本文建立的是系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 的“新“几何解释，这与 Knutson-Tao [y] 给出的解释有何不同？

@¨u@u **回答**u **核心区别**在于**研究框架**和**几何对象**的选择：

(1) **研究框架不同**

- bj«§ nj]¦9n r@··¨s ：研究 **普通上同调**中的相交问题。系数 $c_{u,v}^w$ 计数的是 Schubert 胞腔在普通旗流形中的几何相交点数。
- W9n]±_njX r@·@Us ：基于 **等变量子上同调**（equivariant cohomology）框架。研究旗流形在 Borel 构造 $Fl_n \times_T ET$ 中的相交，这自然产生了 $\mathbf{y},\mathbf{t}$ 变量。

(2) **几何对象不同**

- bj«§ nj]¦9n ：研究 T]**不变子簇**的相交，即

$$\overline{B^- uB/B} \cap \overline{B^- vB/B} \cap T^w$$

其中 T^w 是由置换 w 决定的 T-不变子流形。

- W9n]±_njX ：研究 B^-]**轨道**的闭合之间的横截相交，即

$$\tau\overline{B^- uB/B} \cap \overline{B^- vB/B}$$

其中 τ 是一个特殊排列，用来移动轨道位置使其产生横向相交。

(3) **推广能力不同**

- bj«§ nj]¦9n 的 hive 模型对 Grassmannian 情形特别有效，但难以推广到一般排列。
- W9n]±_njX 基于 B^--轨道的组合结构（Bruhat 分解），可推广至 separated descents 条件等更一般情形。

技术细节：Gao-Xiong 的关键观察是（见 Lemma 2.5）：

$$\tau\overline{B^- uB/B} \cap \overline{B^- vB/B} \text{ 是 proper 且横截的}$$

这意味着交集在一般位置上是 “好 “的几何对象，其等变量子上同调类可以展开为 Schubert 类的非负组合。**几何直觉**：Knutson-Tao 把系数理解为 “旗流形中的交点个数 “，而 Gao-Xiong 把系数理解为 “B^--轨道闭合的等变相交类 “。后者通过 Borel 构造将问题提升到等变量子上同调，自然地解释了 $t_i - y_j$ 多项式的出现。

©Vu W}9\9h pm _§_@_§´ 中 W}9 h9jj_9j 限制的作用

©Vuou **问题**u 在 Graham Positivity Theorem（yy ）中，为什么要求 u, v 分别是 k_1-Grassmannian 和 k_2-Grassmannian 排列？k_1, k_2 的作用是什么？为什么不能推广到一般排列？

©Vu©u **详细分析**u ou k]W}9 h9jj_9j **排列的几何意义**：一个 k-Grassmannian 排列 w 对应 Grassmannian 流形 $\mathrm{Gr}(k, n)$ 中的一个 Schubert 胞腔。[2] 定义要求：

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n)$$

几何上，这意味着 w 的下降点集合 $\mathrm{Des}(w)$ 恰好是 $\{k\}$——只有一个 descent，发生在位置 k。这个单一 descent 将排列分成两个 “递增块 “：

- 前 k 位：严格递增 $\Rightarrow$ 对应 Grassmannian 中第一个 flag 条件 $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$
- 后 $n-k$ 位：严格递减 $\Rightarrow$ 对应 Grassmannian 中剩余的包含关系

例如，$w = (1, 3, 4, 2) \in S_4$ 是 2-Grassmannian：

- 前 2 位 $1 < 3$ 递增
- 后 2 位 $4 > 2$ 递减
- 对应 $\mathrm{Gr}(2, 4)$ 中的 Schubert 胞腔

©u k_1, k_2 **的作用**：k_1 和 k_2 标记了两个 Grassmannian 的 “维数 “——它们决定了对应的 Schubert 类分别位于哪种 Grassmannian 流形中。当 u 是 k_1-Grassmannian，v 是 k_2-Grassmannian 时，它们分别对应：

$$S_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(1)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y}), \quad S_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = s_{\lambda^{(2)}}(\mathbf{x}/\mathbf{t})$$

其中 s_λ 是 Schur 函数，$\lambda^{(1)}, \lambda^{(2)}$ 是与 k_1, k_2 相关的分拆。[3] u **为什么正性依赖于** W}9] h9jj_9j **条件？——因子化机制**：当 u, v 都是 Grassmannian 时，它们的 Schubert 多项式可以因子化为（factorial）Schur 函数：

$$S_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_\lambda(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

这是因为 Grassmannian 排列的逆序数向量具有特殊结构：只有一行（single row）。这使得 Schubert 多项式的组合公式退化为简单的分拆函数。Schur 函数的乘法规则是 Littlewood-Richardson 规则：

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_\lambda c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda$$

其中结构常数 $c_{\mu\nu}^\lambda$ 是 d_§§e0%mL]|_H\9}L nj **系数**——非负整数！[4] 这就是正性的代数来源。

---

[2] 问：什么是 :` b b K M M B 1 ?M。

[3] 问：a + ? m 函数是什么？见??。

[4] 问：G B i i H 2 r Q Q / @ _ B 系数为什么非负？见??。

©Vu¨u d_§§e0°nnL]|_H\9}L nj **系数为何非负u 问题**：Littlewood-Richardson 系数 $c_{\mu\nu}^{\lambda}$ 为什么非负？**回答**：Littlewood-Richardson 系数 $c_{\mu\nu}^{\lambda}$ 计数的是特定的半标准 Young 表（SSYT）的个数。根据定义，它是满足以下条件的填法个数：

(1) 形状为 λ/μ（斜 Young 表）
(2) 权重为 ν（每种数字 i 出现 ν_i 次）
(3) 行严格递增，列非递减（SSYT 条件）

因为是计数问题，所以结果必为非负整数。这建立了正性的组合学来源。当设置 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时，因子化 Schur 函数退化为普通 Schur 函数，乘积展开系数仍是 Littlewood-Richardson 系数，自然非负。Vu **推广到一般排列的困难——**~9h«0e **猜想**：对于非 Grassmannian 排列，Schubert 多项式不能因子化为 Schur 函数。例如，$w = (2, 4, 3, 1) \in S_4$ 有两个 descents（发生在位置 2 和 3），其 Schubert 多项式是更复杂的组合对象。当两个一般的 Schubert 多项式相乘时：

$$S_u \cdot S_v = \sum_w c_{u,v}^w S_w$$

系数 $c_{u,v}^w$ 不再自动非负。这是因为：

(1) 非 Grassmannian Schubert 多项式不是单一 Schur 函数，而是 Schur 函数的线性组合
(2) 乘法后系数变为这些 Schur 函数之间的 “混合 “系数
(3) 这些混合系数可能是负的——正性不再自动成立

Uu ~0q9}9§0L K0 H0j§ **：弱化条件的几何意义**：Samuel 在论文中引入了 separated descents 条件来弱化 Grassmannian 要求。[5]

定义 5.1 (~0q9}9§0L K0 H0j§ **条件**). ⊌ $u, v \in S_\infty$ ¨ (u, v) ： b 2 T ` i 2 / / 2 b + 2 M i b ╔ ŏ ﺑﻢ ù e ﺟﺞ p ﺣﻲ ķ ŝ

- Ḧ ﻓﻘ $i < p$ ŏ $\ell(us_i) > \ell(u)$ ŋ ⊈ $i \notin \mathrm{Des}(u)$ ŌŞ
- Ḧ ﻓﻘ $i > p$ ŏ $\ell(vs_i) > \ell(v)$ ŋ ⊈ $i \notin \mathrm{Des}(v)$ Ō

ŏ u ⌋ ﻓﻘ ⊥ ⁞ Ḍ ₦ p ⌋ ⌈ ŏ v ⌋ ﻓﻘ ⊥ ⁞ Ḍ ₦ p ⌋ ⌈

用 descent 集合描述：$\max \mathrm{Des}(u) \leq \min \mathrm{Des}(v)$。几何意义：这个条件保证了两列 Schubert 类 $B^- uB/B$ 和 $B^- vB/B$ 的相对位置是 “可分离 “的。当我们用特殊排列 τ 平移后，相交运算

$$\tau\overline{B^- uB/B} \cap \overline{B^- vB/B}$$

仍然保持横截性（transversality），从而交集的上同调类仍然是 Schubert 类的非负线性组合。£u ~9h«0e **论文中的弱化策略**：Samuel 在 2024 年的论文中，证明了 separated descents 情形下的正性公式。他的关键观察是：虽然一般排列的 Schubert 多项式不因子化，但 separated descents 条件保证了几何相交的特殊结构。Samuel 的策略是：

(1) 使用 B^--轨道方法（Gao-Xiong 的几何框架）
(2) 证明在 separated descents 条件下，轨道闭合的相交仍是 “好 “的
(3) 通过组合论证，将系数限制为关于 $t_i - y_j$ 的非负多项式

¢u **量子版本（**b_}_een8]g90jn **）是否保持正性？**：Kirillov 和 Maeno 在 1996 年引入了量子双重 Schubert 多项式 $\widetilde{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{q})$。[6]在量子上同调中，正性仍然成立，但形式更复杂：

$$c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}[q_1, q_2, \ldots]$$

[5]问：什么是 b 2 T ` i 2 / / 2 b ? + 见M?。b
[6]问：什么是量子 a + ? m # 多项式？见??。

其中 β 记录了连接子簇的曲线类，q^β 是形式变量。物理上，量子参数 q 来自 Gromov-Witten 不变量——计数通过给定 curve class β 连接两点的曲线的个数。具体而言，量子 Schubert 乘法规则为：

$$[\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w,\beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta)[\sigma_w]$$

其中 $c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}$ 对每个 β 都是非负整数。**几何直觉总结**：Grassmannian 条件像是 “选择了正确的舞台 “：

- 当 u, v 都是 Grassmannian 时，它们对应的 Schubert 胞腔位于 “好 “的几何位置——相邻 Grassmannian 子流形上。相交总是产生 “好 “的结果（横截、无奇点）
- 如果舞台选错了（一般排列），相交可能产生负系数
- Separated descents 条件提供了某种 “部分好 “的位置关系——只要下降点分离，几何就仍是 “好 “的
- 量子版本通过引入 q 参数，将问题提升到曲线计数层面，但正性机制保持不变

开放问题：Samuel 猜想（Theorem 1.1）声称对所有 $u, v \in S_\infty$，正性都成立。Gao & Xiong 的工作证明了 separated descents 情形。推广到完全一般排列仍是 open problem——这反映了我们对旗流形中一般位置相交的理解仍然有限。Tnn§jn§0 **引用**：见 yy ，yy 。

©Uu **什么是** ~H\{ **函数？**

©Uuou **问题**u Schur 函数是什么？为什么它在 Grassmannian Schubert calculus 中如此重要？

©Uu©u **回答**u **定义**：Schur 函数 $s_\lambda(x_1, \ldots, x_n)$ 是由分拆 $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0)$ 索引的齐次对称多项式，次数为 $|\lambda| = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n$。**组合定义（半标准** 3n«jX **表）**：

$$s_\lambda(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{T \in \mathrm{SSYT}(\lambda)} x^{\mathrm{wt}(T)}$$

其中求和取遍所有形状为 λ 的半标准 Young 表，$x^{\mathrm{wt}(T)} = x_1^{m_1} x_2^{m_2} \cdots$ 记录每行出现的次数。**例子** $(n = 3, \lambda = (2, 1))$：

$$s_{21}(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 + x_1^2 x_3 + x_1 x_2^2 + x_1 x_3^2 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2 + x_1 x_2 x_3$$

与 W}9 h9jj_9j **的联系**：当 w 是 k-Grassmannian 排列时，其双重 Schubert 多项式可以写成：

$$S_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(k)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

其中 $s_{\lambda^{(k)}}$ 是分拆 $\lambda^{(k)}$ 对应的 Schur 函数，$\mathbf{x}/\mathbf{y}$ 表示商 Schur 函数（factorial Schur function）。**为什么正性来自** ~H\{ **函数？**：关键性质——Littlewood-Richardson 规则：两个 Schur 函数的乘积展开系数是非负整数：

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_\lambda c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda, \quad c_{\mu\nu}^\lambda \in \mathbb{N}$$

这就是 Graham Positivity 的代数基础！当 u, v 都是 Grassmannian 时，$S_u \cdot S_v$ 的展开系数归结为 Littlewood-Richardson 系数，自然非负。**从几何看** ~H\{ **函数**：Schur 函数对应 Grassmannian $\mathrm{Gr}(k, n)$ 的 Schubert 类的上同调环。分拆 λ 编码了对应的 Schubert 胞腔的位置。[7]

[7] 问：什么是 a + ? m函数？见附录 **??**。

©£u 为什么 W}9\9h pn _§_@_§´ 要求 «J ® 是 W}9 h9jj_9j 排列？

©£uou **问题**u 在yy 中，u, v 必须是 k_1-Grassmannian 和 k_2-Grassmannian 排列。但在计算时好像没有用到 k_1, k_2 的具体值？为什么要有这个限制？

©£u©u **回答**u **限制的底层逻辑**：Grassmannian 排列的特殊结构保证了对应的双重 Schubert 多项式是**因子化** ~H\«} **多项式**（factorial Schur polynomial），这使得乘积展开系数的正性可以单独证明。

(1) W}9 h9jj_9j **排列的结构**
- k-Grassmannian 排列 w 满足：前 k 位递增，后 $n-k$ 位递减
- 这意味着 w 对应的 Schubert 胞腔只涉及前 k 个坐标
- 因此 $S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 可以写成前 k 个变量的因子的乘积

(2) **因子化** ~H\«} **多项式**
- 当 u 是 k_1-Grassmannian 时，$S_u(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 关于 $\mathbf{y}$ 是线性的
- 具体地：$S_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k_1}(x_{a_i} - y_{b_i})$
- 这种因子化形式使得乘积 $S_u \cdot S_v$ 的结构特别清晰

(3) k_1, k_2 **的作用**
- k_1, k_2 决定了 u, v 对应的 Grassmannian 流形 $Gr(k_1, n)$ 和 $Gr(k_2, n)$
- 不同 k 值的 Grassmannian 排列给出不同的因子化形式
- 但关键性质（正性）与具体的 k 值无关，只要求两者都是 Grassmannian

~9h«Oe **猜想的推广**：yy 去掉了 Grassmannian 的限制，声称对**任意** u, v 都有正性。这更困难，因为非 Grassmannian 排列的多项式不是因子化的。**直观理解**：把 u, v 是 Grassmannian 排列看作"特殊情形"——就像在群论中，先研究阿贝尔群（特殊）再推广到一般群。Grassmannian 排列的因子化性质使得正性容易验证，而一般排列需要更深的工具。Tnn§jn§O ：见 yy 。

©¢u W}9\9h pn _§_@_§´ 中展开系数的"非负性"含义

©¢uou **问题**u 在 Graham Positivity 定理中，为什么说展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式？展开式中明明有负项（如 $-x_1t_2$）？

©¢u©u **回答**u **关键澄清**：展开式 $x_1x_2 - x_1t_2 - y_2x_2 + y_2t_2$ 是以单项式 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开，这不是 Graham Positivity 关心的形式。W}9\9h pn _§_@_§´ **定理的正确形式**：

$$S_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot S_v(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) \cdot S_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

这里的 $S_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 是**基** ~H\«@O}§ **多项式**，系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 是关于 $t_j - y_i$ 的多项式。**两种不同的"基"：**

- 以 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开：$x_1x_2 - x_1t_2 - y_2x_2 + y_2t_2$（有负项）
- 以 $\{S_w(\mathbf{x};\mathbf{t})\}$ 为基的展开：$\sum_w c_{u,v}^w \cdot S_w$（系数非负）

©¢u¨u $u = 21, v = 21$ **的完整展开**u **问题：**在 Graham Positivity 的例子中，展开式

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = x_1^2 - x_1t_1 - x_1y_1 + t_1y_1$$

如何写成 $c_{u,v}^{w}(\mathbf{y},\mathbf{t})\cdot S_{\ w}(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 的形式？“其他 (t_j-y_i) 的非负整数系数项 “到底是什么？**回答：**利用 $t_1=(t_1-y_1)+y_1$ 改写：

$$\begin{aligned}x_1^2-x_1t_1-x_1y_1+t_1y_1 &= x_1^2-x_1[(t_1-y_1)+y_1]-x_1y_1+[(t_1-y_1)+y_1]y_1\\ &= x_1^2-x_1(t_1-y_1)-x_1y_1-x_1y_1+y_1(t_1-y_1)+y_1^2\\ &= x_1^2+(-x_1+y_1)(t_1-y_1)-2x_1y_1+y_1^2\end{aligned}$$

关键观察：剩余项 $-2x_1y_1+y_1^2$ 不能直接写成 (t_j-y_i) 的形式。但这并不意味着 Graham Positivity 定理失效——而是说我们需要更仔细地分析。**正确的展开（来自 bj«§ ŋj]¦9n ©·ok ）：**查 S_3 Schubert 基：

$$S_{\ 123}=1 \qquad S_{\ 213}=x_1 \qquad S_{\ 132}=x_1+x_2$$
$$S_{\ 231}=x_1x_2 \qquad S_{\ 312}=x_1x_2 \qquad S_{\ 321}=x_1^2x_2$$

当 $\mathbf{y}=\mathbf{t}=0$ 时，x_1^2 不是任何 $S_{\ w}$ 的首项。但在双重 Schubert 多项式的框架下，关键在于：

$$(x_1-y_1)(x_1-t_1)=(t_1-y_1)\cdot S_{\ 21}(\mathbf{x};\mathbf{t})+\text{来自其他基向量的贡献}$$

完整的代数恒等式：实际上，利用 Schubert 多项式的性质，我们可以验证：

$$\begin{aligned}(x_1-y_1)(x_1-t_1) &= (t_1-y_1)\cdot(x_1-t_1)+t_1x_1-y_1t_1\\ &\quad +x_1^2-x_1t_1-x_1y_1+t_1y_1-\text{重复计数}\end{aligned}$$

更系统的方法是使用 Cauchy formula：

$$S_{\ 21}(\mathbf{x};\mathbf{y})\cdot S_{\ 21}(\mathbf{x};\mathbf{t})=\sum_{w\in S_3}c_{21,21}^{w}(\mathbf{y},\mathbf{t})\cdot S_{\ w}(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

其中 $c_{21,21}^{w}(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 是 (t_j-y_i) 的非负整数系数多项式。**结论：**原笔记中的例子确实不完整。更严谨的处理需要使用更高级的组合恒等式（如 bumpless pipe dreams）。核心要点是：Graham Positivity 保证存在这样的分解，但具体写出每一项需要详细的计算。[8]

©Pu 第一章第三节的定理脉络：三层定理与三层引理

©Puou **问题**u 第一章第三节 “主要定理的证明 “开头应该怎样梳理三个主要定理之间的逻辑关系？

©Pu©u **回答**u **三层定理的递进关系**：

(1) ¦\On}Oh ouo rW}9\9h pn _§_®_§´s ：起点——断言两个 Grassmannian 排列乘积的展开系数非负

(2) ¦\On}Oh ©u¨ r|O»jOL W}9\9h pn _§_®_§´s ：推广——关键观察是 “Grassmannian 排列 “限制本质只用到横截相交性。将假设推广到 separated descents 条件。

(3) ¦\On}Oh ou© r¦}_qeO ~H\«@O}§ pn _§_®_§´s ：进一步推广——三个排列乘积的正性

底层引理的支撑作用：

(1) dOhh9 ©u© （正规子群引理）：归纳法的李代数基础

(2) dOhh9 ©uU （横截相交引理）：核心技术工具，保证相交良定义

(3) Gn}nee9}´ ©uV （闭链分解推论）：几何闭链 → Schubert 基底的组合

[8]更深入的分析见 E M m i b Q M?@)h Q (

证明的核心思想：将几何相交（交集在等变量子上同调中的类）翻译为代数展开系数，然后利用上述引理证明系数必为非负。

ℂku 几何相交如何翻译为代数展开系数

ℂkuou **问题**u 证明的核心思想是将几何相交（交集在等变量子上同调中的类）翻译为代数展开系数。这个翻译机制是如何实现的？除差算子的几何意义是什么？

ℂku©u **回答**u **翻译的三步走战略**：

(1) **横截相交引理（**dOhh9 ©uV **）**：保证交集 $\tau\overline{B^-uB/B}\cap\overline{B^-vB/B}$ 是 proper 且横截的。横截性意味着相交是 "好的 "——没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的点个数是良定义的整数，这使得几何计数成为可能。

(2) **闭链分解推论（**Gn}nee9}′ ©uV **）**：这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形 G/B 上，任意 B^--不变的有效闭链必是 Schubert 类 $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 的非负线性组合：

$$\text{几何闭链}=\sum_w c_w\cdot[\overline{B^-wB/B}]_T$$

(3) **几何 ÷ 代数对应**：
- **几何侧**：Schubert 品种 $\overline{B^-wB/B}$ 的相交
- **代数侧**：Schubert 多项式 $S_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\cdot S_v(\mathbf{x};\mathbf{t})$ 在基 $\{S_w(\mathbf{x};\mathbf{t})\}$ 下的展开
- **翻译**：展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t})$ 就是几何相交数的代数化身

除差算子的几何意义：除差算子 ∂_i 在几何上对应于**沿第 i 个超平面进行截面**。它递归地将高维相交问题降维：通过作用，逐步 "切割 "旗流形中的 Schubert 胞腔，直到降到一个点（对应单项式）。这与拓扑学中的横截截面（transverse section）概念相通。**完整的翻译链条**：

$$\overline{B^-uB/B}\cap\overline{B^-vB/B}\xrightarrow{\text{横截性}}\text{良定义的交点数} \tag{65}$$

$$\xrightarrow{\text{Corollary 2.4}}\sum_w c_{u,v}^w\cdot[\overline{B^-wB/B}]_T \tag{66}$$

$$\xrightarrow{\text{多项式代表元}}S_u\cdot S_v=\sum_w c_{u,v}^w\cdot S_w \tag{67}$$

¨·u W}9\9h 定理为何依赖几何性质

¨·uou **问题**u 在 Chapter 4 (Mihalcea) 中提到：”Graham 定理的证明利用了等变量子上同调的几何性质。” 为什么 Graham 的证明要依赖几何性质？具体用了什么几何性质？到了量子上同调为何变得更复杂？

¨·u©u **回答**u W}9\9h **证明的核心几何思想**：Graham 的证明确实完全基于几何——具体来说，是旗流形上 Schubert 胞腔的相交理论。核心步骤如下：

(1) **几何相交**：在旗流形 G/B 中，两个 Schubert 胞腔 B^-uB/B 和 B^-vB/B 的交集（在一般位置下）是若干 Schubert 胞腔的并。

(2) **横截性保证非负**：由 Kleiman-Bertini 定理，当群作用足够一般时，相交是横截的（transverse），这保证了交集点的个数是良定义的非负整数。

(3) **等变量子上同调的类**：在等变量子上同调中，Schubert 胞腔闭包 $\overline{B^-wB/B}$ 对应一个类 $[\overline{B^-wB/B}]_T\in H_T^*(G/B)$。

(4) **类乘积 Q 相交**：类乘法在几何上对应于胞腔的相交。因此

$$[\overline{B^- uB/B}]_T \cdot [\overline{B^- vB/B}]_T = \sum_w c_{u,v}^w [\overline{B^- wB/B}]_T$$

其中 $c_{u,v}^w$ 正是旗流形中三点交点的个数——自然是非负整数。

(5) **多项式代表元**：等变 Schubert 类 $[\overline{B^- wB/B}]_T$ 可以用标准 Schubert 多项式 $S_w(\mathbf{x})$ 作为代表元，这就将几何相交翻译为了多项式系数。

为什么等变量子上同调比普通上同调更好用？普通上同调 $H^*(G/B)$ 中，Schubert 类 $[\overline{B^- wB/B}]$ 的乘法由相交个数定义，系数是整数。但：

- **整数系数丢失信息**：普通上同调只告诉我们" 有多少个交点"，但不区分不同" 类型" 的交点（比如由不同权贡献的交点）。
- **等变量子上同调保留权的信息**：等变类 $[\overline{B^- wB/B}]_T$ 携带了 torus 作用的信息——它在各个固定点的限制给出权的多项式。这让我们能看到系数中 x_i 的具体结构，而不只是总数。

W}9\9h **的关键洞察**：Graham 发现：即使在等变量子上同调中，" 类是几何对象的代表元" 这一事实仍然成立。因此，相交仍然是良定义的（横截相交），系数 $c_{u,v}^w$ 作为权的多项式仍然可以由几何相交解释——只不过现在每个交点贡献的不只是一个计数 1，而是一个权的单项式（由该交点在 torus 作用下的权重决定）。**为何量子上同调更复杂？**当进入量子上同调时，情况发生了本质变化：

(1) **曲线代替点**：不再是计数点与点的交，而是计数满足特定 Gromov-Witten 不变量的曲线（稳定映射）。

(2) **额外自由度**：稳定映射空间 $\overline{M}_{g,n}(G/P, d)$ 的维数依赖于次数 d，这引入了额外的形式变量 q^d。

(3) **非横截情形出现**：在量子情形中，Schubert 胞腔的" 相交" 不再是简单的点相交，而是涉及整条曲线的重合。这可能导致非横截情形，需要更精细的分析工具。

(4) W}nhn@]¯_§8Oj **不变量的正性不显然**：即使稳定映射的个数是正的（这本身需要深入证明），每个映射贡献的权的多项式是否仍然是非负的？这正是 Mihalcea 要回答的问题。

g_\9eHO9 **的策略**：Mihalcea 的关键思想是：虽然量子上同调更复杂，但我们可以**退化**（degeneration）到经典情形。具体来说，他利用了量子环面作用的退化：让某些参数趋于无穷大，量子上同调的乘法就退化回经典等变量子上同调的乘法。在这个退化过程中，Graham 的几何论证仍然有效——只是我们需要小心追踪 q 变量的行为和新的权结构。**总结**：Graham 的证明依赖几何，因为：

- Schubert 类在几何上对应 Schubert 胞腔
- 类乘法对应胞腔相交
- 横截性保证相交是良定义的
- 相交个数/权多项式就是展开系数

量子上同调之所以更复杂，是因为" 点相交" 变成了" 曲线计数"，这引入了新的技术挑战。但 Mihalcea 的工作表明，核心正性在从点到曲线的推广中仍然保持。

¨ou $B^-(w)$ 与 B^- 的关系

¨ouou **问题**u $B^-(w)$ 是什么？它和 B^- 有什么关系？

¨ou©u **回答**u **定义回顾**：根据yy （子群 $N^-(w)$ 与 $B^-(w)$），我们有：

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

各符号的含义：

- B^-：相反 Borel 子群（下三角可逆矩阵群）
- N^-：B^- 的幂幺根基（单位下三角矩阵）
- T：极大环面（对角矩阵群，$T = B \cap B^-$）
- $N^-(w)$：N^- 中“固定” w 的子群
- $B^-(w)$：由 T 和 $N^-(w)$ 生成的子群（半直积）

极端情形：

- 当 $w = w_0$（最长元）时：$B^-(w_0) = T$（因为 $N^-(w_0) = \{e\}$）
- 当 $w = e$（单位元）时：$B^-(e) = B^-$

几何意义：$B^-(w)$-不变的闭链在 Schubert 胞腔的相交理论中扮演重要角色。直观上：

(1) B^- 是最大的群条件（最弱的要求）——任意 B^- 不变闭链
(2) $B^-(w)$ 是更小的群条件（更强的要求）——只有 $B^-(w)$ 不变的闭链
(3) $B^-(w)$ 越大（w 越短），$B^-(w)$-不变闭链的条件越弱，正性越难保证

为什么 |0»j0L W}9\9h pm _§_@_§´ **更强**：原始 Graham 要求 B^--不变闭链，而 Refined 版本要求 $B^-(w)$-不变闭链。条件更弱（更容易满足），但结论反而更强——根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。这似乎矛盾，但实际上是因为 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性。

¨©u $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(w)}$ 的含义

¨©uou **问题**u 在 Refined Graham Positivity 的证明中，系数 $c^w_{u,v}(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)}$ 这个符号是什么意思？为什么用 $-\alpha$ 而不是 α？

¨©u©u **回答**u **符号分解**：记号 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)}$ 表示” 以 $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$ 为变量的非负整数系数多项式”。更仔细地：

- $\mathbb{N}[x_1, x_2, \ldots, x_k]$：$k$ 个变量的非负整数系数多项式环
- $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$：变量集合

具体例子：由第 yy 行的计算，$I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \le i, j \le n\}$，因此

$$-\alpha = -(y_j - t_i) = t_i - y_j$$

所以 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\ge 1}$，这正是 Graham Positivity 断言的系数形式。**为什么是 $-\alpha$？**：

(1) **符号约定**：在等变量子上同调中，T 的权通常用负根表示。具体来说，$H^*_T(pt) = \mathbb{Z}[t_1, \ldots, t_n]$ 中 t_i 对应负根 $-\epsilon_i$。
(2) Gn}nee9}´ ©uV **的形式**：第 yy 行的 Corollary 2.4 给出

$$[Y]_T = \sum_{w\in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(w)} \cdot [\overline{B^- wB/B}]_T$$

这里 $\mathbb{N}[-\alpha]$ 表示系数是关于负根的非负多项式。
(3) **链式法则**：在证明中（第 yy 行），因为交集在 $N^-(\tau)$ 下闭，而 $N^-(\tau)$ 的李代数与 $I(\tau) = \{y_j - t_i\}$ 相关，所以最终系数出现在 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)}$ 中。

直观理解：这是把”关于 $t_i - y_j$ 的非负整数系数多项式”写得更加抽象和紧凑的形式。两种写法完全等价：

$$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\geq 1}$$

系数的定义与意义

问题 EQLR 系数是什么？它在等变量量子上同调中扮演什么角色？

回答（等变量子 ） EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是等变量量子上同调 $QH_T^*(X)$ 中的结构常数，由以下展开式定义：

$$\sigma(u)^T \circ \sigma(v)^T = \sum_{w,d} q^d \cdot c_{u,v}^{w,d} \cdot \sigma(w)^T$$

其中：

- $\sigma(u)^T$ 是 T-等变 Schubert 类
- q^d 是量子参数（对应 Gromov-Witten 不变量）
- d 是多重次数（quantum degree）

几何含义：从几何上看，EQLR 系数由等变 Gromov-Witten 不变量定义为：

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_\star^T\left((ev_1^T)^\star(\sigma(u)^T)\cdot(ev_2^T)^\star(\sigma(v)^T)\cdot(ev_3^T)^\star(\widetilde{\sigma}(w)^T)\right)$$

其中 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X,d)$ 是稳定映射的模空间，ev_i 是评估映射。**定理（ ）**：Mihalcea 证明了：设 $u,v,w\in W^P$ 且 d 为多重次数，则 EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负单根系 $x_1,\ldots,x_r$ 的非负系数多项式。**与经典 系数的区别**：

- 经典 LR 系数 $c_{u,v}^w$：非负整数（计数的几何相交点数）
- 等变 LR 系数 $c_{u,v}^w(y,t)$：关于 $t_j - y_i$ 的非负多项式
- EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$：关于负根 $x_1,\ldots,x_r$ 的非负多项式（带量子参数 q^d）

证明思路：Mihalcea 的核心思想是**归约**——将 EQLR 系数的计算归约到已经在 Graham Positivity 定理中解决的问题。具体步骤：

(1) 考虑空间 $X\times X$ 及其半直积 $B' = T\cdot(U^-\times U^-)$ 的作用
(2) 利用投影公式将 EQLR 系数的计算归约到 $X\times X$ 上的计算
(3) 应用 Graham 的正性定理（Proposition 6.1）：$[V]_T$ 可以唯一表示为 $[Y(u)\times Y(v)]_T$ 的非负系数线性组合
(4) 使用等变 Poincaré 对偶完成证明

为什么重要：EQLR 系数的正性性质是等变量量子上同调的核心结构。它连接了：

- 经典 Schubert calculus（cohomology）
- 等变上同调（equivariant cohomology）
- 量子上同调（quantum cohomology）

这三种理论在旗流形的 Schubert calculus 中统一起来。[9]

双重 多项式的除差算子定义

问题 双重 Schubert 多项式 $S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 如何用除差算子定义？

[9]问：1 Z G _系数是什么？见附录 **??**。

¨Vu©u **回答u 定义**（参考 Kirillov-Maeno [y]）：

$$\boxed{S_{\ w}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{w^{-1}w_0} \prod_{i+j\le n}(x_i+y_j)}$$

其中：

- $\partial^{(x)}_{w^{-1}w_0}$ 表示只在 x 变量上施加除差算子
- 顶部多项式（top polynomial）$\prod_{i+j\le n}(x_i+y_j)$ 对应最长置换 w_0

与单重情形的对比：

情形	定义公式	顶部多项式
	$S_{\ w}(x) = \partial_{w^{-1}w_0}(x^\delta)$	$x^\delta = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$
双重	$S_{\ w}(x,y) = \partial^{(x)}_{w^{-1}w_0}\prod_{i+j\le n}(x_i+y_j)$	$\prod_{i+j\le n}(x_i+y_j)$

关键性质：

(1) $\partial_i^{(x)}$ 只作用在 x 变量上，y 变量保持不变

(2) 递推关系：$S_{\ ws_i}(x,y) = \partial_i^{(x)} S_{\ w}(x,y)$（当 i 是 w 的 descent 时）

(3) 对称性：$S_{\ w}(x,y) = (-1)^{\ell(w)} S_{\ ww_0}(y,x)$

(4) 退化：当 $\mathbf{y}=\mathbf{0}$ 时，$S_{\ w}(\mathbf{x},\mathbf{0}) = S_{\ w}(\mathbf{x})$

S_2 **的具体例子**：在 S_2 中，$n=2$，$w_0=21$，顶部多项式为 $\prod_{i+j\le 2}(x_i+y_j) = (x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_2+y_1)$。

- $S_{\ 21}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{12}\left[(x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_2+y_1)\right] = (x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_2+y_1)$
- $S_{\ 12}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{21}\left[(x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_2+y_1)\right] = x_2+y_1$

S_3 **的具体例子（详细计算）**：在 S_3 中，$n=3$，$w_0=321$，顶部多项式为

$$\prod_{i+j\le 3}(x_i+y_j) = (x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_1+y_3)(x_2+y_1)(x_2+y_2)(x_3+y_1)$$

（共有 $\binom{3+1}{2}=6$ 个因子，因为满足 $i+j\le 3$ 的 (i,j) 对为：$(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(3,1)$）通过除差算子计算：

- $S_{\ 321}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_1+y_3)(x_2+y_1)(x_2+y_2)(x_3+y_1)$
- $S_{\ 231}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \partial_1^{(x)} S_{\ 321} = (x_1+x_2)(x_1+y_2)(x_1+y_3)(x_2+y_1)(x_3+y_1) + (x_1+x_2)(x_1+y_1)(x_2+y_1)(x_2+y_2)(x_3+y_1)$
- $S_{\ 312}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_2+x_3)(x_1+y_1)(x_2+y_1)(x_2+y_2)(x_3+y_1) + (x_1+x_3)(x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_2+y_1)(x_3+y_1)$
- $S_{\ 132}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_1+x_2)(x_1+y_1)(x_1+y_3)(x_3+y_1) + (x_1+x_3)(x_1+y_1)(x_2+y_1)(x_2+y_2)$
- $S_{\ 213}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_1+x_2)(x_1+y_1)(x_2+y_1) + (x_2+x_3)(x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_2+y_2)(x_3+y_1)$
- $S_{\ 123}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = 1$（恒等置换）

验证：$y=0$ **退化检查**当 $\mathbf{y}=\mathbf{0}$ 时，双重 Schubert 多项式应退化为经典 Schubert 多项式：

- $S_{\ 321}(\mathbf{x},\mathbf{0}) = x_1^3x_2^2x_3$（经典顶部多项式）
- $S_{\ 231}(\mathbf{x},\mathbf{0}) = x_1^2x_2^2x_3 + x_1^2x_2x_3^2 = x_1^2x_2x_3(x_2+x_3)$

除差算子的几何意义：除差算子 ∂_i 在几何上对应于沿第 i 个超平面进行截面，递归地将高维相交问题降维。[10]

[10]除差算子的几何意义见附录 **??**。

$N^-(w)$ 与 胞腔 B^-wB/B 的同构

问题 为什么 $N^-(w)$ 同构于 Schubert 胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$？请解释几何直观、代数同构映射的意义，以及为什么这个同构说明 $N^-(w)$ 是连通的。

回答 **几何直观：维数公式** $\dim N^-(w) = \ell(w_0) - \ell(w)N^-$ 是单位下三角矩阵群，维数为 $\binom{n}{2}$（下三角矩阵的非对角元有 $\binom{n}{2}$ 个自由参数）。作为簇，N^- 同构于 $\mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$，因为每个元素可以唯一写为根子群的乘积：

$$N^- \cong \prod_{\alpha\in\Phi^-} U_\alpha$$

其中 $U_\alpha \cong \mathbb{C}$ 是对应负根 α 的单参子群。$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$ 的维数取决于哪些负根 α 满足 $w(\alpha) > 0$（即 w 把负根变成正根）。关键在于：

$$N^-(w) = \prod_{\substack{\alpha\in\Phi^-\\ w(\alpha)>0}} U_\alpha$$

负根是 $\Phi^- = \{-\epsilon_i + \epsilon_j : 1 \le j < i \le n\}$，共 $\binom{n}{2}$ 个。$w(\alpha) > 0$ 的负根 α 个数等于 $|J(w)| = \binom{n}{2} - \ell(w)$，其中 $J(w) = \{(i,j) : i < j, w(i) < w(j)\}$ 是 w 的非逆序集。因此：

$$\dim N^-(w) = \binom{n}{2} - \ell(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$$

几何图像：N^- 本身同构于最大的相反 Schubert 胞腔 $B^-w_0B/B \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$。而 $N^-(w)$ 是 N^- 的一个" 切片"，只保留那些 w 不翻转的负根方向。 **代数同构：** $N^-(w) \cong B^-wB/B$ 构造同构映射：

$$\phi : N^-(w) \to B^-wB/B, \quad x \mapsto xwB/B$$

验证是良好定义的：若 $x \in N^-(w)$，则 $x \in N^- \subset B^-$，所以 $xwB \in B^-wB$，陪集 xwB/B 落在 B^-wB/B 内。**单射性**：若 $xwB/B = ywB/B$，则 $w^{-1}x^{-1}yw \in B$。同时 $w^{-1}x^{-1}yw \in w^{-1}N^-w \cap N^- = N^-(w)$。但 $B \cap N^-(w) = \{e\}$，所以 $x = y$。**满射性**：任取 B^-wB/B 中元素。由于 $B^- = N^-T$，任意元素可写为 $n_1twB = n_1w(w^{-1}tw)B$。但 $w^{-1}tw \in T \subset B$，所以实际上 $n_1twB = n_1wB$，且 $n_1 \in N^-$,$n_1 \in N^-(w)$。 **同构映射 $x \mapsto xwB/B$ 的意义** G/B 是齐性空间，B^-wB/B 是过基点 wB/B 的胞腔。映射 $x \mapsto xwB/B$ 把 $N^-(w)$ 中的元素 x 看作" 旗的位移"——把基旗 wB/B 推到旗 xwB/B。$N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ 提供了胞腔 B^-wB/B 的自然坐标系。每个 $x \in N^-(w)$ 指定了胞腔中一个唯一点。从齐性空间角度看，wB/B 的稳定化子是 B，而 $N^-(w)$ 是那些" 与 w 的相对位置在 N^- 中" 的元素构成的子群。 **连通性** N^- 是幂幺群（unipotent group），指数映射 $\exp : \mathfrak{n}^- \to N^-$ 是双射（代数群情形的对数映射）。因此 N^- 微分同胚于其李代数 $\mathfrak{n}^- \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$，是连通的。$N^-(w)$ 是 N^- 的闭子群，因此作为代数群也是连通的。同构 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ 说明 $N^-(w)$ 是仿射空间。仿射空间是连通的（甚至单连通）。**参考文献**：Humphreys, [, Section 28]。[11]

置换除法记号 w_0/w 的含义

问题 在 Corollary 1.2（Kirillov 猜想）的证明中，出现了 $v = w_0/w$ 和 $\partial_{w/w_0/w}$ 的记号。这里的除法"/" 是什么意思？

[11] 问：为什么 $N^-(w) \cong B^-wB/B$？见附录 **??**。

由于 $S_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1}x_2^{n-2}\cdots x_{n-1}$ 是单项式，作用于其上的除差算子可以显式计算。

¨¢u 幂幺根基 U 的含义

¨¢uou **问题**u 在 Borel 子群分解 $B = T \cdot U$ 中，U 称为" 幂幺根基"，这是什么意思?

¨¢u©u **回答**u **幂幺（ª j_qn§0j§ ）的定义**：一个代数群元素是幂幺的，当且仅当它所有特征值都为 1（对于复代数群，这意味着它是单参数群的乘积，每个单参数群都是形如 $\exp(t \cdot N)$ 的指数，其中 N 是幂零矩阵）。**几何直观**：在 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 中，幂幺矩阵的形式为上三角矩阵，对角线元素全为 1：

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

这种矩阵称为幂幺，因为 $(u - I)^n = 0$（幂零）。**在一般约化群中**：设 G 为连通复约化群，$B \subset G$ 为 Borel 子群，$T \subset B$ 为极大环面。则

$$B = T \cdot U, \quad B^- = T \cdot U^-$$

其中 U 和 U^- 分别是包含在 B 和 B^- 中的极大幂幺子群。**为什么叫ŷ 根基ŷ （|9L_H9e ）?**：在群论中，radical（根基）是最大的可解理想。幂幺根基 U 是 B 的一个闭子群，它是 B 的" 尾部"——移除了 torus T 的部分后，剩下的就是幂幺群。U 和 U^- 分别是对应于正根和负根的方向。**在旗流形中的作用**：在旗流形 G/B 中，Schubert 胞腔 B^-wB/B 可以通过幂幺群 U^- 的作用参数化。具体而言，每个 $u \in U^-$ 给出一个群作用 $u \cdot (wB/B) = uwB/B$，这正是胞腔上的坐标。**与旗的变化的关系**：当你看到一个旗被" 提升" 时，实际上是 U^- 中的元素在作用。例如在 GL_n 中，U^- 是下三角幂幺矩阵，它们把标准旗变成一般旗。

¨Pu 为何初始条件是 $S_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$

¨Puou **问题**u 为什么 Schubert 多项式的初始条件是 $S_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$? 这个公式的直观意义是什么?

¨Pu©u **回答**u **核心原因：旗流形的上同调环结构** Schubert 多项式 $S_w(\mathbf{x})$ 是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上 Schubert 胞腔类的上同调代表元。其次数等于对应胞腔的维度，即 $\ell(w)$。**最长置换 $w_0 = (n, n-1, \ldots, 1)$ 的特殊情况**：

(1) **几何维度**：旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的复维度是 $\binom{n}{2}$，恰好等于 $\ell(w_0)$。

(2) **上同调环中的关系**：在 $H^*(Fl_n)$ 中，基本类之间满足关系 $\sum_{i=1}^{n} x_i = 0$（因为旗流形是紧致的，Chern 类的和为零）。这意味着在多项式代表元中，变量 x_n 可以用其他变量消去。

(3) **单项式基元的分圆条件**：Schubert 多项式在 $H^*(Fl_n)$ 中构成多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_{n-1}]$ 的自由基。对于每个置换 w，指数向量 $(c_1, c_2, \ldots, c_{n-1})$ 满足 $0 \le c_i \le n - i$。

(4) **最长置换的指数**：w_0 对应的指数向量取最大值：

$$c_i = \#\{j > i : w_0(j) < w_0(i)\} = n - i$$

因此 $S_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$。

具体例子（$n = 2$）：对于 S_2，$w_0 = 21$：

- $i = 1$：$c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2 : 1 < 2\} = 1$

故 $S_{21}(\mathbf{x}) = x_1^1 = x_1$。**具体例子（$n = 3$）**：对于 S_3，$w_0 = 321$：

- $i = 1$：$c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2, 3 : 2, 1 < 3\} = 2$

- $i=2$：$c_2=\#\{j>2:w_0(j)<w_0(2)\}=\#\{3:1<2\}=1$

故 $S_{321}(\mathbf{x})=x_1^2x_2^1=x_1^2x_2$。**具体例子（$n=4$）**：对于 S_4，$w_0=4321$：

- $i=1$：$c_1=\#\{j>1:w_0(j)<w_0(1)\}=\#\{2,3,4:3,2,1<4\}=3$
- $i=2$：$c_2=\#\{j>2:w_0(j)<w_0(2)\}=\#\{3,4:2,1<3\}=2$
- $i=3$：$c_3=\#\{j>3:w_0(j)<w_0(3)\}=\#\{4:1<2\}=1$

故 $S_{4321}(\mathbf{x})=x_1^3x_2^2x_3^1$。**对比：非最长置换的例子**：以 $w=312\in S_3$ 为例，其 code 为：

- $i=1$：$c_1=\#\{j>1:312(j)<312(1)\}=\#\{2,3:1,2<3\}=0$
- $i=2$：$c_2=\#\{j>2:312(j)<312(2)\}=\#\{3:2<1\}=0$

对应首项 $x_1^0x_2^0=1$。实际计算得 $S_{312}(\mathbf{x})=x_1+x_2$，首项是 x_1（对应 Grassmannian 置换的分式）。**规律总结**：code 向量 $(c_1,\dots,c_{n-1})$ 满足 $0\le c_i\le n-i$，且 w_0 对应最大 code $(n-1,n-2,\dots,1)$。q_q0 L}09h **（管道路径）组合解释**：在 bumpless pipe dreams 模型中，w_0 对应最" 拥挤" 的管道图，所有管道都必须尽可能向右拐弯，权重乘积恰好是 $\prod_{i=1}^{n-1}x_i^{n-i}$。

矩阵版本u 对于 $n=3$，最长置换 $w_0=321$ 的矩阵表示为：

$$w_0=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}$$

即第一行是列指标，第二行是置换后的行指标。对应的 code $(c_1,c_2)=(2,1)$ 表示：

- $c_1=2$：第 1 列下面有 2 个数比 3 小（2,1）
- $c_2=1$：第 2 列下面有 1 个数比 2 小（1）

Schubert 多项式 $S_{321}(\mathbf{x})=x_1^2x_2$ 的指数向量 $(2,1)$ 恰好是 code 的直接反映。矩阵视角的意义：在旗流形 $Fl_3(\mathbb{C})$ 中，w_0 对应的 Schubert 胞腔是最大维度的闭胞腔，其上同调类由单项式 $x_1^2x_2$ 代表。

¨ku [«hq\}0´ ¦\0n}0h o¨u¨ **的内容**

¨kuou **问题**u 在引理 2.2 的证明中，引用了 Humphreys [y , Theorems 13.1 and 13.3] 来证明 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。Theorem 13.3 究竟说了什么?

¨ku©u **回答**u **定理内容（**[«hq\}0´ J ***Linear Algebraic Groups***J ¦\0n}0h o¨u¨ **，原文第** ©o·o **页）**：¦\0n}0h o¨u¨u Let G be a connected algebraic group, H a closed connected subgroup. Then $\mathfrak{h}$ is an ideal in $\mathfrak{g}$ if and only if H is normal in G.**翻译：**设 G 为连通代数群，H 为闭连通子群。则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想，当且仅当 H 是 G 的正规子群。**在引理**©u© **证明中的应用：**该定理的"easy half" 表明：如果 H 是 G 的正规子群，则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想。在 Gao-Xiong 的论文中，我们需要证明：当 $ws_i>w$ 时，$N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。通过李代数计算，我们已经验证了 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想（通过检查所有李括号 $[F_\alpha,F_\beta]$ 是否仍在 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 中）。此时，$N^-(ws_i)$ 和 $N^-(w)$ 都是连通交换正规子群（因为它们都是幂幺群的闭子群）。因此，Humphreys Theorem 13.3 保证了 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想这一事实可以提升到群层面——$N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。**关键逻辑链条**：

$$\mathfrak{n}^-(ws_i)\subset\mathfrak{n}^-(w)\text{ 且是理想}\xrightarrow{\text{Thm 13.3}}N^-(ws_i)\subset N^-(w)\text{ 且是正规子群}$$

}0T0}0jH0 u@_@ **中的引用**：

```
@book{humphreys1975,  author = {Humphreys, James E.},  title = {Linear Algebraic Groups}
```

这是代数群理论中的经典参考文献，Theorem 13.3 位于第 13 章（关于幂幺群的结构）。

¨ku¨u ¦\On}Oh o¨uo **与** ¦\On}Oh o¨u¨ **的区别**u 在引理 2.2 的证明中，实际上引用了 Humphreys 的两个定理：

- ¦\On}Oh o¨uo **（格对应定理，原文第** ©·¢¨ **页）**：¦\On}Oh o¨uou Let G be a connected algebraic group. The correspondence $H \mapsto \mathfrak{h}$ is 1-1 and inclusion preserving between the collection of closed connected subgroups H of G and the collection of their Lie algebras, regarded as subalgebras of $\mathfrak{g}$. **翻译**：设 G 为连通代数群。闭连通子群 H 与其李代数 $\mathfrak{h}$ 之间的对应是一一映射且保持包含关系。此定理保证了我们可以从李代数 $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$ 的包含关系提升到群层面 $N^-(ws_i) \subset N^-(w)$。
- ¦\On}Oh o¨u¨ **（正规子群与理想的等价，原文第** ©o·o **页）**：¦\On}Oh o¨u¨u Let G be a connected algebraic group, H a closed connected subgroup. Then $\mathfrak{h}$ is an ideal in $\mathfrak{g}$ if and only if H is normal in G. **翻译**：设 G 为连通代数群，H 为闭连通子群。则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想，当且仅当 H 是 G 的正规子群。结合使用：在验证了 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想之后，Theorem 13.3 保证 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。

两者结合使用，是因为 Theorem 13.1 提供了从群到李代数（和反向）的对应，而 Theorem 13.3 则给出了理想与正规子群的等价关系。[12]

V·u $S_{21}(x;y)$ 的计算问题

V·uou **问题**u 在第一章 S_2 的计算例子中，笔记给出了展开式与简洁公式，它们看起来不同。这两种表达是否相等？如果不相等，哪个是正确的？

(1) 展开式（错误使用公式导致）：

$$S_{21}(x;y) = x_1^2x_2 - x_1^2y_1 - x_1x_2 + x_1y_1 + x_2y_2 - y_1y_2 - x_1x_2y_2 + x_1y_1y_2$$

(2) 简洁公式（由定义直接给出）：

$$S_{21}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

V·u©u **分析**u **使用除差算子验证**：根据双重 Schubert 多项式的除差算子正确定义：

$$S_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{w^{-1}w_0} \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$$

注意这里是 $(x_i - y_i)$ 而非 $(x_i - y_{w_0(i)})$。对于 $n = 2$，$w_0 = 21$，对于 $w = 21$：

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e$$

所以 $\partial_{w^{-1}w_0} = \partial_e = \mathrm{id}$（恒等算子）。因此：

$$S_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{2}(x_i - y_i) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

这与正文中的简洁公式一致。**原附录错误的原因**：原附录使用了错误的公式 $\prod(x_i - y_{w_0(i)})$ 而不是正确的 $\prod(x_i - y_i)$，导致得到了错误的结果 $(x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$。

[12]问：> m K T ? ` 2 v b h ? 2 Q ` 和 R jX 的具体内容是什么？见附录 **??**。

V·u¨u **结论**u 正文中的两种表述存在矛盾，但分析发现：**附录中的除差算子公式写错了**。正确的除差算子定义为：

$$S_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{w^{-1}w_0} \prod_{i=1}^{n}(x_i - y_i)$$

注意这里是 $\prod(x_i - y_i)$ 而非 $\prod(x_i - y_{w_0(i)})$。对于 $w = 21$（$w_0 = 21$）：

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e, \quad \partial_e = \mathrm{id}$$

$$S_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

数值验证：$(1-3)(2-4) = 4$。因此，**正文中的简洁公式 $S_{21} = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$ 是正确的**，附录的展开计算有误（错误地使用了 $y_{w_0(i)}$ 而不是 y_i）。

Vou F_α 是权为 $-\alpha$ 的根向量——是什么意思？

问题u 在第 1056 行，$n^-(w) = \mathrm{span}\{F_\alpha \mid \alpha \in J(w)\}$ 中，F_α 是" 权为 $-\alpha$ 的根向量"。这里的" 权" 和" 根向量" 是什么意思?

回答u ou **什么是Ÿ 根向量Ÿ ?** 在 gl_n 中，每个矩阵单位 E_{ij}（第 i 行第 j 列为 1，其余为 0）都是一个根向量——因为它满足：

$$[H, E_{ij}] = \alpha(H) \cdot E_{ij}$$

其中 $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$ 是权，$H = \mathrm{diag}(t_1, \ldots, t_n) \in \mathfrak{h}$ 是 Cartan 子代数中的任意对角矩阵[13]。u **什么是Ÿ 权Ÿ ?** 设 $H = \mathrm{diag}(t_1, \ldots, t_n) \in \mathfrak{h}$，伴随作用给出：

$$[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$$

这里：

- $[H, E_{ij}] = H \cdot E_{ij} - E_{ij} \cdot H$ 是**矩阵李括号**（Lie bracket），衡量 H 和 E_{ij} 的非对易程度
- $\mathrm{ad}_H(E_{ij}) = [H, E_{ij}]$ 称为 H 对 E_{ij} 的**伴随作用**（adjoint action）

推导：由于 H 是对角矩阵，$(H \cdot E_{ij})_{ik} = t_i E_{ijk}$，而 $(E_{ij} \cdot H)_{ik} = t_j E_{ijk}$，故 $[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$。数 $(t_i - t_j)$ 就是 E_{ij} 的**权**，记为 $\epsilon_i - \epsilon_j$，即 $\alpha(H) = t_i - t_j$。¨u **正根** ® **负根** 在 gl_n 中：

- **正根** $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$（$i < j$）$\to$ 对应 E_{ij}（上三角矩阵）
- **负根** $-\alpha = \epsilon_j - \epsilon_i$（$i < j$）$\to$ 对应 E_{ij}（下三角矩阵）

Vu F_α **的含义**在记号中，F_α 通常指**对应负根 $-\alpha$ 的根向量**。所以：

- 若 $\alpha = \epsilon_1 - \epsilon_2$（正根）
- 则 $F_\alpha = E_{21}$（下三角矩阵）
- 且 F_α 的权是 $-\alpha = \epsilon_2 - \epsilon_1$（负根）

Uu **具体例子（gl_3）**

根	矩阵	类型	权
$\epsilon_1 - \epsilon_2$	E_{12}	正根	$+\alpha$
$\epsilon_2 - \epsilon_1$	E_{21}	负根	$-\alpha$
$\epsilon_1 - \epsilon_3$	E_{13}	正根	$+\beta$
$\epsilon_3 - \epsilon_1$	E_{31}	负根	$-\beta$
$\epsilon_2 - \epsilon_3$	E_{23}	正根	$+\gamma$
$\epsilon_3 - \epsilon_2$	E_{32}	负根	$-\gamma$

[13]即 ?? 中的 * `i M子代数。

£u **为什么 $n^-(w)$ 用 F_α（负根向量）？**因为 $n^- = \mathrm{Lie}(N^-)$，而 N^- 是下三角幂幺矩阵群，其李代数由**负根空间**张成。所以 $n^-(w)$ 中的 F_α 对应负根 $-\alpha$，即权为 $-\alpha$。[14]

V©u $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 与标准 ~H\«@O}§ 多项式的关系

V©uou **问题**u $[\overline{B^-wB/B}]_T$（等变量子上同调类）和标准 Schubert 多项式 $S_w(\mathbf{x})$ 有什么关系?

V©u©u **回答**u **核心关系**：$[\overline{B^-wB/B}]_T$ 是几何对象（等变量子上同调类），而 $S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 是它的多项式代表元。¦\On}Oh o·u£uV **（**Ey J ¦\On}Oh o·u£uVF **，原文）**：设 T 通过字符 $\chi_1,\dots,\chi_n$ 作用在 $Fl(\mathbb{C}^n)$ 上，则对任意 $w\in S_n$，多项式 $S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 在代入

$$x_i = -c_1^T(\mathbb{S}_i/\mathbb{S}_{i-1}),\quad y_i = -\chi_i$$

时映射到 $\sigma_w = [\overline{B^-wB/B}]_T$。即

$$\sigma_w = S_w(x;y) \quad \text{in} \quad H_T^* Fl(\mathbb{C}^n)$$

变量说明:

- $x_i = -c_1^T(\mathbb{S}_i/\mathbb{S}_{i-1})$ 来自旗流形的自丛（tautological subbundle）
- $y_i = -\chi_i$ 来自 torus T 的作用权

具体对应（来自 [y ，Theorem 10.6.4]）:

(1) **等变量子上同调类**：$[\overline{B^-wB/B}]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$
(2) **双重 ~H\«@O}§ 多项式代表元**：$[\overline{B^-wB/B}]_T$ 由 $S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 表示
(3) **退化为标准 ~H\«@O}§ 多项式**：当 $\mathbf{y}=\mathbf{0}$ 时，

$$S_w(\mathbf{x};\mathbf{0}) = S_w(\mathbf{x})$$

几何含义:

- $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 是旗流形中 Schubert 胞腔闭包 $\overline{B^-wB/B}$ 的等变量子上同调类
- $S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 是这个上同调类的多项式代表元（方便计算）
- $\mathbf{y}$ 变量编码了 torus T 作用的信息

为什么需要双重版本？设 $H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[t_1,\dots,t_n]$，则

$$S_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) \in H_T^*(Fl_n) \cong \mathbb{Z}[x_1,\dots,x_n]^{S_n}[t_1,\dots,t_n]/\text{relations}$$

当把 x_i 替换为 0 时，$S_w(\mathbf{0};\mathbf{y})$ 给出了等变量子上同调类在固定点处的 restrictions，这些 restrictions 编码了 Schubert 胞腔的定位信息。**总结表**:

对象	记号	所在空间
	$[\overline{B^-wB/B}]_T$	$H_T^*(Fl_n)$
双重 Schubert 多项式	$S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$	$\mathbb{Z}[x,y]$
标准 Schubert 多项式	$S_w(\mathbf{x})$	$\mathbb{Z}[x]$（当 $\mathbf{y}=0$）

V¨u 8jLO} nj]S«e§nj ~OH§_nj oku¨ **：横截性方法**

Anderson-Fulton 的 [y ，Section 19.3] 建立了横截性（transversality）方法，用于证明 Schubert 结构常数的正性。

[14]问：F_α 是权为 $-\alpha$ 的根向量是什么意思？见附录 **??**。

V¨uou **什么是横截性（¦}9j @0} 9e_§´ ）?u 横截相交的定义**：设 $Y, Z \subseteq X$ 是非奇异簇 X 的子簇。如果 $Y \cap Z$ 要么为空，要么是纯维数的，且

$$\operatorname{codim}_X(Y \cap Z) = \operatorname{codim}_X Y + \operatorname{codim}_X Z$$

则称 Y 与 Z 横截相交（intersect properly/transversally）。**几何直观**：想象两条曲线在平面上相交：

- 如果它们在交点处" 平滑地" 穿过彼此（切向量线性无关），则是横截的
- 如果一条曲线在另一点处" 相切" 或" 平滑地接触"，则不是横截的

为什么横截性重要？: 当两个子簇横截相交时, 其相交次数（intersection number）是良定义的非负整数。这是因为相交局部上是线性空间的相交，交叉点可以用重数（multiplicity）来计数。

V¨u@u **核心定理u ¦\0n}0h oku¨uo （pn _§_@_§´ ¦\0n}0h ，原文）**：设 $Z \subseteq G/P$ 是 T-不变子簇，在 Schubert 基底下写其类为

$$[Z]_T = \sum_{[u]} c_{[u]} x[u]$$

则每个 $c_{[u]}$ 属于 $\mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \ldots, \alpha_r]$，即简单根的正系数多项式。Gn}nee9}´ oku¨u@ （W}9\9h ，**原文）**：在等变量子上同调 $H_T^*(G/P)$ 中，使用相反 Schubert 基 $\{y[w]\}$ 时的结构常数 $c_{[u][v]}^{[w]}$ 是正根 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ 的非负系数多项式：

$$c_{[u][v]}^{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \ldots, \alpha_r]$$

d0hh9 oku¨uV （be0_h9j]?0}§_j_ **定理，原文）**：设 Γ 是连通代数群在不可约簇 X 上传递作用，$Y, Z \subseteq X$ 是不可约子簇。存在稠密开子集 $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$ 使得对所有 $g \in \Gamma^\circ$，gY 与 Z 横截相交。d0hh9 oku¨uU **（精细版** be0_h9j]?0}§_j_ **，原文）**：设 Γ 是连通代数群在非奇异不可约簇 X 上作用，有有限多个轨道 $X_1, \ldots, X_n$。设 $Y \subseteq X$ 是不可约子簇，假设 Y 与每个 Γ-轨道横截相交。给定另一个不可约子簇 Z，存在稠密开子集 $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$ 使得对所有 $g \in \Gamma^\circ$，gY 与 Z 横截相交。

V¨u¨u **非 0x«_@9}_9j§ 情形的证明思路**u 在非 equivariant 情形（T 平凡作用），正性证明非常简洁：

(1) 由 Lemma 19.3.4，存在 $g \in G$ 使得 $gY[w]$ 与 Z 横截相交
(2) 由基本相交理论（Proposition A.3.3），横截相交的类是：

$$[Y] \cdot [Z] = \sum_V m_V [V]$$

其中 $m_V \geq 0$ 是相交重数
(3) Schubert 胞腔的结构常数是：

$$c_{[w]} = \int y[w] \cdot [Z]$$

(4) 由于 $gY[w]$ 与 Z 横截相交，上式化为 $c_{[w]} = \int [gY[w] \cap Z]$
(5) 由基本性质，$\int [V]$ 在 V 是点时为 1，否则为 0
(6) 因此 $c_{[w]} \geq 0$（非负整数）

V¨uVu 0x«_89}_9j§ **情形的证明思路**u equivariant 情形的证明更加精细，因为需要处理 torus 作用带来的权：

(1) 在 approximation space $\mathbf{X} = \mathbb{E} \times^T G/P$ 上工作
(2) 使用群 $\Gamma = \Gamma_f \rtimes (GL_m)^r$ 在 $\mathbf{X}$ 上的作用
(3) 由 Lemma 19.3.5，存在 $g \in \Gamma$ 使得 $g\mathbf{Y}[w]$ 与 $\mathbf{Z}$ 横截相交
(4) 利用 Poincaré 对偶和 Gysin 映射的基本性质
(5) 由于 Gysin 映射保持有效类（effective class），$c_{[w]}$ 是有效类
(6) 因此 $c_{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \ldots, \alpha_r]$

关键洞察：在普通上同调中，横截相交给出非负整数；在 equivariant 上同调中，横截相交给出正根多项式的非负系数。

V¨uVu **在引理** ©uU **证明中的应用**u 在引理 2.5 的证明中，横截性由 Kleiman-Bertini 分析保证：

- 设 $w_0^{(m)} \in S_m$ 是最长排列
- 对于 $w, \pi \in S_n$，记 $w \times \pi \in S_{2n}$ 为直和
- 由 $v \in S_n$ 知 $\overline{B^- vB/B}$ 在 s_i $(n \leq i < 2n)$ 下不变
- 因此 $\overline{B^- vB/B} = u_0 \overline{B^- vB/B}$，其中 $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$
- 类似地 $\tau \overline{B^- uB/B} = \tau u_0 \overline{B^- uB/B}$
- 由于 $u_0^{-1} \tau u_0 = w_0^{(2n)}$，交集的横截性由 [y , Lemma 19.3.5] 保证

Snn§jn§0 ：Theorem 19.4.4 的退化证明见附录 yy 。

VVu 8jL0} njJS«e§nj ¦\0n}0h okuVuV **：退化命题**

本节内容来自 Anderson & Fulton 的《Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry》[y] 第 19.4 节（pages 371-377）。这是 Graham 退化证明的详细版本，用于证明 Schubert 结构常数的正性。

VVuou **预备概念**u 在阅读本节之前，读者需要熟悉以下概念。由于这是大二学生可能未学过的内容，我们在此给出简要说明。

44.1.1. β في ' ت X**线性代数群**：域 $\mathbb{C}$ 上的线性代数群是 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 的闭子群。例如 $\mathrm{GL}_n, \mathrm{SL}_n, \mathrm{B}_n$（上三角矩阵群）等。**连通性**：群 G 是连通的，如果它作为拓扑空间（赋予 Zariski 拓扑）不能分解为两个非空开集的并。所有 Borel 子群都是连通的。**可解群**：群 G 是可解的，如果其导出列最终平凡：

$$G \supseteq [G,G] \supseteq [[G,G],[G,G]] \supseteq \cdots \supseteq \{e\}.$$

例如，所有 Borel 子群 B 都是可解的。**最大环面** rg9²_h9e §n}« s ：设 G 是连通线性代数群。G 的一个**最大环面** T 是 G 中同构于 $(\mathbb{C}^*)^r$ 的极大子群，其中 $r = (G)$ 称为 G 的秩。直观理解：环面 $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$ 是一个" 阿贝尔的"（可交换的）子群，在很多方面像是线性代数群的" 坐标系"。例如：

- 在 GL_n 中，对角矩阵的集合形成一个最大环面 $T \cong (\mathbb{C}^*)^n$。
- 在 SL_n 中，对角矩阵中行列式为 1 的子群是最大环面，$T \cong (\mathbb{C}^*)^{n-1}$。

特征标 rG\9}9H§0}s ：环面 T 的一个特征标是群同态 $\chi : T \to \mathbb{C}^*$。所有特征标构成的群记为 $\hat{T}$，在 $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$ 时有 $\hat{T} \cong \mathbb{Z}^r$。例如，如果 $T = (\mathbb{C}^*)^n$ 由对角矩阵 $(t_1, \ldots, t_n)$ 组成，则 t_i 的第 i 个坐标给出特征标 $\varepsilon_i : (t_1, \ldots, t_n) \mapsto t_i$。

44.1.2. Ь ĭ Ь ĭ X**闭链** rG´HeOs ：在代数几何中，闭链是代数簇的闭子簇的整系数线性组合。例如，Y 是 X 的闭子簇，则 $[Y]$ 是一个闭链。**有效闭链** rN¸OH§_ß0 H´HeOs ：如果闭链中所有系数都是非负整数，则称其为有效闭链。也就是说，有效闭链只是若干闭子簇的" 并"（带重数），没有" 负部"。**维数**：设 Y 是复代数簇，$\dim Y = k$ 表示 Y 是 k 维复簇（实维数 $2k$）。

44.1.3. ɾ Ж ĭ ɔ́ø u X这是将拓扑的" 上同调" 与" 群作用" 结合的理论。**等变量子上同调** $[Y]_T$：设 T 在 X 上作用。X 的 T-等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 是一个同时编码了 X 的拓扑信息和 T 作用信息的环。直观理解：普通上同调 $H^*(X)$ 只关心 X 的形状；等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 额外记录了 T 在 X 上怎么动。**类** $[Y]_T$：如果 $Y \subseteq X$ 是 T-不变子簇（T 保持 Y），则 Y 在等变量子上同调中有一个类 $[Y]_T \in H_T^*(X)$。

- 当 T 平凡作用时，$[Y]_T$ 就是普通的类 $[Y] \in H^*(X)$。
- $[Y]_T$ 包含了更多关于 Y 与 T 轨道关系的信息。

?] **不变**：如果群 B 作用在 X 上，子簇 Y 是 B-不变的（B-invariant）意味着对所有 $b \in B$，有 $bY = Y$。这保证了 Y 在 B 作用下结构稳定。

44.1.4. ⋆ ė 1 X**幂幺群** rªj_qn§0j§ X}n«qs ：一个元素 g 是幂幺的，如果 $(g-I)^m = 0$ 对某个 m 成立。幂幺矩阵群由所有特征值都为 1 的矩阵组成。**幂幺根基** rªj_qn§0j§ }9L_H9es ：设 B 是连通可解代数群。B 的幂幺根基 U（记作 $U = U_N$ 或 U_-）是 B 中所有幂幺元素构成的正规子群。它满足：

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

直观理解：B 可以分解为一个" 阿贝尔的" 环面子群 T 和一个" 幂幺的"（三角阵对角线以上为 1）子群 U 的半直积。在旗流形 G/B 的情形，U_-（或 B^-）是下三角幂幺群，它在旗流形上的轨道正好是 Schubert 胞腔。

44.1.5. K 5 X**纤维积** $B \times_{B'} Y$：这是集合论中的" 拉回" 概念。设 B 作用在 Y 上，$B' \subseteq B$ 是子群。则

$$B \times_{B'} Y = \{(b, y) \in B \times Y : b \text{ 在} B' \text{ 中的等价类} = \text{某个代表元在} B' \text{ 中的位置}\}$$

在几何上，这可以理解为以 Y 为纤维、B/B' 为底空间的纤维丛。投影到 B/B' 给出丛结构。在 Proposition 19.4.4 的证明中，$V = B \times_{B'} Y \to B/B' = \mathbb{A}^1$ 是一个纤维丛，纤维是 Y。

44.1.6. ▉ ₦ ⌋ Ⅾρ Λ X在代数几何中，两个子簇的交有不同的" 深度"：p}nqO} _j§0} 0H§_nj **（固有交集）**：Y 与 Z 在 X 中的交是 proper 的，如果交簇的维数等于 $\dim Y + \dim Z - \dim X$（这正是" 期望" 的维数）。非 proper 交集意味着" 维度异常"——可能维数更低了。**横截相交** r¦9j ß0} 0 _j§0} 0H§_njs ：在光滑点处，如果两个子簇的切空间张成整个切空间，则称它们横截相交。横截相交有良好的性质：交点个数是孤立的（有限的），且个数在族中是稳定的。~H\0h0] **理论上相交**：这是一种更精细的相交概念，考虑了子簇的环结构而不只是集合论意义。V 在 $\infty \times X$ 中与 $\infty \times Y$ scheme-理论上相交，意味着它们在无穷远点的相交方式由理想幂决定，而不是简单的集合包含。直观理解：这三种相交层层递进——scheme-理论上相交是最精细的，横截相交是几何意义上" 最好" 的，proper 相交是维数意义上" 正常" 的。

44.1.7. Ӧ ▶ ɣ ω̃ X**对角作用**：B 在 X 上的对角作用定义为 $b \cdot (x_1, x_2) = (bx_1, bx_2)$。这让 B 同时作用在积 $X \times X$ 的两个分量上。**紧化** $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$：仿射直线 $\mathbb{A}^1$ 不是紧致的（如 $\mathbb{C}$ 不是紧致的），但射影直线 $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 是紧致的。通过添加无穷远点，我们得到紧化。在 Proposition 19.4.4 的证明中：利用 B 在 $\mathbb{P}^1$ 上的作用（由引理 19.4.2-19.4.3 给出），我们将纤维丛 $V \to \mathbb{A}^1$ 紧化到 $\mathbb{P}^1 \times X$，然后利用 $\mathbb{P}^1$ 上的关系 (19.1) 来" 退化"——用 0 和 ∞ 处的信息来控制整条纤维的信息。

44.1.8. ɜ ɻ ˮΩ ɯʁ ϖ ɦ X有了以上预备知识，Proposition 19.4.4 的证明思路可以理解为：

(1) 如果 Y 已经 B-不变，则无需分解。
(2) 否则，构造纤维丛 $V = B \times_{B'} Y \to \mathbb{A}^1$，它在 $\mathbb{P}^1$ 中紧化。
(3) 利用 $\mathbb{P}^1$ 上的基本关系 $[\infty] = [0] + \chi[\mathbb{P}^1]$，与 $[V]$ 作交。
(4) 这将 $[Y]$ 的计算" 退化" 到 0 和 ∞ 处的纤维，产生所需的分解 $[Y] = [Z_1] + \chi[Z_2]$。

这个技巧本质上是把一个难以直接计算的 B'-不变类，通过族化的思想（纤维丛），分解为更简单的 B-不变类的组合。

Wu©u **背景：连通可解群与环面作用u 基本设定**：

- B：复数域 $\mathbb{C}$ 上的连通可解线性代数群
- $T \subseteq B$：最大环面（torus）
- X：复射影簇（complex projective variety）
- T 在 X 上作用，只有有限多个固定点

退化证明的核心思想：将 B'-不变的闭链类 $[Y]_T$ 分解为 B-不变闭链类的线性组合，系数是特征标的多项式。通过逐次应用这个分解，可以将任意 Schubert 胞腔类的乘积展开系数写成正根的非负多项式。

Wu¨u **基本例子：$\mathbb{P}^1$ 上的退化**u N29hqe0 okuVuo ：设 B 通过同态 $B \to \mathrm{GL}_2$ 作用在 $\mathbb{P}^1$ 上：

$$b \mapsto \begin{pmatrix} \chi(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $\chi : B \to \mathbb{C}^*$ 是特征标，$\varphi : B \to \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$ 是满足

$$\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \chi(b_1)\varphi(b_2)$$

的正则函数。注意对 $t \in T$，有 $\varphi(t) = 0$（因为 T 由半单元素组成）。此时 T 在 $\mathbb{C}^2$ 上的权为 χ 和 0。我们有：

$$H_T^* \mathbb{P}^1 = \Lambda[\zeta]/(\zeta + \chi)\zeta,$$

其中 $\zeta = c_1^T(\mathcal{O}(1))$。点 $0 = [1, 0]$ 被 B 固定，点 $\infty = [0, 1]$ 被 T 固定，且

$$[0]_T = \zeta, \quad [\infty]_T = \zeta + \chi.$$

由此得到关键关系（公式 19.1）：

$$[\infty]_T = [0]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1]_T. \tag{68}$$

WuVu **幂幺根基的设置**u 设 $U \subseteq B$ 是幂幺根基（unipotent radical），则 U 是 B 的正规子群，且

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

设 $U' \subseteq U$ 是 B 的正规子群，满足 $\dim(U/U') = 1$，因此 $U/U' \cong \mathbb{G}_a$。（由于 B 可解，这样的 U' 总是存在的。）T 通过共轭作用在 U 上，这给出 T 在 $U/U' \cong \mathbb{A}^1$ 上的一个特征标作用。等价地，如果 $\mathfrak{u} \supset \mathfrak{u}'$ 是对应的李代数，则 χ 是 T 在 $\mathfrak{u}/\mathfrak{u}'$ 上的权。设 $\theta : U \to \mathbb{G}_a$ 是任意同态，核为 U'。

VVuUu **引理** okuVu© **与** okuVu¨u dOhh9 okuVu© ：上述 B 在 $\mathbb{G}_a$ 上的作用由下式给出：

$$b \cdot z = \theta(u) + \chi(t)z,$$

其中 $b = ut$ $(u \in U, t \in T)$，$z \in \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$。dOhh9 okuVu¨ ：设 $\chi : T \to \mathbb{C}^*$ 是特征标，定义 $\tilde{\chi} : B \to \mathbb{C}^*$ 为其在 B 上的唯一扩张（$\tilde{\chi}(ut) = \chi(t)$）。令 $\varphi : B \to \mathbb{C}$ 为 $\varphi(ut) = \theta(u)$。则：

(1) φ 的零点簇是 B'；
(2) 对 $b_1, b_2 \in B$，有 $\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \tilde{\chi}(b_1)\varphi(b_2)$。

因此映射 $b \mapsto \begin{pmatrix} \tilde{\chi}(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是 B 到 GL_2 的群同态。

VVu£u p}nqn _§_nj okuVuV **：退化命题（详细证明）u 命题**：设 B 在非奇异簇 X 上作用，T 是最大环面。设 $B' \subset B$ 是闭子群，$\chi : T \to \mathbb{C}^*$ 是特征标。假设 $Y \subseteq X$ 是 B'-不变的有效闭链，$\dim Y = k$。则存在典则定义的 B-不变有效闭链 Z_1 和 Z_2（$\dim Z_1 = k$，$\dim Z_2 = k+1$），使得

$$[Y]_T = [Z_1]_T + \chi[Z_2]_T. \tag{69}$$

在 $H_T^{2n-2k}X$ 中。

证明（来自 Anderson & Fulton, pp. 373-374）：只需对 Y 是不可约子簇的情形构造。若 Y 已经是 B-不变的，则取 $Z_1 = Y$，$Z_2 = 0$ 即得。否则，令 W 为 $B \cdot Y$ 在 X 中的闭包；这是一个维数为 $k+1$ 的子簇。考虑

$$V = B \times_{B'} Y,$$

具有自然的左 B 作用。这是以 Y 为纤维、$B/B' = \mathbb{A}^1$ 为底空间的纤维丛。映射 $V \to \mathbb{A}^1 \times X$，$[(b, y)] \mapsto (\varphi(b), b \cdot y)$ 是一个 B-等变的闭嵌入，其中 B 在 $\mathbb{A}^1 \times X$ 上对角作用。利用从两个引理得到的 B 在 $\mathbb{P}^1$ 上的作用，我们有 B-等变的紧化 $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$。设 V 为 V 在 $\mathbb{P}^1 \times X$ 中的闭包，则 V 是维数为 $k+1$ 的 B-不变子簇，通过第二投影 $P^1 \times X \to X$ 映射到 $W \subseteq X$。利用第一投影 $P^1 \times X \to P^1$ 拉回关系 (19.1)，我们得到

$$[\infty \times X]_T = [0 \times X]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1 \times X]_T. \tag{70}$$

在 $H_T^2(\mathbb{P}^1 \times X)$ 中。将两边与 $[V]_T$ 作交：

- 左边：$\infty \times X$ 与 V 在 $\infty \times Y \subseteq V$ 处有 scheme-理论上相交。这是因为 φ 的零点簇是 B'，而 B' 保持 Y。
- 右边：$V \to \mathbb{P}^1$ 是支配的，所以 V 与 $0 \times X$ 的交是形如 $0 \times Z_1$ 的正维数为 k 的闭链。由于 V 和 $0 \times X$ 都是 $P^1 \times X$ 的 B-不变子簇，它们的交也是 B-不变的，因此 $Z_1 \subseteq X$ 是一个 B-不变的 k-闭链。

于是得到

$$[\infty \times Y]_T = [0 \times Z_1]_T + \chi \cdot [V]_T$$

在 $H_T^{2n-2k+2}(\mathbb{P}^1 \times X)$ 中。通过投影 $\mathbb{P}^1 \times X \to X$ 推出

$$[Y]_T = [Z_1]_T + \chi \cdot d[W]_T,$$

其中 d 是映射 $V \to W$ 的次数。故 Z_1 和 $Z_2 = dW$ 即为所求的 B-不变有效闭链。□

VVu¢u ¦\On}Oh okuVuU **：链分解**u 在相同设置下，假设我们选择了正规子群链

$$U = U_N \supset U_{N-1} \supset \cdots \supset U_0,$$

其中每个 U_i 被 T 正规化，U_{i-1} 在 U_i 中正规，且 $\dim U_i/U_{i-1} = 1$。设 χ_i 是 T 在李代数 $\boldsymbol{u}_i/\boldsymbol{u}_{i-1}$ 上的权，记 $B_i = U_i \cdot T$。**定理**：设 Y 是 B_0-不变的有效 k-闭链。则对每个 $I \subseteq \{1, \ldots, N\}$，存在典则定义的 B-不变有效闭链 Z_I（$\dim Z_I = k + |I|$），使得

$$[Y]_T = \sum_{I \subseteq \{1,\ldots,N\}} \left(\prod_{i \in I} \chi_i \right) [Z_I]_T. \tag{71}$$

在 $H_T^{2n-2k} X$ 中。

证明：对 N 做归纳。$N = 0$ 的情形平凡。假设对 $N-1$ 的情形已证。对于 $J \subseteq \{1, \ldots, N-1\}$，我们有非负闭链 Z'_J（关于 $B' = U_{N-1} \cdot T$ 不变），满足

$$[Y]_T = \sum_{J \subseteq \{1,\ldots,N-1\}} \left(\prod_{j \in J} \chi_j \right) [Z'_J]_T.$$

对每个 Z'_J 应用 Proposition 19.4.4，可得

$$[Z'_J]_T = [Z_J]_T + \chi_N [Z_{J \cup \{N\}}]_T,$$

其中 Z_J 和 $Z_{J\cup\{N\}}$ 是非负的 B-不变闭链。代入即得所求。□

VVuPu Gn}nee9}′ okuVu¢ **：正性推论**u **推论**：对于对角嵌入 $\delta : G/P \hookrightarrow G/P \times G/P$，有

$$\delta_*(x^{[w]}) = \sum_{[u],[v]} c_{[u][v]}^{[w]} x^{[u]} \times x^{[v]},$$

其中每个系数 $c_{[u][v]}^{[w]}$ 是正根的单项式的非负和。

证明思路：将 Theorem 19.4.5 应用到 $B = (U \times U) \cdot T$ 在 $X \times X$ 上的对角作用。取 U_0 为对角 $U \subseteq U \times U$，$U_N = U \times U$，则链给出分解。由于 U 在 G/P 上只有有限多个轨道，B-不变子簇都形如 $V_I \times W_I$，于是系数可写成正根单项式的非负和。特别地，由于 $\boldsymbol{u}$ 的权空间都是一维的（权就是正根），这些系数是平方自由的。□

参考文献：Anderson, David, and William Fulton. 1[mBp `B Mi *Q?QKQHQ;v BM H;:2QK2i Cambridge University Press, 2023. Section 19.4, pages 371-377.

VUu c]W}9 h9jj_9j **排列与线性因子乘积的等价性**

VUuou **问题**u 正文说：k-Grassmannian 排列 w 的 Schubert 多项式 $S_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成线性因子的乘积。反过来是否成立？即，如果 $S_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成线性因子的乘积，能否推出 w 是 k-Grassmannian 排列？

VUu©u **回答**u **结论：是的，反过来也成立。**这实际上是 k-Grassmannian 排列的一个等价刻画。**等价定义**：一个排列 $w \in S_n$ 是 k-Grassmannian 的，当且仅当其双重 Schubert 多项式 $S_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以分解为 k 个线性因子的乘积：

$$S_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k} (x_{a_i} - y_{b_i})$$

证明思路：

(1) **充分性（W}9 h9jj_9j ⇒ 线性因子）**：已在正文（yy ）证明。k-Grassmannian 排列 w 对应的 Schubert 胞腔 B^-wB/B 是 Grassmannian G/P 的子簇，其坐标环是多项式环的商，故 S_w 有因子化形式。

(2) **必要性（线性因子 ⇒ W}9 h9jj_9j ）**：设 $S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ 是 k 个线性因子的乘积。则 S_w 作为 $\mathbf{x}$ 的多项式，每个因子关于 $\mathbf{x}$ 都是线性的。这意味着 w 对应的旗流形子簇在某些方向上是线性的，这正是 Grassmannian 子簇的特征。更形式地说，如果 w 不是 Grassmannian，则 S_w 包含关于 $\mathbf{x}$ 的二次或更高次项。

具体例子验证：

- $w = 231$（非 Grassmannian）：$S_{231} = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$——不能写成线性因子的乘积
- $w = 21$（1-Grassmannian）：$S_{21} = x_1 - y_1$——线性因子
- $w = 132$（1-Grassmannian）：$S_{132} = x_2 - y_2$——线性因子

直觉理解：Grassmannian 子簇本身是由线性方程定义的，因此其 Schubert 类自然有线性因子的表示。非 Grassmannian 的子簇涉及更复杂的代数关系，导致多项式中出现二次或更高次项。

V£u |O»jOL W}9\9h pn _§_@_§´ 与原始 W}9\9h pn _§_@_§´ 的关系

V£uou **问题**u Refined Graham Positivity（yy ）和原始的 Graham Positivity（yy ）有什么关联？前者是后者的推广吗？

V£u©u **回答**u **是的，**|O»jOL W}9\9h pn _§_@_§´ **是原始** W}9\9h pn _§_@_§´ **的推广。**ou **条件弱化：从** W}9 h9jj_9j **到** ~Oq9}9§OL KO HOj§ **原始** W}9\9h pn _§_@_§´ **（**yy **）**：设 $u, v \in S_n$ 分别是 k_1-Grassmannian 和 k_2-Grassmannian 排列，则

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\geq 1}$$

|O»jOL W}9\9h pn _§_@_§´ **（**yy **）**：设 B^- 作用于非奇异簇 X, Y 是 X 中的一个 $B^-(w)$-不变的有效闭链。则在 $H_T^*(X)$ 中有

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^{m} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

两者共同要求的条件（separated descents）：$\max \mathrm{Des}(u) \leq \min \mathrm{Des}(v)$ **关键澄清**：当 u, v 都是 Grassmannian 时，separated descents 条件**不一定**自动满足！例如 $u = 321$（2-Grassmannian），$v = 213$（1-Grassmannian）时，$\max \mathrm{Des}(u) = 2 > 1 = \min \mathrm{Des}(v)$，不满足 separated descents。**两者的正确关系**：

- **原始** W}9\9h pn _§_@_§´ ：用几何方法（横截相交）证明，条件是 u, v 都是 Grassmannian（**不要求** $k_1 \leq k_2$）
- |O»jOL W}9\9h pn _§_@_§´ ：用 separated descents 条件代替 Grassmannian 条件，推广了适用范围
- 当 separated descents 成立时，两者的系数形式一致

©u **系数形式的变化**原始 Graham Positivity 的系数：

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j\geq 1}$$

Refined Graham Positivity 的系数：

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha\in I(\tau)}$$

两者的关系：当 (u, v) 满足 separated descents 时，$I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \le i, j \le n\}$，因此 $-\alpha = t_i - y_j$，两者等价。¨u **几何理解的升级**

- **原始版本**：要求 B^--不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交
- |0»j0L **版本**：要求 $B^-(\tau)$-不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交，其中 $B^-(\tau) \subset B^-$ 是更小的群（条件更弱）

条件更弱，但 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性，使得正性结论仍然成立。Vu **定理层次的对应关系**

层次	原始 Graham	Refined Graham
	u, v 都是 Grassmannian	separated descents
系数	$\mathbb{N}[t_i - y_j]$	$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$
适用范围	特殊排列	更一般的排列

Uu **总结** Refined Graham Positivity 通过引入 separated descents 条件，将原始 Graham Positivity 从 Grassmannian 排列推广到一般排列。这是 Samuel (2024) 的关键贡献——证明了横截相交性在 separated descents 条件下仍然成立，从而将正性结果推广到更大的适用范围。Tnn§jn§0 ：见 yy ，yy 。

V¢u [«hq\}0´ ~OH§_nj ©PI ?}«\9§ KOHnhqn _§_nj **的内容**

V¢uou **问题**u 正文（引理 2.2 前）引用了 Humphreys [y ，Section 28] 来描述 $N^-(w)$ 与 Schubert 胞腔 $B^- wB/B$ 的同构。Section 28 究竟说了什么?

V¢u©u **回答**u ~OH§_nj ©PI ?}«\9§ KOHnhqn _§_nj 是 Humphreys 一书中关于旗流形分解的核心章节。其主要结果包括：©Puo ¦] **稳定子群（**¦\On}Oh ©Puo] **原文第** o£k **页）**：

¦\On}Oh ©Puou 设 G 为约化群，T 为极大环面，B 为 Borel 子群，U 为 B 的幂幺根基。则 U 可以分解为两个 T-稳定子群的直接乘积：

$$U = U_\sigma \cdot U'_\sigma$$

其中对每个 $\sigma \in W$（Weyl 群元），根系 Φ^+ 被划分为：

$$\Phi^+_\sigma = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) > 0\}, \quad \Phi^-_\sigma = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) < 0\}$$

©Pu¨ ?}«\9§ **分解（**¦\On}Oh ©Pu¨] **原文第** ¨P¨o **页）**：¦\On}Oh ©Pu¨ r?}«\9§ KOHnhqn _§_njsu

$$G = \bigcup_{\sigma \in W} B\sigma B \quad \text{（不相交并）}$$

其中每个双陪集 $B\sigma B$ 等于某个 Schubert 胞腔。**推论（**Gn}nee9}´ nT ¦\On}Oh ©Pu¨ **）**：设 B' 为 G 的任意 Borel 子群，则 $B \cap B'$ 是连通的且包含 G 的一个极大环面。©PuV **正规形式（**¦\On}Oh ©PuV] **原文第** ¨P£¨ **页）**：¦\On}Oh ©PuVu 对每个 $\sigma \in W$，每个元素 $x \in G$ 可以唯一地写成：

$$x = u' \cdot n(\sigma) \cdot t \cdot u$$

其中 $u, u' \in U$（幂幺部分），$t \in T$（环面部分），$n(\sigma) \in N$（Weyl 群代表元）。**在引理**

©u© **证明中的应用**：正文引用"Humphreys [y ，Section 28]，$N^-(w)$ 同构于 Schubert 胞腔 $B^- wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$" 是基于以下对应：

(1) $B^- = TU^-$ 是 B 的相反 Borel 子群
(2) $N^-(w) = N^- \cap wNw^{-1}$ 对应负根方向

(3) 由 Bruhat 分解，$B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$

(4) 作为簇，$N^-(w) \cong B^-wB/B$（通过映射 $x \mapsto xwB/B$）

几何意义：$N^-(w)$ 是旗流形 G/B 中 Schubert 胞腔 B^-wB/B 的坐标空间。具体而言，$N^-(w)$ 同构于 $\mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$（仿射空间），这意味着每个 Schubert 胞腔可以用 $\ell(w_0)-\ell(w)$ 个复坐标参数化。**连通性**：由于 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^d$（仿射空间），它是连通的（甚至单连通）。[15]

VPu 为什么 |O»jOL W}9\9h pm _§_@_§´ 的假设是 õ 更强Ÿ 的？

VPuou **问题**u 在 Remark 中有一段话：

> 当 $w = w_0$ 是最长元时，$B^-(w_0) = T$，yy 给出原始的 Graham 正性定理。我们的假设比 Graham 的更强，因为 $B^-(w)$-不变的环必是 T-不变的，产生更强的正性结果，其中根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。

这里有几个令人困惑的点：

(1) 为什么说 “我们的假设更强”？难道不是要求越多越弱吗？

(2) 为什么根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根是 “更强” 的结果？

VPu@u **回答**u ou **假设强度与不变群的关系**：在几何中，要求一个子簇在某个群作用下不变，条件是越**小**的群越**强**（严格）：

- T：只在 torus T 作用下不变
- B^-：在更大的群 B^- 作用下不变
- $B^-(w)$：只在更小的群 $B^-(w)$ 作用下不变

要求在 $B^-(w)$ 下不变比要求在 T 下不变**更严格**，因为：

- 如果一个子簇在 $B^-(w)$ 下不变，它自动在 T 下不变
- 但反过来不一定成立：在 T 下不变的子簇不一定在 $B^-(w)$ 下不变

因此，yy 的假设：

$$\text{假设：}Y \text{ 是}B^-(w)\text{-不变的}$$

比原始 Graham 的假设：

$$\text{假设：}Y \text{ 是}T\text{-不变的}$$

更强（条件更严格）。@u **为什么结果是 õ 更强Ÿ 的正性？**：这里的 “更强” 不是说系数更大，而是说结论给出了**更精确的信息**。yy 的结论是：

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^{m} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

即系数的多项式只涉及 $\{-\alpha \mid \alpha \in I(w)\}$ 这些根。对比原始 Graham 正性（对应 $w = w_0$ 的情况）：

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^{m} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in \Phi^+} \cdot [Z_i]_T$$

这里 Φ^+ 是所有正根，$I(w) \subseteq \Phi^+$。**关键点**：

- 当 $w = w_0$（最长元）时，$I(w_0) = \Phi^+$（所有正根），两者相同
- 当 $w \neq w_0$ 时，$I(w) \subsetneq \Phi^+$（真子集）
- $I(w)$ 越小，系数多项式的变量越少，约束越强

[15] 问：>mKT?`2vb a2+i BQMnR3i .2+QKTQ说Bi B2?见附录 ??。

¨u **几何直观**：$B^-(w)$ 的定义是：

$$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$I(w)$ 记录了 w 翻转了哪些正根。$|\alpha \in I(w)| = \ell(w)$，即 w 的长度。当 w 很短时（接近单位元），$I(w)$ 很小，只有少数根被翻转，因此 $B^-(w)$ 接近 T，条件变强，但结果也更精确——系数只涉及少数几个根的多项式。Vu **总结**：

(1) **假设更强**：$B^-(w)$-不变比 T-不变要求更多（更严格的条件）
(2) **结果更强**：$I(w)$ 越小，系数被限制在更小的根集上，结论更精确

这似乎矛盾，但实际上反映了 "归纳递进" 的数学思想：当假设更严格时，我们可以得到更精确的结论。**退化情形**：当 $w = w_0$ 时，$B^-(w_0) = T$，假设退化为 T-不变，$I(w_0) = \Phi^+$，结论退化为原始 Graham 正性。[16]

Vku W}n§\OjL_OHc **多项式是什么？**

Vkuou **问题**u 笔记中多次提到 Grothendieck 多项式（如yy ），它与 Schubert 多项式有什么关系？

Vku©u **回答**u W}n§\OjL_OHc **多项式（**W}n§\OjL_OHc qne´jnh_9e **）**是 Schubert 多项式的推广，由 Alexander Grothendieck 在 1950 年代引入。**历史背景**：Schubert 多项式 $S_w(\mathbf{x})$ 由 Lascoux 和 Schützenberger 在 1980 年代引入，用于表示旗流形上 Schubert 胞腔的上同调类。但这只解决了旗流形的**普通上同调**。1950 年代，Grothendieck 和 Grothendieck 学生 Demazure 研究了旗流形的 G\n° **群**和**代数** b] **理论**。他们发现，在 K-理论中，Schubert 类的代表元不再是多项式，而是更复杂的对象——这就是 Grothendieck 多项式。**与** ~H\«@O}§ **多项式的关系**：在旗流形的 K-理论中，Schubert 胞腔的结构常数不再是非负整数，而是更一般的表达式。Grothendieck 多项式 $\widetilde{S}_w(\mathbf{x})$ 满足：

(1) **退化到** ~H\«@O}§ **多项式**：当限制到上同调时，$\widetilde{S}_w(\mathbf{x})$ 退化为 $S_w(\mathbf{x})$

$$\widetilde{S}_w(\mathbf{x}) \equiv S_w(\mathbf{x}) \pmod{\mathbb{Z}_{>0}[\text{次数} \geq 1]}$$

(2) b] **理论中的地位**：在 $K^0(Fl_n) \otimes \mathbb{Q}$ 中，$\{\widetilde{S}_w\}$ 构成基

组合定义：Grothendieck 多项式可以用除差算子递归定义：

$$\widetilde{S}_w(\mathbf{x}) = \partial_i^{-1}\widetilde{S}_{ws_i}(\mathbf{x}) \quad (\text{当} i \text{ 是} w \text{ 的 descent})$$

但这里的 ∂_i^{-1} 是**逆除差算子**，定义为：

$$\partial_i^{-1}(f) = \sum_{k\geq 0} x_i^k \cdot \partial_i(f)$$

这导致 Grothendieck 多项式是**无穷级数**，但可以证明在 K-理论中是良定义的。**几何意义**：在代数 K-理论中，旗流形的结构环 $K^0(Fl_n)$ 由 Schubert 类 $[\mathcal{O}_{\overline{B^-wB/B}}]$ 生成。Grothendieck 多项式 $\widetilde{S}_w(\mathbf{x})$ 是这些 K-理论类的代表元。**正性**：与 Schubert 多项式类似，Grothendieck 多项式的结构常数也满足某种正性。在 Fan-Guo-Xiong [y] 中，他们建立了双重 Grothendieck 多项式范围的正性公式，使用 puzzles 方法。**笔记中的位置**：在yy 中，笔记讨论了关于 Grothendieck 多项式的 positivity 猜想，这是 Gao-Xiong 工作的自然推广方向之一。[17]

---

[16]问：为什么假设更强反而结果更强？见附录 **??**。

[17]问：:`Qi?2M/B多项式是什么？见附录 **??**。

U·u ?_ee0´ **公式的显式形式**

U·uou **问题**u 正文（yy ）说" 从其显式形式（此处略去）"，Billey 公式的显式形式到底是什么?

U·u©u **回答**u ?_ee0´ **公式** rokkks 由 Sara Billey 在论文《Decompositions of the cone of Schur functions》中给出，是计算 Schubert 类在旗流形 G/B 的 torus 固定点处限制的组合公式。**限制公式**：对任意 $u, w \in W$，

$$[\overline{B^- uB/B}]_T|_w = \sum_{\substack{v \in W \\ u \le v \le w}} \prod_{\alpha \in R^+(w) \setminus R^+(v)} \alpha$$

其中 $R^+(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha < 0\}$ 是 w 的反转集。**几何意义**：$[\overline{B^- uB/B}]_T|_w$ 是 Schubert 类限制到 torus 固定点 wB/B 的等变量子上同调类。由于 $H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(\mathit{pt}) = \mathbb{Z}[\alpha_1, \ldots, \alpha_r]$，限制结果是一个单项式之和。Billey 公式表明：这些单项式的指数恰好对应 Bruhat 区间 $[u, w]$ 中 v 的反转集差集。**正性**：由于 $R^+(w) \setminus R^+(v) \subseteq R^+(w)$，而 $R^+(w)$ 中的根都是正根，故每个单项式都是正根的乘积。这给出了 Graham Positivity 最早的几何解释之一。**结构常数公式**（[y , Corollary 4.3]）：对于 Schubert 结构常数 $c_{uv}^w(\mathbf{y})$，

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}) = \sum_{b \in \mathcal{C}(u,v,w)} \prod_{\alpha \in \mathrm{Inv}(b)} \alpha$$

其中 $\mathcal{C}(u, v, w)$ 是特定 braid 元胞腔，$\mathrm{Inv}(b)$ 是其反转集。

Uou $\sigma(u)^T$ **的含义**

Uouou **问题**u $\sigma(u)^T$ 是什么意思? 上标 T 代表什么?

Uou©u **回答**u $\sigma(u)^T$ **是等变量子上同调中的** ~ℍ\«@0}§ **类。**在等变上同调（equivariant cohomology）中，上标 T 表示我们考虑的是 §n}« **等变版本**。具体而言：

- $\sigma(u)$：普通上同调中的 Schubert 类，定义为旗流形 $X = G/P$ 中 Schubert 簇 $Y(u) = \overline{B^- uP/P}$ 的 Poincaré 对偶类
- $\sigma(u)^T$：等变量子上同调中的 Schubert 类，是 $\sigma(u)$ 到等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 的提升

为什么需要 T？在等变量子上同调中，我们考虑群 T（torus，最大环面）作用在流形 X 上。类不再是 X 的普通上同调类，而是提升到同伦商空间（homotopy quotient）$X \times_T ET$ 上的类。**与普通上同调的关系**：当忘掉 torus 作用（即在 $H_T^*(X) \otimes_{\mathbb{Z}[x_1,\ldots,x_r]} \mathbb{Z}$ 中令所有 $x_i = 0$）时，$\sigma(u)^T$ 退化回 $\sigma(u)$。**笔记中的位置**：正文

Uou¨u **例子**u **例** 0 **：**W}9 h9jj_9j $Gr(2,4)$ **情形。**设 $X = Gr(2,4) = GL_4/B$（2 维平面构成的 Grassmannian）。其等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 中，Schubert 类可显式写出。固定最大环面 $T \subset GL_4$ 作用在平面上。则 $\sigma(u)^T$ 在 torus 固定点处的限制为：

- 对于 $u = s_1 s_2$（最短代表元），有 $\sigma(s_1 s_2)^T|_p = x_1 + x_2$；
- 对于 $u = s_2 s_1$，有 $\sigma(s_2 s_1)^T|_p = x_1 + x_3$；

其中 x_1, x_2 是负单根参数。当 $x_i = 0$ 时，这些退化为普通上同调中的类（交点个数）。**例** © **：旗流形** $Fl_3 = GL_3/B$ **情形。**在旗流形 Fl_3 上，取 $u = s_1$，$v = s_2$。则在 $H_T^*(Fl_3)$ 中，利用 Schubert 类的相交理论：

$$\sigma(s_1)^T \cdot \sigma(s_2)^T = \sigma(s_1 s_2)^T + x_1 x_2 \cdot \sigma(1)^T.$$

其中各项的含义：

- $\sigma(s_1s_2)^T$：对应置换 s_1s_2 的 Schubert 类；
- $x_1x_2\cdot\sigma(1)^T$：这是等变修正项，x_1,x_2 是负单根参数，$\sigma(1)^T$ 是单位类。

验证正性：展开系数为 1（非负整数）和 x_1x_2（非负单项式），符合 Graham positivity 的要求。

U©u W}nhn®]¯_§§0j 不变量

U©uou **问题**u 什么是 Gromov-Witten 不变量？它计数的是什么？

U©u©u **回答**u W}nhn®]¯_§§0j **不变量（**W¯ **不变量）是计数满足特定条件的稳定映射（**§9@e0 h9q **）个数的代数不变量。核心思想**：在量子上同调中，我们不仅考虑点与点的相交，还考虑曲线与曲线的相交。Gromov-Witten 不变量计数的是：给定旗流形 X 中三个 Schubert 条件，有多少条有理曲线（$\mathbb{P}^1$）同时满足这些条件。**形式定义**：对于亏格 g、n 个标记点的稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,d)$，Gromov-Witten 不变量定义为：

$$\langle\sigma(u_1),\dots,\sigma(u_n)angle_{g,n,d}=\int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,d)]^{extvir}}\prod_{i=1}^{n}ev_i^*\sigma(u_i).$$

几何意义：

- $g=0$（亏格 0）时，计数的是 $\mathbb{P}^1$ 上满足条件的曲线个数；
- $n=3$（三个标记点）对应三点函数（three-point function）；
- d 是曲线的同调类（curve class）。

为什么叫Ÿ **不变量**Ÿ **？**因为它不依赖于簇的具体实现方式，只依赖于其代数几何的同伦类型——不同的代数几何计算如果同伦等价，则 GW 不变量相同。**与经典** ~H\«@0}§ H9eH«e« **的区别**：

- 经典：计数点是 Schubert 簇的相交个数；
- 量子：计数曲线是稳定映射的个数，涉及模空间积分。

笔记中的位置：正文 yy 使用 GW 不变量解释 EQLR 系数的几何意义。

U¨u **什么是分次** $\Lambda[q]$**代数**

U¨uou **问题**u 在 yy 中提到：$QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$-代数。什么是分次 $\Lambda[q]$-代数？其中的 q 变量代表什么？

U¨u©u **回答**u **分次** $\Lambda[q]$**代数**是同时包含两种参数的代数结构：

(1) $\Lambda=\mathbb{Z}[x_1,\dots,x_r]$ **层**：等变量子部分。x_i 对应负根 $-\alpha_i$，编码 torus 作用的权信息。
(2) q **变量层**：量子修正部分。q 是一个形式变量（formal variable），用来记录曲线的同调类（degree）。当 $q=0$ 时退化为普通等变量子上同调。

为什么叫Ÿ **分次**Ÿ **（**X}9LOL **）？**因为乘法有分次结构：

$$\deg(\sigma(w))=\ell(w),\quad \deg(q)=1,\quad \deg(x_i)=1$$

在乘积 $\sigma(u)\circ\sigma(v)$ 中，次数是相加的：$\deg(\sigma(u)\circ\sigma(v))=\deg(\sigma(u))+\deg(\sigma(v))$。而 q^d 的次数是 d，所以量子项自然地增加了次数。

q **的几何含义**：在量子上同调中，q 变量编码的是曲线计数的额外信息。形式地说：

$$\sigma(u)\circ\sigma(v)=\sum_{w,d}q^d c_{u,v}^{w,d}\sigma(w)$$

其中 d 记录曲线的同调类（multi-degree），$c_{u,v}^{w,d}$ 是对应次数为 d 的 Gromov-Witten 不变量。

具体例子：在 $\mathbb{P}^1$ 的情形（yy ）：

$$\sigma(s_1)\circ\sigma(s_1)=q\cdot\sigma(1)$$

这里 q 出现因为两条直线（在 $\mathbb{P}^1$ 中）相交于一条曲线（亏格 0 曲线），而不是一个点。

与经典情形的对比：

情形	代数结构	结构常数 c
经典上同调 $H^*(X)$	$\mathbb{Z}$-代数	$c_{u,v}^w\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$
等变量子上同调 $H_T^*(X)$	Λ-代数（$\Lambda=\mathbb{Z}[x_i]$）	$c_{u,v}^w\in\Lambda$，系数非负
等变量子量子上同调 $QH_T^*(X)$	分次 $\Lambda[q]$-代数	$c_{u,v}^{w,d}\in\Lambda$，系数非负

UVu $f:\mathbb{P}^1\to X$ 中的 X 是什么？

UVuou **问题**u 在量子上同调的定义中，出现稳定映射 $f:\mathbb{P}^1\to X$，这里的 X 是什么？$\mathbb{P}^1$ 又是什么？

UVu©u **回答**u $X=G/P$ **是齐次空间**（\nhmX0j0n« q9H0 ）：

在 yy 中我们看到，$X=G/P$ 是旗流形（flag variety），其中：

- G 是连通复半单李群（如 $GL_n(\mathbb{C})$）
- $P\subset G$ 是抛物子群（parabolic subgroup）
- G/P 是齐次空间，等同于旗流形 Fl_n

$\mathbb{P}^1$ **是复射影直线**：

$\mathbb{P}^1$ 是 1 维复射影空间，也等价于 Grassmannian $Gr(1,n+1)$。它是一条紧致（compact）的复曲线，亏格（genus）为 0。

稳定映射 $f:\mathbb{P}^1\to X$ **的几何含义**：

在量子上同调中，我们不再计数点与 Schubert 簇的交点，而是计数曲线与 Schubert 簇的交点。具体来说：

- f 是一个代数曲线（这里是 $\mathbb{P}^1$，亏格 0 曲线）
- f 的像 $f(\mathbb{P}^1)\subset X$ 是旗流形中的一条复曲线
- 稳定映射的模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X,d)$ 参数化了所有满足特定条件的映射

与经典 ~H\«@0}§ H9eH«e« **的对比**：

情形	计数对象	结构常数 c 的取值
经典上同调	X 中点的相交数	$c_{u,v}^w\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$
等变量子上同调	点的相交（等变权）	$c_{u,v}^w\in\Lambda$，非负系数
等变量子量子上同调	稳定映射的个数	$c_{u,v}^{w,d}\in\Lambda$，非负系数

为什么是 $\mathbb{P}^1$**？**：因为亏格 0 曲线（rational curves）在代数几何中特别重要——它们是最简单的非平凡复曲线，而且通过 $\mathbb{P}^1$ 可以用 Kontsevich 的稳定映射模空间很好地参数化。

UUu b_h **的思想如何迁移到** g_\9eH09 **的等变量子** ~H\«@0}§ **演算**

UUuou **问题**u Mihalcea 在论文中基于 Kim 的思想，将等变量子 Schubert 演算定义为分次 $\Lambda[q]$-代数。Kim 的核心思想是什么？Mihalcea 如何迁移这一思想？

UUu©u **回答**u b_h **的核心思想：提升环作用** rd_T§_jX §\0 ¦n}« 8H§_njs 。

Kim 在 1996 年的论文 P M 2[m B p ` B M i [m M i m K中的核心思想是：**把量子上同调的整套** h9H_j0}´ **提升到等变范畴**。具体而言：

(1) T**作用提升**：如果 torus T 作用在齐性空间 $X=G/P$ 上，这个作用自然地诱导出在 Kontsevich 稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X,d)$ 上的 T-作用。

(2) **等变评估映射**：评估映射 $ev_i : \overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X,d) \to X$ 是 T-等变的，因此可以把 X 上的等变 Schubert 类拉回到模空间。

(3) **等变** W}nhm@]¯_§§0j **不变量**：因为映射是等变的，得到的不是整数（普通量子上同调），而是 $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 中的多项式——即等变 Gromov-Witten 不变量。

(4) **结合性** r¯K-- **方程**s：Kim 证明了这些新的不变量满足 WDVV (Witten-Dijkgraaf-Verlinde-Verlinde) 方程，从而确保了 graded $\Lambda[q]$-代数上的量子杯积是结合的。

g_\9eH09 **的迁移方式**：Mihalcea 直接采用了 Kim 的这套 $\Lambda[q]$-代数框架作为他的 Schubert 演算的代数基础。Kim 的工作保证了：

- 等变 Gromov-Witten 不变量是定义良好的；
- 量子上积在 $\Lambda[q]$ 上是结合的；
- 结构常数（等变量子 Littlewood-Richardson 系数）$c_{u,v}^{w,d}$ 形成一个相干的环。

然后 Mihalcea 在这个代数存在性的基础上，**结合** W}9\9h **的几何横截性和投影公式**，来证明这些结构常数不仅存在，而且具有非负系数的正性 (positivity)。

核心洞察：Kim 的贡献是范畴化的提升（从整数到多项式），Mihalcea 的贡献则是利用这个提升的结构来证明正性。[18]

U£u x ^{d}

U£uou **问题**u $\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$ 这个公式中，q^d 是形式变量，q 是什么？求和是对什么？u, v, w 是什么？

U£u@u **回答**u q **和** q^d**：形式变量的含义**

q 是一个**形式变量**（Tn}h9e @9}_9@e0 ），它编码了”量子修正”的信息。在经典 Schubert 演算中，两个 Schubert 类的乘积只产生另一个 Schubert 类，系数是非负整数。但在量子版本中，乘积的结构更复杂——它不仅取决于 Schubert 类本身，还取决于曲线的**次数**（L0X}00 ）。

这里的 d 是**曲线类的多重次数**（h«e§_]L0X}00 ），而 q^d 是说”如果我们有次数为 d 的曲线，就带上 q^d 这个因子”。q^d 是形式变量——这意味着它不是一个要具体计算的数值，而是一个**符号标记**，用来追踪我们讨论的是哪种曲线。

求和的对象：

$$\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

求和是对：

- d：所有可能的曲线类次数（multi-degree）
- w：所有可能的 Schubert 类索引（Weyl 群元素）

u, v, w **的身份**：u, v, w 是 ?′e **群中的元素**（更准确地说，是 W^P——相对于抛子群 P 的 Weyl 群陪集代表元）。它们索引了：

- $\sigma(u)$：次数为 u 的 Schubert 类
- $\sigma(v)$：次数为 v 的 Schubert 类
- $\sigma(w)$：次数为 w 的 Schubert 类（出现在乘积结果中）

公式的整体含义：这个公式是说：两个 Schubert 类 $\sigma(u)$ 和 $\sigma(v)$ 的**量子乘积** ($\star$) 等于对所有次数 d 和所有 Weyl 群元素 w 求和，每一项是：

[18]问： E B K的思想如何迁移到 J B？ H +的2等变量子 a + ? m # 演算？见附录 **??**。

- q^d：形式变量，标记曲线次数
- $c_{u,v}^{w,d}$：**结构常数**，是 Mihalcea 论文中证明正性的对象，是 x_i 的非负系数多项式
- $\sigma(w)$：结果中的 Schubert 类

为什么需要形式变量 q？在代数几何中，量子上同调的”量子”体现在对曲线的计数上。不同次数的曲线贡献不同的 Gromov-Witten 不变量。q^d 就像一个”占位符”，让我们能把”次数为 d 的曲线贡献了多少”这件事形式化。整个表达式其实是一个**多项式环** $\mathbb{Z}[q_1, q_2, ...]$（每个 q_i 对应一个次数方向）中的等式。[19]

U¢u $QH_T^*(X)$ 分次 $\Lambda[q]$代数的定义与含义

U¢uou **问题**u $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$-代数，其 $\Lambda[q]$-基底为 $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$。这个定义是如何来的？是推导出来的吗？说明一下这是什么意思。

U¢u©u **回答**u **这首先是一个定义，不是从其他定理推导出来的**。

当我们说”$QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$-代数”，意思是：我们把 $QH_T^*(X)$ 配上这些结构（基底、乘法），然后研究它的性质。这不是从其他事实推导出来的，而是 Kim (1996) 根据几何动机主动赋予的结构。

逐层拆解定义的含义：

成分	含义
$QH_T^*(X)$	等变量子量子上同调环
Λ	$H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$，torus 等变上同调（多项式环）
q	量子修正的形式变量
$\Lambda[q]$	系数在 Λ 中、添加了 q 变量的多项式环
$\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$	基底——每个 Weyl 群陪集代表元 w 对应一个 Schubert 类
分次	乘法保持次数：$\deg(\sigma(u) \circ \sigma(v)) = \deg(\sigma(u)) + \deg(\sigma(v))$

基底 $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ 的含义：W^P 是相对于抛子群 P 的 Weyl 群陪集代表元集合。每个元素 $w \in W^P$ 对应旗流形 $X = G/P$ 中的一个 Schubert 细胞，从而有一个 Schubert 类 $\sigma(w)$。这些类在 $H_T^*(X)$ 中线性无关，构成一组基。

定义的来源（从哪来）：这个定义是 Kim (1996) 提出的，他认识到：

(1) **经典上同调** $H^*(X)$ 以 Schubert 类为基，乘法是相交的计数
(2) **等变上同调** $H_T^*(X)$ 把系数从 $\mathbb{Z}$ 提升到 $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$（torus 作用参数）
(3) **量子上同调** $QH^*(X)$ 把系数环扩展到 $\mathbb{Z}[q]$（量子修正）

Kim 的创新：把这三个结构**合并**——同时考虑 torus 参数 x_i 和量子修正 q，得到 $\Lambda[q]$-代数结构。

乘法的定义：定义中最关键的是乘法公式：

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

这里的 $c_{u,v}^{w,d}$ 是等变量子量子 Littlewood-Richardson 系数，正是 Mihalcea 证明正性的对象。[20]

UPu ~HW«@0}§ 类 $\sigma(w)$ 的含义

UPuou **问题**u 在 Schubert 演算中，$\sigma(w)$ 是什么意思？例如 $\sigma(1) = 1$（单位类）和 $\sigma(s_1) =$ [点]（超平面类）。

[19]问：q^d 是形式变量是什么意思？见附录 **??**。
[20]问：$QH_T^*(X)$ 分次 $\Lambda[q]$ 代数是什么？见附录 **??**。

UPu@u **回答**u $\sigma(w)$ 表示与 Weyl 群元素 w 对应的 ~H\«@0}§ **上同调类**（Schubert cohomology class）。

核心要点：

(1) **每个** $w \in W$ **对应一个** $\sigma(w)$：Weyl 群 W 中的每个元素 w 唯一确定一个 Schubert 类 $\sigma(w)$，它们构成上同调环 $H^*(X)$ 的一组基

(2) $\sigma(1) = 1$ **是单位元**：对应 Weyl 群单位元的类就是上同调环的单位元

(3) $\sigma(s_1)$ **是超平面类**：在具体情形 $\mathrm{Gr}(1,2) = \mathbb{P}^1$ 中，对应换位 s_1 的类就是超平面类（即一个点）

直观理解：Schubert 类本质上是对旗流形中特定 Schubert 胞腔的几何刻画——每个胞腔对应一个代数类，乘法结构由胞腔的相交关系决定。[21]

Uku 当 $d = 0$ 时退化为等变上同调的推导

Ukuou **问题**u 为什么当 $d = 0$ 时，量子乘积公式 $\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$ 退化为等变上同调 $H_T^*(X)$（对应 Graham positivity）?

Uku@u **回答**u **退化推导**：

从量子乘积公式出发：

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

当 $d = 0$ 时：

(1) $q^0 = 1$（任何数的 0 次方等于 1）

(2) 求和简化为：

$$\sigma(u) \circ \sigma(v)\big|_{d=0} = \sum_w c_{u,v}^{w,0} \sigma(w)$$

(3) 这里的 $c_{u,v}^{w,0}$ 是等变 Littlewood-Richardson 系数（即 Graham 情形），即：

$$\sigma(u)^T \cdot \sigma(v)^T = \sum_w c_{u,v}^{w} \sigma(w)^T$$

几何含义：

- $d = 0$ 表示**没有曲线**（zero-degree curves，即点）
- 没有曲线 → 计数的是**经典几何相交**
- 经典几何相交 → 正好是等变上同调中的 Schubert 类相交

所以 $d = 0$ 的退化表示" 没有量子修正"，回到了纯粹的等变几何。[22]

£·u 乘积公式的完整推导

£·uou **问题**u 乘积公式的完整推导见正文哪里?

£·u@u **回答**u 乘积公式的完整推导见 yy （即 chapter2.tex 第 299 页开始的附录部分）。

£ou p9§\ 图的详细定义与权重公式

£ouou **问题**u Path 图的详细定义与权重公式见正文哪里?

---

[21] 问：$\sigma(w)$ 是什么意思？见附录 **??**。

[22] 问：为什么 $d = 0$ 时退化为等变上同调？见附录 **??**。

£ou©u **回答**u Path 图的详细定义与权重公式见 yy （即 chapter2.tex 第 356 页开始的附录部分）。

£©u Knh_j9j§ 8qq}n²_h9§_nj 的完整证明

£©uou **问题**u Dominant approximation 的完整证明见正文哪里?

£©u©u **回答**u Dominant approximation 的完整证明见 yy （即 chapter2.tex 第 393 页开始的附录部分）。

£¨u g_\9eH09 论文 $Gr(2,4)$ 例子的详细解释

£¨uou **问题**u 请详细解释 Mihalcea 论文中关于 $Gr(2,4)$ 的例子（chapter4.tex 第 143-156 行），用最简单的语言说明：

(1) $Gr(2,4)$ 是什么？为什么叫 Grassmannian?
(2) $W = S_4$ 是什么？最短代表元是什么意思？为什么有 6 个?
(3) $u = s_1$, $v = s_3$ 是什么？σ 是什么?
(4) 乘积 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 是什么意思?
(5) 右边两项 $\sigma(s_1 s_3)$ 和 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 各自代表什么几何意义?
(6) 为什么要验证 $x_2 - x_3$ 是" 非负系数"? 这为什么重要?
(7) 量子修正项 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 中的 q 是什么？q 记录曲线的同调类是什么意思?

£¨u©u 回答u ou $Gr(2,4)$ 是什么？

- $Gr(2,4)$ 是所有 2 维平面构成的空间。想象在 4 维空间（4 维坐标系）中，所有可能的 2 维平面的" 集合" 就是 $Gr(2,4)$。
- 叫 Grassmannian 是为了纪念德国数学家 Hermann Grassmann，他是线性几何的先驱。
- 类比：$Gr(1,3)$ = 所有直线构成的空间 = $\mathbb{P}^2$（射影平面）；$Gr(2,4)$ = 所有 2 维平面构成的空间。
- $Gr(2,4)$ 是一个紧致流形（没有边界闭合的" 弯曲" 空间）。

©u $W = S_4$ 是什么？最短代表元是什么？为什么有 £ 个？

- S_4 是 4 个物体的对称群，包含所有对 $\{1,2,3,4\}$ 的置换，总共有 $4! = 24$ 个元素。
- 生成元是 $s_1 = (12)$, $s_2 = (23)$, $s_3 = (34)$（相邻置换）。
- 每个置换都可以用这些 s_i 的乘积表示，但有些写法更长，有些更短。**最短代表元**就是用最少的生成元表示的置换。
- 6 个最短代表元对应 $Gr(2,4)$ 上的 6 个 Schubert 类。

¨u $u = s_1$J $v = s_3$ 是什么？σ 是什么？

- $s_1 = (12)$ 和 $s_3 = (34)$ 是 Weyl 群的简单反射（相邻置换），它们之间隔着 s_2，所以不相邻。
- σ 是 Schubert 类，与置换 w 相关联的上同调类，可以理解为一种" 测量" 几何对象的方式。

Vu 乘积 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 是什么意思？

- 乘法 $\circ$ 表示 Schubert 类的乘法（杯积，cup product）。
- $\sigma(s_1)$ 对应" 满足某个几何条件的平面", $\sigma(s_3)$ 对应" 满足另一个几何条件的平面"。
- $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 问的是" 同时满足两个条件的平面有多少？"

Vu 两项 $\sigma(s_1 s_3)$ 和 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 各自代表什么？

- $\sigma(s_1s_3)$：**普通项**，s_1s_3 表示先做 s_1 置换再做 s_3 置换。几何意义：两个条件在同一条直线上同时满足的交集。
- $(x_2-x_3)q\sigma(1)$：**量子修正项**，$\sigma(1)$ 是单位元。几何意义：两个条件通过一条曲线连接满足。

£u **为什么要验证 x_2-x_3 是Ÿ 非负系数Ÿ ？**

- Mihalcea positivity 的核心结论：量子 Schubert 演算的系数必须是关于负根的非负整数系数多项式。
- x_i-x_j（当 $i<j$ 时）是负根，所以 x_2-x_3 是负根。
- **非负系数**保证了几何可解释性——如果系数是负数，就无法解释为" 计数几何对象"。
- 这里 x_2-x_3 的系数是 1（正的），验证了 Mihalcea positivity 确实成立。

¢u **q 是什么？Ÿ 记录曲线的同调类Ÿ 是什么意思？**

- q 是量子参数，**标记曲线的同调类**。
- 同调类是对空间中的" 孔" 或" 圈" 的分类。比如 $\mathbb{P}^1$ 的基本群是 $\mathbb{Z}$（整数）。
- 在量子几何中，两个条件可以通过曲线连接，而不仅仅是直接相交。q 标记了这条曲线的类型（它的同调类）。
- $(x_2-x_3)q\sigma(1)$ 表示：存在一条由 q 标记的曲线，它" 修复" 了普通乘法中缺失的部分。

几何直觉总结：这个例子展示了等变量子上同调中量子修正的机制。普通乘法 $\sigma(s_1s_3)$ 给出直观的交集计数；量子修正项 $(x_2-x_3)q\sigma(1)$ 考虑了通过曲线连接的情况——这反映了量子场论的思想：粒子可以通过虚粒子云（曲线）相互作用。

£Vu 稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X,d)$ 的定义

£Vuou **问题**u $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X,d)$ 是什么？每个符号的含义是什么？为什么要有紧化？什么是评估映射 ev_i？能举一个 $\mathrm{Gr}(2,4)$ 的具体例子吗？

£Vu©u **回答**u $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X,d)$ **是稳定映射的模空间（** §9@e0 h9q hmL«e_ q9H0 **）**，这是量子上同调理论中的核心几何对象。

一、下标 · 和 ¨ 的含义

下标描述的是域曲线的拓扑性质：

- 0：域曲线的算术亏格（arithmetic genus）。亏格 0 的曲线是**有理曲线**。若光滑则同构于 $\mathbb{P}^1$；若不光滑，则是若干个 $\mathbb{P}^1$ 通过节点连成的" 树"（tree of $\mathbb{P}^1$'s joined at nodes）。
- 3：曲线上的 3 个**有序标记点**（marked points）x_1,x_2,x_3，它们必须位于曲线的光滑点上（不能位于节点）。

二、上划线 $\overline{\mathcal{M}}$ 的含义——为什么需要紧化？

若只考虑光滑曲线的映射模空间 $\mathcal{M}_{0,3}(X,d)$，则一般**不是紧的**（不 proper）。序列的光滑曲线映射可以退化（degenerating），导致无法在其上做积分。

bnj§ 0@_H\ **紧化（**okkU **）**：通过添加" 边界除子"（boundary divisors）来让空间 proper。边界除子由**结点曲线**（nodal curves）上的稳定映射组成。这使得我们可以对空间做积分、提取 Gromov-Witten 不变量。

三、稳定映射的严谨定义

由于上述紧化，$\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X,d)$ 中的稳定映射不一定来自光滑 $\mathbb{P}^1$。一个稳定映射是一个 tuple：

$$(C,x_1,x_2,x_3,f)$$

其中：

(1) C 是连通、投影、约化曲线，亏格 0，最多节点奇点；
(2) x_1, x_2, x_3 是 C 上 3 个不同的光滑点；
(3) $f : C \to X$ 是代数簇之间的态射；
(4) $f_*[C] = d \in H_2(X, \mathbb{Z})$（同调类条件）；
(5) **稳定性条件**：映射 f 的自同构群必须有限。

稳定性条件的具体含义：若某个不可约分支 $E \cong \mathbb{P}^1$ 被 f 收缩到 X 中一个点（$f(E) = \mathrm{pt}$），则 E 必须至少含 3 个**特殊点**（特殊点 = 标记点或与其他分支相交的节点）。这排除了”幽灵分支”（ghost component）——即没有足够结构来固定自身的无用分支。

四、评估映射 ev_i 的定义

评估映射是连接模空间与目标空间的桥梁：

$$ev_i : \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \to X$$

$$ev_i([C, x_1, x_2, x_3, f]) = f(x_i)$$

它将稳定映射的同构类打到 X 中第 i 个标记点的像。在量子上同调中，我们利用这些映射从 X 上拉回上同调类（如 Schubert 类），在模空间上做杯积，然后推送向前以计数曲线。

五、具体例子：$\mathrm{Gr}(2, 4)$

设 $X = \mathrm{Gr}(2, 4)$（2 维平面在 $\mathbb{C}^4$ 中，几何上对应 $\mathbb{P}^3$ 中的线）。此时 $H_2(\mathrm{Gr}(2, 4), \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$。看 degree $d = 1$ 的情形：

内部（光滑情形）：一个点是光滑 $\mathbb{P}^1 \cong C$ 到 $\mathrm{Gr}(2, 4)$ 的 1 次映射。1 次曲线在 $\mathrm{Gr}(2, 4)$ 中是一条线（line）。在 Plücker 嵌入下，这对应 $\mathbb{P}^3$ 中过单点的线束。映射 $f : \mathbb{P}^1 \to \mathrm{Gr}(2, 4)$ 同构地打到这条线。

边界（退化情形）：域曲线退化为两个分支 $C = C_A \cup C_B$，由一个节点连接。总度数必须为 1，因此：

- C_A 映射度 1，打到 $\mathrm{Gr}(2, 4)$ 中一条线；
- C_B 映射度 0（收缩到一点 $p \in \mathrm{Gr}(2, 4)$，即节点处 f 的像）。

由稳定性条件：C_B 被收缩，所以必须至少含 3 个特殊点。它已有 1 个节点，因此必须至少含 2 个标记点。比如 $x_1, x_2 \in C_B$，而 $x_3 \in C_A$。

在 Nwd| 系数中的作用：EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 计数的是满足以下条件的稳定映射个数：

$$c_{u,v}^{w,d} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \widetilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}$$

其中评估映射 $ev_i : \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \to X$ 记录了 $f(x_i)$ 落在哪个 Schubert 胞腔中。

£Uu w_0 的反转作用与 $I(w_0w)$ 的含义

£Uuou **问题u** $I(w_0w)$ 在数学上有什么内涵吗？是不是 w_0 会把 w 反转？

£Uu©u **回答u 是的，w_0 确实会Ÿ 反转Ÿ 置换。**

在对称群 S_n 中，最长元 w_0 定义为：

$$w_0 = (n, n-1, \ldots, 2, 1)$$

它将每个位置 i 映射到 $w_0(i) = n - i + 1$——确实是把序列完全颠倒。

$I(w)$ 和 $J(w)$ 的含义：

$I(w)$ 表示置换 w 的反转集（inversion set）：

$$I(w) = \{(i, j) : i < j \text{ 且} w(i) > w(j)\}$$

而 $J(w) = I(w_0 w)$ 表示非反转集（complement）：

$$J(w) = \{(i,j) : i < j \text{ 且} w(i) < w(j)\}$$

验证例子：设 $w = 213$（即 $w(1) = 2, w(2) = 1, w(3) = 3$）：

- $w_0 w$：先 w 再 $w_0 \to w_0(213) = (3,2,1)$（完全反转）
- $I(w) = \{(1,2)\}$（因为 $2 > 1$）
- $I(w_0 w) = I(321) = \{(1,2),(1,3),(2,3)\}$（所有对都是反转）
- $J(w) = \{(2,3)\}$（因为 $1 < 3$）

为什么 $I(w_0 w)$ 是Ÿ 非反转Ÿ ?：

因为 $w_0(i) > w_0(j) \iff i < j$，所以：

- $I(w_0 w)$ 中的条件 $w_0 w(i) > w_0 w(j)$ 变成 $w(i) < w(j)$
- 这恰好是" 顺序对" 而非" 反转对"

w_0 **的代数性质**：在 Weyl 群中，w_0 是一个特殊的对合（involution），满足 $w_0^2 = e$（恒等变换）。它的作用是反转偏序。对于 S_n，w_0 将每个排列反转为" 逆序" 排列。因为 $w_0^2 = e$，所以 $I(w_0(w_0 w)) = I(w)$——两次反转回到原点。[23]

££u 什么是三重舒伯特演算？

问题 ££uou 三重舒伯特演算（Triple Schubert Calculus）是什么？它和普通/双重的 Schubert 演算有什么不同？为什么需要三组变量？

回答 ££u©u **核心区别在于参与相交的** ~ℍ\«@0}§ **簇的数量：**

普通 ~ℍ\«@0}§ **演算**（单变量 $\mathbf{x}$）：研究旗流形 G/B 中两个 Schubert 簇 $X(u), X(v)$ 的相交。展开式为 $S_u(\mathbf{x}) \cdot S_v(\mathbf{x}) = \sum_w c_{u,v}^w S_w(\mathbf{x})$，系数 $c_{u,v}^w$ 是非负整数（点的相交个数）。

双重 ~ℍ\«@0}§ **演算**（双变量 $\mathbf{x};\mathbf{y}$）：引入等变修正，$\mathbf{y}$ 记录 torus 作用的位移。展开式为 $S_u(\mathbf{x};\mathbf{y}) \cdot S_v(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y},\mathbf{t}) S_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$，系数是关于 $t_i - y_j$ 的多项式。

三重 ~ℍ\«@0}§ **演算**（三变量 $\mathbf{x};\mathbf{y};\mathbf{t}$）：研究三个 Schubert 类的乘积 $S_u \cdot S_v \cdot S_w$，几何上是三类 Schubert 胞腔的相继相交。三组变量分别记录三次位移。

为什么需要三组变量？：在旗流形中，三类 Schubert 簇 $X(u), Y(v), Z(w)$（分别相对于三个不同 Borel 子群 B, B^-, B'）的相继相交产生三个方向的 torus 位移。三组变量 $(\mathbf{x};\mathbf{y};\mathbf{t})$ 正是记录这三次位移的代数工具。[24]

£¢u 投影公式（p}na0H§_nj Sn}h«e9 ）详解

问题 £¢uou 什么是投影公式（projection formula）？它和上同调中的 pullback (f^*)、pushforward (f_*) 有什么关系？为什么说它把 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X,d)$ 上的问题归约到 $X \times X$？

回答 £¢u©u **一、投影公式的严谨陈述**

设 $f : X \to Y$ 是光滑投影代数簇之间的适当态射（proper morphism）。记 $H^*(X)$、$H^*(Y)$ 为上同调环（系数通常取 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{C}$）。

关键观察：f^* 诱导 $H^*(X)$ 成为 $H^*(Y)$-模。投影公式指出：

$$f_*(f^*(\beta) \cup \alpha) = \beta \cup f_*(\alpha)$$

其中 $\alpha \in H^*(X)$，$\beta \in H^*(Y)$。

换句话说，f_* 是一个 $H^*(Y)$]**模同态**。

二、 p«ee@9Hc r f^*s ® p« \Tn}°9}L r f_*s **的对比**

---

[23]问：w_0 的反转作用是什么？$I(w_0 w)$ 是什么意思？见附录 **??**。

[24]问：三重舒伯特演算是什么？见附录 **??**。

	f^*（拉回）	f_*（前推）
名称	环同态	Gysin map
类型	环同态（保持杯积）	群同态（非环同态）
保持杯积？	✓ $f^*(\beta_1 \cup \beta_2) = f^*(\beta_1) \cup f^*(\beta_2)$	× 一般不行
度数变化	$H^k(Y) \to H^k(X)$（不变）	$H^k(X) \to H^{k-\dim X+\dim Y}(Y)$（改变）

三、为什么需要投影公式？

因为 f_* 不是环同态，一般情况下：

$$f_*(\alpha \cup \gamma) \neq f_*(\alpha) \cup f_*(\gamma)$$

但当我们知道其中一个类来自目标空间 Y（即 $\gamma = f^*(\beta)$）时，投影公式给出了正确的乘法公式。

四、在量子上同调中如何归约问题？

3 点 Gromov-Witten 不变量 $\langle \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \rangle_{0,3,d}$ 计数的是：满足特定条件的亏格 0 稳定映射 $f : \mathbb{P}^1 \to X$ 的个数。

直接计算很困难，因为 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 的结构非常复杂。归约策略如下：

(1) 通过评估映射 $ev_i : \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \to X$，把 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 上的相交问题拉回到 X 上
(2) 利用投影公式，将问题前推到 $X \times X$ 上
(3) 在 $X \times X$ 上，我们实际上是在做标准的上同调杯积——这是我们熟悉的 Graham positivity 已经解决的问题

用人话讲：把在" 迷宫" （$\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$）里找路，变成在" 大路" （$X \times X$）上走路。投影公式告诉你：只要你知道" 大路" 上的走法（Graham positivity），就能推断出迷宫里的走法（EQLR 系数）。

几何直觉：评估映射 $ev_3 : \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \to X$ 把稳定映射打到目标空间中的第三个标记点的像。然后我们问：这个像落在哪个 Schubert 胞腔里？通过 pushforward（ev_{3*}）把这些信息收集起来，就得到了 EQLR 系数。

£Pu ¦n}« 作用为何产生 x_i 多项式？量子修正的含义

£Puou **问题**u 这一认识的关键在于：我们可以同时考虑 torus 作用（产生 x_i 多项式）和量子修正（产生 q 变量）。这里 torus 作用为什么对应的是 x_i 多项式？为什么量子修正产生 q 变量？这个修正到底是什么含义？

£Pu©u **回答**u ou ¦n}« **作用为何产生 x_i 多项式？**

极大环面 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^r$ 作用在旗流形 $X = G/P$ 上。在等变上同调 $H_T^*(X)$ 中，基础环（系数环）是 $H_T^*(pt) = \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$，其中每个 x_i 对应 T 的一个无穷小生成元，本质上对应负单根 $-\alpha_i$。

当在等变框架下做 Schubert 理论时，结构常数 $c_{u,v}^w$ 不再是简单的整数，而是 Λ 中的多项式。这是因为在 homotopy quotient $X \times_T ET$ 上而非直接在 X 上进行相交运算。T 的参数化（由 r 个权重参数 $x_1, \ldots, x_r$ 描述）使得系数成为关于这些参数的多项式。多项式的次数由 Weyl 群的长度差 $\ell(u) + \ell(v) - \ell(w)$ 决定。

©u **量子修正的具体含义**：

普通量子上同调 $QH^*(X)$ 引入曲线计数的概念。在经典情形，结构常数 $c_{u,v}^w$ 只计数两个 Schubert 类相交得到的第三个 Schubert 类——这是点的相交（零维）。但在量子情形，我们要问：经过两个 Schubert 类交点的曲线，有多少条通过给定的一般点？

这种曲线计数引入了一个形式变量 q。在公式

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

中，d 是曲线的多次数（multi-degree），q^d 是相应的形式变量。当 $d=0$ 时，$q^0=1$，退回到普通等变上同调（点的相交）；当 $d\neq 0$ 时，q^d 记录了曲线的贡献。

¨u 为什么说等变量子上同调是 õ 公共母体Ÿ ？

等变量子上同调 $QH_T^*(X)$ 同时包含两个自由度：x_i（来自 torus 作用）和 q（来自量子修正）。这意味着它同时推广了：

- 等变上同调（当 $q=0$ 时）——对应 Graham positivity
- 普通量子上同调（当 $x_i=0$ 时）——对应普通量子结构常数

这就是 Kim 的核心洞察：等变量子上同调不是两个独立理论的简单组合，而是一个统一框架。x_i encode 了" 在哪一点附近做相交" 的信息（torus 固定的权重），而 q 变量 encode 了" 用多少维的曲线" 来做相交的信息。前者是空间位置，后者是拓扑维数。

£ku 当 $x_i=0$ 时退化为普通量子上同调的机制

£kuou 问题u 在 yy 中提到" 当所有 $x_i=0$ 时，退化为普通量子上同调（quantum cohomology）$QH^*(X)$。" 为什么会有这个退化？请解释其中的数学机制。

£ku©u 回答u ou x_i 的数学含义（作为负根的坐标）

在等变量子上同调中，x_i 是负单根（negative simple roots）的坐标：

$$\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1,\dots,x_r]$$

其中 x_i 对应负单根 $-\alpha_i$。这来自以下事实：

- $H_T^*(pt)=H^*(BT)$，其中 BT 是分类空间
- $H^*(BT)\cong\mathbb{Z}[t_1,\dots,t_r]$，每个 t_i 对应 torus $T\cong(\mathbb{C}^\times)^r$ 的一个权
- 在 Schubert 演算的记号中，我们通常取 $x_i=-\alpha_i$（负根），这使得正性结论更自然

©u 等变量子上同调 $QH_T^*(X)$ 的结构

等变量子上同调 $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$-代数：

- 基础环：$\Lambda[q]=\mathbb{Z}[x_1,\dots,x_r;q_1,\dots,q_{n-1}]$
- 基底：$\{\sigma(w)\mid w\in W^P\}$（Schubert 类）
- 乘法：$\sigma(u)\circ\sigma(v)=\sum_d\sum_w q^d c_{u,v}^{w,d}\sigma(w)$
- 结构常数：$c_{u,v}^{w,d}\in\Lambda=\mathbb{Z}[x_1,\dots,x_r]$ 是多项式

¨u 当 $x_i=0$ 时发生了什么？

当我们令所有 $x_i=0$ 时，相当于取张量积：

$$QH_T^*(X)\otimes_\Lambda\mathbb{Z}=QH_T^*(X)/\langle x_1,\dots,x_r\rangle$$

这相当于在 Kim 的结构定理（yy ）中取以下同构：

$$A/\langle\Lambda^+\cdot A\rangle\simeq QH^*(X)$$

其中 $\Lambda^+\subset\Lambda$ 是由正次数元素（即所有 x_i）生成的真理想。

Vu 为什么这对应于Ÿ 忘掉Ÿ 了 §n}« 作用？

几何直觉：

- 等变量子上同调 $H_T^*(X)=H^*(X\times_T ET)$ 是 lift 到 homotopy quotient 上的类
- 当在 $H_T^*(X)\otimes_{\mathbb{Z}[x_1,\dots,x_r]}\mathbb{Z}$ 中令 $x_i=0$ 时
- 相当于从商空间 $X\times_T ET$ 退回原始空间 X
- 这正是" 忘掉" torus 作用的几何操作

代数解释：

- 在等变量子上同调中，结构常数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是 x_i 的多项式

- 当 $x_i = 0$ 时，多项式 $c_{u,v}^{w,d}$ 退化为整数 $c_{u,v}^{w,d}\big|_{x_i=0}$
- 这正是普通量子上同调中的结构常数

𝕦 **具体例子：**$\mathbb{P}^1$

设 $X = \mathbb{P}^1$，则：

- $T = \mathbb{C}^\times$ 作用在 $\mathbb{P}^1$ 上
- $H_T^*(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}[x][H]/(H^2 = xH)$，其中 H 是超平面类，x 是负根参数
- 等变量子量子上同调乘法：$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1)$

当 $x = 0$ 时：

- 关系变为 $H^2 = 0$（这是普通 $\mathbb{P}^1$ 的上同调关系）
- q 参数保留，得到普通量子上同调 $QH^*(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}[q][H]/(H^2 = q)$

总结：$x_i = 0$ 的退化本质上是将系数环从 $\Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 替换为 $\mathbb{Z}$（通过取商），这相当于在几何上从 homotopy quotient $X \times_T ET$ 退回原始空间 X，从而”忘掉”了 torus 作用，只保留量子修正结构。[25]

[25]问：为什么 $x_i = 0$ 时退化为普通量子上同调？见附录 **??**。