

第二节

多元函数的偏导数

- 一、偏导数的概念
- 二、偏导数的计算
- 三、偏导数的几何意义
- 四、高阶偏导数

一、偏导数的概念

1.引例 弦线的振动问题.
研究弦在点 x_0 处的振动速度与加速度, 就是将振幅 $u(x, t)$ 中的 x 固定于 x_0 处, 求 $u(x_0, t)$ 关于 t 的一阶导数与二阶导数.



目录

上页

下页

返回

结束

2. 定义8.6 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域 $U(P_0)$ 内有定义. 若当固定 y 在 y_0 , $z = f(x, y_0)$ 在 $x = x_0$ 处的导数存在, 即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称此极限为 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数, 记为

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}; \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}; z_x|_{(x_0, y_0)}; f_x(x_0, y_0).$$

目录

上页

下页

返回

结束

注 $f_x(x_0, y_0)$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \frac{d}{dx} f(x, y_0) \Big|_{x=x_0}$$

同样可定义 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 对 y 的偏导数

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

$$= \frac{d}{dy} f(x_0, y) \Big|_{y=y_0}$$

记为 $\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)}$; $\frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)}$; $z_y \Big|_{(x_0, y_0)}$; $f_y(x_0, y_0)$.

目录

上页

下页

返回

结束

注 1° 偏导函数

若函数 $z = f(x, y)$ 在域 D 内每一点 (x, y) 处对 x 的 (或 y) 偏导数都存在, 称该偏导数为 $z = f(x, y)$ 对自变量 x (或 y) 的偏导函数, 也简称为偏导数, 记为

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial x}, z_x, f_x(x, y), f'_1(x, y)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial y}, z_y, f_y(x, y), f'_2(x, y)$$

[目录](#)[上页](#)[下页](#)[返回](#)[结束](#)

由此可知: $f_x(x_0, y_0) = f_x(x, y)|_{(x_0, y_0)}$

$$f_y(x_0, y_0) = f_y(x, y)|_{(x_0, y_0)}$$

2° 偏导数的概念可以推广到二元以上函数

例如: 三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 (x, y, z) 处对 x 的偏导数定义为

$$f_x(x, y, z) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + \Delta \mathbf{x}, y, z) - f(\mathbf{x}, y, z)}{\Delta x}$$

$$f_y(x, y, z) = ?$$

$$f_z(x, y, z) = ? \quad (\text{请自己写出})$$

目录

上页

下页

返回

结束

3° 可(偏)导

若 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数 $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 均存在, 则称 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可(偏)导.

4° 偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 是一个整体记号, 不能拆分

$$\frac{\partial z}{\partial x} \neq \frac{\partial z}{\partial x}$$

目录

上页

下页

返回

结束

例1 一定量理想气体的状态方程 $pV = RT$

(R 为常数), 求证: $\frac{\partial p}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial p} = -1$

证 $p = \frac{RT}{V}, \quad \frac{\partial p}{\partial V} = -\frac{RT}{V^2}$

$$V = \frac{RT}{p}, \quad \frac{\partial V}{\partial T} = \frac{R}{p}$$

$$T = \frac{pV}{R}, \quad \frac{\partial T}{\partial p} = \frac{V}{R}$$

$$\therefore \frac{\partial p}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial p} = -\frac{RT}{pV} = -1$$

说明: 此例表明,
偏导数记号是一个
整体记号, 不能看作
分子与分母的商!

目录

上页

下页

返回

结束

5° 若 $f(x, y_0)$ 为分段函数, 分段点为 x_0 ,
则求 $f_x(x_0, y_0)$ 时, 须用偏导数定义.

3. 偏导数存在与连续的关系

对于一元函数: 可导 $\xrightarrow{\text{绿色}} \xleftarrow{\text{红色}}$ 连续

对于多元函数: 可(偏)导 $\xrightarrow{\text{绿色}} \xleftarrow{\text{红色}}$ 连续

目录

上页

下页

返回

结束

例2 证明：函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0,0)$ 点连续，
但两个偏导数均不存在。

证 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta \leq \varepsilon$,

则当 $\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} \text{便有 } & \left| \sqrt{x^2 + y^2} - \sqrt{0^2 + 0^2} \right| \\ &= \sqrt{x^2 + y^2} < \delta \leq \varepsilon, \end{aligned}$$

故函数在点 $(0,0)$ 处连续。

目录


上页

下页

例2-1

继续

$$\begin{aligned} \text{但 } & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} \end{aligned}$$



此极限不存在，故函数在 $(0,0)$ 点处关于自变量 x 的偏导数不存在。

同理,关于自变量 y 的偏导数也不存在。

注 对于二元函数：可偏导 \nleftrightarrow 连续

目录

上页

下页

返回

结束

例3 设 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases},$

求 $f_x(0,0)$, $f_y(0,0)$, 并讨论 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的连续性.

解(方法1) $f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x}$
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x \cdot 0}{\sqrt{x^2 + 0}} - 0}{x} = 0$$

同理可求得 $f_y(0,0) = 0$.

目录

上页

下页

返回

结束

$$\begin{aligned}\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx \rightarrow 0}} f(x, y) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot kx}{x^2 + (kx)^2} = \frac{k}{1 + k^2}\end{aligned}$$

其值随 k 的不同而变化,

$$\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2} \text{ 不存在.}$$

从而 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 并不连续!

目录

上页

下页

返回

结束

$$\text{(方法2)} \quad z = f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore f(x, 0) \equiv 0, \quad f(0, y) \equiv 0,$$

$$\therefore f_x(0, 0) = \left. \frac{d}{dx} f(x, 0) \right|_{x=0} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \left. \frac{d}{dy} f(0, y) \right|_{y=0} = 0$$

注 对于二元函数：可偏导 \rightarrow 连续

目录

上页

下页

返回


结束

二、偏导数的计算

由偏导数的定义可知，偏导数的计算可归结为一元函数的导数计算.

$$f_x(x_0, y_0) = \frac{d}{dx} f(x, y_0) \Big|_{x=x_0}$$

$$f_y(x_0, y_0) = \frac{d}{dy} f(x_0, y) \Big|_{y=y_0}$$



求某个具体的点处的偏导数时方便

目录

上页

下页

返回

结束

例4 求 $z = x^2 + 3xy + y^2$ 在点 $(1, 2)$ 处的偏导数.

解(方法1) **先求后代**

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 3y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 3x + 2y$$

$$\therefore \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,2)} = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 8,$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 7$$

目录

上页

下页

返回

结束

(方法2)

先代后求

$$z|_{y=2} = x^2 + 6x + 4$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(1,2)} &= \frac{dz(x,2)}{dx}\bigg|_{x=1} = \frac{d}{dx}(x^2 + 6x + 4)\bigg|_{x=1} \\ &= (2x + 6)\bigg|_{x=1} = 8\end{aligned}$$

$$z|_{x=1} = 1 + 3y + y^2$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y}\bigg|_{(1,2)} &= \frac{dz(1,y)}{dy}\bigg|_{y=2} = \frac{d}{dy}(1 + 3y + y^2)\bigg|_{y=2} \\ &= (3 + 2y)\bigg|_{y=2} = 7\end{aligned}$$

目录

上页

下页

返回

结束

例5 设 $z = x^y$ ($x > 0$, 且 $x \neq 1$), 求证

$$\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial z}{\partial y} = 2z$$

证 $\because \frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{x}{y} yx^{y-1} + \frac{1}{\ln x} x^y \ln x \\ &= x^y + x^y = 2z \end{aligned}$$

目录

上页

下页

例题

结束

例6 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$

求 $f(x, y)$ 的偏导数.

解 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 有

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \frac{2xy(x^4 + y^2) - x^2 y \cdot 4x^3}{(x^4 + y^2)^2} \\ &= \frac{2xy(y^2 - x^4)}{(x^4 + y^2)^2} \end{aligned}$$

目录

上页

下页

例6-1

继续

$$f_y(x,y) = \frac{x^2(x^4 + y^2) - x^2y \cdot 2y}{(x^4 + y^2)^2}$$

$$= \frac{x^2(x^4 - y^2)}{(x^4 + y^2)^2}.$$

当 $(x,y) = (0,0)$ 时, 由偏导数的定义得

$$f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0,$$

$$f_y(0,0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta y} = 0.$$

目录

上页

下页

返回

结束

于是

$$f_x(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy(y^2 - x^4)}{(x^4 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

$$f_y(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2(x^4 - y^2)}{(x^4 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

目录

上页

下页


返回

结束

三、偏导数的几何意义

设 $M_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 为曲面 $z = f(x, y)$ 上一点,

$$\begin{aligned}\tan \alpha &= \left. \frac{df(x, y_0)}{dx} \right|_{x=x_0} \\ &= f_x(x_0, y_0)\end{aligned}$$



目录

上页

下页

返回


结束

$$\tan \beta = f_y(x_0, y_0) = \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y) \right|_{y=y_0}$$

是曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ x = x_0 \end{cases}$

在点 M_0 处的切线 M_0T_y

对 y 轴的斜率.



目录

上页

下页

返回

结束

例7 求曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{1+x^2+y^2}, \\ x = 1, \end{cases}$

在点 $(1,1,\sqrt{3})$ 处的切线与 y 轴正向的夹角 β

解 根据偏导数的几何意义, 有

$$\begin{aligned} \tan \beta &= \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}} = \left. \frac{2y}{2\sqrt{1+x^2+y^2}} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{故} \quad \beta = \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

目录

上页

下页

返回

结束

四、高阶偏导数

设 $z = f(x, y)$ 在域 D 内存在连续的偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_x(x, y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f_y(x, y)$$

若这两个偏导数仍存在偏导数, 则称它们是

$z = f(x, y)$ 的二阶偏导数. 按求导顺序不同,

有下列四个二阶偏导数:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x, y); \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x, y); \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x, y)$$

目录

上页

下页

返回

结束

类似可以定义更高阶的偏导数.

例如, $z = f(x, y)$ 关于 x 的三阶偏导数为

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right) = \frac{\partial^3 z}{\partial x^3}$$

$z = f(x, y)$ 关于 x 的 $n-1$ 阶偏导数, 再关于 y 的一阶偏导数为

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^{n-1} z}{\partial x^{n-1}} \right) = \frac{\partial^n z}{\partial x^{n-1} \partial y}$$

目录

上页

下页

返回

结束

例8 求函数 $z = e^{x+2y}$ 的二阶偏导数及 $\frac{\partial^3 z}{\partial y \partial x^2}$.

解

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= e^{x+2y} & \frac{\partial z}{\partial y} &= 2e^{x+2y} & \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= e^{x+2y} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= 2e^{x+2y} & \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= 2e^{x+2y} & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= 4e^{x+2y} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^3 z}{\partial y \partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \right) = 2e^{x+2y}$$

注 此处 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$,

但这一结论并不总是成立.

目录

上页

下页

例题

继续

问题：二阶混合偏导数一定都相等吗？**不一定！**

例如： $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

$$f_x(x, y) = \begin{cases} y \frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$f_y(x, y) = \begin{cases} x \frac{x^4 - 4x^2y^2 - y^4}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

目录

上页

下页

返回

结束

$$f_x(x, y) = \begin{cases} y \frac{x^4 + 4x^2 y^2 - y^4}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$f_y(x, y) = \begin{cases} x \frac{x^4 - 4x^2 y^2 - y^4}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$f_{xy}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f_x(0, y) - f_x(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y}{y} = -1$$

$$f_{yx}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_y(x, 0) - f_y(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1$$

二者不等

目录

上页

下页

返回

结束

问题：具备怎样的条件，混合偏导数相等？

定理 若 $f_{xy}(x,y)$ 和 $f_{yx}(x,y)$ 都在点 (x_0, y_0) 连续, 则

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0) \quad (\text{证明略})$$

本定理对 n 元函数的高阶混合偏导数也成立.

例如, 对三元函数 $u = f(x, y, z)$, 当三阶混合偏导数在点 (x, y, z) 连续时, 有

$$\begin{aligned} f_{xyz}(x, y, z) &= f_{yzx}(x, y, z) = f_{zxy}(x, y, z) \\ &= f_{xzy}(x, y, z) = f_{yxz}(x, y, z) = f_{zyx}(x, y, z) \end{aligned}$$

目录

上页

下页

返回

结束

例9 证明函数 $u = \frac{1}{r}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 满足拉普拉斯

方程 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$

偏微分方程

证 $\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial r}{\partial x} = -\frac{1}{r^2} \cdot \frac{x}{r} = -\frac{x}{r^3}$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3x}{r^4} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3x^2}{r^5}$$

利用对称性, 有 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3y^2}{r^5}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3z^2}{r^5}$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -\frac{3}{r^3} + \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = 0$$

目录

上页



下页

例9-1


结束

内容小结

1. 偏导数的概念及有关结论

- 定义; 记号; 几何意义
- 函数在一点偏导数存在  函数在此点连续
- 混合偏导数连续  与求导顺序无关

2. 偏导数的计算方法

- 求一点处偏导数的方法 
 - 先代后求
 - 先求后代
 - 利用定义
- 求高阶偏导数的方法 —— 逐次求导法

(与求导顺序无关时, 应选择方便的求导顺序)

目录

上页

下页

返回

结束

备用题

例2-1 设 $z = f(x, y) = \sqrt{|xy|}$, 求 $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$.

$$\begin{aligned}\text{解 } f_x(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|x \cdot 0|} - 0}{x} = 0\end{aligned}$$

同理可求得 $f_y(0, 0) = 0$.

目录

上页

下页

返回

结束

例5-1 求函数 $u = e^{xy} \cos yz$ 的偏导数.

解 $u_x = ye^{xy} \cos yz,$

$$u_y = (\cos yz)e^{xy} x + e^{xy} (-\sin yz) z$$

$$= e^{xy} (x \cos yz - z \sin yz),$$

$$u_z = e^{xy} (-\sin yz) y = -ye^{xy} \sin yz$$

目录

上页

下页

返回

结束

例5-2 设 $z = \arcsin \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{x^2 + y^2}}} \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)'_x \quad (y \neq 0)$

$$= \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{|y|} \cdot \frac{y^2}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} \quad (\sqrt{y^2} = |y|)$$
$$= \frac{|y|}{x^2 + y^2}.$$

目录

上页

下页

返回

结束

$$\begin{aligned}
\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{x^2 + y^2}}} \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)'_y \\
&= \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{|y|} \cdot \frac{(-xy)}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} \\
&= -\frac{x}{x^2 + y^2} \operatorname{sgn} \frac{1}{y} \quad (y \neq 0)
\end{aligned}$$

[目录](#)
[上页](#)
[下页](#)
[返回](#)
[结束](#)

例6-1 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$

求 $f_x(x, y)$ 及 $f_y(x, y)$.

解: 当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{2xy(x^2 + y^2) - x^2 y \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{2xy^3}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

目录

上页

下页

返回

结束

$$f_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{x^2(x^2 + y^2) - x^2 y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$= \frac{x^2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

在 (0,0) 点, 注意到 $f(x, 0) = \begin{cases} 0, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases} = 0$

故有 $f_x(0, 0) = \left. \frac{d}{dx} f(x, 0) \right|_{x=0} = 0$

同理 $f_y(0, 0) = \left. \frac{d}{dy} f(0, y) \right|_{y=0} = 0.$

目录

上页

下页

返回

结束

$$\therefore f_x(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^3}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

$$f_y(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, & (x^2 + y^2) \neq 0, \\ 0, & (x^2 + y^2) = 0. \end{cases}$$

[目录](#)
[上页](#)
[下页](#)
[返回](#)
[结束](#)

例8-1 求下列函数的一阶和二阶偏导数

(1) $z = \ln(x + y^2)$;

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x + y^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{-1}{(x + y^2)^2},$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{-2y}{(x + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{x + y^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{2 \cdot (x + y^2) - 2y \cdot 2y}{(x + y^2)^2} = \frac{2(x - y^2)}{(x + y^2)^2}.$$

目录

上页

下页

返回

结束

(2) $z = x^y$. 由例5知

$$\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y(y-1)x^{y-2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^y \ln^2 x.$$

目录

上页

下页

返回

结束

例8-2 求下列函数的偏导数

$$(1) F(x, y) = \int_{3y}^{2x} \frac{\sin t}{t} dt, \text{求 } F_x, F_y;$$

$$(2) F(x, y) = x \int_y^x e^{-3t^2} dt, \text{求 } \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}.$$

解 (1) $F_x = 2 \cdot \frac{\sin 2x}{2x} = \frac{\sin 2x}{x}.$

$$F_y = -\frac{\sin 3y}{3y} \cdot 3 = -\frac{\sin 3y}{y}.$$

$$(2) F_x = \int_y^x e^{-3t^2} dt + x \cdot e^{-3x^2}$$

$$F_{xy} = -e^{-3y^2}.$$

目录

上页

下页

返回

结束

例9-1 验证函数 $u(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 满足二维拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

解 $\because u = \ln \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2),$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2},$$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{(x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

目录

上页

下页

返回

结束

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2},$$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{(x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{(x^2 + y^2) - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0.$$

[目录](#)[上页](#)[下页](#)[返回](#)[结束](#)