

第四节 空间直线及其方程

- 一、空间直线的方程
- 二、两直线的夹角
- 三、直线与平面的夹角
- 四、点到直线的距离
- 五、平面束法

一、空间直线的方程

定义 空间直线可看成两平面的交线.


$$\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

1. 空间直线的一般式方程

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

(不唯一)



目录

上页

下页


返回

结束

2. 空间直线的对称式方程

方向向量的定义:

如果一非零向量平行于一条已知直线, 则这个向量称为这条直线的**方向向量**.



$$M_0(x_0, y_0, z_0), \quad M(x, y, z),$$

$$\forall M \in L, \quad \overrightarrow{M_0M} // \vec{s}$$

$$\vec{s} = (m, n, p), \quad \overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$$

[目录](#)[上页](#)[下页](#)[返回](#)[结束](#)

直线的对称式方程:

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$



直线的一组**方向数**
方向向量的余弦称为
直线的**方向余弦**.

说明: 某些分母为零时, 其分子也理解为零.

例如, 当 $m = n = 0, p \neq 0$ 时, 直线方程为

$$\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 \end{cases}$$

目录

上页

下页

返回

结束

$$\text{令 } \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p} = t$$

3. 空间直线的参数方程

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases} \quad (\text{参数 } t \in R)$$

[目录](#)[上页](#)[下页](#)[返回](#)[结束](#)

例1 用对称式方程及参数方程表示直线

$$\begin{cases} x + y + z - 1 = 0 \\ 2x - y + 3z + 6 = 0 \end{cases}$$

解 在直线上任取一点 (x_0, y_0, z_0)

$$\text{取 } x_0 = 1 \Rightarrow \begin{cases} y_0 + z_0 = 0 \\ -y_0 + 3z_0 + 8 = 0 \end{cases},$$

解得 $y_0 = 2, z_0 = -2$

点坐标 $(1, 2, -2)$,

目录

上页

下页

返回

结束

再求直线的方向向量:

因所求直线与两平面的法向量都垂直

$$\text{取 } \vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (4, -1, -3),$$

$$\text{对称式方程 } \frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+2}{-3},$$

$$\text{参数方程 } \begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 2 - t \\ z = -2 - 3t \end{cases}.$$

目录

上页

下页

返回

结束

注 化直线 L 方程的一般式

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

为对称式的**步骤**:

1° 由(1), 任意求出直线 L 上的一点

$$M_0(x_0, y_0, z_0)$$

(只要点 M_0 的坐标同时满足(1)中的两个方程即可)

2° 确定 L 的方向向量 \vec{s} .

目录

上页

下页

返回

结束

$\therefore L$ 在平面 Π_1 和 Π_2 上

$\therefore L \perp \vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1), L \perp \vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$

又 $\therefore \vec{s} \parallel L$

$\therefore \vec{s} \perp \vec{n}_1, \vec{s} \perp \vec{n}_2$

若 $\vec{n}_1 \nparallel \vec{n}_2$, 则可取

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix}$$

由此可确定方向数 m, n, p , 从而写出 L 的对称式.

目录

上页

下页

返回


结束

例2 一直线过点 $A(2,-3,4)$, 且和 y 轴垂直相交, 求其方程.

解 因为直线和 y 轴垂直相交,
所以交点为 $B(0,-3,0)$,

取 $\vec{s} = \overrightarrow{BA} = (2, 0, 4)$,

所求直线方程 $\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{0} = \frac{z-4}{4}.$



目录

上页

下页

例2-1

结束

二、两直线的夹角

定义 两直线的方向向量的夹角称之。（锐角）

$$\text{直线 } L_1: \frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1},$$

$$\text{直线 } L_2: \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2},$$

$$\cos(\hat{L_1}, L_2) = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

——两直线的夹角公式

目录

上页

下页

返回

结束

两直线的位置关系

$$(1) \quad L_1 \perp L_2 \iff \vec{s}_1 \perp \vec{s}_2$$

$$\iff m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0,$$

$$(2) \quad L_1 // L_2 \iff \vec{s}_1 // \vec{s}_2 \iff \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2},$$

例如, 直线 L_1 : $\vec{s}_1 = (1, -4, 0)$,

直线 L_2 : $\vec{s}_2 = (0, 0, 1)$,

$$\because \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 0, \quad \therefore \vec{s}_1 \perp \vec{s}_2, \quad \text{即 } L_1 \perp L_2.$$

目录

上页

下页


返回

结束

(3) L_1 与 L_2 相交

$\iff \vec{s}_1 \nparallel \vec{s}_2$, 且

$$[\overrightarrow{MN} \ \vec{s}_1 \ \vec{s}_2] = (\overrightarrow{MN} \times \vec{s}_1) \cdot \vec{s}_2$$



$$= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix} = 0$$

目录

上页

下页


返回

结束

(4) L_1 与 L_2 异面

$$\Leftrightarrow [\overrightarrow{MN} \ \vec{s}_1 \ \vec{s}_2] = (\overrightarrow{MN} \times \vec{s}_1) \cdot \vec{s}_2$$

$$= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix} \neq 0$$



目录

上页

下页

返回


结束

例3 求过点 $(-3, 2, 5)$ 且与两平面 $x - 4z = 3$
和 $2x - y - 5z = 1$ 的交线平行的直线方程.

解 设所求直线的方向向量为 $\vec{s} = (m, n, p)$,

根据题意知 $\vec{s} \perp \vec{n}_1 = (1, 0, -4)$,

$$\vec{s} \perp \vec{n}_2 = (2, -1, -5)$$



取 $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} = (-4, -3, -1),$

所求直线的方程 $\frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-5}{1}.$

目录

上页

下页

返回

结束

例4 设有两直线 $L_1: x - 1 = \frac{y + 1}{2} = \frac{z - 1}{\lambda}$ 和

$L_2: x + 1 = y - 1 = z$, 试确定 λ 的值, 使

(1) 两直线异面;

(2) 两直线相交, 并求它们所在平面的方程.

解 (1) 依题设, 有

$$M(1, -1, 1) \in L_1, \quad N(-1, 1, 0) \in L_2,$$

$$\overrightarrow{MN} = (-2, 2, -1), \quad \vec{s}_1 = (1, 2, \lambda), \quad \vec{s}_2 = (1, 1, 1)$$

目录

上页

下页

返回

结束

$$\overrightarrow{MN} = (-2, 2, -1), \quad \vec{s}_1 = (1, 2, \lambda), \quad \vec{s}_2 = (1, 1, 1)$$

$$\therefore [\overrightarrow{MN} \vec{s}_1 \vec{s}_2] = (\overrightarrow{MN} \times \vec{s}_1) \cdot \vec{s}_2$$

$$= \begin{vmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & \lambda \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-2) \cdot \begin{vmatrix} 2 & \lambda \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (-2) \cdot (2 - \lambda) - 2 \cdot (1 - \lambda) + 1 = 4\lambda - 5$$

$$\text{而 } L_1 \text{ 与 } L_2 \text{ 异面} \Leftrightarrow [\overrightarrow{MN} \vec{s}_1 \vec{s}_2] \neq 0$$

\therefore 当 $\lambda \neq \frac{5}{4}$ 时, 所给两直线异面.

目录

上页

下页

返回


结束

(2) 两直线相交，并求它们所在平面的方程。

$\because \vec{s}_1$ 与 \vec{s}_2 不平行

L_1 与 L_2 相交

$$\Leftrightarrow [\overrightarrow{MN} \ \vec{s}_1 \ \vec{s}_2] = (\overrightarrow{MN} \times \vec{s}_1) \cdot \vec{s}_2 = 0$$



即
$$\begin{vmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & \lambda \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 4\lambda - 5 = 0$$

\therefore 当 $\lambda = \frac{5}{4}$ 时，所给两直线相交。

目录

上页

下页


返回

结束

当 $\lambda = \frac{5}{4}$ 时, 两直线相交.

$$\forall Q(x, y, z) \in \Pi, \text{ 有 } [\overrightarrow{MQ} \vec{s}_1 \vec{s}_2] = (\overrightarrow{MQ} \times \vec{s}_1) \cdot \vec{s}_2 = 0$$

$$\text{即 } \begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z-1 \\ 1 & 2 & \frac{5}{4} \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$



故所求平面方程为

$$\frac{3}{4}(x-1) + \frac{1}{4}(y+1) - (z-1) = 0, \text{ 即 } 3x + y - 4z + 2 = 0.$$

目录

上页

下页


返回

结束

三、直线与平面的夹角

定义 直线和它在平面上的投影直线的夹角 φ ($0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$) 称为直线与平面的夹角.

$$L: \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p},$$



$$\Pi: Ax + By + Cz + D = 0, \quad \vec{n} = (A, B, C),$$

$$(\vec{s}, \vec{n}) = \frac{\pi}{2} - \varphi \quad \text{或} \quad (\vec{s}, \vec{n}) = \frac{\pi}{2} + \varphi$$

目录

上页

下页

返回

结束

$$\sin \varphi = \left| \cos(\vec{s}, \vec{n}) \right| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{s}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|}$$

$$= \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$$

—— 直线与平面的夹角公式

直线与平面的位置关系

- (1) $L \perp \Pi \iff \vec{s} \parallel \vec{n} \iff \frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}.$
- (2) $L \parallel \Pi \iff \vec{s} \perp \vec{n} \iff Am + Bn + Cp = 0.$

目录

上页

下页

返回

结束

例5 设直线 $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{2}$,

平面 $\Pi: x - y + 2z = 3$, 求直线与平面的夹角.

解 $\vec{n} = (1, -1, 2), \quad \vec{s} = (2, -1, 2),$

$$\begin{aligned} \sin \varphi &= \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}} \\ &= \frac{|1 \times 2 + (-1) \times (-1) + 2 \times 2|}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{9}} = \frac{7}{3\sqrt{6}}. \end{aligned}$$

$\therefore \varphi = \arcsin \frac{7}{3\sqrt{6}}$ 为所求夹角.

目录

上页

下页

返回

结束


四、点到直线的距离

$$\therefore \text{面积 } S_{\square} = |\vec{s}| \cdot d$$

$$= |\vec{s} \times \overrightarrow{MP}|$$

\therefore 点 P 到直线 L 的距离为:

$$d = \frac{|\vec{s} \times \overrightarrow{MP}|}{|\vec{s}|}$$



目录

上页

下页

返回

结束

例6 求点 $P(0,-1,1)$ 到直线 $\begin{cases} y+1=0 \\ x+2z-7=0 \end{cases}$ 的距离.


解 (方法1) 公式法

所给直线 L 的方向向量:

$$\vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (2, 0, -1),$$

取点 $M(5,-1,1) \in L$, $\overrightarrow{MP} = (5, 0, 0) \in L$

$$\vec{s} \times \overrightarrow{MP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & -1 \\ 5 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, -5, 0),$$



目录

上页

下页

返回

结束

$$\vec{s} = (2, 0, -1),$$

$$\vec{s} \times \overrightarrow{MP} = (0, -5, 0),$$

\therefore 点 P 到所给直线 的距离为:

$$\begin{aligned} d &= \frac{\left| \vec{s} \times \overrightarrow{MP} \right|}{\left| \vec{s} \right|} \\ &= \frac{5}{\sqrt{2^2 + 0 + (-1)^2}} = \sqrt{5}. \end{aligned}$$

目录

上页

下页


返回

结束

(方法2)

直线 L 的参数方程:
$$\begin{cases} x = -2t + 7 \\ y = -1 \\ z = t \end{cases}$$

点 $N(-2t + 7, -1, t) \in L$



要求: $\vec{s} \perp \overrightarrow{NP}$, 则有 $\vec{s} \cdot \overrightarrow{NP} = 0$

$$\overrightarrow{NP} = (2t - 7, 0, 1 - t), \quad \vec{s} = (2, 0, -1),$$

$$\therefore 2 \cdot (2t - 7) + 0 + (-1) \cdot (1 - t) = 0$$

$$t = 3$$

$$\overrightarrow{NP} = (1, 0, 2), \quad \text{从而} \quad d = |\overrightarrow{NP}| = \sqrt{5}.$$

目录

上页

下页

返回

结束

五、平面束法

1. 平面束：设直线 L 的方程为：

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

则称 Π_λ ：

$$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 + \lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) = 0 \quad (2)$$

(参数 $\lambda \in R$)

为通过直线 L 的平面束.

设 $\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$

可以证明： Π_λ 是通过直线 L (除去 Π_1) 的所有平面.

目录

上页

下页

返回

结束

例7 求过点 $M(0,0,1)$, 且通过两平面

$$\Pi_1: x + y + z + 1 = 0$$

$$\Pi_2: 4x - y + 3z + 1 = 0$$

交线的平面方程 .

解 (方法1) $\because \Pi_1 \nparallel \Pi_2$

$\therefore \Pi_1$ 与 Π_2 必相交成一直线 L :

$$\begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ 4x - y + 3z + 1 = 0 \end{cases}$$

又 $\because M \notin \Pi_1, M \notin \Pi_2$

\therefore 所求平面 Π 一定不是 Π_1, Π_2

目录

上页

下页

例题

继续

\therefore 所求平面 Π 通过直线 L

$\therefore \Pi$ 一定在过直线 L 的平面束 Π_λ 中.

$$\Pi_\lambda: (4x - y + 3z + 1) + \lambda(x + y + z + 1) = 0$$

$$\text{即 } (4 + \lambda)x + (\lambda - 1)y + (3 + \lambda)z + (1 + \lambda) = 0$$

$\therefore M(0,0,1)$ 在 Π 上, 将点 M 的坐标代入上式,

$$\text{得 } (3 + \lambda) \cdot 1 + (1 + \lambda) = 0$$

$$\text{解得 } \lambda = -2$$

$$\therefore \text{所求平面 } \Pi: 2x - 3y + z - 1 = 0$$

目录

上页

下页

返回

结束

(方法2) 在 $\begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ 4x - y + 3z + 1 = 0 \end{cases}$

中令 $y = 0$, 得


$$\begin{cases} x + z + 1 = 0 \\ 4x + 3z + 1 = 0 \end{cases}$$

解得 $x = 2, z = -3$

即得到点 $P(2, 0, -3) \in L$.

\therefore 所求平面的法向量 $\vec{n} \perp \overrightarrow{PM}$, $\vec{n} \perp \vec{s}$

而 $\overrightarrow{PM} = (2, 0, -4)$



目录

上页

下页

返回

结束

$$\vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (4, 1, -5)$$

$$\therefore \text{取 } \vec{n} = \overrightarrow{PM} \times \vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & -4 \\ 4 & 1 & -5 \end{vmatrix} = (4, -6, 2)$$

$$= 2(2, -3, 1)$$

\therefore 所求平面 Π 的方程为

$$2(x-0) - 3(y-0) + 1 \cdot (z-1) = 0$$

即 $2x - 3y + z - 1 = 0.$

目录

上页

下页

返回

结束

例8 (综合题) 求过点 $M(1, 2, 3)$ 与直线

$$L_1: \begin{cases} 2x + z = 3 \\ x + y - z = 1 \end{cases} \text{ 相交, 且平行于平面}$$

$\Pi: x + y + z + 1 = 0$ 的直线方程.


解 (方法1)

1° 过点 M 作平行于平面 Π 的平面 Π_1 .


∴ 平面 Π 的法向量: $\vec{n} = (1, 1, 1)$

$$\therefore \Pi_1: 1 \cdot (x - 1) + 1 \cdot (y - 2) + 1 \cdot (z - 3) = 0$$

即
$$x + y + z - 6 = 0.$$



\therefore 所求直线 L 过点 M ,
 且平行于 Π
 $\therefore L$ 必在平面 Π_1 上
 故 L_1 与 L 的交点 N 必在 Π_1 上,
 从而 N 就是 L_1 与 Π_1 的交点.



2° 求 L_1 与 Π_1 的交点 N

解方程组:
$$\begin{cases} 2x + z = 3 \\ x + y - z = 1 \\ x + y + z = 6 \end{cases}, \text{ 得 } \begin{cases} x = \frac{1}{4} \\ y = \frac{13}{4} \\ z = \frac{5}{2} \end{cases}$$

目录

上页

下页

返回

结束


即 $N(\frac{1}{4}, \frac{13}{4}, \frac{5}{2})$.

3° 求 L 的方向向量 \vec{s}

$$\overrightarrow{NM} = (\frac{3}{4}, -\frac{5}{4}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{4}(3, -5, 2)$$

$$\text{取 } \vec{s} = 4\overrightarrow{NM} = (3, -5, 2)$$

故所求直线 L : $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z-3}{2}$




(方法2) 1° 将 L_1 的方程 $\begin{cases} 2x + z = 3 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$
化为参数式方程.

令 $x = 0$, 得 $y = 4, z = 3$

$\therefore P(0, 4, 3) \in L_1$

L_1 的方向向量为

$$\vec{s}_1 = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (-1, 3, 2)$$



目录

上页

下页

返回

结束

故 L_1 的对称式方程为


$$\frac{x-0}{-1} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{2} = t$$

从而 L_1 的参数式方程为

$$\begin{cases} x = -t \\ y = 4 + 3t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$

$$P(0, 4, 3) \in L_1$$

$$\vec{s}_1 = (-1, 3, 2)$$



\therefore 可设所求直线 L 与已知直线 L_1 的交点为
 $N(-t, 4 + 3t, 3 + 2t)$, 其中 t 为待定参数 .

目录

上页

下页

返回


结束

$$N(-t, 4 + 3t, 3 + 2t),$$

$$\overrightarrow{MN} = (-t - 1, 2 + 3t, 2t)$$

依题意, $L // \Pi \quad \therefore \quad \overrightarrow{MN} // \Pi$

故 $\overrightarrow{MN} \perp \vec{n} \quad \therefore \quad \overrightarrow{MN} \cdot \vec{n} = 0$



$$\text{即 } (-t - 1) \cdot 1 + (2 + 3t) \cdot 1 + 2t \cdot 1 = 0 \quad \therefore \quad t = -\frac{1}{4}.$$

从而 L_1 的方向向量为 $\overrightarrow{MN} = (-\frac{3}{4}, \frac{5}{4}, -\frac{1}{2})$.

故所求直线 $L: \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z-3}{2}$.

目录

上页

下页

返回

结束

内容小结

1. 空间直线的一般方程.

空间直线的对称式方程与参数方程.

2. 两直线的夹角. (注意两直线的位置关系)

3. 直线与平面的夹角.

(注意直线与平面的位置关系)

4. 点到直线的距离

目录

上页

下页

返回

结束

思考题

在直线方程 $\frac{x-4}{2m} = \frac{y}{n} = \frac{z-2}{6+p}$ 中, m 、 n 、 p 各怎样取值时, 直线与坐标面 xoy 、 $yo z$ 都平行.

[目录](#)[上页](#)[下页](#)[返回](#)[结束](#)

思考题解答

$$\vec{s} = (2m, n, 6 + p), \quad \text{且有 } \vec{s} \neq \vec{0}.$$

$$\because \vec{s} \cdot \vec{k} = 0, \quad \vec{s} \cdot \vec{i} = 0,$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 6 + p = 0 \\ 2m = 0 \end{cases} \quad \therefore p = -6, \quad m = 0,$$

$$\because \vec{s} \neq \vec{0}, \quad \therefore n \neq 0,$$

故当 $m = 0, n \neq 0, p = -6$ 时结论成立.

目录

上页

下页

返回

结束

备用题


例2-1 求过点 $M(2,1,3)$ 且与直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程.

解 先作一过点 M 且与已知直线 L_1 垂直的平面 Π

$$3(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0$$

再求已知直线与该平面的交点 N ,

$$\text{令 } \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 3t - 1 \\ y = 2t + 1. \\ z = -t \end{cases}$$



目录

上页

下页

返回

结束

代入平面方程得 $t = \frac{3}{7}$ ，交点 $N(\frac{2}{7}, \frac{13}{7}, -\frac{3}{7})$

取所求直线的方向向量为 \overrightarrow{MN}

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MN} &= (\frac{2}{7} - 2, \frac{13}{7} - 1, -\frac{3}{7} - 3) = (-\frac{12}{7}, \frac{6}{7}, -\frac{24}{7}), \\ &= -\frac{6}{7}(2, -1, 4),\end{aligned}$$

所求直线方程为 $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}.$

目录

上页

下页

返回

结束

例7-1 求过直线： $\begin{cases} x + 5y + z = 0 \\ x - z + 4 = 0, \end{cases}$ 且与平面 $x - 4y - 8z + 12 = 0$ 组成 $\frac{\pi}{4}$ 角的平面方程.

解 过已知直线的平面束方程为

$$x + 5y + z + \lambda(x - z + 4) = 0,$$

$$\text{即 } (1 + \lambda)x + 5y + (1 - \lambda)z + 4\lambda = 0,$$

其法向量 $\vec{n} = (1 + \lambda, 5, 1 - \lambda)$.

又已知平面的法向量 $\vec{n}_1 = (1, -4, -8)$.

目录

上页

下页

返回

结束

由题设知 $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}|}$

$$= \frac{|(1+\lambda) \cdot 1 + 5 \cdot (-4) + (1-\lambda) \cdot (-8)|}{\sqrt{1^2 + (-4)^2 + (-8)^2} \sqrt{(1+\lambda)^2 + 5^2 + (1-\lambda)^2}}$$

即 $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|\lambda - 3|}{\sqrt{2\lambda^2 + 27}}$, 由此解得 $\lambda = -\frac{3}{4}$.

代回平面束方程, 得所求为平面方程:

$$x + 20y + 7z - 12 = 0.$$

目录

上页

下页

返回

结束

又 $\because x - z + 4 = 0$ 与 $x - 4y - 8z + 12 = 0$
的夹角余弦:

$$\cos \varphi = \frac{|1 \cdot 1 + 0 \cdot (-4) + (-1) \cdot (-8)|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{1^2 + (-4)^2 + (-8)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{4}$$

$\therefore x - z + 4 = 0$ 也是所求平面.

目录

上页

下页

返回

结束

注 利用平面束:

$$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 + \lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) = 0$$

求平面方程时, 应注意检验

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

是否为满足题设条件的所求平面, 以免
丢失此解.

目录

上页

下页

返回

结束


例7-2 求直线 $L: \begin{cases} 2x - y + z - 1 = 0 \\ x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$ 在平面 $\pi:$

$x + 2y - z = 0$ 上的投影直线的方程.

解 过直线 L 的平面束方程为

$$(2x - y + z - 1) + \lambda(x + y - z + 1) = 0,$$

$$\text{即 } (2 + \lambda)x + (\lambda - 1)y + (1 - \lambda)z + (\lambda - 1) = 0.$$



目录

上页

下页

返回

结束

又 \because 垂直于平面 π ,

$$\therefore (2 + \lambda) \cdot 1 + (\lambda - 1) \cdot 2 + (1 - \lambda) \cdot (-1) = 0.$$

$$\text{即 } 4\lambda - 1 = 0, \text{ 故 } \lambda = \frac{1}{4}$$

将 λ 代入平面束方程, 得 $3x - y + z - 1 = 0$.

$$\text{所求投影直线方程为 } \begin{cases} 3x - y + z - 1 = 0 \\ x + 2y - z = 0 \end{cases}.$$

目录

上页

下页

返回

结束

例8-1(综合)

求过点 $M_0(1,1,1)$ 且与两直线 $L_1 : \begin{cases} y = 2x \\ z = x - 1 \end{cases}$,
 $L_2 : \begin{cases} y = 3x - 4 \\ z = 2x - 1 \end{cases}$ 都相交的直线 L .

解 (方法1) 将两已知直线方程化为参数方程为

$$L_1 : \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = t - 1 \end{cases}, \quad L_2 : \begin{cases} x = t \\ y = 3t - 4 \\ z = 2t - 1 \end{cases}$$

设所求直线 L 与 L_1, L_2 的交点分别为

目录

上页

下页

返回

结束

$A(t_1, 2t_1, t_1 - 1)$ 和 $B(t_2, 3t_2 - 4, 2t_2 - 1)$.

$\therefore M_0(1, 1, 1)$ 与 A, B 三点共线,

故 $\overrightarrow{M_0A} = \lambda \overrightarrow{M_0B}$ (λ 为实数).

$$\therefore \overrightarrow{M_0A} = (t_1 - 1, 2t_1 - 1, t_1 - 2)$$

$$\overrightarrow{M_0B} = (t_2 - 1, 3t_2 - 5, 2t_2 - 2)$$

于是 $\overrightarrow{M_0A}, \overrightarrow{M_0B}$ 对应坐标成比例, 即有

$$\frac{t_1 - 1}{t_2 - 1} = \frac{2t_1 - 1}{3t_2 - 5} = \frac{t_1 - 2}{2(t_2 - 1)},$$

目录

上页

下页

返回

结束

由 $\frac{t_1-1}{\cancel{t_2-1}} = \frac{t_1-2}{\cancel{2(t_2-1)}}$, 得 $t_1 = 0$,

代入 $\frac{t_1-1}{t_2-1} = \frac{2t_1-1}{3t_2-5}$, 得 $t_2 = 2$.

$\therefore A(0,0,-1), B(2,2,3)$

$\therefore L$ 的方向向量 $\vec{s} = \overrightarrow{M_0B} = (1, 1, 2)$

故 L 的方程为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{2}.$$

目录

上页

下页

返回

结束


(方法2) $\vec{s}_1 = (1, 2, 1)$

$$\Pi_1: [\overrightarrow{PR} \ \overrightarrow{PM} \ \vec{s}_1] = 0$$

$$\text{即} \begin{vmatrix} x & y & z+1 \\ -1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{亦即} \quad 3x - y - (z + 1) = 0,$$

$$\text{化简得} \quad 3x - y - z - 1 = 0.$$



目录

上页

下页

返回

结束

$$\vec{s}_2 = (1, 3, 2)$$


$$\Pi_2: [\overrightarrow{QT} \quad \overrightarrow{QM_0} \quad \vec{s}_2] = 0$$

$$\text{即} \begin{vmatrix} x-2 & y-2 & z-3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{亦即} \quad -4(x-2) + 2(z-3) = 0,$$

$$\text{化简得} \quad 2x - z - 1 = 0.$$

$$\text{故所求直线 } L \text{ 的方程为: } \begin{cases} 3x - y - z - 1 = 0 \\ 2x - z - 1 = 0 \end{cases}.$$



目录

上页

下页

返回

结束