

## 高等数学(上)期中试题解答 (20—21 学年第一学期) 20-11-7

一、(48 分) 1.  $x^2 + 2, 2x$ ;      2.  $\frac{1}{12}$ ;      3.  $a = 1, b = -2$ ;      4.  $-2e^2$ ;

5.  $\sin 2(x-1) \cdot e^{\sin^2(1-x)} dx$ ;      6.  $-3$ ;      7.  $[0, +\infty)$ ;      8.  $2$ ;

9.  $0$ ;      10.  $(-1)^n n! (1 - \frac{1}{2^{n+1}})$ ;      11.  $2$ ;      12.  $\frac{1}{4}$ .

二、(20 分) 1. B;      2. C;      3. A;      4. D;      5. B.

三、1. 解 当  $x \neq 0$  时,  $x_n = \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} = \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \frac{2^n \sin \frac{x}{2^n}}{2^n \sin \frac{x}{2^n}}$  (3 分)

$$= \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} = \frac{\sin x}{x} \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}}$$

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\sin x}{x} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}} = \frac{\sin x}{x} \quad (x \neq 0), \quad (5 \text{ 分})$$

当  $x = 0$  时,  $I = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ ,

$$\text{故 } I = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0. \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

2. 解  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi}{x} \ln \cos \sqrt{x} \quad (2 \text{ 分}) = \pi \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\cos \sqrt{x}} \cdot \frac{-\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}}{1} = -\frac{\pi}{2} \quad (5 \text{ 分})$

$$I = \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln y} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y} = e^{-\frac{\pi}{2}} \quad (6 \text{ 分})$$





3. 解  $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} \quad (2 \text{ 分})$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left( \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} \right) \cdot \frac{dx}{dt} \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{-(\sin t + \cos t)^2 - (\cos t - \sin t)^2}{(\sin t + \cos t)^2} \cdot \frac{1}{e^x (\sin t + \cos t)} = \frac{-2}{e^x (\sin t + \cos t)^3} \quad (6 \text{ 分})$$

四、解 定义域为： $(-\infty, +\infty)$ .  $y' = \frac{1-3x}{3 \cdot \sqrt[3]{x^2(1-x)}}.$  (2 分)

令  $y' = 0$ , 得驻点  $x = \frac{1}{3}$ ; 导数不存在的点为:  $x = 0$  及  $x = 1$ . (3 分)

$x$	$(-\infty, 0)$	$0$	$(0, \frac{1}{3})$	$\frac{1}{3}$	$(\frac{1}{3}, 1)$	$1$	$(1, +\infty)$
$y'$	+	不存在	+	0	-	不存在	+
$y$				极大		极小	

(6 分)

单调增加开区间:  $(-\infty, \frac{1}{3}), (1, +\infty)$ , 单调减少开区间:  $(\frac{1}{3}, 1)$

极大值  $f(\frac{1}{3}) = \frac{\sqrt[3]{4}}{3}$ , 极小值  $f(1) = 0$ . (9 分)

五、证 令  $F(x) = f(x) - x$ , 要证  $F'(\xi) = 0$ . (2 分)

$F(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内可导, 且  $F(0) = 0$ .

下证: 存在  $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ , 使  $F(\eta) = 0$ . (3 分)

$$F(x) \text{ 在 } \left[\frac{1}{2}, 1\right] \text{ 上连续, } F(0) = -1 < 0, \quad F\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0,$$

由零点定理, 存在  $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ , 使  $F(\eta) = 0$ . 即  $F(x)$  在  $[0, \eta]$  上满足罗尔定理条件,

故存在  $\xi \in (0, \eta) \subset (0, 1)$ , 使  $F'(\xi) = 0$ , 即  $f'(\xi) = 1$ . (5 分)