

第八章 多元函数微分法 及其应用

一元函数微分学



推广

多元函数微分学

注意：善于类比，区别异同

上页

下页

返回

结束

第一节

多元函数的极限与连续

- 一、平面点集 n 维空间
- 二、 n 元函数 $R^n \rightarrow R^m$ 的映射
- 三、多元函数的极限
- 四、多元函数的连续性

上页

下页

返回

结束

一、平面点集 n 维空间

1. 平面点集

坐标平面上具有某种性质 P 的点的集合，称为平面点集，记作

$$E = \{(x, y) | (x, y) \text{ 所具有的性质 } P\}.$$

(1) 邻域 在平面上，点集

$$U(P_0, \delta) = \{P | |PP_0| < \delta\}, \text{ 称为点 } P_0 \text{ 的 } \delta \text{ 邻域.}$$

$$U(P_0, \delta) = \{(x, y) | \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\}$$

说明：若不需要强调邻域半径 δ ，也可写成 $U(P_0)$ 。

点 P_0 的去心邻域记为 $\overset{\circ}{U}(P_0) = \{P | 0 < |PP_0| < \delta\}$

目录

上页

下页


返回

结束

(2) 内点、外点、边界点

设有点集 E 及一点 P :

- 若存在点 P 的某邻域 $U(P) \subset E$, 则称 P 为 E 的**内点**, 例如 P_1 ;
- 若存在点 P 的某邻域 $U(P) \cap E = \emptyset$, 则称 P 为 E 的**外点**, 例如 P_2 ;
- 若点 P 的**任一**邻域 $U(P)$ 中既有属于 E 的点, 也有不属于 E 的点, 则称 P 为 E 的**边界点**, 例如 P_3 .
显然, E 的内点必属于 E , E 的外点必不属于 E , E 的边界点可能属于 E , 也可能不属于 E .



目录

上页


下页

返回

结束

(3) 聚点

若对任意给定的正数 δ ，点 P 的去心邻域 $\overset{\circ}{U}(P, \delta)$ 内总有 E 中的点，
则称 P 是 E 的**聚点**.



注 聚点可以属于 E ，也可以不属于 E .

聚点可以为 E 的内点 或 E 的边界点

1° 内点一定是聚点；

2° 边界点可能是聚点，也可能不是聚点；

目录

上页

下页

返回

结束

例如: 设点集 $E = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 < 3\}$,

则点集 $E_1 = \{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 3\}$


中的点都是 E 的内点;

点集 $E_2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$

和 $E_3 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 3\}$

中的点都是 E 的聚点,

但 E_2 的点属于 E , E_3 的点不属于 E .



目录

上页


下页

返回

结束

(4)开区域及闭区域

- 若点集 E 的点都是内点，则称 E 为开集；
- E 的边界点的全体称为 E 的边界，记作 ∂E ；
- 若点集 $\partial E \subseteq E$ ，则称 E 为闭集；
- 若点集 E 中任意两点 都可用一完全属于 E 的折线相连，则称 E 是连通集；
- 连通的开集称为开区域，简称区域；
- 开区域连同它的边界一起称为闭区域.



如, $E_3 = \{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 3\}$ 是开集、连通集、是区域;
 $E_4 = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 3\}$ 是闭集、连通集、闭区域.

目录

上页

下页

返回

结束





例如，在平面上

♣ $\{(x, y) \mid x + y > 0\}$] 开区域

♣ $\{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 4\}$

♣ $\{(x, y) \mid x + y \geq 0\}$] 闭区域

♣ $\{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$



目录

上页


下页

返回

结束

♣ 整个平面是最大的开域，
也是最大的闭域；

♣ 点集 $\{(x, y) \mid |x| > 1\}$ 是开集，
但非区域。



- 对点集 E ，若存在正数 K ，使对一切点 $P \in E$ ， P 与原点 O 的距离 $|OP| \leq K$ ，则称 E 为有界点集；
否则，称为无界点集。

目录

上页

下页

返回

结束

2. n 维空间

n 元有序数组 (x_1, x_2, \dots, x_n) 的全体所构成的集合, 记作 \mathbf{R}^n , 即

$$\begin{aligned}\mathbf{R}^n &= \mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \dots \times \mathbf{R} \\ &= \{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_k \in \mathbf{R}, k = 1, 2, \dots, n \}\end{aligned}$$

\mathbf{R}^n 中的每一个元素 (x_1, x_2, \dots, x_n) 称为 \mathbf{R}^n 中的一个点或一个 n 维向量, 数 x_k 称为该点或该 n 维向量的第 k 个坐标.

当所有坐标 $x_k = 0$ 时, 称该点为 \mathbf{R}^n 中的坐标原点, 或 n 维零向量, 记作 0 .

[目录](#)[上页](#)[下页](#)[返回](#)[结束](#)

对于 \mathbf{R}^n 中的向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 以及实数 λ ，规定

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n),$$

$$\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n),$$

称引入了上述线性运算的集合 \mathbf{R}^n 为 n 维(实)空间.

\mathbf{R}^n 中的点 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与点 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 的距离记作 $P(x, y)$ 或 $\|x - y\|$ ，规定为

$$P(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

\mathbf{R}^n 中的点 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与零元 0 的距离为

目录

上页

下页

返回

结束

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

并称 $\|x\|$ 为向量 x 的模. 当 $n=1,2,3$ 时, $\|x\|$ 通常记作 $|x|$.

于是, 对于 R^n 中的向量 x 与 y , 它们的差为

$$\|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2} = P(x, y)$$

若 R^n 中的变元 x 与定元 a 满足 $\|x - a\| \rightarrow 0$

则称 a 为变元 x 的极限, 记作 $x \rightarrow a$. 显然,

$$x \rightarrow a \iff x_1 \rightarrow a_1, x_2 \rightarrow a_2, \cdots x_n \rightarrow a_n.$$

R^n 中点 a 的 δ 邻域为

$$U(a, \delta) = \{x \mid x \in R^n, P(x, a) < \delta\}$$

目录

上页

下页

返回

结束


二、 n 元函数 $\mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ 的映射

1. n 元函数

引例: • 圆柱体的体积

$$V = \pi r^2 h,$$

$$\{(r, h) \mid r > 0, h > 0\}$$



• 定量理想气体的压强

$$p = \frac{RT}{V} \quad (R \text{ 为常数}), \quad \{(V, T) \mid V > 0, T > T_0\}$$

目录

上页

下页


返回

结束

- 三角形面积的海伦公式

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad \left(p = \frac{a+b+c}{2}\right)$$

$$\{(a, b, c) \mid a > 0, b > 0, c > 0, a + b > c\}$$



定义8.1 设非空点集 $D \subset \mathbf{R}^n$,

映射 $f : D \mapsto \mathbf{R}$

称为定义在 D 上的 **n 元函数**, 记作

$$f : D \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R},$$

目录

上页

下页

返回

结束

或 $y = f(x) = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \quad x \in D.$

x_1, x_2, \cdots, x_n 称为自变量, 点集 D 称为函数的定义域;

数集 $f(D) = \{f(x) \mid x \in D\}$ 称为函数的值域.

\mathbf{R}^{n+1} 的子集 $\{(x_1, x_2, \cdots, x_n, y) \mid y = f(x_1, x_2, \cdots, x_n),$
 $(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in D_f\}$

称为函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的图形.

特别地, 当 $n = 2$ 时, 有二元函数

$$z = f(x, y), \quad (x, y) \in D \subset \mathbf{R}^2$$

目录

上页

下页

返回

结束

当 $n = 3$ 时, 有三元函数

$$u = f(x, y, z),$$


$$(x, y, z) \in D \subset \mathbb{R}^3$$

一般地, 二元函数

$$z = f(x, y), (x, y) \in D$$

的图形为空间曲面 Σ .

二元函数的定义域 是平面点集.



目录

上页

下页

返回

结束

当 $n = 3$ 时, 有三元函数

$$u = f(x, y, z),$$


$$(x, y, z) \in D \subset \mathbb{R}^3$$

一般地, 二元函数

$$z = f(x, y), (x, y) \in D$$

的图形为空间曲面 Σ .

二元函数的定义域 是平面点集.



目录

上页

下页

返回

结束

例如, 二元函数


$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

图形为中心在原点的
的上半球面.

定义域为圆域

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

又如, $z = -\frac{xy}{e^{x^2+y^2}}, (x, y) \in \mathbb{R}^2$








目录

上页

下页

返回

结束



目录

上页

下页

返回

结束

三元函数 的定义域是三维空间的点集.

如, 三元函数

$$u = \arcsin(x^2 + y^2 + z^2)$$

的定义域为 单位闭球

$$\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

图形为 \mathbf{R}^4 空间中的超曲面.

目录

上页

下页

返回

结束

2. $R^n \rightarrow R^m$ 的映射

引例 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 质量为 m_0 的质点 M_0 , 对位于 Ω 内质量为 m 的质点 M 的引力为

$$\begin{aligned} F(x, y, z) &= G \frac{m_0 m}{\left| \overrightarrow{MM_0} \right|^2} \frac{\overrightarrow{MM_0}}{\left| \overrightarrow{MM_0} \right|} \\ &= G \frac{m_0 m}{\left[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 \right]^{3/2}} (x-x_0, y-y_0, z-z_0) \\ &= (F_x, F_y, F_z) \end{aligned}$$

这里的函数 $F(x, y, z)$ 是一个定义在 $\Omega \subset R^3$ 上的向量值函数, 从 R^3 到 R^3 的映射.

[目录](#)[上页](#)[下页](#)[返回](#)[结束](#)

定义8.2 设非空点集 $D \subset \mathbf{R}^n$, 映射 $f: D \mapsto \mathbf{R}^m$ 称为定义在 D 上的一个 n 元向量值函数, 记作

$$f: D \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m,$$

$$\text{或 } (y_1, y_2, \dots, y_m) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

当 $m=1$ 时, 就是定义8.1中的 n 元函数, 当 $n=1$ 时, 就是第七章讲的一元向量值函数.

向量值函数的几何或物理意义举例

$$\mathbf{R}^1 \rightarrow \mathbf{R}^2 : \begin{cases} u = u(t), \\ v = v(t), \end{cases} \longleftrightarrow$$

平面曲线的方程或平面质点随时间运动的轨迹.

目录

上页

下页

返回

结束

$$R^1 \rightarrow R^3 : \begin{cases} u = u(t), \\ v = v(t), \\ w = w(t), \end{cases} \iff$$

空间曲线的方程或空间质点随时间运动的轨迹.

$$R^2 \rightarrow R^2 : \begin{cases} u = u(x, y), \\ v = v(x, y), \end{cases} \iff$$

平面向量场或平面到平面的坐标变换.

$$R^2 \rightarrow R^3 : \begin{cases} u = u(x, y), \\ v = v(x, y), \\ w = w(x, y), \end{cases} \iff$$

曲面的方程或一族空间曲线(当固定 x 或 y).

目录

上页

下页

返回

结束

三、多元函数的极限

1. 定义8.3 设二元函数 $f(P) = f(x, y)$, $P \in D \subseteq \mathbb{R}^2$, $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的聚点, 若存在常数 A , 使得 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 对于一切 $P(x, y) \in \dot{U}(P_0, \delta) \cap D$, 总有

$$|f(P) - A| = |f(x, y) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为函数 $f(P)$ 当 $P \rightarrow P_0$ 时的极限, 记作

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A \text{ 或 } \lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A,$$

或
$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A.$$

目录


上页

下页

返回

结束

注 1° 在二元函数极限定义中, $P \rightarrow P_0$ 是指在平面上位于 D 内以任意方式趋于 P_0 ;



2° 二元函数的极限又称为二重极限;

3° 关于二元函数的极限概念, 可相应地推广到 n 元函数 $u = f(P)$, $P \in D \subseteq \mathbf{R}^n$ 上去;

4° 二元函数的极限运算法则与一元函数类似.

目录

上页

下页

返回

结束


2. 求二重极限的常用方法

(1) 利用定义

例1 求证: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0.$

证 $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$

$$\begin{aligned} & |f(x, y) - 0| \\ &= |x^2 + y^2| \cdot \left| \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \leq x^2 + y^2 \end{aligned}$$



目录

上页

下页

返回

结束

$\forall \varepsilon > 0,$


要使 $\left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon$

只要 $0 < x^2 + y^2 < \varepsilon$

故取 $\delta = \sqrt{\varepsilon}$, 则

当 $0 < \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} < \delta$ 时,

$\left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon$ 原结论成立.



目录

上页

下页

返回

结束


(2) 用变量代换

化二重极限为一元函数的极限.

例2 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x+y}{\sqrt{x+y+1}-1}.$

解 $f(x, y) = \frac{x+y}{\sqrt{x+y+1}-1},$

$$D = \{(x, y) \mid x+y \neq 0, x+y \geq -1\}$$



$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x+y}{\sqrt{x+y+1}-1} \stackrel{\text{令 } t=x+y}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sqrt{t+1}-1}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} (\sqrt{t+1} + 1) = 2.$$

目录

上页

下页

例题

结束


(3) 利用夹逼准则, 重要极限

例3 求极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2}$.

解 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2}$

$$= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 y} \cdot \frac{x^2 y}{x^2 + y^2},$$

其中 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 y} \underline{\underline{u = x^2 y}} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1,$



目录

上页

下页

例题

继续

$$\because 2|x||y| \leq x^2 + y^2$$

$$0 < \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{1}{2} |x| \xrightarrow[y \rightarrow 0]{x \rightarrow 0} 0, \quad (x^2 + y^2 \neq 0)$$

$$\therefore \text{由夹逼准则, 可知 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 y} \cdot \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \\ &= 1 \times 0 = 0. \end{aligned}$$

目录

上页

下页

返回

结束

(4) 利用极坐标变换, 将二重极限化成
 $\rho \rightarrow 0$ (θ 任意变化) 时的极限

例4 求极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(y-x)x}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

$$\because \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho = 0$$

$$|(\sin \theta - \cos \theta) \cos \theta| < 2$$

解 令 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta, (\rho = \sqrt{x^2 + y^2} > 0)$

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(y-x)x}{\sqrt{x^2+y^2}} &= \lim_{\substack{\rho \rightarrow 0 \\ (\theta \text{ 任意})}} \frac{\rho(\sin \theta - \cos \theta) \cdot \rho \cos \theta}{\rho} \\ &= \lim_{\substack{\rho \rightarrow 0 \\ (\theta \text{ 任意})}} \rho \cdot (\sin \theta - \cos \theta) \cos \theta = 0. \end{aligned}$$

目录

上页

下页

返回

结束


3. 确定极限不存在的方法:

(1) 令 $P(x, y)$ 沿直线 $L: y = y_0 + k(x - x_0)$

趋向于 $P_0(x_0, y_0)$, 若 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ (P \in L \cap D)}} f(P)$ 的值

与 k 有关, 则可断言: 二重极限

$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 不存在 .



目录

上页

下页


返回

结束

(2) 找两条特殊路径 L_1, L_2 , 若

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ (P \in L_1 \cap D)}} f(P) \neq \lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ (P \in L_2 \cap D)}} f(P)$$

则 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 不存在 .



目录

上页

下页

返回


结束

例5 证明下列极限不存在:

$$(1) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x+y}{x-y}; \quad (2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2};$$

$$(3) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}.$$

证 (1) $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$



定义域 $D = \{(x, y) \mid x \neq y\}$

目录

上页

下页

例题


继续

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+0}{x-0} = 1$$

$$\lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ x=0}} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0+y}{0-y} = -1$$

$$\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} f(x, y) \neq \lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ x=0}} f(x, y)$$

$$\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x+y}{x-y} \text{ 不存在 } .$$



目录

上页


下页

返回

结束

$$(2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

分析 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$



$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 0}{x^2 + 0^2} = 0$$

$$= \lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ x=0}} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 \cdot y}{0^2 + y^2} = 0$$

能否说 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 存在? 不能!

目录

上页

下页

返回

结束

证 $\because \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot kx}{x^2 + (kx)^2}$$

$$= \frac{k}{1 + k^2}$$

其值随 k 的不同而变化,

$\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 不存在.

目录

上页

下页

返回

结束



$$(3) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$$

分析 $f(x, y) = \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx \rightarrow 0}} f(x, y)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \cdot kx}{x^6 + (kx)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^4 + k^2} = 0.$$

能否说 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$ 存在? 不能!



目录

上页

下页

返回

结束

证 取 $y = kx^3$,

$$\begin{aligned}\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx^3 \rightarrow 0}} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \cdot kx^3}{x^6 + k^2 x^6} \\ &= \frac{k}{1 + k^2},\end{aligned}$$

$$f(x, y) = \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$$

其值随 k 的不同而变化,

故该极限不存在.

目录

上页

下页

返回

结束


例6 问: 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x+y}$ 是否存在?

分析 $f(x, y) = \frac{xy}{x+y}$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot kx}{x + kx} \quad (k \neq -1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx}{1+k} = 0.$$

能否说 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x+y}$ 存在? 不能!



目录

上页

下页

返回

结束

证 取 $x + y = x^2$, 即 $y = x^2 - x$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = x^2 - x \rightarrow 0}} \frac{xy}{x+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot (x^2 - x)}{x^2} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} (x - 1) = -1$$

$$\neq \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = 0}} \frac{xy}{x+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 0}{x+0} = 0$$

\therefore 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x+y}$ 不存在.

目录

上页

下页

返回

结束

四、多元函数的连续性

定义8.4 设二元函数 $f(P) = f(x, y)$ 定义在 D 上, P_0 为 D 的聚点, 且 $P_0 \in D$, 如果

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0),$$

则称函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 连续.

如果函数在 D 上各点处都连续, 则称此函数在 D 上连续. 记作 $f(x, y) \in C(D)$.

定义8.5 设函数 $f(x, y)$ 定义在 D 上, P_0 为 D 的聚点, 如果函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 不连续. 则称 $P_0(x_0, y_0)$ 为函数 $f(x, y)$ 的间断点.

目录

上页

下页

返回

结束

例如, 函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 点极限不存在(例5(2)), 故 $(0, 0)$ 为其间断点.

又如, 函数

$$f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$$

在圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上间断.

结论: 一切多元初等函数在其定义区域内连续.

目录

上页

下页

返回

结束

例7 证明 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

在全平面连续.

证 在 $(x, y) \neq (0, 0)$ 处, $f(x, y)$ 为初等函数, 故连续.

$$\text{又 } 0 \leq \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{1}{2} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2}$$

由夹逼准则得

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 = f(0, 0)$$

故函数在全平面连续.

目录

上页

下页

返回

结束

闭区域上的多元连续函数有与一元函数类似的性质:

性质1 (有界性与最大最小值定理)

在有界闭区域 D 上连续的多元函数必定在 D 上有界, 且能取得它在 D 上的最大值 M 及最小值 m ;

性质2 (介值定理)

在有界闭区域 D 上连续的多元函数必取得介于它在 D 上的最大值 和最小值之间的一切值.

目录

上页

下页

返回


结束

例8 求函数 $f(x, y) = \frac{\arcsin(3 - x^2 - y^2)}{\sqrt{x - y^2}}$ 的连续域.

解 初等函数的连续域就是其定义域.

$$\begin{cases} |3 - x^2 - y^2| \leq 1 \\ x - y^2 > 0 \end{cases}$$

→
$$\begin{cases} 2 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \\ x > y^2 \end{cases}$$



目录

上页

下页

返回

结束

例9 利用函数的连续性求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

解 函数 $z = \frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 是初等函数，

(1,0)点是它的定义区域内的点，

故函数在(1,0)点连续.

于是
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\ln(1 + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\ln(1 + e^0)}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = \ln 2.$$

目录

上页

下页

返回

结束

内容小结

1. 平面点集

- 邻域 : $U(P_0, \delta)$, $\overset{\circ}{U}(P_0, \delta)$
- 区域 —— 连通的开集
- \mathbf{R}^n 空间

2. 多元函数概念

n 元函数 $u = f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$x \in D \subset \mathbf{R}^n$$

常用 $\left\{ \begin{array}{l} \text{二元函数 (图形一般为空间曲面)} \\ \text{三元函数} \end{array} \right.$

目录

上页

下页

返回

结束

3. 多元函数的极限

(1) 定义. $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$
当 $0 < |PP_0| < \delta$ 且 $P \in D$ 时,
有 $|f(P) - A| < \varepsilon$

(2) 求二重极限的常用方法

- 1) 利用定义
- 2) 用变量代换化二重极限为一元函数的极限.
- 3) 利用夹逼准则, 重要极限
- 4) 利用极坐标变换, 将二重极限化成
 $\rho \rightarrow 0$ (θ 任意变化) 时的极限

(3) 确定极限不存在的两种常用方法.

目录

上页

下页

返回

结束

4. 多元函数的连续性

1) 函数 $f(P)$ 在 P_0 连续 $\iff \lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$

2) 闭区域上的多元连续函数的性质:

有界性定理;

最值定理;

介值定理

3) 一切多元初等函数在其定义区域内连续

目录

上页

下页

返回

结束

思考题

1. 已知 $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy \tan \frac{x}{y}$, 试求 $f(tx, ty)$.

解
$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= (tx)^2 + (ty)^2 + txt y \tan \frac{tx}{ty} \\ &= t^2(x^2 + y^2 + xy \tan \frac{x}{y}) = t^2 f(x, y). \end{aligned}$$

(满足关系式: $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ 的函数 $f(x, y)$, 称为 n 次齐次函数)

2. 求下列函数的定义域: (1) $z = \sqrt{x - \sqrt{y}}$;

目录

上页

下页


返回

结束

$$(2) u = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2 - z^2} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - r^2}} \\ (R > r > 0).$$


解 (1) 定义域

$$D: \begin{cases} x \geq \sqrt{y} \\ y \geq 0 \end{cases}$$



(2) 定义域

$$D: r^2 < x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$$



目录

上页

下页


返回

结束

3. 求函数 $f(x, y) = \frac{\sqrt{4x - y^2}}{\ln(1 - x^2 - y^2)}$ 的定义域,

并求 $\lim_{(x, y) \rightarrow (\frac{1}{2}, 0)} f(x, y)$.

解 定义域 $D: \begin{cases} y^2 \leq 4x \\ 0 < x^2 + y^2 < 1 \end{cases}$



$$\lim_{(x, y) \rightarrow (\frac{1}{2}, 0)} f(x, y) = f(\frac{1}{2}, 0) = \frac{\sqrt{2}}{\ln \frac{3}{4}}$$

目录

上页

下页

返回

结束

4. 设 $f(xy, \frac{y^2}{x}) = x^2 + y^2$, 求 $f(\frac{y^2}{x}, xy)$.

解

$$\text{令 } \begin{cases} xy = u \\ \frac{y^2}{x} = v \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x = \frac{u}{\sqrt[3]{uv}} \\ y = \sqrt[3]{uv} \end{cases}$$

$$\longrightarrow f(u, v) = \frac{u^2}{(uv)^{2/3}} + (uv)^{2/3}$$

$$u = \frac{y^2}{x}, v = xy$$

$$f(\frac{y^2}{x}, xy) = \frac{(\frac{y^2}{x})^2}{y^2} + y^2 = \frac{y^2}{x^2} + y^2$$

目录

上页

下页

返回

结束

备用题

例2-1 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2 - \sqrt{xy + 4}}{xy}$.

解 原式 $\stackrel{t=xy}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 - \sqrt{t + 4}}{t}$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2 + \sqrt{t + 4}}$$
$$= \frac{1}{4}$$

目录

上页

下页

返回

结束

例2-2 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)x^2 y^2}$

此函数定义域
不包括 x, y 轴

解 $\because x^2 y^2 \leq \frac{1}{4}(x^2 + y^2)^2$, 令 $r^2 = x^2 + y^2$, 则

$$\left| \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)x^2 y^2} \right| \geq \frac{4(1 - \cos r^2)}{r^6}$$

化为一元函数极限

而 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{4(1 - \cos r^2)}{r^6} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{2r^4}{r^6}$

故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)x^2 y^2} = \infty$.

$$1 - \cos r^2 \sim \frac{r^4}{2} \quad (r \rightarrow 0)$$

目录

上页

下页

返回

结束

例3-1 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{x}$.

解 $D = \{(x, y) | x \neq 0\}$

即函数在 y 轴之外的一切点处有定义.

$$\begin{aligned} \text{当 } y \neq 0 \text{ 时, } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{x} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{xy} y \\ &= 1 \cdot 0 = 0, \end{aligned}$$

目录

上页

下页

返回

结束

当 $y = 0$ 时, 即点 P 沿 x 轴趋于 $(0,0)$ 时,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} \frac{\sin xy}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

综上所述,
$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{x} = 0.$$

目录

上页

下页

返回

结束

例3-2 证明 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$.

证 因为 $|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ 及 $\frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1$,

所以

$$0 \leq \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{x^2}{x^2 + y^2} |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0$$

$((x, y) \rightarrow (0, 0)),$

从而由夹逼定理得证 .

目录

上页

下页

返回

结束

例5-1 讨论函数 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处的极限.

解 当 $P(x, y)$ 沿直线 $y = kx$ 趋于 $(0, 0)$ 点, 则有

$$\begin{aligned}\lim_{(x, kx) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2} \\ &= \frac{k}{1 + k^2}\end{aligned}$$

此结果随 k 值不同而不同!

故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点极限不存在.

目录

上页

下页

返回

结束

例5-2 说明极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{x+y}$ 不存在 .

解
$$\frac{\sqrt{xy+1}-1}{x+y} = \frac{xy+1-1}{(x+y)(\sqrt{xy+1}+1)}$$
$$= \frac{xy}{x+y} \cdot \frac{1}{\sqrt{xy+1}+1}$$

沿 $y = kx^2 - x, k \neq 0, x \rightarrow 0,$

$$\frac{xy}{x+y} = \frac{x \cdot (kx^2 - x)}{x + kx^2 - x} = \frac{kx^3 - x^2}{kx^2} = \frac{kx - 1}{k} \rightarrow -\frac{1}{k}.$$

所以原极限不存在 .

目录

上页

下页

返回

结束

例5-3 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x \frac{\ln(1+xy)}{x+y}$ 是否存在?

解 利用 $\ln(1+xy) \sim xy$, 沿 $y = x^\alpha - x, x \rightarrow 0$,

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = x^\alpha - x}} x \frac{\ln(1+xy)}{x+y} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = x^\alpha - x}} \frac{x^2 y}{x+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\alpha+2} - x^3}{x^\alpha} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - x^{3-\alpha}) = \begin{cases} -1, & \alpha = 3 \\ 0, & \alpha < 3 \\ \infty, & \alpha > 3 \end{cases} \end{aligned}$$

所以极限不存在.

目录

上页

下页

返回

结束