病児保育受け入れ基準：Standards for accepting sick childcare

―利用当日に満たしておく条件:The DAY of use―

体温 Body Temperature	38.5℃以下 Under 38.5℃
食欲 Appetite for food	食事・水分摂取・哺乳が可能で脱水症状がない Able to eat, drink fluid, and take a bottle of milk, and not dehydrated
消化器症状:Digestive Symptoms	頻回な嘔吐や多量の下痢ではない Not frequent or profuse vomit and diarrhea
呼吸器症状:Respiratory symptoms	呼吸困難症状がない（ゼーゼー・ヒューヒュー） No respiratory distress symptoms

―各種感染性疾患等の利用許可基準―

〈〇利用基準: Usage Standards〉

感冒性症候群・気管支炎・マイコプラズマ感染症・RS ウイルス感染症・ヘルパンギーナ
手足口病・突発性発疹・ヒトメタニューモウイルス感染症・骨折・捻挫など
Cold, Flu, Bronchitis, Mycoplasma infection, RS virus infection, herpangina,
HFMD disease, exanthem subitem, HMV infection, Bone fracture/sprain etc.

〈×急性期の利用ができない病気: Diseases that are not available〉

・新型コロナウイルス感染症/COVID-19
・インフルエンザ/ influenza
・溶連菌咽頭炎/hemolytic streptococcal pharyngitis
・感染性胃腸炎/Infectious Gastroenteritis

※以下の場合は受け入れ可能です。Acceptable in the following cases

新型コロナ感染症 COVID-19	発症後 4 日を経過し、かつ解熱している 4 days have passed since the onset of the disease and the fever has resolved
インフルエンザ influenza	
溶連菌咽頭炎 Hemolytic streptococcal pharyngitis	抗菌薬の内服開始後、利用可能 Available after initiation of antimicrobial medication
感染性胃腸炎 Infectious Gastroenteritis	嘔吐、頻回・多量の下痢がなく、水分・食事が摂取できる Able to consume fluids and food without vomiting or frequent or profuse diarrhea

＊解熱とは原則として解熱剤の使用なく、おおよそ 37.5℃未満に熱が下がっていることです。
As a rule, a fever has decreased to 37.5℃ or less without the use of antipyretics.

〈学校保健法の登園・登校停止期間が過ぎれば利用可能〉

Available after the period of suspension from attending preschool and school under the School Health Law

麻疹 Measles	解熱後 3 日後 After 3 days from the time of the release of the heat
風疹 Rubella	発疹の消失後 After disappearance of rash
水痘 chickenpox	すべての発疹がかさぶたになっている All rashes are scabbed over
流行性耳下腺炎 Epidemic subauricular adenitis	耳下腺などの腫脹出現後 5 日が経過している 5 days have passed since the appearance of swelling in the parotid gland, etc.
咽頭結膜炎 sore throat and conjunctivitis	主症状消失後 2 日経過している 2 days have passed since resolution of main symptoms
流行性角結膜炎 Epidemic keratoconjunctivitis	感染の恐れがないと判断された場合 If it is determined that there is no risk of infection

―預かりが不可能な場合: Cases in which the child is not acceptable―

・医師により受け入れが不可能と判断された場合

If a doctor diagnoses that it is impossible to leave the child in a childcare facility

・感染性疾患(麻疹、風疹、水痘、新型コロナウイルス感染症、咽頭結膜熱、流行性角結膜炎、感染性胃腸炎など)で、他者に感染する恐れが強い。トイレ・手洗い場共有/ Strong risk of infecting others

・流行性耳下腺炎、インフルエンザの急性期で他者に感染する恐れが強い場合。

High risk of infecting others in the acute stages of mumps / influenza

・38.5℃以上の熱が続いている。/ Fever of 38.5℃ or higher continues.

・嘔吐・下痢がひどく脱水症状(皮膚や唇の乾燥、涙が出ない、ぐったりしているなど)がある。

Severe vomiting and diarrhea and dehydration

・咳がひどく、呼吸困難である(喘息発作を含む)。

Severe cough and difficulty breathing (including asthma attacks)

・感染しやすく、一旦感染すれば重症になる危険性が高い血液腫瘍疾患や重症心疾患、重症腎疾患、膠原病などや、免疫抑制剤を使用している子など。

Children with hematologic oncology disease, severe cardiac disease, severe renal disease, collagen disease, etc., who are susceptible to infection and at high risk of becoming seriously ill once infected, and children using immunosuppressive drugs.