

Examen 1

- 1) Se ha tomado una muestra de los precios de un mismo producto alimenticio en 16 comercios, elegidos al azar en un barrio de una ciudad, y se han encontrado los siguientes precios:

95, 108, 97, 112, 99, 106, 105, 100, 99, 98, 104, 110, 107, 111, 103, 110

Suponiendo que los precios de este producto siguen una distribución normal de varianza 25 y media desconocida:

- ¿Cuál es la distribución de la media muestral?
- Determine el Intervalo de confianza al 95% para la media poblacional.

Solución:

- a. Denotemos como μ la media poblacional desconocida. Como los precios vienen de una distribución Normal, entonces la media muestral (estadístico que es función de los elementos muestrales) también tiene una distribución Normal con media μ y varianza $\frac{\sigma^2}{n} = \frac{25}{16}$.

- b. Para determinar el IC, primero calculamos la media muestral:

$$\bar{x} = \frac{95 + 108 + \dots + 110}{16} = 104$$

La fórmula del intervalo es:

$$IC(\mu) = \bar{x} \pm t_{n-1; \frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Según la tabla de la t-student (buscando los grados de libertad igual a 15 y la probabilidad igual a 0.025) el valor $t_{n-1; \frac{\alpha}{2}} = 2.1315$.

$$\begin{aligned} IC(\mu) &= 104 \pm 2.1315 \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{16}} = \left[104 - 2.1315 \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{16}} ; 104 + 2.1315 \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{16}} \right] \\ &= [101.3357 ; 106.6643] \end{aligned}$$

- 2) Una marca de nueces afirma que como máximo el 6% de las nueces están vacías. Se eligieron 300 nueces al azar y se detectaron 21 vacías.
- Con un nivel de significación del 1%, ¿se puede aceptar la afirmación de la marca?

- b. Si se mantiene el porcentaje muestral de nueces vacías y el nivel de significación es del 5%, ¿qué tamaño muestral necesitaría para estimar la proporción de nueces con un error menor del 1%?

Solución:

Contraste para una proporción (muestra grande)

$$H_0: p \leq 0.06$$

$$H_1: p > 0.06$$

Donde $p_0 = 0.06$ es la proporción hipotética.

Según los datos muestrales:

$$n = 300$$

$$\hat{p} = \frac{21}{300} = 0.07$$

El estadístico de contraste es:

$$\hat{Z} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.01}{0.0137} = 0.7299$$

El valor crítico es:

$$Z_\alpha = 2.3263$$

Como es un contraste unilateral a la derecha (tenemos un ">" en la hipótesis alternativa), entonces la región de rechazo comienza en el valor crítico $Z_\alpha = 2.3263$ y se extiende hacia la derecha, por lo cual como $\hat{Z} = 0.7299$ es menor que el valor crítico, no se encuentra en la región de rechazo sino en la región de aceptación.

Conclusión: No hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, es decir, para rechazar lo que dice la marca de que como mucho el 6% de las nueces están vacías.

- 3) Los datos de la producción de trigo en toneladas (X) y el precio del kilo de harina en pesetas (Y) en la década de los 80 en España fueron:

Producción de trigo	30	28	32	25	25	25	22	24	35	40
Precio de la harina	25	30	27	40	42	40	50	45	30	25

- Ajusta la recta de regresión lineal simple de Y en función de X estimando sus parámetros.
- Calcula la varianza residual s_R^2 .
- Calcula un intervalo de confianza al 95% para la pendiente de la recta.
- En base al intervalo de confianza, ¿es significativo el parámetro?

Solución:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{s_{xy}}{s_x^2} = -1.3537$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 74.116$$

La recta es:

$$Y = 74.116 - 1.3537 X$$

La varianza residual es:

$$s_R^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n e_i^2 = \frac{207.92}{8} = 25.99$$

Para el intervalo de confianza necesitamos buscar en la tabla de la t-Student al valor $t_{n-2; \alpha/2} = t_{8; 0.025} = 2.306$

$$IC(\beta_1) = \hat{\beta}_1 \pm t_{n-2; \alpha/2} \sqrt{\frac{s_R^2}{(n-1)s_x^2}} = [-2.046; -0.661]$$

Como el intervalo no contiene al cero, rechazamos que $\beta_1 = 0$ al nivel de confianza del 95%. Entonces el β_1 es significativo.