

FICHA TÉCNICA

	Formulado y Distribuido por: Allister de México S.A. de C.V. Av. Circunvalación Sur No. 5 Col. Las Fuentes, C.P. 45070 Zapopan, Jalisco, México Conmutador: 33 31 33 00 13 33 31 33 98 16 e-mail: allister@allister.com.mx	Registro COFEPRIS (México): RSCO-URB-INAC-111-362-008-10
	Centro de Información Toxicológica (ATOX): 800 000 28 69	CLASIFICACIÓN  UN: 3352 PLAGUICIDA, PIRETROIDE, LÍQUIDO, TÓXICO. (Cipermetrina, 10%)
INFORMACIÓN GENERAL		
NOMBRE COMERCIAL:	CYBOR® 10 EA	
DESCRIPCIÓN:	Insecticida de uso urbano	
INGREDIENTE ACTIVO:	Cipermetrina (100 g de i.a./L)	
FAMILIA QUÍMICA:	Piretroide	
NOMBRE QUÍMICO:	(RS)- α -ciano-3-fenoxibencil (1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato	
MECANISMO DE ACCIÓN:	La cipermetrina es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Una vez ingresado el insecticida al cuerpo del insecto, provoca una parálisis del sistema nervioso central (período de residencia) y el insecto queda inmóvil. Al no poder alimentarse, muere por inanición.	
FORMULACIÓN:	SUSPENSIÓN ACUOSA	
	COMPOSICIÓN PORCENTUAL	
	Cipermetrina	10.00
	Ingredientes inertes	90.00
	Total:	100.00

RECOMENDACIONES DE USO: Es un insecticida piretroide especialmente diseñado para el control de plagas en almacenes, cocinas industriales, granjas, industria alimentaria, industria en general, tiendas departamentales, hogares, oficinas, hospitales, hoteles, aviones y cualquier otro lugar donde se encuentren las plagas. No tiene olor ni mancha paredes o ropa.

Plagas	Dosis ml/L de agua	Aplicación
Piojos (<i>Rhodnius prolixus</i>) Chinches (<i>Cimex lectularius</i> , <i>Triatoma infestans</i>) Pulga (<i>Ctenocephalides felis</i>) Mosquito (<i>Aedes aegypti</i> , <i>Anopheles spp</i> , <i>Culex spp</i>) Mosca domestica (<i>Musca domestica</i>) Hormiga de Faraón (<i>Monomorium pharaonis</i>) Hormiga de Fuego (<i>Solenopsis xyloni</i>) Avispa (<i>Vespula spp</i>)	10	Mojar bien techos, paredes y pisos.
Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>)	10	Asperjar en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde se haya visto la plaga. Utilizar dosis altas en infestaciones altas.
Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>) Cucaracha alemana (<i>Blatella germanica</i>)	20	
Alacrán (<i>Centruroides spp</i>)	20	Asperjar en cocinas, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde se haya visto la plaga.

TIEMPO DE REENTRADA: 30 minutos.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:	Mezclar la dosis y volumen de agua indicada en esta etiqueta y agitar hasta lograr una suspensión uniforme. Durante la aplicación no exponga a personas, alimentos, animales domésticos y utensilios de cocina. Después de la aplicación asegúrese de lavar el equipo usado y la ropa de trabajo. Para el control de cucaracha alemana es recomendable hacer aplicaciones en grietas y hendiduras. Se recomienda hacer aplicaciones mensuales para mantenimiento, sin embargo, se pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo de la infestación. En el caso de insectos rastreros se necesita tratar a fondo los escondrijos.
CONTRAINDICACIONES:	No aplicar el producto en áreas cerradas donde se encuentren personas o animales.