

FICHA TÉCNICA

	Formulado y Distribuido por: Allister de México S.A. de C.V. Av. Circunvalación Sur No. 5 Col. Las Fuentes, C.P. 45070 Zapopan, Jalisco, México Conmutador: 33 31 33 00 13 33 31 33 98 16 e-mail: allister@allister.com.mx	Registro COFEPRIS (México): RSCO-URB-INAC-0101A-X0010-009-2.90
---	--	---

	Centro de Información Toxicológica (ATOX): 800 000 28 69	CLASIFICACIÓN
		 UN: 2902 PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO N.E.P (FIPRONIL 2.9%)

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL:	FIPRAX® CE								
DESCRIPCIÓN:	Insecticida de uso urbano								
INGREDIENTE ACTIVO:	Fipronil (25 g de i.a./L)								
FAMILIA QUÍMICA:	Fenilpirazol								
NOMBRE QUÍMICO:	5-amino-1-(2,6-dicloro- α,α,α -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3-carbonitrilo								
FORMULACIÓN:	CONCENTRADO EMULSIONABLE								
	<table> <tr> <th>COMPOSICIÓN PORCENTUAL</th><th>% EN PESO</th></tr> <tr> <td>Fipronil</td><td>2.90</td></tr> <tr> <td>Sinergista, estabilizador y solvente</td><td>97.10</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>100.00</td></tr> </table>	COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO	Fipronil	2.90	Sinergista, estabilizador y solvente	97.10	Total:	100.00
COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO								
Fipronil	2.90								
Sinergista, estabilizador y solvente	97.10								
Total:	100.00								

RECOMENDACIONES DE USO: FIPRAX® CE es un insecticida con un prolongado efecto residual. Se recomienda su uso en aplicaciones interiores y exteriores en: hoteles, tiendas de mascotas, restaurantes, plantas industriales, plantas de alimentos, oficinas, supermercados, casas, edificios, almacenes, hospitales, ferrocarriles y camiones, para el control de las plagas que a continuación se mencionan.

PLAGAS	DOSIS DE APLICACIÓN
Mosquitos (<i>Aedes spp.</i>, <i>Anopheles spp.</i>, <i>Culex spp.</i>) Moscas (<i>Musca domestica</i>, <i>Fannia canicularis</i>, <i>Drosophila spp.</i>, <i>Muscinastabulans sp.</i>, <i>Calliphora spp.</i>) Chinches (<i>Cimexlectularius</i>, <i>Triatoma spp.</i>, <i>Rhodnius spp.</i>) Cucarachas (<i>Periplaneta americana</i>, <i>P. fuliginosa</i>, <i>P. brunnea</i>, <i>Blatella germanica</i>, <i>Blatta orientalis</i>) Chinche de cama (<i>Cimex spp.</i>) Pescadito de Plata (<i>Lepisma spp.</i>) Grillos (<i>Acheta domesticus</i>) Cochinillas (<i>Isopoda</i>) Tijerilla (<i>Forficula auricularia</i>) Alacranes (<i>Centruroides spp.</i>) Arañas (<i>Latrodectus mactans</i>) Ciempies (<i>Quilopodos</i> y <i>Diplopodos</i>) Garrapatas (<i>Ixodidae</i>) Gorgojos (<i>Tribolium castaneum</i>, <i>Sitophilus oryzae</i>)	Aplice la dosis de 10 ó 20 ml/L de agua dependiendo de la infestación de la plaga. Aplice a baja presión en grietas y hendiduras donde estas plagas habitan comúnmente. Un litro de la mezcla es recomendado para 15 ó 20 m². Intervalo de aplicación: de 3 a 4 semanas entre aplicaciones.
HORMIGAS: Cosechadora (<i>Pogonomyrmex sp.</i>) De fuego (<i>Solenopsis sp.</i>) Argentina (<i>Iridomyrmex humilis</i>) Faraona (<i>Monomorium pharaonis</i>) De cabeza grande (<i>Pheidole megacephala</i>) Del pavimento (<i>Tetramorium sp.</i>) Pequeña hormiga del fuego (<i>Wasmannia auropunctata</i>) Domestica (<i>Tapinoma spp.</i>) Carpintera (<i>Camponotus spp.</i>)	
TERMITAS: Subterráneas (<i>Reticulitermes spp.</i>, <i>Zootermopsis spp.</i>, <i>Heterotermes spp.</i>, <i>Coptotermes spp.</i>) De la madera seca (<i>Marginitermes hubbardi</i>, <i>Cryptotermes spp.</i>, <i>Kalotermes spp.</i>) De nidos acartonados (<i>Nasutitermes spp.</i>)	Preparar una emulsion al 2% ó 4% de producto formulado dependiendo de la infestación de la plaga, para la cual diluya 2 ó 4 litros de FIPRAX® CE en 100 L de agua, respectivamente. *vea recomendaciones de aplicación.

TIEMPO DE REENTRADA: 2 horas o inmediatamente después que haya secado.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:	Para abrir el envase gire la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Utilice un vaso dosificador para medir la cantidad a utilizar de acuerdo a las recomendaciones de uso indicadas. Diluya con el volumen indicado de agua y mezcle manteniendo en agitación. TERMITAS Tratamiento para plagas de madera seca: Aplique con aspersor o bomba impregnando completamente la madera. Es recomendable que la madera no se encuentre sellada con barnices o selladores y que se encuentre seca. Tratamiento en pre-construcción: Establecer una barrera horizontal y vertical de insecticida entre el suelo y la edificación, debe efectuarse durante la etapa inicial de construcción hasta inmediatamente antes de colar la losa. La aplicación del insecticida debe efectuarse aspersión directamente sobre el suelo, cubriendo el fondo y las paredes de las excavaciones realizadas para la cimentación, así como el suelo anterior a la losa. Utilice el equipo apropiado para este propósito. Aplique a las dosis de 4 L de emulsión al 2% o 4% de producto formulado por metro cuadrado, según la infestación de las termitas. También establezca una barrera vertical en las instalaciones de agua y drenaje, tubería de gas, líneas eléctricas, etc., aplicando una dosis de 15 L de emulsión al 2% o 4% por cada 3 metros lineales por 30 cm de profundidad. Tanto esta aplicación como el tratamiento del suelo anterior a la losa deben efectuarse inmediatamente antes de cubrir el área con la losa. Tratamiento en post-construcción: El objetivo de este tratamiento es formar una barrera química para impedir que la termita ataque la edificación, en este caso para tratar el suelo que esta junto a la cimentación, es necesario perforar la losa e inyectar el insecticida en lugar de asperjarlo. Aplique en inyección 15 litros de emulsión al 2% o 4% de producto formulado por cada 3 metros lineales por 30 cm de profundidad a lo largo del perímetro interior de los cimientos. Las perforaciones deben hacerse lo suficientemente cercanas ente si (aproximadamente 30 cm), de tal manera que permitan la formación de una barrera química continua. Haga la aplicación con baja presión. Selle las perforaciones después de la inyección. Previo al tratamiento localice las instalaciones de agua y drenaje, tubería de gas, líneas eléctricas, etc. Debe tenerse especial cuidado para evitar perforar o contaminar estas instalaciones.
CONTRAINDICACIONES:	No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hora) o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.