

FICHA TÉCNICA

	Formulado y Distribuido por: Allister de México S.A. de C.V. Av. Circunvalación Sur No. 5 Col. Las Fuentes, C.P. 45070 Zapopan, Jalisco, México Conmutador: 33 31 33 00 13 33 31 33 98 16 e-mail: allister@allister.com.mx	Registro COFEPRIS (México): RSCO-DOM-INAC-174-301-092-0.050								
	Centro de Información Toxicológica (ATOX): 800 000 28 69	CLASIFICACIÓN								
		 UN: 2588 Plaguicida sólido, toxico, N.E.P. (Abamectina, 0.05%)								
INFORMACIÓN GENERAL										
NOMBRE COMERCIAL:	SANGHA® GEL									
DESCRIPCIÓN:	Insecticida de uso doméstico									
INGREDIENTE ACTIVO:	Abamectina (0.5 g de i.a./kg)									
FAMILIA QUÍMICA:	Avermectinas (lactona macrocíclica)									
NOMBRE QUÍMICO:	Mezcla de avermectinas B1 contenido no menos de 80% de avermectina B1a y no más del 20% de avermectina B1b									
FORMULACIÓN:	GEL									
	<table><tr><th>COMPOSICIÓN PORCENTUAL</th><th>% EN PESO</th></tr><tr><td>Abamectina</td><td>0.050</td></tr><tr><td>Otros ingredientes</td><td>99.950</td></tr><tr><td>Total:</td><td>100.00</td></tr></table>		COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO	Abamectina	0.050	Otros ingredientes	99.950	Total:	100.00
COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO									
Abamectina	0.050									
Otros ingredientes	99.950									
Total:	100.00									

RECOMENDACIONES DE USO: Se utiliza en aplicaciones únicas o bien como parte de un programa de control integral. El programa debe incluir medidas sanitarias, entre ellas la protección de las reservas alimenticias, eliminación adecuada de la basura y la reparación de los daños estructurales como grietas y hendiduras para evitar que las plagas encuentren sitios de refugios. Se recomienda su uso para el control de las plagas que a continuación se mencionan:

PLAGAS	DOSIS	LUGARES DE APLICACIÓN
Cucaracha americana <i>(Periplaneta americana)</i> Cucaracha oriental <i>(Blatta orientalis)</i> Cucaracha alemana <i>(Blatella germanica)</i>	De 5 a 20 puntos por m ²  0.25 – 1 g (Tamaño del punto de aplicación) 0.5 cm de diámetro.	Almacenes, cocinas industriales, granjas, industria en general, industria alimentaria, tiendas departamentales, hogares, oficinas, hospitales, hoteles, aviones y cualquier lugar donde se encuentren las cucarachas.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: No es necesario esperar para entrar a los lugares tratados.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:	No requiere de preparación previa ni uso de aspersores. Para la aplicación es necesario retirar el tapón que cubre la boquilla de la jeringa, presione ligeramente el embolo depositando pequeñas porciones en los lugares de refugio y fuentes de alimentación de estas.
CONTRAINDICACIONES:	Evite mojar el cebo o aplicar si la superficie se encuentra mojada.