



2^{ème}

CONGRÈS BURKINABÉ DE SANTÉ PUBLIQUE

Thème

Sécurité sanitaire : quels dispositifs pour mieux protéger les populations contre les risques épidémiques et pandémiques ?

LIVRE DES RÉSUMÉS



Ouagadougou

Du 16 au 18 décembre 2021
à l'Université Joseph KI-ZEBO
BURKINA FASO

PSL prescrits, la communication sur les PSL disponibles.

Mots clés : *Satisfaction client, produits sanguins labiles, modèle tétraclasse.*

STH-5-S10-COL-119

Dévoilement d'abus sexuels sur mineurs à Cotonou : circonstances, attitudes et vécu des parents d'enfants

ANAGONOU L¹, KLIKPO E², DEGNON R³, TOUDONOU G¹, GOGAN M¹, FIOSSI KPADONOU E¹

1. Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences de la Santé, Département de santé mentale, CHU-MEL, Cotonou, Bénin
2. Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences de la Santé, Département de santé mentale, CNHUPC, Cotonou, Bénin
3. Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences de la Santé, Ecole Supérieure des Assistants sociaux, Cotonou, Bénin

Auteur correspondant : ANAGONOU Lucrèce

Tél : +229 66263585

Email : luccea2@gmail.com

Les abus sexuels sur mineurs apparaissent de nos jours comme des problèmes public et politique majeurs. Dans notre contexte culturel, les tabous sociaux constituent un frein considérable à leur révélation.

Cette étude a eu pour objectif de déterminer les attitudes et ressentis des parents lorsqu'ils apprennent que l'un de leurs enfants a été victime d'abus sexuel ainsi que les circonstances du dévoilement.

Il s'agit d'une étude transversale descriptive et analytique utilisant une méthode à la fois qualitative et quantitative. Elle a été réalisée sur une période de six (06) semaines, du 17 août au 26 septembre 2020, dans un centre de prise en charge des victimes à Cotonou.

Elle a concerné quarante-un (41) parents d'enfants victimes d'abus sexuel dont vingt-un (21) de sexe féminin et vingt (20) de sexe masculin. L'âge moyen des enfants était compris entre 10 et 15 ans (56,1%). L'abus sexuel dont a été victime l'enfant a été découvert par le parent lui-même dans 24,4% des cas. Plus de la moitié des agressions sexuelles (51,2%) a été découverte plus d'un mois après leur survenue. Le dépôt de plainte s'est fait dans un délai d'une semaine à 1 mois

dans 39% des cas ; 56,1% des parents n'avaient pas initialement pensé à le faire.

La colère (53,7%) et la tristesse (34,1%) sont les émotions les plus ressenties par la majorité des parents. Ils rapportent une détérioration de la relation à leur enfant dans 21,9% des cas.

Le dévoilement des faits d'abus sexuels sur un enfant bouleverse le système familial.

Mots clés : *abus sexuel, mineur, attitude, vécu, parents, Cotonou.*

STH-5-S10-COL-120

Usage des appareils électroniques audiovisuels par les adolescents de 10 à 19 ans dans la commune d'Abomey Calavi en 2021 : connaissances, attitudes et pratiques, et conséquences socio sanitaires associées

Azandjeme Colette Sylvie^{1*}, LEGBA S. Rosine², AGUEMON Badirou², Sopoh Ghislain³, Sossa Charles¹, Ouendo Edgard-Marius⁴.

¹Département de la Promotion de la Santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

²Département de Santé Publique Santé et Epidémiologie, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

³Département Environnement et Santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

⁴Département Politique et Système de Santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

Auteur correspondant: Azandjeme Colette Sylvie, BP 384 Ouidah. Tel : +229 61784478 Email : colsyaz@yahoo.fr

Introduction : L'usage des appareils audiovisuels chez les enfants comme chez les adultes dans le monde pose un véritable problème de santé Publique. Cependant force est de remarquer que des données sont quasi inexistantes en Afrique et surtout au Bénin. L'objectif de notre étude est d'étudier les connaissances, attitudes et pratiques des adolescents sur l'usage des appareils audiovisuels et les conséquences socio-sanitaires associés dans la commune d'Abomey-Calavi en 2021.

Méthode: Il s'agit d'une étude transversale descriptive et analytique qui s'est déroulée du 17 Mai au 25 Mai 2021. La population d'étude était constituée d'adolescents scolarisés dans les collèges publics et privés de la commune d'Abomey-Calavi sélectionnés suivant une

méthode probabiliste par technique d'échantillonnage stratifié. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire auto-administré.

Résultats : Parmi les 346 élèves adolescents enquêtés, 98,8% avaient une connaissance insuffisante sur l'usage des appareils audiovisuels. La télévision était l'appareil audiovisuel le plus utilisé surtout pour regarder un film. Les conséquences étaient essentiellement à type de troubles visuels (54,3%) et de dépendance (62,4%). Après une analyse multi variée, les variables telles que les troubles musculo squelettiques ($OR= 6,557$; $p=0,002$), la sécheresse oculaire ($OR= 10,824$; $p=0,005$) et les troubles auditifs ($OR= 1,795$; $p=0,050$) étaient significativement associées à la dépendance.

Conclusion : La moitié des élèves adolescents de notre étude avait dans leur quotidien la présence d'appareils audiovisuels surtout l'usage de la télévision et du smartphone.

L'effet d'une certaine forme de dépendance ainsi que l'observance de troubles socio-sanitaires ajoutés à l'insuffisance de connaissances des adolescents et l'usage excessif et inappropriés, nous amènent à tirer la sonnette d'alarme. Des mesures doivent être également prises par tous les acteurs responsables du bien-être des enfants afin de leur assurer une meilleure protection.

Mots clés : Appareils Audiovisuels, Adolescents, Connaissances-Attitudes-Pratiques, Conséquences.

Sous-thème 5 Session 11

STH-5-S11-COL-121

Evaluation de l'efficacité du projet « stratégie de réduction de la consommation du sel dans la commune de Porto-Novo »

Azandjeme Colette Sylvie^{1*}, Danmadou Oceane¹, Metonnou Clemence¹, Sossa Charles¹, Kpozehouen Alphonse², Paraiso Moussiliou¹, Ouendo Edgard-Marius³.

¹Département de la Promotion de la Santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

²Département d'Epidémiologie, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

³Département Politique et Système de Santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

Auteur correspondant: Azandjeme Colette

Sylvie, BP 384 Ouidah. Tel : +229 61784478 Email :

colsyaz@yahoo.fr

Introduction : La consommation du sel constitue un défi notamment pour les pays africains où les prévalences de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires sont en hausse. Le but de l'étude était d'évaluer l'efficacité d'une intervention de réduction de la consommation du sel au sud du Bénin.

Méthode : Il s'agissait d'une étude évaluative qui s'est déroulée du 22 Mars au 16 Avril 2021 dans la ville de Porto-Novo. Elle a pris en compte les intrants en termes de ressources humaines, matérielles et financières. Le processus a porté sur les ateliers de sensibilisation des restaurateurs, pâtisseries, boulangers et hôteliers ainsi que les communications radio et télévision. Les résultats concernent les extraits, les effets et l'impact apprécié auprès de 62 boulangers et pâtisseries et 30 cuisiniers. Chaque composante a été appréciée selon une échelle adaptée de "Varkevisser et al."

Résultats : La composante « performance de la structure » a été jugée bonne à 85,71% avec une défaillance pour les ressources financières. La composante « performance du processus » a été jugée bonne avec un niveau de 100%. Les bénéficiaires du projet dans leur majorité (88,2%) ont une bonne connaissance des recommandations journalières de sel ($p<10^3$). En comparant aux personnes non sensibilisées, les sensibilisées ont reconnu l'effet néfaste d'une consommation élevée du sel sur les maladies cardiovasculaires (82,4%). Toutefois elles estiment qu'il est impossible de cuisiner sans ajout de sel ($p=0,002$) mais n'ajoutent pas de bouillon aux repas ($p=0,036$). Cette réduction du sel a amélioré la fréquentation des clients chez la moitié des acteurs, mais a entraîné une perte de clients chez le tiers.

Conclusion : Ces résultats montrent que la stratégie de réduction du sel a été efficace. Un suivi plus régulier devra se faire pour renforcer les connaissances et les pratiques tout en maintenant la rétention des clients.

Mots Clés : Evaluation, Efficacité, Réduction, Sel

STH-5-S11-COL-122

Évaluation de la qualité de l'eau de boisson et facteurs associés en milieu professionnel dans la ville de Parakou en 2018



UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE
EN SCIENCES DE LA SANTE

2^{ème} CONGRÈS BURKINABE DE SANTE PUBLIQUE



ATTESTATION DE COMMUNICATION

Nous soussignés, attestons que Madame AZANDJEME Colette Sylvie a effectué la communication orale intitulée "Usage des appareils électroniques audiovisuels par les adolescents de 10 à 19 ans dans la commune d'Abomey Calavi en 2021 : connaissances, attitudes et pratiques, et conséquences socio sanitaires associées." lors du 2^{ème} Congrès Burkinabè de Santé Publique (CBSP), tenu à Ouagadougou du 16 au 18 décembre 2021.

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Ouagadougou le 18 décembre 2021

Le Président du Comité d'Organisation

Professeur Laurent T. OUEDRAOGO



Le Président du Comité Scientifique

Professeur Arouna OUEDRAOGO

