



ECOLE NATIONALE DE FORMATION DES TECHNICIENS SUPERIEURS EN SANTE
PUBLIQUE ET EN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE (ENATSE), UNIVERSITE
DE PARAKOU (UP), BÉNIN

PREMIÈRES JOURNÉES D'ÉPIDÉMIOLOGIE ET DE SANTÉ PUBLIQUE DE L'UNIVERSITE DE PARAKOU (JESP-UP)

LIVRE DES RESUMES

THEME :

**La santé publique face aux nouveaux défis sanitaires : Instrument du
développement durable.**

SOUS THEMES :

- ✓ Promotion de la santé et développement durable
- ✓ Organisation des systèmes de santé et développement durable
- ✓ Épidémiologie des affections chroniques à l'ère de la COVID-19
- ✓ Réémergence des maladies infectieuses

Les 6-7 Mai 2022



Directeur de l'ENATSE

Mot du Directeur

L'Afrique fait face à de nombreux défis sanitaires qui impactent significativement son développement. Le rôle des institutions de formation et recherche est d'y apporter des solutions idoines. Les échecs successifs de différentes politiques mettant l'accent sur la médecine curative, la prévention, nous imposent une nouvelle approche de solutions.

La promotion de la santé avec une autonomisation des communautés et la prise en compte de la santé et ses déterminants dans tous les secteurs constitue une opportunité pour nos pays.

L'ENATSE est une institution de formation et de recherche à vocation nationale et régionale qui apporte des solutions aux défis sanitaires actuels que sont les maladies transmissibles (les nouvelles maladies et épidémies associées aux grandes endémies), les maladies non transmissibles aux indicateurs épidémiologiques en augmentation. Ces premières journées se veulent un creuset d'échange scientifique dont les résultats reflètent l'ampleur et l'intensité des travaux de recherche actuels visant à apporter des solutions aux défis sanitaires de nos pays. Des résumés retenus ont été préalablement examinés par un comité scientifique international composé de scientifiques de haut niveau du Bénin, de l'Afrique et de la France.

Je voudrais donc remercier et féliciter les membres de ce comité qui ont réalisé un travail extraordinaire avec une rigueur scientifique implacable pour la sélection des 85 communications.

C'est aussi le lieu pour moi d'adresser ma gratitude aux autorités de notre université ainsi qu'aux autorités sanitaires en particulier le ministre de la santé et sa collègue de l'enseignement supérieur.

Enfin, ces journées ne pouvaient avoir lieu sans le dynamisme des hommes et femmes membres du comité d'organisation qui ont travaillé d'arrache-pied pour sa réussite. Je voudrais les remercier et leur adresser toute ma reconnaissance.

J'adresse aussi mes remerciements aux différents partenaires qui ont cru en nous et ont soutenu ces journées.

Chers collègues, chers participants et congressistes recevez mes mots de remerciements et d'encouragement et je voudrais d'ores et déjà vous souhaiter d'excellents échanges.

Vive la recherche au service de la communauté !

Vive l'ENATSE de l'Université de Parakou !

Je vous remercie.

COMITÉS

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Président

Professeur OUENDO Edgard-Marius

Membres

Professeur HOUINATO Dismand

Professeur PREUX Pierre-Marie

Professeur ALLODE Alexandre

Professeur ADOUKONOU Thierry

Professeur TOGNON Francis

MC DJOGBENOU Luc

MCA HOUETO David

MCA SOSSA Charles

MCA AGUEMON Badirou

MCA SOPOH Ghislain

MCA AZANDJEME Colette

MCA GLELE-AHANHANZO Yolaine

MCA ATTINSOUNON Angelo

Dr AGONNOUDE Maurice

Dr BEHANZIN Luc

Dr HOUEHANOU Y. Corine Nadège

Dr KOSSI Oyéné

COMITÉ D'ORGANISATION

Président

Professeur ADOUKONOU Thierry

Membres

MCA HOUETO David

Dr AGONNOUDE Maurice

Dr AGBO Maxime

Dr BEHANZIN Luc

Dr HOUEHANOU Y. Corine Nadège

Dr KOSSI Oyéné

Dr MOUSSILIOU Azizath

Mr GBAGUIDI Boris

Mr DJOSSE Nicolas

Mme FLENON Adeline

Mr OROU DJARA Alassane

Mme DA COSTA Lino

Mme SATO BIO Dado

Mme IDRISOU Sahoudatou

Mr AHOUMENOU Fabrice

Mr BOKOSSA K. Covalic Melic

SOMMAIRES

I- COMMUNICATIONS.....	12
A. MALADIES NON TRANSMISSIBLES.....	13
CO1 : Prévalence et facteurs associés à l'hypertension artérielle chez les adultes des clubs et associations de sport d'entretien de Parakou en 2021	13
CO2 : Connaissances attitudes et pratiques relatives au cancer du sein chez les femmes du 1er arrondissement de Parakou en 2021	14
CO3 : Prévalence et les facteurs de risque de la maladie rénale chronique chez les élèves de 10 à 15 ans à Parakou.	15
COD4 : Évolution des paramètres échocardiographiques chez les gestantes victimes d'une hypertension artérielle sur grossesse à Parakou au Centre Hospitalier Universitaire et Départemental du Borgou/Alibori en 2021	16
COD5 : Profil évolutif des désordres hypertensifs dans le post-partum au Centre Hospitalier Universitaire et Départemental de Parakou de 2020 à 2021	18
CO6 : Prévalence et facteurs associés aux accidents vasculaires cérébraux dans le 4ème arrondissement de Porto-Novo en 2021	20
CO7 : Épidémiologie des céphalées primaires au cours de la grossesse à Parakou au Bénin en 2021	21
CO8 : Connaissances, attitudes et pratiques des adolescentes face à la dysménorrhée à Parakou en 2021.....	23
CO9 : Prévalence et Facteurs associés à la pression artérielle élevée chez les enseignants des établissements secondaires de Parakou.....	24
CO10 : Prévalences et facteurs associés aux facteurs de risque comportementaux des MNT chez les étudiants de l'Université de Parakou en 2021	25
CO11 : Facteurs associés à la dénutrition aiguë dans la commune de Banikoara au Bénin en 2021.....	26

COD12 : Prévalence des frottis cervico-utérins anormaux dans une population de femmes travailleuses de sexe de la ville de Parakou en 2021.....	27
CO13 : Kyste remanie chondrolytique de l'auricule au Centre Hospitalier Universitaire Departemental du Borgou et de l'Alibori, à propos d'un cas.	29
CO14 : Profil épidémiologique des violences au travail et facteurs associés chez les professionnels de la santé de la zone sanitaire Parakou-Ndali en 2021.	30
CO15 : Profil des risques professionnels associés à la soudure de matières plastiques par brulage artisanal à Parakou en 2019.	31
CO16 : Occurrence des pathologies liées à l'exposition des travailleurs de la filière d'exploitation de déchets de ferrailles aux faibles doses de rayonnements ionisants au Bénin	32
CO17 : Prévalence et facteurs associés à la consommation des substances psychoactives chez les conducteurs de taxi-moto à Djougou en 2021	34
CO18 : Prévalence et facteurs associés à la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans dans la commune de Glazoué en 2021.....	36
COD19 : Connaissances, attitudes et pratiques des apprenties coiffeuses et couturières face à la dysménorrhée dans la ville de Parakou en 2021.....	37
COD20 : Prise en soins des patients présentant des troubles neurodéveloppementaux du langage oral : cas des enfants infirmes moteurs cérébraux	38
COD21 : Prise en soins traditionnels des malades mentaux dans les communes d'Avrankou et d'Abomey.....	39
COD22 : Carie de la petite enfance : prévalence et facteurs associés chez les enfants en âge préscolaire, commune de Sakété, 2019.....	40
CO23: Stroke Burden in Benin 2008 to 2018: Systematic Review of the Literature	42

CO24 : Cancer de la prostate : facteurs de mauvais pronostiques et survie des patients au Bénin de 2016 à 2020.....	43
COD25 : Prévalence et prise en charge de l’hypertension artérielle en milieu de travail : cas de la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) à Cotonou, Bénin.....	44
CO26 : Facteurs professionnels et surcharge pondérale en milieu industriel textile au Bénin.....	46
CO27 : Facteurs associés au tabagisme chez les travailleurs du secteur industriel textile au Bénin.....	47
CO28 : Fertilité spontanée après myomectomie pour désir de grossesse à Cotonou : Facteurs influençant et issue des grossesses	48
COD29 : Diabète sucré chez les sujets atteints de l’hépatite virale C à Cotonou : prévalence et facteurs associés	50
CO30 : Frequency and factors associated with diabetes among pregnant women followed at the zone hospital (HZ) of Natitingou in 2020.....	51
CO31 : Prevalence and factors associated with chronic low back pain in general population in Cotonou in 2021.....	53
CO32 : Aspects cliniques et thérapeutiques des sarcomes à Cotonou.....	54
COD33 : Epidémiologie des facteurs de risque cardiovasculaires en population générale : particularités chez la femme en Afrique sub-Saharienne – étude TAHES	55
COD34 : Psychoéducation et prévention des rechutes chez les psychotiques chroniques a Abomey-Calavi : quand l’éducation thérapeutique rime avec une bonne stabilité de la santé.....	57
COD35 : Connaissances Attitudes et Pratiques sur les troubles neurocognitifs et l’épilepsie chez les étudiants en fin d’études en santé au Bénin.....	58

COD36 : Trouble de la fonction diastolique chez le sujet hypertendu en Afrique subsaharienne : données de TAHES	60
COD37 : Géométrie ventriculaire et fonction diastolique du sujet diabétique en Afrique subsaharienne : données de la cohorte TAHES	62
COD38 : Stigmatisation des malades mentaux au sud du Bénin.....	64
COD39 : Qualité de vie des patients cancéreux suivis dans un service d'oncologie médicale : une étude descriptive qualitative	66
COD40 : Caractérisation du trouble de l'usage de l'alcool : approche bio-psycho-sociale.....	68
CO41 : Prévalence et facteurs associés à la consommation abusive de l'alcool chez les jeunes de la commune de Matéri en 2021.	70
COD42 : Ampleur et facteurs associés au retard de croissance dans la commune de Dassa-Zoumè en 2021	71
COD43 : Facteurs associés au retard de croissance dans la commune de Dassa-Zoumè en 2021	72
COD44 : Epidemiological profile of type 2 diabetes in Avrankou	74
COD45 : Cervical cancer screening in a urban area	76
COD46 : Troubles du spectre autistique à Cotonou : facteurs influençant l'orientation des enfants au cours du processus diagnostique.....	78
COD47 : Pemphigus vulgaire avec profil inhabituel des anticorps anti desmogléine 1 et 3 : à propos d'un cas à Cotonou, Bénin	80
COD48 : Surcharge pondérale et l'obésité chez les enfants d'âge scolaire fréquentant des écoles primaires dans la ville de Porto Novo	82
B. MALADIES TRANSMISSIBLES.....	84
CO49 : Le paludisme et l'immunité anti palustre chez le jeune enfant, cas du projet ISAMIMA.....	84

CO50 : Prévalence de la bilharziose urinaire en milieu scolaire dans les communes de tchaourou et de nikki (benin) en 2018	86
CO51 : Suivi des nouveau-nés exposés au VIH dans les maternités PTME de la zone sanitaire Nikki-Kalalé-Pèrèrè au Bénin	87
CO52 : Connaissances, attitudes et pratiques relative aux VIH chez les conducteurs de taxi-moto à Parakou en 2021.	88
CO53 : Facteurs associés à la survie à trois ans chez les personnes infectées au VIH, mises sous traitement antirétroviral au CNRRPEC/CNHU-HKM de Cotonou	90
CO54 : Épidémiologie de la COVID-19 sur grossesse dans les centres de traitement des épidémies et dans les formations sanitaires de Cotonou en 2021	91
CO55 : COVID-19 sur grossesse au Bénin en 2021: diagnostic, traitement et pronostic	93
CO56 : Artésunate, artémether et létalité du paludisme grave chez l'enfant au CHR Tsévié au Togo : un essai clinique randomisé	95
COD57 : Essai FALCON sur les mesures de prévention des infections du site opératoire dans les pays à revenus faibles et intermédiaires.....	97
COD58 : Facteurs associés à la qualité microbiologique des mains, téléphones des soignants des Chirurgies, CNHU-HKM, Bénin.....	98
COD59 : Connaissances de la covid-19 chez les peuples autochtones de la Sangha en République du Congo	99
COD60 : Manifestations adverses post immunisation anti covid-19 à Brazzaville	101
COD61 : Riposte contre la covid-19 : Défis du personnel de santé à Pointe – Noire	103
C. PROMOTION DE LA SANTE ET AUTRES.....	105

CO62 : Tatouages et piercings : aspects épidémiologiques et motivations en 2021 à Parakou (Bénin).....	105
CO63 : Déterminants conjugaux de la qualité des pratiques alimentaires observées des gestantes de six villages de Klouékanmè (Bénin)	106
CO64 : Perception de l'impact des mesures de restriction de la COVID-19 en milieu de travail du sexe à Cotonou, Bénin, 2020	108
CO65 : Causes profondes de l'accès à la vaccination contre la Covid-19 dans le Zio : Désinformation et mains invisibles à l'ère des réseaux sociaux.....	110
CO66 : Lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique lassa dans la commune de Tchaourou au Benin : rôle de l'action sur les déterminants sociaux de la santé et de l'autonomisation communautaire en 2018	112
CO67 : Stratégies d'intervention pour l'amélioration du pronostic des AVC en Afrique subsaharienne : revue systématique de littérature et méta-analyse	113
COD68 : Impact de l'exercice de la fonction soignante sur la vie conjugale des professionnels de santé : Cas de l'hôpital de zone de Savè-Ouèssè en 2020 ...	114
COD69 : Maternité Désirée : une méthode naturelle capable de réduire les besoins non couverts en planification familiale	116
COD70 : Les maladies inflammatoires systémiques en Médecine Interne du CNHU-HKM de Cotonou : fréquence, aspects cliniques et immunologiques .	118
COD71 : Apport du numérique et de l'intelligence artificielle dans la conduite de travaux de recherche en santé.....	119
CO72 : Problématique du phénomène des garde-malades au Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l'Ouémé-Plateau en 2017.....	120
CO73 : Financement basé sur les résultats et performance en accouchement des formations sanitaires (FS) au nord Bénin en 2016.....	121

CO74 : Performance des formations sanitaires en matière de système d'informations sanitaires et facteurs associés de la zone Parakou-N'dali en 2021	123
CO75 : Prévalence et facteurs associés au recours aux consultations postnatales chez les parturientes de la commune de Glazoué (Bénin) en 2020	124
COD76 : Facteurs associés à l'assiduité aux consultations prénatales recentrées par les gestantes à Allada en 2021	125
COD77 : Environnement socio-anthropologique et administratif de la performance des intervenants de la santé au Bénin	126
COD78 : Évaluation de la qualité de la vaccination chez les enfants de 12-24 mois dans la zone sanitaire Adjohoun-Bonou-Dangbo, 2021	128
CO79 : Mortalité et causes de décès des adultes à cotonou (bénin) en 2019: étude pilote	129
CO80 : Facteurs associés au délai préhospitalier des patients post-AVC au CHUD-Borgou en 2020	131
CO81 : Les secteurs publics et privés du Bénin au regard de la réforme de la politique publique de santé à l'ère de la rupture	133
II- POSTERS	134
P1 : Etat des lieux de la résistance aux antibiotiques en réanimation polyvalente du CNHU/HKM de Cotonou en 2022.....	135
P2 : Motivations des médecins à se spécialiser en Chirurgie à la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou.....	136
P3 : École promotrice de la santé (EPS) : perceptions et pratiques dans le système éducatif au bénin : cas de la circonscription scolaire de Parakou 1 en 2019....	138
P4 : Évaluation de l'estime de soi chez les paralysés cérébraux (PC) à Cotonou	139

I- COMMUNICATIONS

A. MALADIES NON TRANSMISSIBLES

CO1 : Prévalence et facteurs associés à l'hypertension artérielle chez les adultes des clubs et associations de sport d'entretien de Parakou en 2021

Houehanou Yèssito Corine Nadège^{*1}, da Sylva Onesiphore¹, Kossi Oyene¹, Adoukonou Thierry¹, Houinato Dismand²

(1) ENATSE, Université de Parakou

(2) LEMACEN, Université d'Abomey-Calavi

Auteur correspondant* : Houehanou Yessito Corine Nadège, yessito_fr@yahoo.fr

Résumé

Introduction : L'hypertension artérielle (HTA) constitue un problème de santé publique au Bénin. L'objectif général de l'étude était de déterminer la prévalence et les facteurs associés à l'hypertension artérielle chez les adultes des clubs et associations de sport d'entretien de Parakou en 2021.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive, et à visée analytique avec une collecte des données du 17 juillet au 15 août 2021. Ont été incluses, les personnes âgées de 18 ans et plus, membres de clubs et associations de sport d'entretien de Parakou en 2021, et ayant donné leur consentement écrit pour participer à l'étude. Un sondage aléatoire à deux degrés a été réalisé. Un entretien individuel a été fait. Des mesures de paramètres anthropométriques et de la pression artérielle ont ensuite été prises. Les données ont été enregistrées sur une fiche de collecte basée sur l'Instrument STEPS de l'OMS.

Résultats : Au total, 591 sujets ont été enquêtés avec une prédominance masculine (68,7%). La moyenne d'âge était de 38,54 ans $\pm$ 10,27 ans. La prévalence de l'HTA était de 34,69%. Les facteurs associés à la survenue d'HTA étaient le sexe ($p < 0,001$), l'âge ($p < 0,001$), le statut marital ($p < 0,001$), le niveau d'instruction ($p = 0,013$), la profession ($p = 0,001$), le tabagisme ($p = 0,006$), la consommation d'alcool ($p = 0,001$), la consommation de plats riche en sel ($p = 0,009$), l'obésité ($p < 0,001$).

Conclusion : Cette étude a révélé une forte prévalence de l'HTA chez les adultes des clubs et associations de sport à Parakou. Il est important de mener des actions de sensibilisation contre l'hypertension artérielle destinées à cette cible.

Mots clés : hypertension artérielle, clubs et associations de sport, Parakou

CO2 : Connaissances attitudes et pratiques relatives au cancer du sein chez les femmes du 1er arrondissement de Parakou en 2021

Houehanou Yèssito Corine Nadège* (1), Brun Valère (2), Padonou Ghislaine (1), Houéto David (1), Adoukonou Thierry (1).

(1) Ecole Nationale des Techniciens supérieurs en Santé Publique et Surveillance Epidémiologique, Université de Parakou

(2) Faculté de médecine, Université de Parakou

Auteur correspondant* : Houehanou Yèssito Corine Nadège, yessito_fr@yahoo.fr

Résumé

Introduction : Le cancer du sein est l'une des formes de cancer les plus fréquentes chez les femmes au Bénin. L'objectif de cette étude était de décrire les connaissances, attitudes et pratiques relatives au cancer du sein chez les femmes du 1er arrondissement de Parakou en 2021.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale. Elle a porté sur les femmes résidant dans le 1er arrondissement de Parakou, âgées de 15 à 59 ans et ayant donné leur consentement écrit pour participer à l'étude. Un échantillonnage aléatoire en grappes a été réalisé. Les données ont été collectées dans les ménages en août 2021. Un entretien individuel avec la participante a eu lieu à l'aide d'un questionnaire. Les connaissances, les attitudes et les pratiques ont été définies à partir d'une série de questions permettant d'établir des scores. Elles ont été classées chacune en 2 modalités. Des comparaisons de fréquence ont été faites à l'aide du test de Chi2 avec un seuil de significativité p de 0,05.

Résultat : Un total de 630 femmes a été inclus dans l'échantillon. Les femmes de 20 à 29 ans étaient les plus représentées. Au total 21,8% des participantes avaient un bon niveau de connaissance, 57,0% des attitudes adéquates et 29,52% de bonnes pratiques en matière de prévention du cancer du sein. L'âge ($p<0,001$), le niveau d'instruction ($p<0,001$), la profession ($p<0,001$), et le revenu ($p=0,0316$), étaient significativement associés à une bonne pratique en matière de prévention du cancer du sein.

Conclusion : Cette étude montre une faible proportion de femmes ayant une bonne pratique en matière de prévention du cancer du sein. Elle met en exergue la nécessité d'une sensibilisation des femmes sur le cancer du sein à Parakou.

Mots clés : Cancer du sein, Connaissances, Attitudes, Pratiques, Parakou.

CO3 : Prévalence et les facteurs de risque de la maladie rénale chronique chez les élèves de 10 à 15 ans à Parakou.

Ahoui Séraphin^{1*}, Noudamadjo Alphonse¹, Kpanidja Gerard², Agbeille Falilatou², Kondo Rachad Moussa¹, Eteka Evariste¹, Julien Didier Adedemy², Agossou Joseph².

¹Service de Néphrologie du Centre Hospitalier Universitaire Départemental Borgou.

²Service de Pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Départemental Borgou

Résumé

Introduction : La maladie rénale chronique (MRC) est un problème de santé publique.

Objectif : déterminer la prévalence et les facteurs de risque de la maladie rénale chronique chez les élèves de 10 à 15 ans à Parakou.

Méthodes : Il s'est agi d'une étude de suivi longitudinal déroulée pendant 5 mois, du 01 Février au 30 Juin 2021 et a concerné les élèves de 10 à 15 ans des établissements publics d'enseignement secondaire de Parakou (Bénin). Les atteintes rénales ont été recherchées à la bandelette urinaire et au sédiment urinaire et suivies sur 3 mois. Les facteurs associés étaient recherchés et significatifs pour p inférieur à 0,05.

Résultats : Au total, 271 élèves étaient inclus. L'âge moyen était de 13,19±1,32 ans et le sex ratio de 0,84. Les prévalences de l'albuminurie, de l'hématurie et de l'estérase leucocytaire étaient respectivement de 3,47% ; 5,79% et 0,39%. La prévalence de la MRC était de 5,02%. Les marqueurs ont été retrouvés à un mois d'intervalle respectivement chez 9,24% ; 9,65% ; 8,88% et 5,02% des élèves. Les facteurs de risque associés à la MRC étaient : l'automédication aux médicaments contenant de la caféine (p=0,0464), l'exposition au tabac (p=0,0051), et la prise abusive de tisane (p=0,0468).

Conclusion : La prévalence de la MRC est non négligeable en population pédiatrique au Bénin. Les mesures préventives doivent être renforcées autour des facteurs de risque pour en réduire la prévalence.

Mots clés : Maladie rénale chronique, enfants, Parakou

COD4 : Évolution des paramètres échocardiographiques chez les gestantes victimes d'une hypertension artérielle sur grossesse à Parakou au Centre Hospitalier Universitaire et Départemental du Borgou/Alibori en 2021

Codjo HL¹, Dohou SHM², Atadé SR³, Amouzoun YC², Amegan HN⁴, Biaou CA⁵.

¹Clinique Universitaire de Cardiologie, Centre Hospitalier National et Universitaire HKM de Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin

²Unité d'enseignement et de recherche en cardiologie, CHU du Borgou, Université de Parakou, Parakou, Bénin .

³Clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique, CHU du Borgou, Université de Parakou, Parakou, Bénin .

⁴École Doctorale des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin .

⁵Ingénieur de recherche en épidémiologie, spécialiste en suivi-évaluation des programmes/projets en santé.

Auteur correspondant : huguesdohou@gmail.com; tél : 0022996550550

Résumé

Introduction : les changements échocardiographiques persistants d'origine hypertensive après l'accouchement exposent les femmes à des maladies cardiovasculaires. Elles surviennent dans 2% de toutes les grossesses, et représentent les causes non obstétricales les plus importantes de mortalité maternelle.

Objectifs : Etudier les paramètres échographiques des gestantes victimes d'une HTA sur grossesse au CHUD-B/A de Parakou en 2021.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude longitudinale prospective, descriptive et analytique de type exposé/non exposé réalisée du 5 Janvier au 31 septembre 2021 portant sur les accouchées au CHUD-B/A de Parakou en 2021. Au total, 3 échocardiographies ont été effectuées à T0 (1^{ère} semaine après l'accouchement), à 45 jours après l'accouchement (T1) et le troisième 03 mois après l'accouchement (T2). Les données recueillies ont été enregistrées en ligne sur Kobo collect, traitées et analysées avec le logiciel SPSS 21 version française. Les valeurs de $p < 0,05$ étaient statistiquement significatives. Une valeur de AUC supérieure à 0,5 a été considérée comme discriminante.

Résultats : au total 51 accouchées dont 17 hypertendues et 34 normotendues incluses. A T0, l'hypertrophie du ventricule gauche (HVG) était significativement plus élevée chez les hypertendues (100% vs 85,30% ; $p = 0,005$). A T1 l'HVG persistait significativement plus chez les hypertendues (35,30% vs 17,6% ; $p < 0,001$) de même que la fonction systolique altérée

(29,4% vs 2,9% $p = 0,012$). L'HVG persistante était de type concentrique chez les hypertendues et de type excentrique chez les normotendues.

Conclusion : Les retentissements échocardiographiques de l'HTA sur le système cardiovasculaire d'une gestantes, sont fréquents et persistants au CHUD B/A.

Mots clés : échocardiographie, hypertension artérielle, gestante, Bénin.

COD5 : Profil évolutif des désordres hypertensifs dans le post-partum au Centre Hospitalier Universitaire et Départemental de Parakou de 2020 à 2021

Codjo HL¹, Dohou SHM², Vodouhe MV³, Odoulami LCA², Amegan HN⁴, Biaou CA⁵.

¹ Clinique Universitaire de Cardiologie, Centre Hospitalier National et Universitaire HKM de Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin

² Unité d'enseignement et de recherche en cardiologie, CHU du Borgou, Université de Parakou, Parakou, Bénin

³ Clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique, CHU du Borgou, Université de Parakou, Parakou, Bénin

⁴ École Doctorale des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin .

⁵ Ingénieur de recherche en épidémiologie, spécialiste en suivi-évaluation des programmes/projets en santé.

Auteur correspondant : huguesdohou@gmail.com; tél : 0022996550550

Résumé

Introduction : Les désordres hypertensifs de la grossesse (DHG) restent une pathologie grave et fréquente s'accompagnant souvent de complications cardiovasculaires. L'objectif de cette étude était de décrire le profil évolutif des DHG dans le post-partum au CHUD-B/A de Parakou de 2020 à 2021.

Méthodes : L'étude était transversale analytique avec un suivi répété des accouchées à trois mois puis à six mois. Elle s'est déroulée de novembre 2020 à aout 2021. Les patientes atteintes de DHG ont été recrutées dans le service de gynécologie-obstétrique avec un suivi trimestriel dans le service de cardiologie. Une régression par la méthode de Wald a été réalisée pour l'analyse multivariée. Les facteurs associés étaient déterminés par l'odds ratio au seuil de 5%.

Résultats : La fréquence hospitalière des DHG en 2021 était de 12,36%. Les complications maternelles au cours de la grossesse étaient retrouvées chez 54,5% des patientes dominées par HTA sévère (51,9%). À trois mois après accouchement : 64,94% des gestantes étaient guéries et 35,06% avaient une persistance des DHG (31,16% d'HTA contrôlée ; 2,6% d'HTA sévère et 1,3% de décès). À six mois après accouchement : 33,77% avaient une persistance des DHG, 18,18% d'HTA contrôlée ; 11,64% d'HTA non contrôlée (dont 2,6% de récurrence) ; 2,6% d'HTA sévère et 1,3% de décès. En analyse multivariée, la parité, l'antécédent d'HTA au cours de grossesses précédentes, et l'inobservance thérapeutique ($p < 0,05$) étaient les facteurs associés à une persistance de l'HTA.

Conclusion : L'hypertension artérielle sur grossesse est assez fréquente au CHUD-B/A. La persistance de l'hypertension artérielle après 6 mois de suivi concerne plus d'un quart des patientes. Un suivi en cardiologie s'avère indispensable pour ses femmes.

Mots clés : désordres hypertensifs, grossesse, post-partum, Bénin

CO6 : Prévalence et facteurs associés aux accidents vasculaires cérébraux dans le 4^{ème} arrondissement de Porto-Novo en 2021

Agbetou Mendinatou^{1*}, Kossi Oyéné², Kakpo Vignon Charbel², Houehanou Corine², Bangbotche Roland¹, Sowanou Arlos¹, Adoukonou Thierry¹.

1 Département de Neurologie, Université de Parakou, Benin

2 Ecole Nationale de formation des Techniciens Supérieurs en Santé publique et Surveillance Epidémiologique (ENATSE), Université de Parakou, Bénin

*Auteur correspondant : Agbetou Mendinatou, département de Neurologie, Faculté de Médecine, Université de Parakou, mendiagbetou@yahoo.fr

Résumé

Objectif : Déterminer la prévalence et les facteurs associés aux accidents vasculaires cérébraux (AVC) dans le 4^{ème} arrondissement de Porto-Novo au Bénin en 2021.

Méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale à visée analytique déroulée du 01 juin au 31 août 2021 et ayant porté sur les sujets âgés d'au moins 18 ans, résidant depuis plus de six mois dans le 4^{ème} arrondissement de Porto-Novo au Bénin. Le sondage aléatoire en grappe a été utilisé comme technique d'échantillonnage. L'AVC était défini selon les critères cliniques du diagnostic des AVC de l'OMS ou chez tout sujet ayant déjà fait un AVC confirmé par un médecin. Les données ont été intégrées dans une application (Kobo collect) installée sur des tablettes et l'analyse a été faite avec le logiciel EPI info version 7.2.

Résultats : Au total 351 sujets d'âge moyen de $35,14 \pm 13,03$ ans dont 51,6% d'hommes ont été inclus. La prévalence de l'AVC était de 10,3%. Les principaux facteurs de risque vasculaires notés étaient l'alcoolisme 16,5%, l'hypertension artérielle 4,8%, le diabète 4,0%, le tabagisme 2,9%, l'antécédent d'AVC 1,1%. L'âge supérieur à 55ans ($p=0,03$), la consommation d'alcool ($p=0,01$), l'HTA ($p=0,001$) et le diabète ($p=0,001$) étaient les facteurs associés à l'AVC.

Conclusion : Cette étude confirme une prévalence élevée de l'AVC en population générale et met en exergue les facteurs classiques de risque associés à l'affection. Il urge que des stratégies de prévention soient mise en place afin d'en réduire la charge.

Mots clés : AVC, prévalence, facteurs associés, population générale, Porto-Novo

CO7 : Épidémiologie des céphalées primaires au cours de la grossesse à Parakou au Bénin en 2021

Agbetou Mendinatou¹, Dansou Romaric¹, Sidi Imorou², Houehanou Corine³, Kossi Oyéné³, Sowanou Arlos¹, Adoukonou Thierry^{1,3}.

1 Département de Neurologie, Université de Parakou, Bénin

2 Département de gynécologie et d'obstétrique, Université de Parakou, Bénin

3 Ecole Nationale de formation des Techniciens Supérieurs en Santé publique et Surveillance Epidémiologique (ENATSE), Université de Parakou, Bénin

*Auteur correspondant : Agbetou Mendinatou, département de Neurologie, Faculté de Médecine, Université de Parakou, mendiagbetou@yahoo.fr

Résumé

Introduction : Les céphalées primaires sur grossesse sont peu étudiées en Afrique. L'objectif de cette étude était de déterminer la fréquence et l'impact des céphalées primaires au cours de la grossesse à Parakou.

Matériel et Méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale descriptive et analytique déroulée du 03 août au 05 septembre 2021 dans la ville de Parakou au Bénin. L'échantillonnage était mixte. Un choix raisonné des formations sanitaires de la ville avec un minimum de consultation prénatale mensuelle fixé à 80 en juillet 2021 a été fait, puis sept formations sanitaires ont été tirées au hasard parmi les 22 respectant ce critère. Les gestantes résidentes et consentantes ont été incluses systématiquement au prorata de l'effectif de la consultation du mois de juillet 2021 de chaque formation sanitaire. Celles qui présentaient une grossesse à haut risque ou compliquée ou en travail d'accouchement étaient exclues. Les critères de l'ICHD-3 Beta et l'algorithme diagnostique HARSHIP ont été utilisés pour le diagnostic et l'impact des céphalées. L'accord éthique a été obtenu 0442/CLERB-UP/P/SP/R/SA du 19 Juin 2021.

Résultats : Au total 1007 gestantes d'âge moyen de 29 ans ont été incluses dont 23,1% au premier trimestre, 34,1% au deuxième trimestre et 42,8% au troisième trimestre. La fréquence de la migraine était de 7,8%, celle de la migraine probable de 37,2%, les céphalées de tension 12,6%, les céphalées de tension probable 30,3%, les céphalées chroniques quotidiennes 0,4% et celle des céphalées par abus médicamenteux 0,7%. Les céphalées primaires étaient responsables de troubles de la concentration (31,2%), de troubles de sommeil (20,5%), d'idées suicidaires (0,9%), de peur de perte de grossesse (9,2), de tristesse (20,5%), de peur de transmettre les céphalées au bébé chez 15,4%. L'impact sur le travail du conjoint ou de la famille était noté dans 8,4% de cas.

Discussion et conclusion : Les céphalées primaires sont fréquentes au cours de la grossesse avec un impact psychosocial important chez les femmes et leur entourage.

Mots-clés : Céphalées primaires, grossesse, Parakou, Bénin.

CO8 : Connaissances, attitudes et pratiques des adolescentes face à la dysménorrhée à Parakou en 2021

Houunkponou N.F.M. ⁽²⁾, Klikpézo R. ^(1,2), Obossou A. A. A. ⁽²⁾, Atadé S. R. ⁽²⁾, Vodouhè M.V. ⁽²⁾, Michodigni A. ⁽²⁾, Sidi R. I. ⁽²⁾, Salifou B. ⁽²⁾, Ahouingnan Y. A., ⁽²⁾, Salifou K. ⁽²⁾

⁽¹⁾ CHU-HIA, Parakou ;

⁽²⁾ Faculté de médecine, Université de Parakou

Auteur correspondant : Klikpezo Roger, Mail : kliroger@yahoo.fr

Résumé

Introduction : La dysménorrhée chez les adolescentes est un véritable problème de santé. Sa prévalence dans le monde varie de 15 - 94 % avec une prédominance chez les adolescentes. Au Bénin, il y a plusieurs études sur les dysménorrhées qui ont soulevé l'importance du phénomène et son impact sur la qualité de la vie socioprofessionnelle.

Objectifs : étudier la connaissance l'attitude et la pratique des adolescentes face à la dysménorrhée à Parakou en 2021.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive à visée analytique avec recueil prospectif des données et qui a porté sur 620 adolescentes résidant à Parakou du 1^{er} juin au 31 juin 2021. La technique d'échantillonnage était la méthode probabiliste et l'entretien individuel structuré à l'aide d'un questionnaire utilisé pour la collecte des données.

Résultats/Discussion : Sur les 620 enquêtées, la dysménorrhée était présente chez 249 adolescentes soit une prévalence de 40,16 %. Ces résultats sont inférieurs à ceux trouvés au Bénin par **Tshabu AC et al (65,5 %)**, **Sidi et al (78,35 %)**. La moyenne des âges était de 16,81 ± 1,79 ans. La majorité des adolescentes était nulligestes (97,25 %), nullipares (97,25 %), et sans antécédents chirurgicaux (99,9 %). 45,35 % avaient une connaissance globale suffisante et 75,90% avaient une attitude inadaptée de la dysménorrhée. On note une mauvaise pratique chez 44,58% des adolescentes et l'automédication était le moyen thérapeutique le plus utilisé (45,38 %). Les facteurs associés à la bonne connaissance étaient entre autres l'âge (P=0,002), le niveau d'instruction de l'adolescente (0,000) et le niveau d'instruction de la mère (P=0,007).

Conclusion : Les résultats de cette étude indiquent une connaissance insuffisante, une attitude inadaptée et une mauvaise pratique. Il importe une sensibilisation afin d'améliorer la connaissance et le comportement des adolescentes face à la dysménorrhée.

Mots clés : Connaissances - Adolescentes - Dysménorrhée -Parakou

CO9 : Prévalence et Facteurs associés à la pression artérielle élevée chez les enseignants des établissements secondaires de Parakou

Carelle Akiyo^{1,2*}, Corine Houehanou^{1,2}, Hélène Sacca², Concheta Tchibozo², Fabrice Hountondji^{1,2}, Arnaud Houtcheme¹, Fidèle Agossou², Dismand Houinato^{2,3}.

¹Ecole Nationale de formation des Techniciens Supérieurs en Santé publique et en Surveillance Epidémiologique (ENATSE), Université de Parakou, Parakou, Bénin.

²Laboratoire d'Épidémiologie des Maladies Chroniques et Neurologiques (LEMACEN), Faculté des Science de la Santé, Cotonou, Bénin.

³Département de neurologie, Centre National Hospitalier Universitaire, Cotonou, Bénin.

*akiyocarelle@gmail.com

Résumé

Introduction : La pression artérielle élevée, facteur de risque cardiovasculaire majeur, constitue un véritable problème de santé publique. L'objectif de ce travail était d'étudier la prévalence et les facteurs associés à la pression artérielle élevée chez les enseignants des établissements secondaires dans la commune de Parakou en 2021.

Méthodes : Il s'est agi d'une étude, transversale, descriptive et analytique. Elle a porté sur les enseignants de cinq collèges d'enseignement public de Parakou. Etaient inclus les enseignants des 1er et 2nd cycles des établissements ciblés et ayant donné leur consentement éclairé pour la participation à l'étude. Les données générales ont été recueillies lors d'un entretien individuel à l'aide d'une fiche standardisée. La pression artérielle a été mesurée suivant les normes de la société Internationale d'Hypertension.

Résultats : L'étude a porté sur 325 enseignants. L'âge moyen était de 36,19 ans $\pm$ 6,78 ans. La prévalence de la pression artérielle élevée était de 25,23%. L'âge, le statut dans l'enseignement, le nombre d'heures total d'enseignement par semaine, la consommation de tabac, de diabète, familial d'HTA et l'indice de masse corporelle étaient significativement associés à la pression artérielle élevée.

Conclusion : La prévalence de la pression artérielle élevée chez les enseignants du secondaire à Parakou est élevée. Il est nécessaire de mettre en place un programme de prévention des maladies cardiovasculaires dans cette population afin d'améliorer leur santé et leur bien-être.

Mots clés : Pression artérielle élevée, enseignants, Parakou

CO10 : Prévalences et facteurs associés aux facteurs de risque comportementaux des MNT chez les étudiants de l'Université de Parakou en 2021

Toffohossou Evélyne*¹, Houehanou Corine¹, Houinato Dismand¹.

¹ Ecole Nationale d'épidémiologie des maladies chroniques et neurologiques (LEMACEN), Université d'Abomey-Calavi

² Laboratoire d'épidémiologie des maladies chroniques et neurologiques (LEMACEN), Université d'Abomey-Calavi

Auteur correspondant* : Tél : 91684047 Email : evelynetoffohossou@gmail.com

Résumé

Introduction : Les Facteurs de Risque comportementaux (FDR) des Maladies Non Transmissibles (MNT) augmentent au Bénin. Cette étude vise à déterminer les prévalences des FDR comportementaux liés aux MNT chez les étudiants de l'Université de Parakou (UP) en 2021.

Matériels et Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive et à visée analytique qui s'est déroulée du 27 Mai au 30 Juillet 2021. Elle a porté sur les étudiants présents sur le campus pendant la période définie et ayant donné leur consentement pour participer à l'étude. Un questionnaire auto-administré a été utilisé. Le logiciel Epi-Info 7.2 a été utilisé pour l'analyse. Le Rapport de Prévalence (RP) a été utilisé comme mesure d'association.

Résultats : Un total de 717 étudiants a été inclus. L'âge moyen était de 21,15 ans $\pm$ 2,42 ans. Parmi les étudiants enquêtés : 0,67% consommaient abusivement de l'alcool, 1,12% du tabac, 8,93% excessivement de matières grasses, 14,92% excessivement de boissons sucrées, 21,20% excessivement de sel. La prévalence de la consommation insuffisante de fruits et légumes était de 47,28% et celle d'inactivité physique de 60,11%. L'âge ($p=0,03$), la religion ($p=0,02$) et le sexe ($p=0,004$) étaient associés à la consommation de tabac ; l'âge ($p=0,03$) à la consommation excessive de matières grasses ; les antécédents familiaux de MNT ($p=0,03$) à la consommation excessive de boissons sucrées ; la religion ($p=0,01$) à la consommation excessive de sel; l'âge ($p=0,02$), l'entité ($p=0,01$), la sensibilisation sur les MNT ($p=0,001$) à l'inactivité physique.

Conclusion : Les prévalences de certains FDR comportementaux des MNT sont élevées dans la cible étudiée. Il est donc nécessaire de sensibiliser les étudiants de l'UP sur un mode de vie sain.

Mots clés : FDR comportementaux, MNT, étudiants, Parakou

CO11 : Facteurs associés à la dénutrition aiguë dans la commune de Banikoara au Bénin en 2021

Noudamadjo A*, Kpanidja MG*, Agbeille Mohamed F*, Bani Imorou A**, Ahodégnon R*, Adédémy JD*, Agossou J*.

*UFR de Pédiatrie et de Génétique médicale – Faculté de Médecine/Université de Parakou

**Ecole Nationale des Techniciens supérieurs en Santé publique et surveillance Epidémiologique- Université de Parakou.

Correspondant : Dr Alphonse NOUDMADADJO ; Téléphone (229) 94794149 ; email : alphonse_ndama@yahoo.fr

Résumé

Introduction : La dénutrition aiguë représente 45% de tous les décès chez les enfants de moins de 5 ans au Bénin.

Objectifs : Identifier les facteurs associés à la DA dans la Commune de Banikoara en 2021

Matériels et méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale à visée analytique réalisée de janvier 2021 à septembre 2021 dans la commune de Banikoara au Bénin. Ont été inclus dans cette étude tout enfant de 6-59 mois de mère résidant dans la commune de Banikoara. L'échantillon a été obtenu par un sondage aléatoire en grappe. Les données collectées ont été traitées et analysées grâce au logiciel Épi info version 7.2.2.6. Le test statistique Chi-carré (χ^2) de Pearson ou de Fischer ont été utilisé pour comparer les proportions. Le seuil statistique de significativité était $\alpha = 0,05$. Le protocole de recherche a été soumis au comité d'éthique de Parakou.

Résultats : Au total 540 enfants ont été inclus dans l'étude. La sex-ratio était de 1,04 et l'âge moyen de $30,10 \pm 15,44$ mois. La prévalence de la DA de 20%. Les facteurs associés à la DA étaient l'âge ($p=0,0000$), le rang dans la fratrie ($p=0,0012$), la profession de la mère ($p=0,0142$), le milieu de résidence ($p=0,0384$), l'allaitement ($p=0,0000$), le mode d'alimentation ($p=0,0004$).

Discussion : La prévalence élevée comparée à celle de l'EDS V, peut s'expliquer par l'utilisation du périmètre brachial. Les facteurs associés identifiés sont communs à d'autres études sur le thème et s'intègrent dans le cadre conceptuel des causes de la malnutrition élaboré par l'UNICEF en 1990.

Conclusion : Un enfant sur cinq âgé de 6 à 59 mois était concerné par la dénutrition aiguë dans la commune de Banikoara en 2021. Des facteurs associés ont été identifiés. Une étude avec analyse multivariée est nécessaire pour mieux affiner les facteurs associés.

Mots clés : Dénutrition aiguë ; facteurs associés, Bénin.

COD12 : Prévalence des frottis cervico-utérins anormaux dans une population de femmes travailleuses de sexe de la ville de Parakou en 2021

*Brun LVC¹, Cissé IM¹, Balle MC¹, Missodé C¹, Sidi I¹, Obossou A¹, Ahanhanzo R², Adam Imorou Issaou A³, Kitioun S³, Salifou K¹, Akéle Akpo MT⁴.

¹Faculté de Médecine, Université de Parakou, Bénin.

² Centre d'Information de Prospective et de Conseil (CIPEC) du programme National de lutte contre le SIDA (PNLS), Parakou, Bénin.

³Association Béninoise pour la Promotion de la famille (ABPF), Parakou, Bénin.

⁴Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey Calavi, Cotonou, Bénin.

* **Auteur correspondant** : Brun LVC Tél. : (229) 97831453 ; Courriel :

luc.brun2013@gmail.com

Résumé

Introduction : les Travailleuses de Sexe (TS) sont susceptibles d'être plus à risque de cancer du col de l'utérus que les femmes de la population générale. Qu'en est-il des TS de la ville de Parakou qui sont suivies au plan de la santé sexuelle par des Organisations Non Gouvernementales (ONG) ?

L'objectif de cette étude était de déterminer la prévalence des Frottis Cervico Utérins (FCU) anormaux chez les Travailleuses de Sexe (TS) de la ville de Parakou en 2021.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale à visé descriptive et de recueil prospectif, allant de Juin à Septembre 2021. Étaient inclus les TS de la ville de Parakou âgées d'au moins 18 ans, consentantes, suivis au plan de l'hygiène sexuelle par des ONG. A toutes ces femmes un test HIV avait été effectué, suivi d'un FCU. La lecture au microscope des lames de FCU avait été effectuée selon la terminologie de Bethesda 2001, après coloration par la technique de Papanicolaou. La comparaison des moyennes par le test Chi deux a été effectuée au seuil de significativité de $p < 0,05$.

Résultats : Au total 86 femmes TS ont été inclus dans notre étude. L'âge médian des TS était de 26,94 ans avec des extrêmes de 18 ans et 42 ans. La prévalence de FCU anormaux était de 48, 84%, avec une prédominance de lésions malpighiennes atypiques indéterminées (ASC-US), et de lésions malpighiennes de bas grade (LSIL). Les lésions LSIL étaient pour la plupart des koilocytes (cytopathie d'infection par HPV). Les TS aux FCU anormaux étaient de la tranche d'âge 25-34 ans pour 45,24 %. Seules deux TS (02,32%), avaient été testées positives pour le VIH. Toutes deux avaient eu un FCU anormal (1 LSIL et 1 ASC-H).

Conclusion : la prévalence des frottis cervico utérins anormaux était élevée dans cette population de femme TS de la ville de Parakou. Ces résultats appellent au dépistage systématique et régulier du cancer du col de l'utérus chez les femmes TS. Il importe de mener de pareilles études sur des échantillons plus importants.

Mots clés : Prévalence, FCU anormaux, TS, VIH, Parakou

**CO13 : Kyste remanié chondrolytique de l'auricule au Centre Hospitalier Universitaire
Département du Borgou et de l'Alibori, à propos d'un cas.**

Ametonou CB^a, Bouraima FA^{a,b}, Flatin MC^{a,b}, Hounkpatin SHR^{a,b}.

a. Centre Hospitalier Universitaire Département du Borgou. BP 02, Parakou, Bénin.

b. Faculté de Médecine, Université de Parakou. BP 123, Parakou, Bénin.

Auteur correspondant : Cocouvi Bruno AMETONOU

E-mail : brunoametonou@yahoo.fr; Téléphone : (229) 97630208

Résumé

Objectif : Décrire les aspects clinique, radiologique et thérapeutique du kyste remanié chondrolytique de l'auricule droite.

Méthodes : Il s'est agi d'une étude de cas, dont le recueil des données s'est basé sur le dossier médical du patient pris en charge dans le service d'ORL et Chirurgie Cervico-Facial du Centre Hospitalier Universitaire Département du Borgou et de l'Alibori.

Résultats : Le cas clinique est celui d'une fille âgée de 14 ans qui a consulté pour tuméfaction de l'auricule droite évoluant sur un mode progressif depuis la naissance. L'examen physique a permis d'objectiver une tuméfaction rénitente, de 4cm de grand axe, indolore développée au dépend de la face médiale de l'auricule droite communiquant avec une saillie ovalaire opposé au niveau de la face latérale. L'échographie a conclu à un kyste remanié de l'auricule droite. En per opératoire, Il a été constaté l'absence du cartilage en regard de la lésion. Le Kyste a été entièrement réséqué. Les suites opératoires étaient simples.

Conclusion : Le kyste de l'auricule avec lyse cartilagineuse est inhabituel. Sa symptomatologie se résume à la déformation inesthétique de l'auricule. Son traitement de choix reste chirurgical.

Mots clés : Kyste ; auricule ; chirurgie.

CO14 : Profil épidémiologique des violences au travail et facteurs associés chez les professionnels de la santé de la zone sanitaire Parakou-Ndali en 2021.

Gounongbé Ahoya Christophe Fabien¹, Mama Cissé Ibrahim¹, Akoun Yves Morel¹, Hinson Antoine Vikket².

1. Unité de Recherche de Santé au Travail, Faculté de Médecine, Université de Parakou

2. Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, Université d'Abomey-Calavi

Auteur correspondant : Gounongbé A.C. Fabien, Maître de Conférences Agrégé en Santé au Travail, gcfabien@yahoo.ca

Résumé

Contexte et objectif : la violence au travail est un phénomène mondial. Celle en milieu de soins devrait être prise avec précaution pour un meilleur rendement afin d'éviter les erreurs médicales. C'est ce qui a cette étude dont l'objectif était de rechercher la prévalence de la violence au travail chez les professionnels de la santé de la zone sanitaire Parakou-N 'Dali.

Matériel et méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive et à visée analytique qui a duré de juin à octobre 2021. Elle a porté sur les soignants de la zone sanitaire Parakou N'Dali remplissant les critères d'inclusion. C'était un recensement exhaustif. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire inspiré du questionnaire sur la violence selon l'OMS. Les données collectées ont été traitées et analysées à l'aide du logiciel Epi info version 7.2.3.1.

Résultats : 259 ont été enquêtés soit 47,52% un taux de participations de. 56,76% des enquêtés ont déclaré avoir été victimes de violence au cours des 12 derniers mois. Dans 63,82% des cas, il s'agissait des femmes. La violence était verbale chez 90% et physique chez 6,18%. Parmi les catégories professionnelles, les sage-femmes étaient les plus (69,70%). Vingt (62,50) des victimes ont été sujet un à cinq fois. 77,33 des participants de l'hôpital confectionnel ont été victimes.

Discussion : 56,76% des enquêtés étaient victime de violence au travail. Des taux similaires de violences sur professionnels de la santé sont observés en Égypte (59,7%) et en Chine (57,2%).

Conclusion : la violence au travail est un problème majeur pour les établissements de santé mais ignoré. Il est important de réagir face à ce phénomène pour éviter la détérioration de notre système de santé.

Mots-clés : violence, travail, professionnels de la santé, Parakou-N'Dali.

CO15 : Profil des risques professionnels associés à la soudure de matières plastiques par brulage artisanal à Parakou en 2019.

Gounongbé Ahoya Christophe Fabien¹, Mama Cissé I¹, Azandjèmè Colette².

1. Unité de Recherche de Santé au Travail, Faculté de Médecine, Université de Parakou

2. Département de promotion de la santé, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Auteur correspondant : Gounongbé A.C. Fabien, Maître de Conférences Agrégé en Santé au Travail, gcfabien@yahoo.ca

Résumé

Contexte et objectif : La combustion des plastiques dégage des fumées et des gaz qui peuvent s'avérer toxiques. L'objectif visé par étude était d'évaluer la fréquence des différents risques professionnels associés au soudage de matières plastiques par brulage artisanal à Parakou.

Matériel et méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive et à visée analytique qui a porté sur les soudeurs de pièces de rechange en matières plastiques à Parakou. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire, au cours de la période allant du 1er mai au 30 juillet 2019. Les variables étudiées étaient l'accident du travail, les maladies professionnelles et les caractéristiques socioprofessionnelles des artisans. Les données collectées ont été analysées par le logiciel Épi info version 7.2.1.0. Le seuil de signification a été fixé à $p < 0,05$.

Résultat : Au total 137 sujets ont été enquêtés. Ils étaient tous de sexe masculin. La quasi-totalité d'eux était victime d'accidents du travail quatre fois au moins par mois. Les brûlures (99,27%), coupures (98,54%) et piqûres (97,81%) étaient les mécanismes les plus fréquents. Les lésions siégeaient surtout aux doigts (98,54%) et aux pieds (98,54%). Les manifestations morbides les plus exprimées étaient les troubles musculo-squelettiques (97,81%), la rhinite (86,76%), la toux (78,83%), le larmolement (97,81%) et l'hyperhémie conjonctivale (93,38%).

Discussion : 53,37% des enquêtés avaient un bon niveau de connaissances sur la COVID-19. Le même constat était fait en Éthiopie (53,2%). 97,55% des enquêtés utilisaient de masque respiratoire. En Algérie, c'était 76,69% qui en faisaient usage.

Conclusion : Le soudage de plastique à Parakou est une activité à risque sanitaire élevé pour les artisans. La prise de mesures protectrices de ces artisans urge.

Mots clés : Risques, soudage, brulage, plastiques, Parakou.

CO16 : Occurrence des pathologies liées à l'exposition des travailleurs de la filière d'exploitation de déchets de ferrailles aux faibles doses de rayonnements ionisants au Bénin

Hounsou Francis Théotime Mahudjro^{1,2,3}, Avocefohoun Alphonse S^{2,3}, Youssao Abdou Karim Alassane⁴, Sina Haziz^{2*}, Bio Bangana Sahabi⁴, Aina Pépin⁶, Gbaguidi Ahotondji Bertin³, Gilles David Houndetoungan, Ayelo Paul⁵, Herbert Fachinan, Kuassi Marcellin Amoussou-Guenou¹, Savi de Tove, Baba-Moussa Lamine²,

1. Laboratoire de radio-immuno-dosage,
2. Laboratoire de Biologie et de Typage Moléculaire en Microbiologie,
3. Laboratoire de Recherche en Biologie Appliquée (LARBA) à l'Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi (UAC)
4. Laboratoire d'Etude et de Recherche en Chimie Appliquée (LERCA)/Unité de Recherche en Ecotoxicologie et Etude de Qualité (UREEQ)/ Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin
5. Unité d'enseignement de médecine au travail de la faculté de science et de la santé Cotonou
6. Laboratoire d'études et de Surveillance Environnementales du ministère du cadre de vie et de développement durable

Résumé :

La recherche de solution à la croissance vertigineuse de besoins de la population, a conduit les peuples à la conquête de nouvelles filières porteuses d'espoir telles que la filière de l'exploitation des déchets de ferrailles. Il nous paraît impérieux d'étudier les effets de cette ferraille sur la santé pour en faire au besoin une activité pérenne. L'objectif de cette étude est de contribuer à mettre en relief la corrélation entre la faible dose d'exposition et la fréquence d'apparition de certaines pathologies chez les travailleurs d'ATLANTIC CONTROL S.A qui travaillent dans les rayonnements ionisants émis par les déchets de la ferraille à Cotonou au Bénin.

Pour y parvenir le présent travail a procédé à deux sortes d'études. Une étude prospective et une étude rétrospective. Dans un premier temps pour réaliser cette étude, une fiche d'enquête a été élaborée puis distribuée à tout le personnel de l'Atlantic Contrôle. Ainsi nous avons réalisé des interviews menées sur la base du questionnaire de la fiche. Dans le but d'avoir des antécédents médicaux des agents. En suite à l'aide des registres de santé du personnel nous avons recensé les résultats des bilans de santé sur 10 ans de travail dans les rayonnements faiblement ionisants. En fin nous avons tenté de comprendre les résultats obtenus par confrontation des résultats de l'étude prospective à l'étude rétrospective.

Il existe en ressort qu'il existe une forte corrélation entre l'apparition de certaines pathologies telles que les cas de myélémie, de masse thyroïdienne .et les cumules de doses de rayonnements ionisants absorbés par les trieurs recycleurs et récupérateurs de ferraille.

On déduire alors de notre étude que les déchets de ferraille sur nos sites sont faiblement radioactifs. Nos sites sont alors contaminés par les déchets de ferraille enfouis sous terre et, qu'il existe une corrélation entre les cumules de doses des rayonnements faiblement ionisants absorbés et l'apparition de certaines pathologies.

Mots clés : Déchets, Ferraille, Rayonnements Ionisants, faibles, doses Effets sur Santé et Environnement.

CO17 : Prévalence et facteurs associés à la consommation des substances psychoactives chez les conducteurs de taxi-moto à Djougou en 2021

Béhanzin Luc¹, Adouknpè M. Ferdinand², Koudjo Tokpanou Ernest³ Ikokpata Patrocles ¹, Agonnoudé Togbédji Maurice¹, Houéto S. David ¹, Adoukonou A. Thierry¹

¹ Ecole Nationale de Formation des Techniciens Supérieurs en Santé Publique et en Surveillance Epidémiologique, Université de Parakou, Bénin

²Laboratoire National des Stupéfiants et de Toxicologie (LNST)- Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (CBRSI)/Université d'Abomey-Calavi, Bénin

³ Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites, les IST et les épidémies – Cellule du Département du Borgou;

Auteur correspondant : Dr BEHANZIN Luc, École Nationale de Formation des Techniciens Supérieurs en Santé Publique et en Surveillance Épidémiologique, Université de Parakou, Bénin, BP 123 Parakou, Bénin Tel + (229) 66 20 32 08/ 95 96 59 15. bphilus2013@gmail.com

Contexte et objectifs : Consommer des substances psychoactives (SPA), même occasionnellement, présente des risques pour la santé et la sécurité des usagers. Risques de sécurité en circulation routière chez les usagers dont notamment les conducteurs de taxi-moto (CTM). Les objectifs de l'étude étaient d'estimer la prévalence de consommation des substances psychoactives chez les conducteurs de taxi-moto à Djougou en 2021 et d'identifier les facteurs qui y sont associés.

Matériel et méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale à viser analytique ciblant les CTM de la commune de Djougou. L'échantillonnage était par sondage systématique aléatoire de grappes à deux degrés. La collecte des données a été par entrevue face-à-face sur la base d'un questionnaire semi-structuré. Les facteurs associés ont été identifiés par la régression logistique binaire multivariée.

Résultats : Au total 395 CTM ont participé à l'étude. Leur âge médian était 34 ans [Étendue : 60 – 19]. Ils étaient majoritairement mariés (79.25%) et non scolarisés (51,14%). La prévalence globale de consommation de SPA était 59,49% [Intervalle de confiance à 95% (IC95%) : [54,58%- 64,22%]] dont médicaments (52,91%), alcool (28,9%), tabac (27,33%), Tramadol (11,90%), cannabis (6,58%), cocaïne (1,78%), héroïne (0,51%). Les facteurs associés à cet usage étaient la connaissance des effets des SPA (RC=7,60 ; IC 95% : [3,98-14,48]), le fait d'avoir un parc fixe de stationnement (RC=2,00 ; IC 95% : [1,04-3,84]), le fait de savoir différer la consommation avant la conduite (RC=2,25 ; IC 95% : [1,09-4,65]) et après la conduite (RC=3,31 ; IC 95% : [1,60-6,86]).

Discussion/conclusion : Les conducteurs taxi-moto reconnaissent en substances psychoactives, des substances énergisantes pouvant les maintenir plus longtemps en état d'éveil et augmenter leur endurance durant leurs pratiques professionnelles. Ce qui est disproportionnel avec les risques sanitaires et sécuritaires encourus. Il urge de les cibler dans un système de surveillance épidémiologique des addictions.

Mots clés : substances psychoactives, conducteurs taxi-moto, facteurs associés, Bénin

CO18 : Prévalence et facteurs associés à la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans dans la commune de Glazoué en 2021

Agonnoude T. Maurice¹; Kpanidja Gérard²; Batcho S. B. Yannick^{*3}.

1. École Nationale de formation des Techniciens Supérieurs en Santé publique et en Surveillance Épidémiologique- Université de Parakou, Bénin.
2. Département de Pédiatrie, Faculté de Médecine-Université de Parakou, Bénin.
3. Technicien supérieur en santé publique et en surveillance épidémiologique.

***Auteur correspondant** : BATCHO Sourou Boris Yannick (+229 98 21 60 63/yannickbatcho@gmail.com)

Résumé

Introduction : Chaque année, de nombreux enfants décèdent suite à des épisodes de malnutrition à travers le monde. L'objectif de cette étude était d'étudier la prévalence et les facteurs associés à la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans dans la commune de Glazoué en 2021.

Méthodes : Pour l'atteinte de cet objectif, une étude d'observation transversale à visée analytique a été menée. Était éligible à être inclus dans l'étude, tous enfants âgés de 0 à 5 ans de la commune de Glazoué résidant depuis plus de 6 mois. La sélection des individus enquêtés était faite suivant un sondage en grappe. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire par entrevue structurée directe avec les mères d'enfants et par la prise des mesures anthropométriques des enfants.

Résultats : Au total 510 enfants et mères ont été inclus dans notre étude. L'âge moyen des enfants était de 23,1 +/-15,1 mois, avec des extrêmes allant de 0 à 60. Le sexe ratio était de 0,9 garçons pour filles. La prévalence de la sous-nutrition chez les enfants était de 36,5%. Dans le détail : la prévalence de l'émaciation était de 10,4% dont 4,5% de forme sévère ; celle du retard de croissance de 27,8% dont 12,6% de forme sévères ; l'insuffisance pondérale avait une prévalence de 12,9% avec 4,7% de forme sévère. Plusieurs facteurs, dont, les pratiques de l'allaitement exclusif ($p=0,006$), l'IMC des mères ($p=0,00001$), l'intervalle entre les naissances ($p=0,0008$), étaient associés à un mauvais état nutritionnel chez les enfants de 0 à 5 ans dans la commune de Glazoué en 2021.

Conclusion : La malnutrition constitue un problème majeur de santé publique et nécessite la mise en oeuvre des interventions dans la commune de Glazoué.

Mots clés : Malnutrition, enfants, prévalence, Glazoué.

COD19 : Connaissances, attitudes et pratiques des apprenties coiffeuses et couturières face à la dysménorrhée dans la ville de Parakou en 2021

Atade Sèdjro Raoul¹, Hounkponou Ahouingnan Fanny Marlyse Nouessewa², Vodouhe Mahoublo Vinatou², Kouhode Florence², Obossou Achille Afoukou Awadé², Salifou Kabibou².

1- Département Mère-Enfant Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO)
Université de Parakou, Bénin

2- Département Mère-Enfant Faculté de Médecine (FM), Université de Parakou, Bénin

Correspondant : Atade Sèdjro Raoul ; email : raoulatade@yahoo.fr Tel : (229) 97 09 90 11 / (229) 95 59 25 41

Résumé

Introduction : La dysménorrhée est une situation fréquente chez les femmes en âge de procréer. Elle affecte la qualité de vie des adolescentes et entraîne une limitation dans leurs devoirs quotidiens. Il s'agissait d'étudier les connaissances, les attitudes et les pratiques des apprenties coiffeuses et couturières face à la dysménorrhée dans la ville de Parakou en 2021.

Matériels et méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale descriptive à visée analytique avec collecte prospective des données qui s'est déroulée du 1^{er} mars au 1^{er} avril 2021. Etaient incluses, les apprenties coiffeuses et couturières ayant déjà eu leurs ménarches. Les variables dépendantes étaient les connaissances, attitudes et pratiques des apprenties couturières face à la dysménorrhée. La technique de sondage par grappe de l'OMS a été utilisée.

Résultats : Sur 510 apprenties, 393 avaient des dysménorrhées soit une prévalence de 77,1%. Le niveau de connaissance globale était modéré (40,6%). Selon le postulat de De Finetti, 39,8% des connaissances étaient justes, avec 100% de certitude. A l'issue de l'évaluation 52,4% avaient une attitude adaptée et 91,1% avaient une mauvaise pratique. Le niveau d'étude ($p = 0,001$), et l'expérience de la dysménorrhée ($p = 0,001$) étaient statistiquement associés à la connaissance. Plus le niveau d'instruction était bas, plus la connaissance était insuffisante. Les apprenties qui n'avaient pas fait l'expérience de la dysménorrhée avaient 6,7 fois plus de risque d'une connaissance insuffisante. Le bas niveau d'étude ($p = 0,001$) et une connaissance insuffisante ($p = 0,007$) étaient associés à une attitude inadaptée. La mauvaise pratique était associée à une connaissance insuffisante ($p = 0,048$).

Conclusion : Les apprenties avaient une connaissance modérée, une attitude adaptée mais une mauvaise pratique face à la dysménorrhée. Il est important de considérer ces facteurs pour améliorer la connaissance l'attitude et la pratique des apprenties sur la dysménorrhée.

Mots clés : Connaissances, pratiques, dysménorrhée, Bénin

COD20 : Prise en soins des patients présentant des troubles neurodéveloppementaux du langage oral : cas des enfants infirmes moteurs cérébraux

Bada Médard Dominique¹, Viegbe Mikaël Pierre-Désiré².

¹ Laboratoire LAREPHY, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

² EDP/ECD, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Contacts (00229)95172136/97 802158 Courriel : vimdepio@gmail.com

Résumé

Contexte Et Objectifs : L'approche de prise en charge des pathologies neurologiques a beaucoup plus évolué. Mais force est de constater dans les centres hospitaliers que chaque professionnel s'occupe isolément du patient sans tenir compte des autres professionnels qui interviennent sur le même patient.

L'objectif général est de faire l'état des lieux sur la prise en soins dans le domaine de la réadaptation.

Matériels Et Méthodes : La présente étude à visée descriptive s'est déroulée sur une période de 6 mois. Elle s'est basée sur une approche quantitative et a pris en compte 100 parents d'enfants infirmes moteurs cérébraux qui fréquentent la Clinique Universitaire de la Médecine Physique et de la Réadaptation (CUMPR) au CNHU-HKM et les Centres de Réadaptation à Base Communautaires (RBC) de Cotonou. La méthode non probabiliste et la technique d'échantillonnage de choix raisonné a permis cet effectif de parents. Un questionnaire d'enquête leur est administré.

Résultats : Il ressort de cette étude que 100% des parents ont affirmé que le diagnostic est établi par chaque professionnel à son niveau. Il en est de même que le traitement. Les parents à 80% ont affirmé que cette prise en charge se fait soit par les professionnels des centres en dehors de celui qui accueille pour la première consultation ou dans d'autres services du même centre. Les parents ont affirmé à 95% de l'inexistence de centre de prise en charge pluridisciplinaire avec une approche d'interdisciplinarité. Les parents à 85% ont eu des problèmes financiers.

Discussion Et Conclusion : Ces résultats montrent que la prise en soins des enfants infirmes moteurs cérébraux reste à améliorer. La mise en place de plusieurs centres de réadaptation pluridisciplinaire avec une approche interdisciplinaire aidera plus les parents voire les enfants.

Mot clés : Soins - Troubles Neurodéveloppementaux- Langage - Réadaptation

COD21 : Prise en soins traditionnels des malades mentaux dans les communes d'Avrankou et d'Abomey

Mikaël Pierre-Désiré VIEGBE¹

¹EDP/ECD, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Contacts (00229)95172136/97 802158 Courriel : vimdepio@gmail.com

Résumé

Contexte Et Objectifs : Dans la quête de solutions à leur maladie, la plupart des populations fréquentent divers traitants pourvu qu'elles trouvent de solutions. Ainsi donc, existent – ils des tradithérapeutes qui traitent des maladies mentales. L'objectif général est de ressortir les types de maladies mentales du point de vue culturel et le protocole de prise en soin.

Matériels Et Méthodes : Cette étude à visée descriptive avec une approche qualitative de durée trois (03) mois, est basée sur les tradithérapeutes qui traitent les maladies mentales des communes d'Avrankou, et d'Abomey. Un guide d'entretien semi-structuré est soumis au 6 focus groups de discussion des deux communes à raison de six individus en moyenne par focus groups sans discrimination de sexe. La technique de l'observation indirecte a permis de les enregistrer lors de l'entretien.

Résultats : Il ressort de ce résultat les dénominations comme :

- "Alè" (goun) ou "Tadu" (fon) caractérisé par l'errance, la fugue et le collectionnisme.
- "Nuwanumon" caractérisé par la dangerosité, la bizarrerie et l'ambivalence. Il vit avec les siens.
- "Oman" ou "Man" caractérisé par la violence, le sadisme, le meurtre.
- "Gambada" caractérisé aussi par la violence, le sadisme et le suicide.
- "Gué nunu si alè" ou "gué nunu si tadu" qui a les mêmes caractéristiques que "Oman" ou "Man".
- "Yèlu" ou "Lin zon" ou "Yèyi" (fon) ou encore "Lulu" (goun) est caractérisé par la non-violence et la niaiserie.

Après l'entretien, ils consultent le "Fâ", utilisent les plantes suivant plusieurs modes pour traiter.

Discussion Et Conclusion : Ces résultats montrent l'existence d'autre approche thérapeutique des maladies mentales que la médecine conventionnelle doit associer pour une prise en charge holistique. La création des centres psychiatriques intégrés va améliorer la qualité de la prise en soins de ces cas.

Mots clés : Soins - Traditionnels - Malades Mentaux

COD22 : Carie de la petite enfance : prévalence et facteurs associés chez les enfants en âge préscolaire, commune de Sakété, 2019.

Adégbola Phinées¹, Béhanzin Luc¹, Adjofogue Pierre-Paul², Guedenon T Cyriaque¹, Akodjetin YM Anicette¹, Tayéwo F Founkè³

¹Ecole Nationale de Formation des Techniciens Supérieurs en Santé Publique et en Surveillance Epidémiologique, Université de Parakou, Bénin ; BP 123 Parakou, Benin

²Centre Hospitalier et Universitaire du Département de Borgou, Service de stomatologie, Bénin

³Dispensaire, Centre de santé Communal de Kétou, République du Bénin

Auteurs correspondants : ADEGBOLA Phinées, École Nationale de Formation des Techniciens Supérieurs en Santé Publique et en Surveillance Épidémiologique, Université de Parakou, Bénin, BP 123 Parakou, Bénin Tel + (229) 66 29 07 64/ 95 76 26 44. ade4fine@gmail.com

Résumé

Contexte et objectif : La carie dentaire est considérée par l'OMS comme le 3^{ème} fléau mondial après les maladies cardio-vasculaires et les cancers. Elle est la principale maladie infantile chronique la plus courante qui touche les dents permanentes et temporaires avec des répercussions graves sur la qualité de vie et la santé générale de l'enfant à l'âge adulte. Cette étude vise à étudier les facteurs associés à la carie dentaire de la petite enfance en âge préscolaire dans la commune de Sakété en 2019.

Méthodes : Une étude transversale incluant 637 enfants de la tranche d'âge de 2 à 5 ans résidant dans la commune de Sakété a été réalisée auprès des ménages selon une technique de sondage aléatoire en grappes. Pour mesurer quantitativement les dommages causés par la carie de la petite enfance (CPE), le nombre moyen de dents touchées par une carie (co) chez les enfants a été calculé. Une analyse de régression logistique multiple nous a permis de déterminer les facteurs potentiels associés à la CPE.

Résultats : La prévalence de la CPE a été de 80,85% (IC_{95%}= [77,61-83,72]) avec un co de 3,77±2,92. Les facteurs associés étaient la résidence périurbaine, la variation de pâte dentifrice, le non-brossage des dents après les repas, l'habitude des enfants à prendre au moins une collation après les repas, l'allaitement prolongé ou à la demande la nuit et l'habitude des parents à faire dormir les enfants avec un biberon contenant un liquide sucré.

Conclusion : Notre étude témoigne la pertinence du renforcement du programme national de lutte contre les affections buccodentaire pour promouvoir la santé buccodentaire chez les jeunes

enfants. Les parents des enfants doivent-être ciblés par les décideurs pour des séances d'IEC (Information, Education, Communication).

Mots clés : Carie, enfant, âge préscolaire, facteur associé.

CO23: Stroke Burden in Benin 2008 to 2018: Systematic Review of the Literature

Fotso Pervenche², Kossi Oyéné², Adoukonou Thierry^{1 2 3 4}.

- 1- Department of Neurology, University of Parakou, 03BP 10, Parakou, Benin.
- 2- Clinic of Neurology, University Teaching Hospital of Parakou, Benin.
- 3- U-1094 INSERM, University of Limoges, CHU Limoges, U-1094, Tropical Neuroepidemiology, Institute of Epidemiology and Tropical Neurology, GEIST, 87000, Limoges, France.
- 4- Department of Neurology, CHU Limoges Dupuytren, 87000, Limoges, France.

Corresponding author: Pervenche Fotso, Clinic of Neurology, University Teaching Hospital of Parakou, Benin. Email : pervenchestrato2@gmail.com; Oyéné Kossi, Clinic of Neurology, University Teaching Hospital of Parakou, Benin. Email : oyene.kossi@gmail.com; Adoukonou Thierry, Department of Neurology, University of Parakou, 03BP 10 Parakou, Benin. Email : adoukonouthierry@yahoo.fr

Abstract:

Context and objective(s): Stroke is a public health problem. The main objective was to provide an overview of the stroke burden in Benin from 2008 to 2018. The specific objectives were to identify the different aspects of the burden of stroke and to make proposals to reduce it.

Material and methods: A systematic literature review was conducted using the PRISMA methodology. The research equations were entered into PubMed, Science Direct, Reshergate. The selection of studies and the extraction of results were done on the basis of the acronym PICO. A systematic map in the form of an EXCEL spreadsheet file was prepared for data collection. EPI-INFO 7.1.4.0 software was used for data analysis.

Results: The selection allowed the inclusion of 36 references (30 articles and 6 theses). The cities involved were mainly Cotonou and Parakou. The studies presented data from disparate stroke populations and varied considerably in study design and data collection methods. Therefore, it was not appropriate to compare estimates between studies. The data synthesis confirmed the lack of studies addressing aspects of stroke burden over the past 10 years.

Discussion and conclusion: The overall burden was marked by high prevalence, poor knowledge of populations, high mortality, severe disability, high direct cost, and significant co-morbidities. Action is urgently needed to enable accurate stroke surveillance and reduce the burden of stroke in Benin.

Keywords: Burden, stroke, Benin, Systematic review

CO24 : Cancer de la prostate : facteurs de mauvais pronostiques et survie des patients au Bénin de 2016 à 2020

Aguemon Badirou¹, Assouma Lamine¹, Padonou Géraud¹, Damien Georgia¹.

¹ Département de Santé Publique, FSS-UAC

E-mail : baguemon@yahoo.fr

Résumé

Contexte et objectif : Le cancer de la prostate est un problème de santé publique au Bénin avec une mortalité élevée. L'objectif de notre étude était d'étudier la survie à 5 ans du cancer de la prostate dans trois centres de prise en charge au Bénin.

Méthodes : L'étude s'est déroulée au CNHU/HKM de Cotonou, à l'hôpital de Zone d'Abomey-Calavi et à l'hôpital la croix de Zinvié. Elle était transversale descriptive à visée analytique sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 Décembre 2020. Pour l'analyse des données, la survie a été appréciée par la méthode de Kaplan-Meier, le test de log-rank a été utilisé pour la comparaison de la survie entre les groupes et les facteurs pronostiques ont été déterminés par le modèle de Cox.

Résultats : Nous avons colligé au total 236 cas de cancer de la prostate - L'âge moyen des patients était de $70,06 \pm 9,13$ ans. L'adénocarcinome était le type histologique retrouvé chez plus de 9 patients sur 10 (98,90%) et 55% des patients présentaient un mauvais pronostic selon le score de Gleason (soit ≥ 8). La survie globale à 1 an était de 62,45%. A 3 ans, elle était de 34,22% et à 5 ans de 29,04%. En analyse univariée, les facteurs de mauvais pronostic étaient le délai de consultation entre 6 mois et un an ($p=0,0107$), la vie en milieu urbain ($p=0,0232$), l'allure maligne de la prostate au toucher rectal ($p=0,0307$), le score de Gleason ≥ 8 ($p=0,0000$) et l'absence de chirurgie ($p=0,0089$). En analyse multivariée, les facteurs de mauvais pronostic retrouvés étaient le délai de consultation entre 6 mois et un an ($HR=1,95$; $p=0,033$) et le score de Gleason ($HR=10,02$; $p=0,000$).

Conclusion : La survie des patients atteints de cancer de la prostate au Bénin est influencée par de nombreux facteurs. Elle peut être améliorée par le diagnostic et la prise en charge précoces des patients.

Mots-clés : cancer de la prostate, survie, facteurs pronostiques, score de Gleason

COD25 : Prévalence et prise en charge de l'hypertension artérielle en milieu de travail : cas de la Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE) à Cotonou, Bénin.

Damien Barikissou Georgia^{1,2}, Aguemon Badirou², Hinson Vickey³, Datinon Pierrette, Padonou Géraud², Ayelo Paul³.

¹Département Population et santé, Centre de Formation et de Recherche en matière de Population (CEFOP), Université d'Abomey-Calavi, République du Bénin

²Unité de santé publique, Faculté des Sciences de la santé, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Benin

³Unité de santé au travail, Faculté des Sciences de la santé, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Benin

[*Email : barikiss2000@yahoo.fr](mailto:barikiss2000@yahoo.fr)

Résumé

Contexte et objectif : L'hypertension artérielle demeure un problème de santé publique au Bénin. Ce travail avait pour objectif d'étudier la prévalence de l'hypertension artérielle et sa prise en charge chez les travailleurs de la Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) à Cotonou.

Matériels et méthodes : Une étude transversale descriptive a été réalisée dans les directions départementales de la SBEE de novembre à décembre 2016. La population d'étude était constituée par les agents travaillant à la SBEE ayant un âge compris entre 18 et 69 ans. Un échantillonnage stratifié a été fait en tenant compte de l'organigramme des directions régionales de la SBEE. La taille minimum nécessaire pour l'étude était de 314 travailleurs de la SBEE. Un entretien été mené à l'aide d'un questionnaire après la prise des mesures anthropométriques et cliniques. Les données ont été saisies et analysées grâce à Epi info version 7.

Résultats : La moyenne d'âge était de 39 ans $\pm$ 9,8. La majorité des enquêtés appartenait au groupe d'âge de 35-44 ans (36,67%). Le sexe ratio Homme/Femme était de 2,47. Parmi les répondants, 23,50% étaient obèses et 81,68% ont été informés au moins une fois de l'HTA. La proportion d'individus ayant une HTA était de 31,66% dont 54,45% ne connaissait pas leur statut. De façon globale, 36,63% de tous les individus hypertendus étaient sous traitement antihypertenseur contre 80,43% dans le groupe des agents connus hypertendus

Conclusions : La prévalence de la tension artérielle est élevée en milieu de travail à la SBEE malgré un niveau de connaissance élevée de la maladie. Plus de deux tiers des agents hypertendus n'était pas sous traitement du fait de la méconnaissance de leur statut. Il est donc

nécessaire d'intensifier la sensibilisation et les dépistages en milieu de travail, d'assurer la prise en charge et de faire un bon suivi clinique des travailleurs.

Mots-clés : Hypertension artérielle, milieu de travail, dépistage, prise en charge, SBEE, Cotonou.

CO26 : Facteurs professionnels et surcharge pondérale en milieu industriel textile au Bénin

^{1,2,3}Adjobimey M, ²Mama-Cissé I, ²Hountohotègbè E, ^{3,4}Houéhanou C, ¹Mikponhoué R, ¹Hinson V, ¹Ayélo P, ³Houinato D.

1 Unité de Recherche et d'Enseignement en Santé au Travail et Environnement FSS Cotonou,
2 Centre National Hospitalier Universitaire de Pneumo-Phtisiologie de Cotonou,
3 Laboratoire d'Epidémiologie des Maladies Chroniques et Neurologiques, 4 Ecole de Médecine de Parakou

Auteur correspondant : Adjobimey M, Email : menoladjobi@yahoo.fr

Résumé

Contexte et objectif : La surcharge pondérale est un facteur de risque de plusieurs maladies chroniques dont le contrôle est important pour les politiques de lutte contre les maladies non transmissibles en milieu de travail. Certains facteurs professionnels contribuent à la survenue de la surcharge pondérale. L'objectif de l'étude était de déterminer la prévalence et les facteurs associés à la surcharge pondérale en milieu industriel textile au Bénin.

Matériels et méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale analytique menée du 31 janvier au 11 avril 2019 dans 15 usines textiles. Les données ont été collectées à l'aide du questionnaire STEPS de l'OMS sur les maladies non transmissibles digitalisé sur smartphones grâce à l'application Kobo collect. Une régression logistique mixte pas à pas descendante a été réalisée à l'aide du logiciel R 4.1.1. Le seuil de significativité était $p < 0,05$. L'étude a reçu l'approbation du comité d'éthique.

Résultats : Au total, 1883 travailleurs ont été inclus dont 90,8% de sexe masculin. L'âge médian était 38 ans (IQR : 28 ans à 49 ans). La prévalence de la surcharge pondérale était de 31,7% (IC95% : [29,6 - 33,9]). Les principaux facteurs professionnels associés étaient : secteur d'activité (ORa=2,04 ; IC95% : [1,41-2,97]), travail posté (ORa=2,46 ; IC95% : [1,79-3,39]), stress professionnel (ORa=0,58 ; IC95% : [0,42-0,82]) après ajustement sur les facteurs sociodémographiques, comportementaux et cliniques.

Conclusion : La prise en compte des facteurs professionnels dans la gestion des maladies chroniques en milieu de travail est capitale pour la maîtrise du risque.

Mots clés : Surcharge pondérale, Facteurs professionnels, Industrie, Bénin.

CO27 : Facteurs associés au tabagisme chez les travailleurs du secteur industriel textile au Bénin

^{1,2,3}Adjobimey M, ¹Mikponhoué R, ³Gainsi G, ²Mama-Cissé, ^{3,4}Houéhanou C, ²Hountohotègbè E, ¹Hinson V, ¹Ayélo P, ³Houinato D.

1 Unité de Recherche et d'Enseignement en Santé au Travail et Environnement FSS Cotonou,

2 Centre National Hospitalier Universitaire de Pneumo-Phtisiologie de Cotonou,

3 Laboratoire d'Epidémiologie des Maladies Chroniques et Neurologiques, 4 Ecole de Médecine de Parakou

Auteur correspondant : ³Adjobimey M, Email : menoladjobi@yahoo.fr

Résumé :

Contexte et objectif : La consommation de substances psychoactives comme l'alcool et le tabac est interdite sur le lieu de travail et en particulier dans les usines textiles. Cependant, plusieurs facteurs environnementaux professionnels ou non peuvent entraîner et entretenir l'usage de ces substances. L'objectif de l'étude a été de déterminer la prévalence et les facteurs associés à la consommation du tabac dans les usines textiles au Bénin en 2019.

Matériels et méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale et analytique menée du 31 janvier au 11 avril 2019. Elle a porté sur 1884 travailleurs de 15 usines du coton âgés d'au moins 18 ans. Les données ont été collectées par entrevue en mode face-à-face enquêteur- enquêté à l'aide du questionnaire STEPS digitalisé sur smartphones grâce à l'application Kobo collect. L'analyse des données a été effectuée par le logiciel R 4.1.1. Une régression logistique mixte pas à pas descendante a été réalisée. Le seuil de significativité était $p < 0,05$.

Résultats : Sur 1883 enquêtés, 90,8% étaient des hommes. L'âge médian était 38 ans (IQR : 28 ans à 49 ans). La prévalence de la consommation du tabac était de 6,4% (IC95% : [4,4 - 7,6]). Les principaux facteurs liés à la consommation du tabac étaient : la situation matrimoniale de vie seule (ORa=7,71 ; IC95% : [2,00-29,67]), le travail posté/ système quart (ORa=1,86 ; IC95% : [1-3,46]), l'ancienneté dans le coton (année) (ORa=1,65 ; IC95% : [1,12-2,42]), le stress professionnel (ORa=2,62 ; IC95%: [1,41-4,86]) , activités physiques intenses au travail (ORa=1,76 ; IC95%: [1,04-2,98]).

Conclusion : Les facteurs identifiés comme associés à la consommation du tabac peuvent orienter vers des actions visant à mettre en place des mesures préventives afin d'assurer le bien-être des travailleurs enquêtés dans leur milieu de travail.

Mots clés : Prévalence, Tabac, Coton, Bénin.

CO28 : Fertilité spontanée après myomectomie pour désir de grossesse à Cotonou : Facteurs influençant et issue des grossesses

*Dangbemey Djima Patrice^{1,2}, Tognifode Veronique^{1,2}, Atade Raoul⁴, Mfoumou Ruth^{1,2}, Azonbakin Simon^{1,5}, Aboubakar Moufalilou^{1,3}, Ogoudjobi Mathieu^{1,2}, Tshabu-Aguemon Christiane^{1,3}, Hounkpatin Benjamin^{1,2}, Denakpo Justin Lewis^{1,3}.

1 Faculté des Sciences de la Santé, Université Abomey-Calavi (R. Bénin)

2 Service de Gynécologie Obstétrique - CHU MEL de Cotonou

3 Clinique Universitaire de Gynécologie Obstétrique - CNHU HKM de Cotonou

4 Faculté de Médecine de l'Université de Parakou

5 Laboratoire d'Histologie-Biologie de la Reproduction Cytogénétique et Génétique Médicale / Unité de Biologie Humaine de la FSS

*Dr DANGBEMEY Djima Patrice, Maitre-Assistant de gynécologie obstétrique à l'UAC/FSS Cotonou. ddpatus78@yahoo.fr +229 66 25 75 24/ 65475858

Résumé

Contexte : La probabilité de concevoir après la myomectomie et ses déterminants sont des questions récurrentes en consultations.

Objectif : Apprécier les déterminants de la fertilité spontanée et issue des grossesses après une myomectomie pour désir de grossesse

Méthodes : Il s'est agi d'une étude descriptive et analytique à collecte de données rétrospectives portant sur les cas de myomectomie pour désir de grossesse réalisées entre 2016 et 2020 dans les maternités universitaires de Cotonou. Tous les dossiers de myomectomie pour désir de grossesse ont été recensés. Les données relatives à la fertilité après la myomectomie et les caractéristiques cliniques influençant la survenue de la grossesse et son issue après la myomectomie ont été analysées au regard des règles de déontologie et d'éthique.

Résultats : Au total 102 patientes étaient analysées sur 188 attendues. L'âge moyen était de 34 ans $\pm$ 5,7. Les nulligestes (39,2%) étaient les plus nombreuses. Le taux de fertilité spontanée après myomectomie était 16,7% (n=17). Le délai moyen de retour de la fertilité (grossesse) était de 27 mois. L'addiction à l'alcool (p = 0,00), la nulligestité (p=0,01), la taille des myomes (p=0,00) et l'adénomyose (p=0,00) avaient un impact négatif sur le délai de survenue de la grossesse. Sur 17 grossesses enregistrées après myomectomie, 11(64,7%) avaient une évolution normale avec accouchement à terme et 5 avortements spontanés (29,4%) étaient enregistrés. Une (1) grossesse était en cours au moment de l'enquête. La césarienne programmée (n=9) était

le mode d'accouchement le plus fréquent. Onze (11) nouveau-nés ont été accueillis et les suites de couches étaient simples.

Conclusion : La fertilité spontanée après la myomectomie était faible dans notre série. Des facteurs à impact négatif sur la fertilité doivent être pris en compte.

Mots clés : myomes, myomectomies, fertilité, grossesse, Cotonou.

COD29 : Diabète sucré chez les sujets atteints de l'hépatite virale C à Cotonou : prévalence et facteurs associés

Wanvoegbe Finangnon Armand¹, Kpossou Aboudou Raïmi², Agbodande Kouessi Anthelme², Kouam Kamdem Corinne Flore¹, Gninkoun Jules², Azon-Kouanou Angèle², Sehonou Jean², Amoussou-Guenou Daniel¹, Marcel Zannou Djimon².

1-Centre hospitalier universitaire et départemental Ouème-Plateau (CHUD-OP) de Porto-Novo

2-Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou

Auteur correspondant : Finangnon Armand Wanvoegbe wafinarm@yahoo.fr

Introduction : L'infection chronique par le virus de l'hépatite C (VHC) a pour conséquence le développement d'une hépatopathie chronique sévère et des complications métaboliques au rang desquelles le diabète sucré occupe une place importante. Notre objectif était d'étudier les aspects épidémiologiques du diabète sucré chez les patients porteurs du virus de l'hépatite C au CNHU HKM de Cotonou.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive et analytique, réalisée à la clinique Universitaire d'hépto-gastroentérologie du CNHU-HKM de Cotonou chez des patients suivis dans le service, du 1^{er} Janvier 2012 au 31 Octobre 2018.

Résultats : Au total 80 patients porteurs de l'hépatite C ont pu être inclus dans l'étude. L'âge moyen était de 60,2 ans $\pm$ 10,8 avec des extrêmes de 34 et 84 ans. Les sujets enquêtés étaient majoritairement des femmes (62,5 %) avec une sex-ratio de 0,6. Le génotype le plus représenté était le génotype viral 2 (57,2%). La prévalence du diabète sucré était de 25% chez nos patients porteurs du VHC. L'âge ($p=0,02$), l'antécédent familial de diabète ($p=0,03$) et la cytolysé hépatique ($p=0,02$) représentaient les facteurs associés retrouvés.

Conclusion : La prévalence du diabète sucré est élevée chez les porteurs du VHC. Cela nous amène à un dépistage systématique du diabète chez ces patients.

Mots-clés : diabète sucré, l'hépatite virale C, prévalence, Cotonou

CO30 : Frequency and factors associated with diabetes among pregnant women followed at the zone hospital (HZ) of Natitingou in 2020

Hountondji RFC¹, Houehanou YC², Robin Sacca H¹, Tchibozo M-C¹, Kouagou TR¹, Houinato DS¹.

1 Laboratory of Epidemiology of Chronic and Neurological Diseases (LEMANCEN)

2 National School for Senior Technicians in Public Health and Epidemiological Surveillance (ENATSE)

Corresponding author: Mr Romulus Fabrice Codjo HOUNTONDJI, Laboratory of Epidemiology of Chronic and Neurological Diseases. /Email: fabricehoun23@gmail.com /Tel :61949724

Abstract

Context and objective(s): Diabetes is a non-communicable disease that kills millions of people worldwide. In pregnant women, poorly treated diabetes can lead to complications during pregnancy, during delivery, and after delivery. This study aimed to determine the frequency and factors associated with diabetes in pregnant women followed at the zone hospital (ZH) of Natitingou in 2020.

Methods: We conducted a descriptive cross-sectional study with data collection from August 10 to September 15, 2020. This study included 404 pregnant women from the maternity ward of the Natitingou ZH who gave their free and informed consent during this period. General data and medical histories were collected during an individual interview using a standardized questionnaire. A capillary fasting blood glucose was measured. The Kobo collect software was used for data entry and the Epi Info 7.2.2.6. software for data analysis. Chi-2 tests and Fisher's test were used for comparison of proportions. The prevalence ratio (PR) was used as a measure of association.

Results: The mean age was 26.64 ± 5.80 years with extremes of 16 and 44 years. The frequency of diabetes among the pregnant women surveyed was 10.15%. Factors associated with diabetes in the pregnant women of our study were: monthly income ($p < 0,01$; PR=2,88), tobacco consumption ($p = 0,04$; PR=2,39), fruit and vegetable consumption ($p = 0,03$; PR=0,26), personal history of hypertension ($p = 2,98$; PR=0,02), preeclampsia ($p = 0,01$; PR=2,10), diabetes in previous pregnancies ($p < 0,001$; PR=9,17), Mid-Upper Arm Circumference ($p < 0,01$; PR=2,83), histories of macrosomia ($p < 0,001$; PR=4,29), family history of diabetes ($p < 0,001$; PR=5,06), and spontaneous miscarriages ($p < 0,001$; PR=3,16).

Discussions/Conclusions: The results show a high frequency of diabetes in the targeted pregnant women and call for the implementation of appropriate prevention measures.

Key words: Diabetes, associated factors, pregnant women, Natitingou

CO31 : Prevalence and factors associated with chronic low back pain in general population in Cotonou in 2021.

Agossou Fidèle^{1,2,4*}, Kossi Oyéné^{1,2,3}, Yamadjako Deneuve^{1,2,4}, Djohou Joanita^{1,2}, Houeze Bakhita^{1,2}, Salami Mariam^{1,2}, Daga Edith^{1,2}, Guedenon Cyriaque^{1,2}, Adoukonou Thierry^{1,2,3,4}.

¹ National School of Senior Technicians Training in Public Health and Epidemiological Surveillance, University of Parakou, Postal Box 122, Parakou, Benin

² Clinic of neurology, University Teaching Hospital of Parakou, Benin

³ Departement of neurology, University of Parakou, 03 BP, 10 Parakou, Benin

⁴ Laboratory of Epidemiology of Chronic and Neurological Diseases (LEMACEN), Faculty of Health Sciences, School of Health Sciences, University of Abomey-Calavi (UAC), Cotonou, Benin

Autor correspondent: *fagossou43@gmail.com

Abstract

Context and objectives: Low back pain is one of the musculoskeletal disorders that can occur at any age. Its chronic form is responsible of high treatment costs, sick leave and forces the population to face enormous expenses. This work aims to study the prevalence and the factors associated with chronic low back pain in the general population in Cotonou in 2021.

Material and methods: This was a cross-sectional, descriptive study with an analytical focus from April to September 2021. The sample size was 720 subjects drawn according to a cluster survey. Data was collected using the KoboCollect v2021.3.4 application and analyzed using RStudio 1.1.453 and Epi-Info 7.2.2.6 software. The Chi2 statistical test was used to compare the proportions with a significance level of $p < 0.05$.

Results: The mean age was 34.3 ± 14.0 years. The predominance was male with a sex ratio of 1.6. The prevalence of chronic low back pain was 29.3% (95% CI= [26.1; 32.7]). Age, marital status, occupation, carrying a heavy load on the back, position adopted at work, smoking, sedentary lifestyle, depression and body mass index were the factors associated with chronic low back pain in Cotonou in 2021.

Discussions and conclusions: The prevalence of chronic low back pain is high in the general population in Cotonou. It is therefore necessary to act on the factors for effective prevention and the multidimensional management of these affected people in order to improve their quality of life.

Keywords: Prevalence, chronic low back pain, Cotonou.

CO32 : Aspects cliniques et thérapeutiques des sarcomes à Cotonou

Gnangnon FHR¹, Gbessi DG¹, Seidou F², Adanzounnon MO¹, Chigblo SPE³, Imorou Souaïbou Y¹, Attolou SGR¹, Dossou FM⁴, Hans-Moevi Akue A³, Gangbo F², Mehinto DK¹

1. Clinique universitaire de chirurgie viscérale / Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM), Cotonou, Bénin
2. Laboratoire d'anatomie pathologique de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou (LAPC)/FSS-UAC, Bénin
3. Clinique universitaire de traumatologie-orthopédie et chirurgie réparatrice / Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM), Cotonou, Bénin
4. Service de chirurgie générale / Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l'Ouémé-Plateau, Porto-Novo, Bénin

Auteur correspondant : Dr Freddy H.R. GNANGNON, email : fredgang@yahoo.fr

Résumé

Contexte(s) et objectifs : Les sarcomes sont des tumeurs malignes rares d'origine mésenchymateuse, développées à partir des tissus conjonctifs et de soutien, contrastant avec les carcinomes, d'origines épithéliales, plus fréquent et mieux connus. Notre objectif était d'étudier les caractéristiques cliniques, thérapeutiques et pronostiques des sarcomes à Cotonou.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude descriptive et rétrospective sur une période de dix ans de Septembre 2010 à Septembre 2020. Nous avons inclus les observations médicales des patients atteints d'un sarcome histologiquement confirmé pris en charge à Cotonou durant la période d'étude. Une recherche active des cas a été effectuée pour évaluer la survie.

Résultats : L'étude a porté sur ces 80 observations médicales de patients atteints d'un sarcome histologiquement confirmé. La majorité des cas était constituée de sarcomes des parties molles (53,7%) suivi par les sarcomes viscéraux (30%) puis les sarcomes osseux (16,3%). Les principaux symptômes étaient la tuméfaction (96,3%) et la douleur (80%). Un patient sur cinq environ (22,5%) présentait des métastases au diagnostic. La majorité des patients (76,7%) avaient été opérés. Aucun patient n'avait bénéficié d'une radiothérapie. Environ un tiers (30,8%) des patients avaient présenté une récurrence après traitement. La survie médiane globale était de 10 mois pour les sarcomes tous types confondus.

Conclusion : L'amélioration du plateau technique (radiothérapie) et un meilleur accès aux traitements systémiques (chimiothérapie et thérapie ciblée) sont indispensables pour améliorer le pronostic des sarcomes à Cotonou.

Mots-clés : Sarcomes, accès au traitement, chirurgie, chimiothérapie, République du Bénin.

COD33 : Epidémiologie des facteurs de risque cardiovasculaires en population générale : particularités chez la femme en Afrique sub-Saharienne – étude TAHES

Chastaingt Lucie^{1,3}, Gbaguidi Gwladys N², Magne Julien³, Houehanou Corine², Amidou Salmane², Preux Pierre-Marie³, Daoud Héra¹, Aboyans Victor³, Houinato Dismand², Lacroix Philippe^{1,3}.

(1) Service de chirurgie vasculaire et médecine vasculaire, Centre Hospitalier Universitaire de Limoges

(2) University Abomey-Calavi, School of Health Sciences, Laboratory of Chronic Diseases Epidemiology (LEMACEN), Cotonou, Benin

(3) Inserm, Univ. Limoges, CHU Limoges, IRD, U1094 Tropical Neuroepidemiology, Institute of Epidemiology and Tropical Neurology, GEIST, Limoges, France

Auteur correspondant : lucie.chastaingt@chu-limogesfr

Résumé

Contexte et objectif(s) : Les facteurs de risque cardio-vasculaires (FDRCV) sont une cause majeure de mortalité et de handicap chez les femmes en Afrique sub-saharienne. Le rôle de certains facteurs (anxiété, statut obstétrical) est mal connu dans cette région. Nous avons comparé la prévalence des FDRCV entre les femmes et hommes, et déterminé les facteurs associés aux disparités entre ces deux populations.

Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une étude transversale des données recueillies en 2019 dans le cadre de la cohorte TAHES, menée à Tanvé (Bénin). Des analyses univariées et multivariées ont déterminé une association entre le sexe et les différents FDRCV. On a ensuite réalisé une régression logistique sur les FDRCV identifiés comme associés au sexe féminin, afin d'inclure des variables spécifiques aux femmes (données obstétricales).

Résultats : Le diabète (1,2% vs 3,4%, $p=0,0042$), l'insuffisance rénale chronique (15,5% vs 8,4%, $p=0,0002$), l'obésité (12,5% vs. 4,1%, $p < 0,0001$), le tabagisme (3,4% vs. 14,1%, $p < 0,0001$) et l'activité physique limitée (69,9% vs 50,7%, $p < 0,0001$) avaient des prévalences significativement différentes entre les femmes et les hommes, respectivement. La prévalence de l'HTA était similaire entre les deux sexes (32,6% vs 31,5%, $p=0,6471$). A l'issue de l'analyse multivariée, le sexe féminin restait associé à l'obésité, l'insuffisance rénale chronique et l'activité physique limitée. L'analyse multivariée en population féminine retrouvait une association entre le nombre de grossesses et une activité physique limitée.

Conclusion : Les prévalences de l'obésité, de l'insuffisance rénale et de l'activité physique limitée étaient significativement les plus importantes chez les femmes au Bénin, indépendamment des autres facteurs psychologiques, socio-économiques et FDRCV, et étaient proches de celles retrouvées dans les pays occidentaux. Certains FDRCV sont associés au statut obstétrical. Des mesures préventives devraient être mises en place dans la population féminine, et tenir compte de ses spécificités.

Mots-clés : épidémiologie, facteurs de risque cardio-vasculaires, femme

COD34 : Psychoéducation et prévention des rechutes chez les psychotiques chroniques à Abomey-Calavi : quand l'éducation thérapeutique rime avec une bonne stabilité de la santé

Avocè Codjo Jaurès

Ecole Doctorale Pluridisciplinaire « EDP-ECD », Laboratoire de Psychologie Appliquée (LPA), Université d'Abomey-Calavi (UAC)

00229 97272056 / jauresavoce@hotmail.com

Résumé

Le psychisme est l'une des entités qui gouverne l'être humain. Quand dans son fonctionnement, ce psychique en arrive à être affecté, il impacte négativement la santé du sujet, en l'occurrence celle mentale. D'ailleurs, la santé mentale est définie par Sutter et cité par Bachola (2003) comme étant "une aptitude du psychique à fonctionner de façon efficace, harmonieuse et agréable lorsque les circonstances le permettent, à faire face aux souplesses, aux situations difficiles et à rétablir après l'épreuve son équilibre dynamique".

Ainsi, la vie du sujet atteint d'un trouble psychotique chronique est faite d'instabilité : alternance entre période de crise et celle d'accalmie. Pour ce malade, il n'est pas toujours évident d'accepter sa maladie et tout ce qu'elle exige : des traitements au quotidien et à long terme, une remise en question de ses habitudes de vie et souvent le regard stigmatisant des autres. Face à ces difficultés du psychotique, il nécessite qu'il soit accompagné, afin d'accepter et de vivre avec sa maladie tout en respectant les prescriptions thérapeutiques (Fagla, 2008).

C'est ainsi que la présente recherche porte sur la "*Psychoéducation et prévention des rechutes chez les psychotiques chroniques à Abomey-Calavi : quand l'éducation thérapeutique rime avec une bonne stabilité de la santé de la population*". L'objectif général visé à travers ce sujet est d'identifier l'apport de la psychoéducation dans la prise en charge holistique d'un sujet psychotique chronique pour une stabilisation de sa santé dans la commune d'Abomey-Calavi. La démarche méthodologique suivie est majoritairement qualitative et portant sur 42 sujets, avec une étude de cas identifiée et enquêtée. La technique d'échantillonnage est non aléatoire et par commodité.

Cette étude nous a amenée à conclure que pour une prise en charge efficace d'un psychotique chronique, la psychoéducation doit être nécessairement intégrée au profit aussi bien du patient lui-même que de son environnement (parents et proches). Ceci leur permettra de ne plus s'en tenir aux préjugés sur la maladie mentale, mais d'encourager les malades mentaux à assurer de plus en plus de responsabilités au fur et à mesure que leur état s'améliore.

Mots-clés : Psychoéducation – Rechute – Psychotique chronique – Abomey-Calavi.

COD35 : Connaissances Attitudes et Pratiques sur les troubles neurocognitifs et l'épilepsie chez les étudiants en fin d'études en santé au Bénin.

Houinato Maryse¹, Sbeity Ali², Auditeau Emilie², Houinato Dismant¹, Boumédiène Farid², Preux Pierre-Marie², Vergonjeanne Marion², Cartz-Piver Leslie².

1 : Laboratoire d'Epidémiologie des Maladies Chroniques et Neurologiques (LEMACEN), Faculté des Sciences de la Santé, Université Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin

2: Inserm U1094, IRD U270, Univ. Limoges, CHU Limoges, EpiMaCT - Epidémiologie des maladies chroniques en zone tropicale, Institut d'Epidémiologie et de Neurologie Tropicale, OmegaHealth, Limoges, France

Résumé :

Contexte et objectif : Les données épidémiologiques sur les troubles neurocognitifs (TNC) et l'épilepsie mettent en évidence des maladies ubiquitaires, présentent sous toutes cultures et latitudes, avec des prévalences élevées, notamment dans les pays à revenus faibles et intermédiaires (PRFI). L'objectif principal était d'évaluer les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) sur les TNC et l'épilepsie auprès de futurs médecins, pharmaciens et infirmiers dans plusieurs PRFI, dont au Bénin.

Matériel et méthodes : Il s'agit d'une étude descriptive transversale multicentrique en cours de réalisation dans 12 pays. Nous avons utilisé l'initiative STROBE pour développer la méthodologie d'étude. Le recrutement est exhaustif pour les étudiants qui répondent aux critères d'inclusion. Les investigateurs collectent les réponses auprès des étudiants par le biais d'un auto questionnaire et réalisent une conférence apportant des éléments sur le contexte de la recherche épidémiologique sur ces pathologies dans plusieurs PRFI.

Résultats : L'étude menée au Bénin a inclus 108 étudiants (72 étudiants en médecine, 13 étudiants en pharmacie et 23 étudiants en soins infirmiers). Un score moyen de 15,17 +/- 1,49 sur 20 points a été trouvé. Le score de connaissances était plus faible que le score attitudes et pratiques ($p < 0,001$). Les questions avec un pourcentage faible de bonnes réponses portaient sur la définition, le diagnostic et la représentation de l'épilepsie, ainsi que la tolérance de la société envers les personnes vivant avec une épilepsie.

Conclusion : Les étudiants de santé en dernière année au Bénin maîtrisent les connaissances, les attitudes et les pratiques sur l'épilepsie. Nous devons continuer à appliquer les mêmes méthodes d'analyse envers les TNC pour les trois spécialités. Les résultats de cette étude puis ceux issus du Gabon et du Cameroun seront utilisés pour l'élaboration de recommandations pour améliorer et / ou maintenir de bons niveaux de CAP à la sortie des études en santé.

Mots clés : Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP), Etudiants, Epilepsie et Troubles neurocognitifs

COD36 : Trouble de la fonction diastolique chez le sujet hypertendu en Afrique subsaharienne : données de TAHES

David Vandroux (1), Corine Houehanou (2-3), Dominique Saka (3), Arnaud Sonou (3), Dismand Houinato (2), Julien Magne (1), Victor Aboyans (1), Philippe Lacroix (1)

- (1) Inserm U1094, IRD U270, Univ. Limoges, CHU Limoges, EpiMaCT - Epidémiologie des maladies chroniques en zone tropicale, Institut d'Epidémiologie et de Neurologie Tropicale, OmegaHealth, Limoges, France
- (2) Faculté des Sciences de la Santé, Maladies Chroniques et Neurologiques, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin
- (3) Service de cardiologie. CNHU de Cotonou, Bénin

Résumé

Contexte et objectif : Le retentissement de l'hypertension sur le cœur a été principalement évalué à partir de valeur de références établies dans les populations caucasiennes. Notre objectif était d'évaluer l'impact de l'hypertension sur la fonction diastolique en population générale d'Afrique subsaharienne, à partir des valeurs de références spécifiques à cette population.

Matériel et méthodes : Cette étude émane de TAHES, cohorte prospective en population générale dans le district de Tanvè, Bénin. L'hypertension était définie par une pression artérielle systolique ≥ 140 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique ≥ 90 mmHg et/ou la prise régulière de médicaments anti-hypertenseurs. Les échocardiographies étaient réalisées par quatre cardiologues et analysées par un seul observateur. La dysfonction diastolique était déterminée à partir des 5èmes et 95èmes percentiles des paramètres établis à partir d'une population de 513 sujets sains de TAHES. Une dysfonction diastolique étaient définies par au moins deux critères parmi : $e' < 9$; $E/e' > 10$; Volume de l'OG > 36 mL/m². Le profil de dysfonction diastolique était une trouble de relaxation ($E/A < 0.75$), un profil pseudonormal ($0.75 < E/A < 2$) ou un profil restrictif ($E/A > 2$).

Résultats : Dans notre cohorte, 318 participants (65% de femmes, âge 48 [38-62] ans) étaient hypertendus. Ils présentaient des ondes E, e' et un rapport E/A plus bas, et un rapport E/ e' plus élevé que les participants normaux ($p < 0.001$ pour tous). E/A, e' et E/ e' étaient corrélés à la pression artérielle systolique (respectivement $r = -0.35, -0.41$ et 0.39 , $p < 0.0001$ pour tous). Vingt-cinq pourcents des participants hypertendus présentaient un trouble de la fonction diastolique.

Les profils de dysfonction diastolique étaient un trouble de la relaxation pour 17% des hypertendus et un aspect pseudo-normal pour 8%. Aucun profil restrictif n'était détecté.

Conclusion : L'hypertension artérielle cause des altérations de la fonction diastolique en population générale d'Afrique subsaharienne, même en utilisant des critères spécifiques.

Mots clés : TAHES, hypertension, dysfonction diastolique, Bénin.

COD37 : Géométrie ventriculaire et fonction diastolique du sujet diabétique en Afrique subsaharienne : données de la cohorte TAHES

David Vandroux (1), Corine Houehanou (2-3), Dominique Saka (3), Arnaud Sonou (3), Dismand Houinato (2), Julien Magne (1), Victor Aboyans (1), Philippe Lacroix (1)

- (1) Inserm U1094, IRD U270, Univ. Limoges, CHU Limoges, EpiMaCT - Epidémiologie des maladies chroniques en zone tropicale, Institut d'Epidémiologie et de Neurologie Tropicale, OmegaHealth, Limoges, France
- (2) Faculté des Sciences de la Santé, Maladies Chroniques et Neurologiques, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin
- (3) Service de cardiologie. CNHU de Cotonou, Bénin

Résumé

Contexte et objectif : La prévalence du diabète augmente avec la transition épidémiologique. L'objectif de ce travail est d'établir le retentissement du diabète sur la géométrie ventriculaire gauche (VG) et la fonction diastolique en population générale béninoise.

Matériel et méthodes : TAHES est une cohorte prospective en population générale réalisée dans le district de Tanvè, Bénin. Les examens échocardiographiques étaient réalisés par 4 cardiologues puis analysés par un seul observateur en aveugle des données anthropométriques ou médicales. Les valeurs de référence étaient définies à partir de 513 sujets sans facteurs de risque cardiovasculaire. Un participant était défini diabétique s'il prenait un traitement antidiabétique ou si sa glycémie capillaire à jeun était supérieure à 1.26 g/L. Les variables sont présentées en médiane (premier et troisième quartile).

Résultats : Seuls 45 participants [âge 46 (39-57) ans, 24 femmes, surface corporelle 1.72 (1.53-1.94) m², 18 % sous insulinothérapie, 14 % sous antidiabétiques oraux, 62 % hypertendus] ont été définis comme diabétiques (5%). Les sujets diabétiques avaient une masse ventriculaire indexée plus élevée [97 (85-121) vs 90 (76-106), $p=0.024$], même en prenant en compte l'effet de l'âge. Cette augmentation de masse ventriculaire était la conséquence d'une augmentation de l'épaisseur des parois ($p = 0.0012$ pour le septum interventriculaire et $p<0.0001$ pour la paroi postérieure) et non d'une augmentation du volume télédiastolique du VG ($p=0.84$). La géométrie ventriculaire était normale pour 35 sujets (78%), six sujets (13%) présentaient un remodelage ventriculaire et quatre sujets (9%) une HVG excentrique. La fraction d'éjection ventriculaire gauche n'était pas altérée ($p=0.75$). E, E/A et e' étaient abaissées (respectivement $p=0.02$, $p<0.0001$ et $p<0.0001$) et E/e' plus élevé ($p=0.0004$) chez les participants diabétiques.

Toutefois la dysfonction diastolique restait rare (13%) et touchait essentiellement les sujets hypertendus.

Conclusion : La myocardiopathie diabétique est rare dans la cohorte avec des stades essentiellement précoces.

COD38 : Stigmatisation des malades mentaux au sud du Bénin

Viegbe Mikaël Pierre-Désiré¹ ; Serge Evenamia S²

¹ Orthophoniste, Psychologue Clinicien, Doctorant en sciences du langage et de la Communication, option linguistique Clinique Spécialité Neuropsycholinguistique à l'EDP/ECD de l'Université d'Abomey-Calavi Bénin, Contacts (00229)95172136/97 802158 Courriel : vimdepio@gmail.com

² Psychologue Clinicien, Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l'Ouémé

Résumé

Contexte Et Objectifs : Le vécu des malades mentaux au Bénin n'est pas reluisant. Ils sont confrontés à d'énormes problèmes qui perturbent leur quotidien.

Cette situation motive le choix du thème « *STIGMATISATION DES MALADES MENTAUX AU SUD DU BENIN* ». L'objectif général est de ressortir les causes, les manifestations et les conséquences de la stigmatisation des malades mentaux au sud du Bénin.

Matériels Et Méthodes : Cette étude à visée descriptive et analytique avec une approche quantitative à durée de dix (10) mois, est basée sur les tradithérapeutes qui traitent les maladies mentales et responsables religieux, les usagers ou non des centres psychiatriques et le corps médical et paramédical des communes de Cotonou, d'Avrankou, et d'Abomey. Un échantillon de 308 enquêtés dont respectivement 101, 105 et 102 est constitué grâce à la méthode non probabiliste et la technique d'échantillonnage de choix raisonné, les techniques d'échantillonnage par quota et de boule de neige. Un questionnaire d'enquête leur est administré.

Résultats : Les Usagers ou non des centres psychiatriques à 56,33%, affirment que la capacité de nuisance des malades mentaux l'une des Causes psychosociologiques de la stigmatisation. Les Tradithérapeutes affirment à 74,19% que la "peur de se faire attaquer par les mauvais esprits" et le "non-respect des interdits sociaux" sont des Causes culturelles de leur stigmatisation. Les usagers ou non des centres psychiatriques affirment à 63,08 % que la stigmatisation se manifeste par le rejet. Le corps médical affirme à 69,51% que la stigmatisation dans les centres psychiatriques se manifeste par l'abandon du malade mental. Les enquêtés à 82.93%, affirment que la stigmatisation entraîne les rechutes des malades.

Discussion Et Conclusion : Ces résultats montrent la souffrance des malades mentaux au Bénin. Implantés les centres psychiatriques dans les hôpitaux départementaux s'avère

important avec la collaboration des tradipraticiens pour une prise en charge holistique en plus des sensibilisations grand public les 10 octobre.

Mot clés : stigmatisation – malades - mentaux -

COD39 : Qualité de vie des patients cancéreux suivis dans un service d'oncologie médicale : une étude descriptive qualitative

Otti André¹, Sall Aboubacar², Thiam Makhouradia³

¹ Infirmier, Ph. D, Maitre-Assistant des Universités-CAMES, Enseignant-chercheur au Département des Sciences Infirmières de l'Institut National Médico-Sanitaire (INMeS), Université d'Abomey-Calavi (UAC), République du Bénin. **Tél :** +229 64068282 ou 61989888 ; **Courriel :** androtti@ymail.com

² Infirmier, Bsc. Service d'oncologie médicale du Centre hospitalier universitaire DALAL JAMM République du Sénégal **Tél :** +221 77 422 51 28. **Courriel :** boubabd45@gmail.com

³ Infirmier, Ph. D. Coordonnateur du cycle Master en Sciences Infirmières et Obstétricales de l'Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR2S) de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis au Sénégal. **Tél :** +221 77 531 66 73 ; **Courriel :** makhouradiathiam@gmail.com

Résumé :

Contexte et objectif : Face aux symptômes fortement aversifs et aux effets secondaires incapacitants liés à la prise en charge thérapeutique des cancers, l'évaluation de la Qualité de vie (**Qdv**) des patients est essentielle pour mieux éclairer les décisions cliniques. A l'aide d'un devis de recherche de type qualitatif descriptif, le retentissement de la maladie cancéreuse et de ses traitements sur les différentes dimensions de la **Qdv** des patients atteints d'un cancer et suivis dans le service d'oncologie médicale du Centre Hospitalier Universitaire DALAL JAMM du Sénégal a été évalué.

Matériel et méthodes : Les données collectées du 1^{er} juillet au 31 août 2021 à l'aide du questionnaire auto-administré QLQ-C30 (version 3) de l'Organisation Européenne de Recherche de Traitement du Cancer, ont été analysées selon les directives contenues dans le « QLQ-C30 Scoring Manual » par calcul de la moyenne des scores bruts de chacun des 30 items renseignés, puis des Scores Normalisés (SN) variant de 0 à 100 à partir desquels, l'échantillon a été réparti en trois groupes : Qdv peu dégradée (SN : 0-30) ; Qdv moyennement dégradée (SN : 30-60) et ; Qdv fortement dégradée (SN > 60). Enfin, une analyse descriptive bivariable à la recherche d'associations significatives entre la qualité de vie et les différentes variables sociodémographiques et cliniques a été effectuée par calcul du coefficient de corrélation. Les résultats étaient considérés comme significatifs pour le risque alpha de première espèce inférieur à 5 % ($p < 0,05$).

Résultats : 60 patients cancéreux ont été inclus dans l'étude dont 47% étaient au stade **II** de l'évolution du grade SBR de la maladie cancéreuse. Leur âge moyen est de 54,42 ans avec des

extrêmes allant de 13 à 84 ans. La Qdv est peu dégradée chez 66% des enquêtés, moyennement dégradée chez 23% et fortement dégradée chez 11%. Le stade de la maladie ($p<0,003$), la présence de métastases ($p<0,004$), la localisation des métastases ($p<0,004$), la chimiothérapie curative ($p<0,003$), la chimiothérapie palliative ($p<0,004$) et la radiothérapie curative ($p<0,003$) sont des facteurs qui influencent significativement la Qdv des patients cancéreux.

Discussions et Conclusions : La prise en compte de ces facteurs pourrait améliorer la qualité de vie des patients cancéreux

Mots clés : qualité de vie ; cancer ; Centre Hospitalier Universitaire DALAL JAMM ; Sénégal

COD40 : Caractérisation du trouble de l'usage de l'alcool : approche bio-psycho-sociale

Thibaut Gellé ⁽¹⁾, Aude Paquet ^(1,2), Murielle Girard ^(1,2), Philippe Nubukpo ^(1,2)

(1) Inserm U1094, IRD U270, Univ. Limoges, CHU Limoges, EpiMaCT - Epidémiologie des maladies chroniques en zone tropicale, Institut d'Epidémiologie et de Neurologie Tropicale, OmegaHealth, Limoges, France

(2) Unité de Recherche et d'Innovation, Centre Hospitalier Esquirol, Limoges, France

Email : thibaut.gelle@unilim.fr

Résumé :

Contexte et objectifs : Les troubles mentaux et les troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives, dont l'alcool, font partie des principales causes d'années vécues avec une incapacité dans le monde.

L'étude ALCOTRANS vise à mieux comprendre le Trouble de l'Usage de l'Alcool (TUA), en utilisant des approches variées et combinées.

Son objectif est d'identifier chez des sujets présentant un TUA en France (Limoges), au Bénin et au Togo, des caractéristiques : socio-démographiques et cliniques, sensorielles, biologiques et sociales (stigma, représentations socio-culturelles).

Matériel et Méthodes : Deux études sont en cours de réalisation :

- en population générale au Togo et au Bénin pour identifier des cas de TUA et décrire les caractéristiques du trouble (co-morbidités psychiatriques, craving, intensité dépressive, capacités cognitives), pour évaluer le profil sensoriel, et les indicateurs biologiques (S100 beta, NSE, BDNF) chez les sujets TUA identifiés.
- en milieu hospitalier, chez les sujets avec un TUA, dans les trois pays pour comparaison des pays entre eux, avec les mêmes évaluations.

Résultats attendus : Une meilleure identification de la prévalence du TUA et des co-morbidités psychiatriques associées est attendue, au Togo et au Bénin.

Dans les trois pays, l'étude permettra d'identifier chez les sujets avec un TUA :

- Les spécificités du profil sensoriel
- Les taux sériques de BDNF, S100 Beta et de la NSE
- L'impact de la stigmatisation et des représentations socio-culturelles

Discussions et Conclusion : Cette étude épidémiologique à travers une approche biologique et environnementale devrait permettre une meilleure compréhension du TUA et des facteurs cliniques, biologiques, cognitifs et sociaux qui lui sont associés. Cette caractérisation des sujets

souffrant d'un TUA est indispensable pour optimiser les stratégies de prévention, de dépistage, et de soins adaptés aux personnes souffrant d'un TUA.

Mots clés : Trouble de l'Usage de l'Alcool, Afrique, France, Epidémiologie

CO41 : Prévalence et facteurs associés à la consommation abusive de l'alcool chez les jeunes de la commune de Matéri en 2021.

Akpo Yof, Hadekon R, Ahidjanhoun Dmn

Correspondant : Akpo Yof ; ESIIE /IFSIO, Université de Parakou, Benin,
florenceakpo90@gmail.com

Résumé :

Introduction : L'alcool est une substance utilisée dans la plupart des manifestations et elle se fait apprécier par sa qualité et parfois la saveur qu'elle donne dans la bouche. L'abus dans la consommation aboutit à une dégradation progressive de l'état de santé du consommateur. Faisant partir des habitudes de vie, l'ampleur des dégâts sont souvent ignorés de tous, ce qui induit un problème de santé publique.

Objectif : Étudier les facteurs associés à la consommation abusive de l'alcool chez les jeunes de la commune de Matéri en 2021.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude observationnelle, transversale et descriptive allant du 24 septembre au 04 octobre 2021 réalisée à partir d'un guide d'entretien structuré auprès des jeunes de la commune de Matéri. La méthode d'échantillonnage utilisée était celle de convenance.

Résultats : Au total 155 jeunes ont été interrogés au cours de la période d'étude dont 38,06% ont moins de 20 ans, 38,71% ont un âge compris entre 20 et 25 ans, et 23,23% ont plus de 25 ans. Les chrétiens étaient les plus représentés avec 58,06%. Les jeunes vivaient à 80,65% dans les milieux ruraux et réside à 61,29% dans des maisons à terre battue. Ils étaient à plus de 67,74% des élèves et étudiants. La situation socioéconomique de la plupart des enquêtés était basse et occupait 66,45%. Sur les 155 sujets enquêtés 107 déclaraient avoir consommé de l'alcool les douze derniers mois soit une prévalence de 69,03%. Parmi les 107 consommateurs, 83 en consommaient de façon abusive soit pour un taux de 77,57%. 57,40% sujets consommateurs connaissent les conséquences liées à la consommation abusive de l'alcool et 65,42% avait déclaré avoir faire des malaises. La société influe sur 54,21% des sujets et la principale raison qui motivait ces jeunes était la consommation parentale représentée à plus de 42,06%.

Conclusion : Pour assurer le bien-être de la population de Matéri en matière de santé, il est important de réorganiser le système sanitaire en réunissant les efforts vers la prévention de la maladie, en engageant le personnel qualifié et proche de la population pour déceler précocement les problèmes auxquels ils font face et d'y apporter des solutions durables

Mots clés : Prévalence ; facteurs associés ; consommation abusive ; alcool.

COD42 : Ampleur et facteurs associés au retard de croissance dans la commune de Dassa-Zoumè en 2021

Azandjeme Colette Sylvie^{1*}, Davo Auriel², Aguemon Badirou², Metonnou Clémence Germaine¹, Mongbo Virginie¹, Bedie Vignon³.

¹Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi,

²Département de Santé Publique Santé et Epidémiologie, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

³Département Politique et Système de Santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

Auteur correspondant : Azandjeme Colette Sylvie, ¹Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Email : colsyaz@yahoo.fr

Résumé :

Contexte et objectif : La malnutrition demeure un réel problème de santé publique au Bénin, notamment dans les localités rurales. La présente étude vise à décrire l'ampleur des différentes facettes de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans la commune de Dassa-Zoumè en 2021.

Matériel et méthode : Il s'agit d'une étude transversale descriptive portant sur 330 enfants de 6 à 59 mois. Ces enfants et leurs mères ont été sélectionnés selon un échantillonnage en grappes. Les données collectées ont permis d'évaluer l'état nutritionnel des enfants et de les classer en fonction des différentes facettes de la malnutrition.

Résultats : La prévalence de l'insuffisance pondérale était élevée de 17,9% avec une déviation de la courbe vers la gauche ; 13% de forme modérée et 4,8% de forme sévère.. La prévalence du retard de croissance était de 29,1% avec 17,9% de modérée et 11,2% de forme sévère. Les enfants émaciés représentaient 9,4% de la population avec 5,5% de forme modérée et 3,9% de forme sévère. Ces différentes formes prévalaient plus chez les garçons que chez les filles et chez les enfants de 24 à 59 mois.

Discussion et conclusion : Ces résultats soulignent la nécessité d'élaborer des programmes de sensibilisation et d'éducation à l'intention des ménages sur les bonnes pratiques d'alimentation des enfants et les soins à leur apporter en vue d'améliorer leurs états nutritionnels.

Mots clés : Emaciation, Insuffisance pondérale, retard de croissance, Dassa-Zoumè.

COD43 : Facteurs associés au retard de croissance dans la commune de Dassa-Zoumè en 2021

Azandjeme Colette Sylvie^{1*}, Davo Auriel², Aguemon Badirou², Metonnou Clémence Germaine¹, Mongbo Virginie¹, Bedie Vignon³.

¹Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi,

²Département de Santé Publique Santé et Epidémiologie, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

³Département Politique et Système de Santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

Auteur correspondant : Azandjeme Colette Sylvie, ¹Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Email : colsyaz@yahoo.fr

Résumé :

Contexte et objectif : La présente étude vise à identifier l'ampleur et les facteurs associés au retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans dans la commune de Dassa-Zoumè en 2021.

Matériel et méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale et analytique portant sur 330 enfants de 6 à 59 mois. Ces enfants et leurs mères ont été sélectionnés selon un échantillonnage en grappes. Les données collectées ont permis d'apprécier l'état nutritionnel des enfants et d'identifier les facteurs associés du retard de croissance dans cette commune, notamment les facteurs socioéconomiques et socio-culturels, le niveau de sécurité alimentaire des ménages, les pratiques d'allaitement maternel et d'alimentation de complément, les facteurs environnementaux et l'accès aux soins de santé à l'aide d'une régression logistique.

Résultats : La prévalence du retard de croissance était de 29,1%. Les ménages en insécurité alimentaire représentaient 92,8% de la population. Seulement un enfant sur trois a reçu un allaitement maternel exclusif et l'alimentation de complément est peu diversifiée. Le sexe de l'enfant (OR= 1,88 ; [IC 95% 1,12-3,13], le niveau d'instruction du père (OR=1,83 ; [IC 95% 1,10-3,07]), le respect des consultations prénatales lors de la grossesse (OR=0,41 ; [IC 95% 0,24-0,71]), et l'absence de survenue de fièvre ou de diarrhée au cours des 15 derniers jours (OR=0,37 ; IC 95% 0,15-0,88]) étaient les facteurs associés au retard de croissance.

Discussion et conclusion : Cette étude a révélé que le retard de croissance demeure un fléau dans cette commune et les facteurs associés ne sont pas forcément ceux communément décrits

dans la littérature. Ces résultats soulignent la nécessité d'élaborer des programmes holistiques prenant en compte divers aspects de ce problème de santé.

Mots clés : Retard de croissance, Enfants 6 à 59 mois, Facteurs associés, Dassa-Zoumè.

COD44 : Epidemiological profile of type 2 diabetes in Avrankou

PADONOU Sètonджи Géraud Roméo ^{1*}, GNINKOUN Comlan Jules ², MIZEHOUN-ADISSODA Carmelle ³, DAMIEN Georgia ¹, HINSON Antoine Vickey ⁴, AYELO Paul ⁴, AGUEMON Badirou ¹

1 : Département de Santé Publique. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi. 01 BP 188 Cotonou, République du BENIN.

2 : Service d'endocrinologie et diabétologie. Centre National Hospitalier et Universitaire HKM. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi. 01 BP 188 Cotonou, République du BENIN.

3 : Ecole de Nutrition et Diététique. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi. 01 BP 188 Cotonou, République du BENIN.

4 : Unité de recherche et d'enseignement en santé au travail et environnement. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi. 01 BP 188 Cotonou, République du BENIN.

***Corresponding author :**

Sètonджи Géraud Roméo PADONOU.

Département de Santé Publique. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi. 01 BP 188 Cotonou, République du BENIN. geraudpad@yahoo.fr Tél : 00229 66 64 75 75

Abstract

Objectives: In a context of epidemiological transition of chronic non-communicable diseases in middle-income and low-income countries, the objectives of this study were to determine the community prevalence of type 2 diabetes and to research the associated factors.

Methods: A descriptive and analytical cross-sectional study was conducted from July to September 2021 in Avrankou, a city located in the south-east of Benin. 402 subjects were recruited from whom the following data were collected: fasting capillary glycaemia, anthropometric measurements, socio-demographic and economic factors, nutritional information, practice of physical activity. A logistic regression model was made to identify the factors associated with diabetes defined by a glycaemia > 1.26 g/L.

Results: Prevalence of diabetes in our sample was 13.18%. Mean age (SD) was 45.74 (7.89), the M/F sex ratio was 1.32. Most were civil servants or executives (40.81%), 44.53% had a BMI > 25, 40.05% were sedentary. Mean food consumption score was 32.79 and the food diversity score was 8.32. Age > 40 years (OR=2.34; p=0.000), BMI > 25 (OR=3.79; p=0.000),

sedentary lifestyle (OR=2.09; p=0.001) and household wealth index (OR=1.94; p=0.02), were significantly associated with the occurrence of type 2 diabetes.

Conclusion: This study highlights the need to intensify public health interventions to prevent the onset of diabetes in target populations, by acting on modifiable risk factors.

Key-words: Type 2 diabetes-Risk factors-BMI-Sedentary lifestyle -Household wealth index

COD45 : Cervical cancer screening in a urban area

PADONOU Sètonджи Géraud Roméo ^{1*}, SEIDOU Falilatou ², TOGNIFODE Mèdessè Véronique ³, DAMIEN Georgia ⁴, HINSON Antoine Vickey ⁵, AYELO Paul ⁵, AGUEMON Badirou ¹

1 : Département de Santé Publique. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi. 01 BP 188 Cotonou, République du BENIN.

2 : Laboratoire d'anatomie pathologique et cytopathologique. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi. 01 BP 188 Cotonou, République du BENIN.

3 : Département de gynécologie obstétrique. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi. 01 BP 188 Cotonou, République du BENIN.

4 : Centre de Formation et de Recherche en matière de population (CEFOP). Université d'Abomey-Calavi. République du BENIN.

5 : Unité de recherche et d'enseignement en santé au travail et environnement. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi. 01 BP 188 Cotonou, République du BENIN.

***Corresponding author :**

Sètonджи Géraud Roméo PADONOU.

Département de Santé Publique. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi. 01 BP 188 Cotonou, République du BENIN. geraudpad@yahoo.fr Tél : 00229 66 64 75 75

Abstract

Objectives: This study aimed to analyze epidemiological data and measure the level of knowledge of women about cervical cancer and screening in an urban context.

Materials and methods: During a cervical cancer screening campaign carried out in Cotonou, Benin, 154 women were included. Sociodemographic data, gyneco-obstetric profile, knowledge of cervical cancer screening were noted.

Results: Mean age was 32.17 years. Over 70% of women were screening for cervical cancer for the first time. Mean number of children was 2.34 ± 1.6 . The majority (56.13%) did not use hormonal contraceptives. Mean age at first sexual intercourse was 19.03 years. More than half of the women (59.35%) had not had a gynecological consultation during the last 12 months. Only 44.16% of women knew at least one cause of cervical cancer, and among them, 41.55% of women identified STIs and 35.71% multiple partners as possible causes. For 74.02% of women, cervical cancer could not occur before puberty; 59.74% believed that a woman who

has never had sex could have cervical cancer. More than 60% knew no signs of it. For those who knew at least one sign, the most cited was bleeding outside of menstruation (30.52%). The majority, nearly 92%, knew that there is a treatment for cervical cancer and 77.92% said it can be cured. More than half of the women, 52.26%, knew at least one prevention strategy and the most cited were screening and gynecological follow-up. For the majority of women (77.92%) screening should be done every year. The main barriers to carrying out screening were the lack of information (74.67%), the high cost (40.26%) and ignorance of the structures where screening can be carried out (32.46%). More than 16% of women and almost 15% respectively expressed fear of poor performance conditions and fear of pain related to screening.

Conclusion: This study underlines the need to intensify awareness and information messages, and to multiply screening strategies, even in urban populations with women with a good socioeconomic level.

Keywords: Cervical cancer-screening-Knowledge-Barriers.

COD46 : Troubles du spectre autistique à Cotonou : facteurs influençant l'orientation des enfants au cours du processus diagnostique

ANAGONOU Lucrèce¹, KLIKPO Elvyre¹, GBETOGBE Komlan³, ADEOSSI Feldia², FIOSSI- KPADONOU Émilie¹

1. Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences de la Santé, Département de santé mentale, Cotonou, Bénin
2. Centre hospitalier les Pyrénées, Pau, France
3. Département de santé mentale, CNHUP-C, Cotonou, Bénin

Auteur correspondant : ANAGONOU Lucrèce

Tél : +229 66263585

Courriel : luccea2@gmail.com

Contexte et objectif : Les Troubles du spectre Autistique (TSA) constituent l'une des premières causes de maladie chronique chez l'enfant dans le monde. A Cotonou, la fréquence d'orientation des enfants suspects de TSA en pédopsychiatrie, par les professionnels de premier contact, semble être faible. L'objectif de cette étude a été de déterminer les facteurs influençant l'orientation des situations suspectes d'autisme, par les professionnels travaillant avec les enfants à Cotonou.

Matériel et méthode : Il s'est agi d'une étude transversale, de type Connaissances Aptitudes et Pratiques (CAP), mixte, qui s'est déroulée du 04 novembre 2019 au 06 décembre 2019 à Cotonou. Elle a concerné les professionnels de l'enfance, pouvant être capables de repérer un enfant présentant des symptômes susceptibles de correspondre aux manifestations des TSA au cours de leur pratique quotidienne. Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire auto-administré. Le traitement et l'analyse des données ont été réalisés à l'aide du logiciel SPSS, dans sa version 21.

Résultats : L'étude a connu 76% de taux de participation active avec 190 enquêtés ; 61,6% des enquêtés avaient déjà entendu parler de l'autisme. Une bonne définition de l'autisme a été donnée par 44,7% des enquêtés. L'autisme faisait penser en premier, à des troubles du neuro développement (90,19%), à des troubles psychiques (31,37%) et des troubles des conduites et du comportement (28,43%) ; 35% des enquêtés avait un niveau de connaissance moyen des signes évocateurs des TSA. L'indisponibilité des pédopsychiatres, les difficultés financières des parents et les représentations culturelles de la maladie mentale au Bénin, feraient partie des principales raisons rendant difficile la rencontre des enfants orientés vers le pédopsychiatre.

Conclusion : La connaissance des signes évocateurs des TSA bien qu'imparfaite n'est pas le seul frein à l'orientation des enfants au cours du processus diagnostique de l'autisme. D'autres difficultés rencontrées dans la prise en charges des maladies mentales en Afrique Noire y concourent.

Mots clés : Autisme ; connaissances ; signes évocateurs ; Cotonou.

COD47 : Pemphigus vulgaire avec profil inhabituel des anticorps anti desmogléine 1 et 3 : à propos d'un cas à Cotonou, Bénin

AKPADJAN Fabrice¹, HOUNGBO Odile², TAZANOU Armelle¹, TAKIN Romulus³, AGBESSI Nadège², DEGBOE Bérénice¹, KOUDOUKPO Christiane², ADEGBIDI Hugues¹, ATADOKPEDE Félix¹, PADONOU do ANGO Florencia¹.

¹ Service de Dermatologie-Vénérologie, Faculté des Sciences de la Santé, UAC, Bénin

² Service de Dermatologie-Vénérologie, Faculté de Médecine, Université de Parakou, Bénin

³ Laboratoire d'anatomie pathologique DUBOIS

Auteur correspondant : Dr. AKPADJAN Fabrice, Maître-Assistant en Dermatologie-Vénérologie, Faculté des Sciences de la Santé de l'Université d'Abomey-Calavi ; 09BP: 441 Cotonou (Bénin) ; Tél : (+229) 97 07 44 09 ; barfice@yahoo.fr

Conflit d'intérêt : aucun

Résumé

Introduction : Le pemphigus est une dermatose bulleuse auto immune rare liée à la production d'auto-anticorps dirigés principalement contre les desmogléines. Dans sa forme profonde (Ac anti-desmogléine 1) l'atteinte muqueuse prédomine alors que l'atteinte cutanée est plus importante dans le pemphigus superficiel (Ac anti-desmogléine 3). Nous rapportons un cas de pemphigus vulgaire avec une discordance immuno-clinique à Cotonou.

Observation : Femme de 35 ans, consultait pour des érosions buccales douloureuses évoluant depuis 06 mois. A l'examen on notait une altération de l'état général, des érosions des muqueuses buccales et génitales. Sur le plan cutané, de multiples bulles flasques, d'érosions et de croûtes (aisselles, dos, abdomen, cuisses et jambes). Le signe de Nikolsky était positif.

La paraclinique a révélé une positivité des anticorps anti-desmogléine 3 (>800 UR/ml) et une négativité des anticorps anti-desmogléine 1. L'histopathologie a retrouvé un clivage supra basal par acantholyse. Le diagnostic de pemphigus vulgaire a été retenu. Un traitement initial par prednisone à 0,75 mg/kg/jr associé secondairement au méthotrexate à 20mg/semaine a permis d'obtenir une rémission complète depuis un an.

Discussion : L'originalité de cette observation réside dans la discordance immuno-clinique chez notre patiente. En effet, la desmogléine 3 est fortement exprimée dans toutes les couches de la muqueuse buccale et accessoirement dans la couche basale de l'épiderme. Ceci justifie les lésions muqueuses observées. En revanche la desmogléine 1 est responsable de lésions cutanées prédominantes. Cette atteinte cutanée diffuse contraste donc avec la négativité des anticorps anti-desmogléine 1 ; car dans le pemphigus vulgaire typique l'atteinte cutanée n'est pas si importante.

Conclusion : Le diagnostic de pemphigus vulgaire chez notre patiente ne faisait aucun doute. Mais la concordance immuno-clinique classique n'a pas été respectée. Ce cas rare mérite d'être connu.

Mots-clés : pemphigus vulgaire, discordance immuno-clinique, Ac anti desmogléine

COD48 : Surcharge pondérale et l'obésité chez les enfants d'âge scolaire fréquentant des écoles primaires dans la ville de Porto Novo

METONNOU Clémence Germaine^{1*}, AGUEMON Badirou², HOUNKPATIN Ghislaine³, AZANDJEME Colette Sylvie¹, SOSSA Charles¹

1. Département de la promotion de la santé, Institut régional de santé publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin
2. Division appui Statistique et épidémiologie, Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Benin
3. Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Benin

***Auteur correspondant** : Metonnou Clémence Germaine, BP 384 Ouidah.

Tel : +229 95863091

Email metonnouc@yahoo.fr

RESUME :

Introduction : La surcharge pondérale et l'obésité constituent la plus grande cause de décès dans le monde. Cette étude vise les facteurs associés à la surcharge pondérale et l'obésité chez les enfants d'âge scolaire à Porto-Novo.

Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive à visée analytique couvrant la période du 11 au 18 janvier 2021. Les établissements scolaires étaient sélectionnés au premier degré avec un pas de 50 sur la base de la liste de tous les établissements publics et privés de la ville de Porto-Novo. Ainsi trois établissements publics et cinq privés ont été sélectionnés. Au deuxième degré, 40 enfants d'âge scolaire inscrits du CI au CM2 ont été choisis par établissement. Sept élèves par classe ont été sélectionnés de façon aléatoire. Les données ont été analysées par le logiciel Epi info version 7.6. Le logiciel ALIMENTHEQUE® a été utilisé pour calculer les apports en énergie. Le test de Pearson 2 a été utilisé pour la comparaison avec un niveau de signification de 0,05

Résultats : L'âge moyen des enfants était de $8,41 \pm 1,79$ ans 139 des enfants étaient de sexe masculin (44,13%) contre 176 de sexe féminin (55,87). La prévalence du surpoids est de 6,35%. La prévalence de l'obésité est de 3,17%. Soit une prévalence globale de surcharge pondérale de 9,52%. La fréquentation des cantines scolaires et l'inactivité physique sont associées à la surcharge pondérale des écoliers respectivement avec $p = 0,04$ et $p = 0,01$.

Conclusion : La présente étude montre que les habitudes alimentaires des enfants d'âge scolaire de la ville de Porto-Novo sont associées à la surcharge pondérale et l'obésité chez ces enfants

Mots clés Surcharge pondérale ; Obésité ; enfants d'âge scolaire ; Bénin.

B. MALADIES TRANSMISSIBLES

CO49 : Le paludisme et l'immunité anti palustre chez le jeune enfant, cas du projet ISAMIMA.

^{1,2} Moussiliou Azizath, ¹ Ahouansou Charles, ¹ Elijah Oumarou, ¹oualoufeye Aziz, ² Luty Adrian, ² Ndam Nicaise, ¹ Adoukonou Thierry.

¹ ENATSE Ecole Nationale des Techniciens en Santé publique et Surveillance Epidémiologique. Université de Parakou, Parakou, Bénin

² Université de Paris, MERIT (Mère et Enfant face aux Infections Tropicales), IRD (Institut de Recherche pour le Développement), Paris, France

Email : azizathmoussiliou5@gmail.com

Résumé :

Contexte et Objectif : Le paludisme reste une des principales causes de morbidité et de mortalité malgré tous les efforts déployés pour lutter contre la maladie. Cette pandémie est la cause de décès en Afrique et principalement chez les enfants. L'immunité se développe après des années d'exposition et nécessite pour être maintenue un contact permanent avec le parasite. Bien qu'elle ne confère jamais une protection totale, cette prémunition réduit le risque d'infection grave. Une nouvelle stratégie préventive a été récemment développée pour renforcer la lutte contre le paludisme chez les enfants : le traitement préventif intermittent actuellement appelé chimioprévention saisonnière du paludisme (CPS). Depuis la mise en œuvre par le Ministère de la Santé au Bénin, très peu de données sont disponibles sur l'évaluation de l'impact de cette intervention sur la réponse immunitaire de la population cible. Cette étude vise à évaluer les effets de la CPS avec la sulfadoxine-pyriméthamine (SP) et l'amodiaquine (AQ) sur l'évolution de l'immunité antipalustre chez le jeune enfant et sa susceptibilité à l'infection palustre.

Méthodes : Il s'agit d'une étude longitudinale sur des enfants âgés de 6 à 59 mois avec / sans traitement (CPS) dans deux villages au nord du Bénin. Des données sociodémographiques et cliniques ainsi que des échantillons de sang répétés seront collectés (avant, pendant et après le traitement). Les échantillons seront analysés à l'aide d'un test immunologique pour étudier les réponses anticorps anti MSP, AMA1 et PfEMP1. L'activité fonctionnelle des anticorps sera

évaluée par le test d'inhibition de l'adhérence. Des tests moléculaires nous permettront d'étudier la prévalence du paludisme et la virulence des parasites infectant les enfants.

Résultats : Aux termes de cette étude nous espérons évaluer l'impact de la CPS sur le développement de l'immunité antipalustre chez le jeune enfant. Identifier les variantes de parasites capables d'infecter les enfants après le traitement. Les informations collectées contribueront à l'amélioration des efforts de surveillance.

Mots Clés : Paludisme, CPS, immunité.

CO50 : Prévalence de la bilharziose urinaire en milieu scolaire dans les communes de tchaourou et de nikki (benin) en 2018

Kpanidja MG, Adédémy JD, Agbeille MF, Ahoumènou A, Noudamadjo A, Agossou J.
Département Mère-Enfant Faculté de Médecine Université de Parakou, Bénin

Auteur de correspondance : Kpanidja Mèdétinmè Gérard m.kpanidja@yahoo.ca

Tel 00229 96967994/94543195 03BP369 Parakou.

Résumé

Introduction : Il n'existe pas de données récentes sur la prévalence de la bilharziose dans le département du Borgou. L'objectif de ce travail était d'étudier la prévalence de la bilharziose dans les communes de Nikki et Tchaourou.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive réalisée en milieu scolaire dans deux communes au nord du Bénin en 2018 sur un échantillon constitué de manière aléatoire et par grappes. La démarche diagnostique a consisté à réaliser une bandelette urinaire à la recherche d'hématurie ou de protéinurie et à rechercher les œufs de bilharzies dans les culots urinaires. Les données saisies ont été analysées à l'aide du logiciel Epi Info 7.2.2.

Résultats : Au terme de cette étude, 612 écoliers ont été inclus dont 216 de la commune de Nikki et 396 de la commune de Tchaourou. La tranche d'âge majoritaire était celle des dix à 15 ans dans une proportion de 80,39%. A la bandelette urinaire nous avons noté une hématurie dans 11,93% et une protéinurie dans 21,57% des cas. La microscopie du culot urinaire a identifié les œufs de bilharzies chez 39 écoliers soit une prévalence de bilharziose urogénitale de 6,4% (39/612) avec 7,8% dans la commune de Tchaourou et 3,7% dans la commune de Nikki.

Conclusion : Plus de six écoliers sur cent avaient la bilharziose urogénitale dans les communes de Tchaourou et Nikki. Pour réduire cette morbidité, des moyens préventifs comme des campagnes de distribution de praziquantel sont nécessaires.

Mots clés : Bilharziose, écoliers, Bénin

CO51 : Suivi des nouveau-nés exposés au VIH dans les maternités PTME de la zone sanitaire Nikki-Kalalé-Pèrèrè au Bénin

Houngla C¹, Ahanhanzo-glele R¹, Paqui N², Bachabi M³, Houehanou C⁴, Hedokingbe L¹.

¹Centre d'Informations de Prospective et d'Ecoute sur les Infections Sexuellement Transmissibles et le VIH/Sida des départements du Borgou et de l'Alibori au Bénin.

²Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, Bureau Cotonou, Bénin.

³Programme Santé de Lutte contre le Sida du Ministère de la Santé Bénin.

⁴Ecole Nationale de Formation des Techniciens Supérieurs en Santé Publique et en Surveillance Epidémiologique, Université de Parakou.

Auteur Correspondant : HOUNGLA C : levichristo@gmail.com

Résumé :

Introduction : le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant sans chimiothérapie périnatale est de 30 à 40%. Le traitement prophylactique aux antirétroviraux (ARV) du nouveau-né de mère séropositive au VIH réduit fortement le risque de transmission. L'étude avait pour objectif d'étudier la qualité de suivi des enfants nés de mères séropositives au VIH dans les sites PTME de la zone sanitaire Nikki-Kalalé-Pèrèrè au Bénin.

Méthodes : l'étude était rétrospective descriptive s'étendant sur deux ans. Le suivi des enfants était basé sur le suivi clinique et biologique. Les données collectées sur un questionnaire en se servant des dossiers patients ont été saisies et analysées avec les logiciels Epi-Data et Epi-Info.

Résultats : au total, 41 femmes enceintes séropositives au VIH et 41 nourrissons ont été inclus. L'allaitement maternel exclusif a été pratiqué chez 98,29% des enfants. La prophylaxie ARV a été reçue par 92,9% des mères et 96,8% des nourrissons. Parmi les enfants, 14,6% (6/41) ont été suivis jusqu'à 18 mois, 2,4% étaient infectés au VIH, Au cours du suivi, 65,85% des femmes n'ont pas partagé l'information de leur statut avec leurs conjoints ; 95,1% d'entre elles avaient le VIH1.

Discussion : L'âge moyen des mères était de 26,90 ans $\pm$ 5,46 avec les extrêmes 18 et 43 ans patientes. Ce résultat est différent à celui de Mali l'âge moyen des patientes a été de 30ans [6]. Thomas T.K au Kenya en 2011, lui a retrouvé une tranche d'âge plus basse avec une médiane de 23 ans .Ces chiffres traduisent le fait que ce sont les femmes jeunes en pleine activité sexuelle qui sont les plus touchées par l'infection au VIH.

Conclusion : les suivis clinique et biologique sont réalisables au niveau des sites PTME et contribuent à une réduction de la transmission du VIH de la mère à l'enfant.

Mots-clés : Suivi ; Enfants ; Exposés ; VIH.

CO52 : Connaissances, attitudes et pratiques relative aux VIH chez les conducteurs de taxi-moto à Parakou en 2021.

Akodjetin YMA¹, Béhanzin L¹, Adégbola P¹, Koudjo TE².

¹Ecole Nationale de Formation des Techniciens Supérieurs en Santé Publique et en Surveillance Epidémiologique, Université de Parakou, Bénin ; BP 123 Parakou, Benin

²Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites, les IST et les épidémies – Cellule du Département du Borgou ;

Auteur correspondant : AKODJETIN Anicette, École Nationale de Formation des Techniciens Supérieurs en Santé Publique et en Surveillance Épidémiologique, Université de Parakou, Bénin, BP 123 Parakou, Bénin, Tel + (229) 62 90 00 94/ 64507037 anicetteakodjetin@gmail.com

Résumé

Introduction : L'infection à VIH est une pandémie en propagation dans le monde. Elle demeure une préoccupation majeure de santé publique et de développement dans les pays de l'Afrique subsaharienne en particulier au Bénin. Le niveau de connaissance conditionne le comportement et les attitudes des populations vis-à-vis de cette maladie.

Objectifs : Décrire le niveau de connaissances du VIH par les conducteurs de taxi-moto (CTM) à Parakou en 2021.

Méthodes : Une étude transversale incluant 374 CTM exerçant à Parakou en 2021 a été réalisée. Un sujet était dit avoir une bonne connaissance du VIH lorsqu'il connaissait les voies de transmissions, au moins une mesure de prévention et reconnaît que la maladie est incurable. Il est dit avoir une bonne connaissance des pratiques lorsqu'il déclare et suggère une mesure de prévention devenant une opportunité qui expose au VIH. Les L'application KoboCollect a été utilisée pour collecter les données par questionnaire électronique. Ces données ont été analysées à l'aide du logiciel EPI-Info version 7.2.3.1.

Résultats : L'âge moyen était 31,51±7,76 ans avec des extrêmes de 18 ans et 61 ans. Tous les sujets avaient déjà entendu parler de IST/VIH selon leurs déclarations. La majorité des sujets (93,05%) avait une mauvaise connaissance du VIH y compris sa prévention. La connaissance des pratiques à risque était mauvaise et celle des attitudes était moyennement bonne. Les sources d'informations évoquées étaient principalement les médias (77,07%), les parents proches, les amis (63,38%) ou les Organisation non gouvernementales (37,26%). La voie sexuelle était le mode de transmission le plus connu (92,99%) mais 81,83% affirmait que l'infection à VIH peut être traitées.

Conclusion : Le niveau de connaissance des CTM de Parakou devrait être renforcé. La majorité avait confirmé que le VIH est curatif. Il est alors important d'orienter les interventions ciblées de lutte vers cette population pour plus d'efficacité dans le contrôle de l'épidémie de l'infection à VIH par l'information et la sensibilisation.

CO53 : Facteurs associés à la survie à trois ans chez les personnes infectées au VIH, mises sous traitement antirétroviral au CNRRPEC/CNHU-HKM de Cotonou

Aguemon Badirou¹, Semassa Gérard¹, Padonou Géraud¹, Damien Georgia¹.

¹ Département de Santé Publique, FSS-UAC

E-mail : baguemon@yahoo.fr

Résumé

Contexte et objectif : étudier la probabilité de survie à 3 ans chez les personnes infectées par le VIH mis sous traitement antirétroviral au Centre National de Référence pour la Recherche et la Prise En Charge de l'infection à VIH (CNRRPEC)/CNHU-HKM de Cotonou.

Méthodes : Il s'est agi d'une cohorte rétrospective et analytique qui a inclus 354 PVVIH nouvellement infectées et mis sous traitement qui a couvert une période de 3 ans, du 1^{er} août 2017 au 1^{er} août 2021. Les survivants ont été suivis jusqu'au 1^{er} août 2021. Les patients en vie au 1^{er} août 2021 ont été censurés. Les perdus de vue ont été considérés comme vivants (censuré), ou décédés (hypothèse de biais maximum). Le logiciel R 4.1.1 a été utilisé pour l'analyse des données. Deux modèles de Cox à risque proportionnel ont été établis pour identifier les facteurs prédictifs de la mortalité à 3 ans.

Résultats : L'âge moyen des patients était de 39,8±10,5 ans ; 67,2% étaient des femmes et 66,8%. Le taux de mortalité était de 845 décès pour 100 000 personnes-années et de 2 029 décès pour 100 000 personnes-années selon l'hypothèse de biais maximum. A 3 ans, la probabilité de survie était de 96,0% [IC 95% : 92,9% - 99,1%], et de 92,1% (hypothèse de biais maximum). Les facteurs prédictifs de la mortalité à 3 ans étaient : le partage de statut (p=0,006) ; la survenue d'évènement morbide (p=0,001).

Discussion et Conclusion : La mortalité des PVVIH mis sous traitement antirétroviral depuis 3 ans est faible. Il est important de renforcer le counselling pour amener les PVVIH au partage de l'information sur le statut sérologique, et d'œuvrer pour le dépistage et le traitement efficace de toutes infections opportunistes.

Mots clés : PVVIH, survie à 3 ans, facteurs prédictifs, Bénin

CO54 : Épidémiologie de la COVID-19 sur grossesse dans les centres de traitement des épidémies et dans les formations sanitaires de Cotonou en 2021

Dangbemey Djima Patrice^{1,2}, Atade Raoul⁴, Aboubakar Moufalilou^{1,3} Ogoudjobi Mathieu^{1,2} Azonbakin Simon^{1,5}, Kitimaco Kesseck^{1,2}, Tshabu-Aguemon Christiane^{1,3}, Hounkpatin Benjamin^{1,2}, Denakpo Justin Lewis^{1,3}.

1 Faculté des Sciences de la Santé, Université Abomey-Calavi (R. Bénin)

2 Service de Gynécologie Obstétrique - CHU MEL de Cotonou

3 Clinique Universitaire de Gynécologie Obstétrique - CNHU HKM de Cotonou

4 Faculté de Médecine de l'Université de Parakou

5 Laboratoire d'Histologie-Biologie de la Reproduction Cytogénétique et Génétique Médicale / Unité de Biologie Humaine de la FSS,

***Dr DANGBEMEY Djima Patrice**, Tél +229 66 25 75 24/ 65475858

Email : ddpatous78@yahoo.fr

Résumé

Contexte/justification : Connaissances sur la COVID-19 et grossesse sont embryonnaires et limitées. L'épidémiologie permet de mesurer l'ampleur et de connaître les facteurs de risque

Objectif : Apprécier les caractéristiques épidémiologiques de la COVID-19 sur grossesse dans les centres de traitement des épidémies et formations sanitaires de Cotonou en 2021

Méthodes : Il s'agissait d'une étude multisite, rétrospective et analytique qui s'était déroulée dans les Centres de Traitement des Épidémies (CTE) et les formations sanitaires universitaires de Cotonou. Les patientes en période gravidopuerpérale cas suspect ou chez qui le test covid-19 était positif ou présentant une image scanographique caractéristique de la COVID-19 ont été incluses. Les caractéristiques épidémiologiques étaient analysées grâce au logiciel statistique "R" version 4.2. Le test de Chi² de Pearson a permis d'étudier les associations. Le seuil de significativité était $p \leq 0,05$.

Résultats : La fréquence de la COVID-19 sur grossesse était de 16 pour mille. L'infection au SARS-COV2 était plus fréquente au 3^{ème} trimestre (57,4%) de grossesse. La PCR était le test le plus réalisé dans 50% (n=54). L'âge moyen des patientes était de $29,1 \pm 6$ ans. La comorbidité était enregistrée chez 23,1% des patientes avec une prédominance de l'hypertension artérielle (8,3%). Les conditions favorables à la transmission étaient : l'absence de la vaccination (98%), la promiscuité (34,3%) et le voyage en zone de forte épidémie (7,4%). Dans notre série 36% étaient des cas graves. La gravité était associée à l'IMC ($p = 0,009$) et à la parité ($p = 0,029$)

Conclusion : La fréquence de la COVID-19 confirmée sur grossesse était de 16 pour mille. Les facteurs de gravité sur grossesse étaient l'obésité et la multiparité.

Mots clés : Covid-19, grossesse, épidémiologie, gravité, Bénin

CO55 : COVID-19 sur grossesse au Bénin en 2021: diagnostic, traitement et pronostic

Dangbemey Djima Patrice^{1,2}, Padonou Sètonджи Géraud¹, Atade Raoul⁴, Ogoudjobi Mathieu^{1,2}, Atade Raoul⁴, Aboubakar Moufalilou^{1,3}, Azonbakin Simon^{1,5}, Kitimaco Kesseck^{1,2}, Tshabu-Aguemon Christiane^{1,3}, Hounkpatin Benjamin^{1,2}, Denakpo Justin Lewis^{1,3}.

1 Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi (R. Bénin)

2 Service de Gynécologie Obstétrique - CHU MEL de Cotonou

3 Clinique Universitaire de Gynécologie Obstétrique du CNHU HKM de Cotonou

4 Faculté de Médecine de l'Université de Parakou

***Dr DANGBEMEY Djima Patrice**, Tél +229 66 25 75 24/ 65475858

Email : ddpatous78@yahoo.fr

Résumé

Contexte/justification : Le faible taux de morbidité maternofoetale au Bénin mérite une analyse des démarches diagnostiques et thérapeutiques utilisées.

Objectif : Décrire les démarches diagnostiques et thérapeutiques et le pronostic maternofoetal de la covid-19 sur grossesse au Bénin en 2021

Méthodes : Il s'agissait d'une étude multisite, rétrospective descriptive et analytique qui s'était déroulée dans les Centres de Traitement des Épidémies (CTE) et les formations sanitaires universitaires de Cotonou. Les cas étaient des gestantes ou accouchées suspectes ou confirmées COVID-19. Les données relatives au diagnostic, au traitement et au pronostic maternel et foetal de la COVID-19 sur grossesse étaient analysées grâce au logiciel statistique "R" version 4.2. Le test de Chi² de Pearson a permis d'étudier les associations. Le seuil de significativité était $p \leq 0,05$.

Résultats : Le CHU-MEL et le CNHU disposaient d'une unité de tri, d'isolement et de traitement (cas simples) des cas COVID-19. Au total 108 cas étaient inclus dont 105 cas suspects (97,2 %). L'âge moyen des patientes était de $29,1 \pm 6$ ans. Les motifs d'admission les plus fréquents étaient : la fièvre (51,4%), l'asthénie (83,8%), la rhinorrhée (45,7%), la toux (71,5%), les contractions utérines (19,1%), la métrorragie (10,1%), la rupture prématurée des membranes (4,5%). La comorbidité représentait 23,1% des cas. Le diagnostic était posé par les tests RT-PCR (50%), antigéniques (45,4%) et TDR (7,4%). Les cas confirmés représentaient 52,8% (n=57) des cas dont 65% (n=37) de cas simples contre 35% (n=20) de cas graves.

Les cas simples et non confirmés étaient traités par l'hydroxychloroquine et azithromycine, et les cas graves par l'association ribavirine, lopinavir et ritonavir accompagnée Tous les tests

s'étaient négativés au 16^{ème} jour. La guérison était notée dans 93% (n=104) des cas. Quatre (7%) décès maternels et 12(21%) morts in utéro ont été enregistrées

Conclusion : Le respect des procédures opérationnelles standards validées a amélioré le pronostic maternel et fœtal de la COVID-19 sur grossesse.

Mots clés : Covid-19, grossesse, diagnostic, traitement, pronostic, Bénin

CO56 : Artésunate, artémether et létalité du paludisme grave chez l'enfant au CHR Tsévié au Togo : un essai clinique randomisé

Afanvi Kossivi Agbélénko^{1,2*}, Amedo Komla Edem^{2,3}, Djadou Koffi Edem^{3,4}, Gbadoe Ekoué Serge², Balaka Abago⁵, Fianyo Eyram⁵, Saka Bayaki⁵, Kassankogno Yao¹, Ekouevi Didier Koumavi¹, Atakouma Yawo Dzayissè³, Ouendo Edgard-Marius⁶.

- 1 Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université de Lomé, Togo.
- 2 Direction Préfectorale de la Santé de Zio, Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins, Togo.
- 3 Département de Pédiatrie, Faculté des Sciences de la Santé, Université de Lomé, Togo.
- 4 Centre Hospitalier Régional de Tsévié, Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins, Togo.
- 5 Département de Médecine et Spécialités Médicales, Faculté des Sciences de la Santé, Université de Lomé, Togo.
- 6 Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRSP-CAQ), Université d'Abomey-Calavi, Bénin

* Présentateur, adresses : E-mail : afankos@yahoo.fr 04BP : 446 Lomé – Togo

Tél Portable : (00228) 90 08 84 19 WhatsApp : (00228) 90 54 85 85

Résumé

Contexte et objectif : En dépit des immenses progrès de la médecine moderne, le paludisme demeure un problème sanitaire majeur à l'échelle mondiale surtout en Afrique Sub-saharienne. L'artémether (AM) et l'artésunate (AS) n'ont pas été directement comparés dans des essais randomisés chez des enfants africains. Ce travail vise à répondre à la question : « Est-ce que l'artésunate réduit le taux de létalité plus que l'artémether dans le traitement du paludisme grave chez les enfants ? ».

Matériel et méthodes : Il s'agit d'un essai clinique randomisé simple aveugle qui s'était déroulé sur les enfants admis en hospitalisation dans le service de pédiatrie au CHR Tsévié pour paludisme grave de juillet 2017 à septembre 2019. Le protocole de l'étude a été approuvé par le comité de bioéthique pour la recherche en santé.

Résultats : Au total, 564 enfants atteints de paludisme grave âgés de 2 à 180 mois ont été inclus dans cette étude dont 261 traités par de l'AS et 303 traités par l'AM. L'âge moyen était de 45,09±31,04 mois. Au troisième jour de la prise en charge, la clairance parasitaire était de

90,16%, (IC95% [86,51 ; 93,80]) dans le groupe d'AS contre 79,23%, (IC95% [74,52 ; 83,93]) dans le groupe d'AM. Le taux global de létalité était de 4,6%, (IC95% [2,87 ; 6,32]). Dans le groupe d'AS, ce taux était de 2,68%, (IC95% [0,87 ; 4,48]) contre 6,27%, (IC95% [3,54 ; 8,99]) dans le groupe d'AM ($p = 0,043$).

Discussions et Conclusion : Nous avons mené un essai clinique randomisé simple aveugle pour répondre à la question : « Est-ce que l'artésunate réduit le taux de létalité plus que l'artémether dans le traitement du paludisme grave chez les enfants ? ». Les données ont montré que l'artésunate a permis d'avoir un résultat supérieur à l'artémether sur tous les plans.

Mots clés : Paludisme grave, Artémether et Artésunate, Enfants, CHR Tsévié (Togo).

COD57 : Essai FALCON sur les mesures de prévention des infections du site opératoire dans les pays à revenus faibles et intermédiaires

Lawani Ismaïl^{1,2}, Bokossa Covalic¹, Tobome Sèmèvo Romaric¹, Lawani Souliath¹, Kpangon Cyrille¹, Agbadebo Mouhamed¹, Behanzin Ulrich¹, Assouto Pamphile¹, Dossou Francis¹, Olory-Togbe Jean-Léon¹, Nihir Global Research Health Unit on Global Surgery².

¹ Hub Béninois du NIHR Global Health Research Unit on Global Surgery, Faculté des Sciences de La Santé de Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

² NIHR Global Health Research Unit on Global Surgery, Heritage Building, University of Birmingham, Mindelsohn Way, Birmingham, UK

Présentateur : Ismaïl LAWANI, E-mail : ismaillawani@gmail.com

Résumé

Contexte et objectif : Les directives de l'OMS pour prévenir les ISO recommandent la préparation de la peau à la chlorhexidine alcoolique et la fermeture des fascias à l'aide de sutures enduites de triclosan. Cette étude visait à tester ces deux interventions dans des pays à faibles et moyens revenus.

Méthodes : essai contrôlé randomisé factoriel 2 × 2, stratifié selon que la chirurgie était propre-contaminée, ou contaminée ou sale, incluant les patients subissant une chirurgie abdominale avec une incision cutanée de 5 cm ou plus. Les patients ont été randomisés par ordinateur 1:1:1:1 entre (1) chlorhexidine alcoolique à 2% et suture non enduite, (2) chlorhexidine alcoolique à 2% et suture enduite de triclosan, (3) povidone iodée aqueuse à 10% et suture non enduite, ou (4) povidone iodée aqueuse à 10% et suture enduite de triclosan. Le critère de jugement principal était l'ISO. L'analyse a été effectuée en intention de traiter.

Résultats : Entre le 10 déc 2018 et le 7 sept 2020, 5788 patients (3091 dans la strate propre-contaminée, 2697 dans la strate contaminée ou sale) ont été randomisés. Le taux global d'ISO était de 22-0%. Il n'y avait aucune différence du risque d'ISO entre la chlorhexidine alcoolique et la povidone, ou avec des sutures enduites de triclosan vs sutures non enduites.

Discussion et Conclusion : Cet essai n'a pas montré de bénéfice de la préparation cutanée à la chlorhexidine alcoolique à 2% par rapport à la povidone iodée, ou des fils de sutures recouvertes de triclosan par rapport aux fils de sutures non recouvertes, dans la prévention des ISO pour les plaies opératoires propres-contaminées ou contaminées ou sales. La povidone iodée et les fils de sutures non recouvertes, peuvent donc être utilisés sans risque additionnel d'ISO.

Mots-clés : infection du site opératoire, chlorhexidine alcoolique à 2%, povidone iodée, sutures recouvertes de triclosan.

COD58 : Facteurs associés à la qualité microbiologique des mains, téléphones des soignants des Chirurgies, CNHU-HKM, Bénin

Degbey Cyriaque Comlan^{1,3}, Sossa Jérôme Charles¹, Assocle Sègbégnon Romuald², Attolou Sètondji G.R.^{2,3}, Soclo Dansi Evelyne³, Gbessi Dansou Gaspard^{2,3}.

1. Institut Régional de Santé Publique de l'Université d'Abomey –Calavi –BENIN

2. Faculté des Sciences de la Santé de l'Université d'Abomey –Calavi –BENIN

3. Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou, Bénin

Résumé

Contexte et Objectifs : Les mains constituent le principal mode de transmission des germes dans les Infections Associées aux Soins et les téléphones portables du personnel soignant l'un des outils associés à cette transmission. L'objectif était d'étudier les facteurs associés à la qualité microbiologique des mains et des téléphones portables du personnel soignant des services de chirurgie du Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou.

Méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale à visée analytique impliquant le personnel soignant des services de chirurgie. La variable dépendante était la qualité microbiologique des mains et téléphones portables des soignants. Les caractéristiques sociodémographiques, celles liées à la connaissance et aux pratiques des soignants ainsi que celles des structures de soins ont été renseignées. Le seuil de significativité était fixé à 5%.

Résultats : Les mains et les téléphones portables étaient contaminés respectivement chez 68% et 76% des soignants. La qualité microbiologique des mains était associée à l'âge ($p = 0,026$), au sexe ($p = 0,035$), à la masse de travail hebdomadaire ($p = 0,035$), à la sensibilisation en hygiène hospitalière ($p = 0,035$), au respect des indications pour l'hygiène des mains ($p = 0,034$) et au port de la surblouse ($p = 0,001$) ainsi que la disponibilité de dispositifs de lavage des mains ($p = 0,026$). La qualité microbiologique des téléphones était significativement associée à la sensibilisation en hygiène hospitalière ($p = 0,019$) et au respect des indications pour l'hygiène des mains ($p = 0,034$) et au port de la surblouse ($p = 0,001$).

Discussions et Conclusions : Il est nécessaire de mettre en place une approche de prévention du risque infectieux qui en plus de promouvoir l'hygiène des mains, va se concentrer également sur la désinfection des téléphones portables.

Mots Clés : Mains, Téléphones Portables, Contamination, Facteurs associés, Bénin

COD59 : Connaissances de la covid-19 chez les peuples autochtones de la Sangha en République du Congo

Mavoungou Y.V.Y.¹, Niama A.C¹., Essami Issongo M.¹

¹Faculté des Sciences de la Santé, Université Marien Ngouabi, République du Congo

Présentatrice : Mavoungou Yvonne Valérie Yolande ; E mail yvoumbo@yahoo.fr

Résumé

Contexte et Objectif : La covid-19 est une maladie émergente qui place les populations autochtones du Congo en situation de plus grande vulnérabilité, du fait de leur mode de vie et de leurs conditions socioéconomiques traditionnelles. L'objectif de ce travail était de déterminer les connaissances des autochtones sur la covid-19.

Méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale descriptive réalisée du 10 Mai au 10 Août 2021 auprès des peuples autochtones vivant dans les localités de Mokeko et Mbindjo, Nzalangoye dans le département de la Sangha au Congo.

Résultats : Au total 427 personnes ont été enquêtés dont Mbindjo (26,2%), Mokeko (36,5%) Nzalangoye (37,2%). L'âge moyen était de 35,1±13,92 ans et des extrêmes de 15 et 80 ans. La tranche d'âge la plus représentée est celle de 18 à 39 ans. Les hommes étaient plus représentés (53,9%); et la plupart des enquêtés n'avaient aucun niveau d'instruction (65,6 %) et était sans emploi (39,8%). La radio (75,9%) était la principale source d'information sur la covid-19. Cette maladie est connue par 71,9% de la population d'étude. Elle serait transmise soit par contact (36,1%), soit par sorcellerie (28,6%). La plupart des enquêtés (37,5%) avait un niveau de connaissance de la maladie jugé insuffisant. Les connaissances sur la covid 19 sont meilleures chez les enquêtés qui résident dans l'aire de santé de Mbindjo [OR=4,1 (2,3-7,0) $p = 0,000$] et à Mokeko [OR=2,2 (1,3-3,8) $p = 0,0033$]; de même chez ceux qui ont une activité professionnelle [OR=2,9 (1,9-4,7) $p = 0,000$].

Discussion et Conclusion : La covid-19 est une maladie connue chez les autochtones dans les localités de l'étude, le niveau de connaissance est influencé par le lieu de résidence et le fait

d'avoir une activité professionnelle. Il importe de renforcer la sensibilisation par les relais communautaires et dans les centres de santé.

Mots clés : covid-19, connaissances, autochtones, Sangha.

COD60 : Manifestations adverses post immunisation anti covid-19 à Brazzaville

Mavoungou Y.V. Y.¹, Niama A.C.¹, Bono A.F.¹ Osso Ngué P.M.^{1,2}

¹ Faculté des Sciences de la Santé, Université Marien Ngouabi, République du Congo

² Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville, République du Congo

Auteure présentatrice : Mavoungou Yvonne Valérie Yolande ; E mail : yvoumbo@yahoo.fr

Résumé

Contexte et objectif : L'efficacité d'un vaccin pour prévenir des formes graves de la Covid-19 ne cesse d'être prouvée. C'est ainsi qu'en mars 2021 le Congo a commencé la vaccination des adultes. L'objectif de ce travail était de déterminer les manifestations adverses post-immunisation anti-covid-19 (MAPI) à Brazzaville en République du Congo.

Méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale descriptive menée dans tous les centres de vaccination de Brazzaville du 25 mars au 15 octobre 2021. Les individus majeurs et vaccinés contre la covid-19 ayant déclaré une manifestation post vaccinale et donné leur consentement ont été interrogés.

Résultats : Parmi les 178 468 personnes vaccinées, 1010 cas de MAPI ont été enregistrés (0,6%). L'âge moyen était de 46±12,6 ans. Le sexe ratio de 1,72. La proportion d'individus ayant déclaré des effets le jour de la vaccination est de 40,69% ; elle décroît et atteint 0,6% 30 jours après la vaccination. Les manifestations les plus fréquentes et répertoriées étaient: les douleurs articulaires et musculaires (63,07%), les céphalées (59,70%) et la fièvre (55,84%). La rémission était spontanée chez 67,89% des personnes. Environ 25,44% avaient pris un antalgique et 6,67% avaient consulté un professionnel de santé pour une prise en charge.

Discussion et Conclusion : L'âge moyen traduit le fait que ce sont les personnes âgées qui sont plus encouragées à se faire vacciner. La prédominance masculine dans l'échantillon est contraire aux résultats d'autres auteurs qui montrent respectivement que les femmes sont plus vaccinées en Europe. Les MAPI les plus enregistrés corroborent avec les résultats de Russie et Chine. L'hétérogénéité des vaccins entre les pays, rend difficile la comparaison de nos

observations avec celles d'autres auteurs. Cela soutient l'hypothèse de la sécurité et de l'innocuité des vaccins dont des études complémentaires de pharmaco-épidémiologie permettront de veiller aux risques vaccinaux.

Mots clés : MAPI, Immunisation, Covid-19, Brazzaville.

COD61 : Riposte contre la covid-19 : Défis du personnel de santé à Pointe – Noire

Mavoungou Y.V. Y.¹, Moukolo Abel², Lomoamou Adolphe²

¹ Faculté des Sciences de la Santé, Université Marien Ngouabi, République du Congo

² Direction de la lutte contre la Maladie, République du Congo

Auteure présentatrice : Mavoungou Yvonne Valérie Yolande ; Email : yvoumbo @yahoo.fr

Contexte et Objectif : La mise en œuvre des interventions de riposte contre la pandémie de covid-19 a constitué un réel défi pour les services de santé au Congo. L'objectif de cette étude était d'identifier les défis des ressources humaines dans l'offre de service.

Méthodes : Il s'est agi d'une enquête qualitative réalisée du 1^{er} au 10 septembre 2021 dans six (6) centres de santé intégrés et (4) hôpitaux de référence de Pointe Noire. Des entretiens semi-directifs ont été effectués auprès des animateurs clés consentant des structures enquêtées. Les données ont été collectées à l'aide d'une grille avec 3 thèmes en lien avec l'offre des soins en situation d'épidémie puis retranscrites et analysées à l'aide du logiciel Sonal ver.2.1.41.

Résultats : Au total 10 agents de santé ont été enquêtés (6 médecins et 4 infirmiers). Plusieurs défis et leçons apprises ont été identifiés. i) Au niveau organisationnel, l'inexistence de plan blanc de riposte dans la plupart des formations sanitaires ainsi que les conditions de travail inappropriées nécessitent la réorganisation des services et une collaboration avec d'autres secteurs pour faire face aux besoins spécifiques. ii) Concernant le personnel, des lacunes dans la formation initiale et continue ont été déclarées. L'insatisfaction vis-à-vis du travail avec sentiment d'insécurité et d'incapacité à offrir des soins de qualité. Un besoin d'actualisation régulière et fiable des protocoles thérapeutiques, et d'un accompagnement psychologique des soignants. iii) La faible communication institutionnelle sur la réglementation, l'organisation de la gestion des épidémies ; la forte influence des réseaux sociaux à l'origine d'infodémie est à contrôler.

Discussion et Conclusion : Ces défis sont similaires à ceux observés dans d'autres pays. Face aux épidémies, les structures sanitaires sont peu préparées. Les principaux défis à relever sont organisationnels et opérationnels ; leur prise en compte dans l'organisation de la riposte est nécessaire.

Mots clés : Covid-19, défis, personnel de santé, Pointe Noire.

C. PROMOTION DE LA SANTE ET AUTRES

CO62 : Tatouages et piercings : aspects épidémiologiques et motivations en 2021 à Parakou (Bénin)

¹Agbessi Nadège, ²Akpadjan Fabrice, ¹Houngnonvi Reine, ²Dégboé Bérénice, ²Adégbidi Hugues, ²Atadokpèdé Félix, ¹Koudoukpo Christiane.

¹ Faculté de Médecine de Parakou, Université de Parakou (Bénin).

² Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, Université d'Abomey Calavi (Bénin).

*Auteur correspondant : Nadège AGBESSI, auore_ln@yahoo.fr

Résumé

Introduction : les tatouages et piercings constituent des pratiques qui ne cessent de gagner en popularité de par le monde. L'objectif était d'étudier les aspects épidémiologiques et les motivations de la pratique des tatouages et piercings en population générale à Parakou.

Méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale, descriptive à visée analytique ayant portée sur la population de Parakou (Bénin). Un échantillonnage probabiliste à 3 degrés a été réalisé. Les données ont été analysées avec le logiciel Epi info version 7.2.2. Le seuil de significativité était $p < 5\%$.

Résultats : La prévalence des tatouages était de 9,84% et celle des piercings de 11,15%. On notait une prédominance féminine avec une *sex-ratio* à 0,13 pour les piercings et de 0,5 pour les tatouages. L'âge moyen était de $27,31 \pm 6,99$ ans avec les extrêmes allant de 18 à 58 ans. La principale motivation était la mode (65,00 % pour les tatouages et 64,11% pour les piercings). La principale signification de ces pratiques était un moyen d'individualisation (43,33% pour les tatouages et 30,88% pour les piercings). Plus de la moitié des enquêtés n'étaient pas conscients de la survenue de complications sur les piercings (76,54%) et tatouages (90%).

Discussion : La prévalence des tatouages et piercing est similaire à celle trouver dans les pays européens (France et Allemagne), par contre elle est inférieure à celles aux USA. La prédominance féminine retrouvée à Parakou est confirmée par les données de la littérature. La population jeune s'adonne plus à ces pratiques à Parakou comme ailleurs. Les tatouages et piercing sont des moyens d'individualisation à Parakou comme décrits dans la littérature

Conclusion : La pratique des tatouages et piercings est un réel phénomène de mode à Parakou au Bénin et les complications sont méconnues de la population.

Mots clés : Tatouages-Piercings-Motivations-Bénin

CO63 : Déterminants conjugaux de la qualité des pratiques alimentaires observées des gestantes de six villages de Klouékanmè (Bénin)

Klikpézo R. ^(1,2), Hounkponou N.F.M. ⁽²⁾, Flenon Joseph ⁽³⁾, Sidi R. I. ⁽²⁾, Obossou A. A. A. ⁽²⁾, Atadé S. R. ⁽²⁾, Vodouhè M.V. ⁽²⁾, Ahouingnan Y. A. ⁽²⁾, Salifou B. ⁽²⁾, Laleye Djèmilath⁽³⁾, Ouendo Marius Edgar⁽⁴⁾, Salifou K. ⁽²⁾.

⁽¹⁾ CHU-HIA, Parakou ;

⁽²⁾ Faculté de médecine, Université de Parakou ;

⁽³⁾ Faculté des Sciences de la Santé UAC, Cotonou ; ⁽⁴⁾ Institut Régional de Santé Publique, Ouidah

Auteur correspondant : Klikpezo Roger, Mail : kliroger@yahoo.fr

Introduction : L'alimentation et l'état nutritionnel des gestantes constituent des préoccupations importantes dans les pays en développement. Au Bénin, il existe des études sur l'état nutritionnel des gestantes mais peu ont mis en relief les pratiques alimentaires de ces dernières.

Objectifs : Il s'agissait d'étudier les déterminants conjugaux de la qualité des pratiques alimentaires observées chez des gestantes dans six villages de la Commune de Klouékanmè.

Cadre De L'étude : C'est la commune de klouékanmè dans le département de couffo

Méthode de l'étude : De nature transversale, descriptive et analytique, elle a été réalisée sur une population de gestantes parmi les mères d'enfants de 0-5 ans de 412 ménages échantillonnés lors d'une étude initiale. La taille calculée de cet échantillon initial suivant la formule de SCHWARTZ était de 422 ménages et 76 gestantes ont été identifiés et retenus.

Résultats /Discussion : L'âge des gestantes enquêtées varie de 15 ans à 39 ans et 50% ont entre 20-29 ans. La majorité soit (98,68%) des gestantes est mariée. L'évaluation de la qualité des pratiques alimentaires observées des gestantes, révèle que seulement (13,16%) des gestantes ont de bonnes pratiques alimentaires. Les déterminants conjugaux de leurs pratiques alimentaires sont : le village, l'âge des gestantes, l'âge des maris et les connaissances des gestantes de l'alimentation de la femme enceinte. Les résultats de l'étude de MEKONNEN S. et ENDALAMAW T. en Ethiopie en 2014 ont aussi démontré qu'il y a une association entre les connaissances et les pratiques nutritionnelles

Conclusion : Les bonnes pratiques alimentaires sont importantes pour améliorer l'état nutritionnel des gestante. Dans ce cadre, il serait souhaitable de sensibiliser les gestantes à aller,

dès le 1^{er} mois de grossesse, aux CPN organisées en stratégies avancées dans les villages et se faire peser.

Mots clés : Alimentation ; Gestantes ; Klouékanmè; Bénin.

CO64 : Perception de l'impact des mesures de restriction de la COVID-19 en milieu de travail du sexe à Cotonou, Bénin, 2020

Béhanzin Luc^{1,2,3,4}, Kintin Frédéric^{2,3}, Atchekp Septime^{2,3}, Azan-Gnandji Marlène^{2,3}, Goma-Matsétsé Ella^{2,3,4}, Guédou Fernand A.^{2,3,4}, Zannou D. Marcel^{3,5,6}, Alary Michel^{4,7,8}.

Affiliations :

¹ École Nationale de Formation des Techniciens Supérieurs en Santé Publique et en Surveillance Épidémiologique, Université de Parakou, Bénin

² Dispensaire IST, Cotonou, Bénin

³ Organisation pour la promotion de la santé et le développement communautaire

⁴ Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval, 1050 chemin Sainte-Foy, G1S 4L8, Québec, QC, Canada

⁵ Faculté des sciences de la santé, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin

⁶ Centre national hospitalier universitaire HMK de Cotonou, Bénin

⁷ Département de médecine sociale et préventive, Université Laval, 1050 avenue de la Médecine, G1V 0A6, Québec, QC, Canada

⁸ Institut national de santé publique du Québec, 945 avenue Wolfe, G1V 5B3, Québec, QC, Canada

Auteur correspondant : Dr Béhanzin Luc, École Nationale de Formation des Techniciens Supérieurs en Santé Publique et en Surveillance Épidémiologique, Université de Parakou, Bénin, BP 123 Parakou, Bénin. Tel + (229) 66 20 32 08/ 95 96 59 15. Email: bphilus2013@gmail.com

Contexte et objectif : Depuis le début de la pandémie à COVID-19 au Bénin en mars 2020, les autorités sanitaires ont implanté des mesures de restriction visant à freiner la propagation de l'épidémie. Tous les secteurs socio-économiques dont celui des échanges économique-sexuels étaient concernés. Les travailleuses du sexe (TS) constituent l'une des populations clés de l'infection à VIH. L'objectif de cette étude était de décrire chez les TS exerçant à Cotonou, le niveau de perception de l'impact des mesures de restriction de prévention de la COVID-19 sur leurs activités au début de cette crise sanitaire en 2020.

Méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale descriptive ciblant la population des TS à Cotonou. L'échantillonnage était par la technique systématique aléatoire de grappes. La collecte des données a été digitalisée avec la plateforme KoBoToolBox et l'application KoboCollect.

La description a été faite par le pourcentage ou les paramètres de tendance centrale et de dispersion, selon le cas.

Résultats : Au total, 407 TS ont participé à l'enquête. L'âge médian était de 30 ans [intervalle interquartile : 25-38]. Les TS enquêtées ont rapporté : rareté des clients (66.1%), méfiance des clients vis-à-vis d'elles par crainte de contracter la COVID-19 (66,1%), baisse du prix de la passe (35,6%), diminution de leur pouvoir d'achat (68,1%), éviction préventive de la position face-à-face lors des rapport sexuels (7,4%), diminution de la fréquentation des centres de santé pour le suivi mensuel des TS (11,7%), intégration de la sensibilisation contre la COVID-19 aux activités de prévention du VIH menées au profit des TS (82,4%).

Discussion et conclusion : La persistante de la crise sanitaire pourrait engendrer une hausse de la vulnérabilité des TS et une augmentation de leur précarité sociale. Au-delà de l'épidémie du VIH, les travailleuses du sexe constituent également une population clé de la COVID-19.

Mots clés : Impact, SRAS-CoV-2, COVID-19, travailleuse du sexe, Bénin

CO65 : Causes profondes de l'accès à la vaccination contre la Covid-19 dans le Zio : Désinformation et mains invisibles à l'ère des réseaux sociaux

Afanvi Kossivi Agbélénko^{1,2*}, Adranyi Koami Mesah², Batchassido Essohana Karabou², Kassankogno Yao¹, Ekouevi Didier Koumavi¹, Ouendo Edgard-Marius³.

- 1 Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université de Lomé, Togo.
- 2 Direction Préfectorale de la Santé de Zio, Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins, Togo.
- 3 Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRSP-CAQ), Université d'Abomey-Calavi, Bénin

* Présentateur, adresses : E-mail : afankos@yahoo.fr 04BP : 446 Lomé – Togo

Tél Portable : (00228) 90 08 84 19 WhatsApp : (00228) 90 54 85 85

Résumé

Contexte et objectif : Le district sanitaire de Zio est l'un des deux premiers à être touchés par la COVID-19 au Togo. Depuis le démarrage de la vaccination contre cette pandémie, l'engouement de la population est timide. Cette étude vise à répondre à la question : « Quelles sont les causes profondes de l'accès à la vaccination contre la COVID-19 dans le Zio ? ».

Méthodes : Il s'agit d'une étude transversale descriptive à visée analytique, conduite dans toutes les 36 aires sanitaires du district de Zio du 09 octobre au 24 novembre 2021. Nous avons utilisé les outils de la science de l'amélioration pour analyser les données. La participation des enquêtés était volontaire. L'anonymat était respecté dans la collecte des données et le consentement éclairé a été obtenu.

Résultats : Au total, 307 personnes ont été enquêtées. La recherche d'une protection contre la COVID-19 a motivé la décision de se faire vacciner dans 64 % des cas, les mesures contraignantes annoncées par le gouvernement dans 43 % et les exigences des services habituellement fréquentés dans 34 %. Les messages qui circulent sur les réseaux sociaux ont constitué les raisons de la faible mobilisation pour la vaccination contre la COVID-19 dans 84 % et le phénomène de gifles venant de mains invisibles lors de l'enterrement sécurisé d'une victime de la COVID-19 dans 40 %. Toutes les personnes qui ont eu un proche parent, ami ou collègue infecté par la COVID-19 ont cherché une protection, contre 81,4 % chez les personnes n'ayant pas eu de proche parents infectés ($p = 0,004$). Les sous-piliers « Prestation des services de santé » et « Information sanitaire » ont totalisé 68% des dysfonctionnements causant la faible

mobilisation pour la vaccination contre la covid-19 dans le district de Zio. **Discussions et Conclusion** : Cette étude nous a permis de retenir comme enseignements pour améliorer la couverture de la vaccination contre la COVID-19, la communication active et intentionnée sur les réseaux sociaux et le professionnalisme dans la gestion des cas et événements liés à la COVID-19.

Mots clés : Vaccination contre la Covid-19, Causes profondes de l'accès, Désinformation et réseaux sociaux, District sanitaire de Zio (Togo).

CO66 : Lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique lassa dans la commune de Tchaourou au Bénin : rôle de l'action sur les déterminants sociaux de la santé et de l'autonomisation communautaire en 2018

Bokossa K. CM¹², Behanzin L¹, Houeto D¹, Adoukonou TA¹².

¹*École Nationale de Formation des Techniciens Supérieurs en Santé Publique et en Surveillance Épidémiologique (ENATSE), Université de Parakou, Bénin.*

²*Unité de recherche du Département de Neurologie de l'Université de Parakou*

Auteur Correspondant : BOKOSSA K. CM : covalicbokossa@gmail.com

Résumé

Introduction : La fièvre de Lassa est une fièvre hémorragique foudroyante. Le but de l'étude était de démontrer qu'en agissant sur les déterminants sociaux de la santé nous pouvons lutter efficacement contre l'épidémie de la Fièvre Hémorragique Lassa (FHL) dans la commune de Tchaourou au Bénin.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive visant trois cibles à savoir : les cas de FHL, Les agents de santé et la communauté de Tchaourou ; nous avons effectué un recrutement exhaustif à la fois pour les dossiers de cas de FHL et le personnel de santé. En communauté, au niveau de chaque village/ quartier, nous avons fait la technique du parcours aléatoire pour sélectionner les sujets à enquêter.

Résultats : La commune de Tchaourou a enregistré 12 cas confirmés FHL dont 5 décès (létalité de 41,6%). Sur les 172 sujets de la communauté de Tchaourou, 120 (69,8%) avaient une mauvaise connaissance de la FHL. Sur les 33 personnels de santé, 12 (36,4%) avaient une bonne connaissance de la FHL, 15 (45,5%) avaient une connaissance moyenne et 6 (18,1%) avaient une connaissance insuffisante sur la FHL. En matière de pratique face à la FHL, sur les 33 personnels de santé, 24 (72,7%) avaient une pratique inadéquate. Les déterminants majeurs de la survenue de la FHL étaient : la consommation de souris, la pratique de chasse en période épidémique, la pratique de feu de brousse, le manque d'instruction, l'inaccessibilité du centre de santé, l'inexistence de centre de santé à la frontière Bénin/Nigéria.

Conclusion : L'action sur les déterminants sociaux de la santé avec l'appui des autres secteurs donne le pouvoir à la communauté pour la rendre autonome. Ainsi les actions et interventions pourront durer dans le temps et être pérennes.

Mots clés : fièvre lassa, déterminants sociaux de la santé, Tchaourou

CO67 : Stratégies d'intervention pour l'amélioration du pronostic des AVC en Afrique subsaharienne : revue systématique de littérature et méta-analyse

Bokossa K. CM¹², Agbetou M¹², Kossi O¹², Adoukonou TA¹², Houinato D³⁴.

¹*École Nationale de Formation des Techniciens Supérieurs en Santé Publique et en Surveillance Épidémiologique, Université de Parakou, Bénin.*

²*Unité de recherche du Département de Neurologie de l'Université de Parakou*

³*Ecole Doctorale des Sciences de la Santé, Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou*

⁴*Laboratoire d'Epidémiologie des Maladies Chroniques et Neurologiques*

Auteur Correspondant : BOKOSSA K. CM : covalicbokossa@gmail.com

Résumé

Contexte et objectif : Le fardeau des AVC est assez lourd pour les pays en développement et plus particulièrement en Afrique subsaharienne. L'objectif général est de faire le point sur les différentes stratégies d'intervention pour l'amélioration du pronostic des AVC en Afrique subsaharienne.

Méthodes : Nous réaliserons une revue systématique de la littérature suivant les recommandations de PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-analyses). Le protocole sera enregistré auprès de l'International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO). Les mots-clés seront établis sur la base de l'acronyme PICO (Participants, Interventions, Comparaison, Outcomes) et la stratégie de recherche de PubMed sera adaptée aux autres bases de données. Tous les articles publiés entre le 1er Janvier 2002 et le 31 Décembre 2021 seront recrutés et leur admissibilité sera évaluée en vue de leur inclusion dans cette revue.

Résultats : Une version modifiée de l'échelle de Newcastle-Ottawa (NOS) sera utilisée pour évaluer la qualité méthodologique des études. L'échelle NOS comprendra trois critères catégoriques avec un score maximal de 9 points. La qualité de chaque étude sera évaluée en utilisant les algorithmes de notation suivants : ≥ 7 points sera considéré comme une étude de « bonne qualité », 4 à 6 points étude de « qualité moyenne » et ≤ 3 points, étude de « qualité faible ».

Conclusion : Il faudra souligner que seule une érection de véritable filière neurovasculaire nationale et une prise en charge correcte de l'hypertension artérielle permettraient d'améliorer significativement le pronostic des AVC.

Mots clés : stratégies d'intervention, pronostic, AVC, Afrique subsaharienne

COD68 : Impact de l'exercice de la fonction soignante sur la vie conjugale des professionnels de santé : Cas de l'hôpital de zone de Savè-Ouèssè en 2020

ATADE Raoul Sèdjro¹, GANDEBAGNI Y.M.O. Carrel², DEGBEVI K. F. John³, FLANDA Rolesse B. M.⁴.

¹ Assistant chef de clinique en Gynécologie-Obstétrique au CHUD/B-A

² Épidémiologiste, Associé gérant du CONSORTIUM EPIDEMIO CABINET

³ Épidémiologiste, Directeur des études du CONSORTIUM EPIDEMIO CABINET

⁴ Épidémiologiste, Directeur de la planification des enquêtes de terrains du CONSORTIUM EPIDEMIO CABINET

Contexte : La profession soignante en raison de ses caractéristiques exigeantes, place les praticiens dans des situations de risque particulier pour parvenir à un équilibre travail, vie de foyer adéquat.

Objectif : Étudier l'impact de l'exercice de la fonction soignante sur la vie de conjugale des professionnels de santé à l'hôpital de zone de Savè-Ouèssè en 2020.

Méthodes : Une étude transversale à visée descriptive a été menée. Les données ont été collectées auprès du personnel soignant et de leur conjoint. Les logiciels EPI data 3.1 et SPSS version 20 ont été utilisés pour l'analyse

Résultat : Au total, 32 praticiens et 27 de leur conjoint ont été inclus. 76,5% des praticiens déclaraient consacrer une durée de temps importante à leur profession. Ce temps avait un impact négatif sur leur vie de famille à travers le mauvais suivi des enfants (70,6%), le manque de communication avec les enfants (23,5%), les disputes à causes des absences répétées (17,6%). Le test de satisfaction conjugale administré au conjoint révèle que 40,7% des couples étaient malheureux, 40,7% des couples étaient heureux et 18,5% des couples étaient très heureux.

Discussion : Les praticiens (76,5%) déclaraient consacrer une durée de temps importante à leur profession ; temps ayant un impact négatif sur leur vie conjugale. Anne BARTHELEMY (1892) déclarait. « *Déphasé par rapport aux rythmes généraux de la vie sociale, ce type d'horaire tend à restreindre le temps pendant lequel le travailleur posté et chacun des membres de sa famille peuvent se trouver simultanément disponibles pour entrer en relation et partager [...] les activités de la vie hors travail*¹² ».

Le test de satisfaction conjugale a fait ressortir 40,7% de couples malheureux, 40,7% heureux et 18,5% très heureux. Cette observation peut s'expliquer par le fait que la profession d'agent de santé apporte une plus-value à la vie de famille malgré le manque de temps engendré.

Conclusion : On note toutefois un ressenti beaucoup plus positif que négatif allant vers un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie de foyer.

Mots-clés : Impact – Fonction Soignante – Vie-conjugale

COD69 : Maternité Désirée : une méthode naturelle capable de réduire les besoins non couverts en planification familiale

Mongbo Virginie^{1*}, Biaou Chabi Alphonse², Makoutodé Patrick¹, Saïzonou Jacques¹, Ouendo Edgard-Marius¹.

1 : Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum de Ouidah

2 : Ministère de la Santé du Bénin

Auteur présentateur : Mongbo Virginie : vmongade@yahoo.com

Biaou Chabi Alphonse : alphonse.biaou@yahoo.fr

Makoutodé Patrick : makoutodepatrick@yahoo.fr

Saïzonou Jacques : saizonoujacques@yahoo.fr

Ouendo Edgard-Marius: euendo@yahoo.fr

Résumé :

Objectifs : Maternité Désirée (MatDes), méthode de planification familiale (PF) naturelle basée sur l'auto-observation des signes de fertilité, aide à identifier les phases fertiles pour limiter les grossesses surprises et espacer les naissances. Le présent travail visait à évaluer le programme MatDes, mis en œuvre dans les départements du Borgou-Alibori par l'ONG PotalMen.

Méthodes : L'évaluation a été réalisée par approche quantitative et qualitative, dans les communes d'intervention Kandi, Banikoara et Nikki, auprès de l'équipe technique du programme, des leaders religieux, autorités politico-administratives, des bénéficiaires et non-bénéficiaires de MatDes. Les données quantitatives collectées par enquête par questionnaire et exploitation documentaire, ont été analysées par le logiciel Stata 14. Les données qualitatives collectées par entretien individuel et de groupe ont fait l'objet d'analyse de contenu.

Résultats : Au total, 122 femmes ont été enquêtées, âgées de 30,90 ans $\pm$ 8,44, majoritairement non instruites (81,97%), cultivatrices (58,20%), pratiquant l'Islam (85,25%) et vivant en couple (95,90%). Parmi ces femmes, 87,10 % connaissaient les méthodes contraceptives modernes, principalement dans les formations sanitaires, mais déclarent qu'elles sont faiblement utilisées, pour des raisons socio-culturelles et leurs effets secondaires. MatDes était connue de 90,98% des enquêtés, par les animatrices de PotalMen. Parmi les 122 enquêtées, 69 (56,56%) utilisaient au moins une méthode contraceptive au moment de l'enquête dont 60 (86,96%), MatDes. Selon les enquêtées, MatDes ne coûte rien aux utilisateurs et ne présente pas d'effet secondaire, d'où sa forte acceptabilité. Son utilisation serait encouragée par leurs conjoints (88,33%) et aurait

entraîné renforcement du dialogue, harmonie sexuelle sans crainte de grossesse non désirée (52,00%) et espacement des naissances (56,00%). Parmi les 60 utilisatrices de MatDes, trois grossesses ont été enregistrées et toutes seraient planifiées.

Conclusion : Avec sa forte acceptabilité, MatDes pourrait combler les attentes des populations en PF. D'autres études sont nécessaires pour en prouver l'efficacité.

Mots-clés : Maternité Désirée, méthode contraceptive, naturelle

COD70 : Les maladies inflammatoires systémiques en Médecine Interne du CNHU-HKM de Cotonou : fréquence, aspects cliniques et immunologiques

Wanvoegbe Finangnon Armand¹, Agbodande Kouessi Anthelme², Azon-Kouanou Angèle², Alassani Adebayo³, Saïzonou Franck⁴, Ahmed Adama², Dovonou Albert³, Zannou Djimon Marcel², HOUNGBE Fabien².

1. Médecine interne de CHUD-OP de Porto-Novo
2. Médecine interne du CNHU-HKM de Cotonou
3. Médecine interne de CHUD-BA de Parakou
4. Centre cardiologique Sainte Face (CCSF) de Cotonou

Auteur correspondant : Finangnon Armand Wanvoegbe wafinarm@yahoo.fr

Résumé

Introduction : Les maladies inflammatoires systémiques (auto-immunes et auto-inflammatoires) sont des maladies rares et de diagnostic difficile. Cette étude a pour objectif de déterminer la fréquence hospitalière, les aspects cliniques et immunologiques de ces maladies dans le service de Médecine Interne du CNHU-HKM de Cotonou.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive qui s'est déroulée du 30 mars au 30 octobre 2018 et ayant porté sur des patients suivis dans le service de Médecine Interne du CNHU-HKM pour maladies inflammatoires systémiques

Résultats : Durant la période d'étude (7 mois), 699 patients avaient consulté dans service. Nous avons recensé 23 patients pour notre étude soit une fréquence de 3,3%. L'âge moyen était de 44 +/- 12 ans avec des extrêmes de 24 à 64 ans. La majorité de nos patients était des femmes avec une sex-ratio (H/F) de 0,09. La fièvre prolongée était le premier motif d'admission (34,8%), suivie de la polyarthralgie (25%). Le lupus systémique était le plus représenté (52,2%), suivi de la sclérodermie (13%), de la connectivité mixte (13%). Quant à la classe de maladies inflammatoires systémiques, ce sont les maladies auto-immunes systémiques qui étaient les plus représentées (87,0%). Les anticorps anti-nucléaires étaient les plus fréquents (56,5%).

Conclusion : Les maladies inflammatoires systémiques sont peu connues au Bénin. Leurs présentations cliniques et immunologiques sont très polymorphes.

Mots clés : Auto-immunes, auto-inflammatoires, anticorps, Cotonou.

COD71 : Apport du numérique et de l'intelligence artificielle dans la conduite de travaux de recherche en santé

Salanon Elfried^{1,2}.

1. *Centre de recherche, d'expertise et de perfectionnement en santé publique*
2. *Data_sanctuary*

Abstract

Les outils numériques se sont développés dans tous les domaines, en particulier dans la santé et dans la recherche médicale. L'objectif de cette présentation sera d'éclairer, à partir de quelques exemples l'apport de l'intelligence artificielle, du numérique et des sciences de données au progrès de la recherche biomédicale. Cette présentation aborde dans un premier temps les progrès générés par le numérique dans la santé et la recherche des outils numériques destinés à la santé. Dans un deuxième temps, sont abordés le cadre juridique et les aspects éthiques. Puis enfin la prédiction

CO72 : Problématique du phénomène des garde-malades au Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l'Ouémé-Plateau en 2017

Dovonou¹ Ac, Alassani¹ Ac, Houssou F², Wanvoegbe A³, Agbodande Ka³, Azon-Kouanou A³.

1 Faculté de Médecine, Université de Parakou

2 Ecole Nationale de Formation des Techniciens Supérieurs en santé Publique et en Surveillance Epidémiologique, Université de Parakou

3 Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi

Auteur correspondant : MCA Dovonou Comlan Albert

Téléphone : 00229 9749213 E-Mail : dovcom1@yahoo.fr

Résumé

Introduction : La présence d'un proche auprès des malades hospitalisés constitue un facteur indispensable au bon rétablissement de ces derniers. L'objectif de ce travail était d'étudier la problématique du phénomène des garde-malades au Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l'Ouémé/Plateau en 2017.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude d'observation de type transversal et descriptif avec recueil prospectif des données du 18 septembre au 17 octobre 2017 chez les garde-malades des malades hospitalisés dans les services d'hospitalisation du CHUD-OP. L'analyse des données a été faite avec le logiciel Epi Info 7. 1.1.14.

Résultats : Les garde-malades étaient des sujets âgés de 16 à 30 ans (45,2 %) ; 69,0 % étaient de sexe féminin, 84,8 % étaient mariés, 49,1 % étaient non scolarisés et 82,4 % étaient des chrétiens. Ils aidaient leur malade dans les fonctions de base dont 62,2 % pour le bain ; 36,9 % pour l'alimentation et les gestes liés aux soins, 54,2% pour les produits pharmaceutiques. Dans 90,6 % il existait des barrières linguistiques entre le personnel soignant et le malade. Ces Garde-malades dans 31,5% se couchaient par terre dans la salle d'hospitalisation du malade ou dans les couloirs et entretenaient une bonne collaboration avec le personnel soignant. Leur présence dans les services hospitaliers du CHUD-OP était source d'encombrement, de malpropreté et d'introduction de produits traditionnels dans le traitement des malades.

Conclusion : La présence des Garde-malades en milieu hospitalier aujourd'hui, est davantage pensée comme une complémentarité dans la prise en charge de la personne vulnérable que comme une entrave à la guérison et il faut que les autorités sanitaires pensent à améliorer leurs conditions de vie au sein des structures soins.

Mots clés : Garde-malades, CHUD-OP, Porto-Novo, Bénin.

CO73 : Financement basé sur les résultats et performance en accouchement des formations sanitaires (FS) au nord Bénin en 2016

Agonnoude T Maurice¹, Houeto S. David¹, Sambieni Nemmanuel², Adoukonou Thierry Ta^{1,3}, Behanzin Luc¹.

- 1- Ecole de formation des techniciens supérieurs en santé publique et surveillance épidémiologique (ENATSE), Université de Parakou BP 123 Parakou ; Tél. : + 229 95961542 Courriel : amaurte@yahoo.fr Auteur présentateur.
- 2- Faculté des lettres, arts et sciences humaines (FLASH), Université de Parakou, BP 123 Parakou.
- 3- Faculté de Médecine, Université de Parakou, BP 123 Parakou.

Résumé :

Contexte : Vers la fin de la mise à l'échelle du FBR entreprise en 2015 sur la base des 2 expériences pilotes débutées au Bénin en 2012, on se demande si les améliorations de la performance des FS espérées seront atteintes.

Objectif : analyser l'impact du FBR sur la performance en accouchement des FS des zones sanitaires PN et NKP via la qualité de la structure et du processus d'offre de ces services.

Méthodes : c'est une étude longitudinale rétrospective portant sur toutes les FS fonctionnelles des deux zones sur la période de 14 trimestres (T1 2014 à T2 2017). La variable dépendante (performance des FS) était le taux d'accroissement du nombre total d'accouchements sur la période d'étude. Les variables indépendantes concernaient la qualité de la structure, la qualité du processus et le contexte. La collecte de données s'est faite à l'aide d'une fiche de dépouillement des données de routine (sur la période 2014-2015) et des données quantitatives et qualitatives du FBR à partir de T3 2015. Un modèle de régression linéaire a été ajusté pour voir les variables explicatives de la performance des FS. **Résultats :** Au total 55 FS en majorité en milieu rural (76,4%) ont participé à l'étude. Il n'y avait aucune amélioration dans la structure ($p=0,761$), non plus du personnel qualifié ($p = 0,67$), ni du personnel sage-femme ($p = 0,75$), encore moins de la performance en matière d'accouchements ($p = 0,527$) pour les FS des deux zones sur la période d'étude; en revanche il y avait eu une amélioration significative du processus d'offre ($p = 0,001$).

Conclusion : Pour impacter la performance des FS en accouchement, le FBR devrait agir non seulement sur les processus d'offre de ces services mais aussi et surtout sur les structures (ressources surtout humaines).

Mots-clés : Accouchement, financement basé sur les résultats, qualité des soins, structures, processus, Borgou, Bénin

CO74 : Performance des formations sanitaires en matière de système d'informations sanitaires et facteurs associés de la zone Parakou-N'dali en 2021

Agonnoudé T. Maurice^{1*}, Bio-Ngoye B Louise¹, Houeto S. David¹, Behanzin Luc¹, Padonou Géraud².

1- Ecole de santé publique et d'épidémiologie (ENATSE), Université de Parakou, BP 123, Tél.: +229) 95 96 15 42/ 61 32 06 90, Courriel: amaurte@yahoo.fr

2- Faculté de Médecine/Université de Parakou/République du Bénin

Type de présentation : communication orale

Résumé

Contexte : Le rôle du Système d'informations sanitaires (SIS) est de fournir les meilleures informations pour permettre la prise de décisions à temps en matière de santé.

L'objectif général était d'évaluer les performances des formations sanitaires périphériques (FSP) de la zone sanitaire Parakou-N'Dali (ZS PN) en termes de Système national d'informations et de gestion sanitaire (SNIGS) et les facteurs associés en 2021.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude d'observation transversale à visée analytique menée en juillet 2021 dans toutes les FSP de la ZS PN. La variable dépendante était la performance du FSP en termes de SNIGS mesurée en tant qu'indicateur composite des scores des dimensions qualité et utilisation des données de la performance. Les variables indépendantes concernaient les caractéristiques des FSP, celles des répondants, la qualité du processus du SNIGS ainsi que la perception des agents sur les déterminants techniques. Le rapport de prévalence avec son intervalle de confiance de 95% a été utilisé pour détecter les facteurs liés à la performance.

Résultats : Les FSP jugées performantes uniquement par la qualité des données était de 51,5%, puisque l'utilisation était nulle dans toutes les FSP. Les facteurs associés à la performance étaient : la distance entre le bureau de district et le FSP ($p = 0,04$), l'âge ($p < 0,001$), le sexe ($p = 0,009$) et le nombre d'années de service du répondant ($p < 0,001$) et enfin la qualité du processus SNIGS ($p < 0,001$).

Conclusion : Les FSP de la ZS PN ne sont pas performantes en termes de SNIGS.

Mots-clés : Système national d'informations et de gestion sanitaire (SNIGS), performance, qualité des données, processus

CO75 : Prévalence et facteurs associés au recours aux consultations postnatales chez les parturientes de la commune de Glazoué (Bénin) en 2020

Agonnoude Tm.^{1*}, Kpanou B.¹, Kossi O¹, Houehanou C¹, Behanzin L¹, Houeto S. D.¹, Adoukonou T.^{1, 2}.

- 1- *Ecole Nationale de Formation des Techniciens Supérieurs en Santé Publique et Surveillance Epidémiologique (ENATSE), Université de Parakou* **Présentateur :**
BP123 Parakou, Tél. : +229 95 96 15 42 / 61 32 06 90 Courriel: amaurte@yahoo.fr
- 2- *Faculté de Médecine/Université de Parakou/République du Bénin*

Résumé

Contexte : Pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale précoce, il est important d'agir sur quatre piliers dont la consultation postnatale (CPoN). Cette réalité semble souvent être oubliée par les acteurs de la santé.

Objectif : analyser la prévalence et les facteurs associés aux recours aux CPoN chez les parturientes de la commune de Glazoué en 2020. **Méthode :** Il s'agissait d'une étude transversale à visée analytique ayant inclus 303 parturientes venant d'accoucher dans l'une des 14 formations sanitaires de la commune.

Résultats : La prévalence du recours aux CPoN était de 9,24%. Le niveau d'instruction secondaire ou plus ($p = 0,006$), le revenu mensuel de la femme d'au moins 15 000FCFA ($p = 0,009$), le mode d'accouchement dystocique ou par césarienne ($p < 0,001$), la satisfaction vis-à-vis des services de la maternité ($p = 0,048$) et dans une moindre mesure et au seuil de 10%, la participation aux séances de sensibilisation ($p = 0,061$) étaient associés au recours des parturientes en CPoN.

Conclusion : Un accent doit être mis sur l'encouragement aux agents de santé qui effectuent bien le travail et qui organisent des séances de sensibilisations sur divers thèmes aux populations de leur localité. L'association du revenu mensuel aux recours à la CPoN souligne la nécessité de la couverture médicale universelle des soins de santé.

Mots clés : Consultation post natale, instruction, satisfaction, Glazoué

COD76 : Facteurs associés à l'assiduité aux consultations prénatales recentrées par les gestantes à Allada en 2021

Atade Sèdjro Raoul¹, Agonnoude Maurice T², Klipezo Roger ³, Hountcheme Arnaud ², Sidi Imorou Rachidi³, Salifou Kabibou³.

- 3- Département Mère-Enfant Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO) Université de Parakou, Bénin
 - 4- Ecole Nationale de formation des Techniciens Supérieurs en sante publique et en surveillance Epidemiologique (ENATSE)
 - 5- Département Mère-Enfant Faculté de Médecine (FM), Université de Parakou, Bénin
- Correspondant : ATADE Sèdjro Raoul ; email : raoulatade@yahoo.fr Tel : (229) 97 09 90 11 / (229) 95 59 25 41

Contexte et Objectifs : Les consultations prénatales constituent l'un des quatre piliers de la maternité à moindre risque. La consultation prénatale recentrée dispensée dans des bonnes conditions sert à l'identification des risques liés à la grossesse. Il s'agissait d'étudier les facteurs associés à l'assiduité aux consultations prénatales recentrées par les gestantes dans la commune d'Allada en 2021.

Méthodes : L'étude était de type observationnel transversal à visée analytique. Elle s'était déroulée du 1^{er} décembre 2020 au 30 septembre 2021. Ont été incluses, les gestantes d'enfant de moins d'un an fréquentant les formations sanitaires de la commune d'Allada pour vaccination de leur enfant. Les données ont été collectées par questionnaires, compilées dans KoBoCollect, analysées dans Epi-info version 7.2.4.0.

Résultats : Au total 949 gestantes âgées en moyenne de $26,35 \pm 5,59$ ans ont été incluses dans l'étude. Elles étaient mariées (98,4%), vivaient dans un milieu rural (73,45%) et à moins de 5 km d'un centre de santé (81,7%). L'assiduité en consultation prénatale recentrée était de 37,2%. D'après l'analyse bivariée, les gestantes de tranche d'âge 25 ans à 34 ans (RP=1,2 ; IC95% [1,01-1,46] ; p=0,03), les multigestes et multipares (RP =0,8; IC95% 0,59 -0,97 p=0,01), étaient les plus assidues en CPNR. En outre, le niveau d'instruction de la gestante (p<0,001), celui de son époux (p<0,001) ainsi que leurs professions (p<0,001) étaient statistiquement associés à l'assiduité en consultation prénatale recentrée des gestantes dans la commune d'Allada en 2021.

Conclusion : Les gestantes de la commune d'Allada ne respectent pas les fréquences de réalisation des consultations prénatale.

Mots clés : Consultations prénatales recentrées, Assiduité, facteurs associés, Allada.

COD77 : Environnement socio-anthropologique et administratif de la performance des intervenants de la santé au Bénin

Salami Lamidhi^{1,5*}, Ouendo Edgard-Marius Dona¹, Hounghin Roch A.^{2,5}, Sossa Charles Jérôme¹, Fayomi Benjamin ⁴.

¹ Département de Politique et Système de Santé - Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey Calavi-Bénin

² Département de Sociologie - Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université d'Abomey Calavi-Bénin

⁴ Département de Santé Publique - Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey Calavi-Bénin

⁵ Ministère de la Santé du Bénin

*Auteur correspondant : s.lamidhi@yahoo.com - Institut Régional de Santé Publique de Ouidah, Bénin - BP 834 Ouidah (BENIN) Fax: (+229) 21 34 16 72 Tél : (+229) 21 34 16 74
Adresse personnelle : 03 BP 4278 Jéricho-Cotonou - Mobile : (+229) 97471287 **Auteur présentateur** : Lamidhi Salami

Résumé :

Contexte et objectifs : Plusieurs actions sont menées depuis plus d'une décennie pour la recherche de la performance dans le système de santé au Bénin, tel le Financement Basé sur les Résultats (FBR) démarré en 2011 dans un contexte africain caractérisé par un engouement généralisé pour l'intervention. La présente recherche a été menée pour combler le déficit de connaissance approfondie sur le contexte de mise en œuvre des initiatives de recherche de la performance comme le FBR afin de favoriser leur succès et leur pérennité.

Matériels et méthodes : La recherche a consisté en des interviews d'une quarantaine d'acteurs du ministère de la santé et de quatre zones sanitaires couvertes par la phase expérimentale du FBR au Bénin et une revue documentaire sommaire.

Résultats et discussion : Elle a relevé un contexte socioculturel et religieux favorable dont les principes et normes sociaux généralement admis se prêtent à la mise en œuvre du FBR. Le cadre normatif sanitaire qui présentait des écarts avec les orientations du FBR en évolution, surtout au plan réglementaire. Les constats majeurs concernaient les discordances entre les pratiques attendues des acteurs sociaux et du système de santé et leurs pratiques réelles. Celles-ci consistaient surtout au non-respect des normes, au rançonnement, à la privatisation du service et à l'impunité développés sous le couvert de l'influence de réseaux sociaux et politiques. Les

écarts notés entre les normes et les pratiques sociales, le formel et l'informel, et l'importante porosité de l'Etat, qui sapent le socle de toute performance, focalisent de plus en plus des actions de réforme.

Conclusion : Cette étude révèle que l'environnement des interventions en santé comporte des "normes pratiques" entretenues par une culture professionnelle locale et une culture bureaucratique privatisée. Leur maîtrise est essentielle l'atteinte des performances du système de santé.

Mots-clés : environnement - Financement Basé sur les Résultats - socio-anthropologique - performance - Bénin.

COD78 : Évaluation de la qualité de la vaccination chez les enfants de 12-24 mois dans la zone sanitaire Adjohoun-Bonou-Dangbo, 2021

Barikissou Damien Georgia^{1*}, Aguemon Badirou², Padonou Géraud², Sossa Charles Jérôme³.

¹Département Population et santé, Centre de Formation et de Recherche en matière de Population (CEFOP), Université d'Abomey-Calavi, Bénin.

²Unité de santé publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Benin

³Institut Régionale de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Benin.

*Email : barikiss2000@yahoo.fr

Résumé

Introduction : Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), chaque année, la vaccination permet d'éviter environ 2,5 millions de décès d'enfants dans le monde. Cette étude avait pour objectif d'évaluer la qualité de la vaccination chez les enfants de 12 à 24 mois dans la zone sanitaire Adjohoun – Bonou – Dangbo en 2021.

Méthodes : Il s'agit d'une étude transversale descriptive analytique et évaluative. La population était constituée des enfants de 12-24 mois et des femmes ayant été une fois enceinte. La méthode d'échantillonnage probabiliste en grappe à deux degrés a été utilisée. Le seuil de satisfaction a été fixé à 80% pour l'évaluation de la structure, du processus et des résultats des services de vaccination.

Résultats : Le seuil de satisfaction par rapport aux infrastructures était de 76,75%. Le seuil de 96,66% a été atteint pour la planification des activités du PEV. Dans le domaine des équipements et matériels, le seuil attendu n'a pas été atteint (77,11%). Parmi les femmes ayant été une fois enceinte, 87,27% ont reçu leurs doses de VAT1 tandis que 7,27% seulement d'entre elles ont reçu leurs doses de VAT5. Sur les 388 enfants inclus, 80,10% était incomplètement vacciné. Seul le long délai d'attente était significativement associé à la vaccination incomplète de l'enfant ($p=0,014$).

Discussions et Conclusions : Pour améliorer le taux de couverture vaccinale dans la zone sanitaire Adjohoun-Bonou-Dangbo, nous recommandons de renforcer les infrastructures là où elles sont défectueuses, d'améliorer le délai d'attente afin d'obtenir de meilleurs résultats.

Mots clés : Enfants, Services de vaccination, qualité, évaluation.

CO79 : Mortalité et causes de décès des adultes à cotonou (bénin) en 2019: étude pilote

Hounmenou Minton Prince¹; Amidou Salmane²; Houehanou Corine³; Dossa Bernadin⁴; Houinato Dismand⁵.

¹ Pharmacien Epidémiologiste ; École doctorale des Sciences de la santé/UAC, Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles/MS 0022966646543, hounmenouprince@gmail.com

² Ph D'Epidémiologie ; Laboratoire d'Epidémiologie et des maladies chronique et neurologique/UAC ; Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles/MS +229 97 13 21 32 ; aramidou@gouv.bj

³ École Nationale de Formation des techniciens supérieurs en Epidémiologie et en surveillance Sanitaire/ UP ; Laboratoire d'Epidémiologie et des maladies chronique et neurologique/UAC +229 96 35 79 31, yessito_fr@yahoo.fr

⁴ Ph D, Psychologie ; Laboratoire de Psychologie humaine et clinique ; UAC, Bénin. +229 97 01 74 59 ; dbernadin@yahoo.fr

⁵ Ph D et HDR en neuro-épidémiologie, Professeur Titulaire en neurologie ; Directeur du laboratoire d'épidémiologie et des maladies chronique et neurologique ; Université d' Abomey calavi +229 95 36 99 50 ; dshouinato@gmail.com

Résumé :

Contexte et objectifs : Les statistiques de mortalité constituent encore les bases fondamentales pour mesurer l'ampleur des problèmes de santé. Au Bénin, elles sont inexistantes chez les adultes et le système d'état civil est défaillant. Dans ce contexte, l'autopsie verbale est la méthode pratique pour déterminer leurs causes probables de décès des adultes.

Méthodes : Une autopsie Verbale standardisée basée sur un questionnaire adapté à l'outil interVA-5.1 a été utilisé en entretien face à face avec les proches des personnes décédées dans la zone sanitaire Cotonou 2 et 3 en 2019. La probabilité des causes de décès ont été attribuées grâce à l'outil InterVA-5.1. et les fractions de mortalité par cause (CMSF) ont été déterminées par classe d'âge et sexe grâce à InterVA-5.1.

Résultats : En 2019, 227 décès ont été enregistrés (52.9% pour les femmes). Le taux de mortalité était de 62/100000 personnes-années (pa) pour les femmes contre 66/100000 chez les hommes. Il augmente avec l'âge en allant de 20/100000 pa chez les 15-49 (14% des décès) à 673/100000 personnes années chez les 65 ans et plus (45% des décès). Les causes de décès étaient principalement dans le groupe des maladies non transmissibles (MNT) avec une part de

mortalité de 55%, dont principalement les maladies cardiovasculaires (64% des MNT). Indépendamment du sexe et des classes d'âge, l'AVC était la première cause de décès des adultes avec une incidence globale de 30 pour 100 000 personnes-années en 2019. Le % CSMF de l'AVC n'a pas montré de différence statistiquement significative dans les différents sous groupe.

Conclusion : Les causes de décès des adultes dans la zone sanitaire 2 et 3 de Cotonou en 2019 sont dominées par les MNT dont principalement les accidents vasculaires cérébraux.

Mots clés : Autopsie verbale - InterVA 5.1 - Cause de décès – MNT

CO80 : Facteurs associés au délai préhospitalier des patients post-AVC au CHUD-Borgou en 2020

Kossi Oyéné^{1,2*}, Kpedoké Jean-Baptiste¹, Noukpo Sènadé Inès², Agbetou Mendinatou^{1,3}, Adoukonou Thierry^{1,3}.

¹ ENATSE (Ecole Nationale de Santé Publique et de Surveillance Epidémiologique), University of Parakou, Parakou, Benin.

² Service de Kinésithérapie et d'Appareillage Orthopédique, University Hospital of Parakou, Parakou, Benin.

³ Département de Neurologie, Faculté de Médecine, Université de Parakou, Parakou, Bénin.

* **CORRESPONDANCE** : Oyéné Kossi ; ENATSE, Université de Parakou ; 03 BP 10 Parakou – République du Bénin Email: oyene.kossi@gmail.com; Tel: +229 97160260

Résumé :

Contexte : Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont la principale cause d'hospitalisation dans les services de neurologie et un problème majeur de santé publique.

Objectif : L'objectif de ce travail était d'étudier les facteurs associés au délai préhospitalier des patients victimes d'AVC suivis au Centre Hospitalier Universitaire et Départemental du Borgou (CHUD/B) en 2020.

Méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale, à visée analytique qui s'est déroulée en septembre 2020. Notre échantillon était constitué à partir d'un recrutement exhaustif des patients victimes d'AVC et admis au CHUD/B entre le 1^{er} janvier et 30 septembre 2020.

Résultats : Au total, 57 patients post-AVC ont été inclus dans notre étude. Le délai médian d'admission des patients au service des urgences du CHUD/B était de 23 heures avec un intervalle interquartile de [7 heures 10 minutes – 64 heures 32 minutes], un minimum de 30 minutes et un maximum de 552 heures 30 minutes. Un long délai préhospitalier était constaté chez la majorité des patients de notre étude (85,96%). Le faible niveau d'instruction des patients (RP=2,09 ; IC% [1,34-3,22] ; p<0,001), l'absence d'antécédent (RP=1,77 ; IC% [1,06-2,94] ; p<0,001), une distance parcourue supérieure à 15 Km (RP=1,39 ; IC% [1,34-3,22] ; p=0,003), un AVC de type ischémique (RP= 3,14 ; IC95% [2,17-4,55] ; p<0,001), la visite d'une formation sanitaire périphérique (RP= 1,88; IC95% [1,20-2,95]; p<0,001) et la méconnaissance des AVC (RP= 3,62; IC95% [1,66-19,83] ; p<0,001) étaient significativement associés au long délai préhospitalier.

Conclusion : Le renforcement du niveau de connaissance de la population sur les AVC et l'urgence du recours aux soins médicaux appropriés peuvent favoriser la réduction du délai préhospitalier chez les patients reçus au CHUD/B.

Mots-clés : délai préhospitalier ; AVC, urgence.

CO81 : Les secteurs publics et privés du Bénin au regard de la réforme de la politique publique de santé à l'ère de la rupture

Ahlinvi Messanh Emmanuel

MCA en Science politique

Ecole doctorale sciences juridique, politique et administrative, Université de Parakou

Résumé

L'accession à la magistrature suprême du président Patrice Talon, acteur sociopolitique issu du secteur privé et du monde libéral a coïncidé avec l'élaboration et la mise en œuvre de la réforme du système de santé au Bénin. Si celle-ci marque l'esprit par son volontarisme, elle a aussi profondément mis à rude épreuve les secteurs privé et public de l'économie nationale en même temps qu'elle n'a pas pu atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée. L'absence d'une masse critique d'agents de santé qualifiés, d'infrastructures et instruments spécialisés de performance d'une part, et les effets conjugués du Covid 19, la morosité économique quasi planétaire d'autre part, ont contribué pour la part qui leur revient aux résultats mitigés auxquels elle a conduit.

Mots clés : Santé publique, Secteur, public, privé, politiques publiques, réforme, libéralisme personnel soignant, crise économique.

II- POSTERS

P1 : Etat des lieux de la résistance aux antibiotiques en réanimation polyvalente du CNHU/HKM de Cotonou en 2022

Ahounou E¹, Yansané A¹, Djèkpé R¹

1/ Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU/HKM)

2/ Centre Hospitalier Universitaire Mère Enfant Lagune (CHU-MEL)

Auteur correspondant : Ahounou Ernest. Mail : ahounousteph@yahoo.fr

Mots clés : antibiotique, résistance, réanimation

Résumé

Contexte : la résistance aux antibiotiques, est un problème de santé publique. Elle est plus inquiétante en Afrique Subsaharienne où les hôpitaux ne disposent pas de plateau technique microbiologique de qualité avec une grande partie de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Nous rapportons dans ce travail, la morbidité et la mortalité associées aux germes multirésistants en réanimation du CNHU/HKM en 2022.

Objectifs : Isoler les germes multirésistants en réanimation du CNHU/HKM. Déterminer le profile épidémiologique et clinique des malades infectées aux germes multirésistants

Déterminer la morbi mortalité associée à cette résistance bactérienne

Méthode : Etude transversale sur quatre mois (Novembre 20021 à février 2022), dans le service de Réanimation du CNHU/HKM. Toutes les hémocultures réalisées pendant la période d'étude ont été inclues et analysées.

Résultats et discussion : Quatre-vingt-dix hémocultures avaient été réalisées chez soixante-deux patients. La moyenne d'âge était de 33,19 ans et la sexe-ratio était de 1,48. Les germes les plus représentatifs étaient : Klebsiella Pneumoniae (30%), Acinobacter Sp , Entérobacter Cloacae et les Levures respectivement 13,33%. La mortalité au sein de la population infectée était de 64,52%. Des résistances à tous les antibiotiques présents au Bénin ont été identifiées.

Conclusion : La résistance aux antibiotiques dans le service de la réanimation du CNHU/HKM a pris des proportions inquiétantes. Elle est liée à une mauvaise utilisation des antibiotiques par les soignants. Des actions urgentes doivent être entreprises pour changer la tendance.

P2 : Motivations des médecins à se spécialiser en Chirurgie à la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou

Gnangnon Fhr^{1,2}, Gbessi Dg¹, Hodonou A³, Hountondji Rfc², Avakoudjo Jdg¹, Fiogbe Ma¹, Alamou S¹, Vigninkin-Yehouessi B¹, Denakpo JI⁴, Dossou Fm¹, Hans-Moevi Akue A¹, Mehinto Dk¹.

1 Département de Chirurgie, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi

2 Laboratoire d'Epidémiologie des Maladies Chroniques et Neurologiques, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi

3 Département de Chirurgie, Faculté de Médecine, Université de Parakou

4 Département Mère Enfant, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi

Auteur correspondant : Dr Freddy H.R. GNANGNON, Service de Chirurgie Viscérale CNHU-HKM de Cotonou. /Email : fredgnang@yahoo.fr/Tel :64092222

Code postal : 06BP738 Cotonou Bénin

Résumé :

Contexte(s) et objectifs : La Banque Mondiale estime que les problèmes de santé imposant une prise en charge chirurgicale entraîneront des pertes en termes de productivité économique de 12 300 milliards de dollars dans les pays à revenu faible et intermédiaire d'ici à 2030. Le Bénin manque de ressources humaines spécialisées en chirurgie. Notre objectif était de déterminer les motivations des médecins à se spécialiser en chirurgie à la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou.

Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude transversale descriptive. Elle a concerné 72 médecins en spécialisation chirurgicale à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Le logiciel Kobocollect a été utilisé pour la collecte et la saisie des données puis la version 25 du logiciel SPSS pour l'analyse des données. Les variables quantitatives ont été exprimées en moyenne avec écart type lorsque leur distribution vérifiait la loi normale ; et exprimées en médiane avec intervalle interquartile dans le cas contraire. Quant aux variables qualitatives elles ont été exprimées en pourcentage.

Résultats : L'âge moyen des médecins en spécialisation chirurgicale était de $32,51 \pm 4,78$ ans avec les extrêmes de 25 à 48 ans. Plus d'un médecin sur trois (43,1%) n'étaient pas de nationalité béninoise. La majorité des médecins étrangers ayant choisi le Bénin, l'on fait car ils estimaient que la formation y était meilleure. Moins d'un médecin sur 4 avait une bourse de formation. Les facteurs qui avaient le plus souvent, très fortement, orienté le choix des médecins vers une spécialité chirurgicale étaient : l'intérêt pour les procédures chirurgicales de la spécialité (56,3%) et la disponibilité d'opportunités emploi après la spécialisation (31,9%).

Discussions et conclusions : Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité sont multiples, soit intrinsèques, soit extrinsèques au médecin en spécialisation chirurgicale.

Mots clés : Motivation, médecins, spécialisation, Chirurgie

P3 : École promotrice de la santé (EPS) : perceptions et pratiques dans le système éducatif au Bénin : cas de la circonscription scolaire de Parakou 1 en 2019

Houeto Eg¹, Béhanzin L¹, Houeto Ds¹, Bokossa K. Cm¹, Otti A², Ahossi E².

¹Ecole Nationale De Formation Des Techniciens Supérieurs En Sante Publique Et En Surveillance Epidémiologique (ENATSE) (Université de Parakou, Bénin)

²Institut Nationale Médico-Sanitaire (INMeS) (Université d'Abomey-Calavi)

Auteur Correspondant : Etienne G. HOUETO ethoueto@yahoo.fr

Résumé

Introduction : L'école promotrice de santé est une stratégie d'intervention en milieu scolaire qui vise à promouvoir la santé de tous ceux qui fréquentent un établissement scolaire (élèves et adultes). Le but de l'étude était de déterminer les perceptions et le niveau de pratiques des acteurs de la circonscription scolaire de Parakou1 au Bénin en matière de l'approche EPS

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive visant quatre cibles à savoir : les écoliers, les enseignants, les membres APE ainsi que les autorités politico administratives de la circonscription scolaire de Parakou1. Nous avons réalisé une technique aléatoire raisonnée pour sélectionner les sujets à enquêter.

Résultats : Un questionnaire semi structuré a été administré à 342 acteurs des écoles primaires publiques de la circonscription scolaire de Parakou1. Les résultats montraient que sur les 200 écoliers recrutés, 75,50% avaient une mauvaise connaissance de l'approche EPS et 12,50% d'entre eux avaient une connaissance moyenne et 12,00% une bonne connaissance. Sur les 120 enseignants recrutés, 75,83% avaient une mauvaise connaissance de l'approche, 4,17% une connaissance moyenne et 20,00% avaient une bonne connaissance. En ce qui concerne les 20 APE, aucun d'entre eux n'avaient jamais entendu parler de l'approche EPS et ne connaissaient aucune définition d'une telle approche. Par contre le représentant de la mairie ainsi que le chef de la circonscription scolaire de Parakou1 reconnaissent avoir entendu parler de l'approche. La grande majorité des écoliers (88%) a une pratique néfaste en ce qui concerne la santé, 7,50% des écoliers ont une pratique inadéquate et 4,50% des écoliers ont une pratique adéquate des normes de la santé. 80% des enseignants ont une pratique adéquate des normes de la santé, 5,83% une pratique inadéquate et 14,17% une pratique adéquate néfaste qui contribue à l'amélioration de la santé.

Mots clés : Approche EPS, écoliers, Parakou

P4 : Évaluation de l'estime de soi chez les paralysés cérébraux (PC) à Cotonou

Anagonou Lucrèce¹, Klikpo Elvyre², Toudonou Ghislaine¹, Dessou Patern³, Gansou Magloire², Fiossi Kpadonou E¹.

1. Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences de la Santé, Département de santé mentale, CHU-MEL, Cotonou, Bénin
2. Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences de la Santé, Département de santé mentale, CNHUPC, Cotonou, Bénin
3. Clinique Universitaire de Médecine Physique et de Réadaptation Fonctionnelle, Cotonou, Bénin

Auteur correspondant : ANAGONOU Lucrèce Tél : +229 66263585

Courriel : luccea2@gmail.com

Contexte et objectif : L'estime de soi, reflète le sentiment que chacun éprouve à l'égard de ce qu'il pense être. L'essence et le fondement de l'estime de soi dépendent de façon étroite d'une part de la personnalité de l'individu, du développement éducationnel familial et scolaire et d'autre part, des interactions socioprofessionnelles. En Afrique, beaucoup de représentations sociales entourent le handicap et peuvent être d'ordre spirituel ou avec une dimension invisible, et/ou d'ordre relationnel. Au Bénin, la personne devenue handicapée à la suite de déficiences motrices acquises (« Sèkounon = dont le *Se est mort, annihilé* ») inspire pitié, compassion et protection pour avoir perdu son ange gardien. La paralysie cérébrale étant l'une des causes les plus fréquentes du handicap physique, l'objectif de ce travail a été d'étudier l'estime de soi des paralysés cérébraux à Cotonou.

Matériels et méthodes : Il s'est agi d'une étude cas-témoin à visée descriptive et analytique qui s'est déroulé du 19 Juin 2019 au 31 Juillet 2019 et portant sur 159 sujets dont 53 PC. La saisie des données collectées a été faite avec le logiciel SPSS. Le logiciel EPI INFO 7.2.1.0 a été utilisé pour l'analyse statistique.

Résultats : L'âge moyen des sujets impliqués dans la présente étude était de 15,88±1,48 ans. La « diplégie » était l'atteinte motrice neurologique la plus retrouvée. La proportion d'hypertonie (57,14%) était supérieure à celle de l'hypotonie (42,86%). La majorité des sujets PC adolescents et adultes avait une mauvaise estime de soi. L'âge, le niveau d'instruction du père et le niveau scolaire du patient étaient des facteurs associés à l'estime de soi chez les adultes. Le niveau scolaire était un facteur associé à l'estime de soi chez les adolescents.

Conclusion : Il ressort de notre étude que les PC ont effectivement une mauvaise estime de soi et que plusieurs facteurs y sont liés.

Mots clés : Paralysie Cérébrale (PC), estime de soi, Cotonou.

***COD : Communication Orale à Distance**