

## INSTITUT REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE

COMLAN ALFRED QUENUM

4<sup>èmes</sup> Journées Scientifiques de l'Institut Régional de Santé Publique

Ouidah, les 3 et 4 Décembre 2020

EDITION SPECIALE EN LIGNE

Thème : L'Afrique face aux  
Urgences en Santé Publique

Axe 1 : Santé Publique / Axe 2 : Epidémiologie  
Axe 3 : One Health / Axe 4 : Communications libres

**PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET  
RESUMES DES COMMUNICATIONS**

*BENIN*

## SOMMAIRE

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| REMERCIEMENTS.....                         | 3   |
| EDITEUR .....                              | 4   |
| I- INFORMATIONS GENERALES.....             | 5   |
| COMITE SCIENTIFIQUE .....                  | 6   |
| COMITE D'ORGANISATION .....                | 7   |
| II- PROGRAMMATION DES COMMUNICATIONS ..... | 12  |
| Communications Salle1.....                 | 13  |
| Communications Salle 2.....                | 20  |
| Communications Salle 3.....                | 29  |
| Communications Salle 4.....                | 38  |
| Communications Salle 5.....                | 45  |
| III- RESUME DES COMMUNICATIONS .....       | 50  |
| COMMUNICATIONS ORALES.....                 | 50  |
| AXE 1 : SANTE PUBLIQUE .....               | 50  |
| AXE 2: EPIDEMIOLOGIE .....                 | 92  |
| AXE 3: ONE HEALTH.....                     | 132 |
| AXE 4 : COMMUNICATIONS LIBRES .....        | 150 |
| COMMUNICATIONS AFFICHEES .....             | 181 |
| AXE 1 : SANTE PUBLIQUE .....               | 181 |
| AXE 2: EPIDEMIOLOGIE .....                 | 189 |
| AXE 3: ONE HEALTH.....                     | 197 |
| AXE 4 : COMMUNICATIONS LIBRES .....        | 206 |

## REMERCIEMENTS

L'Institut Régional de Santé  
Publique Comlan Alfred  
QUENUM  
(IRSP-CAQ) remercie ses  
partenaires pour leurs  
contributions à ces  
journées scientifiques

## **EDITEUR**

Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred QUENUM

(IRSP-CAQ)

Route des Esclaves

B.P. 384 Ouidah

Tél. + 229 21 34 16 74/75

FAX. + 229 21 34 16 72

Courriel : [irsp@irsp-ouidah.org](mailto:irsp@irsp-ouidah.org)

Web : [www.irsp-ouidah.org](http://www.irsp-ouidah.org)

BENIN

### **Comité de rédaction**

Directeur de publication : Pr Edgard-Marius Ouendo

Secrétaire scientifique : Dr Cyriaque DEGBEY

### **Membres**

MCA Ghislain SOPOH

MC Noël M. PARAÏSO

MCA Colette AZANDJEME

MCA Yolaine GLELE AHANHANZO

MA Patrick MAKOUTODE

M. Francis HOUNKPATIN

M. Hervé KOUKOUBOU

## **I- INFORMATIONS GENERALES**

### **Les droits d'inscription couvrent :**

- les documents relatifs aux Journées Scientifiques, notamment le programme des communications et le livret des résumés
- les frais de participation aux sessions scientifiques

### **Communications orales**

- Sessions plénières : Salle 3
- Sessions parallèles : Salle 1, 2, 3 et 4

### **Communications affichées : Salles 4 et 5**

## COMITE SCIENTIFIQUE

**Président** : Prof Laurent OUEDRAOGO (Burkina-Faso)

**Vice-Président** : Prof Edgard-Marius OUENDO (IRSP-CAQ)

**Secrétaire** : Dr Cyriaque DEGBEY (IRSP-CAQ)

### Membres

Prof Jakob ZINSSTAG (Suisse)

Prof Séverin ANAGONOU (FSS - UAC)

Prof Joseph HOUGNIGAN (FSA - UAC)

Prof Dismand HOUINATO (FSS - UAC)

Prof François DJROLO (FSS - UAC)

Prof Sahidou SALIFOU (EPAC - UAC)

Prof Adolphe KPATCHAVI (FASHS - UAC)

Prof Roch HOUNGNIHIN (FASHS - UAC)

Dr Roch JONHSON, MC (CIFRED - UAC)

Dr Luc DJOGBENOU, MC (IRSP - UAC)

Dr Jacques SAIZONOU, MCA (IRSP - UAC)

Dr Ghislain SOPOH, MCA (IRSP - UAC)

Dr Charles SOSSA-JEROME, MCA (IRSP - UAC)

Dr Noel M. PARAISO, MC (IRSP - UAC)

Dr Alphonse KPOZEHOUEN, MC (IRSP - UAC)

Dr Colette AZANDJEME, MA (IRSP - UAC)

Dr Yolaine GLELE HESSOU, MA (IRSP - UAC)

Dr Marius Nonvignon KEDOTE, MA (IRSP-UAC)

Dr Charles Patrick MAKOUTODE, MA (IRSP-UAC)

Virginie MONGBO, (IRSP - UAC)

Mr Hervé KOUKOUBOU

Mr Michael Setondji BATO

## COMITE D'ORGANISATION

**Président** : Dr Charles SOSSA-JEROME  
**Vice-président** : Mr Jonas GBAGUIDI  
**Secrétaire** : Dr Yolaine GLELE AHANHANZO

### Membres

Dr Ghislain SOPOH  
Dr Moussiliou Paraïso  
Dr Alphonse KPOZEHOUEN  
Dr Colette AZANDJEME  
Dr Cyriaque DEGBEY  
Dr Patrick MAKOUTODE  
Dr Marius KEDOTE  
Dr Virginie MONGBO  
Mme Andréa ACAKPO HOUNTONDJI  
Mr Christophe ASSOGBA  
Mr Michael Setondji BATO  
Mr Roland GNANSOUNOU  
Mr Francis HOUNKPATIN  
Mr Hervé KOUKOUBOU  
Mr Boris TANDJI

| Jeudi 3 décembre 2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       | VENDREDI 4 décembre 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |       |       |       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 09h00- 09h30          | <div>CEREMONIE D’OUVERTURE</div> <div>Salle 3 Participer à la réunion Zoom</div> <div><a href="https://zoom.us/j/4365108070?pwd=MHRTQkp6cTdrVFRUTDZybXY1UXdwQT09">https://zoom.us/j/4365108070?pwd=MHRTQkp6cTdrVFRUTDZybXY1UXdw QT09</a><br/><a href="https://fb.me/irspcaqofficiel">https://fb.me/irspcaqofficiel</a> ID de réunion : 436 510 8070</div> <div>Code secret : k2541h</div> |       |       |       | <div>SEANCE PLENIERE</div> <div>Salle 3 Participer à la réunion Zoom</div> <div><a href="https://zoom.us/j/4365108070?pwd=MHRTQkp6cTdrVFRUTDZybXY1UXdw QT09">https://zoom.us/j/4365108070?pwd=MHRTQkp6cTdrVFRUTDZybXY1UXdw QT09</a><br/><a href="https://fb.me/irspcaqofficiel">https://fb.me/irspcaqofficiel</a> ID de réunion : 436 510 8070 Code secret : k2541h</div> <div>Conférence</div> <div>THEME : Renforcement du système immunitaire dans le contexte des maladies infectieuses émergentes</div> <div>MCA AZANDJEME Colette,</div> <div>MCA SOSSA JEROME Charles</div> <div>MC GBENOUDON Sedaminou Judith, MC</div> |                                                                              |       |       |       |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       | 10H00-10H30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pause-café                                                                   |       |       |       |
| 09h30-10h30           | <div>SEANCE PLENIERE</div> <div>Conférence inaugurale</div> <div>THEME : L’Afrique à l’épreuve des urgences de santé publique de portée internationale : de la préparation à la riposte</div> <div>Dr LOKOSSOU Virgile</div> <div>Pr OUENDO Edgard-Marius</div>                                                                                                                           |       |       |       | 10h30<br>13h00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>SESSIONS PARALLELES</div> <div>COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES</div> |       |       |       |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OH-CO                                                                        | EP-CO | SS-CO | CL-CO |
| 10h30-11h00           | Pause-café                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       | 13H00-14H00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pause-déjeuner                                                               |       |       |       |
| 11h00-13h00           | <div>SESSIONS PARALLELES</div> <div>COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>SESSIONS PARALLELES</div> <div>COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES</div> |       |       |       |
|                       | OH-CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EP-CO | SS-CO | CL-CO | 14h00<br>17H00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OH-CO                                                                        | EP-CO | SS-CO | CL-CO |
| 13h00-14h00           | Pause-déjeuner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLÔTURE                                                                      |       |       |       |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       | 17h00<br>17 H 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |       |       |       |
| 14h00-18h00           | <div>SESSIONS PARALLELES</div> <div>COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |       |       |       |
|                       | OH-CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EP-CO | SS-CO | CL-CO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |       |       |       |
| 18h00<br>18h30        | Réunion du secrétariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |       |       |       |

OH : ONE HEALTH

EP : EPIDEMIOLOGIE

SS : SYSTEME DE SANTE

CL : COMMUNICATIONS LIBRES

| Jeudi 03 décembre 2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 09h00<br>09h30         | <b>CEREMONIE D'OUVERTURE</b><br>Salle 3 Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://zoom.us/j/4365108070?pwd=MHRTQkp6cTdrVFRUTDZybXY1UXdwQT09">https://zoom.us/j/4365108070?pwd=MHRTQkp6cTdrVFRUTDZybXY1UXdw QT09</a> <a href="https://fb.me/irspcaqofficiel">https://fb.me/irspcaqofficiel</a><br>ID de réunion : 436 510 8070 Code secret : k2541h |       |       |       |
| 09h30<br>10h30         | Séance plénière<br><b>Conférence inaugurale</b><br>THEME : l'Afrique à l'épreuve des urgences de sante publique DE portée internationale : De la préparation à la riposte<br>DR LOKOSSOU Virgile,<br>Pr OUENDO Edgard-Marius                                                                                                                              |       |       |       |
| 10h30<br>11h00         | Pause-café                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |
| 11h00<br>13h00         | <b>SESSIONS PARALLELES</b><br><b>COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |
|                        | OH-CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EP-CO | SS-CO | CL-CO |
| 13h00<br>14h00         | Pause-déjeuner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |
| 14h00<br>18h00         | <b>SESSIONS PARALLELES</b><br><b>COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |
|                        | OH-CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EP-CO | SS-CO | CL-CO |
| 18h00<br>18h30         | Réunion du secrétariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |

OH : ONE HEALTH

EP : EPIDEMIOLOGIE

SS : SYSTEME DE SANTE

CL : COMMUNICATIONS LIBRES

| Vendredi 4 décembre 2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 9h00<br>10H00            | <p>SEANCE PLENIERE</p> <p>Salle 3 Participer à la réunion Zoom</p> <p><a href="https://zoom.us/j/4365108070?pwd=MHRTQkp6cTdrVFRUTDZybXY1UXdwQT09">https://zoom.us/j/4365108070?pwd=MHRTQkp6cTdrVFRUTDZybXY1UXdwQT09</a> <a href="https://fb.me/irspcaqofficiel">https://fb.me/irspcaqofficiel</a> ID de réunion : 436 510 8070</p> <p>Code secret : k2541h</p> <p><b>Conférence</b></p> <p><b>THEME : RENFORCEMENT DU SYSTEME IMMUNITAIRE DANS LE CONTEXTE DES MALADIES INFECTIEUSES EMERGENTES</b></p> <p>MCA AZANDJEME COLETTE</p> <p>MCA SOSSA JEROME CHARLES</p> <p>MC GBENOUDON Judith</p> |       |       |       |
| 10h00<br>10H30           | Pause -Café                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| 10H30<br>13H00           | <p><b>SESSIONS PARALLELES</b></p> <p><b>COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |
|                          | OH-CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EP-CO | SS-CO | CL-CO |
| 13H00<br>14H00           | Pause-déjeuner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |
| 14H00<br>17H00           | <p><b>SESSIONS PARALLELES</b></p> <p><b>COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |
|                          | OH-CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EP-CO | SS-CO | CL-CO |
| 17 H -17 H30             | CLÔTURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |

OH : ONE HEALTH

EP : EPIDEMIOLOGIE

SS : SYSTEME DE SANTE


CL : COMMUNICATIONS LIBRES



## II- PROGRAMMATION DES COMMUNICATIONS

### Répartition des communications par salle

| SALLE      | MATIN         |          |               |           |
|------------|---------------|----------|---------------|-----------|
|            | 03/12/2020    | HEURES   | 04/12/2020    | HEURES    |
| SALLE 1    | OH-CO 1 A 09  | 11H-13H  | CL-CO 22 A 31 | 10H30-13H |
| SALLE 2    | EP-CO 1 A 10  |          | EP-CO 28 A 41 |           |
| SALLE 3    | SS-CO 1 A 10  |          | SS-CO 28 A 41 |           |
| SALLE 4    | CL-CO 1 A 9   |          | CL-CA 1 A 9   |           |
| SALLE 5    | EP-CA 1 A 5   |          | OH-CA 6 A 8   |           |
|            | OH-CA 1 A 2   |          | SS-CA 1 A 7   |           |
| APRES MIDI |               |          |               |           |
| SALLE 1    | OH-CO 10 A 25 | 14H -18H | CL-CO 32 A 42 | 14 H-17H  |
| SALLE 2    | EP-CO 11 A 27 |          | EP-CO 42 A 55 |           |
| SALLE 3    | SS-CO 11 A 27 |          | SS-CO 42 A 57 |           |
| SALLE 4    | CL-CO 10 A 21 |          | CL-CA 10 A 17 |           |
| SALLE 5    | EP-CA 6 A 11  |          | OH-CA 9 A 10  |           |
|            | OH-CA 3 A 5   |          | SS-CA 8 ET 09 |           |



COMMUNICATIONS ORALES

COMMUNICATIONS AFFICHEES

## Programme des communications

### Communications Salle1

| Participer à la réunion Zoom                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="https://zoom.us/j/6156287309?pwd=eDdhYm5RYjFoZUNRamNsWjdITDkwQT09">https://zoom.us/j/6156287309?pwd=eDdhYm5RYjFoZUNRamNsWjdITDkwQT09</a> |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
| ID de réunion : 615 628 7309 Code secret : xbV2T1                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
| 03/12/2020                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
| Horaires                                                                                                                                          | Code                                                                                                                                       | Titres                                                                                                                                                 | Auteurs                                                                                                                                    |
| <b>Matinée</b>                                                                                                                                    | <b>Modérateur :</b> MCA SOPOH Ghislain<br><b>Secrétaires :</b> DAH-TINDE Dorcas, AISSI Florel, ABOUBACARI Maichanatou, CAPO-CHICHI Cécilia |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
| 11h00 à 11h10                                                                                                                                     | OH-CO-01                                                                                                                                   | EVALUATION DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI SUR LA RAGE                                         | PHILIPPE SESSOU*, NESTOR DENAKPO NOUDEKE, DAVID SALAKO, MAHUNAN GAËL JOSUE OUSSOU, BRUNO YAOVI, GWLADYS KOMAGBE S, SOUAÏBOU FAROUGOU       |
| 11h10 à 11h20                                                                                                                                     | OH-CO-02                                                                                                                                   | INFECTIVITY OF CULTURE-ADAPTED PLASMODIUM FALCIPARUM FIELD ISOLATES TO ANOPHELES GAMBIAE                                                               | ADANDÉ A. MEDJIGBODO*, CONSTANTIN ADOHA, LAURETTE DJOSSOU, MARTIN J. DONNELLY, DAVID WEETMAN AND LUC S. DJOGBENOU                          |
| 11h20 à 11h30                                                                                                                                     | OH-CO-03                                                                                                                                   | EFFET DE L'EXPOSITION A LA POLLUTION DE L'AIR AU COURS DE LA GROSSESSE SUR LES MESURES ANTHROPOMETRIQUES DU NOUVEAU-NE A SEME-KPODJI AU BENIN          | HINSON ANTOINE VIKKEY1, AVOKPAHO EURIPIDE2, LAWIN HERVE1, DANDJI SEVERIN1, KPANGON ARSENE                                                  |
| 11h30 à 11h40                                                                                                                                     | OH-CO-04                                                                                                                                   | CONTAMINATION METALLIQUE DES PRODUITS HALIEUTIQUES ET MARAICHERS ET ANALYSE DE RISQUES TOXICOLOGIQUES A HOUIN LOGBO DANS LA COMMUNE DE LOKOSSA (BENIN) | ARMELLE HOUNKPATIN1,2 *, PATRICIA MINTOLE HEKPAZO1, ROCH CHRISTIAN JOHNSON 1                                                               |
| 11h40 à 11h50                                                                                                                                     | OH-CO-05                                                                                                                                   | AMELIORATION DES CONDITIONS D'HYGIENE ET D'ASSAINISSEMENT DANS LA COMMUNE DE ZE AU BENIN                                                               | ROCH CHRISTIAN JOHNSON1, ARMELLE SABINE YELIGNAN HOUNKPATIN1,2*, FRANCINE INOCENTIA JOHNSON1, GRATIEN BONI1, BEATRIZ GOMEZ3, GABRIEL DIEZ3 |

| 11h50 à 12h00  | Plénière 1                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | Modérateurs                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12h00 à 12h 10 | OH-CO-06                                                                                                                                                                                                                | CONTRIBUTION A L'AMELIORATION DE L'HYGIENE ET DE L'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL DANS LA COMMUNE DE LALO AU BENIN                                        | ROCH CHRISTIAN JOHNSON <sup>1</sup> , ARMELLE SABINE YELIGNAN HOUNKPATIN <sup>1,2*</sup> , ZOULKIFL SALOU, JOSEE AKOKO AGOSSOU <sup>1</sup> , BEATRIZ GOMEZ <sup>3</sup> , GABRIEL                                                                                                 |
| 12h10 à 12h 20 | OH-CO-07                                                                                                                                                                                                                | EVALUATION MICROBIOLOGIQUE DE TROIS TECHNIQUES D'HYGIENE DES MAINS EN MILIEU UNIVERSITAIRE AU BENIN EN 2020                                               | BRIFELLE TENTE <sup>1</sup> , DAMIEN TOFFA <sup>1</sup> , RAFIATOU BA <sup>1</sup> , JULIANA DAHOU <sup>1</sup> , HARVEY JOHNSON <sup>1</sup> , CARINE ZINSOU <sup>1</sup> , FRANCK MIGNANWANDE <sup>1</sup> , PARFAIT DJOSSOU <sup>1</sup> , *ROCH CHRISTIAN JOHNSON <sup>1</sup> |
| 12h20 à 12h30  | OH-CO-08                                                                                                                                                                                                                | SCREENING PHYTOCHIMIQUE, EVALUATION DES ACTIVITES ANTIPLASMODIALE IN VITRO ET ANTIRADICALAIRES DE LA TIGE FEUILLEE DE SENNA ROTUNDIFOLIA LINN (FABACEAE). | ESSEH K.4*, KOUDOUVO K., BAZIE V.B.E.J.T, IDOH K.4, KAROU D.S., LAGNIKA L. AGBONON A., KOKOU K. SIMPORE J., GBEASSOR M.                                                                                                                                                            |
| 12h30 à 12h40  | OH-CO-09                                                                                                                                                                                                                | INNOCUITE DE L'EXTRAIT ETHANOLIQUE CRATEVA ADANSONII DC. (CAPPARIDACEAE) RECOLTE A DASSA-ZOUNME AU CENTRE DU BENIN                                        | ROCH CHRISTIAN JOHNSON <sup>1</sup> , ZINSOU FRANCK MIGNANWANDE <sup>1</sup> , ARMELLE SABINE YELIGNAN HOUNKPATIN <sup>1,2</sup> , DAMIEN TOFFA <sup>1</sup> , PARFAIT DJOSSOU <sup>1</sup> , EUSTACHE HOUETO <sup>1</sup> , GRATIEN BONI <sup>1</sup>                             |
| 12h40 à 12h50  | OH-CO-10                                                                                                                                                                                                                | ETAT DES LIEUX DES CONDITIONS DE PRODUCTION DES ALIMENTS D'ORIGINE ANIMALE VENDUS EN MILIEU SCOLAIRE DANS LE DEPARTEMENT DU MONO AU BENIN                 | EUSTACHE C. HOUNKPE <sup>1,2*</sup> , NICOLAS KORSACK <sup>2*</sup> , SOUAÏBOU FAROUGOU <sup>1*</sup>                                                                                                                                                                              |
| 12h50 à 13h00  | Plénière 2                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | Modérateurs                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Après midi     | <b>Modérateur :</b> MC JOHNSON Rock Christian <b>Assistants :</b> MCA GLELE AHANHANZO Yolaine, MA DEGBEY Cyriaque C<br><b>Secrétaires :</b> DAH-TINDE Dorcas, AISSI Florel, ABOUBACARI Maichanatou, CAPO-CHICHI Cécilia |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14h00 à 14h10  | OH-CO-11                                                                                                                                                                                                                | INFECTIONS DU SITE OPERATOIRE ET EMERGENCE DE CARBAPENEMASES                                                                                              | CARINE LAURENCE YEHOUE <sup>1,2,3</sup> , DISSOU AFFOLABI <sup>2,3,4</sup> , OLIVIA DALLEUR <sup>5,6</sup> , AND ANNE SIMON <sup>7,8</sup>                                                                                                                                         |
| 14h10 à 14h20  | OH-CO-12                                                                                                                                                                                                                | INVENTAIRE DES TIQUES DURES PARASITANT LA FAUNE SAUVAGE AU SUD-BENIN : CAS DES COMMUNES DE KPOMASSE, DE TORI-BOSSITO, D'ABOMEY CALAVI, DE ZE ET D'ALLADA  | ROLAND ERIC YESSINOU <sup>1</sup> , CAMUS ADOLIGBE <sup>1</sup> , EMÉRAN HOUNGA <sup>1</sup> JUSTIN ADINCI <sup>1</sup> , SOUAÏBOU FAROUGOU <sup>1</sup>                                                                                                                           |
| 14h20 à 14h30  | OH-CO-13                                                                                                                                                                                                                | ESTIMATION DE L'EXPOSITION AU PLOMB DES CONSOMMATEURS DE WAGASHI GASSIRE DU SUD DU BENIN                                                                  | DOSSOU ALPHONSE <sup>1,2*</sup> , MADODE YANN <sup>1</sup> , DOUNY CAROLINE <sup>2</sup> , SCIPPO MARIE LOUISE <sup>2</sup> , AZOKPOTA PAULIN <sup>1</sup> , CLINQUART ANTOINE <sup>1</sup>                                                                                        |

|                      |                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14h30 à 14h40        | OH-CO-14          | FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET COMPORTEMENTS ASSOCIES A L'INFECTION A MYCOBACTERIUM ULCERANS DANS LA COMMUNE DE LALO AU BENIN : UNE ETUDE CAS-TEMOINS                                                                        | ANAGONOU GIMATAL ESAÏ* 1,7, BIAOU CHABI ALPHONSE 1,5, WADAGNI ANITA CAROLLE 1,5, BAROGUI YVES THIERRY 2,7, GNIMAVO SETONDJI RONALD 4,5, AYELO ADJIMON GILBERT 3, SAKA KORA ERIC 1, HOUEZO JEAN GABIN 1, SOPOH GHISLAIN EMMANUEL 5, JOHNSON ROCH CHRISTIAN 6,7 |
| 14h40 à 14h50        | OH-CO-15          | ETUDE DE LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DES EAUX DES GROUPEMENTS DE FEMMES DE OUINHI AU BENIN EN 2019                                                                                                                          | SOLANGE ASSOGBA1*, DAMIEN TOFFA1, CARINE ZINSOU1, GRATIEN BONI1, DEODAD LISSASSI1, WILFRID DONHOUEDE1, JUSTINE WOUINSOU1, ROCH CHRISTIAN JOHNSON1                                                                                                             |
| <b>14h50 à 15h00</b> | <b>Plénière 3</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15h00 à 15h10        | OH-CO-16          | OBSERVATION DES GESTES BARRIERES PREVENTIFS DE LA COVID-19 DANS LES ZONES SANITAIRES DE L'ATLANTIQUE AU BENIN : DE LA NECESSITE DE L'EVEIL PSYCHOLOGIQUE DUS A L'EMOUSSEMENT MOTIVATIONNEL MULTIFACTORIEL DE LA POPULATION | AVOCÈ CODJO JAURES                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15h10 à 15h20        | OH-CO-17          | STATUT HYDRIQUE DES JOUEURS DE HANDIBASKET APRES UN MATCH INTERNATIONAL EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE                                                                                                                           | O. D. AZE 1, 2, K. AFFOYON1, R. SITOU1, D. OUEDRAOGO1, J AHOUNOU AIKPE1, J. TEBA1, B. AKPLOGAN1,                                                                                                                                                              |
| 15h20 à 15h30        | OH-CO-18          | APPROCHE INTEGREE DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES NEGLIGÉES A MANIFESTATIONS CUTANÉES AU BENIN : RESULTATS ET IMPACT INDIRECT                                                                                   | YVES T. BAROGUI1, GHISLAIN E. SOPOH2, ESAI ANAGONOU3, JEAN GABIN HOUEZO3, GILBERT AYELO4, RONALD GNIMAVO5, GABRIEL DIEZ6, BEATRIZ GOMEZ6, ASIEDU KINGSLEY7, ROCH C. JOHNSON8                                                                                  |
| 15h30 à 15h40        | OH-CO-19          | LONGITUDINAL PATTERNS OF LIFESTYLE BEHAVIOURS IN ADOLESCENCE: A LATENT TRANSITION ANALYSIS                                                                                                                                 | MOHAMED DAKIN1; FLORIAN MANNEVILLE1; JOHANNE LANGLOIS2; KARINE LEGRAND1,3; EDITH LECOMTE2; SERGE BRIANÇON1; ABDOU Y. OMOROU1,3                                                                                                                                |
| 15h40 à 15h50        | OH-CO-20          | LA TRISOMIE 21 : LOGIQUES ET PRATIQUES DE PRISE EN CHARGE D'UNE MALADIE CONGÉNITALE A COTONOU.                                                                                                                             | SÈDAMI LYDIE EDITH DEFODJI, ROCH A. HOUNGNIHIN                                                                                                                                                                                                                |
| <b>15h50 à 16h00</b> | <b>Plénière 4</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16h00 à 16h10        | OH-CO-21          | DIAGNOSTIC MOLECULAIRE DE LA TUBERCULOSE BOVINE A L'INSPECTION POST MORTEM                                                                                                                                                 | CAMUS. ADOLIGBE1, ANGE R. ZOCANCLOUNON1, HERBERT DEDEHOUANOU2, SOUAIBOU FAROUGOU1                                                                                                                                                                             |

|                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16h10 à 16h 20       | OH-CO-22                                                                                                                                   | FACTEURS DE RISQUE ET CONNAISSANCES DE LA RAGE CANINE DANS LE DEPARTEMENT DE L'OUEME AU BENIN DE 2016 A 2019                                                                                          | ALLANONTO VICTOR, YANOGO PAULINE, AKPO YAO, NOUDEKE NESTOR                                                                                                                                          |
| 16h20 à 16h30        | OH-CO-23                                                                                                                                   | PREVALENCE DE LA BRUCELLOSE BOVINE DANS LA COMMUNE DE DJOUGOU, NORD-BENIN.                                                                                                                            | SOHA S. ARNAUD <sup>1</sup> , AKABASSI BAUDELAIRE <sup>1</sup> , OHOUKO O. FREJUS <sup>1</sup> , ADOUKO S. JACQUES <sup>1</sup> , GUEDEGBE O. GANIOU <sup>1</sup> , DOUGNON T. JACQUES <sup>1</sup> |
| 16h30 à 16h40        | OH-CO-24                                                                                                                                   | EVALUATION DES PREVALENCES, DES FACTEURS DE RISQUES ET LA CARACTERISATION DES ENTEROBACTERIES MULTIRESISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES ISOLEES CHEZ L'HOMME, L'ANIMAL ET DE L'ENVIRONNEMENT AU BURKINA FASO | SORE S.1,2,3, BEOGO S.1, BATIONO B.G3., KY H3. MADINGAR D.P3., LLBOUDO K.S.1, OUEDRAOGO A.S.2,SANOU I.1,2                                                                                           |
| 16h40 à 16h50        | OH-CO-25                                                                                                                                   | PORTAGE ASYMPTOMATIQUE DE PLUSIEURS BACTERIES MULTIRESISTANTES CHEZ DES VOLONTAIRES SAINS ET DES PATIENTS A OUAGADOUGOU, BURKINA FASO                                                                 | SORE S.1,2, SANOU S.3, BEOGO S.1, DAKOUO N.P.3 DJAMALLADINE M.D.4 ILBOUDO K.S.1, ZOUNGRANA J. <sup>3</sup> , PODA A. <sup>3</sup> , OUEDRAOGO A.S.2 ,SANOU I.1,2                                    |
| <b>16h50 à 17h00</b> | <b>Plénière 5</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>04/12/2020</b>    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Matinée</b>       | <b>Modérateur :</b> MCA SOPOH Ghislain<br><b>Secrétaires :</b> DAH-TINDE Dorcas, AISSI Florel, ABOUBACARI Maichanatou, CAPO-CHICHI Cécilia |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
| 10h30 à 10h 40       | CL-CO-22                                                                                                                                   | DIAGNOSTIC ET IMPACTS PSYCHO-SOCIAUX DE LA DYSFONCTION ERECTILE AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSTAIR HUBERT KOUTOUKOU MAGA DE COTONOU                                                           | DODJI MAGLOIRE I. YEVI, FAWAZ ABIOLA YESSOUFOU, FRED HODONOU, MICHEL MICHAËL AGOUNKPE, JEAN SOSSA, GILLES NATCHAGANDE, MICHEL MICHAËL AGOUNKPE, JOSUE D.G. AVAKOUDJO                                |
| 10h40 à 10h 50       | CL-CO-23                                                                                                                                   | LES NOUVELLES MUTATIONS SOCIALES ET LEUR RAPPORT A LA MATERNITE CHEZ L'ADOLESCENTE EN MILIEU BAATONU DE KANDI AU NORD BENIN                                                                           | ADAM NOUHOUN LOUKOUMANOU, IMOROU ABOU-BAKARI                                                                                                                                                        |
| 10h50 à 11h 00       | CL-CO-24                                                                                                                                   | ASPECT DE LA PREVENTION DE LA TRANSMISSION MERE A L'ENFANT (PTME) DU VIH EN PEDIATRIE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ZONE D'ABOMEY CALAVI (CHUZ/AC)/ BENIN                                    | E.E. AGBE 1, * I. DOSSOU-DAGBA 2, F. ZINSOU 3                                                                                                                                                       |
| 11h00 à 11h 10       | CL-CO-25                                                                                                                                   | ACCOMPAGNER POUR LA VIE ET ACCOMPAGNER VERS LA MORT. UNE REFLEXION AUTOUR DE LA                                                                                                                       | AGBODJAVOU KOMI MENA 1&2, KPATCHAVI CODJO ADOLPHE 1&2                                                                                                                                               |

|                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                   | GESTION DES MALADIES CHRONIQUES : CAS DU DIABETE ET SES COMPLICATIONS CHRONIQUES AU SUD TOGO.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11h10 à 11h 20        | CL-CO-26          | EFFET DE ROUREA COCCINEA ET DE CASSYTHA FILIFORMIS SUR LA FERTILITE DES RATS MALE WISTAR                                                                                                                                              | AGBODJENTO1 ERIC, KLOTOE*1,2 JEAN ROBERT, DOUGNON1 VICTORIEN, SACRAMENTO3 ISABELLE, AMADOU1 AFOUSSATOU, DEGUENON1 ESTHER, ATEGBO4 JEAN MARC                                                                                                         |
| <b>11h 20 à 11h30</b> | <b>Plénière 1</b> |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11h30 à 11h40         | CL-CO-27          | BLOC DU NERF PUDENDAL SOUS NEUROSTIMULATION AU COURS D'UNE MISSION FORAINE DE CHIRURGIE UROLOGIQUE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MERE – ENFANT LAGUNE (CHU-MEL): TECHNIQUE ET EFFICACITE CHEZ L'ENFANT                          | AKODJENOU J <sup>1</sup> , AHOUNOU E <sup>2</sup> , ZOMAHOUN L1, GBENOU S1, ZOUMENOU E <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |
| 11h40 à 11h50         | CL-CO-28          | STRUCTURE FAMILIALE ET ROLES SOCIAUX ASSOCIES : POUR UNE COMPREHENSION DES COMPORTEMENTS SEXUELS DITS DEVIANTS DES JEUNES A COME (BENIN)                                                                                              | ALIHONOU KOUASSIBA ODETTE [2]ET HOUNGNIHIN ROCH APOLLINAIRE                                                                                                                                                                                         |
| 11h50 à 12h00         | CL-CO-29          | CONNAISSANCES ET PRATIQUES DE L'ALLAITEMENT MATERNEL EXCLUSIF (AME) CHEZ LES MÈRES D'ENFANTS DE 0 À 24 MOIS MALNUTRIS HOSPITALISÉS AU CENTRE DE RÉCUPÉRATION NUTRITIONNEL INTENSIF (CRENI) DE L'HÔPITAL NATIONAL LAMORDÉ (HNL), NIGER | NOUHO MA1, ALKASSOUM SI2, GONI ALASSAN MB3, TIEKOURA BD4, ABOUBACAR S4                                                                                                                                                                              |
| 12h00 à 12h10         | CL-CO-30          | DONNEES METABOLIQUES DES FOOTBALLEURS D'ELITES AU COURS D'UN MATCH EPROUVANT DANS UN ENVIRONNEMENT CHAUD ET HUMIDE                                                                                                                    | JEAN-MICHEL BAZABA KAYILOU1,2, JUDITH FIFAMIN AHOUNOU AÏKPE1, JEAN-BÉNOÎT GODONOU1 JOACHIM DJIMON GBENOU3, PIERRE HOUNDJIVI DANSOU1                                                                                                                 |
| 12h10 à 12h20         | CL-CO-31          | VOULOIR, MAIS NE PAS POUVOIR: REALITES DES BESOINS NON SATISFAITS EN CONTRACEPTION CHEZ LES FEMMES EN POST-PARTUM DANS LE NORD DU BENIN                                                                                               | FANNY HOUNKPONOU1, CHABI OLANIRAN ALPHONSE BIAOU2, YOLAINE GLÈLÈ AHANHANZO2, CANDIDE RUSSEL DOS-SANTOS1, AURELLE AHOINGNAN1, AWADÉ ACHILLE OBOSSOU1, RACHIDI SIDI IMOROU1, MAHUBLO VODOUHE1, HUBERT LAOUROU3, KABIBOU SALIFOU1, RENÉ XAVIER PERRIN4 |
| <b>12h 20 à 12h30</b> | <b>Plénière 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                                                                                                                  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12h30 à 12h40         | CL-CO-32                                                                                                                                                                                                                | PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES AU SEXTING CHEZ LES ETUDIANTS DES ECOLES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'UNIVERSITE DE PARAKOU (NORD BENIN) EN 2019.                                                                    | FRANCIS TOGNON TCHEGNONSI1, CHABI OLANIRAN ALPHONSE BIAOU2, ELIE ATAÏGBA1, EDMOND BODJRENOU1, ANSELME DJIDONOU1, PROSPER GANDAH01   |
| 12h40 à 12h 50        | CL-CO-33                                                                                                                                                                                                                | FACTEURS ASSOCIES A LA RETICENCE AU DON BENEVOLE DE SANG DANS LA COMMUNE DE PARAKOU(BENIN) EN 2018                                                                                                                        | FANNY HOUNKPONOU1, DELPHIN AÏDEWOU1, AURELLE AHOOUNGNAN1, RAYMONDE AFFOKPA2, CHABI OLANIRAN ALPHONSE BIAOU3, THIERRY ADOUKONOU1,2   |
| <b>12h 50 à 13h00</b> | <b>Plénière 3</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                  |
| <b>Après midi</b>     | <b>Modérateur :</b> MC JOHNSON Rock Christian <b>Assistants :</b> MCA GLELE AHANHANZO Yolaine, MA DEGBEY Cyriaque C<br><b>Secrétaires :</b> DAH-TINDE Dorcas, AISSI Florel, ABOUBACARI Maichanatou, CAPO-CHICHI Cécilia |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| 14h00 à 14h10         | CL-CO-34                                                                                                                                                                                                                | ETUDE DES FACTEURS ASSOCIES A L'UTILISATION DE LA MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES A LONGUE DUREE D'ACTION DANS LES ECOLES CORANIQUES DU DISTRICT SANITAIRE DE DAROU MOUSTY/ SENEGAL                                              | DIOP CHEIKH TACKO, KA OUSSEYNOU                                                                                                     |
| 14h10 à 14h20         | CL-CO-35                                                                                                                                                                                                                | ETUDE DES DETERMINANTS DE L'ADHESION DES POPULATIONS AUX MUTUELLES DE SANTE EN 2015 DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE GUEDEAWAYE (SENEGAL)                                                                                    | DIOP CHEIKH TACKO, KA OUSSEYNOU                                                                                                     |
| 14h20 à 14h30         | CL-CO-36                                                                                                                                                                                                                | ENQUÊTE ETHNOBOTANIQUE PORTANT SUR LES PLANTES UTILISEES DANS LE TRAITEMENT DE L'INFERTILITE MASCULINE AU BENIN                                                                                                           | AZONBAKIN S (1) , DANGBEMEY P(2) , OSSENI R(1) ., KORA F(1) , YAUDE A(1) , ADOVOEKPE D(1) , AWEDE B(3) , DJEGO F(4) , LALEYE A(1) . |
| 14h30 à 14h40         | CL-CO-37                                                                                                                                                                                                                | PHYTOMEDICAMENT "MEDOLEME" UTILISE DANS LA PRISE EN CHARGE DES IST/ VIH/SIDA EN AFRIQUE DE L'OUEST : CONNAISSANCES ENDOGENES DES TRADITHERAPEUTES DU TOGO SUR L'UTILISATION DES PLANTES CONSTITUTIVES EN RECETTES UNIQUES | KOUDOUVO KOFFI1,* , TOUGOMA ATEHEZI1, ADZAVON YAO MAWULIKPLIMI2, ESSEH KOMLAVI1, AGBONON AMEGNONA.1, GBEASSOR MESSANVI1             |
| 14h40 à 14h50         | CL-CO-38                                                                                                                                                                                                                | RAIDEUR POST-TRAUMATIQUE DES MEMBRES PELVIENS AU CNHU-HKM DE COTONOU : RESULTATS REEDUCATIFS.                                                                                                                             | ALAGNIDE H ETIENNE, SETONDI KN FABRICE, NIAMA NATTA D DIDIER, KOGO DANIEL, ANANI YVES, OLOUKA JEAN, KPADONOU G TOUSSAINT.           |
| <b>14h50 à 15h00</b>  | <b>Plénière 4</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                  |

|                      |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15h00 à 15h10        | CL-CO-39          | ETUDE DES REPRESENTATIONS DE LA POPULATION SUR LA MALADIE A CORONAVIRUS ET DES MESURES DE LUTTE EN COTE D'IVOIRE EN 2020                                 | AKA LBN, EKRA KD, SABLE S, AKA DA, ORSOT TE, EKOU FK, KPEBO DOD, DAGNAN NS                                                                                              |
| 15h10 à 15h20        | CL-CO-40          | ÉVALUATION DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES PROFESSIONNELS DE SANTE SUR LA COVID-19 DANS LES STRUCTURES SANITAIRES DE COTE D'IVOIRE EN 2020 | EKRA KD, AKA LBN, EKOU FK, ANO MN, ORSOT TE, KPEBO DOD, OKOUBO G, SABLE S, AKA DA, DAGNAN NS.                                                                           |
| 15h20 à 15h30        | CL-CO-41          | CONNAISSANCES ATTITUDES ET PRATIQUES DES POPULATIONS RELATIVES A LA COVID-19 AU BENIN                                                                    | NONVIGNON MARIUS KEDOTE <sup>1,2</sup> , CLAUDE-GERVAIS ASSOGBA <sup>3</sup> , ROCH HOUNGNIHIN <sup>4</sup> , JOAQUIN DARBOUX <sup>2</sup> , LUC DJOGBENOU <sup>1</sup> |
| 15h30 à 15h40        | CL-CO-42          | TINEA PEDIS ET ONYCHOLYSE A CYLINDROCARPON LICHENICOLA CONFIRME PAR SEQUENÇAGE CHEZ UNE JEUNE BENINOISE IMMUNOCOMPETENTE.                                | SISSINTO SAVI DE TOVE Y, WAKPO A, DEGBOE B, AFFOLABI D, ATADOPKEDE F, ADEGBIDI H, OGOUYEMI HOUNTO A, MASSOUGBODJI A, PIHET M, BOUCHARA JP, DENNING W D, KINDE-GAZARD D. |
| <b>15h40 à 16h00</b> | <b>Plénière 5</b> |                                                                                                                                                          | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                                      |

## Communications Salle 2

### Participer à la réunion Zoom

<https://zoom.us/j/5972219203?pwd=eElnb3ppVlk3UmNzWFdIVUdLbEdOZz09>

ID de réunion : 597 221 9203 Code secret : 0p9qQX

03/12/2020

| Matinée                                                                                 |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modérateur : MC PARAISO Noel                                                            |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
| Secrétaires : AHAMIDE Josias, BARRY Alpha Amadou, AKOUTA Merveille GBESSEMEHLAN Doriane |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
| Horaires                                                                                | Code     | Titres                                                                                                                                   | Auteurs                                                                                                                                           |
| 11h00 à 11h10                                                                           | EP-CO-01 | PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A L'HEPATITE B CHEZ LES TRAVAILLEUSES DU SEXE VIH NEGATIVES, COTONOU-BENIN, 2014-2015                    | ROSETTE KOUFEDE, F. A. GUEDOU, S. SALIFOU, M. B. LAURENT, O.J.B. OTSHUDIANDJEKA,, Y FR. DIALLO , PK YANOGO , N MEDAO                              |
| 11h10 à 11h20                                                                           | EP-CO-02 | ETUDE DES FACTEURS ASSOCIES AU RETARD DE CONSULTATION SANITAIRE DES VICTIMES DE VIOLS AU SENEGAL                                         | MAMADOU MAKHTAR MBACKÉ LEYE , A.A. DIOUF , M. DIONGUE , I. SECK , A.T. DIA                                                                        |
| 11h20 à 11h30                                                                           | EP-CO-03 | ETUDE CAS-TEMOINS SUR LA VULNERABILITE DES FEMMES FACE AU VIH, KAOLACK, 2019                                                             | ABDOUL AZIZ NDIAYE1, DIYA DIOP1, OUSSEYNOU KA1, NDÈYE FATOU NGOM GUEYE1, ALIOUNE BADARA TALL1, AWA BA-DIOP1, ANTA TAL DIA2                        |
| 11h30 à 11h40                                                                           | EP-CO-04 | DELAÏ DIAGNOSTIQUE DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE ET FACTEURS ASSOCIES A SON ALLONGEMENT DANS LA REGION DE BOKE, GUINEE, 2019-2020         | ABOUBACAR CONTÉ 1,2, NICOLAS MÉDA 1,3, MARIANNE LAURENT3, JOSEPH OTSHADIANDJEKA3, BERNARD SAWADOGO4, ALAIN DESU2, BAYAKI SAKA5, PAULINE YANOGO1,3 |
| 11h40 à 11h50                                                                           | EP-CO-05 | PRONOSTIC DE L'ACCOUCHEMENT CHEZ L'ADOLESCENTE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA MERE ET DE L'ENFANT LAGUNE (CHU-MEL) DE COTONOU | ABOUBAKAR M1, TOGNIFODE V2.,DANGBEMEY P2, , LOKOSSOU MSH1,TONATO-BAGNAN A                                                                         |

| 11h50 à 12h00     | Plénière 1                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | Modérateurs                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12h00 à 12h 10    | EP-CO-06                                                                                                                                                                                                                      | HEPATITE VIRALE B LORS D'UNE CAMPAGNE DE DEPISTAGE EN POPULATION GENERALE AU BENIN : SEROPREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES                               | ABOUDOU RAÏMI KPOSSOU1, MOUSSILIOU NOEL PARAISO2, COMLAN N'DÉHOUGBÈA SOKPON1, KHADIDJATOU SAKÉ ALASSAN3, RODOLPH KOFFI VIGNON1, JEAN SÉHONOU1, NICOLAS KODJOH4, HERVÉ LAWIN5                                                                      |
| 12h10 à 12h 20    | EP-CO-07                                                                                                                                                                                                                      | STRESS PROFESSIONNEL CHEZ LES TRAVAILLEURS EN MILIEU INDUSTRIEL                                                                                        | 2ADJOBIMEY M, 1HINSON VIKKEY, 2 HOUNTOHOTOGBE E, 1ADJOGOU A, 2HOUINATO D                                                                                                                                                                          |
| 12h20 à 12h30     | EP-CO-08                                                                                                                                                                                                                      | DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTERUS : CONNAISSANCE, PARTICIPATION ET FACTEURS ASSOCIES CHEZ LES FEMMES DU MARCHE DANTOKPA AU BENIN                  | AGUEMON B1, SOSSA CJ2, PADONOU SGR1, DAMIEN BG1, OLOFINDJI M.J.M-G1                                                                                                                                                                               |
| 12h30 à 12h40     | EP-CO-09                                                                                                                                                                                                                      | IMPACT DES STRATEGIES PREVENTIVES DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS A SEME-PODJI AU SUD DU BENIN                         | IDELPHONSE B AHOGNI1,2*, MICHEL AGBLA2,3, PRUDENCIENE AGBOHO1,4, ROSERIC AZONDEKON1,5, SEBASTIEN KOUDENOUKPO1, RODRIGUE ANAGONOU1, ANDRE SOMINAHOUIN1, JANYCE GNANVI4, HORACIO NANI5, GERMAIN PADONOU1,2, ANDRE HOUTOUKPE6 AND MARTIN C AKOGBETO1 |
| 12h40 à 12h50     | EP-CO-10                                                                                                                                                                                                                      | FACTEURS DE PREDICTION DE LA MORTALITE DES MALADES POSITIFS AU COVID 19 AUX SOINS INTENSIFS DES CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC (CUSL) DE BRUXELLES | AHOOUNOU E1*, AKODJENOU J2, HOUNKPE P-C1, ZOUMENOU E1, HANTSON P3                                                                                                                                                                                 |
| 12h50 à 13h00     | Plénière 2                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | Modérateurs                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Après midi</b> | <b>Modérateur :</b> MCA HINSON Antoine <b>Assistants :</b> <i>MC KPOZEHOUE</i> <b>Alphonse</b> , Dr MONGBO Virginie<br><b>Secrétaires :</b> AHAMIDE Josias, <i>BARRY Alpha Amadou</i> , AKOUTA Merveille GBESSEMEHLAN Doriane |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14h00 à 14h10     | EP-CO-11                                                                                                                                                                                                                      | ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUE DU « BURNOUT » CHEZ LE PERSONNEL SOIGNANT DE L'HOPITAL DE MENONTIN A COTONOU                                                   | ANTOINE V. HINSON1, ROSE MIKPONHOU1, BADIROU AGUEMON2, CISSE IBRAHIM MAMA3, PATRICK C. SEMBEYA1, MENONLI ADJOBIMEY1 PAUL AYELO1                                                                                                                   |

|                      |                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14h10 à 14h20        | EP-CO-12          | STRESS PROFESSIONNEL DANS LES USINES DE COTON : PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES                                                                                                                   | ANTOINE VIKKEY HINSON <sup>1</sup> , MENONLI ADJOBIMEY <sup>1</sup> , ROSE MIKPONHOU <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14h20 à 14h30        | EP-CO-13          | IMPACT DE LA COMMUNICATION INTER-HOSPITALIERE SUR LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS REFERES AUX URGENCES PEDIATRIQUES DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DEPARTEMENTAL DE L'OUEME-PLATEAU (CHUD-OP) | PADONOU CAROLINE <sup>1</sup> , BOGNON GILLES <sup>1</sup> , LOGBO PARSIFAL <sup>1</sup> , SAGBO GRATIEN <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14h30 à 14h40        | EP-CO-14          | ROLE DE L'ISOIMMUNISATION AUX ANTIGENES SPERMATIQUES DANS L'INFERTILITE FEMININE AU BENIN                                                                                                         | GANLAKI TOMAVO HTR, HOUNSOSSOU CH, KOUGNIMON FEE, AKPOVI DC*, LOKO FS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14h40 à 14h50        | EP-CO-15          | PREVALENCE DES FACTEURS DE RISQUE VASCULAIRE DANS L'ARRONDISSEMENT DE TITIROU A PARAKOU AU BENIN EN 2016                                                                                          | HOUEHANOU YESSITO CORINE NADEGE, AGBETOU MENDINATOU, KOSSI OYENE, HOUNTADA HOSPICE, AGONNOUDE MAURICE, ADOUKONOU THIERRY                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>14h50 à 15h00</b> | <b>Plénière 3</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15h00 à 15h10        | EP-CO-16          | ETUDE DE LA MORBIDITE RESIDUELLE DE LA LEPRE APRES LA POLYCHIMIOThERAPIE PAR AUDIT CLINIQUE DANS LES DEPARTEMENTS DU ZOU ET DU PLATEAU AU BENIN                                                   | ROCH CHRISTIAN JOHNSON <sup>1</sup> , PARFAIT DJOSSOU <sup>1</sup> , RONALD SÊTONDI GNIMAVO <sup>3</sup> , CHABI ALPHONSE BIAOU <sup>2</sup> , ZOULKIFL SALOU BACHIROU <sup>1</sup> , FRANCK ZINSOU MIGNANWANDE <sup>1</sup> , ESAÏ ANAGONOU <sup>3</sup> , ANITA AKPÉDJÉ WADAGNI <sup>3</sup> , JEAN GABIN HOUZEZO <sup>3</sup> , YVES THIERRY BAROGUI <sup>3</sup> , GHISLAIN EMMANUEL SOPOH <sup>2</sup> |
| 15h10 à 15h20        | EP-CO-17          | IMPACT DE L'UTILISATION DE L'EAU DU FORAGE SUR LA VARIATION DE L'INCIDENCE DE L'ULCERE DE BURULI AU BENIN : RESULTATS D'UNE ETUDE CAS-TEMOINS                                                     | 1,2HORACE DEGNONVI, 3SEBASTIEN FLEURET, 2CLEMENT COUDEREAU, 4RONALD GNIMAVO, 3SIGRID GIFFON, 5EDOUARD YERAMIAN, 1ROCH CHRISTIAN JOHNSON, 2ESTELLE MARION                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15h20 à 15h30        | EP-CO-18          | PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A L'UTILISATION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE DU POST-PARTUM CHEZ LES FEMMES AU BENIN : ENQUETE DEMOGRAPHIQUE ET DE SANTE 2017-2018.                              | ALPHONSE KPOZEHOUEN <sup>1*</sup> , YOLAINE GLELE AHANHANZO <sup>1</sup> , ELVYRE KLIKPO <sup>2</sup> , CYRIAQUE DEGBEY <sup>1</sup> , MOUSSILIOU NOËL PARAÏSO <sup>1</sup> , JACQUES SAÏZONOU <sup>1</sup> , EDGARD-MARIUS OUENDO <sup>1</sup>                                                                                                                                                             |

|                      |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15h30 à 15h40        | EP-CO-19          | TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT DU PALUDISME A LA SULFADOXINE – PYRIMETHAMINE DES FEMMES ENCEINTES AU BENIN: PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES EN UTILISANT LES DONNEES DE L'ENQUETE DEMOGRAPHIQUE ET DE SANTE 2017-2018 | ALPHONSE KPOZEHOUEN1*, YOLAINE GLELE AHANHANZO1, CYRIAQUE DEGBEY1, ALPHONSE CHABI1, DOSTEN KPOZEHOUEN1, ELVYRE KLIKPO2, MOUSSILIOU NOËL PARAISO1, EDGARD-MARIUS OUENDO1 |
| 15h40 à 15h50        | EP-CO-20          | PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A LA VACCINATION COMPLETE CHEZ LES ENFANTS DE 12 A 23 MOIS : EVIDENCE A PARTIR DE L'ENQUETE DEMOGRAPHIQUE ET DE SANTE DU BENIN, 2017-2018                                                | ALPHONSE KPOZEHOUEN1*, YOLAINE GLELE AHANHANZO1, ELVYRE KLIKPO2, COLLETTE AZANDJAME1, VIRGINIE MONGBO1, MOUSSILIOU NOËL PARAISO1, EDGARD-MARIUS OUENDO1                 |
| 15h50 à 16h00        | EP-CO-21          | FACTEURS ASSOCIES A L'UTILISATION DES GPS LORS DES ACCIDENTS DE LA VOIE PUBLIQUE A COTONOU EN 2019                                                                                                                       | PATRICK MAKOUTODE1 , GLORIA LAURELLE GANDJI1, ALPHONSE KPOZEHOUEN, YOLAINE AHANHANZO1                                                                                   |
| <b>16h00 à 16h10</b> | <b>Plénière 4</b> |                                                                                                                                                                                                                          | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                                      |
| 16h10 à 16h20        | EP-CO-22          | STATUT NUTRITIONNEL POST-RECUPERATION DES ENFANTS MALNUTRIS DOUZE MOIS APRES SORTIE D'UN PROGRAMME DE TRAITEMENT ET FACTEURS ASSOCIES AU BENIN.                                                                          | CHARLES SOSSA, DONELLE AGOSSADOU, GHISLAIN SOPOH, MOUSSILIOU PARAISO, VICTOIRE AGUEH                                                                                    |
| 16h20 à 16h 30       | EP-CO-23          | DETERMINANTS DU RISQUE CARDIOVASCULAIRE GLOBAL EN MILIEU PROFESSIONNEL A COTONOU : CAS DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR « BANQUE-ASSURANCE »                                                                                  | CHARLES SOSSA, KARL KPOSSOU, GHISLAIN SOPOH, MOUSSILIOU PARAISO, BADIROU AGUEMON                                                                                        |
| 16h30 à 16h40        | EP-CO-24          | MISE EN PLACE ET SUIVI DE LA COHORTE "TRAUMAR" DES VICTIMES D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU BENIN EN 2019.                                                                                                               | DONATIEN DADDAH1,2, YOLAINE GLÈLÈ AHANHANZO,2, ALPHONSE KPOZEHOUEN,2, BELLA HOUNKPE DOS SANTOS1,2, EDGARD-MARIUS OUENDO,2, ALAIN LEVEQUE1                               |
| 16h40 à 16h50        | EP-CO-25          | CARACTÉRISTIQUES ÉPIDÉMIOLOGIQUES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION CHEZ LES PIÉTONS ET CONDUCTEURS DE BICYCLETES AU BÉNIN DE 2008 À 2017                                                                                  | DONATIEN DADDAH1,2, YOLAINE GLÈLÈ AHANHANZO,2, ALPHONSE KPOZEHOUEN,2, BELLA HOUNKPE DOS SANTOS1,2, HUGUETTE TÉDJI2, EDGARD-MARIUS OUENDO,2, ALAIN LEVEQUE1              |

|                |                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16h50 à 17h00  | EP-CO-26                                                                                                                | EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AU BÉNIN, 2019                                                               | BELLA HOUNKPE DOS SANTOS <sup>1,2</sup> , ANDRÉ AÏNA <sup>3,4</sup> , ALPHONSE KPOZEHOUEN <sup>2</sup> , YOLAINE GLELE AHANHANZO <sup>2</sup> , DONATIEN DADDAH <sup>1,2</sup> , YVES COPPIETERS <sup>1</sup> , ELISABETH PAUL <sup>2</sup> |
| 17h00 à 17h10  | EP-CO-27                                                                                                                | PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET CLINIQUE DU PIAN DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE MBAÏKI EN CENTRAFRIQUE                                     | JEAN DE DIEU LONGO, EUDES GBAGBANGAÏ, HENRI SAINT-CALVAIRE DIEMER, GILLES BRÜKER, LAURENT BELEC, GERARD GRESENGUET                                                                                                                          |
| 17h10 à 17h20  | EP-CO-56                                                                                                                | DETERMINANTS DES DECES MATERNELS AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA MERE ET DE L’ENFANT LAGUNE DE COTONOU AU BENIN           | Saizonou Jacques, Savane Yacouba, Makoutodé Patrick, Ouendo Edgard-Marius                                                                                                                                                                   |
| 17h20 à 17h35  | Plénière 5                                                                                                              |                                                                                                                                     | Modérateurs                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04/12/2020     |                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Matinée        | Modérateur : MC PARAISO Noel<br>Secrétaires : AHAMIDE Josias, BARRY Alpha Amadou, AKOUTA Merveille GBESSEMEHLAN Doriane |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10h30 à 10h 40 | EP-CO-28                                                                                                                | INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH A BANGUI                                                          | JEAN DE DIEU LONGO, EUDES GBAGBANGAÏ, HENRI SAINT-CALVAIRE DIEMER, GILLES BRÜKER, LAURENT BELEC, GERARD GRESENGUET                                                                                                                          |
| 10h40 à 10h 50 | EP-CO-29                                                                                                                | INVESTIGATION D’UN CLUSTER DE COVID-19 DANS LA CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS DE SOKODE, DISTRICT SANITAIRE DE TCHAOUDJO, TOGO, 2020. | N’DJAO A., HILIM P.M., TCHALLA-A E., BASSOTI S., NABA M.A., ABDOULAYE A., AHONSOU D., KINDE R., TAMEKLOE S.A.                                                                                                                               |
| 10h50 à 11h 00 | EP-CO-30                                                                                                                | ETUDE DES PROFILS ELECTROPHORETIQUES DES PATIENTS REÇUS POUR EXAMEN DE PROTIDOGamme                                                 | ORNELA F.A.O. DAOUDOU, SYLVAIN HOUNSOUNNOU, CASIMIR D. AKPOVI                                                                                                                                                                               |
| 11h00 à 11h 10 | EP-CO-31                                                                                                                | MORBI MORTALITE GERIATRIQUE DANS LE SERVICE ORL DE L’HOPITAL PRINCIPAL DE DAKAR DU 1ER JANVIER 2018 AU 1ER AOUT 2020                | OUSSEYNOU KA, ABDOUL AZIZ NDIAYE CHEIKH TACKO DIOP, YASSINE BENNANI ZIATNI, MOUNTAGA ELIMANE DIA, BOUBACAR GUEYE, BAY KARIM DIALLO                                                                                                          |
| 11h10 à 11h 20 | EP-CO-32                                                                                                                | PROFIL ACTUEL DE L’HEPATITE VIRALE C AU BENIN : SEROPREVALENCE ET FACTEURS                                                          | MOUSSILIOU NOËL PARAÏSO, ABOUDOU RAÏMI KPOSSOU, COMLAN N’DEHOUGBÈA SOKPON,                                                                                                                                                                  |

|                       |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                   | ASSOCIES ISSUE D'UNE CAMPAGNE DE DEPISTAGE EN POPULATION GENERALE                                                                                                                                                        | HERVÉ LAWIN, CÉDRIC BIGOT, KHADIDJATOU SAKÉ ALASSAN, RODOLPH KOFFI VIGNON, RENÉ KEKE, CAMILLE DOMONHÉDO, SOSSA EDMOND GBÉDO, JEAN SÉHONOU, NICOLAS KODJOH. |
| <b>11h 20 à 11h35</b> | <b>Plénière 1</b> |                                                                                                                                                                                                                          | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                         |
| 11h25 à 11h35         | EP-CO-33          | PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES AUX INFECTIONS DU SITE OPERATOIRE DANS LES CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE TRAUMATOLOGIE ET D'UROLOGIE DU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUKOU MAGA DE COTONOU EN 2020 | CYRIAQUE DÉGBEY,A,B,* , ALPHONSE KPOZEHOUEA, DRISSA COULIBALYA, PASCAL CHIGBLOC, JOSUÉ AVAKOUDJOD , EDGARD-MARIUS OUENDO, ARISTOTE HANS-MOEVIC             |
| 11h35 à 11h45         | EP-CO-34          | CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES PRESTATAIRES DE SANTE VIS-A-VIS DES CAS SUSPECTS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN GUINEE                                                                                           | ALEXANDRE DELAMOU1, SIDIKIBA SIDIBÉ1, ALIOUNE CAMARA1,2,THIERNO OUMAR FOFANA1, MAURICE SANDOUNO3                                                           |
| 11h45 à 11h55         | EP-CO-35          | EVALUATION RAPIDE DU NIVEAU DE PREPARATION DU SYSTEME DE SANTE ET DE LA REPONSE A LA PANDEMIE DE COVID-19 EN GUINEE                                                                                                      | ALEXANDRE DELAMOU1, THIERNO OUMAR FOFANA1, GRAZIELLA GHESQUIÈRE2, SIDIKIBA SIDIBÉ1, ALIOUNE CAMARA1,3                                                      |
| 11h55 à 12h05         | EP-CO-36          | CARACTERISTIQUES DES USAGERS DE LA ROUTE ET COMPORTEMENTS PAR RAPPORT AU PORT DE CASQUE AU BENIN                                                                                                                         | BELLA HOUNKPE DOS SANTOS1,2, ALPHONSE KPOZEHOUE2, YOLAINE GLELE AHANHANZO2, DONATIEN DADDAH1,2, ALAIN LEVEQUE1, YVES COPPIETERS1                           |
| 12h05 à 12h15         | EP-CO-37          | ASSESSMENT OF ADHERENCE TO PUBLIC HEALTH MEASURES AND THEIR IMPACT ON THE COVID-19 OUTBREAK IN BENIN REPUBLIC, WEST AFRICA                                                                                               | PHILIPPE SESSOU1*, JOSEPH NELSON SIEWE FODJO2, CHARLES SOSSA JEROME3, SOUAÏBOU FAROUGOU1, ROBERT COLEBUNDERS2                                              |
| <b>12h 15 à 12h20</b> | <b>Plénière 2</b> |                                                                                                                                                                                                                          | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                         |
| 12h20 à 12h30         | EP-CO-38          | INVESTIGATION DES CAS DE COVID-19 CHEZ DES ETUDIANTS, COMMUNE III DE BAMAKO, MALI, JUIN 2020                                                                                                                             | OB TOGOLA1, Y KONE1, LC MARIAME2, MD SOUMARE3, K KAYEMBE4, B TRAORE4, M KONE1, H KEITA1, S COULIBALY5, OJB OTSHUDIANDJEKA2, P YANOGO2, F DIALLO2, N MEDA2  |

|                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12h30 à 12h40         | EP-CO-39                                                                                                                                                                                         | INFECTIONS LIEES AU CATHETER D'HEMODIALYSE AU CNHU DE COTONOU 2019 : PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES                                                                                         | VIGAN JACQUES1, SOSSA JEROME C2, AHOUI SERAPHIN3, AYADJI ERIC1, DOTCHAMOU BK CENMAS1, AGBOTON BRUNO LEOPOLD1                    |
| 12h40 à 12h 50        | EP-CO-40                                                                                                                                                                                         | INSUFFISANCE RENALE AIGUË AU CNHU ET AU CHUMEL A COTONOU : ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUE, ETIOLOGIQUE, THERAPEUTIQUE ET PRONOSTIQUE EN 2019                                                        | VIGAN JACQUES1, AHOUI SERAPHIN2, SEDJAME BG CHRISTELLE1, AGBOTON BRUNO LEOPOLD1                                                 |
| 12h50 à 13h 00        | EP-CO-41                                                                                                                                                                                         | DELAI DIAGNOSTIQUE DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE ET FACTEURS ASSOCIES DANS LA REGION DU CENTRE AU BURKINA                                                                                     | PK YANOGO1, BALIMA CLARISSE2, NICOLAS MEDA1                                                                                     |
| <b>13h 00 à 13h10</b> | <b>Plénière 3</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              | <b>Modérateurs</b>                                                                                                              |
| <b>Après midi</b>     | <b>Modérateur : MCA HINSON Antoine Assistants : MC KPOZEHOUEN Alphonse, Dr MONGBO Virginie</b><br><b>Secrétaires : AHAMIDE Josias, BARRY Alpha Amadou, AKOUTA Merveille GBESSEMEHLAN Doriane</b> |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |
| 14h00 à 14h10         | EP-CO-42                                                                                                                                                                                         | DEVENIR DES PATIENTS HEPATITE B POSITIFS DE LA CAMPAGNE DE DEPISTAGE DE SOS HEPATITE A OUAGADOUGOU, BURKINA FASO, JUIN 2019                                                                  | PK YANOGO1, ESTELLE NADINE SANOU2, NICOLAS MEDA1                                                                                |
| 14h10 à 14h20         | EP-CO-43                                                                                                                                                                                         | FACTEURS ASSOCIES A LA SUPPRESSION VIRALE CHEZ LES ADOLESCENTS (ADOS) VIVANT AVEC LE VIH AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ZONE D'ABOMEY CALAVI (CHUZ/AC)/ BENIN                        | E.E. AGBE 1, *I. DOSSOU-DAGBA 2, A. IBIKOUNLE 3, A. TOSSOU 4.                                                                   |
| 14h20 à 14h30         | EP-CO-44                                                                                                                                                                                         | EVOLUTION DES DECES MATERNELS AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MERE – ENFANT LAGUNE (CHU-MEL) DE 2015 A 2019                                                                              | AKODJENOU J <sup>1</sup> , ABOUBACAR M <sup>1</sup> , AHOUNOU E <sup>2</sup> , BIAOU COA <sup>3</sup> , ZOUMENOU E <sup>2</sup> |
| 14h30 à 14h40         | EP-CO-45                                                                                                                                                                                         | PRURIT APRES RACHIANESTHESIE AVEC MORPHINE COMME ADJUVANT POUR CESARIENNE AU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE LA MERE ET DE L'ENFANT - LAGUNE (CHU-MEL) AU BENIN: INCIDENCE ET GRAVITE | AKODJENOU J1, AHOUNOU E <sup>1</sup> , EDWIGE TCHINCHIN-CADETE2, ZOUMENOU E1.                                                   |
| 14h40 à 14h50         | EP-CO-46                                                                                                                                                                                         | PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES AU SURPOIDS CHEZ LES FEMMES DU MARCHE DANTOKPA AU BENIN EN 2018                                                                                              | MAMA CISSE I1, ALASSANI A1, DOVONOU AC1, GOUNONGBE F1, GANDAHO P1                                                               |

|                      |                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14h50 à 15h 00       | EP-CO-47          | L'INACTIVITE PHYSIQUE CHEZ LE PERSONNEL SOIGNANT EN SERVICE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DEPARTEMENT DU BORGOU EN 2017                                  | MAMA CISSE I1, ALASSANI A1, DOVONOU AC1, GOUNONGBE F1, GANDAHO P1                                                                                                                   |
| <b>15h00 à 15h10</b> | <b>Plénière 4</b> |                                                                                                                                                                | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                                                  |
| 15h10 à 15h20        | EP-CO-48          | DETERMINANTS DU RETARD A LA CONSULTATION CHEZ LES SUJETS ADULTES ATTEINTS DU PALUDISME A BEMBEREKE EN 2019                                                     | ALASSANI A1, MAMA CISSE I1, DOVONOU AC1, GOUNONGBE F1, GANDAHO P1                                                                                                                   |
| 15h20 à 15h30        | EP-CO-49          | DETERMINANTS DU DEPISTAGE VOLONTAIRE DE L'INFECTION VIH CHEZ LES GESTANTES SUIVIS A PARAKOU EN 2019                                                            | ALASSANI A1, MAMA CISSE I1, DOVONOU AC1, GOUNONGBE F1, GANDAHO P1                                                                                                                   |
| 15h30 à 15h40        | EP-CO-50          | USAGE PROBLEMATIQUE DU TRAMADOL CHEZ LES ADOLESCENTS EN MILIEU SCOLAIRE AU BENIN.                                                                              | ASSAD BIO SYA1, HENRI JOËL GANDJO1, ELVYRE T. E. KLIKPO4, ODILE KOUGLENOU2, ARNAUD C. AGBANLINSOU3, ADRIEN N. NOUDJIEGBE1, ADOLPHE C. KPATCHAVI2, ANATOLE LALEYE3, AUREL C. ALLABI1 |
| 15h40 à 15h50        | EP-CO-51          | SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA MENINGITE AU BENIN DE 2016 A AOUT 2020                                                                                         | D'ALMEIDA CAMÉLIA1, SALIFOU SOURAKATOU2, MARIAM OKÊ SOPOH3, MARIANNE KOUAWO1, GHISLAIN E. SOPOH4                                                                                    |
| 15h50 à 16h00        | EP-CO-52          | CERVICALGIE NON SPECIFIQUE CHEZ LES EMPLOYES DE BUREAU A COTONOU                                                                                               | ALAGNIDE H. ETIENNE, DAHOUE TO WILFRIED, NIAMA NATTA D. DIDIER, HOUNGBEDJI M. GERMAIN, ANANI YVES, OYAMBAYE ANDRE, KPADONOU G. TOUSSAINT                                            |
| 16h10 à 16h20        | EP-CO-53          | ETUDE DES FACTEURS ASSOCIES A LA CERVICALGIE COMMUNE NON SPECIFIQUE CHEZ LES EMPLOYES DE BUREAU A COTONOU.                                                     | ALAGNIDE H. ETIENNE, DAHOUE TO WILFRIED, NIAMA NATTA D. DIDIER, ASSOGBA FRANCK, AMANZONWE RENAUD, OYAMBAYE ANDRE, KPADONOU G. TOUSSAINT                                             |
| 16h20 à 16h30        | EP-CO-54          | EFFETS DE L'UTILISATION DES MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES ET DE LA PULVERISATION INTRADOMICILIAIRE SUR LA PARASITEMIE PALUSTRE DANS TROIS COMMUNES AU NORD DU BENIN | SISSINTO SAVI DE TOVE Y23 HOUNKPE B1, TOKPONON F1, ADINSI DE SOUZA V3, KOUKPOLIYI A3, WAKPO A3, OGOUYEMI-HOUNTO A123, MASSOUGBODJI A23, KINDE-GAZARD D23.                           |

|               |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16h30 à 16h40 | EP-CO-55   | CONNAISSANCES DES ETUDIANTS EN MEDECINE A LA FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE DE COTONOU SUR LA FIEVRE HEMORRAGIQUE A VIRUS LASSA AU BENIN EN 2019 | MONGBO VIRGINIE <sup>1</sup> , SOSSA-JEROME CHARLES <sup>2</sup> , NOUDOHOUNSI MAHUGNON MAUREL <sup>3</sup> , MAKOUTODE PATRICK <sup>1</sup> , SAÏZONOU JACQUES <sup>1</sup> , OUENDO EDGARD-MARIUS <sup>1</sup> |
| 16h40 à 17h00 | Plénière 5 |                                                                                                                                                    | Modérateurs                                                                                                                                                                                                      |

## Communications Salle 3

Participer à la réunion Zoom

<https://zoom.us/j/4365108070?pwd=MHRTQkp6cTdrVFRUTDZybXY1UXdwQT09>

ID de réunion : 436 510 8070 Code secret : k2541h

**03/12/2020**

| <b>Matinée</b><br><b>Modérateur :</b> MCA SOSSA- JEROME Charles<br><b>Secrétaires :</b> BAKARY Yasmine, TOGNIDE Daniel, AGBANLIN Astrid, LAOUROU Félicité |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horaires</b>                                                                                                                                           | <b>Codes</b>      | <b>Titres</b>                                                                                                                                                                            | <b>Auteurs</b>                                                                                                    |
| 11h00 à 11h10                                                                                                                                             | SS-CO-01          | COMBINAISON DE LA RECHERCHE DES MARQUEURS DEL'INFLAMMATION ET D'AUTO-REACTIVITE POUR UNMEILLEURDIAGNOSTIC DE LA POLYARTHRITE RHUMATOIDE, UN PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE NEGLIGEE AU BENIN | OMAR MALADE, GATIEN ADJIMON LOKOSSOU, HILAIRE DOSSOU-YOVO, JULIEN AZONNAKPO, YEDIA DJOHOUN, EVELYNE JOSETTE LOZES |
| 11h10 à 11h20                                                                                                                                             | SS-CO-02          | CONTRIBUTION DES ARMEES A LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE A COVID-19, SENEGAL 2020.                                                                                                          | ABDOUL AZIZ NDIAYE1,2, BABACAR NDAO2, OUSSEYNOU KA1, , ANTA TAL DIA3                                              |
| 11h20 à 11h30                                                                                                                                             | SS-CO-03          | HEMATOME RETRO-PLACENTAIRE : PRISE EN CHARGE ET PRONOSTIC MATERNO-FŒTAL AU CHU-MEL                                                                                                       | ABOUBAKAR M1, DANGBEMEY P2, TOGNIFODE V2, LOKOSSOU MSH1,TONATO-BAGNAN A                                           |
| 11h30 à 11h40                                                                                                                                             | SS-CO-04          | EFFICACITE DU TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH ET QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE AU CENTRE DE SANTE DE COTONOU 1 EN 2018                                   | BADIROU AGUEMON <sup>1</sup> , MOUSSA BACHABI <sup>1</sup> , FERNAND GUEDOU <sup>2</sup> .                        |
| 11h40 à 11h50                                                                                                                                             | SS-CO-05          | STRATEGIE ORGANISATIONNELLE AUX SOINS INTENSIFS FACE A L'INFECTION AU SARS-COV2 : MODELE DES CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC DE BRUXELLES                                             | AHOOUNOU E1*, AKODJENOU J2, ZOUMENOU E1, HANTSON P3                                                               |
| <b>11h50 à 12h00</b>                                                                                                                                      | <b>Plénière 1</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>Modérateurs</b>                                                                                                |

|                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12h00 à 12h 10       | SS-CO-06                                                                                                                                                                                     | COMPORTEMENT DE RECHERCHE DE TRAITEMENT CONTRE LE PALUDISME A L'HOPITAL PREFECTORALE DE COYAH, GUINEE                                                                  | ALIOUNE CAMARA1,2, ABDOULAYE 2 TOURE2, ALEXANDRE DELAMOU2, MAMADOU OURY CISSE1, 4, ABOUBACAR SIDIKI CONDE2, TIMOTHEE GUILAVOGUI2,3 |
| 12h10 à 12h 20       | SS-CO-07                                                                                                                                                                                     | PRATIQUES ALIMENTAIRES ET GESTION DU DIABETE CHEZ LES DIABETIQUES SUIVIS AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE ET A LA BANQUE D'INSULINE DE COTONOU AU BENIN | HOUNGLA M F N, AGUEH V D, MOUBARAC JC                                                                                              |
| 12h20 à 12h30        | SS-CO-08                                                                                                                                                                                     | EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE SURVEILLANCE DES DECES MATERNELS/NEONATALS ET RIPOSTE AU BENIN                                                       | CHRISTELLE BOYI1, CHRISTIAN AGOSSOU1, KEFILATH BELLO1, ARMELLE VIGAN1, HASHIM HOUNKPATIN1, JEAN-PAUL DOSSOU1                       |
| 12h30 à 12h40        | SS-CO-09                                                                                                                                                                                     | FACTEURS SOCIOCULTURELS INFLUENÇANT L'UTILISATION DES SOINS POST-PARTUM DANS LE SUD DU BENIN : UNE ETUDE ETHNOGRAPHIQUE                                                | CHRISTELLE BOYI HOUNSOU 1, ARMELLE VIGAN 1, JEAN-PAUL DOSSOU 1, CHARLOTTE GRYSEELS 2, LYDIE KANHONOU 1, THERESE DELVAUX            |
| 12h40 à 12h50        | SS-CO-10                                                                                                                                                                                     | LES FACTEURS DE LA FAIBLE FREQUENTATION DES STRUCTURES SANITAIRES EN CONTEXTE DE PANDEMIE DU COVID 19 AU BENIN                                                         | NADINE SOSSOUHOUNTO, ELIETH EYEBIYI                                                                                                |
| <b>12h50 à 13h00</b> | <b>Plénière 2</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                 |
| <b>Après midi</b>    | <b>Modérateur : Pr AYELO Paul</b> Assistants : <b>MCA AZANDJEME Colette</b> , MA MAKOUTODE Patrick<br><b>Secrétaires : BAKARY Yasmine, TOGNIDE Daniel, AGBANLIN Astrid, LAOUROU Félicité</b> |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
| 14h00 à 14h10        | SS-CO-11                                                                                                                                                                                     | EVALUATION DE LA QUALITE DE LA GESTION DES EFFLUENTS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES DU DEPARTEMENT DE LITTORAL AU BENIN                                       | JUDICAËL TODEDI1*, GHISLAIN SOPOH1, CYRIQUE DEGBEY1,2, AROUNA YESSOUFOU3, FIDELE SUANON3, DAOUDA MAMA3                             |
| 14h10 à 14h20        | SS-CO-12                                                                                                                                                                                     | OBSTACLES LIES A L'ACCOUCHEMENT ASSISTE DANS L'ARRONDISSEMENT DE TAÏACOU EN 2018-2019                                                                                  | DAVID HOUETO, EMMANUEL SAMBIENI, NATACHA KINIANTA                                                                                  |
| 14h20 à 14h30        | SS-CO-13                                                                                                                                                                                     | ETHNOGRAPHIE DU PORT OBLIGATOIRE DE MASQUES EN CONTEXTE PANDEMIQUE DE LA COVID-19 A COTONOU                                                                            | ROCH HOUNGNIHIN                                                                                                                    |
| 14h30 à 14h40        | SS-CO-14                                                                                                                                                                                     | IN VITRO ASSESSMENT OF ANTIPLASMODIAL ACTIVITY AND ACUTE ORAL TOXICITY OF DISSOTIS ROTUNDIFOLIA                                                                        | ROCK DJEHOU1, RAFIOU ADAMOU1, ABDOU MADJID O. AMOUSSA1,                                                                            |

|                      |                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                   | EXTRACTS AND FRACTIONS ON PLASMODIUM FALCIPARUM STRAINS                                                                                                                  | ADANDE A. MEDJIGBODO2, ANATOLE LALEYE3, AMBALIOU SANNI1, LUC S. DJOGBENOU2 AND LATIFOU LAGNIKA1                                                               |
| 14h40 à 14h50        | SS-CO-15          | DETERMINANTS SOCIAUX DE LA FAIBLE UTILISATION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE CHEZ LES FEMMES EN AGE DE PROCREER DANS LA COMMUNE DE ZE AU BENIN                            | SAIZONOU JACQUES, DIARRA MAMADOU, MONGBO VIRGINIE, CAPOCHICHI G. JUSTINE, OUENDO EDGARD-MARIUS                                                                |
| <b>14h50 à 15h00</b> | <b>Plénière 3</b> |                                                                                                                                                                          | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                            |
| 15h00 à 15h10        | SS-CO-16          | INFECTIONS NOSOCOMIALES DANS LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE PEDIATRIE ET GENETIQUE MEDICALE AU CNHU-HKM DE COTONOU EN 2019 ET EN 2020 : PREVALENCE ET FACTEURS EXPLICATIFS | NATHALIE SENAMI SESSOU1, CYRIAQUE COMLAN DEGBEY1,2, GHISLAIN EMMANUEL SOPOH1, EDGARD-MARIUS D. OUENDO1, MICHEL MAKOUTODE1V                                    |
| 15h10 à 15h20        | SS-CO-17          | EFFICACITE DES MASQUES CHIRURGICAUX ET ARTISANAUX EN MILIEU UNIVERSITAIRE AU BENIN EN 2020                                                                               | JULIANA DAHOU1, RAFIATOU BA1, DAMIEN TOFFA1, BRIFELLE TENTE1, HARVEY JOHNSON1, CARINE ZINSOU1, FRANCK MIGNANWANDE1,PARFAIT DJOSSOU1, *ROCH CHRISTIAN JOHNSON1 |
| 15h20 à 15h30        | SS-CO-18          | EXPERIENCE DES MEDECINS DE PREMIERE LIGNE FACE A LA PANDEMIE DE COVID-19 AU BENIN                                                                                        | KEFILATH BELLO1,2, CHRISTIAN AGOSSOU1, JEAN-PAUL DOSSOU1,2, MARCEL ZANNOU3, JAN DE LEPELEIRE4, BART CRIEL2                                                    |
| 15h30 à 15h40        | SS-CO-21          | LIBERALISATION DES PRIX DES PRODUITS DE LA SANTE REPRODUCTIVE , MATERNELLE , NEONATALE ET INFANTILE (SRMNI) AU BENIN : DEFIS ET PERSPECTIVES                             | MAKOUTODÉ P ; TOSSOU E, BIAOU A,, SODABI N, GBAGUIDI A                                                                                                        |
| 15h40 à 15h50        | SS-CO-20          | ITINERAIRE THERAPEUTIQUE ET DEVENIR DES ENFANTS ADMIS AUX URGENCES DE PEDIATRIE DU CNHU-HKM DE COTONOU                                                                   | LALYA F(1), ZOHOUN L(1), ALIHONOU F(1), BEHANZIN M(1), BAGNAN TOSSA L(1), D'ALMEIDA M(1)                                                                      |
| 15h50 à 16h00        | SS-CO-19          | EVALUATION DE LA PRESCRIPTION DES ANTIBIOTIQUES AU CNHU-HKM ET AU CHU-MEL DE COTONOU                                                                                     | LALYA F(1), TCHIAKPE ENIANLOKO N (1), SÈÏDOU ALASSANE H (1), FOTSO KUATE G(1), BAGNAN TOSSA L(1), D'ALMEIDA M(1)                                              |
| 16h10 à 16h20        | <b>Plénière 4</b> |                                                                                                                                                                          | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                            |

|               |                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16h20 à 16h30 | SS-CO-22          | EVALUATION DE L'EFFICACITE DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION MENEES EN MILIEU SCOLAIRE EN 2019 SUR LA CONDUITE ROUTIERE DANS LES COMMUNES DE COTONOU ET D'ABOMEY-CALAVI AU BENIN                 | PATRICK MAKOUTODE1, BORIS PLECK DANSOU1, YOLAINE GLELE AHANHANZO1, MOUSSILIOU NOËL PARAISO1, GHISLAIN EMMANUEL SOPOH1                      |
| 16h30 à 16h40 | SS-CO-23          | PRATIQUE DES GESTES BARRIERES LIES A LA PREVENTION CONTRE LA COVID19 CHEZ LES ADULTES A BRAZZAVILLE                                                                                              | YVONNE V. Y. MAVOUNGOU1, BAZABA NELLY2, LEVI MANKOUSSOU3, JEAN CLAUDE MOBOUSSE4                                                            |
| 16h40 à 16h50 | SS-CO-24          | FACTEURS ASSOCIES A LA NON-CONFORMITE DU DIAGNOSTIC ET DU TRAITEMENT DU PALUDISME AUX DIRECTIVES NATIONALES DANS TROIS SITES SENTINELLES DISTRICT SANITAIRE SAN-PEDRO, COTE D'IVOIRE, 2018-2019. | SOMPOHI JACQUES TOKPA1, PAULINE K. YANOGO1, JOSEPH OTSHUDIANDJEKA1, MARIANNE KOUAWO1, ISSAKA TIEMBRE2, VROH JOSEPH BENIE BI2               |
| 16h50 à 17h00 | SS-CO-25          | EVALUATION DE L'ACTIVITE ANTIOXYDANTE ET LA COMPOSITION PHYSICO-CHIMIQUE DES EXTRAITS AQUEUX ET HYDRO-ETHANOLIQUE DES FEUILLES DE MORINDA CITRIFOLIA LINNE (RUBIACEAE).                          | YAYA DJAWAL1, 2, PIERRE H.DANSOU1, 2, JOACHIM D. GBENOU1, 2, AHOUNOU JUDITH1, AGBODJOGBE WILFRID1                                          |
| 17h00 à 17h10 | SS-CO-26          | COUT DU BILAN BIOLOGIQUE DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DREPANOCYTOSE A LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE DES MALADIES DU SANG (CUMAS) DU CNHU-HKM                                                        | ZOHOUN A1,2,3, BAGLO-AGBODANDE T1,2, LADEKPO S1, MASSI R1, HOUSSOU B1, OROU GUIWA C1, DEHOUMON J1, MEHOU J1, ANANI L1,2, KINDE-GAZARD D1,2 |
| 17h10 à 17h20 | SS-CO-27          | PALUDISME ET URGENCES DREPANOCYTAIRES A LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE DES MALADIES DU SANG DU CNHU-HKM DE COTONOU                                                                                    | ZOHOUN A1,2,3, BAGLO-AGBODANDE T1,2, DODO R1, HOUSSOU B1, MASSI R1, OROU GUIWA C1, DÈHOUMON J1, MEHOU J1, ANANI L1,2, KINDE-GAZARD D1,2    |
| 17h30 à 17h45 | <b>Plénière 5</b> |                                                                                                                                                                                                  | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                         |

04/12/2020

| 04/12/2020            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matinée               | <b>Modérateur :</b> MCA SOSSA- JEROME Charles<br><b>Secrétaires :</b> BAKARY Yasmine, TOGNIDE Daniel, AGBANLIN Astrid, LAOUROU Félicité |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |
| 10h30 à 10h 40        | SS-CO-28                                                                                                                                | PERCEPTIONS ET PRATIQUES DE PREVENTION DU DIABETE DANS LA COMMUNE DE COME EN 2019                                                                                                        | ATIOGBE KOUGBESSI GELASE1, DEGBEY CYRIAQUE1,2, SOPOH GHISLAIN E. 1, OUENDO EDGARD-MARIUS D1.                                                                                                                      |
| 10h40 à 10h 50        | SS-CO-29                                                                                                                                | PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET CLINIQUE DE 52 CAS D'ULCERE DE BURULI INFECTES PAR LE VIH PRIS EN CHARGE DANS 3 CDTUBS DU BENIN DE 2005 A 2019                                                 | ADJIMON GILBERT AYELO1, YVES THIERRY BAROGUI2, RONALD GNIMAVO3, JEAN GABIN HOUZEZO4, ESAÏ ANAGONOU4, ROCH CHRISTIAN JOHNSON5, GHISLAIN EMMANUEL SOPOH6                                                            |
| 10h50 à 11h 00        | SS-CO-30                                                                                                                                | EVOLUTION DES ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DEPARTEMENTAL DE L'OUEME/PLATEAU                                                                       | R. A. SITOU1, B. D. AVOCETIEN1, O. D. AZE 1, 2, D. HOUNHOUENOU1, J. TEBA1, B. AKPLOGAN1.                                                                                                                          |
| 11h00 à 11h 10        | SS-CO-31                                                                                                                                | ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUE, CLINIQUE, PARACLINIQUE, THERAPEUTIQUE ET EVOLUTIF DES PLEURESIES                                                                                                | BOGNON GILLES, PADONOU CAROLINE, DAH-BOLINON ROMEO, SAGBO GRATIEN                                                                                                                                                 |
| 11h10 à 11h 20        | SS-CO-32                                                                                                                                | ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'OFFRE DES SOINS DE SANTE DANS LES CENTRES DE SANTE URBAINS AU SUD DU BENIN: CAS DES CENTRES DE SANTE D'AYELAWADJE, DE SAINT-MICHEL ET D'AÏDJEDO DE COTONOU | DAMIEN B. GEORGIA1,2, AGUEMON BADIROU2, CAPO-CHICHI P. SENA2, LISBOA LUCRESSE2, SOSSOU BENOIT1, MEDEDJI DAMIEN1, GANSOU G. MAGLOIRE2, AGODOKPESSI GILDAS2, MEHINTO DELPHIN2, OUENDO EDGARD3, LE HESRAN JEAN-YVES4 |
| <b>11h 20 à 11h30</b> | <b>Plénière 1</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                                                                                |
| 11h30 à 11h40         | SS-CO-33                                                                                                                                | CONNAISSANCES EN RADIOPROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX RAYONNEMENTS IONISANTS EN MILIEU MEDICAL EN AFRIQUE FRANCOPHONE SUB-SAHARIENNE                                             | B.G. DAMIEN1, D.W.M.M. AKANNI2, K.-M. SAVI DE TOVE2, S.M. KIKI2, S.B.M.G. ADJADOHOUN3, P. YEKPE-AHOUANSSOU3, B. AGUEMON 3, P. AYELO3, K.P. N'ZI4                                                                  |

|                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11h40 à 11h50         | SS-CO-34                                                                                           | EFFICACITE DES MASQUES CHIRURGICAUX ET ARTISANAUX EN MILIEU UNIVERSITAIRE AU BENIN EN 2020                                                                   | JULIANA DAHOU, RAFIATOU BA, DAMIEN TOFFA, BRIFELLE TENTE, HARVEY JOHNSON, CARINE ZINSOU, FRANCK MIGNANWANDE, PARFAIT DJOSSOU, ROCH CHRISTIAN JOHNSON                                                                        |
| 11h50 à 12h00         | SS-CO-35                                                                                           | DE LA DECOUVERTE A LA DEPENDANCE AUX SUBSTANCES PSYCHOACTIVES CHEZ LES ADOLESCENTS EN MILIEU SCOLAIRE A COTONOU                                              | A. ODILE KOUGBLENOU; PIERRE C. MELIHO; FERDINAND M. ADOUNKPE; A. ASSAD. BIO SYA; C. ARNAUD AGBANLINSOU; ERIC AKPI; MONIQUE OUASSA; ROCK HOUNGNIHIN; CODJO ADOLPHE KPATCHAVI; DISMAND HOUINATO; ANATOLE LALEYE; AUREL ALLABI |
| 12h00 à 12h10         | SS-CO-36                                                                                           | SUBSTANCES PSYCHOACTIVES EN MILIEU SCOLAIRE AU BENIN : ETHNOGRAPHIE DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT, DES USAGES ET DES EFFETS CHEZ LES ADOLESCENTS ET JEUNES | A. ODILE KOUGBLENOU; FERDINAND M. ADOUNKPE; PIERRE C. MELIHO; C. ARNAUD AGBANLINSOU; A. ASSAD BIO SYA; MONIQUE OUASSA; ROCK HOUNGNIHIN; CODJO ADOLPHE KPATCHAVI; DISMAND HOUINATO; ANATOLE LALEYE                           |
| 12h10 à 12h20         | SS-CO-37                                                                                           | CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DE LA POPULATION DE LA REGION DE DAKAR SUR LA COVID-19                                                                 | MAMADOU MAKHTAR MBACKÉ LEYE, KEITA I M, BASSOUM O                                                                                                                                                                           |
| <b>12h 20 à 12h30</b> | <b>Plénière 2</b>                                                                                  |                                                                                                                                                              | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                                                                                          |
| 12h30 à 12h40         | SS-CO-38                                                                                           | LES DETERMINANTS DU RECOURS AUX SOINS DE SANTE PAR LES ADULTES A BRAZZAVILLE                                                                                 | YVONNE V. Y. MAVOUNGOU, BAZABA NELLY, LEVI MANKOUSSOU, JEAN CLAUDE MOBOUSSE                                                                                                                                                 |
| 12h40 à 12h50         | SS-CO-39                                                                                           | OBESITE ET FACTEURS ASSOCIES AU BENIN, ANALYSE DES DONNEES DE L'ENQUETE NATIONALE STEPS 2015.                                                                | C MIZÉHOUN-ADISSODA, R SANTOS, S AMIDOU, C HOUEHANOU, T TOTAH, H ROBIN, D HOUINATO                                                                                                                                          |
| 12h50 à 13h 00        | SS-CO-40                                                                                           | STATUT EN VITAMINE D DU SUJET AGE BENINOIS VIVANT DANS LA VILLE DE COTONOU                                                                                   | C MIZÉHOUN-ADISSODA, Y. BAKARY OZAVINO, B AWÈDÉ                                                                                                                                                                             |
| <b>13h 00 à 13h15</b> | <b>Plénière 3</b>                                                                                  |                                                                                                                                                              | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Après midi</b>     | <b>Modérateur : Pr AYELO Paul</b> Assistants : <b>MCA AZANDJEME Colette</b> , MA MAKOUTODE Patrick |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |

|                      | <b>Secrétaires : BAKARY Yasmine, TOGNIDE Daniel, AGBANLIN Astrid, LAOUROU Félicité</b> |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14h00 à 14h10        | SS-CO-41                                                                               | INFECTION PAR PAPILLOMAVIRUS ET VIH CHEZ LES FEMMES CONSULTANT A L'HOPITAL MILITAIRE D'ABIDJAN, COTE D'IVOIRE                                                                | ZINZENDORF NY, CABLAN MA, TAHOU-APETE S, DOTIA A, LATHRO JS, AGBESSI-KOUASSI BT, BROU K, KRIZO A, DJATCHI RA, ZABA FS |
| 14h10 à 14h20        | SS-CO-42                                                                               | CHUTES CHEZ LES PERSONNES AGEES A PROPOS DE 210 CAS DANS UN CENTRE DE GERIATRIE (SENEGAL)                                                                                    | OUSSEYNOU KA, CHEIKH TACKO DIOP, ABDOU AZIZ NDIAYE, BORIS ARTHUR ABOUA GHÉBI, MOUNTAGA ELIMANE DIA SOUHAIBOU NDONGO   |
| 14h20 à 14h30        | SS-CO-43                                                                               | QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA VOIE PUBLIQUE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DEPARTEMENTAL DE L'OUEME PLATEAU                            | CYRIAQUE DEGBEY 1,2, YOLAINE GLELE AHANHANZO1, CHARLEMAGNE AHOUANSO1, EDGARD-MARIUS OUENDO1,                          |
| 14h30 à 14h40        | SS-CO-44                                                                               | EVALUATION QUALITATIVE DES SOINS ET SERVICES OFFERTS AUX PATIENTS TRAUMATISES CRANIO-ENCEPHALIQUES A L'UNITE DE NEUROCHIRURGIE DU CHUD/B-A EN 2018.                          | FATIGBA O.H1,2, QUENUM K 1,2, AMOUSSOU ARISTIDE 1, HODONOU ADRIEN                                                     |
| 14h40 à 14h50        | SS-CO-45                                                                               | EVALUATION DE LA CAPACITE DES AGENTS DE SANTE A EVALUER L'ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS DE ZERO A ONZE MOIS A L'UNITE DE VACCINATION DU CENTRE DE SANTE DE COTONOU 1 EN 2019 | SOUSSIA T.1*, SALLOUA D.1, SOSSA JEROME C.2                                                                           |
| 14h50 à 15h 00       | SS-CO-46                                                                               | EVALUATION DE LA QUALITE DES ASSOCIATIONS DE DOSE FIXE (ADF) D'ANTITUBERCULEUX DISTRIBUEES PAR LE PROGRAMME NATIONAL CONTRE LA TUBERCULOSE AU BENIN                          | A. YEMOA*1,2, J. BONOU3, P. WACHINO4, A. ADJAGBONI1,2, A. AMOUSSA 1,2, V. HABYALIMANA5, P. DOFFON1,2, R.D MARINI6,7   |
| <b>15h00 à 15h10</b> | <b>Plénière 4</b>                                                                      |                                                                                                                                                                              | <b>Modérateurs</b>                                                                                                    |
| 15h10 à 15h20        | SS-CO-47                                                                               | DIAGNOSTIC SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE DE L'ORGANISATION DES SECOURS ET L'ACCUEIL DES VICTIMES D'ACCIDENT DE LA ROUTE DANS QUATRE HOPITAUX DE COTONOU                              | MENSAH COFFI MAHUGNON ANDRE AÏNA, YOLAINE GLELE-AHANHANZO, N'KOUÉ EMMANUEL SAMBIENI, MARC PONCELET                    |
| 15h20 à 15h30        | SS-CO-48                                                                               | OFFRE DE SOINS DE SANTE CURATIFS ET ACCOUCHEMENTS EN MILIEU ADJA : COMMENT LE SYSTEME LOCAL DE SANTE DEVIENT LA FABRIQUE DES PRESTATAIRES DE SOINS INFORMELS ?               | 1ERIC AYEDJO AKPI, 1CORY GBEDODE SINSIN, 1LEONTINE ELISABETH GNAHOU ET 1CODJO ADOLPHE KPATCHAVI                       |

|                      |                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15h30 à 15h40        | SS-CO-49          | EVALUATION DU SYSTEME DE SURVEILLANCE DE LA TUBERCULOSE BOVINE EN ABATTOIR DANS LE DISTRICT DE BAMAKO DE JUIN 2018 A MAI 2019                                                              | S. DARA1,3, DARASEYDOU@GMAIL.COM S. SIDIBÉ 2, CHEICK OUMAR FOMBA3 AK SIDIBÉ4, EL HADJ ISSA A. SY1,4, MARIAME LAURENT C. KOUAWO1, OJB OTSHUDIANDJEKA 1, DR FADIMA1, P. YANOGO1,5, N. MEDA1.5 |
| 15h40 à 15h50        | SS-CO-50          | EFFET D'UN PROGRAMME D'EDUCATION NUTRITIONNELLE SUR LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE DES HANDBALLEUSES JUNIORS BENINOISES AUX CAMPS D'ENTRAINEMENT PREPARATOIRES DU CHALLENGE TROPHY ZONAL 2019 | SIDONIEMAHOUNGNON KIKI1, ISSIAKO BIONIGAN1, POLYCARPE GOUTHON1                                                                                                                              |
| 15h50 à 16h00        | SS-CO-51          | ETUDE DES DETERMINANTS INFLUENÇANT LE NON-RESPECT DU CIRCUIT DU PATIENT DANS LA PYRAMIDE SANITAIRE DU BURKINA FASO.                                                                        | MEDA ZIEMLE CLEMENT1,2, NIKIEMA NICOLE1, HIEN HERVE3, ILBOUDO BERNARD3, SOMBIE ISSIAKA1,4, SAVADOGO GUESWENDE BLAISE LEON1,2                                                                |
| <b>16h00 à 16h10</b> | <b>Plénière 5</b> | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
| 16h10 à 16h20        | SS-CO-52          | ETUDE DES PRATIQUES DE PRESCRIPTION EN CONSULTATION DE MEDECINE GENERALE DANS LES HOPITAUX DES DISTRICTS SANITAIRES DE LA REGION DES HAUTS-BASSINS, BURKINA FASO.                          | MEDA ZIEMLE CLEMENT1,2, ILBOUDO DIANE1, HIEN HERVE3, ILBOUDO BERNARD3, SOMBIE ISSIAKA1,4, SAVADOGO GUESWENDE BLAISE LEON1,2                                                                 |
| 16h20 à 16h30        | SS-CO-53          | ANALYSE DE L'OFFRE DES SERVICES DE SANTE ESSENTIELS DANS LE CONTEXTE DE LA REPONSE A LA COVID-19 EN COTE D'IVOIRE EN 2020                                                                  | AKA LBN, ORSOT TE, SABLE S, OKOUBO G, EKOUE FK, KPEBO DOD, ANO MN, AKA DA, DAGNAN NS                                                                                                        |
| 16h30 à 16h40        | SS-CO-54          | EFFETS DE L'EPIDEMIE A COVID-19 SUR LES ACTIVITES DE ROUTINE DU PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION EN COTE D'IVOIRE EN 2020                                                                   | EKRA KD, AKA LBN, KPEBO DOD, OKOUBO G, SABLE S, AKA DA, ORSOT TE, EKOUE FK.                                                                                                                 |
| 16h40 à 16h50        | SS-CO-55          | VACCINATION ET INEGALITES SOCIALES DE SANTE : EXEMPLE DE LA RETICENCE DES PARENTS FACE A LA VACCINATION CONTRE LA POLIOMYELITIS A NIKKI ET A KALALE EN 2020                                | HOUETO D1, ASSANI L1, AIFA J2                                                                                                                                                               |

|                      |                   |                                                                                                                                                     |                                                                         |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16h50 à 17h00        | SS-CO-56          | LES ENFANTS DE MOINS DE 6 MOIS FACE A LA MALNUTRITION AIGUË AU CHU-MEL DE COTONOU (BENIN) : AMPLEUR ET FACTEURS EXPLICATIFS                         | MOUSSILIOU NOËL PARAISO, ABDOUL MADJIDI SOILIH, CLEMENCE METONNOU       |
| 17h20 à 17h30        | SS-CO-57          | CONVULSIONS NEONATALES DANS L'UNITE DE NEONATOLOGIE DU SERVICE DE PEDIATRIE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET DEPARTEMENTAL DE L'OUEME-PLATEAU | BOGNON GILLES, PADONOU CAROLINE, MATONDO-BABOTE PATRICIA, SAGBO GRATIEN |
| <b>17h00 à 17h10</b> | <b>Plénière 6</b> |                                                                                                                                                     | <b>Modérateurs</b>                                                      |

## Communications Salle 4

Participer à la réunion Zoom

<https://zoom.us/j/9843471159?pwd=VHNkekNsUXNSRFNMWG5RMWdFVzdEQT09>

ID de réunion : 984 347 1159 Code secret : Ja1q2v

03/12/2020

| Matinée                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modérateur :</b> MC DJOGBENOU Luc<br><b>Secrétaires :</b> AKOHA Félicité, DOSSOU-YOVO Harold, YAMADJAKO Deneuve, ALLADASSI Lisette |          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| Horaires                                                                                                                              | Code     | Titres                                                                                                                                                                                        | Auteurs                                                                                                                                                                |
| 11h00 à 11h10                                                                                                                         | CL-CO-01 | EFFETS COMBINES DU DECOCTE DE «CYMBOPOGON CITRATUS» ET DES EXERCICES PHYSIQUES SUR LES PARAMETRES ANTHROPOMETRIQUES ET HEMODYNAMIQUES DES FEMMES OBESES AU CAMEROUN                           | J. F. AHOUNOU AÏKPE A. HAMADOU ; W. R GUESSOGOL.; BONOY; B. GNANSOUNOU ; J. D. GBENOU ET H. P. DANSOU                                                                  |
| 11h10 à 11h20                                                                                                                         | CL-CO-02 | EVALUATION DES ACTIVITES ANTI-INFLAMMATOIRE ET CICATRISANTE DES EXTRAITS AQUEUX DE VIGNA COMOSA BAKER ET DE ZEA MAYS L. CHEZ LES RATS WISTAR.                                                 | KOTIN MAHOUTIN LUCRECE, AHOUNOU AÏKPE FIFAMIN JUDITH, AKAKPO BAÏ HUGUETTE, ASSOGBA MAHOUDO FIDELE, GODONOU JEAN-BENOIT1 GBENOU DJIMON JOACHIM, DANSOU HOUNDJIVI PIERRE |
| 11h20 à 11h30                                                                                                                         | CL-CO-03 | NIVEAU ET EFFET DES CONDITIONS DE VIE SUR LES MARIAGES D'ADOLESCENTES EN AFRIQUE DE L'OUEST : UNE META-ANALYSE DES DONNEES INDIVIDUELLES ISSUES DES ENQUETES DEMOGRAPHIQUES ET DE SANTE (EDS) | ACOTCHEOU PACOME EVENAKPON, SAIZONOU ZINSOU JACQUES, AFFO MINGNIMON ALPHONSE, DANSOU JUSTIN                                                                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11h30 à 11h40        | CL-CO-04                                                                                                                                                                                                             | FACTEURS DE RISQUE COMPORTEMENTAUX MODIFIABLES ASSOCIES AUX FACTEURS DE RISQUE BIOLOGIQUES CHEZ LES SUJETS A RISQUE DE DIABETE DE TYPE 2 AU BENIN.                      | C. G. METONNOU-ADANHOUME *, C. S. AZANDJEME, C. J. SOSSA, G. E. SOPOH, M. N. PARAÏSO1, I BIO NIGAN, V. AGUEH                             |
| 11h40 à 11h50        | CL-CO-05                                                                                                                                                                                                             | IMPACTS DE LA PANDEMIE DE COVID-19 SUR LES MOBILITES ET MIGRATIONS HUMAINES                                                                                             | AGBADJAGAN YACINTHE VIDEOU, DOUBOGAN YVETTE ONIBON                                                                                       |
| <b>11h50 à 12h00</b> | <b>Plénière 1</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                       |
| 12h00 à 12h 10       | CL-CO-06                                                                                                                                                                                                             | EVALUATION DU POUVOIR METHANOGENE DE LA JACINTHE D'EAU SUR LE LAC NOKOUE A GANVIE AU BENIN                                                                              | ALFRED D. DOHOU*, KOTO N'GOBI GABIN, CLEMENT A.KOUCHADE, BASILE B. KOUNOUHEWA                                                            |
| 12h10 à 12h 20       | CL-CO-07                                                                                                                                                                                                             | PROTOCOLE D'EXERCICE PHYSIQUE DE COURTE DUREE POUR LE TRAITEMENT DU DIABETE DE TYPE 2                                                                                   | BERNADIN GNANSOUNOU, JUDITH F. AHOUNOU AÏKPE, AZE OSCAR, JEAN-BENOIT M. GODONOU, JOACHIM D. GBENOU, PIERRE H. DANSOU ET BARNABE AKPLOGAN |
| 12h20 à 12h30        | CL-CO-08                                                                                                                                                                                                             | TENDANCES DE L'ENROLEMENT DES ADOLESCENTES DANS DES UNIONS POLYGAMES AU BENIN                                                                                           | ACOTCHEOU PACOME EVENAKPON, AFFO MINGNIMON ALPHONSE, SAIZONOU ZINSOU JACQUES, DANSOU JUSTIN                                              |
| 12h30 à 12h40        | CL-CO-09                                                                                                                                                                                                             | POLLUTION MICROBIOLOGIQUE DE L'AIR AU NIVEAU DE DEUX CARREFOURS A SENS GIRATOIRE A INTENSITE DE TRAFIC ROUTIER ELEVE A COTONOU, BENIN                                   | CODJO-SEIGNON L. M. KARINE, SOPOH GHISLAIN E., DEGBEY CYRIAQUE, ZINHOTA RAOUL, AINA MARTIN P.                                            |
| 12h40 à 12h50        | CL-CO-10                                                                                                                                                                                                             | VARIATION TEMPORELLE DE LA POLLUTION DE L'AIR AU NIVEAU DE DEUX CARREFOURS A SENS GIRATOIRE DE LA VILLE DE COTONOU (BENIN)                                              | L. M. KARINE CODJO-SEIGNON, VINCENTIA M. C. HOUSSOU QUENUM, PHILIPPE KOSSOLOU, MARTIN P. AINA, E. GHISLAIN SOPOH                         |
| <b>12h50 à 13h00</b> | <b>Plénière 2</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                       |
| <b>Après-midi</b>    | <b>Modérateur :</b> MCA SAIZONOU Jacques <b>Assistants :</b> MC PARAISO Noel, MCA AGUEMON Badirou, MA KEDOTE Marius<br><b>Secrétaires :</b> AKOHA Félicité, DOSSOU-YOVO Harold, YAMADJAKO Deneuve, ALLADASSI Lisette |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
| 14h00 à 14h10        | CL-CO-11                                                                                                                                                                                                             | EFFET DE LA SAISON SUR LA CAPACITE DU SCORE DE DIVERSITE ALIMENTAIRE A PREDIRE LA QUALITE NUTRITIONNELLE DU REGIME ALIMENTAIRE DES ENFANTS DE 6 A 23 MOIS AU SUD-BENIN. | ELIE KOUKOU, WALIOU AMOUSSA HOUNKPATIN, MATHILDE SAVY, CELINE TERMOTE, GERVAIS NTANDOU-BOUZITOU                                          |

|                      |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14h10 à 14h20        | CL-CO-12          | PRATIQUE DES GESTES BARRIERES LIES A LA PREVENTION CONTRE LA COVID19 CHEZ LES ADULTES A BRAZZAVILLE                                                              | YVONNE V. Y. MAVOUNGOU, BAZABA NELLY, LEVI MANKOUSSOU, JEAN CLAUDE MOBOUSSE                                                    |
| 14h20 à 14h30        | CL-CO-13          | L'ACCEPTABILITE DU TEST DE DEPISTAGE DE LA COVID 19 CHEZ LES POPULATIONS DE BRAZZAVILLE                                                                          | YVONNE V. Y. MAVOUNGOU, BAZABA NELLY, LEVI MANKOUSSOU, JEAN CLAUDE MOBOUSSE                                                    |
| 14h30 à 14h40        | CL-CO-14          | ACTIVITES ANTIBACTERIENNES DE DERIVES EN SERIE IMIDAZOPYRIDINYL-CHALCONE SUR LES SOUCHES DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTANT A LA METICILLINE                     | NANGA Z, OUATTARA M, KOUASSI-AGBESSI BT, LATHRO J, OUASSA T A, GUINA D, CABLAN M, LOUKOU G.                                    |
| 14h40 à 14h50        | CL-CO-15          | CONNAISSANCE DES MEDECINS GENERALISTES DE LA VILLE DE COTONOU SUR LE LUPUS ERYTHEMATEUX SYSTEMIQUE                                                               | AZON-KOUANOU A., ABOUÉ N.C.A., MISSIHO M.S.G., DANSOU E., SOKADJO Y.M., AGBODANDE K.A., WANVOEGBE A.F., ZANNOU D.M., HOUNGBÉ F |
| <b>14h50 à 15h00</b> | <b>Plénière 3</b> |                                                                                                                                                                  | <b>Modérateurs</b>                                                                                                             |
| 15h00 à 15h10        | CL-CO-16          | IMPACTS FINANCIERS ET REPERCUSSIONS A COURT TERME DES TRAUMATISMES CRANIO-ENCEPHALIQUES AU SEIN DES FAMILLES DES VICTIMES A PARAKOU EN 2018                      | FATIGBA O.H1,2, QUENUM K 1,2, OUOROU S1 , TAMOU BIO E 2,3                                                                      |
| 15h00 à 15h20        | CL-CO-17          | MODELISATION MATHEMATIQUE DE LA RESISTANCE DES SOUCHES DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE UROPATHOGENES AUX FAMILLES D'ANTIBIOTIQUES CLASSIQUES                            | JEAN-PIERRE GNIMATIN*, VICTORIEN DOUGNON, PHENIX ASSOGBA, JERROLD AGBANKPE, HORNEL KOUDOKPON, ESTHER DEGUENON, KAFAYATH FABIYI |
| 15h20 à 15h30        | CL-CO-18          | RESISTANCE AUX VIOLENCES CONJUGALES FAITES AUX FEMMES : UNE SOCIO-ANTHROPOLOGIE DES REPRESENTATIONS SOCIALES A KPOMASSE AU SUD DU BENIN                          | HERVE AGBOMAHENAN ET DODJI AMOUZOUVI                                                                                           |
| 15h30 à 15h40        | CL-CO-19          | HABITUDES ALIMENTAIRES ET TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX CHEZ DES PATIENTS HOSPITALISES AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUTOU MAGA DE COTONOU | SOUSSIA T.1*, AHAMADA A.1, SOSSA JEROME C.2                                                                                    |
| 15h40 à 15h50        | CL-CO-20          | EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE PREVENTION PRIMAIRE DE LA MALNUTRITION                                                                           | ADEYEMON O. F.1, HOUNGLA N. F.1, SOUSSIA T.1*, SOSSA JEROME C.2                                                                |

|                     |                   |                                                                                                                                        |                                                                  |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                     |                   | DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS DANS L'ARRONDISSEMENT D'IKPINLE EN 2016                                                                  |                                                                  |
| 15h50 à 16h00       | CL-CO-21          | REPRESENTATIONS SOCIALES DE L'ORIGINE DE LA MALADIE : UN DETOUR POUR COMPRENDRE LE SYNCRETISME ISLAMIQUE DANS LA COMMUNE DE LA KOZAH 1 | BOUSSANLEGUE TCHABLE, NADIEDJOH TCHELEGUE YAROU GUERA CHABI YORO |
| <b>16h0 à 16h10</b> | <b>Plénière 4</b> |                                                                                                                                        | <b>Modérateurs</b>                                               |

| COMMUNICATION AFFICHEES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Communications Salle 4                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| 04/12/2020                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| Participer à la réunion Zoom                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="https://zoom.us/j/9843471159?pwd=VHNkekNsUXNSRFNMWG5RMWdFVzdEQT09">https://zoom.us/j/9843471159?pwd=VHNkekNsUXNSRFNMWG5RMWdFVzdEQT09</a> |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| ID de réunion : 984 347 1159 Code secret : Ja1q2v                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| Matinée                                                                                                                                           | <b>Modérateur :</b> Ir METONNOU Clémence <b>Assistants :</b> SOSSOU Ericie, ATTIOGBE Gélase<br><b>Secrétaires :</b> TALON Yvonne, SOSSOUHOUNTO Silas, ADE Justine |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| 11h30 à 14h00                                                                                                                                     | CL-CA-01                                                                                                                                                          | INFLUENCE DE L'INFECTION BACTERIENNE DU SPERME SUR LA FECONDITE MASCULINE                                                                                                      | SCHAMA I. F. ZANNOU, V. BRICE ARMAND FANOU, SYLVAIN HOUNSOUNNOU, EUSTACHE ACLINO, ANGELE TH. AHOYO                                                                                                        |
|                                                                                                                                                   | CL-CA-02                                                                                                                                                          | ETUDE COMPAREE DE LA TOLERANCE AU D-GLUCOSE DE ANNONA SENEGALENSIS PERS ANNONACEAE ET DE TRICHILIA PRIEUREANA A. JUSS MELIACEAE CHEZ LE RAT WISTAR : POTENTIEL ANTIDIABETIQUE. | ROLAND B. KANGBETO, EUGENE SELIDJI ATTAKPA, LATIFOU LAGNIKA, MOUNIROU TCHACHEDRE, RAPHAÏO OROU PIAMI.                                                                                                     |
|                                                                                                                                                   | CL-CA-03                                                                                                                                                          | ACTIVITE DIURETIQUE ET SALIDIURETIQUE D'EXTRAITS DE JATROPHA CURCAS DANS LE TRAITEMENT TRADITIONNEL DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE AU BENIN                                      | ALDO L. F. RIGIS GNONLONFOUN, JUDITH F. AHOUNOU AÏKPE, WILFRID K. AGBODJOGBE, REGIS ANANI, FALCAO PADONOU, JEAN-BENOIT M. GODONOU, HUGUETTE B AKAKPO, LUCRECE KOTIN, JOACHIM D. GBENOU, PIERRE H. DANSOU. |
|                                                                                                                                                   | CL-CA-04                                                                                                                                                          | CONSOMMATION D'ALCOOL ET OBESITE ABDOMINALE PARMI LA POPULATION ADULTE AU BURKINA FASO: ANALYSE A PARTIR D'ETUDE TRANSVERSALE                                                  | KADARI CISSE, HENRI GAUTIER OUEDRAOGO, SENI KOUANDA                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | CL-CA-05                                                                                                                                                                                        | EFFET DE LA STIMULATION ELECTRIQUE TRANSCUTANEE DANS LA PRISE EN CHARGE DES DOULEURS INDUITES PAR LE HANDIBASKET AU BURKINA FASO                        | D. OUEDRAOGO, O. D. AZE, J. AHOUNOU, B. AKPLOGAN, R. SITOU                                                                                                                          |
|                      | CL-CA-06                                                                                                                                                                                        | ACTIVITES ANTIBACTERIENNES DE L'EXTRAIT ETHANOLIQUE DE CRATEVA ADANSONII DC. (CAPPARIDACEAE) RECOLTEE A DASSA-ZOUME AU CENTRE DU BENIN                  | ZINSOU FRANCK MIGNANWANDE, ROCH CHRISTIAN JOHNSON, ARMELLE SABINE YELIGNAN HOUNKPATIN, DAMIEN TOFFA, GRATIEN BONI, EUSTACHE ENOCK HOUETO, PARFAIT DJOSSOU, MADJID OLATOUNDE AMOUSSA |
|                      | CL-CA-07                                                                                                                                                                                        | ANALYSE DES RESIDUS D'ANTIBIOTIQUES DANS LES PRODUITS LAITIERS ET DERIVES DE CONSOMMATION DANS LES COMMUNES AGRO-PASTORALES AU NORD DU BENIN.           | AZANMANVO M. YEDJENOU, MURIELLE F. SOGLO, ANTOINE V. HINSON, HAZIZ SINA, RAZACK ADEOTI, ROUSSEAU DJOUAKA                                                                            |
|                      | CL-CA-08                                                                                                                                                                                        | ANALYSE DES RESIDUS D'INSECTICIDES DE SYNTHESE DANS LES PRODUITS LAITIERS ET DERIVES DE CONSOMMATION DANS LES COMMUNES DE BANIKOARA, KANDI ET GOGOUNOU. | AZANMANVO M. YEDJENOU, MURIELLE F. SOGLO, ANTOINE V. HINSON, HAZIZ SINA, RAZACK ADEOTI, ROUSSEAU DJOUAKA                                                                            |
|                      | CL-CA-09                                                                                                                                                                                        | PERCEPTIONS ET PRATIQUES SOCIALES LIEES A LA MALNUTRITION DES ENFANTS DANS LES COMMUNES DE BOUKOMBE, COBLY, MATERI ET TANGUIETA                         | FLORENTINE B. MERE, ROCH A. HOUNGNIHIN (LABORATOIRE D'ANTHROPOLOGIE MEDICALE APPLIQUEE, UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI)                                                                 |
|                      | CL-CA-10                                                                                                                                                                                        | PROJET D'ENQUETE SUR LES CONNAISSANCES, PERCEPTIONS ET PRATIQUES ALIMENTAIRES DES FOOTBALLEURS DU BENIN AU COURS DE LA SAISON SPORTIVE 2020             | RAÏSSA AKPLOGAN, ISSIAKO BIO NIGAN, MOUSSILIOU PARAÏSO, JEAN-PAUL KOUASSI, LEONCE LINTA                                                                                             |
| <b>13h00 à 14h00</b> | <b>Commentaire des posters</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Après-midi</b>    | <b>Modérateur :</b> MA KEDOTE Marius <b>Assistants :</b> Ir METONNOU Clémence, ATTIOGBE Gélase<br><b>Secrétaires :</b> AKOHA Félicité, DOSSOU-YOVO Harold, YAMADJAKO Deneuve, ALLADASSI Lisette |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| 14h00-15h00          | CL-CA-11                                                                                                                                                                                        | FACTEURS ASSOCIES A LA PRATIQUE DE L'EDUCATION NUTRITIONNELLE A LA MATERNITE DU CHU-MEL DE COTONOU EN REPUBLIQUE DU BENIN EN 2019                       | DANGBEMEY DP, SOSSA JC, TOGNIFODE V, ABOUBAKAR M, KOUMAGBEAFIDE V, HOUNKPATIN BIB, TONATO-BAGNAN JA, DENAKPO JL                                                                     |

|                      |                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | CL-CA-12                       | CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES ADOLESCENTS DE LA VILLE DE BRAZZAVILLE EN MATIERE DE LA PREVENTION DU COVID-19                                                                                 | MOUSSOUAMI SIMPLICE INNOCENT, BOUSSANA ALAIN, NSOMPI FLORENT, ALONGO YVON ROCK GHISLAIN, MBEMBA FRANÇOIS, GOUTHON POLYCARPE                                     |
|                      | CL-CA-13                       | PRESCRIPTIONS POLITIQUES ET MEDICALES VERSUS PRATIQUES QUOTIDIENNES FACE AU COVID 19 : ESSAI POUR LA COMPREHENSION DES DIFFICULTES D'APPROPRIATION DES MESURES RESTRICTIVES, AU SUD-BENIN                | PHILIPPINE SONON                                                                                                                                                |
|                      | CL-CA-14                       | SITUATION PSYCHO-SOCIALE ET RESULTATS SCOLAIRES DES ORPHELINS ET ENFANTS VIVANT AVEC LE VIH/SIDA (ETUDE REALISEE A L'HOPITAL BETHESDA ET AU CENTRE SOCIAL DE LA ZONE SANITAIRE V DE LA VILLE DE COTONOU) | YELOME D. MARDOCHEE, FIOSSI-KPADONOU EMILIE, BOKO C. GABRIEL, HOUESSO D.Y. PATRICK                                                                              |
|                      | CL-CA-15                       | SYNTHESE DES TRAITEMENTS ENDOSCOPIQUES UROLOGIQUES AU CNHU-HKM DE COTONOU                                                                                                                                | DODJI MAGLOIRE I. YEVI, ANDILATH LASSISSI, FRED HODONOU, MICHEL MICHAËL AGOUNKPE, JEAN SOSSA, GILLES NATCHAGANDE, MICHEL MICHAËL AGOUNKPE, JOSUE D.G. AVAKOUDJO |
|                      | CL-CA-16                       | PRATIQUES DU SEXTING EN MILIEU UNIVERSITAIRE : ETUDE DESCRIPTIVE A L'UNIVERSITE DE PARAKOU (NORD BENIN) EN 2019                                                                                          | FRANCIS TOGNON TCHEGNONS1, CHABI ALPHONSE BIAOU2, ELIE ATAÏGBA1, EDMOND BODJRENOU1, ANSELME DJIDONOU1, PROSPER GANDAH01                                         |
|                      | CL-CA-17                       | TRANSLOCATION 46, XY,t(2,5)(q37.3;q35.) DANS UN CAS D'INFERTILITE MASCULINE                                                                                                                              | AZONBAKIN S, AWEDE B, ADOVOEKPE D, GBEDO G M, ADJAGBA M, LALEYE A.                                                                                              |
| <b>15h00 à 16h00</b> | <b>Commentaire des posters</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salle 5                                                                                                                                      | <div>Participer à la réunion Zoom</div> <div><a href="https://zoom.us/j/9025647687?pwd=OUc1bFBseFhyOGs2L1lmWFJ1R0Mzd09">https://zoom.us/j/9025647687?pwd=OUc1bFBseFhyOGs2L1lmWFJ1R0Mzd09</a></div> <div>ID de réunion : 902 564 7687</div> <div>Code secret : nd11HL</div> |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| Communications Salle 5                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| 03/12/2020                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| Matin                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diffusion de Posters                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
| Modérateur : Ir METONNOU Clémence Assistants : SOSSOU Ericie, ATTIOGBE Gélase<br>Secrétaires : TALON Yvonne, SOSSOUHOUNTO Silas, ADE Justine |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| Horaires                                                                                                                                     | Code                                                                                                                                                                                                                                                                       | Titres                                                                                                                                                                          | Auteurs                                                                                                                        |
| 11H00-13H00                                                                                                                                  | EP-CA-01                                                                                                                                                                                                                                                                   | INVESTIGATION AUTOUR D’UN CAS DE COVID 19 AU CENTRE NATIONAL DE CARDIOLOGIE DE NOUAKCHOTT, MAURITANIE, DISTRICT DE KSAR, REGION DE NOUAKCHOTT OUEST, MAI 2020                   | H.M. MOHAMEDOU (RESIDENT MPH-BFELTP)                                                                                           |
|                                                                                                                                              | EP-CA-02                                                                                                                                                                                                                                                                   | FACTEURS ASSOCIES A L’INFECTION A VIH CHEZ LES POPULATIONS CLES A PARAKOU AU BENIN EN 2019 : CAS DES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LES HOMMES (HSH) / TRANSGENRES (TG) | O.M.C. OUATTARA,* E.E. AGBE, F. TCHEGNONSI TOGNON                                                                              |
|                                                                                                                                              | EP-CA-03                                                                                                                                                                                                                                                                   | INVESTIGATION D’UN CLUSTER DE COVID-19 A ADJENGRE DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE SOTOUBOUA, TOGO, 2020.                                                                          | HILIM P. M*, N’DJAO A., TCHALLA A. E, BASSOTI S., DJISSENOU K. E, BADADOKO P. E , NAPO P., N’TAPI K., KINDE R., TAMEKLOE T. A. |
|                                                                                                                                              | EP-CA-04                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVALENCE DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE CHEZ LES MILITAIRES DE LA GARNISON DE PARAKOU AU BENIN EN 2019                                                                          | HOUEHANOU YESSITO CORINE NADEGE, CODJO LEOPOLD , NASSOUHOUDE FLORENTIN, DOHOU HUGUES, SONOU ARNAUD                             |

|                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | EP-CA-05                       | PREVALENCE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE AU COURS DE LA GROSSESSE AU BENIN : ANALYSE DES DONNEES DE L'ENQUETE STEPS 2015                                                                                                                                  | HOUEHANOU YESSITO CORINE NADEGE, AMIDOU SALIMANOU, SONOU ARNAUD, TCHIBOZO MARIA-CONCHETA, HOUINATO DISMAND                                                                                                                                                                    |
|                    | OH-CA-01                       | MODELISATION DE LA DISTRIBUTION SPATIALE ET DE LA NICHE ECOLOGIQUE DE QUELQUES VECTEURS POTENTIELS INCRIMINES DANS LA TRANSMISSION DE L'ULCERE DE BURULI : ELABORATION DE LA CARTE DE RISQUE DE PROPAGATION DE LA MALADIE AU BENIN                       | PERUGINE AKOTON*, KOUROUMA KOURA ET JEAN COSSI GANGLO                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | OH-CA-02                       | MODELISATION DE LA NICHE ECOLOGIQUE DU RAT MASTOMYS NATALENSIS, VECTEUR DE LA FIEVRE LASSA AU BENIN ET EN AFRIQUE                                                                                                                                        | NANDJIB SANOUSSI, KOUROUMA KOURA ET JEAN COSSI GANGLO                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | OH-CA-03                       | HYPERTENSION ARTERIELLE CHEZ LES TRAVAILLEURS DE LA SBBE DE BOHICON                                                                                                                                                                                      | ADJOBIMEY M, HINSON VIKKEY, MIKPONHOUE R, LOKO E, AYELO P.                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | OH-CA-04                       | ASSESSING THE EFFICACY OF TWO DUAL ACTIVE INGREDIENTS LONG-LASTING INSECTICIDAL NETS FOR CONTROL OF MALARIA TRANSMITTED BY PYRETHROIDS-RESISTANT VECTORS IN BENIN: STUDY PROTOCOL FOR A THREE ARMED, SINGLE BLINDED, CLUSTER RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL | MANFRED ACCROMBESSI, JACKIE COOK, CORINE NGUFOR, ARTHUR SOVI, EDOUARD DANGBENON, BOULAIS YOVOGAN, HILAIRE AKPOVI, AUORE HOUNTO, CHARLES THICKSTUN, GIL G. PADONOU, FILEMON TOKPONNON, LOUISA MESSENGER, IMMO KLEINSHMIDT, MARK ROWLAND, MARTIN AKOGBETO, NATACHA PROTOPOPOFF. |
|                    | OH-CA-05                       | AGROFORESTERIE, ETHNOMEDECINE HUMAINE, PHYTOMEDECINE VETERINAIRE ET CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE : QUEL LIEN ?                                                                                                                                        | OHOUKO OKRI FRÉJUS HANS, ESSEH KOMLAVI, KOUDOUVO KOFFI, SOHA ARNAUD, ADOUKO JACQUES, GUEDEGBE GANIOU, DOUGNON TOSSOU JACQUES, GBEASSOR MESSANVI.                                                                                                                              |
| <b>13H00-14H00</b> | <b>Commentaire des posters</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Après midi</b>  | <b>Diffusion de Posters</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | EP-CA-06                       | EPIDEMIOLOGIE DE L'INFECTION A PAPILLOMAVIRUS CHEZ LES PATIENTES SUIVIES AU CHU DE TREICHVILLE, ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)                                                                                                                                  | ZINZENDORF NY, TAHOU-APETE S, DOTIA A, DJATCHI R, TONI THOMAS D'AQUIN, BOHOUSOU E, AKO-AKO AB, DJAMAN AJ                                                                                                                                                                      |

|             |          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14H00-16H00 | EP-CA-07 | INVESTIGATION D'UN CLUSTER DE COVID-19 AU CHR SOKODE, DISTRICT SANITAIRE DE TCHAOUDJO, TOGO, 2020                                 | BASSOTI S., N'DJAO A., TCHALLA-A E., HILIM P.M., NABA M.A., ABDOULAYE A., AHONSOU D., KINDE R., TAMEKLOE S.A.                                                                     |
|             | EP-CA-08 | CONTAMINATION METALLIQUE DES EAUX USEES DES COLLECTEURS D'AKPAKPA, DEVERSEES DANS LE LAC NOKOUE AU BENIN.                         | BOKOSSA HERVE KOUESSIVI JANVIER1,2, TOFFA DAMIEN1, BONI GRATIEN1, JOHNSON ROCH CHRISTIAN1, KANHOUNNON GBEDODE WILFRIED3, FIOGBE EMILE DIDIER2                                     |
|             | EP-CA-09 | PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A L'HEPATITE B CHEZ LES TRAVAILLEUSES DU SEXE VIH NEGATIVES, COTONOU-BENIN, 2014-2015             | ROSETTE KOUFEDE1, F. A. GUEDOU2, S. SALIFOU3, M. B. LAURENT1, O.J.B. OTSHUDIANDJEKA1,5, Y FR. DIALLO 1, PK YANOGO 1,4, N MEDA1,4                                                  |
|             | EP-CA-10 | EPIDEMIOLOGIE DES TUMEURS DU SEINS DE LA FEMME DE MOINS DE 40 ANS A COTONOU (R. BENIN)                                            | DANGBEMEY DP*1, GNANGNON F, TOGNIFODE V1, ABOUBAKAR M2, LOKOSSOU S2, OGOUDJOBI M1, PALMADA U1, TSHABU-AGUEMON C2, HOUNKPATIN BIB1, TONATO-BAGNAN1 JA, DENAKPO JL2.                |
|             | EP-CA-11 | FACTEURS ASSOCIES A LA PRATIQUE DE L'EDUCATION NUTRITIONNELLE A LA MATERNITE DU CHU-MEL DE COTONOU EN REPUBLIQUE DU BENIN EN 2019 | DANGBEMEY DP1, SOSSA JC3, TOGNIFODE V1, ABOUBAKAR M2, KOUMAGBEAFIDE V4, HOUNKPATIN BIB1, TONATO-BAGNAN1 JA, DENAKPO JL2.                                                          |
|             | OH-CA-06 | ETUDE DES ACTIVITES ANTIPLASMODIALE, ANTIOXYDANTE ET DE LA PHYTOCHIMIE DE LA TIGE FEUILLEE DE MORINDA LUCIDA LINN (RUBIACEAE)     | ESSEH K.4*, KOUDOUVO K., AHAMA-ESSEH K.Y.S., KAROU D.S., AGBONON A., KOKOU K, GBEASSOR M.                                                                                         |
|             | OH-CA-07 | TOXICITE DES POLLUANTS ISSUS DE LA BIOMASSE SUR QUELQUES PARAMETRES PHYSIOLOGIQUES DES RATS WISTAR                                | JEAN-BENOIT M. GODONOU, JUDITH F. AHOUNOU AÏKPE, CREDO R. KOUKPOLIYI, ARMEL HOUNKONNOU, HUGUETTE B AKAKPO, LUCRECE KOTIN, JOACHIM D. GBENOU, PIERRE H. DANSOU.                    |
|             | OH-CA-08 | TEACHING ONE HEALTH: ANIMAL HUSBANDRY IN A POST-GRADUATE INTERDISCIPLINARY CURRICULUM                                             | DJIBO IDRISSE SIDIKOU1, YANNICK CARON2, CATHERINE DELGUSTE3, ABDOULKARIM ISSA IBRAHIM4, MAMAN LAMINOU IBRAHIM5, HASSANE ADAKAL1, JEAN-LUC HORNICK3 AND NICOLAS ANTOINE-MOUSSIAUX3 |

|                      |                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | OH-CA-09                       | SOINS INFIRMIERS EN CONTEXTE D'EPIDEMIE A MORTALITE RAPIDE : CAS DE LA FIEVRE HEMORRAGIQUE A VIRUS LASSA AU BENIN                                   | DR AHOSSI EUSEBE COOVI, DR OTTI ANDRE, M. ADOUNVO OLIVIER, M. TOKPANOU K. HUBERT CHARBEL                                                                              |
|                      | OH-CA-10                       | PORTAGE NASAL DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTANT A LA METICILLINE CHEZ DES VOLONTAIRES SAINS ET DES MALADES HOSPITALISE A OUAGADOUGOU, BURKINA FASO | SORE S.1, 2, SANOU S.3, BEOGO S.1, DAKOUO S.N.P.3, DJAMALLADINE M.D.4, ILBOUDO K.S.1, ZOUNGRANA J. <sup>3</sup> , PODA A. <sup>3</sup> , OUEDRAOGO A.S.2, SANOU I.1,2 |
| <b>16h00 à 17h00</b> | <b>Commentaire des posters</b> |                                                                                                                                                     | <b>Modérateurs</b>                                                                                                                                                    |

| 04/12/2020                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matin                                                                                                                                                             |          | Diffusion de posters                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| <b>Modérateur :</b> Ir METONNOU Clémence <b>Assistants :</b> SOSSOU Ericie, ATTIOGBE Gélase<br><b>Secrétaires :</b> TALON Yvonne, SOSSOUHOUNTO Silas, ADE Justine |          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
| 10h30 à 13H00                                                                                                                                                     | SS-CA-01 | PERFORMANCE DE MARCHÉ DE PATIENTS HEMIPLEGIQUES CHRONIQUES D'ORIGINE VASCULAIRE : ETUDE COMPARATIVE A PARTIR DE PARCOURS DE SOINS.                                                    | OSCAR D. AZE, ETIENNE OJARDIAS, THIERRY ADOUKONOU, DIANA RIMAUD, HERMES GBAGUIDI, OYENE KOSSI, BARNABE AKPLOGAN, PAUL CALMELS, PASCAL GIRAUX    |
|                                                                                                                                                                   | SS-CA-02 | URINARY TRACT INFECTIONS IN BENIN: EXPLORING THE VIRULENCE FACTORS AND ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES AND VIRULENCE GENES AMONG BACTERIA ISOLATES                                        | PHENIX ASSOGBA1, VICTORIEN DOUGNON1, JERROLD AGBANKPE1, ESTHER DEGUENON1, KAFAYATH FABIYI1, EDNA HOUNSA1, ALIDAH ANIAMBOSSOU1, JACQUES DOUGNON1 |
|                                                                                                                                                                   | SS-CA-03 | COVID-19 REVELATRICE D'UNE TUBERCULOSE PULMONAIRE : A PROPOS DE 2 CAS                                                                                                                 | AZON-KOUANOU, A., AGBODANDE K.A., WANVOEGBE A.F., MISSIHO M.S.G, DANSOU E., SOKADJO Y.M, ZANNOU D.M., HOUNGBE F.                                |
|                                                                                                                                                                   | SS-CA-04 | RISQUE D'ESCARRE CHEZ DES PATIENTS D'UN HOPITAL UNIVERSITAIRE DU BENIN : LE ROLE PROPRE INFIRMIER A L'EPREUVE                                                                         | OTTI A., DHOSSOU K.G., SANNY M. A. N., AGUESSY VOGNON F. S.                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   | SS-CA-05 | REFERENCE OU ORIENTATION GUIDEE DES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC D'AUTRES HOMMES (HSH) SEROPOSITIFS AU VIH POUR L'INITIATION PRECOCE AU TRAITEMENT ANTI RETROVIRAL AU MALI. | HESSOU PEPIN SEPTIME HECTOR*, DICKO MOUSSA, KANOUTE ABDUL KARIM, KEITA FATOUMATA ; ABDOULAYE SANOGO, KEITA YACOUBA.                             |

|               |                         |                                                                                                                |                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | SS-CA-06                | STROKE BURDEN IN BENIN 2008 TO 2018:<br>SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE                                    | PERVENCHE FOTSO, OYENE KOSSI, THIERRY<br>ADOUKONOU                                                                                    |
|               | SS-CA-07                | ASSESSING THE EFFICACY OF NUTRITION<br>EDUCATIONAL VIDEOS TO IMPROVE<br>BREASTFEEDING PRACTICES IN RURAL BENIN | BODJRENOU FIFALI SAM ULRICH1,2*, AMOUSSA<br>HOUNKPATIN WALIOU1, TERMOTE CELINE3, SALAKO<br>VALERE1, SAVY MATHILDE4                    |
|               | SS-CA-08                | PARCOURS ET RECONNAISSANCE DES<br>PROFESSIONNELS DE SANTE COMMUNAUTAIRE                                        | OUSSEYNOU KA, NDEYE FATOU OUMAR SY,<br>MOUNTAGA ELIMANE DIA, ABDOUL AZIZ NDIAYE<br>CHEIKH TACKO DIOP, BOUBACAR GUEYE, LAMINE<br>GUEYE |
|               | SS-CA-09                | MOTIVATION PROFESSIONNELLE ET RISQUES<br>PSYCHOPATHOLOGIQUES DES AGENTS DE<br>GARDIENNAGE EN AFRIQUE           | GEORGES M. KUESSI*, MAGLOIRE GANSOU **,<br>MARDOCHÉE YELOME***, THIERRY KOUGBEAGBEDE                                                  |
| 13h00 à 14h00 | Commentaire des posters |                                                                                                                | Modérateurs                                                                                                                           |

## III- RESUME DES COMMUNICATIONS

### COMMUNICATIONS ORALES

#### AXE 1 : SANTE PUBLIQUE

##### SS-CO-01

#### COMBINAISON DE LA RECHERCHE DES MARQUEURS DEL'INFLAMMATION ET D'AUTO-REACTIVITE POUR UN MEILLEUR DIAGNOSTIC DE LA POLYARTHRITE RHUMATOIDE, UN PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE NEGLIGEE AU BENIN

**Auteurs :** Omar Malade<sup>1</sup>, Gatien Adjimon Lokossou<sup>1</sup>, Hilaire Dossou-Yovo<sup>2</sup>, Julien Azonnakpo<sup>1</sup>, Yédia Djohoun<sup>1</sup>, Evelyne Josette Lozes<sup>1</sup>

**Affiliations :** 1 : Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi, Université d'Abomey-Calavi, Calavi, Bénin 2 : Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, Cotonou, Bénin

**Introduction :** La polyarthrite rhumatoïde (PR) est un problème majeur de santé publique mais demeure négligée dans les pays à faibles revenus. Le pronostic à moyen et long terme de la PR repose sur l'établissement d'un diagnostic correct et l'initiation d'un traitement précoce. Les anomalies biologiques telles que la présence d'auto-anticorps spécifiques précèdent de plusieurs années le déclenchement clinique de la maladie. L'objectif de ce travail était d'étudier l'utilité de la combinaison des anticorps anti-CCP et des facteurs rhumatoïdes associée à une activité inflammatoire comme outil diagnostique prédictif de la survenue de la PR.

**Méthodes :** Nous avons conduit une étude transversale à visée descriptive et analytique en milieu hospitalier dans le sud du Bénin sur un échantillon de 71 participants atteints de PR à immunologie positive et/ou présentant des symptômes suggestifs de cette maladie datant de moins de deux mois, comparer à des participants indemnes de la maladie. Des échantillons de sang ont été recueillis chez ces participants et les différents facteurs biologiques ont été mesurés.

**Résultats :** Les anticorps anti-CCP étaient majoritairement retrouvés dans le groupe de participants qui présentaient des symptômes suggestifs de la PR. Par ailleurs, des concentrations élevées en anticorps anti-CCP associées à un syndrome inflammatoire ont été retrouvées chez 68% des participants de ce groupe. La moyenne des concentrations de ces auto-anticorps dans le groupe des participants ne souffrant pas de PR était significativement plus basse que celle des participants avec des symptômes suggestifs ( $p=0,001$ ).

**Conclusion :** Ces résultats préliminaires suggèrent que la combinaison de ces facteurs pourrait constituer un biomarqueur capital pour le diagnostic précoce de la PR. L'utilisation de cet outil pourrait ainsi améliorer la prévention secondaire et tertiaire de la maladie et la qualité de vie des personnes souffrant de PR.

**Mots clés :** Polyarthrite rhumatoïde, Biomarqueur, Diagnostic précoce

**SS-CO-02****CONTRIBUTION DES ARMEES A LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE A COVID-19, SENEGAL 2020.**

Abdoul Aziz NDIAYE<sup>1,2</sup>, Babacar NDAO<sup>2</sup>, Ousseynou KA<sup>1</sup>, , Anta TAL DIA<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Université Alioune Diop, <sup>2</sup> Direction Santé des Armées ; <sup>3</sup>Université Cheikh Anta Diop Dakar

Abdoul Aziz NDIAYE<sup>1</sup> : Maître de conférences agrégé, Université Alioune Diop de Bambey, [abdoulaziz.ndiaye@uadb.edu.sn](mailto:abdoulaziz.ndiaye@uadb.edu.sn), BP : 30 Bambey Tél : +221773665266

**Introduction :** La maladie à coronavirus 19 ou Covid-19 est une maladie infectieuse émergente, très contagieuse, apparue à Wuhan (Chine) en Novembre 2019. En mars 2020, l'OMS déclare l'épidémie à Covid-19 une pandémie. Au Sénégal, le MSAS était chargé de coordonner la lutte, avec l'implication des autres secteurs. La Direction de la Santé des Armées est un acteur essentiel de la composante intervention d'urgence de la plateforme multisectorielle « One health ». Les objectifs étaient de participer à la riposte et de contribuer à la résilience du système de santé.

**Méthode :** L'approche multisectorielle a été la pierre angulaire de la réponse. La coordination stratégique et opérationnelle est assurée par le ministère de la santé avec la participation de tous les ministères. Une revue documentaire des rapports d'activités élaborées durant avant et au cours de la pandémie, a été réalisée.

**Résultats :** au total 121 personnels dont 45 médecins ont été mis à la disposition du MSAS. Les hôpitaux militaires de niveau 2 et 3 participent au dépistage de la Covid-19. Les deux sites extrahospitaliers militaires, d'une capacité de 360 lits, ont permis la prise en charge 976 patients de la covid-19 âgés de 2 à 86 ans. L'HPD a joué le premier rôle dans la prise en charge des cas graves de covid-19 au niveau national. Le taux de mortalité y était de 25%, la moitié du taux national.

Dans le cadre de résilience du système de santé, l'hôpital principal de Dakar a pu doubler ses capacités en lits d'urgence, dédier un service de 25 lits au traitement Covid-19 et maintenir son fonctionnement optimal. Aussi, un hôpital mobile a assuré la continuité des soins au niveau de Touba pendant trois mois , avec un bilan 4 973 consultations réalisés dont 62,6% au profit des femmes.

**Conclusion :** La lutte contre la pandémie a démontré la nécessité d'approche multisectorielle performante, et le rôle des forces de défense et de sécurité en cas d'urgence sanitaire.

**Mots clés :** Covid-19, Résilience, Approche multisectorielle

**SS-CO-03****HEMATOME RETRO-PLACENTAIRE : PRISE EN CHARGE ET PRONOSTIC MATERNO-FCETAL AU CHU-MEL**

Aboubakar M<sup>1</sup>, Dangbemey P<sup>2</sup>, Tognifode V<sup>2</sup>, Lokossou MSH<sup>1</sup>, Tonato-Bagnan A

<sup>1</sup>Centre National Hospitalier Universitaire HKM, (CNHU-HKM), Cotonou

<sup>2</sup>Centre Hospitalier Universitaire de La Mere et de l'Enfant Lagune (CHU-MEL), Cotonou

**Introduction :** La grossesse et l'accouchement sont des processus naturels qui comportent de nombreux risques. Parmi les principales causes de décès maternel, les hémorragies occupent une place importante notamment les hémorragies de la délivrance, l'hématome rétro-placentaire (HRP) et le placenta prævia etc. La mortalité et la morbidité fœtale liées à l'HRP demeurent élevées et parfois, le pronostic vital maternel est menacé.

**Objectif :** Etudier l'hématome rétro-placentaire au service de Gynécologie obstétrique du CHU-MEL

**Méthodes :** Il s'agit d'une étude prospective, descriptive et analytique avec recueil prospectif des données sur une période de 20 mois allant du 1<sup>er</sup> Janvier 2017 au 30 Septembre 2018.

**Résultats :** Au total, 126 parturientes ont été incluses dans cette étude. Parmi elles 80,16% avaient un âge compris entre 20 à 35 ans. L'âge moyen était de 26,51 ans avec des extrêmes 15 à 44 ans. La prévalence de l'H.R.P était de 1,61%. La létalité fœtale liée à l'HRP était de 71,75% et celle maternelle était de 7,14%.

**Conclusion :** L'HRP est une cause importante de mortalité périnatale et de morbidité maternelle. Malgré une meilleure connaissance des facteurs de risque, il reste une complication imprévisible. Un meilleur dépistage des populations à risque et la prise de décision conséquente permettront certainement d'améliorer le pronostic de cette affection.

**Mots clés :** HRP, Pronostic, CHU-MEL

## SS-CO-04

### EFFICACITE DU TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH ET QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE AU CENTRE DE SANTE DE COTONOU 1 EN 2018

Badirou Aguemon<sup>1</sup>, Moussa Bachabi<sup>1</sup>, Fernand Guédou<sup>2</sup>.

1 : Faculté des sciences de la santé de Cotonou ; 2 : Centre de santé de Cotonou1

#### Auteur correspondant

Dr Badirou AGUEMON : Département de Santé Publique, Ecole de Santé Publique, Faculté des Sciences de la santé de Cotonou

E-mail : [baguemon@yahoo.fr](mailto:baguemon@yahoo.fr)

**Objectifs :** L'étude a pour objectifs de déterminer le taux de succès thérapeutique et d'apprécier la qualité de la prise en charge chez PVVIH suivies au centre de santé de Cotonou 1.

**Méthode :** Il s'agit d'une étude transversale à visée descriptive et qualitative réalisée sur une période de 13 mois (novembre 2017 à décembre 2018) et prenant en compte 297 PVVIH suivies au centre de santé de Cotonou 1

**Résultats :** L'âge moyen des enquêtés était de  $42,60 \pm 10,69$  ans avec des extrêmes allant de 19 à 78 ans ; le poids moyen était de  $61,13 \pm 13,50$  kg avec des extrêmes allant de 37 à 115 kg et 69% des enquêtés sont de sexe féminin. L'étude a révélé que près de 4/5 des PVVIH enquêtées (79%) étaient en succès thérapeutique et ce succès thérapeutique était plus observé chez les professionnelles de sexe (PS) que dans les autres groupes (86% chez les PS contre 71% chez les HSH et 79% dans la population générale en dehors des PS et des HSH) ; la majorité des enquêtés (54%) étaient sous TDF+3TC+EFV (protocole de première intention recommandé par la politique nationale) et seulement 2 malades étaient sous protocole non conforme au document national de politique, norme et procédure de prise en charge des PVVIH du Bénin. Globalement, 64% des enquêtés étaient très satisfaits de la qualité des services offerts dans le centre. Néanmoins 85% des PVVIH enquêtées n'étaient pas satisfaites du screening de la tuberculose de même que seulement 35% étaient satisfaites de la prise en charge psychologique et de l'appui nutritionnel.

**Conclusion :** Dans le contexte du centre de santé de Cotonou 1, l'objectif du 3<sup>ème</sup> 90 de l'ONUSIDA est réalisable d'ici 2022. Cependant, l'atteinte de cet objectif pourrait être compromise si le screening de la tuberculose de même que la prise en charge psychologique et l'appui nutritionnel ne sont pas améliorés.

**Mots clés :** VIH, traitement antirétroviral, professionnelle de sexe, succès thérapeutique, Cotonou

**SS-CO-05****STRATEGIE ORGANISATIONNELLE AUX SOINS INTENSIFS FACE A L'INFECTION AU SARS-CoV2 : MODELE DES CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC DE BRUXELLES**

Ahounou E<sup>1\*</sup>, Akodjenou J<sup>2</sup>, Zoumenou E<sup>1</sup>, Hantson P<sup>3</sup>.

1/Service polyvalent d'anesthésie réanimation, CHNU-HKM, Cotonou 2/ Service d'Anesthésie Réanimation, CHU-MEL, Cotonou 3/ Cliniques Universitaires Saint-Luc

**\*Auteur correspondant** : Docteur Ahounou Ernest Tél. : +229 96 98 37 77

E.mail : [ahounousteph@yahoo.fr](mailto:ahounousteph@yahoo.fr)

**Introduction** : nous rapportons le modèle d'organisation des soins intensifs des Cliniques Universitaires Saint-Luc de Bruxelles pendant notre stage dans le service, en réponse à la pandémie liée à la maladie Covid-19.

**Objectifs** : Décrire l'organisation mise en place par les soins intensifs des CUSL.

- Relever les points positifs applicables dans les pays de l'Afrique Subsaharienne.

**Méthode** : étude observationnelle, descriptive, aux soins intensifs des CUSL, sur quarante-cinq jours (du 15 mars au 30 avril). Les points abordés étaient l'organisation logistique, la gestion de l'admission des malades, les procédures de prise en charge, les résultats obtenus en terme d'évolution clinique des Covid-19, nombre de soignants infectés et en capacité d'accueil des malades.

**Résultats** : l'organisation mise en place aux soins intensifs des CUSL a permis de doubler leur capacité d'accueil, de mobiliser suffisamment de ressources humaines et de disposer de médicaments et du matériel médical face à la crise. Cinquante-quatre malades COVID 19 ont été pris en charge, vingt-huit malades ont été intubés et mis sous ventilation artificielle (51,85%). Douze décès ont été enregistrés parmi les malades ventilés soit 42,85%. Quatre malades ont été extubés (14,28%) ; trente malades ont été guéris soit 55,55% et sortis des soins intensifs ; six malades ont été mis sous oxygénation extracorporelle (ECMO). Douze malades restaient intubés à J45. Quatre soignants ont été confirmés infectés au SARS-CoV2, tous traités et guéris.

**Conclusion** : l'organisation mise en place aux soins intensifs des CUSL a permis une meilleure gestion de la pandémie due au SARS-CoV2. Ce modèle très coûteux, pour un résultat décevant ne saurait être une priorité pour les pays Africains. L'Afrique doit s'inspirer de l'organisation, mais donner plus de priorité à la prévention.

**Mots clés** : Covid-19, soins intensifs, organisation, CUSL

**SS-CO-06****COMPORTEMENT DE RECHERCHE DE TRAITEMENT CONTRE LE PALUDISME A L'HOPITAL PREFECTORALE DE COYAH, GUINEE**

Alioune Camara<sup>1,2</sup>, Abdoulaye 2 Touré<sup>2</sup>, Alexandre Delamou<sup>2</sup>, Mamadou Oury Cissé<sup>1, 4</sup>, Aboubacar Sidiki Conde<sup>2</sup>, Timothee Guilavogui<sup>2,3</sup>

1- Programme national de lutte contre le paludisme, Guinée

2- Département de santé publique, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Guinée

3 - Département des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital national de Donka, Guinée

4 - Direction des grandes endémies et de la lutte contre les maladies, Ministère de la Santé, Guinée

**Contexte :** Actuellement, moins de 18% des enfants atteints de fièvre et de paludisme reçoivent en Guinée un traitement recommandé de combinaison thérapeutique à base d'artémisinine (CTA). Pour comprendre pourquoi la couverture reste faible, il est nécessaire d'examiner le cheminement de la recherche de soins entre le début de la maladie fébrile et le traitement approprié.

**Méthodes :** Une étude transversale a été menée auprès de 600 patients atteints de paludisme recherchant un traitement de février à juin 2019 à l'hôpital du district de Coyah en Guinée. Les caractéristiques sociodémographiques et le parcours de recherche de traitement rapportée ont été décrites. Les sources de recherche de traitement ont été classées comme conventionnelles (centre de santé, établissement privé, hôpital) ou alternatives (automédication, médecine traditionnelle/ phytothérapie). Une régression logistique a été utilisée pour déterminer les facteurs associés au retard dans la recherche de soins dans les établissements de santé (> 48 heures après l'apparition de la fièvre).

**Résultats :** La plupart des patients interrogés étaient âgés de plus de 5 ans (63,8%), de sexe masculin (56,3%) et résidait en milieu rural (77,3%). Le premier recours pour les patients interrogés dans la recherche de soins de santé était un traitement conventionnel pour 39%, 17% avaient cherché un traitement traditionnel/phytothérapie et 44% avaient recouru à l'automédication. Au total, 75,5% des patients avaient reçu un traitement contre le paludisme au troisième recours de recherche de traitement. Les parcours de recherche de traitement les plus courants incluaient l'utilisation de l'hôpital seul (10,7%), les institutions privées puis l'hôpital (12,2%), les centres de santé puis l'hôpital (9,5%) et l'automédication puis les institutions privées et l'hôpital (9,2%). L'utilisation de la médecine alternatives a été signalée pour 63,2% des patients. Seuls 143 (23,8%) des participants ont cherché un traitement dans les établissements de santé dans les 48 heures suivant l'apparition de la fièvre. Le diagnostic du paludisme grave [OR ajusté (ORa) = 2,56, intervalle de confiance à 95% : 1,41 - 4,64], paludisme associé à une autre maladie [ORa = 2,43 : 1,34 - 4,42] et première recours étant la médecine alternative [ORa = 2,89: 1,95 - 4,29] étaient associées à une utilisation tardive des établissements de santé.

**Conclusions :** Des services de santé plus accessibles et abordables et de meilleurs programmes de communication pour le changement de comportement sont nécessaires pour accroître la demande de prestataires conventionnels.

**Mots clés :** Recherche de traitement contre le paludisme, hôpital préfectorale, Guinée

## SS-CO-07

### PRATIQUES ALIMENTAIRES ET GESTION DU DIABETE CHEZ LES DIABETIQUES SUIVIS AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE ET A LA BANQUE D'INSULINE DE COTONOU AU BENIN

Mme HOUNGLA M F N : Institut National Médico-Sanitaire (INMeS)

Prof AGUEH V D: Institut Régional de Santé Publique (IRSP)

Prof MOUBARAC JC : Université de Montréal

**Introduction :** Le diabète est en progression au Bénin et sa prévalence est passée de 2,9% en 2008 à 12,4% en 2015. Or, il existe peu de données sur les facteurs favorisant ou aggravant la gestion de cette maladie. Cette étude vise à évaluer les pratiques alimentaires des diabétiques et leur prise en charge nutritionnelle au Bénin. **Matériel et méthode :** Il s'agit d'une étude transversale auprès de 252 diabétiques âgés de 18 ans et plus suivis au Centre National

Hospitalier Universitaire (CNHU) et à la banque d'insuline de Cotonou. Des rappels alimentaires de 24h, des questionnaires et des mesures d'hémoglobine glyquée ont été colligés auprès des diabétiques et des entrevues semi dirigées ont été réalisées auprès de 18 professionnels de santé. Les tests de Chi 2, de Fisher ainsi que le test non paramétrique U de Mann-Whitney ont permis de rechercher les associations entre les pratiques alimentaires et la gestion du diabète. De plus, une grille d'analyse a permis de qualifier la prise en charge nutritionnelle des diabétiques par les professionnels de la sante. **Résultats** : Dans l'ensemble, les individus suivis au CNHU gèrent mieux leur diabète que ceux de la banque d'insuline. Il existe une différence significative dans la gestion du diabète selon l'âge et la profession. Les pratiques alimentaires sont surtout basées sur la cuisine maison mais les plats cuisinés souffrent de manque de diversité. Peu de diabétiques ont une bonne gestion de leur diabète et ceux-ci reçoivent une prise en charge nutritionnelle déficiente variant d'un centre de diabétologie à l'autre. **Conclusion** : Il est important de mieux étudier les pratiques alimentaires des diabétiques, de standardiser la prise en charge nutritionnelle et de recruter des nutritionnistes dans les services de diabétologie au Bénin.

**Mots clés** : Diabète de type 2, pratiques alimentaires, prise en charge nutritionnelle

## SS-CO-08

### EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE SURVEILLANCE DES DECES MATERNELS/NEONATALS ET RIPOSTE AU BENIN.

Christelle Boyi<sup>1</sup>, Christian Agossou<sup>1</sup>, Kéfilath Bello<sup>1</sup>, Armelle Vigan<sup>1</sup>, Hashim Hounkpatin<sup>1</sup>, Jean-Paul Dossou<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Centre de Recherche en Reproduction Humaine en Démographie (CERRHUD), 01BP1822, Cotonou, Bénin.

**Contexte** - Afin de réduire les décès maternels et néonataux (DMN), le Bénin a institutionnalisé, depuis 2013, la Surveillance des Décès Maternels/néonataux et Riposte (SDMR) dans toutes les zones sanitaires. Cette étude a pour but d'analyser la mise en œuvre de la SDMR au Bénin depuis son adoption et d'identifier des pistes d'amélioration.

**Méthodes** - Cette étude est transversale avec une approche mixte. Nous avons 1) exploité les rapports de revues de DMN de 2016 à 2018 ; 2) effectué des discussions de groupes avec les acteurs de mise en œuvre de la SDMR aux niveaux périphériques, intermédiaires et nationaux au cours d'ateliers et sur la plateforme District. Team. Le cycle d'action continu de la SDMR proposé par l'Organisation Mondiale de la Santé et le cadre de référence de la SDMR au Bénin ont été utilisés comme cadres d'analyse. Les logiciels Stata et Excel ont été utilisés pour l'analyse des données quantitatives. Une analyse de contenu a été faite pour les données qualitatives.

**Résultats** - Nous avons constaté une sous-notification des DMN malgré une augmentation du nombre de cas de DMN enregistrés. Les principales causes de la sous-notification sont la quasi-inexistence de la notification des décès survenus en communauté et dans le secteur privé. Seulement la moitié des décès maternels notifiés et le cinquième des décès néonataux notifiés sont revus. Ces faibles taux de revues sont largement liés aux hôpitaux nationaux, qui malgré le fait qu'ils enregistrent les plus grands nombres de DMN, en réalisent très peu. La plupart des revues réalisées sont de qualité insuffisante. Enfin, la riposte est le maillon le plus faible de la SDMR.

**Conclusion** – La SDMR au Bénin est fonctionnelle, mais il reste des points clés à améliorer notamment la riposte pour que cette stratégie réduise réellement la mortalité maternelle et néonatale.

**Mots clés** : Notification des décès maternels et néonataux, Revue des décès maternels et néonataux,

## SS-CO-09

### FACTEURS SOCIOCULTURELS INFLUENÇANT L'UTILISATION DES SOINS POST-PARTUM DANS LE SUD DU BENIN : UNE ETUDE ETHNOGRAPHIQUE

Christelle Boyi Hounsou 1, Armelle Vigan 1, Jean-Paul Dossou 1, Charlotte Gryseels 2, Lydie Kanhonou 1, Thérèse Delvaux 2

1 Centre de Recherche en Reproduction Humaine et Démographie (CERRHUD), Cotonou, Bénin

2 Institut de médecine tropicale (ITM), Anvers, Belgique

**Contexte** : Les soins postpartum contribuent à la réduction de la mortalité et la morbidité maternelles. Au Bénin, malgré un taux d'accouchement institutionnalisé élevé (84%), plus d'un tiers des femmes ne bénéficie pas des soins postpartum 48 heures après l'accouchement et un autre tiers n'en bénéficie pas du tout. Cette étude vise à identifier les besoins, les pratiques et les barrières liés aux soins postpartum au Bénin.

**Méthode** : Cette étude a utilisé des techniques ethnographiques pour collecter des données qualitatives d'août 2018 à août 2019 dans une zone sanitaire semi-rurale du Sud du Bénin. Au total 83 entretiens approfondis, 86 entretiens informels, 32 observations et trois discussions de groupe ont été réalisés au sein de la communauté et des prestataires de soins biomédicaux, alternatifs et spirituels. L'analyse thématique du contenu a été réalisée à l'aide du logiciel NVIVO 12.

**Résultats** : Dans cette communauté *Fon*, la combinaison de soins biomédicaux, alternatifs et spirituels est jugée efficace pour la mère pendant le postpartum. La communauté considère les soins postpartum inutiles si la femme est apparemment bien portante. Les femmes ont honte de rester longtemps dans le centre de santé, parce que cela suggère une incapacité à payer. Le manque d'eau chaude dans les centres de santé est aussi un obstacle. Au niveau des prestataires de soins biomédicaux, nous avons noté une insuffisante connaissance des directives nationales de soins, les longs délais d'attente, et le manque de compassion envers les femmes.

**Conclusion** : La combinaison de soins biomédicaux, alternatifs et spirituels, couramment recherché par les mères pendant le post-partum, n'est pas intégrée dans l'offre de soins. Cela se traduit par divers défis dans l'accès aux soins pendant cette période. Les pratiques alternatives et spirituelles peuvent être examinées pour informer les programmes et les politiques afin d'améliorer la santé maternelle au Bénin.

**Mots clés** : soins postpartum, facteurs socio-culturel, Sud Bénin

## SS-CO-10

### LES FACTEURS DE LA FAIBLE FREQUENTATION DES STRUCTURES SANITAIRES EN CONTEXTE DE PANDEMIE DE LA COVID 19 AU BENIN

1. Nadine SOSSOUHOUNTO, socioanthropologue de la santé, Centre Universitaire d'Adjarra

## 2. Elieth EYEBIYI, socioanthropologue, LASDEL & Université de Parakou

La fin du premier trimestre 2020 a marqué l'entrée du Bénin dans la gestion de la pandémie de la COVID 19. A l'instar de nombreux autres pays, des instructions ont été données par les autorités publiques afin de freiner la propagation de la maladie. En première ligne, le système sanitaire a dû développer des réponses rapides pour se préparer à l'accueil des malades. Or, la situation sociosanitaire de la population béninoise en général n'est guère reluisante et les problèmes d'hygiène liés au cadre de vie de la majorité des habitants favorisent l'éclosion de nombreuses maladies. Malgré l'amélioration de la couverture en infrastructures sanitaires avoisinant 80% (ASS, 2018), la majorité des béninois recourent tardivement aux structures sanitaires. Dans le même temps, les populations ont été l'objet d'un ensemble de mesures destinées à les maintenir dans un premier temps loin des structures sanitaires et ensuite à pouvoir être prises en charge dans des conditions particulières.

L'objectif général de cette communication est de rechercher les facteurs de la faible fréquentation des structures sanitaires à travers la gestion de la pandémie de la covid 19 dans la zone sanitaire Cotonou 2 – Cotonou 3.

Les données examinées proviennent d'une recherche ethnographique et qualitative dans la zone sanitaire Cotonou 2- Cotonou 3, effectuée sur la base d'une vingtaine d'entretiens semi directifs avec le personnel de santé et des usagers des structures sanitaires, de quelques observations et du recueil d'histoires de vie auprès de patients.

Les principaux résultats montrent que face au risque que constitue la pandémie de la covid 19 et à la hantise de contracter le virus, et surtout face aux expériences des usagers relayées dans la communauté, les populations adoptent des comportements, issus de certaines représentations sociales qui mettent à nu les facteurs de la faible fréquentation des structures sanitaires de la zone sanitaire Cotonou 2 – Cotonou 3.

Mots clés : Covid 19, faible fréquentation, structures sanitaires

## SS-CO-11

### EVALUATION DE LA QUALITE DE LA GESTION DES EFFLUENTS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES DU DEPARTEMENT DE LITTORAL AU BENIN

Judicaël Todedji<sup>1\*</sup>, Ghislain Sopoh<sup>1</sup>, Cyriaque Degbey<sup>1,2</sup>, Arouna Yessoufou<sup>3</sup>, Fidèle Suanon<sup>3</sup>, Daouda Mama<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Régional de Santé Publique, Département de Santé-Environnement, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin, <sup>2</sup> Clinique Universitaire d'Hygiène Hospitalière, Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga, Cotonou, Bénin, <sup>3</sup> Institut National de l'Eau, Laboratoire d'Hydrologie Appliquée, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

\*Auteur correspondant: Judicaël Todedji, Institut Régional de Santé Publique, Département de Santé-Environnement, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin. Email: dosjudi@yahoo.fr; Tél. 0022997597612

**Introduction :** Les rejets liquides hospitaliers (effluents) menacent l'environnement et sont de nos jours au centre des préoccupations de l'ensemble des acteurs du système de santé et de ceux de la protection de l'environnement. La gestion des effluents est un problème majeur dans les pays en développement. L'objectif de cette étude était d'évaluer la qualité de la

gestion des effluents au niveau des centres hospitaliers universitaires (CHU) du Littoral au Bénin. **Méthode:** Il s'agit d'une étude transversale, descriptive évaluative qui s'est déroulée en 2020. Les appréciations portées sur la structure, le processus et les résultats ont été faites en fonction des seuils standards (Mauvaise: <60%; Acceptable: [60% - 80% [ et Bon: ≥ 80%). **Résultats :** Dans tous les CHU, toutes les composantes, de même que la qualité globale de la gestion des effluents hospitaliers, avaient un score compris entre 0 et 60%, avec une appréciation jugée donc mauvaise. La mauvaise qualité du processus mettait en évidence le non-respect des normes relatives à la gestion des rejets liquides hospitaliers. Plusieurs facteurs liés à la fois aux composantes structure, processus et résultats expliquent cette mauvaise gestion des effluents hospitaliers universitaires. **Conclusion :** Ces effluents rejetés sans traitement préalable dans les eaux de surface peuvent constituer une source de dissémination des bactéries potentiellement pathogènes. Il est donc important de développer des méthodes de traitement de ces effluents avant leur rejet dans le milieu naturel. **Mots clés:** Evaluation, gestion, effluents.

## SS-CO-12

### OBSTACLES LIES A L'ACCOUCHEMENT ASSISTE DANS L'ARRONDISSEMENT DE TAÏACOU EN 2018-2019

David HOUETO<sup>1</sup>, Emmanuel SAMBIENI<sup>2</sup>, Natacha KINIANTA<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ecole de Santé Publique (ENATSE), Université de Parakou

<sup>2</sup>Département de Sociologie-Anthropologie, Université de Parakou

**Correspondance :** David Houéto, [dhoueto@gmail.com](mailto:dhoueto@gmail.com), +22997277515

**Introduction.** Dans les départements du Nord Bénin le taux de consultations prénatales est plus élevé que celui des accouchements. Malgré certaines raisons évoquées pour expliquer cette situation telles la pauvreté, l'absence de problèmes de santé pendant la grossesse, il peut exister néanmoins d'autres facteurs plus explicites et complexes, pour le moment, inconnus ; ce qui a motivé cette étude à Taïacou pour étudier les obstacles à un accouchement assisté.

**Méthodes.** Il s'est agi d'une étude transversale descriptive à recueil rétrospectif et à visée analytique qui s'était déroulée du 1<sup>er</sup> au 20 septembre 2020. Elle a impliqué les femmes ayant eu un accouchement les deux dernières années par un recensement exhaustif et leurs conjoints. Les données ont été collectées à l'aide d'un guide d'entretien semi-structuré. Une double saisie des données a été faite dans le logiciel Epi Data 3.1 et l'analyse à l'aide du logiciel Epi Info 7.2.2.6.

**Résultats.** Au total, 262 sujets (couples) ont été enquêtés dont 58 n'avaient pas eu un accouchement assisté. Les facteurs associés à l'accouchement non assisté sont la profession (ménagères et cultivatrices,  $p=0,01$ ), la situation matrimoniale (célibataires,  $p=0,006$ ), le niveau d'instruction (non instruction,  $p=0,03$ ), le revenu mensuel (salaire mensuel = 0 ou ≤50000,  $p=0,005$ ), la satisfaction psychologique lors des CPN ( $p=0,01$ ), la multiparité ( $p<0,001$ ).

**Conclusion.** Plusieurs facteurs expliquent le choix des femmes de Taïacou d'un accouchement non assisté. Une étude approfondie permettrait de spécifier ces facteurs afin de formuler des actions bien appropriées pour les lever au sein de la communauté.

**Mots-Clés :** Accouchement non assisté, Facteurs associés, Nord Bénin.

**SS-CO-13****ETHNOGRAPHIE DU PORT OBLIGATOIRE DE MASQUES EN CONTEXTE PANDEMIQUE DE LA COVID-19 A COTONOU**

Roch Hounghinin, anthropologue, Laboratoire d'anthropologie médicale appliquée (LAMA), Université d'Abomey-Calavi

Adresse : tél. +229 95 06 13 35, email : roch\_hounghinin2001@yahoo.fr

**Introduction :** Dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19, plusieurs mesures ont été prises au Bénin, dont le port obligatoire de masques. Mais cette initiative a suscité des réactions marquées par de multiples usages sociaux des masques, dans un contexte où les informations qui circulent sont diverses et hétérogènes, amplifiées par les rumeurs. A cet effet, une recherche a été menée à Cotonou, l'objectif étant de comprendre les réactions des populations face à ce dispositif de prévention.

**Méthode :** Il s'agit d'une enquête qualitative organisée auprès d'acteurs sociaux de différents profils. La recherche a intégré la réalisation d'une ethnographie associant des entretiens individuels semi-structurés et des observations. Cette approche a permis de collecter des données auprès de 33 personnes.

**Résultats :** Au Bénin, le port de masque a été institué à partir du 8 avril 2020. Très tôt à Cotonou, les populations semblent avoir adopté cette mesure préventive. Cette appropriation se traduit par la fabrication et la distribution massive de masques par les artisans locaux. Une gamme variée de masques est disponible sur le marché, avec des prix différents, des textures et des qualités variées. La crainte d'une répression policière semble être le facteur favorable majeur. Ainsi, le port du masque est perceptible sur les voies publiques où le risque de rencontrer un policier est grand. Plusieurs raisons sont évoquées dont notamment la gêne respiratoire. Par ailleurs, le masque acquérable dans les officines de pharmacie est un luxe pour maintes populations ; il est surtout porté par une très grande minorité de personnes « nanties ». La grande majorité de la population se contente des autres types de masques vendus aux abords des rues.

**Conclusion**

A l'analyse, on note que le masque est un marqueur de différenciation sociale, faisant émerger plusieurs catégories d'individus.

Mots clés : Covid-19, masque, Cotonou

**SS-CO-14****IN VITRO ASSESSMENT OF ANTIPLASMODIAL ACTIVITY AND ACUTE ORAL TOXICITY OF DISSOTIS ROTUNDIFOLIA EXTRACTS AND FRACTIONS ON PLASMODIUM FALCIPARUM STRAINS**

Rock Djehoue<sup>1</sup>, Rafiou Adamou<sup>1</sup>, Abdou Madjid O. Amoussa<sup>1</sup>, Adande A. Medjigbodo<sup>2</sup>, Anatole Laleye<sup>3</sup>, Ambaliou Sanni<sup>1</sup>, Luc S. Djogbenou<sup>2</sup> and Latifou Lagnika<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Laboratory of B00000iochemistry and Bioactive Natural Substances, Unit of Biochemistry and Molecular Biology, University of Abomey-Calavi, 04 BP, 0320 Cotonou, Benin.

<sup>2</sup>Laboratory of Infectious Vector Borne Diseases, Regional Institute of Public Health, University of Abomey-Calavi, 01BP 918, Cotonou, Benin.

<sup>3</sup>Laboratoire d'histologie, de Cytogénétique et d'Embryologie,  
Faculté des Sciences de la Santé (FSS), Université d'Abomey-Calavi, Benin.

**Background:** The emergence and spread of malaria parasites resistant to artemisinin-based combination therapy underscores the need for new malaria drugs. The investigation on plants used in traditional medicine to treat malaria remains a credible option for the development of new drugs against malaria. *Dissotis rotundifolia* were selected after an ethnopharmacological survey conducted on plants used traditionally for malaria treatment in south Benin, with the aim of discovering new natural active extracts against *Plasmodium*.

**Methods:** The antiplasmodial activity of the plant extracts was evaluated using the parasite lactate dehydrogenase (pLDH) immunodetection assay. The extract with the best antiplasmodial activity were used on Wistar rats for acute toxicity.

**Results:** Ethanolic extract of *Dissotis rotundifolia* showed promising activity (Isolate:  $IC_{50} = 22.58 \pm 1.12 \mu\text{g/mL}$ ; 3D7:  $IC_{50} = 6.81 \pm 0.85 \mu\text{g/mL}$ ) on *Plasmodium falciparum* compared to the aqueous extract (Isolate:  $IC_{50} > 100 \mu\text{g/mL}$ ; 3D7:  $IC_{50} > 100 \mu\text{g/mL}$ ). The aqueous fraction of *D. rotundifolia* exhibit highly potent activity against *P. falciparum* strain (Isolate:  $IC_{50} > 100 \mu\text{g/mL}$ ; 3D7:  $IC_{50} = 4.05 \pm 0.72 \mu\text{g/mL}$ ). Haemolytic effect of actives extracts and fractions is less than 5%. Ethanolic extract of *D. rotundifolia* revealed no obvious acute toxicity in rat up to the highest dose administered (2000 mg/kg).

**Conclusion:** This study justifies traditional uses of *D. rotundifolia* against malaria. A bio-guided fractionation of these extracts would identify molecules responsible for their antiplasmodial activity. Moreover, these results could lead to the design of improved traditional medicines in the basis of this plant.

**Key words:** Ethnopharmacology, *Plasmodium falciparum*.

## SS-CO-15

### DETERMINANTS SOCIAUX DE LA FAIBLE UTILISATION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE CHEZ LES FEMMES EN AGE DE PROCREER DANS LA COMMUNE DE ZE AU BENIN

Saizonou Jacques, Diarra Mamadou, Mongbo Virginie, Capochichi G. Justine, Ouendo Edgard-Marius.

**Introduction :** La planification familiale permet d'améliorer l'état de santé et le bien-être de la famille et de contribuer efficacement au développement social du pays.

L'objectif de ce travail est d'étudier les déterminants sociaux associés au faible taux d'utilisation de la PF dans la zone sanitaire Allada-Toffo-Zè dans le département de l'Atlantique au Bénin en 2019.

**Méthode :** Il s'agissait d'une étude transversale analytique qui a porté sur 330 femmes en âge de procréer (de 15 à 49 ans) sélectionnées par la méthode d'échantillonnage probabiliste avec la technique de grappe. Un questionnaire a été utilisé à l'endroit des femmes en âges de procréer. La régression logistique a été utilisée pour l'identification des déterminants avec le calcul des OR. Les tests de  $\chi^2$  et de Hosmer-Lemeshow ont permis de retenir les déterminants dans le modèle final.

**Résultats :** L'étude a montré que le taux d'utilisation de la planification familiale dans la commune de Zè est de 38,48%. Les déterminants sociaux identifiés sont l'isolement de la femme ( $OR=2,0007$ ;  $p=0.0217$ ) le manque de considération pour la femme ( $OR=0,5057$ ;  $p=0.0051$ ) et le Risque de séparation ( $OR=0,4926$ ;  $p=0.0138$ ).

**Conclusion :** Les interventions basées sur les déterminants sociaux identifiés vont permettre d'améliorer le taux d'utilisation de la planification familiale dans cette zone.

**Mots clé :** planification familiale ; déterminants sociaux ; Bénin.

## SS-CO-16

### INFECTIONS NOSOCOMIALES DANS LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE PEDIATRIE ET GENETIQUE MEDICALE AU CNHU-HKM DE COTONOU EN 2019 ET EN 2020 : PREVALENCE ET FACTEURS EXPLICATIFS

Nathalie Sênami SESSOU<sup>1</sup>, Cyriaque Comlan DEGBEY<sup>1,2</sup>, Ghislain Emmanuel SOPOH<sup>1</sup>, Edgard-Marius D. Ouendo<sup>1</sup>, Michel Makoutodé<sup>1†</sup>

*1 Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey Calavi, Bénin.*

*2 Service d'hygiène Hospitalière, Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM), Cotonou, Bénin*

*† In Memoriam*

**Contexte et objectif :** Les infections nosocomiales (IN) figurent parmi les causes majeures de morbidité accrue et de décès aussi bien les pays développés que ceux pauvres en ressources comme le Bénin. Cette étude vise à déterminer les facteurs associés à la survenue des IN dans la clinique de pédiatrie et génétique médicale (CPGM) du CNHU-HKM de Cotonou en 2019 et en 2020.

**Méthodes :** Il s'agit d'une étude transversale descriptive et analytique qui comporte un volet rétrospectif et un volet prospectif, qui s'est déroulée dans la CPGM du CNHU-HKM de Cotonou du 25 mai au 12 juin 2020. La prévalence des IN a été déterminée à partir de l'étude des dossiers des nouveau-nés et enfants hospitalisés. Les caractéristiques liées au nouveau-né et à l'enfant, à l'environnement, à l'organisation des soins, au personnel de soins et aux mères d'enfants ont été collectées. Une analyse descriptive, suivie d'une régression logistique ont permis de déterminer les odds ratio ajustés (ORaj) ainsi que les intervalles de confiance

**Résultats :** Au total 511 enfants et nouveau-nés hospitalisés, 95 mères d'enfants et 32 personnels de santé ont été enquêtés. La prévalence des IN était de 8,41%. L'âge (<12mois ORaj; IC95% =0,02; [0,002-0,160]), la durée de séjour ( $\geq 4$  jours ORaj; IC95% =2,05; [1,60-2,62]), et les actes invasifs (ORaj; IC95% =1,20 ; [1,09-1,30]) ont été retrouvés comme facteurs associés à la survenue des infections nosocomiales. La mauvaise gestion des DBM, le non-respect des étapes de stérilisation, le non-respect du bionettoyage, les consignes insuffisantes données aux mères d'enfants hospitalisés, la charge de travail élevée, la présence de germes en circulation pourraient expliquer la survenue de ces infections.

**Conclusion :** Des mesures efficaces en matière d'hygiène doivent être prises afin de réduire la survenue des infections lors des séjours d'hospitalisation.

**Mots-clés :** Infection nosocomiale, Facteurs associés, Bénin.

## SS-CO-17

### EFFICACITE DES MASQUES CHIRURGICAUX ET ARTISANAUX EN MILIEU UNIVERSITAIRE AU BENIN EN 2020

Juliana DAHOU<sup>1</sup>, Rafiatou BA<sup>1</sup>, Damien TOFFA<sup>1</sup>, Brifelle TENTE<sup>1</sup>, Harvey JOHNSON<sup>1</sup>, Carine ZINSOU<sup>1</sup>, Franck MIGNANWANDE<sup>1</sup>, Parfait DJOSSOU<sup>1</sup>,

\*Roch Christian JOHNSON<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Laboratoire d'Hygiène-Assainissement, d'Ecotoxicologie et de Santé Environnementale HECOTES/CIFRED/UAC, 03BP1463 Cotonou, Bénin

**Introduction :** Dans la lutte contre la pandémie à COVID 19, le port des masques fait partie des solutions proposées par l'OMS. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'efficacité des masques chirurgicaux et artisanaux en milieu universitaire au CIFRED en 2020.

**Méthodes :** Les analyses microbiologiques ont été réalisées sur 20 échantillons de masques à raison de 05 avant et après usage des masques chirurgicaux et 05 avant et après usage des masques artisanaux. Les prélèvements ont été faits dans les boîtes de Petri de contact par empreinte gélosée suivant la Norme NF EN ISO 14698-1 (2004). Avant utilisation les masques ont été stérilisés puis prélevés. Pendant l'utilisation les étudiants ont parlé et toussés dans les masques dans une zone stérile pendant 90 secondes puis les faces externes des masques ont été prélevées. Ces boîtes ont été incubées pendant 24 heures à 37 °C à l'étuve. Les colonies trouvées après incubation ont fait l'objet d'un examen microscopique après la coloration de Gram. Pour leur identification les différentes colonies ont été soumises aux tests de catalase ou d'oxydase.

**Résultats :** Avant usage des masques, aucun germe n'a été retrouvé. Mais après usage des masques, la moyenne de présence de germes est de 2 UFC/25Cm<sup>2</sup> aussi bien sur les masques chirurgicaux que sur les masques artisanaux.

**Conclusion :** Les masques qu'ils soient artisanaux ou chirurgicaux ont la même efficacité dans la lutte contre les infections. L'utilisation des masques artisanaux ou chirurgicaux est conseillée pour une meilleure prévention des infections.

**Mots clés :** masques chirurgicaux et artisanaux, contamination, bactéries

## SS-CO-18

### EXPERIENCE DES MEDECINS DE PREMIERE LIGNE FACE A LA PANDEMIE DE COVID-19 AU BENIN

Kéfilath Bello<sup>1,2</sup>, Christian Agossou<sup>1</sup>, Jean-Paul Dossou<sup>1,2</sup>, Marcel Zannou<sup>3</sup>, Jan de Lepeleire<sup>4</sup>, Bart Criel<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Centre de Recherche en Reproduction Humaine et en Démographie, Bénin

<sup>2</sup> Institut de Médecine Tropicale d'Anvers, Belgique

<sup>3</sup> Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

<sup>4</sup> Katholieke Universiteit Leuven, Belgique

**Introduction :** La lutte contre la COVID-19 exige une préparation optimale au niveau de l'interface entre la population et le système de santé, la première ligne de soins. Notre étude visait à analyser le niveau de préparation des médecins de première ligne (MPL) et l'impact de l'épidémie sur leur travail.

**Méthodologie :** Il s'agissait d'une étude mixte dans les zones sanitaires Cotonou 2-3, Ouidah-Kpomassè-Tori Bossito, Parakou-N'Dali et Nikki-Kalalé-Pèrèrè. Les données quantitatives, collectées par une enquête en ligne, ont été analysées avec Stata (analyse descriptive puis bivariée). Les données qualitatives, collectées par des entretiens semi-structurés, ont fait l'objet d'une analyse de contenu, soutenue par le logiciel N-Vivo. Le quantitatif et le qualitatif ont ensuite été intégrés.

**Résultats :** Respectivement 90 et 11 MPL ont participé aux volets quantitatif et qualitatif. La mesure de lutte la plus fréquente était le dispositif de lavage des mains (98,8%) et la moins

fréquente était la disponibilité d'un protocole de tri des patients (56,8%). Les formations sanitaires publiques disposaient plus d'un protocole que les formations privées. Mais les privés disposaient plus du nécessaire de lavage des mains. La majorité des médecins (80,2%) déclaraient être stressés. Le volet qualitatif a révélé que ce stress était non seulement lié à la crainte de contracter la maladie, mais surtout à la baisse de la fréquentation des formations sanitaires. Les MPL craignaient aussi l'impact de certaines mesures de lutte, comme les effets secondaires potentiels de la chloroquine. Enfin, même si la majorité des MPL déclaraient bénéficier d'un appui des autorités sanitaires, seuls 24,7% pensaient que leurs inquiétudes étaient prises en charge.

**Conclusion :** Il existe un besoin important d'accompagnement des MPL. Des facteurs comme la crainte de voir baisser la fréquentation des formations sanitaires et la crainte des effets collatéraux des mesures de lutte, doivent être considérés avec attention pour une riposte efficace.

**Mots clés :** Médecins, COVID-19, préparation

## SS-CO-19

### ÉVALUATION DE LA PRESCRIPTION DES ANTIBIOTIQUES AU CNHU-HKM ET AU CHU-MEL DE COTONOU

Lalya F<sup>(1)</sup>, Tchiakpè Enianloko N<sup>(1)</sup>, Séidou Alassane H<sup>(1)</sup>, Fotso Kuate G<sup>(1)</sup>, Bagnan Tossa L<sup>(1)</sup>, d'Almeida M<sup>(1)</sup>

1- Centre National Hospitalier Universitaire Hubert K. Maga de Cotonou, Bénin

**Introduction :** La prescription et l'utilisation inappropriée des antibiotiques contribuent au développement et à la propagation de la résistance bactérienne. L'objectif de l'étude était d'évaluer la prescription des antibiotiques en pédiatrie au CNHU-HKM et au CHU-MEL.

**Méthode :** Il s'est agi d'une étude transversale, prospective à visée descriptive, menée du 14 octobre au 14 décembre 2019 et ayant inclus les dossiers et ordonnances médicales de tous les enfants admis en pédiatrie au CNHU-HKM et au CHU-MEL de Cotonou pendant la période. Le traitement des données a été informatique (logiciels spss et epi info).

**Résultats :** Parmi les 1868 enfants hospitalisés dans les deux centres 572 (30,6%) ont reçus au moins un antibiotique. Six cent quatre-vingt-neuf prescriptions de 1185 antibiotiques ont été effectuées, soit une moyenne de 1,18 prescription avec un maximum de trois prescriptions par patient. La majorité des patients (83%) ont eu une seule prescription, 104 (15,1%) en ont eu deux et 13 patients (1,9%) trois. Le prescripteur était un médecin en spécialité dans 67,9% des cas. La prescription n'était pas justifiée chez 20,6% des patients.

La posologie était adaptée pour 506 (42,7%) antibiotiques prescrits, excessive pour 651 (54,9%) et en-dessous de la posologie minimale pour 28 (2,4%) cas. Les éléments de pharmacocinétique étaient pris en compte dans la majorité des cas.

**Conclusion :** L'antibiothérapie, même dans nos centres de référence ne respecte pas toujours les normes de prescription. La sensibilisation des prescripteurs reste un moyen sûr pour contribuer à réduire la résistance aux antibiotiques, aujourd'hui un problème de santé publique.

**Mots clés :** Utilisation d'antibiotiques - Prescripteur - Enfants - Pédiatrie - CNHU-HKM - CHU-MEL

**SS-CO-20****ITINERAIRE THERAPEUTIQUE ET DEVENIR DES ENFANTS ADMIS AUX URGENCES DE PEDIATRIE****DU CNHU-HKM DE COTONOU**

Lalya F<sup>(1)</sup>, Zohoun L<sup>(1)</sup>, Alihonou F<sup>(1)</sup>, Béhanzin M<sup>(1)</sup>, Bagnan Tossa L<sup>(1)</sup>, d'Almeida M<sup>(1)</sup>

1- Centre National Hospitalier Universitaire Hubert K. Maga de Cotonou, Bénin

**Introduction :** La survenue d'une maladie conduit le patient à recourir aux soins avec un itinéraire dont dépend souvent l'issue de ladite maladie. L'objectif de l'étude était d'étudier l'itinéraire thérapeutique et le devenir des enfants admis aux urgences de Pédiatrie du CNHU-HKM de Cotonou.

**Méthode :** Il s'agissait d'une étude transversale, prospective, à visée descriptive et analytique, du 11 Août au 09 Octobre 2019 et incluant, de manière aléatoire, les enfants de 1 mois à 18 ans et leurs mères, admis aux urgences pédiatriques du CNHU-HKM. Les données, collectées grâce à une étude du dossier médical et à un entretien structuré avec la mère, ont été analysées de manière informatique.

**Résultats :** Cent quarante-six enfants ont été recrutés au cours de la période d'étude. Le délai moyen de consultation au CNHU-HKM était de 8 jours (45 mn - 75 jours). Les enfants consultaient directement au CNHU-HKM dans 33,6% des cas et 66,4% parcouraient entre 1 et 3 centres avant l'admission au CNHU-HKM. Ces enfants ont reçu, avant d'être admis, un traitement en automédication (79,5% des cas), un traitement médical (54,8% des cas) ou un traitement traditionnel (54,1% des cas). A l'admission, les enfants étaient en état de détresse vitale dans 90,4 % des cas. Ces enfants avaient guéri sans séquelles dans 81,5% des cas et étaient un décédés dans 5,5%. Aucun des facteurs que nous avons étudiés n'était associé au devenir des enfants de façon statistiquement significative.

**Conclusion :** Cette étude a montré que, quel que soit l'itinéraire suivi par les enfants admis en pédiatrie au CNHU-HKM, la qualité des soins reçus leur permet d'avoir une évolution dans la plupart des cas favorable.

**Mots clés :** Itinéraire thérapeutique, devenir, enfants, urgences, CNHU-HKM

**SS-CO-21****LIBERALISATION DES PRIX DES PRODUITS DE LA SANTE REPRODUCTIVE , MATERNELLE , NEONATALE ET INFANTILE (SRMNI) AU BENIN : DEFIS ET PERSPECTIVES**

Makoutodé P<sup>1</sup> ; Tossou E<sup>2</sup>, Biaou A<sup>1</sup>, , Sodabi N<sup>3</sup>, Gbaguidi A<sup>2</sup>

(1) Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRSP-CAQ)

(2) Ordre National des Pharmaciens du Bénin

(3) Direction de pharmacie et Médicaments

Au regard des grands défis persistants dans le système de santé du Bénin, l'USAID à travers le Private Sector Health Partnership (PSHPA) s'est fixé comme défi d'accroître l'équité et la disponibilité globale, l'accessibilité et l'utilisation de produits et services de qualité, et ainsi contribuer à améliorer les indicateurs en santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile (SRMNI). C'est à cet effet que la présente étude a été initiée par le projet USAID/PSHPA pour évaluer les impacts d'une libéralisation des prix des produits SRMNI au Bénin.

Il s'agit d'une étude d'envergure nationale couvrant cinq (05) départements du pays que sont : Atacora, Borgou, Littoral, Ouémé et Collines. Elle a impliqué plusieurs acteurs intervenant dans la gestion des produits pharmaceutiques au Bénin.

Au terme de cette étude, nous pouvons retenir que le prix des médicaments est encadré au Bénin par plusieurs textes réglementaires nationaux et communautaires. L'analyse de l'évolution du prix des Médicaments Essentiels Génériques (MEG) et SRMNI a été abordée en fonction de la catégorie des produits SRMNI et selon qu'ils soient subventionnés ou non.

Les causes de rupture au niveau des centres de santé sont de deux ordres : celles spécifiques aux zones sanitaires (rupture au niveau du Dépôt Répartiteur de Zone Sanitaire et absence de moyens de transport pour le convoyage) et celles qui dépendent des centres de santé (Difficulté de trésorerie).

Enfin, la libéralisation des prix aura comme effet de rentabilité perçue :

- une augmentation de la disponibilité contre une baisse potentielle de l'accessibilité géographique et financière des médicaments ;
- des difficultés dans la coordination de l'ARCH avec comme conséquence un retard de traitement des demandes de remboursement. De même la libre concurrence va conduire à une disparité des prix et une grande difficulté en matière de planification des remboursements ;
- une réorganisation structurelle et fonctionnelle du secteur pharmaceutique surtout au niveau de l'offre des prestations.

La libéralisation des prix profiterait plus au secteur pharmaceutique, aux prestataires de soins qu'aux bénéficiaires/consommateurs des produits. Ces produits reviendraient plus chers au consommateur qu'aujourd'hui. L'impact/effet attendu interviendra plutôt sur l'offre des prestations et engendrera si on ne prend pas garde des dépenses catastrophiques pour les demandeurs de prestation que sont les ménages. Dans ce cadre, la réglementation des prix par l'Etat apparaît très importante et doit servir de rhéostat en proposant un tarif qui vise à abaisser celui des monopoles, tout en permettant aux firmes pharmaceutiques de couvrir leurs dépenses.

**Mots clés :** Impact, libéralisation des prix, produits SRMNI, Bénin

## SS-CO-22

### **Évaluation de l'efficacité de la campagne de sensibilisation menée en milieu scolaire en 2019 sur la conduite routière dans les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi au Bénin**

Boris Pleck DANSOU<sup>1</sup>, Patrick MAKOUTODE<sup>1</sup>, Yolaine GLELE AHANHANZO<sup>1</sup>, Moussiliou Noël PARAISSO<sup>1</sup>, Ghislain Emmanuel SOPOH<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Institut Régional de Santé Publique – Route des Esclaves, Cotonou. Ouidah, – Université d'Abomey-Calavi – BP 918 – Ouidah – Bénin.*

Première cause de mortalité chez les jeunes dans le monde, les accidents de la voie publique sont pourtant évitables grâce à l'adoption d'attitudes et comportements simples. L'ONG Handicap International a lancé une campagne de sensibilisation dans les collèges des communes de Cotonou et Abomey-Calavi afin d'amener les jeunes usagers béninois à adopter de bonnes attitudes et des comportements sécuritaires lors de la conduite sur route. Cette étude vise à évaluer l'efficacité de cette campagne. L'étude est transversale évaluative, de type ici-ailleurs, menée dans quatorze collèges des villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi, dont sept ayant bénéficié de la campagne et sept n'en ayant pas bénéficié. Les élèves étaient sélectionnés sur la base d'un échantillonnage aléatoire à deux degrés. 656 élèves dont 309 sensibilisés et 347 non-sensibilisés, ont été inclus dans cette étude. La campagne a été plutôt

efficace. Les perceptions des élèves, enseignants et responsables de collège sur la campagne étaient positives. Les élèves sensibilisés avaient un niveau de connaissance meilleur ( $p=0,001$ ) et déclaraient avoir des comportements plus sécuritaires ( $p=0,003$ ) vis-à-vis de la conduite sur la route que ceux non-sensibilisés. Bien que les effets soient positifs, ils restent très faibles. Donc, les efforts doivent être poursuivis et beaucoup reste à faire.

Mots-clés : Accident de la voie publique-Sensibilisation-Collège-Élève-Bénin.

## SS-CO-23

### PRATIQUE DES GESTES BARRIERES LIES A LA PREVENTION CONTRE LA COVID19 CHEZ LES ADULTES A BRAZZAVILLE

Yvonne V. Y. Mavoungou<sup>1</sup>, Bazaba Nelly<sup>2</sup>, Levi Mankoussou<sup>3</sup>, Jean Claude Mobousse<sup>4</sup>

<sup>1</sup>*Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo ; BP :15405. Email : [yvoumbo@yahoo.fr](mailto:yvoumbo@yahoo.fr)*

<sup>2</sup>*Direction générale de la population, Brazzaville, Congo.*

<sup>3</sup>*Institut National de la Statistique, Brazzaville, Congo.*

<sup>4</sup>*Direction Départementale de la Santé de Brazzaville, Brazzaville, Congo.*

**Introduction :** La pandémie de covid19 déclaré à travers le monde a atteint le Congo. L'OMS souligne la nécessité d'une application stricte des mesures barrières : distanciation physique, port du masque, lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou désinfection des mains au gel hydroalcoolique pour garantir la protection des individus. L'objectif de cette étude est d'évaluer le niveau de pratique des gestes barrières à Brazzaville.

**Méthodologie :** Il s'agit d'une étude transversale descriptive dont les données proviennent d'une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques sur la covid19, réalisée du 18 au 24 août 2020 à Brazzaville. Les réponses des personnes âgées de plus de 18 ans qui ont déclaré avoir entendu parler des gestes et qui pratique les gestes barrières ont été exploitées. Les variables considérées dans l'étude : sont les caractéristiques socio démographiques des enquêtés, la perception de la gravité de la covid19, le niveau des connaissances et de pratique des gestes barrières.

**Résultats :** Au total 498 interrogés ont déclaré que la covid19 existe seul 8,4 ont déclaré qu'elle peut être évité. Il est constaté que 5,5% de personnes interrogées déclare pratiquer aucun geste barrière. La pratique des gestes barrières est en général médiocre, les femmes (76%) ont une pratique meilleure que les hommes ( $p=0,02$ ). Les personnes ayant le niveau du collège (86,5%) ont plus de pratique médiocre de geste barrière ( $p=0,001$ ). La bonne pratique des gestes barrière est observée seulement chez 13,2% des personnes déclarant un bon niveau de perception de la gravité de la covid19 ( $p=0,002$ ).

**Conclusion :** Les personnes interrogées ont en général une pratique inappropriée des gestes barrière contre la covid19. Cette pratique est associée à des facteurs individuels tel que le sexe, le niveau d'instruction mais aussi au niveau de perception de la gravité de la covid19.

**Mots clés :** Adultes, gestes barrières, gravité de la covid19.

#### SS-CO-24

### FACTEURS ASSOCIES A LA NON-CONFORMITE DU DIAGNOSTIC ET DU TRAITEMENT DU PALUDISME AUX DIRECTIVES NATIONALES DANS TROIS SITES SENTINELLES DISTRICT SANITAIRE SAN-PEDRO, COTE D'IVOIRE, 2018-2019.

Sompohi Jacques Tokpa<sup>1</sup>, Pauline K. Yanogo<sup>1</sup>, Joseph Otshudiandjeka<sup>1</sup>, Marianne Kouawo<sup>1</sup>, Issaka Tiembre<sup>2</sup>, Vroh Joseph Benie Bi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Burkina-Faso Field Epidemiology and Laboratory Training Program, <sup>2</sup>Institut National d'Hygiène Publique

**Introduction :** Notre objectif était d'étudier les facteurs associés à la non-conformité du diagnostic et du traitement du paludisme aux directives nationales.

**Méthode :** Nous avons réalisé une étude transversale analytique portant sur des cas de paludisme dans trois structures sentinelles du district sanitaire de San-Pedro et les prestataires de soins ayant pris en charge ces cas. La force de l'association était quantifiée par les odds-ratios ajustés au seuil de 5%.

**Résultats :** Au total 317 cas de paludisme et 30 prestataires de soins ont été recensés. 80% des prestataires étaient formés sur les directives nationales. Le paludisme grave représentait 33,75% des cas, le sexe féminin 64,35% et les moins de 5 ans 48,6%. Le diagnostic, le traitement du paludisme simple étaient non conformes aux directives respectivement dans 24,29% et 33,33% des cas. Aucun cas de diagnostic du paludisme grave n'était conforme aux directives contre 28,97% de traitement non conforme. Concernant les soignants, la non-conformité du diagnostic et celle du traitement du paludisme aux directives étaient indépendamment associées à la tranche d'âge inférieur à 40 ans, au sexe masculin, à l'ancienneté de plus de 10 ans de travail et à la catégorie professionnelle agents de santé. Par ailleurs, la non-conformité du diagnostic du paludisme aux directives était indépendamment liée à la forme simple du paludisme, la non disponibilité des intrants de diagnostic. La non-conformité du traitement du paludisme aux directives était significativement liée à l'âge inférieur à 5 ans des patients.

**Conclusion :** La disponibilité des intrants et l'encadrement continu des prestataires de soins semblent nécessaires à la conformité du diagnostic et du traitement du paludisme aux directives nationales.

**Mots clés :** Paludisme, Directives, Non-conformité.

**SS-CO-25****EVALUATION DE L'ACTIVITE ANTIOXYDANTE ET LA COMPOSITION PHYSICO-CHIMIQUE DES EXTRAITS AQUEUX ET HYDRO-ETHANOLIQUE DES FEUILLES DE MORINDA CITRIFOLIA LINNE (RUBIACEAE).**

Yaya Djawal<sup>1, 2</sup>, Pierre H.Dansou<sup>1, 2</sup>, Joachim D. Gbénou<sup>1, 2</sup>, Ahounou Judith<sup>1</sup>, Agbodjogbé Wilfrid<sup>1</sup>,

1-Laboratoire de physiologie de l'effort, Institut National de la jeunesse, de l'Education Physique et du Sport, Université d'Abomey Calavi (Bénin).

2-Laboratoire de pharmacognosie et des huiles essentielles (LAPHE).Faculté des sciences et techniques et des sciences de la santé /Université d'Abomey Calavi (Bénin).

Correspondance à adresser:Yaya A. Djawal, BP : 14 Ouidah; [Tel:96176135](tel:96176135); E-mail: Djawaly@yahoo.fr

Le stress oxydant, facteur potentialisant l'apparition à l'échelle mondiale des maladies plurifactorielles telles que le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires, suscite de nos jours la recherche de nouveaux remèdes antioxydants. Dans cette optique, l'étude de l'activité antioxydante des extraits aqueux et hydro-éthanolique de *Morinda citrifolia* (Rubiaceae) a été réalisée. Les objectifs de ce travail sont d'une part de réaliser le screening phytochimique des deux extraits par des réactions (coloration et précipitation) différentielles des principaux groupes de composés chimiques et d'autre part de déterminer leurs toxicités (aigüe, chronique et larvaire) et d'étudier in vitro leur pouvoir antioxydant. Les matériels d'étude utilisés sont: les feuilles de la plante, des larves de crevettes saumures et des rats wistar. Les réactifs chimiques utilisés sont: DPPH, le réactif de Folin-Ciocalteu, l'acide ascorbique, l'acide gallique, AlCl (trichlorure d'aluminium), la quercétine et l'éthanol. Les résultats des tests de toxicité ont révélé que les deux extraits de notre plante sont non toxiques. L'analyse chimique des extraits a montré la présence de composés reconnus pour leurs propriétés antioxydantes comme les tannins, les flavonoïdes. L'extrait aqueux ayant une IC<sub>50</sub> de 6,53ug/mL a une meilleure activité antioxydante comparativement à l'extrait hydro-éthanolique (IC<sub>50</sub> = 7,95ug/mL).

**Mots clés** : *Morinda Citrifolia*, extraits, activité antioxydante.

**SS-CO-26****COUT DU BILAN BIOLOGIQUE DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DREPANOCYTOSE A LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE DES MALADIES DU SANG (CUMAS) DU CNHU-HKM**

Zohoun A<sup>1,2,3</sup>, Baglo-Agbodande T<sup>1,2</sup>, Ladekpo S<sup>1</sup>, Massi R<sup>1</sup>, Houssou B<sup>1</sup>, Orou Guiwa C<sup>1</sup>, Dèhoumon J<sup>1</sup>, Mehoul J<sup>1</sup>, Anani L<sup>1,2</sup>, Kinde-Gazard D<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Clinique Universitaire des Maladies du Sang – CNHU-HKM – Cotonou

<sup>2</sup> Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou

<sup>3</sup> Hôpital d'Instruction des Armées – Centre Hospitalier Universitaire de Cotonou

**Introduction** : La drépanocytose constitue un problème de santé publique. Sa prise en charge est multidisciplinaire et nécessite un suivi régulier. Dans les pays en développement, elle se heurte à de nombreuses difficultés notamment socio-économiques. Il nous a paru utile d'évaluer le coût de cette prise en charge et plus particulièrement celui afférent aux analyses biologiques.

**Méthode** : Etude prospective à visée descriptive et analytique menée d'août à novembre 2015 et portant sur un échantillon de 49 patients drépanocytaires.

**Résultats :** L'échantillon était composé en majorité de 40 drépanocytaires homozygote SS (81,63%) et 07 drépanocytaires double hétérozygote SC (14,29%). Vingt-cinq patients (51%) étaient de sexe masculin. L'âge moyen des patients était de 22 ans. Le coût de la prise en charge se répartissait en coûts directs et en coûts indirects et intangibles. Le coût moyen de la prise en charge d'un patient drépanocytaire non assuré était de 71953 FCFA par mois soit en moyenne 863440 FCFA par an. En ce qui concerne le bilan biologique, le coût moyen était de 26104 FCFA soit le tiers du coût moyen de la prise en charge globale. Enfin, les principaux facteurs influençant significativement la prise en charge des patients drépanocytaires étaient représentés par la survenue de complications et les charges non-médicales notamment les frais de déplacement.

**Conclusion :** La drépanocytose constitue un lourd fardeau pour les patients et leurs familles. L'évaluation du coût de la prise en charge de la maladie drépanocytaire et les actions visant à le réduire permettront d'améliorer les conditions de vie des patients drépanocytaires.

**Mots clés :** Drépanocytose, Biologie, Coût.

### SS-CO-27

#### PALUDISME ET URGENCES DREPANOCYTAIRES A LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE DES MALADIES DU SANG DU CNHU-HKM DE COTONOU

Zohoun A<sup>1,2,3</sup>, Baglo-Agbodande T<sup>1,2</sup>, Dodo R<sup>1</sup>, Houssou B<sup>1</sup>, Massi R<sup>1</sup>, Orou Guiwa C<sup>1</sup>, Dèhoumon J<sup>1</sup>, Mehoul J<sup>1</sup>, Anani L<sup>1,2</sup>, Kinde-Gazard D<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Clinique Universitaire des Maladies du Sang – CNHU-HKM – Cotonou

<sup>2</sup> Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou

<sup>3</sup> Hôpital d'Instruction des Armées – Centre Hospitalier Universitaire de Cotonou

**Introduction :** Le paludisme et la drépanocytose représentent deux problèmes de santé publique majeurs au Bénin. Les complications aiguës infectieuses de la drépanocytose peuvent constituer des urgences avec la mise en jeu du pronostic vital ou fonctionnel. Notre travail avait pour objectif d'étudier l'association paludisme et urgences drépanocytaires à la Clinique Universitaire des Maladies du Sang (CUMAS) du CNHU-HKM de Cotonou.

**Méthode :** Etude rétrospective et descriptive de janvier 2014 à décembre 2015 et portant sur l'ensemble des patients hospitalisés pour une urgence drépanocytaire. Nous avons exclu les patients hospitalisés pour des complications drépanocytaires chroniques.

**Résultats :** Deux cent quatre (204) patients ont été admis pour une urgence drépanocytaire durant la période d'étude. Cent vingt-quatre patients (60,8%) étaient de sexe masculin. L'âge moyen des patients était de 24,2 ans. L'homozygotie SS était majoritairement représentée à 72,1%. Le paludisme était retrouvé à une fréquence de 27,5% et constituait la troisième étiologie la plus fréquente après les crises vaso-occlusives ostéo-articulaires (70,1%) et la décompensation anémique (30,4%). *P. falciparum* était la seule espèce retrouvée et la parasitémie moyenne était de 4918 trophozoïtes/ $\mu$ L.

**Conclusion :** Le paludisme est une complication aiguë et une urgence chez le patient drépanocytaire. Contrairement aux croyances véhiculées, la survenue d'une fièvre chez le drépanocytaire doit faire évoquer la possibilité d'une infestation palustre et une investigation systématique doit être entreprise.

**Mots clés :** Drépanocytose, Paludisme, Urgences.

**SS-CO-28****PERCEPTIONS ET PRATIQUES DE PREVENTION DU DIABETE DANS LA COMMUNE DE COME EN 2019**

ATIOGBE Kougbéssi Gélase<sup>1</sup>, DEGBEY Cyriaque<sup>1,2</sup>, SOPOH Ghislain E.<sup>1</sup>, OUENDO Edgard-Marius D<sup>1</sup>.

*1 Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey Calavi, Bénin.*

*2 Clinique Universitaire d'Hygiène Hospitalière du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert KOUTOUKOU MAGA de Cotonou, Bénin.*

**Introduction :** Le diabète est un important problème de santé publique, et l'une des quatre maladies non transmissibles prioritaires ciblées par l'OMS. L'étude s'est consacrée aux perceptions et aux pratiques de prévention du diabète dans la commune de Comé en 2019.

**Méthode :** Il s'agit d'une étude transversale analytique, avec des aspects quantitatifs et qualitatifs, qui s'est déroulée en janvier 2019. L'échantillonnage a été probabiliste (échantillonnage en grappes à trois degrés) pour 164 membres de la communauté ayant au moins 15 ans, constituant la cible primaire, et non probabiliste (par commodité ou choix raisonné) pour les cibles secondaires constituées par les relais communautaires, les agents de santé, le représentant du maire et 6 autres membres de la communauté ayant participé à un focus group. Au total, 195 individus enquêtés. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire et un guide d'entretien en adéquation avec chacune des cibles.

**Résultats :** L'étude a révélé des insuffisances dans les connaissances des enquêtés, ce qui influence les perceptions. En effet, parmi, respectivement, ceux qui ont de bonnes perceptions (45 sur les 164 soit 27,44%), et de bonnes pratiques de prévention (7,93% soit 13 sur les 164), 68,89% (soit 31 sur 45) et 76,92% (soit 10 sur 13), ont reçu des informations en matière de diabète. Les cibles secondaires nous ont beaucoup plus renseignés sur le vécu des diabétiques et la politique de prévention du diabète dans la commune de Comé. Les participants du focus group ont exprimé un besoin de suivi de proximité.

**Conclusion :** Des défis restent encore à relever afin d'améliorer les perceptions et les pratiques de préventions du diabète. Il faut intensifier les activités d'information, d'éducation et de communication afin d'induire des changements de comportements de la communauté.

**Mots clés :** diabète, perception, pratiques.

**SS-CO-29****PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET CLINIQUE DE 52 CAS D'ULCERE DE BURULI INFECTES PAR LE VIH PRIS EN CHARGE DANS 3 CDTUBS DU BENIN DE 2005 A 2019**

Adjimon Gilbert Ayelo<sup>1</sup>, Yves Thierry Barogui<sup>2</sup>, Ronald Gnimavo<sup>3</sup>, Jean Gabin Houezo<sup>4</sup>, Esaï Anagonou<sup>4</sup>, Roch Christian Johnson<sup>5</sup>, Ghislain Emmanuel Sopoh<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Centre de Dépistage et de Traitement de l'Ulcère de Buruli d'Allada, Bénin. <sup>2</sup> Centre de Dépistage et de Traitement de l'Ulcère de Buruli de Lalo, Bénin. <sup>3</sup> Centre de Dépistage et de Traitement de l'Ulcère de Buruli de Pobè, Bénin. <sup>4</sup> Programme National de Lutte contre la Lèpre et l'Ulcère de Buruli, Cotonou, Bénin. <sup>5</sup> Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable, Abomey Calavi, Bénin. <sup>6</sup> Institut Régional de Santé Publique de Ouidah, Bénin.

**Introduction :** L'ulcère de Buruli (UB) est une maladie tropicale négligée causée par une bactérie de l'environnement, le *Mycobacterium ulcerans*. Il est la 3<sup>ème</sup> affection mycobactérienne la plus fréquente dans le monde derrière la tuberculose et la lèpre. L'objectif

de ce travail est de décrire le profil épidémiologique des cas d'UB infectés par le VIH pris en charge au Bénin de 2005 à 2019.

**Méthode** : Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive et analytique qui a concerné les cas d'UB infectés par le VIH pris en charge dans les CDTUB du Bénin de 2005 à 2019 et dont les données sont disponibles.

**Résultats** : 52 nouveaux cas d'UB, co-infectés par le VIH ont été enregistrés dans les 3 CDTUBs au Bénin de 2005 à 2019 soit une moyenne annuelle de 3,47 cas. L'âge médian des cas était de 35ans (IIQ : 27,5-46,5ans). La durée médiane d'évolution des lésions avant consultation était de 72 jours (IIQ : 37,5-150 jours). 88,5% des cas présentaient de lésions ulcérées, 65,4% étaient de sexe féminin, 15,7% avaient de lésions multiples et 70,7% avaient des lésions de catégorie 3. La quasi-totalité (94,2%) des cas avaient des lésions au niveau des membres et un peu plus de la moitié (52,1%) présentaient de limitations de mouvements articulaires. 91,7% des patients avaient eu besoin de la chirurgie et la durée médiane de cicatrisation était de 151 jours (IIQ : 90-211 jours).

**Conclusion** : Cette étude fait remarquer que la majorité des cas d'UB associés à une infection à VIH sont de cas ulcérés siégeant pour la plupart au niveau des membres avec des limitations de mouvements articulaires. Une étude approfondie est ainsi nécessaire pour apprécier l'effet de l'infection au VIH sur l'évolution de l'UB.

**Mots clés** : Ulcère de Buruli, co-infection au VIH, Bénin

### SS-CO-30

#### EVOLUTION DES ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DEPARTEMENTAL DE L'OUEME/PLATEAU

R. A. SITOU<sup>1</sup>, B. D. AVOCETIEN<sup>1</sup>, O. D. AZE<sup>1,2</sup>, D. HOUNHOUENOU<sup>1</sup>, J. TEBA<sup>1</sup>, B. AKPLOGAN<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Unité de Recherche : Déficiences, Activités Physiques Adaptées et Réhabilitation du Laboratoire des Sciences de la Vie de la Santé. Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique et du Sport/Université d'Abomey-Calavi (INJEPS/UAC), 01 BP 169, Porto-Novo, Bénin

<sup>2</sup> Université de Lyon, UJM-Saint-Etienne, LIBM, EA 7424, F-42023, SAINT-ETIENNE, France

**Auteur correspondant** : AZE Oscar, e-mail : oscar\_aze@yahoo.fr

**Introduction** : L'Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est une pandémie qui sévit dans le monde. Si l'organisation des soins permet d'avoir une bonne idée des conséquences des AVC dans les pays développés, ceux en développement se démarquent par l'existence de données parcellaires.

**Méthodes** : Il s'agissait d'une étude rétrospective basée sur un screening indépendant des dossiers des patients pris en charge pour AVC au Centre Hospitalier Universitaire Départemental Ouémé/Plateau.

**Résultats** : 909 dossiers médicaux d'AVC ont été inclus. Sur le plan de la prise en charge, 55,5% des dossiers provenaient de la Médecine interne avec un pic de consultation (14,9%) en 2018. La moyenne d'âge des AVC au CHUD-O/P a évolué de façon croissante de 2015 à 2019 (57,4±11,7 à 59,8±15,3 ans). Les hommes ont plus souffert d'AVC que les femmes (53,2 versus 46,8% ; p=0,05). Le recours au scanner pour déterminer le type d'AVC a connu une amélioration dans le temps (0 à 8,9%). La mortalité au CHUD-O/P était de 18,8% avec des pics de décès en 2017 et 2019 (5,2 et 7,3%). Tous les patients admis à l'hôpital n'ont pas suivi les soins : 9,6% étaient sortis contre avis médical.

Sur le plan fonctionnel, nos investigations n'ont pas permis d'appréhender les niveaux d'atteintes motrices et fonctionnelles des patients malgré un recours au service de rééducation par 30,5% de ces derniers.

**Conclusion :** Au CHUD-O/P, les AVC sont devenus fréquents et touchent une population jeune et productive. Une meilleure connaissance des conditions de la prise en charge initiale permettrait de réduire la mortalité, les séquelles et le handicap qui en sont consécutifs. Nous suggérons l'installation d'une unité de scanner dans cet hôpital pour favoriser un diagnostic rapide des AVC.

**Mots clés :** AVC, Evolution, Bénin.

### SS-CO-31

#### ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUE, CLINIQUE, PARACLINIQUE, THERAPEUTIQUE ET EVOLUTIF DES PLEURESIES

**Bognon Gilles, Padonou Caroline, Dah-Bolinon Roméo, Sagbo Gratien**

Service de pédiatrie du CHUD-OP

**Introduction :** la pleurésie est fréquente en pédiatrie dans les pays en développement. Ce travail vise à décrire les caractéristiques et les facteurs de mauvais pronostic des enfants hospitalisés.

**Méthode :** il s'agissait d'une étude prospective, descriptive et analytique ayant porté sur les enfants de 01 mois à 17 ans hospitalisés de septembre à décembre 2019 pour pleurésie dans trois hôpitaux universitaires au Sud du Bénin.

**Résultats :** sur 3379 enfants admis, 25 avaient présenté une pleurésie soit une fréquence hospitalière de 0,74%. Le sex-ratio était de 0,8. La majorité des enfants avait moins de 5ans. Les parents avaient un bas niveau socio-économique (18/25). Le délai avant admission était plus de 7 jours chez 16 enfants. Les principaux symptômes étaient la fièvre, la dyspnée et la toux. La majorité des enfants avait la vaccination PEV à jour (21/25). La quasi-totalité des enfants présentait une détresse respiratoire (24/25). A la radiographie pulmonaire, les pleurésies étaient de grande abondance (12/25). Les principaux germes retrouvés étaient le *Staphylococcus aureus* (16/25), le *Streptococcus pneumoniae* (3/25) et le *Streptococcus A* (1/25). Tous les enfants avaient bénéficié d'une oxygénothérapie et d'une antibiothérapie ; le drainage était réalisé chez 22 enfants. La durée moyenne d'hospitalisation était de 14jours. Vingt-un enfants étaient guéris sans séquelle et deux enfants décédés. Les facteurs associés à l'évolution défavorable des pleurésies étaient le délai d'admission ( $p = 0,035$ ) et la détresse respiratoire ( $p = 0,049$ ).

**Conclusion :** De cette étude, il ressort que la pleurésie reste une réalité chez les enfants de 01 mois à 5 ans et il est impératif que le diagnostic et la prise en charge soient précoces.

**Mots clés :** pleurésie- détresse respiratoire-drainage pleural

### SS-CO-32

#### ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'OFFRE DES SOINS DE SANTE DANS LES CENTRES DE SANTE URBAINS AU SUD DU BENIN: CAS DES CENTRES DE SANTE D'AYELAWADJE, DE SAINT-MICHEL ET D'AÏDJEDO DE COTONOU

DAMIEN B. Georgia<sup>1,2</sup>, AGUEMON Badirou<sup>2</sup>, CAPO-CHICHI P. Sèna<sup>2</sup>, LISBOA Lucrette<sup>2</sup>, SOSSOU Benoît<sup>1</sup>, MEDEDJI Damien<sup>1</sup>, GANSOU G. Magloire<sup>2</sup>, AGODOKPESSI Gildas<sup>2</sup>, MEHINTO Delphin<sup>2</sup>, OUENDO Edgard<sup>3</sup>, LE HESRAN Jean-Yves<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Centre de Formation et de Recherche en matière de Population (CEFOP) / UAC

<sup>2</sup> Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou (FSS) / UAC

<sup>3</sup> Institut Régional de Santé Publique (IRSP) / UAC

<sup>4</sup> Unité Mixte de Recherche (UMR261)-MERIT, Institut de Recherche pour le développement (IRD) / Université Paris Descartes

**Introduction :** Au Bénin, l'amélioration de la qualité de l'offre sanitaire constitue l'un des principaux objectifs de l'Assurance pour le Recouvrement du Capital Humain (ARCH). Pour y parvenir, il est utile de renseigner l'activité réelle des centres de santé (CS). Par ailleurs, le Bénin a pris part active à l'opération de lutte contre la criminalité pharmaceutique transnationale (opération "Pangea IX") avec démantèlement du marché de vente de médicaments contrefaits. Notre étude avait pour but d'analyser la demande, et l'offre de soins dans certains CS urbains de Cotonou et de mesurer l'effet de Pangea IX sur la fréquentation des CS.

**Méthode :** Il s'agissait d'une étude rétrospective descriptive et analytique portant sur les données enregistrées des patients ayant consulté dans les dispensaires de trois centres de santé (Ayélawadjè, Saint Michel et Aïdjèdo) de Cotonou entre juin 2016 et juin 2018. Les variables étudiées étaient : âge, sexe, motifs de consultations, diagnostics établis, prescriptions faites, bilans demandés et conseils donnés, référencement de malades effectués.

**Résultats :** Sur 14170 consultations enregistrées dans les trois CS de juin 2016 à juin 2017, la population consultante étaient majoritairement féminine (sex-ratio:1,26) et l'âge moyen était de 21 ans. La fièvre (62,32%), constituait le premier motif déclaré. Le TDR (48,51%), la GE/DP (40,94%) et la NFS (35,9%) étaient prioritairement demandé. Le paludisme simple (20,84%), les IRA (12,51%) et les gastroentérites (6,85%) étaient les plus fréquents. Les classes de médicaments fréquemment utilisés étaient: antalgiques (26,7%), antibiotiques (24,5%) et antipaludiques (10,98%). Peu de patients ont bénéficié de conseils et de sensibilisations par rapport aux affections. Pangea IX a eu augmenté la fréquentation des CS pour certaines pathologies infectieuses ( $p < 0,05$ ).

**Conclusion:** Les CS n'arrivent pas à couvrir correctement les objectifs des soins de santé primaires dans les trois CS. Il existe le besoin de disponibilité de moyens techniques de diagnostic et un cadre adéquat de référencement des malades.

**Mots clés:** Soins de Santé Primaires, Demande de soins et Offre de soins, Cotonou.

### SS-CO-33

#### CONNAISSANCES EN RADIOPROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX RAYONNEMENTS IONISANTS EN MILIEU MEDICAL EN AFRIQUE FRANCOPHONE SUB-SAHARIENNE

B.G. Damien<sup>1</sup>, D.W.M.M. Akanni<sup>2</sup>, K.-M. Savi de Tové<sup>2</sup>, S.M. Kiki<sup>2</sup>, S.B.M.G. Adjadohoun<sup>3</sup>, P. Yekpe-Ahouansou<sup>3</sup>, B. Aguemou<sup>3</sup>, P. Ayélo<sup>3</sup>, K.P. N'zi<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Centre de formation et de recherche en matière de population, Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin.

<sup>2</sup> Faculté de médecine, Université de Parakou, Parakou, Bénin.

<sup>3</sup> Faculté des sciences de la santé, Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin.

<sup>4</sup> Institut de cardiologie d'Abidjan, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte-d'Ivoire.

**Introduction :** L'objectif de cette étude était de mesurer le niveau de connaissances en radioprotection des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants en milieu médical en Afrique francophone sub-saharienne.

**Méthodes :** Une étude transversale sous forme de questionnaire a été réalisée à Cotonou en mai 2019 durant les Journées de radiologie d'Afrique noire francophone (JRANF). Les connaissances ont été évaluées sur les sources des rayonnements ionisants (RI), les principes élémentaires de la radioprotection, les effets biologiques des RI, les effets pathologiques des RI, les grandeurs et unités en radioprotection, la radioprotection des patients, la grossesse et l'exposition médicale aux RI. Le score global des connaissances (SGC) a été calculé à partir du nombre de bonnes réponses aux questions ( $n = 20$ ) et classé en « Bon », « Moyen » ou « Mauvais ». La relation entre la qualification professionnelle des travailleurs et leurs connaissances en radioprotection a été analysée.

**Résultats :** La population d'étude était composée de 91 travailleurs. La moyenne du SGC était de 7,9 avec des valeurs extrêmes de 2 et 12. Le SGC était classé « Mauvais » chez 93,41 % de la population d'étude et aucun des enquêtés n'avait un SGC classé « Bon ». Le SGC des manipulateurs était deux fois plus petit que celui des DES-RIM ( $p < 0,0001$ ) et trois fois plus petit que celui des médecins radiologues ( $p < 0,0001$ ).

**Conclusion :** La connaissance en radioprotection des travailleurs exposés en milieu médical dans les pays africains francophones sub-sahariens est globalement mauvaise. La mise en place par la SRANF d'un programme de formation initiale et continue en radioprotection commune à tous les pays membres ainsi que des guides de procédures de réalisation des examens d'imagerie pourrait permettre de relever le niveau de connaissances des travailleurs exposés.

Mots clés : radioprotection / connaissances / Afrique

## SS-CO-34

### EFFICACITE DES MASQUES CHIRURGICAUX ET ARTISANAUX EN MILIEU UNIVERSITAIRE AU BENIN EN 2020

Juliana DAHOU<sup>1</sup>, Rafiatou BA<sup>1</sup>, Damien TOFFA<sup>1</sup>, Brifelle TENTE<sup>1</sup>, Harvey JOHNSON<sup>1</sup>, Carine ZINSOU<sup>1</sup>, Franck MIGNANWANDE<sup>1</sup>, Parfait DJOSSOU<sup>1</sup>,

\*Roch Christian JOHNSON<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Laboratoire d'Hygiène-Assainissement, d'Ecotoxicologie et de Santé Environnementale HECOTES/CIFRED/UAC, 03BP1463 Cotonou, Bénin

**Introduction :** Dans la lutte contre la pandémie à COVID 19, le port des masques fait partie des solutions proposées par l'OMS. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'efficacité des masques chirurgicaux et artisanaux en milieu universitaire au CIFRED en 2020.

**Méthodes :** Les analyses microbiologiques ont été réalisées sur 20 échantillons de masques à raison de 05 avant et après usage des masques chirurgicaux et 05 avant et après usage des masques artisanaux. Les prélèvements ont été faits dans les boîtes de Petri de contact par empreinte gélosée suivant la Norme NF EN ISO 14698-1 (2004). Avant utilisation les masques ont été stérilisés puis prélevés. Pendant l'utilisation les étudiants ont parlé et toussés dans les masques dans une zone stérile pendant 90 secondes puis les faces externes des masques ont été prélevées. Ces boîtes ont été incubées pendant 24 heures à 37 °C à l'étuve. Les colonies trouvées après incubation ont fait l'objet d'un examen microscopique après la coloration de Gram. Pour leur identification les différentes colonies ont été soumises aux tests de catalase ou d'oxydase.

**Résultats :** Avant usage des masques, aucun germe n'a été retrouvé. Mais après usage des masques, la moyenne de présence de germes est de 2 UFC/25Cm<sup>2</sup> aussi bien sur les masques chirurgicaux que sur les masques artisanaux.

**Conclusion :** Les masques qu'ils soient artisanaux ou chirurgicaux ont la même efficacité dans la lutte contre les infections. L'utilisation des masques artisanaux ou chirurgicaux est conseillée pour une meilleure prévention des infections.

**Mots clés :** masques chirurgicaux et artisanaux, contamination, bactéries

## SS-CO-35

### DE LA DECOUVERTE A LA DEPENDANCE AUX SUBSTANCES PSYCHOACTIVES CHEZ LES ADOLESCENTS EN MILIEU SCOLAIRE A COTONOU

A. Odile KOUGBLENOU<sup>1</sup>; Pierre C. MELIHO<sup>1</sup>; Ferdinand M. ADOUNKPE<sup>2</sup>; A. Assad. BIO SYA<sup>2</sup>; C. Arnaud AGBANLINSOU<sup>3</sup>; Eric AKPI<sup>1</sup>; Monique OUASSA<sup>1</sup>; Rock HOUNGNIHIN<sup>1</sup>; Codjo Adolphe KPATCHAVI<sup>1</sup>; Dismand HOUINATO<sup>4</sup>; Anatole LALEYE<sup>3</sup>; Aurel ALLABI<sup>2</sup>

1- Laboratoire de Sociologie et d'Anthropologie Médicale Appliquée (LAMA), Université d'Abomey-Calavi (UAC);

2- Laboratoire National de Stupéfiants et de toxicologie (LNST), Université d'Abomey-Calavi (UAC);

3- Laboratoire d'Histologie, Biologie de la Reproduction, Cytogénétique et Génétique Médicale (LHBRGCM), Université d'Abomey-Calavi (UAC)

4- Laboratoire d'Epidémiologie des Maladies Chroniques Et Neurologiques (LEMACEN), Faculté des Sciences de la santé/Université d'Abomey-Calavi (FSS/UAC)

Cet article décrit et analyse le parcours des adolescents scolaires consommateurs de substances psychoactives (SPA), de la découverte à la dépendance. Il s'agit d'une enquête descriptive et analytique à visée qualitative. Elle s'est déroulée dans la période de mars à avril 2020 dans 10 lycées et collèges à Cotonou et a porté sur un échantillon de 40 adolescents et jeunes âgés de 10 à 24 ans. Ces derniers ont été sélectionnés par la technique de choix raisonné et de boule de neige. L'observation participante, l'entretien individuel et l'entretien de groupe sont les techniques ayant servi pour la collecte de données.

L'enquête a montré que la découverte à un âge précoce des SPA a favorisé le développement d'une habitude de consommation abusive et dépendante chez certains adolescents et jeunes, contrairement à d'autres qui sont parvenus à maîtriser leur consommation.

La carence affective, le relâchement des normes et valeurs sociales et l'absence (temporaire ou permanent) de figure parentale sont les déterminants de l'usage dépendant des SPA. La rupture du parcours de consommation, quant à elle, est associée à la déception liée à des sensations désagréables, au goût ou aux effets de la substance découverte à la première consommation, une forte conviction des risques sociaux et sanitaires des SPA et la peur de la perte de confiance et de l'affection d'un parent/proche.

L'usage des SPA est une pratique qui prend de l'ampleur en milieu scolaire au Bénin. Il pose un réel problème social et de santé publique qui mérite de profondes réflexions scientifiques pour la contribution aux éventuelles actions préventives et la prise en charge des cas de dépendance avérée.

**Mots clés :** substances psychoactives, Adolescents, dépendance

**SS-CO-36****SUBSTANCES PSYCHOACTIVES EN MILIEU SCOLAIRE AU BENIN : ETHNOGRAPHIE DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT, DES USAGES ET DES EFFETS CHEZ LES ADOLESCENTS ET JEUNES**

A. Odile KOUGBLENOU<sup>1</sup>; Ferdinand M. ADOUNKPE<sup>2</sup>; Pierre C. MELIHO<sup>1</sup>; C. Arnaud AGBANLINSOU<sup>3</sup>; A. Assad BIO SYA<sup>2</sup>; Monique OUASSA<sup>1</sup>; Rock HOUNGNIHIN<sup>1</sup>; Codjo Adolphe KPATCHAVI<sup>1</sup>; Dismand HOUINATO<sup>4</sup>; Anatole LALEYE<sup>3</sup>

1- Laboratoire de Sociologie et Anthropologie Médicale Appliquée (LAMA), Université d'Abomey-Calavi (UAC)

2- Laboratoire National de Stupéfiants et de toxicologie (LNST), Université d'Abomey-Calavi (UAC)

3- Laboratoire d'Histologie, Biologie de la Reproduction, Cytogénétique et Génétique Médicale (LHBRCGM)

4- Laboratoire d'Epidémiologie des Maladies Chroniques Et Neurologiques (LEMACEN), Faculté des Sciences de la santé/Université d'Abomey-Calavi (FSS/UAC)

Au Bénin, la vente et l'usage de substances psychoactives (SPA), surtout dans l'espace scolaire sont en augmentation malgré les mesures et les stratégies de prévention et de lutte contre le phénomène. L'objectif de cet article est de décrire et d'analyser les usages de SPA et leurs implications sanitaires et sociales chez les adolescents et jeunes scolaires à Cotonou. L'étude est de type transversal, descriptif et analytique à deux volets : quantitatif et qualitatif. Elle s'est déroulée dans 10 lycées et collèges auprès de 384 élèves âgés de 10 à 24 ans enquêtés aux moyens de techniques de collecte telles que : l'observation directe, les entretiens directs et semi-directifs dans la période de mars à avril 2020.

L'enquête a montré que les lycées et collèges à Cotonou ainsi que leur environnement proche sont des espaces sociaux facilitant l'approvisionnement, l'usage et le mésusage de substances psychoactives. L'absence ou le manque d'autorité parentale, le statut social des parents, le relâchement des normes et valeurs sociales, le manque de contrôle sur les adolescents, la quête d'intégration sociale et la quête de performance physique, intellectuelle et sexuelle sont les principaux motifs d'usage de ces produits chez les adolescents et jeunes scolaires.

Cette enquête a également révélé que la consommation de SPA a entraîné des conséquences sur la santé physique et psychique, les relations entre pairs, entre enseignants-enseignés, entre autorités scolaires et enseignants. Cette pratique pose un véritable problème de santé publique.

Au Bénin, l'usage des SPA chez les adolescents et jeunes se généralise en milieu scolaire. Il constitue un frein au bon fonctionnement du système éducatif, au développement et à l'atteinte des objectifs du développement durable (ODD).

**Mots clés** : substances psychoactives, milieu scolaire, ethnographie

**SS-CO-37****CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DE LA POPULATION DE LA RÉGION DE DAKAR SUR LA COVID-19**

Mamadou Makhtar Mbacké LEYE <sup>a</sup>, Keita I M <sup>b</sup>, Bassoum O <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Service de Médecine Préventive et Santé Publique, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar

<sup>b</sup> Ministère de la Santé et de l'Action Sociale

**Introduction :** Devant l'augmentation des cas confirmés de COVID-19 au Sénégal particulièrement dans la région de Dakar, épicerie de la maladie, il s'avère nécessaire d'étudier les connaissances, attitudes et pratiques des populations des districts Ouest et Sud sur la COVID-19.

**Méthodologie :** Une étude transversale, descriptive, à visée analytique a été réalisée du 09 au 30 mai 2020. Un sondage en grappes à quatre degrés a été effectué au niveau des districts Ouest et Sud. Des analyses univariées et multivariées ont été effectuées par le logiciel R 3.4.4.

**Résultats :** Au total, 400 personnes ont été enquêtées. L'âge moyen des personnes enquêtées était de  $40,2 \pm 14,7$  ans et des extrêmes de 18 et 82 ans. Le sexe masculin prédominait soit 66,5 % des cas. Les personnes avaient de bonnes connaissances des signes, des risques de transmission et des mesures de prévention respectivement dans 4,7 % ; 3 % et 47,8 %. Au total, 74% des personnes enquêtées respectaient le concept de « restez chez vous ». Le port du masque et le lavage systématique des mains avec de l'eau et du savon étaient notés chez les personnes enquêtées respectivement dans 53,6 % et 34,8 % des cas. Les personnes qui avaient de bonnes connaissances sur les mesures de prévention contre la COVID-19 portaient plus le masque ( $OR_{aj} = 2,1[1,2-3,5]$ ) et lavaient plus leurs mains avec l'eau et du savon ( $OR_{aj} = 1,9[1,1-3,4]$ ).

**Conclusion :** L'engagement communautaire est essentiel pour l'adoption de comportements favorables pour la lutte contre la COVID-19. Ainsi, il est important de renforcer les interventions de lutte comme la communication pour un changement de comportements et les actions visant à rendre disponibles les moyens de prévention aux bénéfices de toute la population.

**Mots clés :** prévention, COVID-19, pandémie.

## SS-CO-38

### LES DETERMINANTS DU RECOURS AUX SOINS DE SANTE PAR LES ADULTES A BRAZZAVILLE

Yvonne V. Y. Mavoungou<sup>1</sup>, Bazaba Nelly<sup>2</sup>, Levi Mankoussou<sup>3</sup>, Jean Claude Mobousse<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo ; BP :15405. Email : [yvoumbo@yahoo.fr](mailto:yvoumbo@yahoo.fr)

<sup>2</sup>Direction générale de la population

<sup>3</sup>Institut National de la Statistique, Brazzaville

<sup>4</sup>Direction Départementale de la Santé de Brazzaville

**Introduction :** Les rapports d'activités des formations sanitaires publiques indiquent une diminution des recours aux soins, dans les services de santé publics depuis quelques mois. L'objectif de ce travail est d'analyser le recours aux soins au sein des formations sanitaires par les adultes à Brazzaville en période de Covid19.

**Méthode :** Il s'agit d'une étude transversale descriptive ; les données proviennent d'une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques sur la covid 19 réalisée du 18 au 24 août 2020 à Brazzaville. Les réponses des personnes âgées de plus de 18 ans ayant présenté un épisode morbide au cours du mois précédant l'étude sont exploitées. Les caractéristiques socio démographiques des enquêtés, la perception de la gravité de la maladie, les types de recours de soin ont été considérés comme variables de l'étude.

**Résultats** : Au total 161 individus de plus de 18 ans, ont déclaré avoir eu recours à des soins lors du dernier épisode morbide. L'âge moyen des sujets étaient de 37 ans avec une légère prédominance féminine (sex-ratio=1,14). Les moins de 30 ans (46%) avec un niveau d'étude secondaire (49,1%) était plus représenté. Les motifs de consultation déclarés : les fièvres isolées (57,1%), les syndromes grippaux (19,3%) mal de tête (13,0%) ont été les plus importants. Parmi les enquêtés, une seule femme a déclaré avoir eu la covid19. Le recours aux soins est lié à l'âge et au niveau d'instruction ( $p < 0,05$ ). L'utilisation des formations sanitaires publiques ou privées ou de l'automédication est constatée sans différence significative ( $p > 0,05$ ).

**Conclusion** : Cette étude a montré que le recours aux soins des plus de 18 ans est lié aux caractéristiques individuelles ; des études approfondies nationales sont envisager pour mieux apprécier le recours aux formations sanitaires des adultes.

**Mots clés** : formation sanitaire, adulte, motif de consultation.

### SS-CO-39

#### OBESITE ET FACTEURS ASSOCIES AU BENIN, ANALYSE DES DONNEES DE L'ENQUETE NATIONALE STEPS 2015.

C Mizéhoun-Adissoda<sup>1,2</sup>, R Santos<sup>1,2</sup>, S Amidou<sup>1</sup>, C Houehanou<sup>1</sup>, T Totah<sup>1</sup>, H Robin<sup>1,3</sup>, D Houinato<sup>1,3</sup>

- 1) Laboratoire d'épidémiologie des maladies chroniques et neurologiques, faculté des sciences de la santé/université d'Abomey-Calavi (FSS/UAC), 01 BP 188, Cotonou, Bénin
- 2) École de nutrition et diététique, faculté des sciences de la santé/université d'Abomey-Calavi (FSS/UAC), 01 BP 188, Cotonou, Bénin
- 3) Inserm, université de Limoges, CHU de Limoges, UMR 1094, Institut d'épidémiologie neurologique et d'épidémiologie tropicale, 2 rue du Dr. Marcland, 87 025 Limoges Cedex, France

Auteur correspondant : Carmelle Mizéhoun-Adissoda, Tel : +22921302013/ 21304095 ;

Email : [carmelle.mizehoun@gmail.com](mailto:carmelle.mizehoun@gmail.com)

**Introduction** : L'obésité est devenue un problème de santé publique dans les pays en développement. Au Bénin, l'enquête STEPS réalisée en 2008 révélait une prévalence de l'obésité de 9,40%. L'objectif était d'estimer la prévalence de l'obésité et les facteurs y associés en utilisant les données de l'enquête STEPS-2015 au Bénin.

**Méthode** : Une analyse secondaire des données recueillies lors d'une étude transversale nationale dont l'objectif était d'évaluer les facteurs de risque des maladies non transmissibles (MNT) a été effectuée. L'enquête a été conduite selon l'approche STEPwise. 5200 sujets adultes âgés de 18-69 ans ont été sélectionnés par échantillonnage probabiliste en grappes en fonction des informations issues du recensement général de la population et de l'habitat du Bénin. L'obésité a été déterminée par l'indice de masse corporelle (IMC). Une régression logistique multivariée a été utilisée pour déterminer les facteurs associés à l'obésité.

**Résultats** : Les données de l'IMC ont été considérées pour 4598 sujets. L'âge moyen des participants était de  $34,6 \pm 00,2$  ans avec un sex-ratio de 0,90. L'IMC moyen était de  $23,2 \pm 0,1$  kg/m<sup>2</sup>. La prévalence de l'obésité était de 7,4%, intervalle de confiance 95% [6,0%-9,1%]. Elle était plus élevée dans le département du Zou (16,5%) et plus faible dans le département du Borgou (1,82 %),  $p < 0,001$ . L'âge  $\geq 30$  ans, les sujets de sexe féminin ; la résidence en zone urbaine, le statut socio-économique élevé et la pratique insuffisante d'activité physique, étaient positivement associés à l'obésité  $p < 0,05$ .

**Conclusion :** Une diminution de la prévalence de l'obésité a été observée au plan national de 2008 à 2015. Ce résultat est concordant avec les cibles mondiales nutrition et MNT relatives à l'obésité. Les politiques de suivi et de lutte contre l'obésité devraient être poursuivies et renforcées en tenant compte des spécificités de la population béninoise.

**Mots clés :** Obésité ; Bénin ; STEPS

#### SS-CO-40

##### STATUT EN VITAMINE D DU SUJET AGE BENINOIS VIVANT DANS LA VILLE DE COTONOU

C Mizéhoun-Adissoda<sup>1</sup>, Y. Bakary Ozavino<sup>1</sup>, B Awèdè<sup>1,2</sup>

- 1) École de nutrition et diététique, Faculté des sciences de la santé/université d'Abomey-Calavi (FSS/UAC), 01 BP 188, Cotonou, Bénin
- 2) Laboratoire de Physiologie humaine, Faculté des sciences de la santé/université d'Abomey-Calavi (FSS/UAC), 01 BP 188, Cotonou, Bénin

Auteur correspondant : Carmelle Mizéhoun-Adissoda, Tel : +22921302013/ 21304095 ; Email : [carmelle.mizehoun@gmail.com](mailto:carmelle.mizehoun@gmail.com)

**Introduction :** L'insuffisance ou carence en vitamine D est un problème majeur de santé publique dans le monde. On estime à un milliard, le nombre de personnes insuffisantes ou déficientes en vitamine D, toutes cibles confondues. Des études récentes ont montré une association entre le déficit en vitamine D et les maladies chroniques dont la prévalence est en nette augmentation en Afrique. Ces maladies chroniques s'observent particulièrement chez les personnes âgées qui constituent des sujets à risque de présenter un déficit en vitamine D. La présente étude a été effectuée pour déterminer le statut en vitamine D du sujet âgé vivant dans la ville de Cotonou.

**Objectif :** Evaluer le statut en vitamine D du sujet âgé vivant à Cotonou.

**Méthode :** Il s'agissait d'une étude transversale à visée descriptive et analytique ayant porté sur des personnes âgées, apparemment saines, vivant à Cotonou. Des connaissances et informations relatives à la vitamine D ont été recueillies grâce à un questionnaire. Un prélèvement sanguin a été effectué chez chaque sujet pour le dosage du taux plasmatique de la vitamine D, de la glycémie à jeun et l'insulinémie.

**Résultats :** Notre population d'étude était constituée de 72 sujets dont 39 femmes (54.2%). L'âge moyen était de 65.32±5.68 ans avec des extrêmes de 60 à 83 ans. Le taux plasmatique moyen de la vitamine D était de 81,10±41,6. Seuls 5,6% des sujets présentaient un déficit en vitamine D. Aucune association significative n'a été trouvée entre le statut en vitamine D et l'insulinémie à jeun, la glycémie à jeun, l'indice d'insulinorésistance HOMA-IR, l'IMC, et les facteurs de risque associés au déficit.

**Conclusion :** Le déficit en vitamine D paraît peu fréquent chez les sujets âgés vivant à Cotonou. Des études en population générale, sont nécessaires pour une meilleure appréciation du statut vitaminique du sujet béninois.

**Mots clés :** Statut vitamine D, sujet âgé, Cotonou

#### SS-CO-41

##### INFECTION PAR PAPILLOMAVIRUS ET VIH CHEZ LES FEMMES CONSULTANT A L'HOPITAL MILITAIRE D'ABIDJAN, COTE D'IVOIRE

Zinzendorf NY<sup>1</sup>, Cablan MA, Tahou-Apete S<sup>1</sup>, Dotia A<sup>1</sup>, Lathro JS, Agbessi-Kouassi BT, Brou K<sup>2†</sup>, Krizo A<sup>1</sup>, Djatchi RA<sup>1</sup>, Zaba FS<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Université Felix Houphouët Boigny, UFRSB, <sup>2</sup>Hôpital Militaire d'Abidjan.

## Introduction

Nous avons cherché à documenter l'association entre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et l'immunodéficience et l'infection oncogène par le virus du papillome humain (VPH) chez les femmes ne présentant pas de lésions néoplasiques du col de l'utérus à Abidjan, Côte d'Ivoire

## Méthodes

Cette étude descriptive transversale s'est déroulée d'avril 2015 à mars 2016, chez des patientes consultant au service de gynécologie de l'Hôpital Militaire d'Abidjan. Après consentement éclairé, un dépistage de l'infection à papillomavirus par la méthode de l'inspection visuelle à l'acide acétique et une sérologie VIH sont réalisés. Le diagnostic de l'infection par le VPH et l'identification du génotype ont reposé sur le Kit Linnear Array de Roche Diagnostics.

## Résultats

Au total, 73 femmes (45 séropositives et 28 séronégatives) ont été incluses. La prévalence globale de l'infection par le VPH était de 43,8%. Selon le statut VIH, 51,1 % (23) des femmes étaient co-infectées contre 32,1% (9) de mono-infectés par VPH. Les infections par plusieurs types de HPV étaient plus fréquentes chez les femmes séropositives (34,8 %) /8 que chez les femmes séronégatives (22,2 %),

## Conclusion

La prévalence de VPH est élevée chez les femmes ne présentant pas de lésions néoplasiques du col de l'utérus, en particulier chez les femmes séropositives pour le VIH. Une évaluation de l'impact du VIH sur l'apparition et la persistance de l'infection par VPH est nécessaire afin de concevoir des programmes de dépistage adaptés à l'infection par VPH en Côte d'Ivoire.

## Mots clés

Papillomavirus humain, cancer du col de l'utérus, VIH, Côte d'Ivoire

## SS-CO-42

### Chutes chez les personnes âgées à propos de 210 cas dans un centre de gériatrie (Sénégal)

**Auteurs :** Ousseynou Ka<sup>1</sup>, Cheikh Tacko Diop, Abdoul Aziz Ndiaye<sup>1</sup>, Boris Arthur Aboua Ghébi<sup>2</sup>, Mountaga Elimane Dia<sup>1</sup>Souhaibou Ndonga

<sup>1</sup>UFR Santé et Développement Durable de l'Université Alioune Dio de Bambey

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Téléphone : 00 221 616 49 98

Email : [ousseynou.ka@uadb.edu.sn](mailto:ousseynou.ka@uadb.edu.sn)

**Auteur principal :** Ousseynou Ka

Au Sénégal la réalité de la chute chez les personnes âgées est méconnue puisque les données épidémiologiques ne les prennent pas en compte malgré leur gravité. L'objectif de cette étude était d'étudier les chutes en particulier leur fréquence et déterminants chez des personnes âgées de 60 ans et plus venues en consultation au centre de gérontologie et gériatrie de Ouakam. Il s'agissait d'une étude transversale descriptive qui s'était déroulée du 09 mai au 10 juillet 2016 au centre de gérontologie et gériatrie de Ouakam. La population d'étude était constituée de 210 patients avec une prédominance féminine (61%), un âge moyen de 69 ans, 72% de mariés, 22% pratiquaient une activité physique, 54% avaient un poids normal, 58% prenaient plus d'un médicament. Les pathologies les fréquentes étaient la baisse de l'acuité visuelle (70%), l'hypertension artérielle (52%), l'arthrose (25%)... Les classes médicamenteuses

les plus prescrites étaient les antihypertenseurs (33%), les antalgiques (13%), les antidiabétiques (10%). La prévalence de la chute était de 27% et celle-ci avait eu lieu en général à domicile (65%). Les déterminants de la chute étaient les obstacles au sol (35%), la perte d'équilibre (22%), les sols humides (16%), les escaliers (8%) ...Le nombre de médicaments pris par patient a été le seul facteur statistiquement corrélé au nombre de chutes. Les contusions représentaient l'essentiel des complications mécaniques (62%) par contre tous les patients avaient développé la phobie de chuter à nouveau. Des recommandations ont été formulées pour une meilleure prise en charge de ces chutes.

**Mots clés** : chutes, personnes âgées, centre de gériatrie de Ouakam,

### SS-CO-43

#### QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA VOIE PUBLIQUE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DEPARTEMENTAL DE L'OUEME PLATEAU

Cyriaque Dégbey <sup>1,2</sup>, Yolaine Glèlè Ahanhanzo<sup>1</sup>, Charlemagne Ahouansou<sup>1</sup>, Edgard-Marius Ouendo<sup>1</sup>,

1. Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin

2. Clinique Universitaire d'Hygiène Hospitalière, Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga, Cotonou, Bénin

\*Auteur correspondant: Cyriaque Dégbey, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin et Clinique Universitaire d'Hygiène Hospitalière, Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou MAGA, Cotonou, Bénin; Tél. 0022995960541; Mail : comlancy@yahoo.fr

**Introduction** : L'accès aux soins de qualité est un défi majeur pour tous les systèmes de santé, et le besoin devient plus pressant en situation d'urgence surtout lors des accidents de la voie publique, lorsque le pronostic vital est en jeu. Cette étude avait pour objectif d'évaluer la qualité de la prise en charge des victimes des accidents de la voie publique au Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l'Ouémé Plateau.

**Méthode** : Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive et évaluative portant sur la qualité de la prise en charge des victimes d'accident de la voie publique. Les composantes explicatives sont comparées aux référentiels à partir des entretiens individuels avec les victimes et leurs accompagnants, des dossiers médicaux, des prélèvements et de l'observation directe.

**Résultats** : L'étude montre une faible qualité de la prise en charge des victimes d'accident de la voie publique avec 55,47% de la totalité des scores. Le manque de matériel médico-technique, le non-respect des règles de prévention et de contrôle des infections, l'inexistence de protocole de prise en charge, le coût élevé des actes chirurgicaux, la surcharge de travail du personnel soignant expliquent cette situation.

**Conclusion** : Les composantes évaluées présentent des insuffisances, il est donc important d'agir sur les goulots d'étranglement pour améliorer la fonctionnalité des services afin d'offrir les soins de qualité aux victimes.

**Mots clés** : qualité de prise en charge, accident de la voie publique, Centre Hospitalier Universitaire Départemental Ouémé Plateau, Bénin.

**SS-CO-44****ÉVALUATION QUALITATIVE DES SOINS ET SERVICES OFFERTS AUX PATIENTS TRAUMATISÉS CRANIO-ENCEPHALIQUES A L'UNITÉ DE NEUROCHIRURGIE DU CHUD/B-A EN 2018**

Fatigba O.H<sup>1,2</sup>, Quenum K<sup>1,2</sup>, Amoussou Aristide<sup>1</sup>, Hodonou Adrien<sup>2,3</sup>.

1. *Unité de neurochirurgie, Faculté de Médecine de l'Université de Parakou, Benin*
2. *Département de Chirurgie et spécialités chirurgicales, Faculté de Médecine de l'Université de Parakou, Benin*
3. *Service de Chirurgie générale, Faculté de Médecine de l'Université de Parakou, Benin*

**Correspondance:** Dr Fatigba O. Holden ; Faculté de Médecine de l'Université de Parakou, Email: holfatigba@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9912-8028, Tel: +229.97 49 22 45

**Introduction**

Les traumatismes crânio-encéphaliques (TCE) sont fréquents et potentiellement graves tant à court terme qu'à long terme, d'où l'importance d'un traitement adéquat.

**Objectif.** Evaluer la qualité des soins et services offerts aux patients traumatisés cranio-encéphaliques dans l'unité de neurochirurgie du CHUD-BA.

**Méthode.** Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive et analytique réalisée au CHUD-BA du 1er Mars 2018 au 31 Mai 2018. Tous les traumatisés crânio-encéphaliques hospitalisés ont été suivis de l'admission à la sortie. Les délais de prise en charge et la satisfaction des patients ont été évalués.

**Résultats.** Cent vingt-et-un TCE ont été enregistrés. L'âge moyen était de  $25 \pm 8$  ans. La sex-ratio était de 5,4. Parmi ces patients 40,5% présentaient un TCE grave, 22,3% un TCE modéré et 37,2% un TCE léger. Tous les patients avaient été reçus aux urgences par les stagiaires internés dans un délai de  $8 \pm 5$  minutes. Dans 64,5% l'avis spécialisé était par téléphone avec un délai moyen de  $12 \pm 11,5$  h. Le délai moyen du 1<sup>er</sup> avis spécialisé était de 38h. Tous les scanners encéphaliques avaient été demandés après avis spécialisé avec un délai moyen de réalisation de 37,7h. Aucun patient n'avait bénéficié d'une intubation, sédation ou ventilation mécanique en réanimation. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de  $87 \pm 60,7$  h. La mortalité était de 19,8%. De façon générale 89% des patients étaient satisfaits de l'efficacité du traitement du spécialiste.

**Conclusion.** La qualité de prise en charge de TCE au CHUD-BA n'est pas encore conforme aux recommandations internationales; les procédures de prise en charge devrait être réformée.

**Mots clés:** Qualité de soins, traumatisme cranio-encéphalique, Parakou.

**SS-CO-45****EVALUATION DE LA CAPACITE DES AGENTS DE SANTE A EVALUER L'ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS DE ZERO A ONZE MOIS A L'UNITÉ DE VACCINATION DU CENTRE DE SANTE DE COTONOU 1 EN 2019**

Soussia T.<sup>1\*</sup>, Salloua D.<sup>1</sup>, Sossa Jerome C.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut National Médico-Sanitaire, Université d'Abomey-Calavi

<sup>2</sup> Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum

Email: \*[soussiatheodore@gmail.com](mailto:soussiatheodore@gmail.com)

La malnutrition constitue un problème de santé publique chez les enfants de moins de 5 ans dans les pays en voie de développement. Celle déficitaire, nécessite pour son contrôle

plusieurs approches dont l'évaluation de l'état nutritionnel à tout contact des enfants avec le système de santé. La présente étude a été réalisée pour évaluer la capacité des agents de la santé à évaluer l'état nutritionnel des enfants de 0 à 11 mois reçus au Centre de Santé Cotonou 1. Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive et évaluative qui s'était déroulée du 12 au 30 septembre 2019. Elle concernait quatre agents de santé et 160 enfants âgés de 0 à 11 mois. La méthode non probabiliste avec techniques de choix raisonné (pour les enfants) et de choix exhaustif (pour les agents) a été utilisée et les données étaient analysées par EPIINFO 7.

L'étude a révélé que le niveau de capacité des agents de santé à évaluer l'état nutritionnel des enfants était faible. Le niveau de la capacité de la composante « structure », la sous composante ressources matérielles était bonne (score 6/6). Le score total obtenu sur la composante « processus » était faible (score 5 /12).

La composante « résultat » de la capacité des agents à évaluer l'état nutritionnel des enfants était faible. En conséquence, les faiblesses dans l'évaluation de l'état nutritionnel des enfants nécessitent le renforcement des capacités, la sensibilisation et la supervision des agents.

**Mots clés :** évaluation, capacité, agents

### SS-CO-46

#### EVALUATION DE LA QUALITE DES ASSOCIATIONS DE DOSE FIXE (ADF) D'ANTITUBERCULEUX DISTRIBUEES PAR LE PROGRAMME NATIONAL CONTRE LA TUBERCULOSE AU BENIN

A. Yemoa<sup>\*1,2</sup>, J. Bonou<sup>3</sup>, P. Wachinou<sup>4</sup>, A. Adjagboni<sup>1,2</sup>, A. Amoussa <sup>1,2</sup>, V. Habyalimana<sup>5</sup>, P. Doffon<sup>1,2</sup>, R.D Marini<sup>6,7</sup>

<sup>1</sup> Université d'Abomey Calavi, Faculté des Sciences de Santé de Cotonou, Bénin; <sup>2</sup>Laboratoire de Chimie Analytique et Analyse des Médicaments (LCAM); Faculté des Sciences de Santé de Cotonou, Université d'Abomey Calavi, Bénin, <sup>3</sup>Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Médicaments et Consommables Médicaments/Ministère de la Santé, Bénin <sup>4</sup> Ministère de la Santé, Programme National contre la Tuberculose (PNT), Cotonou, Bénin, <sup>5</sup>Rwanda Biomedical Center / Medical Procurement and Production Division, Kigali, Rwanda, <sup>6</sup>Université de Liège (ULiège), Département de Pharmacie, CIRM, Laboratoire de Chimie Analytique Pharmaceutique (LCAP), Quartier Hôpital, Avenue Hippocrate 15, 4000- Liège, Belgique <sup>7</sup> Université de Kisangani, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Plateau du Campus, B.P. 2012, Kisangani, Commune de Makiso, République Démocratique du Congo

\*Correspondance: [ayemoa@yahoo.fr](mailto:ayemoa@yahoo.fr)

**Introduction :** Les structures de préqualification mises en place par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et adoptées par les Programmes Nationaux contre la Tuberculose (PNT) dont celui du Bénin, permettraient l'achat de médicaments antituberculeux de bonne qualité. Cependant, les distributeurs, les prescripteurs et les dispensateurs ne sont pas en situation de vérifier la qualité des médicaments distribués ou dispensés. Il est d'ailleurs difficile de détecter des produits de mauvaise qualité et cela nécessiterait des moyens coûteux rarement disponibles dans les pays du sud avec des risques au point de vue de santé publique.

**Méthode :** Nous avons entrepris le contrôle de qualité de 4 différents lots d'association médicamenteuse de dose fixe (ADF) d'Ethambutol, de Rifampicine, d'Isoniazide, de Pyrazinamide (ERHZ comprimés) échantillonnés à la Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels (CAME) et dans 9 magasins du PNT-Bénin à travers une étude transversale descriptive et analytique.

Les différents tests effectués sont :

- l'identification visuelle,
- les tests pharmacotechniques
- les tests d'identification des principes actifs par chromatographie sur couche mince, spectroscopie Raman et de dosage par chromatographie liquide à haute performance couplée au détecteur UV-Visible.

**Résultats :** Il ressort de l'analyse de nos résultats, que 100% des échantillons (n=12) ont satisfait aux critères de qualité testés eu égard aux spécifications de la pharmacopée américaine (USP). Ainsi, du point de vue des tests d'identification des principes actifs dans les échantillons, nous avons noté une nette superposition entre les spectres de l'échantillon et de la référence (p-value : 98,7%). De même, les tests pharmacotechniques ont révélé que plus de 80,0 % (normes USP) de chaque principe actif était libéré après 45 minutes de dissolution des comprimés analysés (Ethambutol : 93,3 % ; Rifampicine : 89,8 % ; Isoniazide : 91,4% ; Pyrazinamide : 92,1%). Les teneurs moyennes rapportées pour le dosage (normes USP: 90,0 à 110,0%) étaient respectivement 99,0±0,4 % (Ethambutol); 99,0±0,3 % (Rifampicine) ; 96,6 ± 2,6 % (Isoniazide) ; 99,6 ±0,2 (Pyrazinamide). Nous avons noté une perte de matière de 0,5 ±0,2 % (<1%) au test de friabilité et un temps de désagrégation de 13,4 ± 1,6 min (< 30min).

**Conclusion :** L'ensemble de ces résultats très satisfaisants encouragerait les autorités du PNT-Bénin à maintenir la veille et le niveau d'exigence pour la sélection des fournisseurs.

Mots clés : Antituberculeux, Contrôle de qualité ; PNT-Bénin

## SS-CO-47

### DIAGNOSTIC SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE DE L'ORGANISATION DES SECOURS ET L'ACCUEIL DES VICTIMES D'ACCIDENT DE LA ROUTE DANS QUATRE HOPITAUX DE COTONOU

Mensah Coffi Mahugnon André AïNA - *Doctorant en Sciences Politiques et Sociales à l'Université de Liège – Belgique/ Université de Parakou - Projet de Recherche Multidisciplinaire pour la Prévention des Accidents de la Voie Publique*, [andremensah.aina@gmail.com](mailto:andremensah.aina@gmail.com)

Yolaine GLELE-AHANHANZO, *Enseignante-chercheure, Maître-assistant – IRSP Ouidah - Projet de Recherche Multidisciplinaire pour la Prévention des Accidents de la Voie Publique*

N'koué Emmanuel SAMBIENI, *Enseignant-chercheur, Maître de Conférences – Université de Parakou - Projet de Recherche Multidisciplinaire pour la Prévention des Accidents de la Voie Publique*

Marc PONCELET, *Professeur ordinaire – Université de Liège - Projet de Recherche Multidisciplinaire pour la Prévention des Accidents de la Voie Publique*

**Introduction :** Les gestes de premiers secours et l'aide médicale d'urgence constituant la « chaîne de secours », déterminent la survie et le pronostic des victimes d'accident de la route. Cette contribution rend compte de l'organisation de la chaîne de secours, des pratiques des acteurs et des dysfonctionnements relatifs à l'offre de soins.

**Méthode :** Cette enquête socio-anthropologique s'inscrit dans le cadre du programme de recherche multidisciplinaire pour la prévention des accidents de la voie publique piloté par l'IRSP. Elle a été possible grâce à un séjour de recherche au sein des équipes de secours du Groupement National des Sapeurs-pompiers à la Direction de Cotonou de juillet à septembre 2019. Basée sur une démarche de type « sociologie embarquée » (Bourrier, 2010) combinant observation directe et entretien libre, elle saisit de l'intérieur les interactions entre acteurs et les négociations qui se jouent à l'arrière-plan des interventions.

**Résultats :** La « chaîne de secours » regroupe cinq activités : l'aide d'urgence ou mesures immédiates de sécurisation des victimes et l'appel d'urgence apportés par les témoins et la police ; le premier secours et le transport des victimes assurés par les sapeurs-pompiers ; l'accueil des victimes et les soins effectués par les professionnels de santé à l'hôpital. Les hôpitaux Saint Luc et Saint Jean, le Centre « LES MERVEILLES » et le CNHU sont les plus sollicités. Leur choix est fonction de la proximité, la gravité des traumatismes, la qualité de l'accueil, l'accessibilité, la disponibilité et la continuité des soins. Mais on note une rupture de la chaîne à l'accueil aux urgences pour indisponibilité de personnels qualifiés, insuffisance de plateau technique et inaccessibilité financière.

**Conclusion :** Il existe d'un dispositif opérationnel de secours fonctionnel, mais l'absence d'un système intégré de prise en charge systématique des victimes d'accident dans les formations sanitaires constitue un défi pour des interventions efficaces.

#### SS-CO-48

#### OFFRE DE SOINS DE SANTE CURATIFS ET ACCOUCHEMENTS EN MILIEU ADJA : COMMENT LE SYSTEME LOCAL DE SANTE DEVIENT LA FABRIQUE DES PRESTATAIRES DE SOINS INFORMELS ?

<sup>1</sup>Eric Ayédjo AKPI, <sup>1</sup>Cory Gbèdodé SINSIN, <sup>1</sup>Léontine Elisabeth GNAHOUI et <sup>1</sup>Codjo Adolphe KPATCHAVI

1. Laboratoire d'Anthropologie Médicale Appliquée (LAMA), Université d'Abomey-Calavi (UAC) Mail : [ericakpi@gmail.com](mailto:ericakpi@gmail.com)

Au Bénin, les Systèmes Locaux de Santé (SYLOS) ont bénéficié du Programme d'Appui au Secteur de la Santé (PASS) de la Coopération Technique Belge (Enabel). Cependant, les indicateurs de performance sanitaires du département du Couffo demeurent faibles notamment en termes de soins curatifs et d'accouchements.

Cette recherche se propose d'étudier les causes du faible niveau performance sanitaire dans le Couffo. Par une démarche qualitative, elle a porté sur cent soixante enquêtés regroupant les acteurs de l'offre formelle de santé, des acteurs de l'offre privée et des acteurs de la demande. Ceux-ci sont interviewés moyennant les techniques d'entretiens semi-directifs individuels, le focus group et l'observation directe.

L'enquête a identifié des dysfonctionnements structurels et organisationnels au niveau des SYLOS. Il ressort aussi que, par le moyen de ces dysfonctionnements, le système local de santé « fabrique » les acteurs du secteur informel en les dotant directement ou indirectement de savoir-faire médicotechniques. Ces derniers disposent ainsi en plus de leur savoir-faire culturel des connaissances médicales leur permettant d'offrir une prise en charge holistique et adaptée aux populations les plus pauvres.

Il serait bénéfique de repenser la gouvernance des SYLOS en mettant l'accent sur la collaboration avec les acteurs du secteur privé pour lever les barrières d'accès aux soins de santé.

**Mots clés :** Système local de santé, soins informels, Bénin.

#### SS-CO-49

#### EVALUATION DU SYSTEME DE SURVEILLANCE DE LA TUBERCULOSE BOVINE EN ABATTOIR DANS LE DISTRICT DE BAMAKO DE JUIN 2018 A MAI 2019

S. Dara<sup>1,3</sup>, daraseydou@gmail.com S. Sidibé<sup>2</sup>, Cheick Oumar Fomba<sup>3</sup> AK Sidibé<sup>4</sup>, El Hadj Issa A. SY<sup>1,4</sup>, Mariame LAURENT C. Kouawo<sup>1</sup>, OJB Otshudiandjeka<sup>1</sup>, DR Fadima<sup>1</sup>, P. Yanogo<sup>1,5</sup>, N. Meda<sup>1,5</sup>.

1. Épidémiologie de terrain et de Laboratoire du Burkina-Faso
2. Laboratoire Central Vétérinaire de Bamako
3. Direction nationale des services vétérinaires, Mali
4. Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, Mali
5. Université de Ouagadougou, Burkina Faso

**Introduction :** La tuberculose bovine (TBB) est une maladie contagieuse d'évolution chronique affectant plusieurs espèces animales et transmissible à l'Homme due essentiellement à *Mycobacterium bovis*. En plus d'être un problème de santé publique ; elle représente un problème économique majeur pour l'élevage. La surveillance de la TBB se fait en grande partie à l'abattoir.

Nous avons évalué le système de surveillance de la TBB dans le District de Bamako afin de déterminer ses performances et ses attributs.

**Méthodes :** Nous avons utilisé le guide pour l'évaluation des systèmes de surveillance de la santé publique du CDC pour évaluer la surveillance de la TBB de 2006 à 2011. Nous avons calculé des fréquences, des moyennes, des ratios, des pourcentages en utilisant le logiciel MS Excel et épi info.

**Résultats :** De juin 2018 à mai 2019, 184 492 bovins ont été inspectés dont 2 834 saisies pour motif de TBB soit une prévalence moyenne de 1.53 % variant de 0,77 à 2,43 selon le mois. Les saisies totales représentent 2,12 % contre 97,82 % pour les saisies partielles. Aucune des saisies n'a fait l'objet de prélèvement pour confirmation au laboratoire. L'incidence financière s'élève à environ 32 042 000 FCFA. Les lésions tuberculeuses sont en majorité situées dans les poumons suivis du foie puis des intestins et des ganglions régionaux.

**Conclusion :** Le nombre élevé de cas décelé montre l'étendue de la maladie au Mali et présage de la possibilité importante de sa transmission du bétail à l'homme. L'apport du labo est nécessaire pour rendre plus crédible cette surveillance comme des études supplémentaires pour déterminer le rôle de *M. bovis* dans l'épidémiologie de la tuberculose humaine.

**Mots clés :** Tuberculose bovine, Abattoir, Saisie

## SS-CO-50

### EFFET D'UN PROGRAMME D'EDUCATION NUTRITIONNELLE SUR LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE DES HANDBALLEUSES JUNIORS BENINOISES AUX CAMPS D'ENTRAINEMENT PREPARATOIRES DU CHALLENGE TROPHY ZONAL 2019

Sidonie Mahougnon Kiki<sup>1</sup>, Issiako BioNigan<sup>1</sup>, Polycarpe Gouthon<sup>1</sup> ...

1-Unité de Recherche: Sport, Santé et Évaluation (UR/SSE), Institut National de la Jeunesse, de l'Éducation Physique et du Sport (INJEPS), Université d'Abomey Calavi, Porto-Novo, Bénin.

**Auteur correspondant:** Kiki Sidonie Mahougnon E-mail: [sidoniekiki@gmail.com](mailto:sidoniekiki@gmail.com) Tel: +229 96928310

**Introduction:** La consommation alimentaire est un proxy permettant d'apprécier l'accessibilité, la sécurité alimentaire et la qualité de l'alimentation d'une population à l'exemple des sportifs. La consommation alimentaire des handballeuses de l'élite béninoise ne bénéficie toutefois pas d'une même attention que les facteurs technico-tactiques et

physiologiques pendant les préparations des compétitions. **Objectif:** Il s'agit d'apprécier le changement induit par l'effet d'un programme d'éducation nutritionnelle (PEN) sur la consommation alimentaire des handballeuses juniors en période de préparation. **Matériels et Méthodes:** Une observation directe des repas servis aux 36 handballeuses aux deux camps d'entraînement préparatoires du Challenge Trophy de zone de 2019, a permis de calculer leur score de consommation alimentaire (SCA) avant et après le PEN. Ce calcul est basé sur huit groupes d'aliments et le nombre de jours de consommation relatif à chacun d'eux ( $\leq 7$  jours). **Résultats:** Les handballeuses étaient âgées de  $17,0 \pm 1,69$  ans, avec une taille moyenne de  $1,6 \pm 7,26$  m, un poids de  $59,2 \pm 6,46$  kg et un IMC de  $22,30 \pm 1,60$  kg/m<sup>2</sup>. Avant le PEN, la consommation alimentaire était pauvre (SCA=36), mais à l'issue du PEN, elle était devenue acceptable (SCA=59). **Conclusion:** Le PEN a eu un effet positif sur la consommation des handballeuses juniors aux camps préparatoires du Challenge Trophy de zone de 2019. Toutefois, il est indispensable de continuer à former les handballeuses, que la Fédération de handball recrute un spécialiste de nutrition sportive pour l'équipe et mette à sa disposition, des moyens adéquats pour un bon suivi alimentaire des joueuses.

**Mots-clés:** Diversité alimentaire, handball, Bénin.

## SS-CO-51

### ETUDE DES DETERMINANTS INFLUENÇANT LE NON-RESPECT DU CIRCUIT DU PATIENT DANS LA PYRAMIDE SANITAIRE DU BURKINA FASO.

Méda Ziemlé Clément<sup>1,2</sup>, Nikiéma Nicole<sup>1</sup>, Hien Hervé<sup>3</sup>, Ilboudo Bernard<sup>3</sup>, Sombié Issiaka<sup>1,4</sup>, Savadogo Gueswendé Blaise Léon<sup>1,2</sup>

**Institutions :** 1. INSSA, Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

2. Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS), Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

3. Institut national de santé publique (INSP), Ouagadougou, Burkina Faso

4. Organisation ouest africaine de la santé (OOAS), Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

**Introduction :** Le contact avec le système de santé se fait selon le niveau dans ledit système. Le présent travail a étudié les déterminants influençant le non-respect de la pyramide sanitaire par les patients au Burkina Faso.

**Méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale qui s'est déroulée du 20 avril au 10 juin 2019. Les patients inclus venaient des urgences chirurgicales, médicales et gynéco-obstétricales du Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo-Dioulasso.

**Résultats :** Un total de 330 patients a été inclus : âge moyen de 37,9 (95%IC : 36,2-39,6) ans, femmes (60,9%) et sexe ratio de 1,6, auto-référés (36,1%). Les enquêtés disaient être passés dans une formation sanitaire (55,2%) avant d'arriver au CHUSS dont : Centre de santé périphérique (73,1%), hôpital de district (58,8%), Centre hospitalier régional ou CHR (14,3%) et Cliniques privées (8,8%). Il est ressorti: jamais reçu d'information sur l'organisation du système de santé (83,6%), jamais reçu d'information sur là il faut aller consulter pour la première dans le système de santé (44,5%), pas informés sur ce que c'est que le système de santé (91,5%) et son organisation (80,3%). Les enquêtés disaient avoir payé leurs soins : centre de santé (99,3%), hôpital de district (99,2%), CHR (100,0%) et CHUSS (100,0%). Le temps d'attente de la consultation était le plus long au centre de santé (51,4%). Les enquêtés jugeaient les explications données le plus au CHUSS (83,8%) et le plus suffisantes (88,4%). Leurs attentes étaient le moins satisfaites au centre de santé à 40,2%. Les services de soins étaient trouvés tout le temps ouverts à tous les niveaux, le personnel soignant toujours

présent mais pas toujours apte à travailler. Les médicaments et examens de laboratoire étaient le plus souvent en manque au Centre de santé (67,5%) et au CHR (66,7%).

**Conclusion :** Bien informé le patient sur l'organisation du système de santé, son expérience vécue au contact des services de santé et la qualité des soins et services de santé offerts sont essentiels pour le respect de la pyramide sanitaire.

**Mots clés :** Système de santé, malade, organisation des services de santé.

## SS-CO-52

### ETUDE DES PRATIQUES DE PRESCRIPTION EN CONSULTATION DE MEDECINE GENERALE DANS LES HOPITAUX DES DISTRICTS SANITAIRES DE LA REGION DES HAUTS-BASSINS, BURKINA FASO.

Méda Ziemlé Clément<sup>1,2</sup>, Ilboudo Diane<sup>1</sup>, Hien Hervé<sup>3</sup>, Ilboudo Bernard<sup>3</sup>, Sombié Issiaka<sup>1,4</sup>, Savadogo Gueswendé Blaise Léon<sup>1,2</sup>

**Institutions :** 1. INSSA, Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

2. Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS), Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

3. Institut national de santé publique (INSP), Ouagadougou, Burkina Faso

4. Organisation ouest africaine de la santé (OOAS), Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

**Introduction :** La consultation médicale permet une prise en charge de qualité des patients y compris leur gestion. L'objectif était d'étudier les pratiques de prescription médicale en consultation de médecine générale dans les hôpitaux de districts sanitaires de la région des Hauts-Bassins (RHBS), Burkina Faso.

**Méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale (incluant un audit), qui s'est déroulée du 10 Novembre 2019 au 30 Juin 2020. Tous les patients en consultation et les responsables des hôpitaux des districts de la RBHS ont été inclus. L'analyse a concerné : qualité rédactionnelle d'une ordonnance médicale, nombre moyen et type de médicaments prescrits par patient, nombre moyen d'antibiotiques prescrits par patient, coût moyen des ordonnances, et remplissage des supports de la consultation.

**Résultats :** Ont été inclus 151 patients. La consultation de rendez-vous représentait 47,7%. La durée moyenne de la consultation médicale était de 19,5 (3-50) minutes. Il ressortait de l'ordonnance : bonne lisibilité (53,6%), nom établissement sanitaire (89,9%), date prescription (98,7%), nom-prénom patient (100%), nom prescripteur (94,7%) et qualification prescripteur (46,4%), score moyen « qualité rédactionnelle d'une ordonnance médicale » ( $10,1 \pm 0,1$ ), nombre moyen de médicaments prescrits par patient (1,78) avec antalgiques (15,9%), antihypertenseurs (12,2%), au moins un antibiotique (15,9%). Les spécialités médicales prescrites représentaient 84,1% contre 15,9% de médicaments essentiels prescrits. Le coût moyen des ordonnances s'élevait à 7 613 FCFA ; la principale cause de non-achat des médicaments était la non-disponibilité des médicaments. Seulement 33,1% des patients avaient un carnet de santé lors de la consultation, et les carnets santé non systématiquement remplis. L'audit organisationnel de gestion des médicaments révélait que l'ensemble des structures évaluées ne répondait pas aux normes de bonne gestion des médicaments.

**Conclusion :** La prescription irrationnelle des médicaments dans les structures de santé était réelle invitant au renforcement de la qualité de la rédaction de l'ordonnance pour l'amélioration de la qualité des prescriptions médicales.

**Mots clés :** organisation des services de santé, audit, qualité.

**SS-CO-53****ANALYSE DE L'OFFRE DES SERVICES DE SANTE ESSENTIELS DANS LE CONTEXTE DE LA REPONSE A LA COVID-19 EN COTE D'IVOIRE EN 2020**

Aka LBN, Orsot TE, Sable S, Okoubo G, Ekou FK, Kpebo DOD, Ano MN, Aka DA, Dagnan NS  
 Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan Cocody, Côte d'Ivoire

**Introduction :** La pandémie de la Covid-19 a entraîné une augmentation brutale de la demande dans les établissements de santé et a fait craindre un problème de résilience du système de santé ivoirien. Cette étude avait pour objectif d'analyser la situation de l'offre des services de santé essentiels dans le contexte de la réponse à la Covid-19 en Côte d'Ivoire.

**Méthode :** Nous avons réalisé une enquête transversale dans les districts sanitaires repartis en deux strates : la région d'Abidjan (Covid-19) et la région du Béliér (non Covid-19). Elle a concerné les ressources humaines, matérielles et financières, les activités curatives, préventives et promotionnelles sur la période de janvier à avril de 2017 à 2020.

**Résultats :** Les activités promotionnelles et préventives, notamment les premières Consultations Prénatales (CPN), la pesée des enfants et les activités de planification familiale avaient baissé (de 15 à 30%) entre janvier et avril 2020 en zone Covid-19 comparées aux années antérieures. Les CPN4 et les accouchements assistés n'avaient pas variés.

Les activités curatives à savoir le nombre de consultations curatives, d'hospitalisations et d'interventions chirurgicales, de consultations pour maladies diarrhéiques étaient en baisse de dans la zone Covid-19 uniquement. Le nombre personnes prises en charge pour maladies chroniques (diabète, VIH et tuberculose) avait connu une baisse (de 20 à 70%) dans les deux zones.

**Conclusion :** la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire a eu un impact négatif sur l'utilisation des services de santé essentiels malgré la disponibilité des ressources humaines, matériels et logistiques. Ce problème de résilience du système de santé ivoirien à amener le ministère à prendre des mesures spécifiques pour améliorer la lutte contre les maladies.

**Mots clés :** Covid-19, système de santé, Côte d'Ivoire

**SS-CO-54****EFFETS DE L'EPIDEMIE A COVID-19 SUR LES ACTIVITES DE ROUTINE DU PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION EN COTE D'IVOIRE EN 2020**

Ekra KD, Aka LBN, Kpebo DOD, Okoubo G, Sable S, Aka DA, Orsot TE, Ekou FK.  
 Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan Cocody, Côte d'Ivoire

**Introduction :** La pandémie du Covid-19 a fait craindre un problème de résilience du système de santé ivoirien. La présente avait pour objectif d'évaluer les effets de l'épidémie à Covid-19 sur les activités de routine du Programme Élargi de Vaccination en Côte d'Ivoire

**Méthode :** Nous avons réalisé une étude transversale analytique avec une approche mixte quantitative et qualitative dans les districts sanitaires de Côte d'Ivoire. Il s'agissait de comparer les activités de vaccination de routine pour la période allant de janvier à mai, des années 2019 et 2020. Elle a été conduite dans les districts sanitaires d'Abidjan (Zone Covid-19) et dans les districts sanitaires de la région du Béliér (Zone non Covid-19).

**Résultats :** L'étude a montré que l'offre des services n'a pas connu de changement significatif entre 2019 et 2020 dans la mise en œuvre des stratégies vaccinales, de la supervision et des activités relatives à la génération de la demande. La quasi-totalité des structures visitées avaient mis en œuvre des mesures de mitigation de l'épidémie.

Par contre, l'on a noté une baisse de l'utilisation des services, une augmentation des refus de vaccination (2% en 2019 vs 34% en 2020) pour cause de rumeurs et peurs liées à la Covid-19 avec pour conséquence une baisse des performances vaccinales dans les deux zones (VPO3 en mai à 77,3% en 2019 vs 30,7% en 2020). De même, l'on a constaté une baisse des performances des activités de surveillance avec moins de cas de maladie notifiés.

**Conclusion** : la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire a eu un effet négatif sur les performances des activités de routine du Programme Élargi de Vaccination malgré le maintien de l'offre des services. D'où la nécessité de prendre des dispositions pour une meilleure utilisation des services de vaccination pendant l'épidémie à Covid-19.

**Mots-clés** : PEV, Covid-19, Effets, Côte d'Ivoire

### SS-CO-55

#### **Vaccination et inégalités sociales de santé : Exemple de la réticence des parents face à la vaccination contre la poliomyélite à Nikki et à Kalalé en 2020**

Houeto D<sup>1</sup>, Assani L<sup>1</sup>, Aifa J<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ecole de Santé Publique (ENATSE), Université de Parakou

<sup>2</sup>Zone Sanitaire Nikki-Kalalé-Pèrèrè

**Correspondance** : David Houéto, [dhoueto@gmail.com](mailto:dhoueto@gmail.com), +22997277515

**Introduction.** Etudier les facteurs associés à la réticence des parents d'enfants de 0 à 5 ans face à la vaccination contre la poliomyélite dans les communes de Nikki et de Kalalé en 2020.

**Méthodes.** Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive à visée analytique ayant impliqué 510 mères ou gardiennes d'enfant de 0 à 5 ans selon la technique de sondage en grappes (proportionnel à la taille). Les données ont été collectées à l'aide d'un guide d'entretien individuel semi-structuré, saisies avec Epi-Data 3.1.fr et analysées avec Epi-Info 7.2.2.6.us. La mesure d'association était le Rapport de Prévalence. Le test statistique  $\chi^2$  de Pearson ou le test exact de Fisher étaient utilisés, selon le cas, pour comparer les proportions. Les moyennes étaient comparées par le test t de Student. Le seuil de significativité était  $p < 0,05$ .

**Résultats.** L'âge moyen des mères enquêtées était de 27,94 ans  $\pm$  8,42 ans avec des extrêmes de 15 et 50 ans, 30,20% étaient sans instruction et 38,00% étaient des ménagères. La majorité (86,50%) était de la religion musulmane et vivait en milieu rural. Plus de la moitié (56,10%) avait un revenu mensuel inférieur à 100000 CFA et 69,90% avaient déclaré avoir entendu parler de la poliomyélite. Les facteurs associés à la réticence de la vaccination anti-poliomyélite étaient l'âge ( $p < 0,0001$ ), le niveau d'instruction ( $p = 0,01$ ), le sexe de l'enfant ( $p < 0,0001$ ), la décision de vacciner l'enfant ( $p = 0,002$ ), le milieu de résidence ( $p = 0,002$ ) et la perception de la vaccination ( $p = 0,04$ ).

**Conclusion.** Les facteurs associés sont majoritairement ceux positionnant les individus sur l'échelle sociale, suggérant la prise en compte de la réduction des inégalités sociales dans la promotion de la vaccination contre la poliomyélite.

**Mots-clés.** Vaccination poliomyélite, Inégalités sociales de santé, Bénin.

### SS-CO-56

#### **LES ENFANTS DE MOINS DE 6 MOIS FACE A LA MALNUTRITION AIGUË AU CHU-MEL DE COTONOU (BENIN) : AMPLEUR ET FACTEURS EXPLICATIFS**

Moussiliou Noël PARAISO, Abdoul Madjidi SOILHI, Clémence METONNOU

**Auteur correspondant** : Dr Moussiliou Noel PARAISO, e-mail : [moussparaiso@gmail.com](mailto:moussparaiso@gmail.com). Tél : +229 96757440.

**Introduction :** La malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 6 mois n'est pas suffisamment documentée au Bénin. La présente étude a permis de déterminer la prévalence et les facteurs qui étaient associés chez 68 enfants de cette tranche d'âge dans les services de consultation externe en pédiatrie et de nutrition du CHU MEL de Cotonou

**Méthodes :** Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive et analytique qui avait examiné l'association de la malnutrition aiguë avec les facteurs relatifs à la mère, à l'enfant, aux structures sanitaires et à l'environnement dans un modèle de régression logistique.

**Résultats :** La prévalence de la malnutrition aigüe chez les enfants de 0 à 6 mois était de 14,7%. L'âge de l'enfant OR = 3,1 (IC<sub>95%</sub> 1,5 - 6,9), la survenue d'une maladie lors des 15 jours précédant l'enquête OR = 11,5 (IC<sub>95%</sub> :1,5 - 89,2) ainsi que le niveau d'instruction de la mère OR = 17,1 (IC<sub>95%</sub> : 1,7 - 171,2) y étaient associés.

**Conclusion :** Ces résultats permettront de réaliser des études beaucoup plus approfondies sur les facteurs associés à la malnutrition aiguë chez les enfants de 0 à 6 mois au Bénin et d'améliorer sa prise en charge.

**Mots clés :** Malnutrition aiguë, enfant de 0 à 6 mois, facteurs associés, Bénin.

## SS-CO-57

### CONVULSIONS NEONATALES DANS L'UNITE DE NEONATOLOGIE DU SERVICE DE PEDIATRIE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET DEPARTEMENTAL DE L'OUEME-PLATEAU

Bognon Gilles, Padonou Caroline, Matondo-Babote Patricia, Sagbo Gratien

Service de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire et Départemental de L'Ouémé-Plateau (CHUD-OP)

**Introduction :** Les affections neurologiques en période néonatale constituent une cause majeure de décès et séquelles neurologiques invalidantes. L'objectif de cette étude était d'étudier les convulsions néonatales dans l'unité de néonatalogie du service de pédiatrie de CHUD-OP.

**Méthode :** il s'agissait d'une étude prospective, descriptive et analytique menée dans l'unité de néonatalogie du CHUD-OP de juillet 2019 à janvier 2020. Elle a porté sur les nouveau-nés admis dans le service pour des convulsions néonatales.

**Résultats :** sur 1230 nouveau-nés hospitalisés, 59 avaient présenté une convulsion soit une fréquence hospitalière de 4,8%. Le sex-ratio était de 1,7. La moitié des mères avaient fait moins de 4 consultations prénatales (54,2% ; 32/59). La moitié des enfants était des prématurés (49,2% ; 30/59). Dix nouveaux nés étaient nés en état de mort apparente (16,9%). La plupart des nouveau-nés avaient présenté leur première crise dans les 48 premières heures de vie (81,7% ; 40/59). Les principaux types de convulsion retrouvés étaient les formes atypiques. Les causes les plus fréquentes retrouvées étaient l'encéphalopathie anoxo-ischémique, les troubles métaboliques et la méningite. La durée moyenne d'hospitalisation était de 9,03±4,00 jours. Vingt-quatre nouveau-nés étaient décédés et 3 avaient présenté des séquelles. Les facteurs de mauvais pronostic étaient le terme de la grossesse (P=0,047) et les crises cloniques (P=0,049).

**Conclusion :** Les convulsions néonatales sont relativement fréquentes au CHUD-OP et peuvent être graves. L'amélioration du suivi des grossesses, du travail d'accouchement, la référence précoce et la bonne pratique de la réanimation néonatale peuvent contribuer à améliorer la prise en charge.

**Mots clés :** convulsions néonatales- encéphalopathie anoxo-ischémique- infection néonatale.

## AXE 2: EPIDEMIOLOGIE

### EP-CO-01

#### PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A L'HEPATITE B CHEZ LES TRAVAILLEUSES DU SEXE VIH NEGATIVES, COTONOU-BENIN, 2014-2015

Rosette KOUFEDE<sup>1</sup>, F. A. GUEDOU<sup>2</sup>, S. SALIFOU<sup>3</sup>, M. B. LAURENT<sup>1</sup>, O.J.B. OTSHUDIANDJEKA<sup>1,5</sup>, Y FR. DIALLO<sup>1</sup>, PK YANOGO<sup>1,4</sup>, N MEDA<sup>1,4</sup>

1. Burkina Field Epidémiologie Training Program en Afrique de l'Ouest, Université Joseph KI ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

2. Laboratoire de recherche en IST, Centre Communal de Santé de Cotonou-1, Bénin.

3. Direction Nationale de la Santé Publique, Bénin

4. Faculté de Médecine, Université Joseph KI ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

**Introduction :** Au Bénin, l'hépatite B est de loin la plus redoutable pour plusieurs raisons. Bien que les travailleuses du sexe (TS) soient un groupe à haut risque pour les infections sexuellement transmissibles dont le virus de l'hépatite B, les études portant sur l'épidémiologie du VHB chez les travailleuses du sexe sont rares en Afrique. L'objectif principal était d'étudier la prévalence et les facteurs associés à l'hépatite B chez les travailleuses du sexe VIH négatives à Cotonou-Bénin septembre 2014 à décembre 2015.

**Méthodes :** Nous avons analysé les données collectées, d'une étude menée chez les travailleuses du sexe VIH négatives à Cotonou-Bénin septembre 2014 à décembre 2015. Les 311 TS VIH négatives enrôlées ont été incluses, le test de khi 2 avait été utilisé pour comparer les prévalences et une régression logistique a permis d'estimer les Odds ratio brutes (ORb) d'association entre les différents facteurs et le statut d'hépatite B.

**Résultats :** Parmi les 311 travailleuses du sexe incluses dans notre étude, 13 étaient positives à l'hépatite B (hépatite B courante) soit une prévalence brute de 4,2 %. Le seul facteur associé à l'infection par le VHB chez les travailleuses du sexe VIH négatives était l'antécédent de transfusion sanguine (OR= 4,89 ; IC<sub>95%</sub> = [1,40-17,08] p=0,01).

**Conclusion :** La prévalence de l'hépatite B chez les travailleuses du sexe VIH négatives étant élevée, nous recommandons que les actions de santé publique soient entreprises tenant compte du facteur de risque identifié pour améliorer la prévention de l'hépatite B chez ces dernières.

**Mots clés :** Hépatite B, Travailleuse du sexe, Bénin.

### EP-CO-02

#### ETUDE DES FACTEURS ASSOCIES AU RETARD DE CONSULTATION SANITAIRE DES VICTIMES DE VIOLS AU SENEGAL

Mamadou Makhtar Mbacké Leye<sup>A</sup>, A.A. Diouf<sup>B</sup>, M. Diongue<sup>A</sup>, I. Seck<sup>A</sup>, A.T. Dia<sup>A</sup>

<sup>a</sup> Service de médecine préventive et santé publique, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

<sup>b</sup> Service de gynécologie et obstétrique, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

**Introduction :** Le viol reste l'une des formes de violences sexuelles les plus graves du fait de ses répercussions négatives sur la santé physique et mentale des victimes. L'objectif de cette étude est d'identifier les facteurs associés au retard de consultation des victimes de viols au niveau des structures sanitaires au Sénégal.

**Méthode :** Une étude d'observation rétrospective, descriptive et analytique a été menée durant la période de 2006 à 2015. La population d'étude était constituée par l'ensemble des dossiers judiciaires des filles ou des femmes victimes de viols au niveau des 11 tribunaux de grande instance du Sénégal. Un recrutement exhaustif a été effectué. Les analyses uni et multivariées ont été faites respectivement grâce aux logiciels Epi Info 2000 et R 2.2.9.

**Résultats :** Au terme de la collecte, 1037 cas de viols étaient enrôlés au niveau national. L'âge moyen des victimes était de 16,3 ans  $\pm$  7,9 et des extrêmes allant de 1 à 72 ans. Les mineures (< 18 ans) représentaient 24,8 %. Le délai médian de consultation au niveau des structures sanitaires était de 24 heures. Le retard de consultation (> 24 heures) était noté chez 38,6 % des victimes de viols. Les victimes de viols résidant dans les axes sud (ORaj = 4,31 [1,14–16]), nord (ORaj = 4,22 [1,26–14,14]), majeures (ORaj = 1,67 [1,04–2,68]), mariées (ORaj = 3,44 [1,58–7,5]), présentant une grossesse après l'agression (ORaj = 34,03 [15,47–74,85]) ou un avortement (ORaj = 5,45 [1,04–287]) étaient plus à risque d'accuser un retard de consultation après viols.

**Conclusion :** Il importe aux autorités sanitaires et judiciaires de renforcer la sensibilisation sur les conséquences néfastes des violences sexuelles, les avantages thérapeutiques, de la réparation du préjudice subi par la victime en cas de viol couplé à une disponibilité des services holistiques de prise en charge 24H/24.

**Mots clés :** prévention, viol, retard de consultation.

### EP-CO-03

#### ETUDE CAS-TEMOINS SUR LA VULNERABILITE DES FEMMES FACE AU VIH, KAOLACK, 2019

Abdoul Aziz Ndiaye<sup>1</sup>, Diya Diop<sup>1</sup>, Ousseynou Ka<sup>1</sup>, Ndeye Fatou Ngom Gueye<sup>1</sup>, Alioune Badara Tall<sup>1</sup>, Awa Ba-Diop<sup>1</sup>, Anta Tal Dia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Université Alioune Diop Bambey, <sup>2</sup>Université Cheikh Anta Diop Dakar

**Introduction :** Au Sénégal, l'infection à VIH progresse malgré une faible prévalence qui cache des disparités entre les régions et les sexes. Les femmes sont plus vulnérables. L'objectif était d'étudier les déterminants de la vulnérabilité de la femme face à l'infection VIH/SIDA.

**Méthodologie :** Il s'agissait d'une étude cas- témoins réalisée au Centre de Santé de Kasnack, Kaolack. Au total, 80 cas séropositifs et 240 témoins séronégatifs ont participé à l'étude. Un questionnaire était administré aux femmes sélectionnées après leur consentement. Les données étaient saisies et analysées à l'aide des logiciels Epi Info et Stata.

**Résultats :** l'âge moyen des cas était de 32  $\pm$  9,7 ans et des témoins, de 29,5  $\pm$  8,5 ans. Elles étaient souvent ménagères ou commerçantes, la moitié n'était pas scolarisée. Les soins étaient accessibles pour 74,4% des femmes.

Le niveau de connaissance des moyens de prévention du VIH était moyen chez 71,3 % des cas et 0,8% des témoins. Le niveau de connaissance des modes de transmission était moyen chez 47,5% des cas et 0,8% des témoins

La majorité des témoins (99,2%) avait un faible niveau de connaissance des moyens de prévention et modes de transmission du VIH. Les pratiques à risque étaient respectivement de 40% et 7,9% chez les cas et les témoins ; la vulnérabilité élevée de 40% et 7,9%.

**Conclusion :** Le niveau de connaissances du VIH est faible chez la plupart des femmes. Il est meilleur chez les femmes séropositives qui sont plus exposées aux pratiques à risque qui augmentent leur vulnérabilité. La réduction de cette vulnérabilité passe par une amélioration de leurs connaissances et de leur autonomisation.

**Mots clés :** Sénégal, VIH, Cas-témoins, Connaissance, Vulnérabilité

**EP-CO-04****DELAI DIAGNOSTIQUE DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE ET FACTEURS ASSOCIES A SON ALLONGEMENT DANS LA REGION DE BOKE, GUINEE, 2019-2020**

Aboubacar Conte <sup>1,2</sup>, Nicolas Meda <sup>1,3</sup>, Marianne Laurent<sup>3</sup>, Joseph Otshadiandjeka<sup>3</sup>, Bernard Sawadogo<sup>4</sup>, Alain Desu<sup>2</sup>, Bayaki Saka<sup>5</sup>, Pauline Yanogo<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup>*Burkina Field Epidemiology Training Program, Ouagadougou, Burkina Faso*

<sup>2</sup>*Ministry of Health, Guinea*

<sup>3</sup>*University of Ouagadougou, Burkina Faso*

<sup>4</sup>*AFENET (Réseau africain d'épidémiologie de terrain)*

<sup>5</sup>*CHU Sylvanus Olympio, Université de Lomé, TOGO*

**Introduction :** L'allongement du délai diagnostique de la tuberculose contribue à la propagation de cette maladie dans la communauté. L'objectif de cette étude était de déterminer le délai diagnostique de la tuberculose et d'identifier les facteurs associés à son allongement.

**Méthodes :** Une étude analytique de novembre 2019 à janvier 2020, de 313 nouveaux cas de tuberculose pulmonaire dans les huit Centres de Diagnostic et de Traitement antituberculeux (CDT) de la Région de Boké. Le seuil de 30 jours a été prédéfini entre les délais diagnostiques court et long. Ces délais ont été divisés en délai patient et délai système. Le seuil de significativité  $\alpha=0,05$  a été retenu. Le logiciel R a permis l'analyse. **Résultats :** Le délai diagnostique moyen était de  $55\pm 25$  jours (médiane 44 jours). Le délai diagnostique moyen dû au patient était de  $39\pm 15$  jours (médiane 33 jours) et celui dû au système de soins était de  $17\pm 18$  jours (médiane de 6 jours). Chez 241(77%) malades le délai diagnostique patient était long. Chez 66 (21%) malades le délai diagnostique système était long et chez 281(89,78%) malades le délai diagnostique total était long. La pauvreté (OR=2,20 ; IC= [1,63-3,59],  $p=0,002$ ), la non scolarité (OR=2,20 ; IC= [1,85-6,03],  $p=0,01$ ), la profession cultivateur (OR=2,17 ; IC= [1,83-5,74],  $p=0,04$ ) et le CDT (OR=40,72 ; IC= [9,56-217,80],  $p<0,0001$ ) sont des facteurs associés à l'allongement de ces délais.

**Conclusion :** Les délais diagnostiques de la tuberculose sont trop longs dans la région de Boké et associés de manière significative à la pauvreté, la non scolarité, la profession cultivateur et CDT. La connaissance et la prise en compte de ces facteurs permettront d'optimiser les stratégies de prise en charge de la tuberculose en Guinée.

**Mot clés :** Tuberculose, délai, diagnostic.

**EP-CO-05****PRONOSTIC DE L'ACCOUCHEMENT CHEZ L'ADOLESCENTE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LE MERE ET DE L'ENFANT-LAGUNE (CHU-MEL) DE COTONOU**

Aboubakar M<sup>1</sup>, Tognifode V<sup>2</sup>, Dangbemey P<sup>2</sup>, Lokossou Msh<sup>1</sup>, Tonato-Bagnan A

<sup>1</sup>*Centre National Hospitalier Universitaire HKM, (CNHU-HKM), Cotonou*

<sup>2</sup>*Centre Hospitalier Universitaire de La Mère et de l'Enfant Lagune (CHU-MEL), Cotonou*

**Introduction :** L'adolescence est une période définie selon l'OMS par des personnes âgées de 10 à 19 ans. Une grossesse à cet âge là fait classer parmi les grossesses à risque élevé.

**Objectif :** Étudier le pronostic de l'accouchement chez les adolescentes au CHU-MEL de Cotonou.

**Matériels et méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale Cas /Témoins à but descriptif et analytique à collecte rétrospective. Elle a comparé une population de primipares

adolescentes de 10-19 ans à une population témoin de primipares âgées de 20 à 29 ans. L'analyse statistique a été réalisée à l'aide du logiciel EPI INFO 7.1.3.3.

**Résultats :** La prévalence des accouchées adolescentes a été de 4,85% de l'ensemble des accouchées durant la période d'étude. Les adolescentes ont été majoritairement représentées par des élèves/étudiantes (46%). Les principaux facteurs de risque de la maternité chez l'adolescente ont été la grossesse non suivi (20%) ou mal suivie (62,5%), les pathologies sur grossesse telles que le SVR (28,17%) et la MAP (20%), un accouchement difficile soit prématuré (22%), soit dirigé (37,89%) ou par la césarienne (42%). Le pronostic maternel vital a été bon dans les deux sous-groupes. Les principales complications retrouvées ont été les lésions des parties molles (10,31%) et l'HPPI (3,45%). La mortalité néonatale était élevée dans les deux sous-groupes.

**Conclusion :** L'accouchement chez l'adolescente demeure un accouchement à haut risque. La réduction des complications passe par une triple prise en charge à la fois médicale, psychologique et sociale.

**Mots clés :** Accouchement, adolescente, grossesse, complications, nouveau-né.

## EP-CO-06

### HEPATITE VIRALE B LORS D'UNE CAMPAGNE DE DEPISTAGE EN POPULATION GENERALE AU BENIN : SEROPREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES.

Aboudou Raïmi Kpossou<sup>1</sup>, Moussiliou Noel Paraiso<sup>2</sup>, Comlan N'dehougbea Sokpon<sup>1</sup>, Khadidjatou Sake Alassan<sup>3</sup>, Rodolph Koffi Vignon<sup>1</sup>, Jean Sehonou<sup>1</sup>, Nicolas Kodjoh<sup>4</sup>, Herve Lawin<sup>5</sup>.

1-Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, Bénin

2-Institut Régional de Santé Publique (IRSP), Ouidah, Bénin

3-Service de Médecine Interne, Centre Hospitalier Universitaire Départemental Borgou-Alibori, Parakou, Bénin ;

4-Programme National de Lutte contre les Hépatites (PNLH), Cotonou, Bénin ;

5- Unité d'Enseignement et de Recherche en Santé au travail et Environnement, FSS, UAC, Bénin.

**Introduction :** L'hépatite B est un problème mondial de santé publique. Le but de cette étude était de déterminer la prévalence et les facteurs associés au portage du virus de l'hépatite B (VHB) à l'occasion d'un dépistage de masse dans plusieurs localités réparties sur le territoire béninois.

**Méthodes :** Il s'agissait d'une étude transversale descriptive et analytique avec une collecte prospective de données. Cette collecte avait eu lieu du 20 au 28 juillet 2019 à l'occasion d'un dépistage volontaire gratuit de l'hépatite B organisé au Bénin par les Club Rotary sur 23 sites répartis sur tout le territoire national. Un test rapide d'orientation diagnostique avait été utilisé pour la détection de l'Antigène HBs.

**Résultats :** En tout, 9035 volontaires étaient inclus, pour la plupart de nationalité Béninoise (99%), avec un âge médian de 27 ans, dont 51,1% de célibataires et principalement des écoliers, élèves ou étudiants (37,9%). La séroprévalence du VHB était de 6% (545/9035) [IC95%=5,5%-6,5%]. Les facteurs associés au portage de l'Ag HBs étaient, en analyse univariée : l'âge, le sexe, le statut matrimonial, le niveau d'étude, la profession et les antécédents de diabète, de scarification et d'hépatite C ; et en analyse multivariée : le sexe, l'âge, et le niveau d'étude.

**Conclusion** : La séroprévalence du VHB est de 6% dans la population étudiée. L'infection par le VHB semble toucher volontiers les sujets de sexe masculin, âgés de plus de 17 ans, et ayant un niveau d'étude secondaire.

**Mots clés** : Virus de l'hépatite B, Profil épidémiologique, Bénin

### EP-CO-07

#### **STRESS PROFESSIONNEL CHEZ LES TRAVAILLEURS EN MILIEU INDUSTRIEL.**

<sup>1,2</sup>adjobimey M, <sup>1</sup>hinson Vikkey, <sup>2</sup>Hountohotogbe E, <sup>1</sup>adjogou A, <sup>2</sup>houinato D.

<sup>1</sup>Unité de Recherche et d'Enseignement en Santé au Travail et Environnement FSS Cotonou,

<sup>2</sup>Laboratoire d'Epidémiologie des Maladies Chroniques et Neurologiques (LEMACEN)

**Introduction** : Le stress professionnel est un risque psychosocial émergent en milieu de travail. Les conditions du travail en milieu industriel peuvent exposer au stress professionnel. Au Bénin, il existe peu de données épidémiologiques sur le stress professionnel en milieu industriel.

**Objectif** : Etudier la prévalence et facteurs associés au stress professionnel en milieu industriel textile au Bénin en 2019.

**Méthodes** : Il s'est agi d'une étude transversale et analytique menée du 31 janvier au 11 avril 2019. L'échantillonnage était exhaustif pour les travailleurs permanents et stratifié par quart pour les occasionnels des entreprises du secteur textile. Les données ont été collectées grâce aux questionnaires de Karasek et de Siegrist digitalisés sur smartphones grâce au logiciel Kobo-Collect. L'analyse des données a été effectuée par le Logiciel R 3.6.0. Une régression logistique binaire pas à pas descendante a été réalisée. Le seuil de significativité était  $p < 0,05$ .

**Résultats** : Sur 2117 travailleurs enquêtés, 91,0% étaient des hommes. L'âge médian était 38 ans (IQR : 28 ans à 48 ans). La prévalence du stress professionnel était de 77,7% (IC95% : [75,9 - 79,4]). La demande psychologique était élevée chez 92,9% des travailleurs et 84,0% avaient une latitude décisionnelle faible. Parmi les travailleurs 81,5% bénéficiaient d'un soutien social élevé et environ 90,4% des travailleurs avaient un score de reconnaissance faible. Les principaux facteurs liés au stress professionnel étaient, l'activité physique de forte intensité (ORa=0,63 ; IC95%: [0,50-0,78]), le type de travailleur (ORa=3,42 ; IC95%: [2,46-4,76]), le secteur d'activité (ORa=1,44 ; IC95%: [1,02-2,02]), l'exposition directe au bruit (ORa=1,31 ; IC95%: [1,01-1,70]), la faible reconnaissance au travail (ORa=1,72 ; IC95%: [1,22-2,42]).

**Conclusion** : Le stress professionnel est très fréquent chez les travailleurs en milieu industriel. La mise en place de mesures préventives contre ces facteurs de risques s'avère nécessaire.

**Mots clés** : Stress-professionnel, Industrie, Bénin

### EP-CO-08

#### **Dépistage du cancer du col de l'utérus : Connaissance, participation et facteurs associés chez les femmes du marché Dantokpa au Bénin**

Aguemon B<sup>1</sup>, Sossa Cj<sup>2</sup>, Padonou Sgr<sup>1</sup>, Damien Bg<sup>1</sup>, Olofindji M.J.M-G<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>Unité de santé publique, Faculté des Sciences de la santé, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Benin

<sup>2</sup> Institut Régional de Santé Publique (IRSP), Ouidah, Bénin

**Objectifs** : Pathologie en nette progression en Afrique au sud du Sahara, le cancer du col de l'utérus constitue un véritable problème de santé publique au Bénin. L'objectif de l'étude était

d'analyser le niveau de connaissance et le degré de participation des femmes en ce qui concerne le dépistage, ainsi que les facteurs qui y sont associés.

**Méthode :** Il s'agit d'une étude transversale descriptive à visée analytique à deux volets : quantitatif et qualitatif portant sur un échantillon de 474 femmes sélectionnées par échantillonnage en grappes à trois degrés. Sont incluses dans l'étude, les femmes vendant dans le marché Dantokpa, âgées de 25 à 65 ans

**Résultats :** La moyenne d'âge des femmes était de 40,20 ans, avec une déviation standard de 10,66 ans. Chez les femmes de Dantokpa, la prévalence du dépistage était de 4,64% ; le score moyen du niveau de connaissance sur le cancer du col utérin était de 3,01 avec un écart-type de 2,77 et celui du niveau de connaissance sur le dépistage était 2,72 avec un écart-type de 3,07. Trois variables étaient significativement associées à la pratique du dépistage : l'antécédent familial de cancers gynécologiques ( $p=0,000$ ), le niveau de connaissance sur le cancer du col utérin ( $p=0,000$ ), et le niveau de connaissance sur le dépistage du cancer du col utérin ( $p=0,000$ ). Cependant, l'association entre l'âge, le niveau d'instruction, le suivi gynécologique et la pratique du dépistage était faible.

**Conclusion :** Afin de contribuer à l'augmentation de la prévalence du dépistage, il est nécessaire de mener des actions concrètes telles que des campagnes d'information pour l'amélioration du niveau de connaissance des femmes, et la sensibilisation.

**Mots clés :** Cancer du col utérin, Dépistage, Pratique, Bénin, Dantokpa.

## EP-CO-09

### IMPACT DES STRATEGIES PREVENTIVES DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS A SEME-PODJI AU SUD DU BENIN

Idelphonse B Ahogni<sup>1,2\*</sup>, Michel Agbla<sup>2,3</sup>, Prudenciene Agboho<sup>1,4</sup>, Roseric Azondekon<sup>1,5</sup>, Sebastien Koudenoukpo<sup>1</sup>, Rodrigue Anagonou<sup>1</sup>, Andre Sominahouin<sup>1</sup>, Janyce Gnanvi<sup>4</sup>, Horacio Nani<sup>5</sup>, Germain Padonou<sup>1,2</sup>, Andre Houtoukpe<sup>6</sup> And Martin C Akogbeto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Centre de Recherche Entomologique de Cotonou (CREC), Ministry of Health, Cotonou, Benin*

<sup>2</sup>*Faculté des Sciences et Techniques (FAST), University of Abomey-Calavi (UAC), Benin*

<sup>3</sup>*Laboratoire National du Benin, Ministry of Health, Cotonou, Benin*

<sup>4</sup>*Département de Zoologie, Laboratoire Evolution, Biodiversité des Arthropodes et Assainissement, FAST, Cotonou, Benin*

<sup>5</sup>*University of Wisconsin Milwaukee, Milwaukee, USA*

<sup>6</sup>*Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG), University of Abomey-Calavi (UAC), Benin*

<sup>7</sup>*Project to Advance the Durability of Long-Lasting Insecticide-treated Nets (PADNET), Porto-Novo, Benin*

**Introduction :** Cette étude vise à évaluer l'impact des changements de comportement dans la population sujette au paludisme après avoir mis en place des stratégies préventives telles qu'une sensibilisation et une formation solides en ce qui concerne la réparation des moustiquaires.

**Méthodes :** Il s'agit d'une étude transversale réalisée d'avril à juin 2017 auprès d'enfants de moins de cinq ans dont les parents avaient auparavant (2 ans plus tôt) reçu des moustiquaires, suivie d'une sensibilisation pour une meilleure utilisation (groupe 1: 115 enfants) plus des kits de réparation de MILD (groupe 2: 121 enfants) ou que de MILD (groupe 3 témoin: 137 enfants). Des frottis sanguins et des gouttes épaisses ont été réalisés selon les protocoles de l'OMS ; l'hémoglobine a été lue et des TDR ont également été effectués.

**Résultats :** Au total, 373 enfants ont été examinés et échantillonnés. La prévalence globale de l'anémie était de 60% sans différence statistique significative entre les trois groupes ( $p>0,05$ ). Sur 373 lames lues au microscope, 19,3% présentaient le *P. falciparum* et aucune autre espèce n'a été identifiée. La prévalence du paludisme dans les groupes 1, 2 et 3 était respectivement de 22,6%, 4,9% et 29,9% ( $p<0,001$ ). La sensibilisation et les kits de réparation sont probablement à l'origine du faible taux d'enfants parasités dans le groupe 2 ( $p<0,001$ ).

**Conclusion :** Cette évaluation a montré une faible prévalence de la parasitémie chez les enfants dont les parents ont reçu des MILD et des kits de réparation et ont été sensibilisés à une meilleure utilisation. Il est donc crucial que le Programme National de Lutte contre le Paludisme, implique davantage dans ces stratégies la sensibilisation au changement de comportement pour une meilleure utilisation des MILD dans la lutte contre le paludisme.

**Mots-clés :** Parasitémie, anémie, TDR, *Plasmodium*, Sèmè-Podji.

## EP-CO-10

### FACTEURS DE PREDICTION DE LA MORTALITE DES MALADES POSITIFS AU COVID 19 AUX SOINS INTENSIFS DES CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC (CUSL) DE BRUXELLES

Ahounou E<sup>1\*</sup>, Akodjenou J<sup>2</sup>, Hounkpe P-C<sup>1</sup>, Zoumenou E<sup>1</sup>, Hantson P<sup>3</sup>.

1/Service polyvalent d'anesthésie réanimation, CHNU-HKM, Cotonou, 2/ Service d'Anesthésie Réanimation, CHU-MEL, Cotonou, 3/ Cliniques Universitaires Saint-Luc

**Introduction :** La maladie Covid-19 est une maladie infectieuse émergente provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2. Elle est responsable d'une insuffisance respiratoire hypoxique dans sa forme sévère, principal motif d'hospitalisation aux soins intensifs.

**Objectif :** décrire les caractéristiques des malades positifs au Covid-19 aux soins intensifs et analyser les facteurs prédictifs de la mortalité

**Méthode :** il s'agit d'une étude descriptive, analytique, des malades positifs au Covid-19 aux soins intensifs des CUSL, pendant la période du 15 mars au 30 avril 2020. La variable dépendante était la mortalité, les variables indépendantes étaient les caractéristiques démographiques, cliniques et thérapeutiques. La mortalité a été comparée en fonction des variables indépendantes à l'aide du test du Khi-deux ou du test exact de Fisher. Les facteurs de risque de mortalité ont été analysés selon un modèle multivarié de régression logistique et les résultats présentés sous forme de Odd Ratio, accompagnés de leur intervalle de confiance à 95%

**Résultats :** cinquante malades positifs au Covid-19 ont été étudiés. La moyenne d'âge était 59,9 ans et la sex-ratio 4. Les comorbidités les plus représentatives étaient l'obésité (52%) suivi de l'hypertension artérielle (48%). 56% des malades étaient intubés, mis sous ventilation artificielle. La durée médiane de l'intubation était de 7,5 jours et la durée moyenne d'hospitalisation pour les malades sortis et ceux décédés était de 12,16 jours. 10% des malades ont été mis sous oxygénation par membrane extra-corporelle, 32,69 ont eu une infection nosocomiale. La mortalité était de 24% des malades sortis des soins intensifs. L'intubation associée à la ventilation artificielle (OR = 5,55 ; IC95% = 1,07 – 28,82) était le seul facteur de risque significativement associé au décès.

**Conclusion :** la mortalité des malades positifs au Covid-19 aux soins intensifs est élevée ; l'intubation associée à la ventilation artificielle ont été les facteurs de risque de mortalité

**Mots clés :** Covid-19, soins intensifs, CUSL

**EP-CO-11****ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES DU « BURNOUT » CHEZ LE PERSONNEL SOIGNANT DE L'HOPITAL DE ZONE DE MENONTIN A COTONOU**

Antoine V. Hinson<sup>1</sup>, Rose Mikponhoue<sup>1</sup>, Badiro Aguemou<sup>2</sup>, Cisse Ibrahim Mama<sup>3</sup>, Patrick C. Sembeya<sup>1</sup>, Menonli Adjobimey<sup>1</sup> Paul Ayelo<sup>1</sup>

*1=Unité de Recherche et d'Enseignement en Santé au Travail et Environnement, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey Calavi, Bénin*

*2= Unité d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey Calavi, Bénin*

*3= Faculté de Médecine/ Université de Parakou, Bénin*

**Introduction\_:** Le burnout est un problème de santé publique dans le monde professionnel. Il associe trois dimensions à savoir l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et l'accomplissement professionnel évaluées à l'aide du Maslach Burnout Inventory (MBI).

**Objectif\_:** Evaluer la prévalence du burnout et ses facteurs associés chez le personnel soignant de l'Hôpital de Zone de Mènontin (HZM) à Cotonou au Bénin.

**Méthode\_:** Il s'est agi d'une étude transversale, analytique, à visée descriptive qui s'est déroulée du 9 Septembre au 8 Octobre 2019 auprès des agents de santé de l'HZM à Cotonou. L'échantillonnage a été non probabiliste. Les données recueillies ont été analysées à l'aide du logiciel STATA version 15. La comparaison des fréquences a été faite à l'aide du test de Chi2. En analyse multi variée, le modèle Logit a été utilisé pour la régression logistique. Un Odds ratio (OR) avec un intervalle de confiance à 95% (IC 95%) a été calculé. Un  $p \leq 0,05$  a été considéré comme statistiquement significatif.

**Résultat :** La prévalence du burnout était de 30,6% dont 2,3% en burnout sévère. Les facteurs associés au burnout étaient le sexe féminin ( $p < 0,0001$ ), le manque de temps consacré à sa famille ( $p = 0,04$ ), recevoir des remarques négatives sur ce manque de temps ( $p = 0,04$ ) et travailler dans un mauvais climat professionnel ( $p = 0,03$ ). Après analyse multivariée, d'autres facteurs comme une jeune expérience professionnelle (2,8 [1.2;6.2] ;  $p = 0,009$ ) et la consommation d'alcool (0,6[0.3;0.9] ;  $p = 0,021$ ) étaient également associés aux dimensions du burnout.

**Conclusion :** Cette étude montre une prévalence élevée du burnout chez les soignants de l'HZM. La prise en charge des facteurs associés et une amélioration des relations familiales et de travail pourraient réduire cette prévalence et ainsi prévenir le burnout.

**Mots-clés :** Burnout, personnel soignant, prévalence, facteurs associés, Bénin.

**EP-CO-12****STRESS PROFESSIONNEL DANS LES USINES DE COTON : PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES**

Antoine Vikkey Hinson<sup>1</sup>, Menonli Adjobimey<sup>1</sup>, Rose Mikponhoue<sup>1</sup>, Esdras Hountohotegbe<sup>2</sup>, Cisse Ibrahim Mama<sup>3</sup>, Dismand Houinato<sup>2</sup>

*1= Unité de Recherche et d'Enseignement en Santé au Travail et Environnement, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey Calavi, Bénin*

*2= Laboratoire d'Épidémiologie des Maladies Chronique et Neurologiques (LEMACEN), Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey Calavi, Bénin*

*3=Faculté de Médecine/ Université de Parakou, Bénin*

**Introduction :** Le stress professionnel (SP) est un risque psychosocial émergent en milieu de travail. Au Bénin, les données épidémiologiques sont quasi-inexistantes sur le stress

professionnel en entreprise textile. L'objectif de la présente étude est d'étudier la prévalence et les facteurs associés dans les usines de coton.

**Méthodes** : Il s'est agi d'une étude observationnelle transversale et analytique menée du 31 janvier au 11 avril 2019. Elle a porté sur 2117 travailleurs de 15 usines du coton âgés d'au moins 15 ans. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire digitalisé sur smartphones grâce au logiciel Kob Collecte. L'analyse des données a été effectuée avec le Logiciel R 3.6.0. Une régression logistique binaire pas à pas descendante a été réalisée. Le seuil de significativité était  $p < 0,05$ .

**Résultats** : Sur 2117 enquêtés, 91,0% étaient des hommes. L'âge médian était 38 ans (IQR : 28 ans à 48 ans). La prévalence du SP était de 77,7% (IC95% : [75,9 - 79,4]). La demande psychologique était élevée chez 92,9% des travailleurs et 84,0% avaient une latitude décisionnelle au travail faible. Plus de la moitié bénéficiaient d'un soutien social et environ un travailleur sur vingt avaient un score de reconnaissance élevé. Les principaux facteurs liés au SP étaient, l'activité physique de forte intensité (ORa=0,63 ; IC95% : [0,50-0,78]), le type de travailleur (ORa=3,42 ; IC95%: [2,46-4,76]), le secteur d'activité (ORa=1,44 ; IC95%: [1,02-2,02]), l'exposition directe au bruit (ORa=1,31 ; IC95%: [1,01-1,70]), la reconnaissance (ORa=1,72 ; IC95%: [1,22-2,42]).

**Conclusion** : Le SP est très fréquent chez les travailleurs des usines de coton au Bénin. Il importe de mettre en place des mesures préventives contre ces facteurs de risques afin d'assurer le bien-être des travailleurs enquêtés dans leur milieu de travail.

**Mots clés** : Stress professionnel, Coton, Bénin

### EP-CO-13

#### IMPACT DE LA COMMUNICATION INTER-HOSPITALIÈRE SUR LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS RÉFÉRÉS AUX URGENCES PÉDIATRIQUES DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DEPARTEMENTAL DE L'OUÉMÉ-PLATEAU (CHUD-OP)

PADONOU CAROLINE<sup>1</sup>, BOGNON GILLES<sup>1</sup>, LOGBO PARSIFAL<sup>1</sup>, SAGBO GRATIEN<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Service de pédiatrie du CHUD-OP

**Introduction** : La communication inter-hospitalière est l'ensemble des échanges d'informations concernant le patient, et survenant entre les différentes formations sanitaires impliquées dans la transition de soins. Ce travail vise à évaluer l'impact de la communication inter-hospitalière sur la prise en charge des enfants référés aux urgences pédiatriques du CHUD-OP.

**Méthode** : Il s'agissait d'une étude transversale analytique menée du 1<sup>er</sup> avril au 30 septembre 2017 ayant porté sur les enfants de 29 jours révolus à 18 ans admis aux urgences pédiatriques. Les items de référence et de contre-référence de Stille et al. ont servi de normes.

**Résultats** : Parmi les 1489 enfants inclus, 885 étaient référés soit une fréquence hospitalière de 59,4%. La moyenne d'âge était de 46,11 mois et le sex-ratio de 1,26. Une communication préalable à l'admission était établie pour sept enfants (0,8%). Elle était associée à une réduction significative des délais d'initiation de la mise en condition ( $p < 0,001$ ), du séjour aux urgences ( $p = 0,0096$ ), du séjour d'hospitalisation ( $p = 0,00661$ ) et de la mortalité ( $p < 0,0001$ ). Le carnet de soins (59,8% ; 245/410) et la fiche de référence (46,1% ; 189/410) étaient les documents de référence retrouvés. Ils étaient associés à une réduction significative du délai moyen d'initiation du traitement étiologique ( $p < 0,001$ ) et de la fréquence hospitalière de décès ( $p < 0,0001$ ). Une contre-référence était effectuée chez trente-huit (4,3%) enfants référés.

**Conclusion :** L'existence d'une communication préalable à l'admission et d'un document de référence complet améliore la prise en charge des enfants référés.

**Mots-clés :** communication inter-hospitalière, référence, urgences pédiatriques.

#### EP-CO-14

##### ROLE DE L'ISOIMMUNISATION AUX ANTIGENES SPERMATIQUE DANS L'INFERTILITE FEMININE AU BENIN

GANLAKI TOMAVO HTR, HOUNSOSSOU CH, KOUGNIMON FEE, AKPOVI DC\*, LOKO FS

*Département de Génie de Biologie Humaine, Unité de Recherche sur les Maladies Non Transmissibles et le Cancer (UR-MNTC), Laboratoire de Recherche en Biologie Appliquée, Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi, Université d'Abomey-Calavi, Bénin.*

**Introduction :** La proportion d'infertilité féminine d'origine inexpliquée est de plus en plus alarmante. Notre but était de contribuer à l'amélioration du diagnostic des cas d'infertilités inexpliquées au Bénin par le dosage des Anticorps Anti-Spermatozoïdes (AAS). **Méthodes :** Le dosage d'AAS a été réalisé par la méthode ELISA indirect non compétitive sur des échantillons de 90 patientes (66 femmes infertiles et 24 femmes gestantes). Les tests statistiques de  $\chi^2$  et de Fisher ont été utilisés pour l'analyse des données. Le test de corrélation de Pearson et le test de comparaison de la variance ont été utilisés pour comparer les groupes de données et les variations ont été jugées significatives à  $p < 0,05$  en utilisant le test  $t$  de Student.

**Résultats :** La cause de l'infertilité était indéterminée chez 71,21% des femmes infertiles. La durée moyenne de l'infertilité au sein du couple était de 4,97 ans IC95% [3,84 ; 6,09]. Il y avait 68% de cas d'infertilité primaire contre 32% d'infertilité secondaire. Il n'y avait pas de différence significative entre l'âge moyen des femmes des deux groupes ( $p=0.160$ ). Il n'existait pas de lien entre l'infertilité et la profession ( $p=0.840$ ), l'ethnie ( $p=0.056$ ) ou le nombre d'avortements ( $p=0.243$ ). Les taux d'AAS étaient significativement plus élevés ( $p=0.000$ ) chez les femmes infertiles (27,42 IC95% [24,35 ; 30,56]) que chez les femmes gestantes 15,46 (IC95% [9,94 ; 20,97]). Il y avait une corrélation positive entre le taux d'AAS et l'âge ( $R=0.236$ ,  $p=0.029$ ) et entre le taux d'AAS et le nombre d'avortements ( $R=0.363$ ,  $p=0.00$ ). **Conclusion :** L'isoimmunisation féminine par les antigènes du spermatozoïde est l'une des causes majeures de l'infertilité indéterminée chez la femme au Bénin.

**Mots clés :** Infertilité féminine, antigène spermatique, isoimmunisation.

#### EP-CO-15

##### PREVALENCE DES FACTEURS DE RISQUE VASCULAIRE DANS L'ARRONDISSEMENT DE TITIROU A PARAKOU AU BENIN EN 2016

HOUEHANOU YESSITO CORINE NADÈGE (1), AGBETOU MENDINATOU (2), KOSSI OYENE (1,2), HOUNTADA HOSPICE (2), AGONNOUDÉ MAURICE (1), ADOUKONOU THIERRY (1,2)

(1) *Ecole nationale de formation des techniciens supérieurs en épidémiologie, Université de Parakou, Parakou, Bénin*

(2) *Département de neurologie, Faculté de médecine, Université de Parakou, Parakou, Bénin*

**Introduction :** L'Afrique est confrontée à un fardeau élevé des accidents vasculaires cérébraux en raison de l'augmentation de leurs facteurs de risque. L'objectif de cette étude était de déterminer la prévalence des facteurs de risque vasculaire et leurs facteurs associés dans l'arrondissement de Titirou à Parakou au Bénin en 2016.

**Méthodes** : C'était une étude transversale. Elle a porté sur des adultes vivant à Titirou et ayant donné leur consentement. Une enquête porte-à-porte a été réalisée du 15 mars au 15 juillet 2016 dans chaque quartier ou village jusqu'à ce que le nombre attendu soit atteint. Les données sociodémographiques, les antécédents médicaux, les mesures anthropométriques et de pression artérielle ont été collectées en utilisant l'approche STEPS de l'OMS. Une régression logistique a été effectuée pour identifier les variables associées aux facteurs de risque métabolique.

**Résultats** : Un total de 4671 participants a été inclus avec un âge moyen de  $27,7 \pm 12,9$  ans. Les prévalences des facteurs de risque comportementaux étaient de : 17,2% pour la consommation d'alcool ; 21,5% pour la faible consommation de fruits et légumes ; 51,1% pour la faible pratique d'activité physique et 3,5% pour le tabagisme. Celles des facteurs de risque métabolique s'élevaient à : 8,7% pour l'obésité, 7,1% pour l'hypertension artérielle, 1,7% pour le diabète et 2,2% pour la dyslipidémie. L'âge ( $p < 0,001$ ), le sexe ( $p < 0,001$ ), l'état matrimonial ( $p < 0,001$ ) et la profession ( $p = 0,010$ ) étaient associés à l'obésité. L'âge était également associé à l'hypertension artérielle ( $p < 0,001$ ) et au diabète ( $p < 0,001$ ). La dyslipidémie variait selon le tabagisme ( $p = 0,033$ ) et la faible pratique d'activité physique ( $p = 0,003$ ).

**Conclusion** : Cette étude montre une forte prévalence de certains facteurs de risque vasculaire. Elle souligne la nécessité d'interventions ciblées pour la prévention primaire des accidents vasculaires cérébraux au Bénin.

**Mots clés** : Prévalence - Facteurs de risque vasculaire - Bénin

## EP-CO-16

### ETUDE DE LA MORBIDITE RESIDUELLE DE LA LEPRE APRES LA POLYCHIMIOThERAPIE PAR AUDIT CLINIQUE DANS LES DEPARTEMENTS DU ZOU ET DU PLATEAU AU BENIN

ROCH CHRISTIAN JOHNSON<sup>1</sup>, PARFAIT DJOSSOU<sup>1</sup>, RONALD SETONDJI GNIMAVO<sup>3</sup>, CHABI ALPHONSE BIAOU<sup>2</sup>, ZOULKIFL SALOU BACHIROU<sup>1</sup>, FRANCK ZINSOU MIGNANWANDE<sup>1</sup>, ESAÏ ANAGONOU<sup>3</sup>, ANITA AKPEDJE WADAGNI<sup>3</sup>, JEAN GABIN HOUZO<sup>3</sup>, YVES THIERRY BAROGUI<sup>3</sup>, GHISLAIN EMMANUEL SOPOH<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Centre Inter Facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable/Université d'Abomey-Calavi (CIFRED/UAC)

<sup>2</sup> Institut Régional de Santé Publique (IRSP)

<sup>3</sup> Programme National de Lutte contre la Lèpre et l'Ulcère de Buruli (PNLLUB)

**Introduction** : La morbidité résiduelle après la polychimiothérapie (PCT) a un impact sur la vie des personnes affectées par la lèpre principalement celles qui présentent des atteintes neurologiques. C'est pour apprécier l'état clinique des malades ayant terminé leur PCT dans les communes de Djidja, Ouinhi, Zagnanado dans le département du Zou et celle de Kétou dans le département du Plateau que la présente étude a été réalisée.

**Méthodes** : Sur la base de l'étude des registres, tous les malades ayant reçu la PCT dans la période de 2006 à 2016 dans les communes cibles ont été répertoriés. Une recherche systématique de tous les cas index a été effectuée. Les malades retrouvés ont été interviewés et examinés par des Inspecteurs Lèpre. Les données cliniques et épidémiologiques ont été collectées. La comparaison des proportions d'infirmité de degré 2 a été faite grâce au  $\chi^2$  de McNemar. Le seuil de significativité était de 5%.

**Résultats** : Au total, 197 patients de la lèpre sur 343 attendus ont été examinés dont 90 à Djidja, 40 à Ouinhi, 30 à Zagnanado et 37 à Kétou. Les résultats révèlent 15 cas d'erreur diagnostique soit 9,8% des cas examinés. Trente-cinq (35) soit 17,7% des patients n'ont pas

achevé leur traitement. Quarante-quatre (44) soit 22,34% des malades présentent une infirmité de degré 2. La proportion des infirmités de degré 2 rapportée au diagnostic (n=23 ; soit 15,23%), n'est pas significativement différente (p=0,405) de celle rapportée par l'équipe de l'audit clinique (n=26 ; soit 17,21%).

**Conclusion :** Le suivi des patients après la PCT devrait être une priorité pour améliorer la qualité de vie des personnes affectées par la lèpre.

**Mots clés :** Lèpre, Audit clinique, Bénin

## EP-CO-17

### IMPACT DE L'UTILISATION DE L'EAU DU FORAGE SUR LA VARIATION DE L'INCIDENCE DE L'ULCERE DE BURULI AU BENIN : RESULTATS D'UNE ETUDE CAS-TEMOINS

<sup>1,2</sup>HORACE DEGNONVI, <sup>3</sup>SEBASTIEN FLEURET, <sup>2</sup>CLEMENT COUDEREAU, <sup>4</sup>RONALD GNIMAVO, <sup>3</sup>SIGRID GIFFON, <sup>5</sup>EDOUARD YERAMIAN, <sup>1</sup>ROCH CHRISTIAN JOHNSON, <sup>2</sup>ESTELLE MARION

1. Centre Inter Facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable, Université d'Abomey Calavi, Cotonou, Benin

2. Centre de recherche en cancérologie et immunologie Nantes-Angers, French National Institute of Health and Medical Research, Université de Nantes, Université d'Angers, Angers, France

3. Centre national de la recherche scientifique, UMR Espaces et SOciétés, Université d'Angers, Angers, France

4. Centre de Diagnostic et de Traitement de la lèpre et de l'ulcère de Buruli, Fondation Raoul Follereau, Pobè, Benin

5. Unité de microbiologie structurale, Institut Pasteur, Centre National de Recherche Scientifique, Université de Paris, Paris, France

**Introduction :** L'ulcère de Buruli est la troisième maladie mycobactérienne la plus répandue dans le monde. Le fardeau de santé publique de cette maladie tropicale négligée est important dans les régions pauvres de l'Afrique. Les facteurs de risque ou de protection peuvent différer d'une région à une autre, et pourraient être environnemental, socio-économique ou comportemental. Une meilleure accessibilité à l'eau potable, à travers les forages de puits pourrait être un facteur protecteur.

Notre but était d'étudier les impacts de l'utilisation de l'eau des forages de puits sur la variation de l'incidence de l'ulcère de Buruli dans une zone définie.

**Méthode :** Il s'agit d'une étude prospective de type cas-témoins appariée avec une méthode de recueil mixte qui a porté sur tous les cas incidents de l'ulcère de Buruli dépistés et confirmés par PCR-UB au CDTLUB-POBE de Janvier 2018 à Janvier 2020. Les données de forage de puits ont été aussi recueillies auprès du ministère de l'Énergie, Eau et Mines et les coordonnées géographiques ont été obtenues lors des visites de sites.

**Résultats :** La principale activité socio-économique des personnes atteintes de l'ulcère de Buruli incluses dans l'étude était l'agriculture de subsistance. Les analyses de régression logistique conditionnelle sur 106 cas et 212 témoins ont montré que l'utilisation régulière de l'eau des puits de forage pour se laver, se baigner, boire ou cuisiner protégeait contre l'ulcère de Buruli (Odds ratio ajusté = 0,1, IC à 95% [0,04 – 0,44] ; p = 0,0012).

**Conclusion :** Cette étude ouvre de nouvelles possibilités pour développer une politique efficace et abordable de lutte contre la maladie à une échelle géographique substantielle. Notre étude montre que l'accès à l'eau protégée est un moyen efficace et faisable pour réduire

l'incidence de l'ulcère de Buruli et, par conséquent pourraient servir de base pour un contrôle de cette affection.

**Mots clés :** Incidence, ulcère de Buruli, forage

### EP-CO-18

#### PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A L'UTILISATION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE DU POST-PARTUM CHEZ LES FEMMES AU BENIN : ENQUETE DEMOGRAPHIQUE ET DE SANTE 2017-2018.

ALPHONSE KPOZEHOUEN<sup>1\*</sup>, YOLAINE GLELE AHANHANZO<sup>1</sup>, ELVYRE KLIKPO<sup>2</sup>, CYRIAQUE DEGBEY<sup>1</sup>, MOUSSILIOU NOËL PARAÏSO<sup>1</sup>, JACQUES SAÏZONOU<sup>1</sup>, EDGARD-MARIUS OUENDO<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Bénin*

<sup>2</sup>*Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin*

**Introduction :** La planification familiale (PF) est un élément crucial des soins de santé dispensés pendant la période prénatale, immédiatement après l'accouchement et pendant la première année suivant l'accouchement. La planification familiale du post-partum (PFPP) est définie comme la prévention des grossesses non désirées et des grossesses très rapprochées durant les 12 premiers mois qui suivent l'accouchement. L'objectif de notre travail était de déterminer la prévalence de la PFPP et les pénitentiels facteurs qui lui sont associés en utilisant l'Enquête Démographique et de Santé (EDS) 2018-2019.

**Méthodes :** Nous avons travaillé sur les femmes en âge de procréer de 15 à 49 ans de l'ensemble de données de l'EDS 2018, qui ont eu une naissance au cours des 5 années précédant l'enquête. Nous avons utilisé à la fois des analyses descriptives et un modèle de régression logistique pour l'identification des facteurs influençant l'utilisation de la PFPP chez ces femmes.

**Résultats :** Nous avons travaillé sur 9266 femmes ; leur âge moyen était de 29,69 ans. Plus du cinquième des femmes (20,21% IC95%=[18,73 ; 24,68]) ont utilisé la PFPP au Bénin. La PFPP était significativement associée au niveau d'instruction primaire ou secondaire des femmes (OR = 1,49; IC95% = [1,19-1,85]; OR = 1,55; IC95% = [1,21-1,99] respectivement) par rapport aux femmes qui n'avaient aucun niveau. Les femmes appartenant aux ménages très riches ou riches étaient plus susceptibles d'utiliser la PFPP que les femmes de milieu très pauvre (OR = 1,60; IC95% = [1,15-2,22]; OR = 1,53; IC95% = [1,06-2,23] respectivement). Les femmes exposées aux médias étaient plus enclin de plus utiliser la PFPP que celles qui n'étaient exposées à aucun média.

**Conclusions :** Augmenter l'éducation et l'information en matière de santé reproductive parmi les femmes en post-partum, en particulier celles qui sont défavorisées, celles sans éducation et les plus pauvres, améliorerait considérablement la PFPP au Bénin.

**Mots clés :** EDS, planification familiale du post-partum, Bénin

### EP-CO-19

#### TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT DU PALUDISME A LA SULFADOXINE – PYRIMETHAMINE DES FEMMES ENCEINTES AU BENIN : PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES EN UTILISANT LES DONNEES DE L'ENQUETE DEMOGRAPHIQUE ET DE SANTE 2017-2018

ALPHONSE KPOZEHOUEN<sup>1\*</sup>, YOLAINE GLELE AHANHANZO<sup>1</sup>, CYRIAQUE DEGBEY<sup>1</sup>, ALPHONSE CHABI<sup>1</sup>, DOSTEN KPOZEHOUEN<sup>1</sup>, ELVYRE KLIKPO<sup>2</sup>, MOUSSILIOU NOËL PARAÏSO<sup>1</sup>, EDGARD-MARIUS OUENDO<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Bénin*

<sup>2</sup>*Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin*

**Introduction :** Le paludisme gestationnel est un véritable problème de santé publique. Le traitement préventif intermittent est d'une efficacité prouvée. La présente étude avait pour objectif d'identifier les facteurs associés à l'observance du traitement préventif intermittent au Bénin en 2018.

**Méthodes :** Des analyses secondaires ont été menées sur les données de l'enquête démographique de santé 2017-2018 du Bénin. La variable dépendante était l'utilisation adéquate du traitement préventif intermittent par les femmes (adéquate si 3 doses et plus, et inadéquates si non). Les caractéristiques sociodémographiques de la femme, le lieu d'accouchement, le nombre de consultations effectuées et la possession d'un carnet de santé, étaient les variables dépendantes. La régression logistique multiple a été utilisée pour vérifier l'association entre ces variables et la variable dépendante, à l'aide du logiciel STATA 12.

**Résultat :** L'étude a porté sur 8759 femmes. Le profil sociodémographique type est celui de la femme âgée de 29,6 ans  $\pm$  6,9 ans, non instruite (64,1%), d'ethnie Fon (34%), de religion chrétienne (37,3%) et résidant dans en zone rurale. La prévalence de l'utilisation adéquate du traitement préventif intermittent à la sulfadoxine-pyriméthamine était de 12,7% (IC95% : 11,71; 13,71). Les femmes ayant un niveau d'instruction secondaire (OR= 1,51 ; IC95% : 1,23 – 1,85), ayant effectué quatre consultations prénatales et plus (OR=24,15 ; IC à 95% : 7,07 – 82,44) et qui appartenaient à un ménage d'un niveau de vie moyen (OR=1,44 ; IC95% : 1,09 – 1,91), riche (OR=1,59 ; IC95% : 1,21 – 2,09) et très riche (OR=1,57 ; IC95% : 1,14 – 2,16) étaient plus susceptibles d'utiliser adéquatement le traitement préventif intermittent.

**Conclusion :** L'observance du traitement préventif intermittent au Bénin demeure faible. Les facteurs associés identifié par la présente étude devraient être pris en compte lors de la conception et de la mise en œuvre des politiques de santé visant à optimiser les stratégies de prévention du paludisme au Bénin.

**Mots Clés :** Prévalence, Facteurs Associés, traitement préventif intermittent à la sulfadoxine-pyriméthamine, Enquête Démographique et de Santé, Bénin

## EP-CO-20

### PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A LA VACCINATION COMPLETE CHEZ LES ENFANTS DE 12 A 23 MOIS : EVIDENCE A PARTIR DE L'ENQUETE DEMOGRAPHIQUE ET DE SANTE DU BENIN, 2017-2018

Alphonse Kpozehouen<sup>1\*</sup>, Yolaine Glele Ahanhanzo<sup>1</sup>, Elvyre Klikpo<sup>2</sup>, Collette Azandjame<sup>1</sup>, Virginie Mongbo<sup>1</sup>, Moussiliou Noël Paraiso<sup>1</sup>, Edgard-Marius Ouendo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

<sup>2</sup>Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

**Introduction :** La vaccination fait partie des interventions de santé publique les plus rentables pour réduire la morbidité et la mortalité infantiles dans le monde. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande que les vaccins soient administrés au cours des premières années de vie selon un calendrier et une plage de temps spécifiés. L'objectif de cette étude était de déterminer la prévalence et les facteurs associés à la vaccination complète des enfants de 12 à 23 mois au Bénin.

**Méthodes :** Les données utilisées, proviennent de l'Enquête Démographique et de Santé de 2017-2018 au Bénin (EDSB). Il s'agit d'une enquête en grappes stratifiée en zones urbaine et rurale. L'association entre la vaccination complète des enfants de 12 à 23 mois (variable dépendante) et les variables socioéconomiques liées à la mère et à l'enfant a été évaluée en

calculant les rapports de cotes suivis de leur intervalle de confiance à 95% à l'aide d'une régression logistique, en utilisant le logiciel Stata 12.

**Résultats :** Au total, 4575 femmes avaient répondu à la question sur la vaccination complète des enfants vivants, âgés de 12 à 23 mois ; la prévalence de la vaccination complète chez les enfants de 12 à 23 mois était de 56.9% IC95%=[54.42% - 59.36%]. Les enfants âgés de 12 à 23 mois dont la mère avait au moins fréquenté l'école secondaire étaient plus susceptibles d'être complètement vaccinés (OR=1.75 IC95%=[1.30 – 2.36]), les mères ayant effectué au moins une visite prénatale pendant leur grossesse étaient plus susceptibles de faire vacciner leurs enfants entre 12 et 23 mois que celles n'ayant effectué aucune visite prénatale ((OR=2.78 IC95%=[1.73 – 4.47] pour celles qui avaient effectué entre 1 et 3 visites) et (OR=3.46 IC95%=[2.15 – 5.55] pour celles qui avaient effectué 4 consultations prénatales et plus). De même, les enfants dont les mères ont accouché à domicile, étaient moins susceptibles d'être vaccinés que ceux dont les mères ont accouché dans un centre de santé (OR=0.64 IC95%=[0.44 – 0.92]).

**Conclusion :** Pour que le programme national élargi de vaccination ait un impact réel sur les maladies pouvant être prévenues par la vaccination, la vaccination complète systématique des enfants doit être privilégiée. Des stratégies novatrices pour améliorer la rapidité de la vaccination des enfants, combinées au renforcement du système de surveillance, devraient être mises en place au Bénin.

**Mots-clés :** Vaccination complète, enfant de 12 à 23 mois, Prévalence, Déterminants, Bénin.

## EP-CO-21

### FACTEURS ASSOCIES A L'UTILISATION DES GPS LORS DES ACCIDENTS DE LA VOIE PUBLIQUE A COTONOU EN 2019

PATRICK MAKOUTODE<sup>1</sup>, GLORIA LAURELLE GANDJI<sup>1</sup>, ALPHONSE KPOZEHOUEN, YOLAINE AHANHANZO<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Institut Régional de Santé Publique – Route des Esclaves, Cotonou. Ouidah, – Université d'Abomey-Calavi – BP 918 – Ouidah – Bénin.*

Une localisation spatiale précise des accidents est importante pour la réalisation de recherches en accidentologie ou d'études sur la sécurité routière. La présente étude a pour objectif d'étudier les facteurs associés à la géolocalisation des accidents de la voie publique à Cotonou en 2019. Il s'est agi d'une étude transversale, rétrospective à visée analytique portant sur les dossiers des accidents de la voie publique pendant la période du 18 Avril au 12 Juin 2020. Le travail a été réalisé à partir des 384 dossiers d'accidents dépouillés dans les 06 arrondissements de Cotonou sélectionnés au hasard. Une régression logistique a permis d'étudier les facteurs associés à l'utilisation des GPS lors des accidents de la voie publique. Le modèle final retenu à travers la modélisation << pas à pas ascendante >> a été adoptée.

Cette étude révèle que la prévalence des coordonnées du GPS renseigné au sein de l'échantillon est de 41,62% avec un intervalle de confiance [29,76-54,91] en 2019. L'âge moyen des agents chargés de constat était de 32 ans (32,13 ± 3,17). Les facteurs identifiés comme associés à cette géolocalisation sont le niveau d'instruction des agents de police avec odd Ratio 2 et son intervalle de confiance de [1.02-2.40], le moyen de déplacement des agents de police avec odd ratio 2.56 avec son intervalle de confiance [1,21-5,41], le niveau de gravité de l'accident avec son odd ratio 4.59 et son intervalle de confiance [2,82-8,32] et le type de jour de survenue de l'accident avec odd ratio 0,56 et son intervalle de confiance de [0.437-2.553].

Quant à la qualité des coordonnées GPS renseignées, 85% des coordonnées recueillies sont de bonne qualité.

Compte tenu de la gravité et de l'ampleur des accidents de la route la réduction des accidents de la voie publique passe par des stratégies de promotion de la géolocalisation des accidents en vue d'une meilleure identification des zones à risque et de la prise de décision adaptée au phénomène des accidents.

**Mots-clés :** Accidents, GPS, géolocalisation, Bénin.

## EP-CO-22

### STATUT NUTRITIONNEL POST-RECUPERATION DES ENFANTS MALNUTRIS DOUZE MOIS APRES SORTIE D'UN PROGRAMME DE TRAITEMENT ET FACTEURS ASSOCIES AU BENIN.

CHARLES SOSSA, DONELLE AGOSSADOU, MOUSSILIOU PARAISO GHISLAIN SOPOH, BADIROU AGUEMON, VICTOIRE AGUEH

**Introduction :** La prise en charge hospitalière de la malnutrition aiguë sévère est l'un des volets de l'approche communautaire de la prise en charge de la malnutrition aiguë. Le statut nutritionnel post-récupération des enfants de zéro à cinq ans traités par malnutrition aiguë sévère au Bénin n'est pas documenté. L'objectif était d'évaluer l'état nutritionnel post-récupération des enfants malnutris douze mois après sortie d'un programme de traitement et les facteurs associés.

**Patients et méthodes :** Il s'agit d'une étude transversale, descriptive et analytique conduite en 2018 qui a porté sur 81 enfants de 0 à 5 ans sortis du programme de traitement de malnutrition aiguë, il y a un an ainsi que leurs mères. Les données anthropométriques des enfants ont été collectées. Les données sociodémographiques, les connaissances et pratiques alimentaires des mères ont été recueillies par questionnaire. Le test de Chi Deux de Pearson a été utilisé pour examiner l'association entre l'état nutritionnel au moment de l'enquête des enfants et les facteurs sociodémographiques et alimentaires.

**Résultats :** Parmi les 163 enfants recensés à partir des dossiers médicaux, seuls 81 ont été retrouvés. Parmi ceux-ci, 76,1% étaient malnutris. L'âge ainsi que le niveau de sécurité alimentaire des ménages étaient associés à l'état nutritionnel post-récupération des enfants malnutris douze mois après sortie du programme de traitement.

**Conclusion :** La plupart des enfants pris en charge pour malnutrition étaient encore malnutris douze mois après leur sortie du programme de traitement. Le suivi des enfants malnutris après leur sortie du programme de traitement devrait être systématique.

**Mots-clés :** Malnutrition aiguë, statut nutritionnel post-hospitalisation, enfants de 0 à 5 ans, Bénin.

## EP-CO-23

### DETERMINANTS DU RISQUE CARDIOVASCULAIRE GLOBAL EN MILIEU PROFESSIONNEL A COTONOU EN 2018 : CAS DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR DES BANQUES ET ASSURANCES

CHARLES SOSSA, KARL KPOSSOU, GHISLAIN SOPOH, MOUSSILIOU PARAISO, C. METONNOU, L. DJOGBENOU.

**Introduction :** Les Maladies cardiovasculaires sont la 1<sup>ère</sup> cause de morbi-mortalité dans le monde. L'objectif était d'évaluer le risque cardiovasculaire global (RCVG) chez les travailleurs dans le secteur des banques et assurances à Cotonou en 2018.

**Méthodes :** Il s'agissait d'une étude transversale qui s'est déroulée en 2018. Elle a porté sur 147 adultes travaillant dans le secteur Banque et Assurance à Cotonou sélectionnées par un sondage en grappe. Les données sociodémographiques et de mode de vie ont été collectées par questionnaires. Les données anthropométriques et biologiques nécessaires au calcul du risque cardiovasculaires global ont été collectées. La régression logistique a été utilisée pour rechercher des facteurs associés au RCVG élevé.

**Résultats :** L'âge moyen des travailleurs était 37,19 (+/- 7,49). Le ratio homme/femme était de 1,13. Les prévalences de l'hypertension, du diabète, du surpoids, de l'inactivité physique, des dyslipidémies, du stress professionnel, du travail sédentaire, des conflits au travail et des violences émotionnelles étaient respectivement de : 29,9% ; 7,5% ; 57,6% ; 71,4% ; 67,3% ; 28,6% ; 70,1% ; 10,9% et 31,3%. La prévalence des travailleurs avec un RCVG élevé (FRS  $\geq$  10%) était estimée à 7,7%. Le modèle final de régression logistique a permis d'identifier la consommation d'alcool (OR=6,94 ; IC95% [1,36 - 35, 45]) » ; la faible consommation des fruits et légumes (OR=8,58 ; IC95% [1,36 - 35,45]) » ; le niveau d'étude non universitaire (OR=6,31 ; IC95% [1,11 - 35,96]) comme des facteurs associés au RCVG chez les travailleurs. Il n'y a pas de relation statistiquement significative entre un RCVG élevé et l'exposition aux facteurs professionnels.

**Conclusion :** La prévalence élevée des travailleurs avec un RCVG élevé (FRS  $\geq$  10%) du secteur des banques et assurances requiert des interventions appropriées en vue de leur réduction.

**Mots clés :** Risque cardiovasculaire global, travailleurs, banques et assurances, Bénin

## EP-CO-24

### MISE EN PLACE ET SUIVI DE LA COHORTE "TRAUMAR" DES VICTIMES D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU BENIN EN 2019.

DONATIEN DADDAH<sup>1,2</sup>, YOLAINE GLELE AHANHANZO<sup>2</sup>, ALPHONSE KPOZEHOUEN<sup>2</sup>, BELLA HOUNKPE DOS SANTOS<sup>1,2</sup>, EDGARD-MARIUS OUENDO<sup>2</sup>, ALAIN LEVEQUE<sup>1</sup>

1-Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique.

2-Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin.

**Résumé :** Les accidents de la circulation représentent en Afrique et au Bénin un véritable problème de santé publique. La mise en place d'une cohorte de victimes d'accident de la circulation au Bénin constitue une opportunité de disposer de données factuelles sur cette thématique.

La collecte de donnée avait été réalisée, du 01 juillet 2019 au 31 janvier 2020, par un questionnaire électronique KoBoCollect dans cinq hôpitaux couvrant tous les niveaux de la pyramide sanitaire du Bénin.

Au total 1968 victimes d'accident de la circulation ont été recrutées au sein de la cohorte dont 1871 (95%) de patients consentants. Les usagers à deux roues, les femmes, les piétons et les conducteurs de véhicules légers représentaient respectivement 27,4% ; 69,4% ; 18,8% et 2,5 % des sujets enrôlés au sein de cette cohorte.

Cette phase initiale a été complétée par une phase de suivi téléphonique à 6 mois avec un taux de réponse 74,7 %. Elle a permis de recueillir des données sur la situation clinique des victimes et les conséquences à court termes de l'accident notamment celles physiques, mentales et professionnelles.

Le suivi à 12 mois actuellement en cours permettra d'apporter aux victimes une assistance spécialisée et collectera les données sur les conséquences à moyen terme de l'accident en l'occurrence celles mentales, professionnelles, financières, familiales et sociales.

La cohorte TraumAR, base de données d'accident de la circulation, constitue une source fiable pouvant nourrir l'élaboration de politique de prévention des accidents de la circulation au Bénin.

**Mot clés :** cohorte, suivi, accident de la circulation

### EP-CO-25

#### CARACTERISTIQUES EPIDEMIOLOGIQUES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION CHEZ LES PIETONS ET CONDUCTEURS DE BICYCLETES AU BENIN DE 2008 A 2017

DONATIEN DADDAH<sup>1,2</sup>, YOLAINE GLELE AHANHANZO<sup>2</sup>, ALPHONSE KPOZEHOUEN<sup>2</sup>, BELLA HOUNKPE DOS SANTOS<sup>1,2</sup>, HUGUETTE TEDJI<sup>2</sup>, EDGARD-MARIUS OUENDO<sup>2</sup>, ALAIN LEVEQUE<sup>1</sup>

*1-Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique.*

*2-Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin.*

*3-Centre National de Sécurité Routière, Bénin*

Les accidents de la circulation représentent dans le monde la première cause de mortalité chez les jeunes de 15-29 ans dont plus de 90% concerne les pays en développement.

Une analyse secondaire de données a été réalisée sur les accidents de la circulation constatés par la police au Bénin entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2017. La régression logistique a été utilisée pour rechercher les associations. Les Odd Ratio (OR) ont été calculés suivis de leurs intervalles de confiance à 95%.

Sur la période d'étude, 54498 accidents de la circulation ont été constatés. Près de 10 % de ces accidents avaient impliqué un piéton ou un cycliste avec plus de 90 % piétons.

Les principaux antagonistes dans ces accidents sont les véhicules légers (50%), les motos (27,50%) et les véhicules poids lourds (20,57%).

Les accidents de la circulation impliquant les piétons et cyclistes furent mortels dans plus du 25% des cas ( $p < 0,001$ ). Ces usagers ont été 18,58 fois plus à risque de décès que les autres (OR ajusté 18,58 [16,84 ; 20,51]).

Cette étude montre le fardeau de morbidité et de mortalité que supportent les usagers les moins protégés de la circulation au Bénin.

**Mots clés :** accident de la circulation, piéton, cyclistes

### EP-CO-26

#### EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SECURITE ROUTIERE AU BENIN, 2019

BELLA HOUNKPE DOS SANTOS<sup>1,2</sup>, ANDRE AÏNA<sup>3,4</sup>, ALPHONSE KPOZEHOUEN<sup>2</sup>, YOLAINE GLELE AHANHANZO<sup>2</sup>, DONATIEN DADDAH<sup>1,2</sup>, YVES COPPIETERS<sup>1</sup>, ELISABETH PAUL<sup>2</sup>

*<sup>1</sup>Université Libre de Bruxelles. <sup>2</sup> Institut Régional de Santé Publique. <sup>3</sup>Université de Parakou.*

*<sup>4</sup>Université de Liège*

**Introduction :** Le Bénin ayant adhéré à la Décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020 a mis en œuvre de multiples actions pour réduire les accidents de la route et leurs conséquences. L'étude vise à évaluer le niveau de mise en œuvre des interventions de sécurité routière au Bénin.

**Méthode :** Il s'agit d'une recherche évaluative visant à faire l'analyse de la mise en œuvre, renforcée d'une analyse logique des interventions menées dans le domaine de la sécurité routière au Bénin en 2019. Elle a combiné une revue de la littérature grise et un volet qualitatif. Les données ont été collectées par exploitation de documents et par entretiens

individuels. Ces données proviennent des structures impliquées dans la gestion de la sécurité routière.

**Résultats :** La sécurité routière est une priorité nationale avec une institution chef de file et plusieurs structures impliquées. On note l'absence de creuset de concertation des parties prenantes, l'insuffisance de documents de cadrage, de ressources, de textes législatifs et de données d'études. Peu de routes sont en bon état et très peu permettent la séparation des deux roues. Le parc automobile est vétuste : plus de 70% des véhicules immatriculés ont plus de 10 ans. Diverses activités de sensibilisation sont réalisées mais elles sont insuffisantes et mal coordonnées. Les traumatisés sont référés vers les structures sanitaires par les sapeurs-pompier, des proches ou des témoins. Les hôpitaux de référence disposent du service minimum pour prendre en charge les cas de traumatisme. Les interventions n'ont pas encore entraîné une réduction du nombre de blessés et de tués par accidents qui évolue en dents de scie.

**Conclusion :** Le Bénin a fait de grands efforts dans le domaine de la sécurité routière. Toutefois il persiste quelques insuffisances à prendre en compte.

**Mots-clés :** Evaluation, sécurité routière, Bénin.

## EP-CO-27

### PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET CLINIQUE DU PIAN DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE MBAÏKI EN CENTRAFRIQUE

Jean De Dieu Longo<sup>1,2,\*</sup>, Eudes Gbagbangaï<sup>3</sup>, Henri Saint-Calvaire Diemer<sup>1</sup>, Gilles Bröker<sup>5</sup>, Laurent Belec<sup>4</sup>, Gerard Gresenguet<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Centre National de Référence des Maladies Sexuellement Transmissibles et de la Thérapie Antirétrovirale, Bangui, République Centrafricaine; <sup>2</sup> Unité de Recherches et d'Intervention sur les Maladies Sexuellement Transmissibles et le SIDA, Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé de Bangui, République Centrafricaine; <sup>3</sup> Services Maladies Infectieuses et Tropicales des Services des Armées, République Centrafricaine; <sup>4</sup> Laboratoire de Microbiologie, hôpital Européen Georges Pompidou, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, and Faculté de Médecine Paris Descartes, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Paris, France; <sup>5</sup> Université Paris Sud, Département de Santé Publique, Bicêtre Hospital, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Le Kremlin-Bicêtre, France, et Direction Internationale, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paris.

**Introduction :** Le but de cette étude dans le but de déterminer la séroprévalence du pian dans deux districts sanitaire du Sud du pays afin d'obtenir des données de base pour mieux adapter les stratégies de lutte dans cette zone.

**Matériel et Méthodes :** Il s'agissait une étude transversale descriptive qui s'était déroulée du 1er octobre au 31 décembre 2018.

**Résultats :** L'étude menée dans 12 villages des communes de M'baïki et de Baléloko a permis de déterminer 395 cas de pian sérologie positive au RPR. Toutes les tranches d'âges sont affectées par le pian, la tranche d'âge la plus concernée sur l'ensemble de l'échantillon est celle de 26-30 ans (61/395) cas de pian soit 15,44%, avec un intervalle de 2 à 78 ans, minimum de 2 ans et maximum de 78 ans. La moyenne d'âge était de 30 ans, le mode à 28 ans et un écart type = 1. Les hommes (198/395) soit 50,13% étaient légèrement plus touchés que les femmes (197/395) soit 48,87% et un sex ratio homme/femme=1. Les ménagères (123/395) soit 31,14% étaient les groupes socioprofessionnels les plus concernées suivies des cultivateurs (71/395) soit 17,97% et des élèves (69/395) soit 17,47%. Les ethnies les Aka ou

« pygmées » (228/395) soit 57,72% étaient plus touchés (réservoir de pian) que les bantous (167/395) soit 42,28%. Le niveau d'instruction: les analphabètes (230/395) soit 58,23% présentaient plus de pian que le niveau primaire (119/395) soit 30,13% puis secondaire (40/395) soit 10,13%. La lésion pianique dominante était la papillome (197/395) soit 49,87% et des macules (108/395) soit 27,34%. La localisation des lésions du pian était diverse se situant sur tout le corps, la localisation plantaire (258/395) soit 65,31% dominait suivi du dos (42/395) soit 10,63%. Les personnes avec du pian multiple (228/395) soit 72,91% dominaient.

**Conclusion :** Notre étude confirme que le pian demeure endémique dans en RCA et sa transmission est réelle. Au nombre des raisons évoquées, l'absence de traitement de masse, la promiscuité entre Aka et Bantous, le faible niveau de vie et le faible niveau d'instruction de la population.

**Mots clés :** Pian, épidémiologie, République Centrafricaine

## EP-CO-28

### INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH A BANGUI

Jean De Dieu Longo<sup>1,2,\*</sup>, Eudes Gbagbangai<sup>3</sup>, Henri Saint-Calvaire Diemer<sup>1</sup>, Gilles Bröker<sup>5</sup>, Laurent Belec<sup>4</sup>, Gerard Gresenguet<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Centre National de Référence des Maladies Sexuellement Transmissibles et de la Thérapie Antirétrovirale, Bangui, République Centrafricaine; <sup>2</sup> Unité de Recherches et d'Intervention sur les Maladies Sexuellement Transmissibles et le SIDA, Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé de Bangui, République Centrafricaine; <sup>3</sup> Services Maladies Infectieuses et Tropicales des Services des Armées, République Centrafricaine; <sup>4</sup> Laboratoire de Microbiologie, hôpital Européen Georges Pompidou, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, and Faculté de Médecine Paris Descartes, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Paris, France; <sup>5</sup> Université Paris Sud, Département de Santé Publique, Bicêtre Hospital, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Le Kremlin-Bicêtre, France, et Direction Internationale, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paris.

**Introduction :** La co-infection Tuberculose-VIH est la principale cause de décès des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) en République Centrafricaine. L'objectif de cette étude était de déterminer l'incidence et les facteurs de risque de la TB chez les PVVIH à Bangui.

**Matériel et méthodes :** Il s'agissait d'une étude rétrospective réalisée à partir d'une cohorte de PVVIH suivies dans un centre de prise en charge de l'infection à VIH à Bangui. Les PVVIH âgées d'au moins 18 ans, sans antécédent de TB et enrôlées entre le 1<sup>er</sup> janvier 2016 et le 31 décembre 2017 ont inclus dans l'étude. Le logiciel, Epi Info 7 a permis de faire la saisie et l'analyse des données. Le test de chi-carré a servi que comparer les proportions au seuil de significativité de 5%.

**Résultats :** Au total, 677 patients dont 618 (91,28%) étaient sous traitement antirétroviral (TAR) étaient inclus dans l'étude. L'âge médian était de 34 ans avec des extrêmes allant de 18 à 57 ans. Des patients suivis, 104 ont développé la TB. L'incidence de la TB dans l'ensemble était de 15,37 (104/677) cas pour 100 PVVIH-année. Cette incidence était de 13,10 (81/618) cas pour 100 chez les patients sous TAR-année et de 38,99 (23/59) cas pour 100 patients en pré-TAR-année. Chez les patients en pré-TAR l'incidence de la TB était donc presque 3 fois plus élevée que celle des PVVIH sous TAR ( $p=0,03$ ). Les stades cliniques III et IV de l'OMS ( $p=0,02$ ), l'absence de TAR ( $p=0,03$ ), la mauvaise observance ( $p=0,004$ ) et la faible capacité fonctionnelle ( $p=0,04$ ) étaient les facteurs de risque associés à la survenue de TB chez les PVVIH à Bangui.

**Conclusion :** La forte incidence de la TB dans notre contexte est essentiellement liée retard de diagnostic et la qualité de la prise en charge. L'initiation précoce du TAR, un screening systématique de la TB chez les PVVIH à l'entrée dans la file active et un meilleur suivi des patients sous TARV sont prioritaires.

**Mots clés:** incidence, tuberculose, VIH,

### EP-CO-29

#### INVESTIGATION D'UN CLUSTER DE COVID-19 DANS LA CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS DE SOKODE, DISTRICT SANITAIRE DE TCHAOUDJO, TOGO, 2020.

*N'djao A., Hilim P.M., Tchalla-A E., Bassoti S., Naba M.A., Abdoulaye A., Ahonsou D., Kinde R., Tamekloe S.A.*

**Introduction :** Le 14 Août 2020, un cas de COVID-19 a été détecté dans une caserne de sapeurs-pompiers à Sokodé. Nous avons mené cette investigation pour décrire l'évènement et mettre en place des mesures de riposte.

**Méthode :** Nous avons conduit une étude descriptive du 31 juillet au 20 septembre 2020 dans la ville de Sokodé. Un cas suspect de COVID-19 était toute personne résidant à Sokodé, présentant un syndrome d'infection respiratoire aiguë de cause inexpliquée, ou toute personne ayant séjourné hors du pays dans les 14 derniers jours à partir du 31 juillet 2020. Le cas confirmé était toute personne ayant un test PCR positif au SRAS-CoV2. Nous avons identifié les contacts du cas index. Nous avons collecté les données avec des fiches d'investigation de cas confirmé et des contacts. Nous avons calculé les fréquences, les proportions, les moyennes et les ratios.

**Résultats :** Le cas index était un homme sapeur-pompier de 33 ans sans antécédent connu travaillant dans une caserne de 16 sapeurs-pompiers et vivant seul. La source de l'infection n'a pu être retrouvée. Nous avons identifié 19 contacts dont 16 Sapeurs-Pompiers et 3 dans la communauté. Les 5 cas confirmés parmi les contacts étaient de la caserne pour un taux d'attaque secondaire de 31,25 pour 100 Sapeurs-Pompiers en 19 jours. L'âge moyen était de 32,5 ans  $\pm$  2,5. Tous les cas étaient des sapeurs-pompiers, de sexe masculin. Les asymptomatiques représentaient 66,6%. Sous une bithérapie associant Hydroxychloroquine + Azithromycine, l'évolution a été favorable avec un séjour moyen au CTE de 9,83 jours  $\pm$  1,83. L'évolution immédiate a été favorable pour 100% des cas.

**Conclusion :** L'investigation du cas de COVID-19 dans la caserne des sapeurs-pompiers a permis la mise en place des mesures de riposte qui ont contribué à limiter le nombre de cas et à éviter sa propagation en dehors de la caserne.

**Mots clés :** Cluster, Sapeurs-pompiers, Togo

### EP-CO-30

#### DES PROFILS ELECTROPHORETIQUES DES PATIENTS REÇUS POUR EXAMEN DE PROTIDOGRAMME

Ornela F.A.O. Daoudou<sup>1</sup>, Sylvain Hounsounnou<sup>2</sup>, Casimir D. Akpovi<sup>1</sup>

**1 :** Ecole Polytechnique d'Abomey Calavi (EPAC – UAC)

**2 :** Toxi-Labo, Cotonou

Le Protidogramme est une analyse de routine dans les laboratoires d'analyses biomédicales qui constitue à la répartition des différentes fractions protéiques du sérum. Il contribue au diagnostic biologique des affections liées aux protéines sériques. Ainsi le présent travail avait

pour objectif d'établir une vue générale des anomalies du protidogramme, et les âges des personnes qui sont les plus affectées par ces anomalies. Nous avons travaillé au laboratoire TOXI-LABO durant la période de Janvier 2019 à Février 2020 sur 270 personnes dont 152 de sexe masculin et 118 de sexe féminin. L'examen s'est déroulé sur du sérum recueilli à partir de sang prélevé dans un tube sans anticoagulant. On a procédé au dosage des protides totaux au spectrophotomètre d'absorption moléculaire Erba par la méthode de biuret puis à la migration des sérums à l'aide du Minicap Sebia. La moyenne d'âge de la population était  $51,51 \pm 20,41$  ans avec des extrêmes de 8 mois à 92 ans. De l'analyse des profils protidiques il ressort que seulement 12,96% des cas étaient normaux du point de vue quantitatif et qualitatif, 59,25% avaient une Hypergammaglobulinémie polyclonale suivi des hypoalbuminémies (28,15%), des syndromes inflammatoires (32,59%) syndrome néphrotique (5,55%) et des hyper gammaglobulinémies monoclonales (1,48%). Contrairement aux autres anomalies fréquentes chez les sujets de 40 ans au moins, les syndromes néphrotiques étaient plus fréquents chez les sujets de la tranche d'âge 0 à 20 ans. En sommes, cette étude met en évidence la variabilité des anomalies rencontrées lors d'une électrophorèse des protéines sériques et les tranches d'âge les plus concernées.

**Mots Clés :** Protidogramme, Anomalies, Profil protidique

### EP-CO-31

#### **MORBI MORTALITE GERIATRIQUE DANS LE SERVICE ORL DE L'HOPITAL PRINCIPAL DE DAKAR DU 1ER JANVIER 2018 AU 1ER AOUT 2020**

OUSSEYNOU KA<sup>1</sup>, ABDOUL AZIZ NDIAYE<sup>1</sup> CHEIKH TACKO DIOP<sup>1</sup>, YASSINE BENNANI ZIATNI<sup>2</sup>, MOUNTAGA ELIMANE DIA<sup>1</sup>, BOUBACAR GUEYE<sup>1</sup>, BAY KARIM DIALLO<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>*UFR Santé et Développement Durable de l'Université Alioune Dio de Bambey*

<sup>2</sup>*Université Cheikh Anta Diop Dakar, service ORK*

**Introduction :** Les pathologies ORL et cervico-faciales sont peu étudiées chez les personnes âgées pourtant elles posent un problème de santé publique pour cette catégorie de population. L'objectif de cette étude était de déterminer le profil de pathologie gériatrique ORL en milieu hospitalier.

**Patients et méthode :** L'étude a été menée dans le service d'Oto-Rhino-Laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital principal de Dakar. La population d'étude était constituée de sujets âgés de 60 ans et plus hospitalisés. Les données ont été recueillies à partir des dossiers d'hospitalisation. Une étude rétrospective, descriptive et analytique a été réalisée sur une période, allant du 1<sup>er</sup> janvier 2018 au 1<sup>er</sup> aout 2020. L'analyse des données a été effectuée avec le logiciel SSPSS version 18.

**Résultats :** les résultats ont montré une prévalence hospitalière de 8.22% (52 patients âgés sur 632), la tranche d'âge majoritaire était [60-70], il y avait une prédominance féminine (55.8%). La masse cervicale antérieure constituait le motif principal d'hospitalisation (36.5%), la localisation anatomique des lésions prédominante était la glande thyroïde (36.5%), le principal diagnostic était le goitre hétéro-multinodulaire (25%), l'HTA était la comorbidité la plus fréquente (68.97%).

78.8% des patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical et 98.1% d'un traitement médical. Le nombre de médicaments reçus était de trois pour la majorité des patients (61.5%). La prise en charge des patients était essentiellement assurée par le FNR (34.6%), la durée moyenne d'hospitalisation était de moins d'une semaine pour la majorité des patients (69.2%) et un seul décès a été noté (1, 29%). Le tabac était associé à la survenue du cancer du larynx.

**Conclusion :** Cette étude nous a permis d'identifier les pathologies ORL les plus fréquentes chez le sujet âgé et met en évidence l'ampleur des efforts à consentir pour améliorer le bien-être de cette population.

**Mots- clés :** pathologies ORL, sujet âgé, hospitalisation.

### EP-CO-32

#### PROFIL ACTUEL DE L'HEPATITE VIRALE C AU BENIN : SEROPREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES ISSUE D'UNE CAMPAGNE DE DEPISTAGE EN POPULATION GENERALE.

Moussiliou Noël Paraïso, Aboudou Raïmi Kpoussou, Comlan N'dehoubea Sokpon, Herve Lawin, Cedric Bigot, Khadidjatou Sake Alassan, Rodolph Koffi Vignon, Rene Keke, Camille Domonhedo, Sossa Edmond Gbedo, Jean Sehonou, Nicolas Kodjoh.

**Introduction :** L'hépatite C est un problème mondial de santé publique. Le but de cette étude était de déterminer la prévalence et les facteurs associés au portage des anticorps anti-virus de l'hépatite C (VHC) à l'occasion d'un dépistage de masse dans plusieurs localités réparties sur le territoire béninois.

**Méthodes :** Il s'agissait d'une étude transversale descriptive et analytique avec une collecte prospective de données. Cette collecte a eu lieu du 20 au 28 juillet 2019 à l'occasion d'un dépistage volontaire gratuit de l'hépatite C organisé au Bénin par les Club Rotary sur 23 sites répartis sur tout le territoire national. Un test rapide d'orientation diagnostique a été utilisé pour la détection des anticorps anti-VHC.

**Résultats :** En tout, 9035 volontaires étaient inclus, pour la plupart de nationalité Béninoise (99,0%), avec un âge médian de 27 ans, dont 51,1% de célibataires (4619/9035) et principalement des écoliers, élèves ou étudiants (37,9%, soit 3426/9035). La séroprévalence du VHC était de 1,0% (87/9035) [IC95% = 0,8% - 1,2%]. Cette infection était associée à l'âge supérieur à 42 ans (ORa=3,9 ; IC95% : 1,9-7,6), l'antécédent de diabète (ORa=3,9 ; IC95% : 1,9-7,6).

**Conclusion :** La séroprévalence des anticorps anti-VHC est relativement faible dans la population étudiée : 1%. Les facteurs associés au portage des anticorps anti-VHC étaient l'âge, la profession et l'antécédent diabétique.

**Mots clés :** Virus de l'hépatite C, Profil épidémiologique, Bénin

### EP-CO-33

#### PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES AUX INFECTIONS DU SITE OPERATOIRE DANS LES CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE TRAUMATOLOGIE ET D'UROLOGIE DU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUKOU MAGA DE COTONOU EN 2020

Cyriaque Degbey<sup>A,B,\*</sup>, Alphonse Kpozehouen<sup>a</sup>, Drissa Coulibaly<sup>a</sup>, Pascal Chigblo<sup>c</sup>, Josue Avakoudjo<sup>d</sup>, Edgard-Marius Ouendo<sup>a</sup>, Aristote Hans-Moevi<sup>c</sup>,

<sup>a</sup> Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin

<sup>b</sup> Clinique Universitaire d'Hygiène Hospitalière, Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga, Cotonou, Bénin

<sup>c</sup> Clinique Universitaire de Traumatologie-Orthopédie et de Chirurgie Réparatrice, Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga, Cotonou, Bénin

<sup>d</sup> Clinique Universitaire d'Urologie, Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga, Cotonou, Bénin

**Introduction :** Les infections du site opératoire sont une complication des ostéosynthèses et fait partie des infections nosocomiales. Ces infections demeurent un problème majeur de santé publique et font courir aux personnes qui doivent être opérées un risque important en raison de ces complications majeures. Cette étude avait pour objectif d'étudier la prévalence et les facteurs associés à la survenue des infections du site opératoire dans les Cliniques Universitaires de Traumatologie-Orthopédie de Chirurgie Réparatrice et d'Urologie dans un pays en voie de développement.

**Méthodes :** Il s'agissait d'une étude rétrospective à visée descriptive et analytique portant sur 384 personnes opérées pendant la période de 2019. Une régression logistique avait permis d'étudier les facteurs associés aux infections du site opératoire. Le modèle final retenu à travers la modélisation « pas à pas descendante » a été adoptée. Les associations entre la variable dépendante et les autres variables ont été appréciées par les odds ratio (OR) suivis de leur intervalle de confiance à 95%.

**Résultats :** La prévalence des infections du site opératoire était de 7,81% IC95% = [5,12-10,51]. L'âge moyen était de 49 ans avec un minimum de 3 ans et un maximum de 89 ans. Les facteurs liés aux infections du site opératoire sur la population d'étude étaient le mode d'admission du patient (OR = 2,74 ; IC 95% = [1,08 - 6,95]) et la durée du séjour post opératoire (OR = 8,75 ; IC 95% = [2,83 - 26,98]). L'entrevue et l'observation directe ont permis de relever des dysfonctionnements du système de soins, des erreurs médicales, la surveillance et l'indisponibilité financière des patients comme facteurs qui pourraient favoriser la survenue des infections du site opératoire.

**Conclusion :** Les interventions devront être focalisées sur les facteurs identifiés pour la prise en charge efficace des patients opérés.

**Mots clés :** Prévalence – Infection du site opératoire - CNHU-HKM – Bénin.

#### EP-CO-34

### CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES PRESTATAIRES DE SANTE VIS-A-VIS DES CAS SUSPECTS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN GUINEE

Alexandre Delamou<sup>1</sup>, Sidikiba Sidibe<sup>1</sup>, Alioune Camara<sup>1,2</sup>, Thierno Oumar Fofana<sup>1</sup>, Maurice Sandouno<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Université Gamal Abdel Nasser, Conakry, Guinée.

<sup>2</sup>Programme national de lutte contre le paludisme, Conakry, Guinée

<sup>3</sup>Agence de coopération Belge (ENABEL) Conakry, Guinée

**Introduction :** L'objectif de cette étude était d'analyser les connaissances, attitudes et pratiques des personnels de santé sur la maladie à coronavirus en Guinée.

**Méthode :** Il s'agissait d'une étude transversale analytique qui s'est déroulée du 10 au 25 Avril 2020, auprès des personnels de santé de 169 structures de santé du pays.

**Résultats :** Parmi les 1058 personnels de santé (PS), 44,9% ont été rencontrés à Conakry et 55,1% à l'intérieur du pays. Les modes de transmission interhumaines (80,9%) et par les voies respiratoires directes (80,6%) étaient bien connus par les PS. Cependant le mode de transmission à travers les surfaces et les objets souillés peu. La définition correcte des cas suspects de Covid était plus connue par 54,8% L'utilisation des gants devant (70%) et face à un cas suspect de Covid\_19 et le lavage des mains après les actes médicaux (81,7%) étaient systématique chez les PS. L'âge de 25- 39 ans (ORa=3,68 IC95%: (1,99-6,83), de 40-59 ans (ORa=3,49 IC95% (1,66-7,36), bonne connaissance des signes de Covid\_19 (ORa=2,57; IC95%: 1,31-5,06), bonne connaissance des mesures préventives (ORa=7,75 (1,94-17,11), bonne attitude face à un cas suspect de Covid\_19 (ORa= 2,60 ; IC95%: 1,61-4,18) étaient

staitiquement associés à la connaissance de la définition correcte de cas suspects de Covid\_19. L'âge 25-39 ans (ORa=2,36 ; IC95% : 1,28-4,36), 60 ans et plus (ORa=4,03; IC95% : 1,33-12,28) étaient associés à la bonne pratique des PS en face à un cas suspect de Covid\_19.

**Conclusion :** Les personnels de santé sont à risque de contracter le COVID-19 en Guinée. Il est nécessaire de renforcer l'information, améliorer les conditions de travail et fournir des directives claires et des formations complémentaires pour les protéger et faciliter leur rôle dans la riposte face au COVID-19.

**Mots clés :** COVID-19 ; Personnel de santé ; Guinée.

### EP-CO-35

#### EVALUATION RAPIDE DU NIVEAU DE PREPARATION DU SYSTEME DE SANTE ET DE LA REPONSE A LA PANDEMIE DE COVID-19 EN GUINEE

Alexandre Delamou<sup>1</sup>, Thierno Oumar Fofana<sup>1</sup>, Graziella Ghesquiere<sup>2</sup>, Sidikiba Sidibe<sup>1</sup>, Alioune Camara<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup>Université Gamal Abdel Nasser, Conakry, Guinée.

<sup>3</sup>Agence de coopération Belge (ENABEL) Conakry, Guinée

<sup>4</sup>Programme national de lutte contre le paludisme, Conakry, Guinée

**Introduction :** Les maladies à potentiel épidémique constituent des menaces pour les systèmes de santé africains. Cette étude avait pour objectif d'évaluer les niveaux de préparation et de réponse du système de santé au COVID-19 en Guinée.

**Méthode :** Une étude transversale a été conduite en Avril 2020 dans les structures/services de santé publics et privés dans 13 districts sanitaires guinéens auprès du personnel des structures/services de santé.

**Résultats :** Au total, 197 gestionnaires et 1020 personnels de santé ont participé à l'étude. Les documents d'orientation et les espaces dédiés à la prise en charge/isolément des cas suspects de COVID-19 n'étaient disponibles que dans 29% et 26% des structures, respectivement. Les capacités de collecte (9%) et de transport en toute sécurité (14%) des échantillons étaient faibles. Les unités de soins intensifs (5%), les lits réservés aux patients (3%), les oxygénateurs (2%) et les respirateurs (0,6%) faisaient presque défaut. Alors que 36% des structures/services avaient reçu des intrants de prévention et de contrôle des infections, 20% seulement disposaient de stocks suffisants pour 30 jours. Seulement 9% des personnels de santé avaient reçu une formation formelle sur le COVID-19. Les principales sources d'information du personnel étaient les médias (90%) et internet (58%). Seuls 30% des personnels avaient reçu un équipement de protection individuelle, davantage dans le secteur public ( $p < 0,001$ ) et dans la capitale Conakry ( $p = 0,022$ ).

**Conclusion :** Les niveaux de préparation des systèmes de santé Guinéens étaient faibles. Les personnels de santé ne se sentaient pas en sécurité sur leur lieu de travail. Une meilleure gouvernance pour améliorer et maintenir les capacités du système de santé guinéen à répondre aux épidémies actuelles et futures est nécessaire.

**Mots clés :** COVID-19; Préparation; Guinée.

### EP-CO-36

#### CARACTERISTIQUES DES USAGERS DE LA ROUTE ET COMPORTEMENTS PAR RAPPORT AU PORT DE CASQUE AU BENIN

Bella Hounkpe Dos Santos<sup>1,2</sup>, Alphonse Kpozehouen<sup>2</sup>, Yolaine Glele Ahanhanzo<sup>2</sup>, Donatien Daddah<sup>1,2</sup>, Alain Leveque<sup>1</sup>, Yves Coppieters<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Université Libre de Bruxelles. <sup>2</sup>Institut Régional de Santé Publique

**Introduction :** L'OMS recommande le port de casque comme l'un des principaux moyens de prévention des traumatismes par accidents de la route chez les motocyclistes. L'objectif de l'étude est d'apprécier les comportements des usagers de la route en ce qui concerne le port de casque au Bénin.

**Méthode :** Il s'agit d'une étude transversale, descriptive et analytique, réalisée sur une cohorte de traumatisés par accidents de la route mise en place au Bénin. L'étude a porté sur 1313 usagers à deux roues. Les données ont été traitées et analysées à l'aide du logiciel STATA15. Le test Chi2 de Pearson, le test-t de Student ont été utilisés au seuil de signification de 0,05.

**Résultats :** Dans l'ensemble 60,3% [IC<sub>95%</sub> : (57,6 ; 62,9)] portaient le casque dont 4,0% n'avaient pas la sangle de sécurité fermée essentiellement par négligence. 82,7% de sujets ne portant pas de casque jugent le casque encombrant. Parmi les conducteurs les femmes avaient plus porté le casque que les hommes (p=0,015). Les sujets portant le casque étaient mariés (p=0,000), plus âgés (p=0,000), avaient une plus grande ancienneté de conduite (p=0,000) et un plus faible indice de masse corporelle (p=0,003). Ils avaient plus d'antécédents d'accidents (p=0,045), ne consommaient pas d'alcool (p=0,000), étaient assurés (p=0,000), étaient en fonction (p=0,000) et en déplacement professionnel (p=0,000). Il a été observé que les sujets ne portant pas de casque décédaient plus de leur traumatisme que ceux qui en portaient (p=0,017).

**Conclusion :** une sensibilisation de certaines couches de la population, essentiellement les hommes jeunes. L'exigence du port de casque chez les passagers des deux roues devraient être une priorité nationale

**Mots-clés :** port de casque, comportements, traumatisés.

### EP-CO-37

#### ASSESSMENT OF ADHERENCE TO PUBLIC HEALTH MEASURES AND THEIR IMPACT ON THE COVID-19 OUTBREAK IN BENIN REPUBLIC, WEST AFRICA

Philippe Sessou<sup>1\*</sup>, Joseph Nelson Siewe Fodjo<sup>2</sup>, Charles Sossa Jerome<sup>3</sup>, Souaïbou Farougou<sup>1</sup>, Robert Colebunders<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Research Unit of Communicable Diseases, Polytechnic School of Abomey-Calavi, University of Abomey-Calavi, 01 BP 2009, Cotonou, Benin Republic

<sup>2</sup>Global Health Institute, University of Antwerp, Doornstraat 331, 2610 Antwerp, Belgium

<sup>3</sup>Division of Health Promotion, Regional Institute of Public Health, Ouidah, Benin.

**Introduction:** Following the global COVID-19 outbreak, the government of Benin implemented preventive measures to stall viral transmission. We sought to evaluate adherence of the Beninese people to these preventive measures, in order to identify predictors of poor adherence and adapt the national response to COVID-19

**Methods:** Two consecutive online surveys were conducted between May and August 2020. 462 and 507 adult participants aged 18 years and above responded to the first and second survey respectively, with >70% be males.

**Results:** More than 98% of respondents reported wearing face masks. A five-point adherence score was constituted by scoring observance to key preventive measures (mask use, physical distancing, hand hygiene, coughing hygiene, and avoiding to touch one's face). We observed an overall increase in adherence scores from 3.59 to 3.69 from the first to the second survey

( $p=0.086$ ). Increasing age and obtaining COVID-19 information from official sources were significantly associated with higher adherence scores in a multivariable model.

**Conclusion:** These findings suggest that a wide dissemination of adequate information about COVID-19 would increase adherence, and that targeted efforts should be directed towards increasing the compliance to preventive measures among the younger age groups.

**Key-words:** COVID-19, preventive measures, adherence, Benin, epidemiology

### EP-CO-38

#### INVESTIGATION DES CAS DE COVID-19 CHEZ DES ETUDIANTS, COMMUNE III DE BAMAKO, MALI, JUIN 2020.

OB TOGOLA<sup>1</sup>, Y KONE<sup>1</sup>, LC MARIAME<sup>2</sup>, MD SOUMARE<sup>3</sup>, K KAYEMBE<sup>4</sup>, B TRAORE<sup>4</sup>, M KONE<sup>1</sup>, H KEITA<sup>1</sup>, S COULIBALY<sup>5</sup>, OJB OTSHUDIANDJEKA<sup>2</sup>, P YANOGO<sup>2</sup>, F DIALLO<sup>2</sup>, N MEDA<sup>2</sup>

1. Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique (DGS-HP), Bamako, Mali
2. African Field Epidemiology Network (AFENET), BFELTP, Université Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
3. Centre de Santé de Référence de la Commune III, Bamako, Mali
4. African Field Epidemiology Network (AFENET), Bamako, Mali
5. Institut National de Santé Publique (INSP), Bamako, Mali.

**Introduction :** Urgence de santé publique de portée internationale, le COVID-19 est une maladie respiratoire aiguë, causée par un nouveau coronavirus qui est transmis par voie aérienne lors de la toux et des éternuements. En mi-mai, l'Afrique comptait 60661 cas avec 2223 décès et signalait ce plus grand nombre en Afrique du Sud avec 9420 cas et 186 décès. La Commune III de Bamako a notifié deux cas positifs de COVID-19 le 4 Juin 2020. Une investigation a été conduite pour confirmer l'épidémie ; déterminer son ampleur et instaurer des mesures de contrôle et de prévention.

**Méthodes :** Nous avons conduit une étude transversale descriptive sur deux cas confirmés de COVID-19 et leurs contacts du 7 Mai au 29 Juillet 2020. La définition de cas était un patient atteint d'une infection respiratoire aiguë grave et/ou toute personne contact des deux cas confirmés de COVID-19 notifiés par la commune III à partir du 4 Juin 2020. Des fréquences et proportions ont été calculées en utilisant Epi-info 7.2.

**Résultats :** Au total 212 personnes contacts dont 29 cas positifs au COVID-19 ont été enregistrées. Tous les contacts ont été testés à la PCR. L'âge moyen des cas positifs a été de 23,34 ans  $\pm$  3,49 [18-30], majoritairement asymptomatique (58,62%) et un sex-ratio (hommes/femme) de 2,22. La promiscuité sans mesures barrière a été le moyen de propagation le plus représenté (76,89%). ASACOKOULPOINT a été l'épicentre du COVID-19 avec 89,65% des cas positifs. L'épidémie a atteint son pic le 10 Juin avec 10 cas positifs. Tous les malades ont été pris en charge et aucun décès n'a été enregistré.

**Conclusion :** Les jeunes de sexe masculin étaient susceptibles d'être infectés par le COVID-19. Nous recommandons le dépistage des jeunes, la promotion des mesures barrières et la conduite d'études sur la transmission du COVID-19 chez les personnes asymptomatiques.

**Mots clés :** Etude transversale, COVID-19, Commune III.

### EP-CO-39

#### INFECTIONS LIEES AU CATHETER D'HEMODIALYSE AU CNHU DE COTONOU 2019 : PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES

VIGAN JACQUES<sup>1</sup>, SOSSA JEROME C<sup>2</sup>, AHOUI SERAPHIN<sup>3</sup>, AYADJI ERIC<sup>1</sup>, DOTCHAMOU BK

CENMAS<sup>1</sup>, AGBOTON BRUNO LEOPOLD<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *Clinique Universitaire de Néphrologie Hémodialyse du Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert K Maga (CNHU-HKM) de Cotonou;*

<sup>2</sup> *Institut Régional de Santé Publique (IRSP) de Ouidah, Université d'Abomey Calavi, Benin*

<sup>3</sup> *Service de Néphrologie; Centre Hospitalier Départemental de Borgou, Parakou.*

**Introduction :** La fistule artério-veineuse est la voie d'abord préférentielle en hémodialyse. L'utilisation de cathéters veineux centraux doit être réservée à l'urgence ou en cas d'impossibilité de création d'un accès vasculaire.

**But :** Etudier les infections liées au cathéter d'hémodialysé (ILC) chez les patients IRC porteurs de cathéter veineux central (CVC) d'hémodialyse

**Méthodes :** Il s'est agi d'une étude prospective, descriptive et analytique, menée sur une période de 5 mois allant d'août à décembre 2019. Etaient inclus dans l'étude les insuffisants rénaux chroniques hémodialysés suivis au CNHU-HKM de Cotonou et qui dialysent par un CVC. L'ILC est retenue devant une infection locale non bactériémique du cathéter ou bien une bactériémie liée cathéter selon les guidelines IDSA 2009. Les facteurs associés ont été recherchés par régression logistique. Le seuil de significativité  $p = 0,05$ .

**Résultats :** La population d'étude était constituée de 56 patients dont 24 ont développé une ILC soit une prévalence de 42,8% avec un taux de bactériémie liée au cathéter de 45,8%. Le sexe masculin était prédominant (sex ratio=1,24). Les germes les plus retrouvés sont les Cocci gram positif 54,6% suivis des bacilles gram négatif 36,4%.

Les facteurs associés étaient l'âge ( $p=0,04$ ), le diabète ( $p=0,04$ ), le type de cathéter ( $p=0,04$ ), les circonstances de pose ( $p=0,02$ ) et la durée du cathéter ( $p=0,008$ ). Les complications sont survenues dans 28,8% des cas avec un taux de mortalité de 16,7%.

**Conclusion :** La prévalence des ILC est élevée. Le traitement comprend l'ablation du cathéter et l'administration des antibiotiques en fonction du germe responsable. Il importe de renforcer les acquis du personnel sur les règles de bonnes pratiques et de rendre gratuits les cathéters tunnésés qui constituent des moyens pour en réduire la fréquence.

**Mots clés :** Infection liée au cathéter, hémodialyse, facteurs associés.

## EP-CO-40

### INSUFFISANCE RENALE AIGÜE AU CNHU ET AU CHUMEL A COTONOU : ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUE, ETIOLOGIQUE, THERAPEUTIQUE ET PRONOSTIQUE EN 2019

Vigan Jacques<sup>1</sup>, Ahoui Seraphin<sup>2</sup>, Sedjame Bg Christelle<sup>1</sup>, Agboton Bruno Leopold<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *Clinique Universitaire de Néphrologie Hémodialyse du Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert K Maga (CNHU-HKM) de Cotonou;*

<sup>2</sup> *Service de Néphrologie; Centre Hospitalier Départemental de Borgou, Parakou.*

**Introduction :** L'insuffisance rénale aiguë (IRA) est une pathologie fréquente en milieu hospitalier. Le but de ce travail était d'étudier l'IRA au CNHU-HKM et au CHU-MEL.

**Patients et méthodes :** Il s'agit d'une étude transversale descriptive et analytique menée du 1<sup>er</sup> Juin au 30 novembre 2019. Etaient inclus tous les patients âgés de plus de 18 ans, présentant une IRA et ayant donné leur consentement libre et éclairé. Le diagnostic de l'IRA reposait sur une baisse de débit urinaire  $< 0,5\text{mL/kg/heure}$  pendant 6 à 12 heures associée à une élévation de la créatininémie  $\geq 3\text{ mg/L}$  ou à 1,5 à 1,9 fois valeur de base. Les facteurs associés ont été recherchés par régression logistique. Le seuil de significativité  $p = 0,05$ .

**Résultats :** Au total 602 patients étaient inclus. La fréquence de l'IRA était de 11,77%. Les sujets de sexe masculin étaient les plus représentés (52,16%) avec un sex-ratio de 1,1. L'âge moyen était de 51,70±18,30 ans et plus de la moitié des patients (53,30%) avaient un âge supérieur ou égal à 50 ans. Les motifs d'admission les plus fréquents étaient la dyspnée (18,94%) et l'altération de conscience (17,11%). L'oligurie était observée chez 38,37%. Plus de la moitié des patients étaient classés au stade 1 de KDIGO (67,61%). L'insuffisance rénale aiguë organique par nécrose tubulaire aiguë était la plus fréquente. Les étiologies étaient dominées par les infections (33,22%), l'état de choc (22,26%) et l'insuffisance cardiaque (14,29%). Le taux de mortalité était de 28,06% et les facteurs de risque de décès étaient l'altération de l'état de conscience ( $p<0,0001$ ), l'œdème aigu du poumon ( $p=0,0003$ ), l'hyperkaliémie ( $p<0,0001$ ), l'état de choc ( $p<0,0001$ ) et la pneumopathie ( $p<0,0318$ ).

**Conclusion :** L'IRA est fréquente et grave. Il est important d'assurer une prise en charge efficace afin d'éviter les complications qui sont préjudiciables à la vie des patients.

**Mots clés :** Cotonou, IRA, épidémiologie, facteurs pronostiques.

## EP-CO-41

### DELAI DIAGNOSTIQUE DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE ET FACTEURS ASSOCIES DANS LA REGION DU CENTRE AU BURKINA

PK Yanogo<sup>1</sup>, Balima Clarisse<sup>2</sup>, Nicolas Meda<sup>1</sup>

1.Département de Santé Publique, Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé, Université Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

2.CHU Yalgado OUEDRAOGO, Ouagadougou, Burkina Faso

**Introduction :** Le retard diagnostique contribue significativement à l'échec de l'éradication de la tuberculose. Notre objectif est de déterminer le délai diagnostique de la tuberculose pulmonaire et d'en identifier les facteurs associés à son allongement dans la Région du Centre au Burkina en 2018.

**Méthodes :** Une étude transversale analytique a été menée auprès de 384 nouveaux tuberculeux pulmonaires de l'année 2018 dans la Région du Centre au Burkina pour répondre à cet objectif. Les délais diagnostiques « patient », « système » et total ont été estimés et des OR ont été calculés dans une régression logistique pour identifier les facteurs associés aux longs délais diagnostiques « patient » (>30 jours), « système » (>15 jours) et total (> 45 jours).

**Résultats :** La médiane des délais diagnostiques total, « patient » et « système » étaient respectivement de 37, 21 et 7 jours. Être diagnostiqué au Centre de Kossodo [OR=7,10, IC<sub>95%</sub> (2,42 -20,85),  $p=0,03$ ], la fièvre [OR=0,54, IC<sub>95%</sub> 50,32-0,91),  $p=0,02$ ] et consulter la médecine traditionnelle avant la structure de référence [OR=1,88, IC<sub>95%</sub> (1,09 -3,24),  $p=0,02$ ] étaient associés au délai diagnostique « patient ». Être agent de santé [OR=25,43, IC<sub>95%</sub> (1,79 - 359,49),  $p=0,02$ ] ; et l'automédication [OR=2,36, IC<sub>95%</sub> (1,16 -5,22),  $p=0,01$ ] étaient associés à l'allongement du délai diagnostique « système ». Le lieu consulté avant la structure de référence (médecine traditionnelle [OR=1,65, IC<sub>95%</sub> (1,01 -2,70) ; l'automédication [OR=2,46, IC<sub>95%</sub> (1,18 -5,11) ;  $p=0,01$ ] et la sérologie VIH négative [OR=3,30, IC<sub>95%</sub> (1,20 -9,02),  $p=0,01$ ] étaient associés à l'allongement délai diagnostique total.

**Conclusion :** Les facteurs associés à l'allongement des délais dans notre étude sont tous modifiables. La sensibilisation sur les signes de la tuberculose et l'urgence dans un centre de santé doit être redoublée à l'endroit des populations et devrait être faite pour contribuer à réduire ces délais.

**Mots clé :** Délai diagnostique, Tuberculose, facteurs associés.

#### EP-CO-42

### DEVENIR DES PATIENTS HEPATITE B POSITIFS DE LA CAMPAGNE DE DEPISTAGE DE SOS HEPATITE A OUAGADOUGOU, BURKINA FASO, JUIN 2019

PK Yanogo<sup>1</sup>, Estelle Nadine Sanou<sup>2</sup>, Nicolas Meda<sup>1</sup>

*1.Département de Santé Publique, Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé, Université Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso*

*2.CHU Yalgado OUEDRAOGO, Ouagadougou, Burkina Faso*

**Introduction :** La lutte contre l'hépatite B en Afrique nécessite de connaître l'épidémiologie de la maladie en milieu communautaire et surtout d'avoir un suivi des patients. Notre étude a pour objectif de déterminer la prévalence de l'hépatite B et étudier le devenir des patients après dépistage dans le Centre SOS HEPATITE de Ouagadougou en juin 2018.

**Méthodes :** Il s'agissait d'une enquête longitudinale. 787 personnes dépistées ont été incluses et 94 patients hépatite B positifs sensibilisés et suivis pendant 18 mois pour mesurer la prévalence de la maladie au dépistage et décrire leur devenir après dépistage. Des proportions ont été calculées.

**Résultats :** La prévalence de l'hépatite B était de 11,94%. A 6 mois, seuls 2 patients étaient guéris ; seulement 54,02% étaient suivis dont 14,89% sous traitement. A 12 mois, 28,74% des patients suivis avaient arrêté le suivi et 37,93% des patients hépatite B positive n'avaient toujours pas recherché de suivi ; deux patients avaient évolué vers une cirrhose hépatique. A 18 mois, seulement 18,09% des patients avaient bénéficié d'un suivi régulier depuis le dépistage ; et 73,59% des personnes dépistées négatives s'étaient vaccinées. Les raisons d'arrêt ou de non recherche de suivi étaient la contrainte financière et ne pas trouver de nécessité au suivi.

**Conclusion :** La prévalence mesurée dans notre étude maintient le Burkina Faso comme pays à forte endémicité. La couverture vaccinale élevée après la campagne de dépistage était le principal intérêt de la campagne de dépistage dans la prévention l'hépatite B. Cependant la proportion élevée de patients non suivis et les raisons avancées révèlent que malgré la gravité de l'hépatite B, elle demeure négligée. D'où l'importance de politiques de santé fortes pour lever les obstacles liés à absence de suivi afin d'éviter l'évolution vers les complications mais aussi la propagation de la maladie.

**Mots clé :** Hépatite B, Intérêt, dépistage

#### EP-CO-43

### FACTEURS ASSOCIES A LA SUPPRESSION VIRALE CHEZ LES ADOLESCENTS (ADOS) VIVANT AVEC LE VIH AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ZONE D'ABOMEY CALAVI (CHUZ/AC)/ BENIN

E.E. Agbe<sup>1</sup>, \*I. Dossou-Dagba<sup>2</sup>, A. Ibikounle<sup>3</sup>, A. Tossou<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites, les IST et les Epidémies - Cotonou (Bénin), <sup>2</sup>Centre Hospitalier Universitaire de Zone d'Abomey Calavi - Abomey Calavi (Bénin), <sup>3</sup>Programme Santé de Lutte contre le SIDA - Abomey Calavi (Bénin), <sup>4</sup>Zone Sanitaire d'Abomey Calavi - Abomey Calavi (Bénin)

**Introduction :** Il est important de connaître les facteurs associés à la suppression du VIH notamment chez les ados.

**Objectifs :** Identifier les facteurs associés à la suppression virale chez les ados suivis au CHUZ/AC.

**Méthodes :** Etude transversale à visée descriptive et analytique réalisée sur 5 mois, allant du 1<sup>er</sup> mai au 30 septembre 2019. Elle avait porté sur les ados [10–19] ans ayant une durée minimale de Traitement Antirétroviral (TARV) de 6 mois et ayant bénéficié au moins une fois de la Charge Virale (CV). Les données étaient collectées à l'aide d'une fiche d'enquête. La CV était considérée comme supprimée lorsqu'elle est inférieure à 1000 copies/mL.

**Résultats :** Au total, 37 ados étaient recensés. L'âge moyen était  $13,08 \pm 2,38$  ans et la sex-ratio (H/F) à 0,54. La résidence était urbaine chez 32,43% des ados et 8,11% n'étaient pas scolarisés. Aucun antécédent d'Hépatites Virales ni de Tuberculose n'était noté. Au moins une Infection Opportuniste (IO) était diagnostiquée chez 21,62 % des ados. La durée moyenne de TARV était de 55,58 mois. Etaient sous TARV de première ligne 70,27% des ados et le reste en deuxième ligne. Les schémas de TARV les plus fréquemment retrouvés étaient ABC-3TC-EFV (27,03%) et TDF-3TC-DTG (21,62%). Le nombre de CD4 moyen était de 778,12 cellules/ $\mu$ L. Le taux de bonne observance était identique à celui de la suppression virale à 56,76%. Il y avait une association significative entre la suppression virale et 4 facteurs : la résidence urbaine ( $p=0,002$ ), l'absence d'IO ( $p=0,040$ ), un nombre élevé de CD4 ( $p=0,000$ ) et la bonne observance ( $p=0,000$ ).

**Conclusion :** Vivre en milieu urbain était aussi un facteur associé à la suppression virale. Ce qui suggère une attention particulière des professionnels de santé sur les ados résidant en zone rurale.

**Mots clés :** Facteurs associés, CV, Ados.

#### EP-CO-44

#### EVOLUTION DES DECES MATERNELS AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MERE – ENFANT LAGUNE (CHU-MEL) DE 2015 A 2019

AKODJENOU J<sup>1</sup>, ABOUBACAR M<sup>1</sup>, AHOUNOU E<sup>2</sup>, BIAOU COA<sup>3</sup>, ZOUMENOU E<sup>2</sup>

1. Centre Hospitalier et Universitaire - Mère-Enfant Lagune (Cotonou – Bénin)

2. Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cotonou – Bénin)

3. Institut Régional de Santé Publique, (Ouidah – Bénin)

**Introduction :** Dans le monde 830 femmes meurent chaque jour de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. La proportion est de 99% pour les pays en développement dont 84% pour l'Afrique sub-saharienne. Cette étude vise à décrire l'évolution de cette mortalité maternelle au CHU-MEL de Cotonou (Bénin) de 2015 à 2019.

**Patientes et Méthode :** Il s'agissait d'une étude descriptive à collecte de données rétrospectives du 1<sup>er</sup> Janvier 2015 au 31 Août 2019. Les variables sociodémographiques, les variables liées aux antécédents gynéco-obstétricaux et médico-chirurgicaux, les variables cliniques et les variables liées à la conduite tenue ont été étudiées. Elles ont été collectées à partir des dossiers médicaux, registres de décès maternels, d'anesthésie et protocoles opératoires des patientes. Les données ont été saisies et analysées avec les logiciels Epidata 3.1 et STATA 15.

**Résultats :** Le ratio de mortalité maternelle sur 5 ans était de 905 pour 100000 NV. Il est passé de 594 en 2015 pour 1168 en 2019. L'âge des femmes décédées variait de 15 à 44 ans, la moyenne de  $29,09 \pm 7,04$  ans. Il s'agissait de femmes analphabètes ou d'un niveau d'instruction primaire (47,02%), mariées (64,5%) primigestes ou paucigestes dans 47,02% des cas et primipares ou paucipares dans 59,52% des cas. Les principaux antécédents étaient : la

césarienne (22,76%), l'HTA et ses complications (4,18%), la grossesse extra-utérine (1,38%) et le placenta prævia (0,69%). Le principal mode d'admission était la référence (82,78%). Les détresses vitales retrouvées étaient l'Etat de choc hémorragique (68,21%), les détresses respiratoires (37,09%) et les convulsions (15,23%). La prise en charge médicale était faite de l'intubation oro-trachéale (58,94%), de la ventilation mécanique (32,42%) de la transfusion des produits sanguins labiles (23,85%) de l'utilisation des antihypertenseurs (23,84%) des anticonvulsivants (19,21%) et du MCE (93,38%). La chirurgie a été réalisée chez 92 femmes (60,93%) et l'AG + IOT (66,27%) était le type d'anesthésie le plus utilisé.

**Conclusion :** La réduction de la mortalité nécessite une réponse complexe, un engagement du gouvernement sur la prise en charge des Urgences obstétricales et l'Assurance maladie.

**Mots clés :** Evolution, Mortalité Maternelle, CHU-MEL, Bénin

**EP-CO-45****PRURIT APRES RACHIANESTHESIE AVEC MORPHINE COMME ADJUVANT POUR CESARIENNE AU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE LA MERE ET DE L'ENFANT - LAGUNE (CHU-MEL) AU BENIN: INCIDENCE ET GRAVITE**

Akodjenou J<sup>1</sup>, Ahounou E<sup>1</sup>, Edwige Tchinchin-Cadete<sup>2</sup>, Zoumenou E<sup>1</sup>.

1- *Faculté des Sciences de la Santé (Cotonou, Bénin)*

2- *Institut National Médico – Sanitaire (Cotonou, Bénin)*

**Introduction :** La rachianesthésie associant la morphine à la bupivacaïne est une technique anesthésique procurant une analgésie postopératoire efficace de longue durée. Mais elle n'est pas dénuée d'effets secondaires dont le prurit. L'objectif de cette étude est d'estimer l'incidence et la gravité du prurit chez les femmes qui ont subi la césarienne sous rachianesthésie avec morphine comme adjuvant.

**Patientes et Méthode :** Il s'agissait d'une étude descriptive et analytique qui s'était déroulée au CHU-MEL et couvrant la période du 09 septembre au 10 octobre 2019. Etaient incluses les parturientes de statut ASA1 et ASA2 proposées pour une césarienne sous rachianesthésie chez qui la morphine est utilisée comme adjuvant à la bupivacaïne. La variable qualitative était le prurit après rachianesthésie et les variables quantitatives étaient le délai de survenue du prurit et le délai de cessation. La collecte des données a été faite à l'aide d'une grille d'observation. Elles ont été saisies et analysées à l'aide du logiciel Epi info et version 7. Le seuil de significativité était de 5%.

**Résultats :** Au total 122 sur 127 femmes opérées pour césarienne sous rachianesthésie avec la morphine 100µg utilisée comme adjuvant à la bupivacaïne sont retenues dans notre étude. L'âge moyen était de  $28,4 \pm 6,1$ ans. Les statuts ASA1 (61%) et ASA2 (39%) étaient les seuls représentés. Le prurit était survenu chez les femmes dans (60,66%) des cas et était plus représenté dans la tranche d'âge de 21 à 35 ans (85,14%). Les parturientes de la classe ASA2 avaient plus développé le prurit (64,58%) que les ASA1 (58,11%) sans différence significative entre les classes ( $p=0,474$ ). Les femmes qui avaient d'antécédents de la césarienne avaient plus développé le prurit (63,64%) en comparaison aux femmes n'ayant pas d'antécédents à la césarienne sans différence statistiquement significative ( $p=0,541$ ). Le prurit était dans 72,31% des cas associés à une césarienne réalisée en urgence et 27,69% pour anesthésie programmée sans différence significative entre les modalités d'intervention ( $p=0,933$ ) et 87,84% des patientes ont présenté le prurit dans les 12 premières heures après la rachianesthésie. Il y a cessation de prurit chez 100% après les 24h.

**Conclusion :** La rachianesthésie qui est une technique alliant anesthésie et analgésie post opératoire, induit le prurit. Ce dernier survient dans les 12 premières heures post-opératoires chez les patientes jeunes ASA2 qui sont opérés en situation d'urgence.

**Mots clés :** Rachianesthésie, Morphine, prurit, CHU-MEL, Bénin

**EP-CO-46****PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES AU SURPOIDS CHEZ LES FEMMES DU MARCHE DANTOKPA AU BENIN EN 2018**

Mama Cisse I<sup>1</sup>, Alassani A<sup>1</sup>, Dovonou Ac<sup>1</sup>, Gounongbe F<sup>1</sup>, Gandaho P<sup>1</sup>

1-*Département de Médecine et Spécialités Médicales, Faculté de Médecine, Université de Parakou, Bénin*

**Introduction :** Les maladies cardio-vasculaires (MCV) représentent la première cause de mortalité dans le monde. Le surpoids et l'obésité figurent parmi les facteurs favorisant les MCV. La présente étude a pour objectif d'étudier la prévalence et les facteurs associés au surpoids chez les femmes du marché Dantokpa.

**Méthode d'étude :** Il s'agit d'une enquête transversale à visée descriptive et analytique chez les femmes vendeuses du marché Dantokpa. La variable dépendante est le surpoids. L'analyse des données a été faite par le logiciel Epi data 3.1

**Résultats :** Au total, 268 femmes ont été incluses dans l'étude. La moyenne d'âge était 40,6 ans  $\pm$  12,13. La prévalence du surpoids chez les femmes vendeuses du marché Dantokpa qui est de **75,29%** ; les facteurs associés au surpoids chez les femmes du marché Dantokpa sont en analyse multivariée sont: l'âge de plus de 40 ans, femmes mariées, la non satisfaction du poids, le désir de perte de poids et tour de taille élevé.

**Conclusion :** Au Bénin, on retrouve le surpoids chez bon nombres de femmes de toute situation sociale, économique et d'âge. Les femmes vendeuses du marché Dantokpa n'en font pas exception. Il est important donc pour lutter contre ce fléau d'éradiquer les facteurs associés.

**Mots clés :** Surpoids, marché Dantokpa, Bénin

#### EP-CO-47

#### L'INACTIVITE PHYSIQUE CHEZ LE PERSONNEL SOIGNANT EN SERVICE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DEPARTEMENT DU BORGOU EN 2017

Mama Cisse I<sup>1</sup>, Alassani A<sup>1</sup>, Dovonou Ac<sup>1</sup>, Gounongbe F<sup>1</sup>, Gandaho P<sup>1</sup>

*1-Département de Médecine et Spécialités Médicales, Faculté de Médecine, Université de Parakou, Bénin*

**Introduction :** L'inactivité physique est associée à l'augmentation de la prévalence de la mortalité des maladies notamment cardiovasculaires et à l'accroissement du fardeau des maladies non transmissibles dans les pays en développement. L'objectif de cette étude était d'étudier la prévalence et les facteurs associés à l'inactivité physique chez le personnel de santé du CHUD/B en 2017.

**Méthodologie :** L'étude était transversale descriptive et analytique et les sujets ont été sélectionnés parmi le personnel de santé du CHUD/B de façon exhaustive. L'inactivité physique a été appréciée pour une activité d'intensité modérée de durée d'au moins 30 minutes par jour et au moins 5 jours par semaine. L'analyse des données a été faite par le logiciel Epi Data 3.1

**Résultats :** L'étude incluait 125 sujets dont 64 hommes. La fréquence de l'inactivité physique était de 26,4 % (IC95%= [18,9-35,0]). L'inactivité physique était associée au fait d'être sage-femme, d'avoir un travail posté, de se rendre au service à moto ou à voiture, de s'asseoir souvent au service et le manque d'envie.

**Conclusion :** La prévalence de l'inactivité physique chez le personnel de santé du CHUD/B est élevée. Des actions doivent être menées pour réduire cette prévalence et les conséquences associées.

**Mots clés :** Inactivité physique, personnel de santé, Parakou

**EP-CO-48****DETERMINANTS DU RETARD A LA CONSULTATION CHEZ LES SUJETS ADULTES ATTEINTS DU PALUDISME A BEMBEREKE EN 2019**

Alassani A<sup>1</sup>, Mama Cisse I<sup>1</sup>, Dovonou Ac<sup>1</sup>, Gounongbe F<sup>1</sup>, Gandaho P<sup>1</sup>

*1-Département de Médecine et Spécialités Médicales, Faculté de Médecine, Université de Parakou, Bénin*

**Introduction :** Le paludisme est une des principales causes de morbi-mortalité au Bénin. Parmi les facteurs favorisant le décès figure le retard à la prise en charge. La présente étude a pour objectif de déterminer la fréquence du retard à la consultation ainsi que les facteurs associés.

**Méthode d'étude :** Il s'agit d'une étude transversale à visée descriptive et analytique dans la population de Bembèrèkè. Le retard à la consultation a été défini pour un recours aux soins de plus de 24 h après le début des symptômes. L'analyse et le traitement des données étaient faites par les logiciels Epi data 3.1 et Epi info 3.5. Une p-value inférieure à 5% avait été considérée comme significative.

**Résultats :** Au total, 178 adultes étaient recrutés dans cette étude parmi lesquels 93 (52,2%) étaient de sexe masculin soit un sexe ratio de 1,09. L'âge moyen des sujets enquêtés était de  $21 \pm 6,49$  ans. Le retard à la consultation était observé chez 128 patients soit une fréquence de 71,9%. Les motifs du retard à la consultation étaient l'automédication et le manque de moyens financiers respectivement chez 70,3% et 29,7% des patients. L'absence de moyens de déplacement, l'absence d'hospitalisation antérieure et le paludisme grave étaient les facteurs associés au retard à la consultation.

**Conclusion :** Les sujets souffrant de paludisme à Bembèrèkè ont un recours tardif à la consultation pour la plupart. Pour y remédier, il est important de sensibiliser la population à l'abandon de l'automédication.

**Mots clés :** Paludisme, Retard à la consultation

**EP-CO-49****DETERMINANTS DU DEPISTAGE VOLONTAIRE DE L'INFECTION VIH CHEZ LES GESTANTES SUIVIES A PARAKOU EN 2019**

Alassani A<sup>1</sup>, Mama Cisse I<sup>1</sup>, Dovonou Ac<sup>1</sup>, Gounongbe F<sup>1</sup>, Gandaho P<sup>1</sup>

*1-Département de Médecine et Spécialités Médicales, Faculté de Médecine, Université de Parakou, Bénin*

**Introduction :** La transmission mère-enfant constitue l'un des principaux modes de contamination de l'infection VIH. La présente étude a pour objectif de décrire les obstacles au dépistage volontaire du VIH chez les gestantes à Parakou.

**Méthode d'étude :** Il s'agit d'une étude transversale à visée descriptive chez les gestantes suivies dans les maternités de Parakou. La variable étudiée était le dépistage volontaire de l'infection VIH. L'analyse des données a été faite par les logiciels Epi data 3.1 Epi-info 7 et Stata 11.

**Résultats :** Au total, 422 gestantes ont été incluses dans l'étude. La moyenne d'âge de  $24,20 \pm 5,53$  ans. Parmi les 422 gestantes, 94,78% ont accepté faire le dépistage volontaire du VIH afin de connaître son statut (49%), se traiter (22,5%) et protéger de l'enfant (17,5%). Parmi celles qui avaient refusé le dépistage volontaire, les raisons principales évoquées étaient l'éviction des soucis (45,4%) et l'absence de signes (27,3%)

**Conclusion :** La prévalence de l'infection VIH chez les gestantes suivies à Parakou est faible. Des obstacles entravent le dépistage volontaire et le partage du statut sérologique avec le conjoint.

**Mots clés :** Dépistage volontaire, VIH, Gestantes

#### EP-CO-50

##### USAGE PROBLEMATIQUE DU TRAMADOL CHEZ LES ADOLESCENTS EN MILIEU SCOLAIRE AU BENIN.

Assad Bio Sya<sup>1</sup>, Henri Joël Gandjo<sup>1</sup>, Elvyre T. E. Klikpo<sup>4</sup>, Odile Kouglou<sup>2</sup>, Arnaud C. Agbanlinsou<sup>3</sup>, Adrien N. Noudjiegbe<sup>1</sup>, Adolphe C. Kpatchavi<sup>2</sup>, Anatole Laleye<sup>3</sup>, Aurel C. Allabi<sup>1</sup>  
*1-Laboratoire National des Stupéfiants et de Toxicologie (LNST), Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (CBRSI)/Université d'Abomey-Calavi, Bénin.*

*2-Laboratoire d'Anthropologie Médicale Appliquée (LAMA)/ Université d'Abomey-Calavi, Bénin*

*3-Laboratoire d'Histologie, Biologie de la reproduction, Cytogénétique et Génétique Médical (LHBRGCM)/ Université d'Abomey-Calavi, Bénin.*

*4-Centre National Hospitalier Universitaire de Psychiatrie (FSS-UAC) ; Bénin.*

**Contexte :** Le tramadol est un opioïde synthétique régulièrement détourné de son usage thérapeutique. Au Bénin, ce type d'usage est très peu décrit. Ainsi, l'objectif de cette étude était de déterminer la prévalence et les facteurs associés à la consommation du tramadol chez les adolescents en milieu scolaire au Bénin.

**Méthodes :** Il s'agit d'une étude transversale descriptive et analytique, réalisée dans les établissements secondaires publics et privés de Cotonou. Elle a concerné 384 élèves de 10 à 24 ans. Le questionnaire OMS-ASSIST V3.0 a été utilisé pour le dépistage et l'évaluation de la consommation problématique du tramadol. Le dépistage urinaire a été réalisé grâce aux kits de détection NarcoCheck® et les facteurs de risques associés à la consommation du tramadol ont été recherchés par la régression logistique multiple.

**Résultats :** Sur les 384 élèves ; 9,6% (n=37) avaient consommé du tramadol au cours de la vie. La consommation au cours des trois derniers mois était de 5,20 %. Le dépistage urinaire s'était révélé positif chez 1,04 % des élèves. Les facteurs de risque de l'utilisation du tramadol étaient le sexe masculin (p=0,01), le niveau de classe (p=0,04) et le tabagisme (P<0,001). Parmi les utilisateurs de tramadol, 45,95% avaient des problèmes liés à leur consommation mais aucun cas de dépendance n'a été retrouvé.

**Conclusion :** La consommation du tramadol est une réalité chez les élèves au Bénin. Cette consommation était significativement associée au sexe masculin, au niveau des classes et au tabagisme. Les programmes scolaires devraient intégrer des modules sur l'usage de substances psychoactives afin de sensibiliser les élèves sur les risques liés à leur consommation.

**Mots clés :** Tramadol, addiction, épidémiologie

#### EP-CO-51

##### SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA MENINGITE AU BENIN DE 2016 A AOUT 2020

D'almeida Cameilia<sup>1</sup>, Salifou Sourakatou<sup>2</sup>, Mariam Oke Sopoh<sup>3</sup>, Marianne Kouawo<sup>1</sup>, Ghislain E. Sopoh<sup>4</sup>

*1 Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé, Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso*

2 Direction de la surveillance épidémiologique et du suivi évaluation, Agence nationale des soins de santé primaires, Ministère de la santé, Bénin

3 Direction nationale de la santé publique, Ministère de la santé, Bénin

4 Institut régional de santé publique Comlan Alfred Quenum, Université d'Abomey Calavi, Bénin

**Introduction :** La méningite constitue un problème de santé publique majeur dans la ceinture africaine, dont fait partie le Bénin, du fait de son potentiel épidémique. L'objectif de ce travail est d'analyser le profil épidémiologique de cette affection au Bénin.

**Méthode :** Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive des cas de méningites enregistrés dans la base de données nationale de 2016 à 2020. Des mesures de fréquence, des paramètres de position centrale et de dispersion ont été calculés en fonction du type de variables, pour les cas confirmés.

**Résultats :** Durant cette période, 615 cas (14,27%) étaient confirmés sur 4308 notifiés. La létalité était de 12%. Le sexe masculin représentait 60% des cas pour 39,84% de féminin, soit un sex-ratio de 1,53. Les enfants de moins de 1 an représentaient 36,75% des cas, suivis des 1-5 ans (27,32%). L'âge médian (Q1, Q3) était de 2 (0, 10) ans. Le département du Borgou est le plus touché avec 70,24% de cas notifiés. Le plus grand nombre de cas a été notifié en 2020 (25,36%). Les Cocci (gram positif et négatifs) représentaient 77% des germes identifiés. Les bactéries en cause sont les suivants : *Streptococcus Pneumoniae* (59,51%), *Neisseria Meningitidis* (34,36%) et *Haemophilus Influenzae* (6,13%). Les différents sérogroupes de *Neisseria Meningitidis* identifiés étaient les suivants : A (1,23%), C (12,27%), W135 (17,79%), X (3,07%).

**Conclusion :** La méningite présente au Bénin un faciès polymorphe qui ne rend pas aisée son contrôle. On remarque une faible proportion des méningites dues au séro groupe A, probablement en lien avec la campagne MenAfriVac®, mise en œuvre au Bénin depuis 2012. Cependant, la proportion élevée des méningites de la souche W135 doit inquiéter.

**Mots clés :** Epidémiologie, Méningites, Bénin

## EP-CO-52

### CERVICALGIE NON SPECIFIQUE CHEZ LES EMPLOYES DE BUREAU A COTONOU

Alagnide H. Etienne, Dahoueto Wilfried, Niama Natta D. Didier, Hounghedji M. Germain, Anani Yves, Oyambaye Andre, Kpadonou G. Toussaint

*Clinique Universitaire de Médecine Physique et de Réadaptation/ CNHU-HKM (Cotonou- Bénin)*

**Contexte :** Les employés de bureau sont souvent amenés à passer de longs moments de posture assise au travail [1]. Au Bénin, comme dans la plupart des pays sous-développés, l'équipement ergonomique pour amoindrir les contraintes de cette posture n'est généralement pas disponible. Cette catégorie socio-professionnelle pourrait donc être plus exposée à des douleurs de la colonne rachidienne. Objectif : Etudier la cervicalgie chez les employés de bureau à Cotonou.

**Méthodologie :** Il s'est agi d'une étude prospective transversale de type descriptif, conduite sur une période de quatre (4) mois, du 1<sup>er</sup> Mai au 30 Août 2019. Elle a été menée sur 332 employés de bureau consentants de sociétés commerciales, directions, et ministères situés dans la ville de Cotonou en République du Bénin et dont les autorités ont donné un avis favorable de recherche dans leur structure. Les caractéristiques cliniques de la cervicalgie ont été recueillies par interrogatoire, avec l'intensité de la douleur évaluée grâce à l'échelle numérique. Les caractéristiques psychosociales des sujets et l'incapacité liée à la cervicalgie

ont été appréciées respectivement grâce à la version française du questionnaire de Karasek et le Neck Disability Index (NDI).

**Résultats :** L'âge moyen des enquêtés était de  $38,9 \pm 9,31$  ans. Il s'agissait de 178 hommes (53,61%). Le type psycho-social le plus représenté était le job strain ; sujet sous pression (60,84%). La prévalence de la cervicalgie non-spécifique au sein de notre échantillon a été de 73,79% selon le ressenti des patients ; mais en associant l'incapacité induite selon le NDI, elle a été 48,19%. Les femmes étaient les plus touchées (55%). 63,70% des patients présentaient une incapacité. La douleur était d'intensité légère à forte. Elle était aggravée surtout avec la position assise (95,92%) et atténuée surtout avec le repos (71,84%). Les micromassages ont été les principaux traitements faits par ces patients.

**Discussion-Conclusion :** La cervicalgie non-spécifique est fréquente chez les employés de bureau à Cotonou. Ces patients ne bénéficient généralement pas d'une prise en charge adéquate, probablement par manque d'information. Dans tous les cas, un traitement préventif de ces cervicalgies devrait être priorisée.

**Mots-clés :** Cervicalgie non-spécifique, employés de bureau, prévalence, incapacité, Cotonou.

### EP-CO-53

#### ETUDE DES FACTEURS ASSOCIES A LA CERVICALGIE COMMUNE NON SPECIFIQUE CHEZ LES EMPLOYES DE BUREAU A COTONOU.

Alagnide H. Etienne, Dahoueto Wilfried, Niama Natta D. Didier, Assogba Franck, Amanzonwe Renaud, Oyambaye Andre, Kpadonou G. Toussaint

*Clinique Universitaire de Médecine Physique et de Réadaptation/ CNHU-HKM (Cotonou- Bénin)*

**Contexte :** La cervicalgie commune non spécifique est un trouble fréquent chez les employés de bureau. Elle réduit le rendement professionnel des sujets. La connaissance des facteurs associés à une affection est déterminant dans sa prise en charge [1]. Objectif : Rechercher les facteurs associés à la cervicalgie commune non spécifique chez les employés de bureau à Cotonou.

**Méthodologie :** Etude transversale, comparative, menée du 1<sup>er</sup> Mai au 30 Août 2019, sur 332 employés de bureau de sociétés commerciales, directions, et ministères de la ville Cotonou. Ont été définis cervicales, les sujets ayant déclaré avec eu dans les douze derniers mois au moins une crise douloureuse en région cervicale avec un retentissement fonctionnel selon le Neck Disability Index (NDI) : score supérieur à 4. La comparaison des résultats des variables indépendantes des cervicales et des non cervicales a été faite par les tests d'ANOVA et de chi- carré de PEARSON, respectivement pour les variables quantitatives et qualitatives. Le sens de l'association des différents facteurs associés à la cervicalgie ( $p < 0,05$ ) a été recherché par le calcul de l'odd ratio (OR).

**Résultats :** Les principaux facteurs associés étaient l'âge ( $p=0,02$ ), le sexe ( $p<0,001$ ), l'activité sportive ( $p<0,001$ ), le grade au sein de la hiérarchie ( $p<0,001$ ), la durée journalière de travail sur ordinateur et/ou papier ( $p=0,001$ ), le temps passé sur ordinateur et/ou papier avant chaque pause ( $p<0,001$ ), le nombre journalier de pause ( $p=0,02$ ), la durée de chaque pause ( $p<0,001$ ), le type d'ordinateur ( $p<0,001$ ), l'inutilisation d'un porte-document ( $p=0,03$ ), une demande psychologique élevée et une faible latitude décisionnelle ( $p<0,001$ ). L'utilisation d'un porte-document, la pratique régulière d'activité sportive (au moins 3 fois/semaine) et des pauses fréquentes et régulières (plus de 2 pauses par jour) se sont révélés avoir un rôle protecteur contre la survenue de la cervicalgie non-spécifique.

**Discussion- Conclusion :** Les divers facteurs associés à la cervicalgie non-spécifique chez les employés de bureau à Cotonou font ressortir l'importance de l'ergonomie au travail, des conditions psychosociales de travail et la rationalisation de la demande de travail.

**Mots-clés :** Cervicalgie non-spécifique, employés de bureau, facteurs de risque, Cotonou.

#### EP-CO-54

##### **EFFETS DE L'UTILISATION DES MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES ET DE LA PULVERISATION INTRADOMICILIAIRE SUR LA PARASITEMIE PALUSTRE DANS TROIS COMMUNES AU NORD DU BENIN**

Sissinto Savi De Tove Y<sup>23</sup> Hounkpe B<sup>1</sup>, Tokponon F<sup>1</sup>, Adinsi De Souza V<sup>3</sup>, Koukpoliyi A<sup>3</sup>, Wakpo A<sup>3</sup>, Ogouyemi-Hounto A<sup>123</sup>, Massougboji A<sup>23</sup>, Kinde-Gazard D<sup>23</sup>.

*1Programme national de lutte contre le paludisme Ministère de la Santé Cotonou Bénin*

*2Faculté des sciences de la santé 01BP188 Université d'Abomey Calavi Cotonou Bénin,*

*3Laboratoire de Parasitologie-Mycologie CNHU Calavi Bénin.*

**Introduction :** L'intensification de la lutte antipaludique par la mise en œuvre de plusieurs interventions diminue la transmission du paludisme. Au Bénin la présente étude a été initiée pour évaluer l'évolution de la prévalence de l'infestation palustre au cours de la pulvérisation intradomiciliaire (PID) et de l'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticides de longue durée d'action (MILD).

**Méthodes d'étude :** Une étude de cohorte a été conduite dans les communes de Djougou Cobly et Ouaké au nord du Bénin sur une période de 08 mois de Mai à Décembre 2017. Elle a ciblé les enfants de 0 à 59 mois suivis mensuellement sélectionnés au hasard dans les ménages des villages d'étude à l'aide des tests de diagnostic rapide du paludisme, des gouttes épaisses et frottis sanguins.

**Résultats :** Le nombre d'enfants inclus était de 370. La moyenne d'âge des enfants était de 24±14 mois avec une prédominance du sexe masculin. Une réduction du risque d'infestation à *Plasmodium falciparum* chez les enfants a été observée après la PID dans les communes de Djougou Cobly et Ouaké, passant de 40,70 à 32,7 %.

**Conclusion :** La pulvérisation intradomiciliaire et l'utilisation des moustiquaires imprégnées a baissé la prévalence de l'infestation palustre au cours du suivi. Ces résultats encouragent la combinaison de plusieurs moyens pour lutter contre le paludisme.

**Mots-clés :** paludisme, Pulvérisation Intradomiciliaire, parasitémie, moustiquaires imprégnées

#### EP-CO-55

##### **CONNAISSANCES DES ETUDIANTS EN MEDECINE A LA FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE DE COTONOU SUR LA FIEVRE HEMORRAGIQUE A VIRUS LASSA AU BENIN EN 2019**

Mongbo Virginie<sup>1</sup>, Sossa-Jerome Charles<sup>2</sup>, Noudohounsi Mahugnon Maurel<sup>3</sup>, Makoutode Patrick<sup>1</sup>, Saïzonou Jacques<sup>1</sup>, Ouendo Edgard-Marius<sup>1</sup>

*1 : Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRSP-CAQ) de Ouidah, Département Politiques et systèmes de Santé*

*2 : Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRSP-CAQ) de Ouidah, Département Promotion de la Santé*

*3 : Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, Brazzaville*

**Objectif :** Depuis 2014, le Bénin a connu cinq épidémies de Fièvre Hémorragique à Virus Lassa (FHVL), toutes meurtrières autant en communauté qu'en milieu hospitalier. La présente recherche visait à étudier le niveau de connaissance des étudiants en médecine de la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou sur la FHVL.

**Méthodes :** Il s'agissait d'une étude transversale analytique auprès des étudiants en médecine, sélectionnés par échantillonnage stratifié. Les données collectées par questionnaire auto-administré ont été traitées par le logiciel Epi Info version 7.1.4.0 puis analysées dans STATA/SE 11.2. Le niveau de connaissance a été apprécié par des scores, au seuil de 65%, considéré comme limite entre bonne et mauvaise connaissance. La régression logistique multivariée a permis d'identifier les déterminants du niveau de connaissance obtenu.

**Résultats :** Sur 303 étudiants enquêtés, 25,38% avaient une bonne connaissance sur la FHVL. L'épidémiologie de cette zoonose était connue par 30,94%, la démarche diagnostique, par 66,05%, les mesures de contrôle par 28,67% et 10,00% savaient qu'il existait un traitement curatif efficace à base de ribavirine si administré tôt. La formation sur la FHVL comme source d'information était le seul facteur associé au niveau de connaissance OR : 3,96 (IC<sub>95%</sub> : 1,41 ; 11,13).

**Conclusion :** Vu le faible niveau de connaissance des étudiants sur la FHVL, il s'avère nécessaire de mettre davantage l'accent sur les Fièvres Hémorragiques Virales dans les programmes de formation médicale adaptés aux différentes années d'étude.

**Mots clés :** Déterminants, Fièvre Hémorragique à Virus Lassa, Etudiants en médecine, Bénin.

## EP-CO-56

### DETERMINANTS DES DECES MATERNELS AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA MERE ET DE L'ENFANT LAGUNE DE COTONOU AU BENIN

Saizonou Jacques, Savane Yacouba, Makoutode Patrick, Ouendo Edgard-Marius

**Introduction :** La mortalité maternelle demeure un problème majeur de santé publique et de développement en Afrique.

**Objectif :** Etudier les déterminants des décès maternels au Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant – Lagune (CHU-MEL) de Cotonou, au Bénin en 2019.

**Méthodes :** Il s'agissait d'une étude cas-témoins portant sur les mères décédées et vivantes à la maternité du CHU-MEL de Cotonou pendant la période de 2016 à 2018. Le travail a été réalisé à partir des données de 270 cas. Une régression logistique conditionnelle sur un échantillon apparié a permis d'étudier les déterminants liés au décès maternel. Le modèle final a été retenu après une régression logistique « pas à pas descendante ».

**Résultats :** L'âge moyen était de 28,65 ans  $\pm$  6,90 ans chez les cas et de 28,78 ans  $\pm$  6,63 ans chez les témoins. Les causes obstétricales directes ont été dominantes marquées par les hémorragies (41%) (OR= 12,9075; IC<sub>95%</sub>= [4,6640; 35,7217]). Les éclampsies (23%), (OR= 6,3992; IC<sub>95%</sub>= [1,1051; 37,0544]). Les ratios de mortalité maternelle étaient de 773 pour 100 000 NV en 2017 contre 1099 pour 100 000 NV en 2018.

Les dysfonctionnements du système de soins, les erreurs médicales dans le traitement, la surveillance des patientes et l'accessibilité financière des patientes sont les principaux déterminants du décès maternel identifié dans notre étude.

**Conclusion :** Les interventions focalisées sur les déterminants identifiés pour la prise en charge efficace des mères, notamment le système de référence/contre référence et la réactivité dans la prise en charge permettront de résoudre ce phénomène de santé maternels.

**Mots clés :** Déterminants, Décès maternel, Bénin.

### AXE 3: ONE HEALTH

#### OH-CO-01

##### EVALUATION DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI SUR LA RAGE

Philippe Sessou\*, Nestor Denakpo Noudeke, David Salako, Mahunan Gaël Josue Oussou, Bruno Yaovi, Gwladys Komagbe S, Souaïbou Farougou

*Research Unit on Communicable Diseases, Laboratory of Applied Biology Research, Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi, Université Abomey-Calavi, 01 BP 2009, Cotonou, Benin.*

**Introduction :** La rage est une zoonose virale à prévention vaccinale. Dès lors que les symptômes cliniques apparaissent, la rage est mortelle dans pratiquement 100 % des cas. La présente étude a pour objectif d'évaluer les connaissances, attitudes et pratiques des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi sur la rage afin d'explorer les facteurs favorisant la survenue de cette zoonose.

**Méthode :** Pour ce faire, une enquête transversale descriptive a été réalisée auprès de 263 étudiants sélectionnés de façon aléatoire. Les données collectées ont été analysées par le logiciel R et le test de Chi carré a précisé la significativité.

**Résultats :** Sur l'ensemble des enquêtés, 53,2% des étudiants ont affirmé avoir entendu parler de rage canine contre 47,5% pour la rage humaine. Les chiens errants étaient reconnus par 49,0% comme une véritable source d'infection du virus rabique ; les morsures de ces chiens (41,4%) étaient considérées comme mode de contagion de la rage et la vaccination des chiens étaient considérées par 32,7% comme moyen de lutte contre la rage. En cas de morsure, 32,7% préfèrent se rendre à l'hôpital contre 4,6% chez les guérisseurs traditionnels. Pour le sort réservé au chien mordeur, 18,6%, 27,4% et 27,4% préfèrent respectivement les tuer, les amener chez le vétérinaire et ne rien faire. En ce qui concerne le risque lié à la non consultation en cas de morsure, 58,2% évoquaient le risque de faire la rage.

**Conclusion :** La sensibilisation des étudiants sur les sources d'infections, les réservoirs du virus rabique, les modes de contagion, les moyens de lutte contre la rage, les attitudes à adopter en cas de morsure par un chien et les risques de non consultation en cas de morsure sont nécessaires afin de renforcer les connaissances, attitudes et pratiques des étudiants sur la rage.

**Mots clés :** Connaissances, Attitudes, Rage

#### OH-CO-02

##### INFECTIVITY OF CULTURE-ADAPTED *PLASMODIUM FALCIPARUM* FIELD ISOLATES TO *ANOPHELES GAMBIAE*

Adandé A. Medjigbodo<sup>1\*</sup>, Constantin Adoha<sup>1</sup>, Laurette Djossou<sup>1</sup>, Martin J. Donnelly<sup>2</sup>, David Weetman<sup>2</sup> And Luc S. Djogbenou<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>*Laboratory of Infectious Vector-Borne Diseases, Regional Institute of Public Health / University of Abomey-Calavi, BP 384, Ouidah, Benin*

<sup>2</sup>*Department of Vector Biology, Liverpool School of Tropical Medicine, Pembroke Place, Liverpool L3 5QA, UK*

**Background:** To achieve malaria elimination goal, it still paramount to study in depth the biology of its causative agent as occurring in natural populations. However, studies on vaccines and transmission blocking assays using the culture-adapted *P. falciparum* field isolates are lacking. Herein, we explored the ability of the *P.f.* field isolates collected from a symptomatic patient to be maintained in continuous culture until gametocytogenesis and the infectivity of its gametocytes to *Anopheles gambiae* vectors.

**Methodology:** The *P. falciparum* field isolates were adapted in *in vitro* culture as well as the reference laboratory *P. falciparum*, NF54 until gametocytes production. Daily asexual and sexual parasite morphology and density were monitored and compared between the strains. Infectivity of fresh-produced and cryopreserved gametocytes from the field isolates to *An. gambiae* was assessed and compared to that of the NF54 through standard membrane feeding assays.

**Results:** The dynamic of intraerythrocytic developmental cycle of the *P. falciparum* field isolates was similar to that of NF54 (respectively, ranging 0.02–11.53% and 0.035–10.5% parasitaemia throughout twelve days culturing). Further, the culture-adapted *P.f.* field isolates displayed higher infectivity to *An. gambiae* (10–40% prevalence) compared to that of NF54 (5–25% prevalence). Interestingly, the cryopreserved gametocytes from the field isolates were able of infecting *An. gambiae* mosquitoes up to 30% prevalence with an average of 12 oocysts/midgut.

**Conclusion:** Our study reveals the infectivity of fresh and cryopreserved gametocytes from freshly culture-adapted *P. falciparum* field isolates to the major African malaria vectors. These findings might be of great interest for studies on malaria vaccines and antimalarial drugs discovery as well as for transmission blocking experiments.

**Key words:** *Plasmodium falciparum*, field isolates, *Anopheles gambiae*.

### OH-CO-03

#### EFFET DE L'EXPOSITION À LA POLLUTION DE L'AIR AU COURS DE LA GROSSESSE SUR LES MESURES ANTHROPOMÉTRIQUES DU NOUVEAU-NÉ À SÈMÈ-KPODJI AU BENIN

HINSON ANTOINE VIKKEY<sup>1</sup>, AVOKPAHO EURIPIDE<sup>2</sup>, LAWIN HERVE<sup>1</sup>, DANDJI SEVERIN<sup>1</sup>, KPANGON ARSENE<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Unité de Recherche et d'Enseignement en Santé au Travail et Environnement, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey Calavi, Bénin

<sup>2</sup>Institut de Recherche Clinique du Bénin, Abomey Calavi, Bénin

<sup>3</sup>Département de médecine interne, Faculté de Médecine de Parakou, Université de Parakou, Bénin

**Introduction :** La pollution de l'air est un véritable problème de santé publique. Les effets néfastes des polluants de l'air pourraient s'étendre au fœtus en cas de grossesse. L'objectif de la présente étude était d'évaluer les effets de l'exposition personnelle au monoxyde de carbone (CO) et aux particules fines (PM<sub>2.5</sub>) au cours de la grossesse sur les mensurations du nouveau-né.

**Méthode :** Il s'agissait d'une cohorte prospective incluant quatre-vingt-cinq (85) femmes enceintes ayant subi les mesures de monoxyde de carbone et de particules fines à l'aide des enregistreurs individuels EL-USB-CO® et le MICROPEMS®. Des informations concernant les caractéristiques sociodémographiques, les antécédents médicaux et gynéco-obstétricaux, le tabagisme, le type de combustible utilisé, la localisation des cuisines, la distance maison-route principale et la durée de temps passé au bord et dans le trafic d'une route principale ont été

recueillies. L'association entre le niveau de concentration moyenne de CO, des PM<sub>2.5</sub> et les mesures anthropométriques des nouveau-nés a été évaluée à travers une régression linéaire.

**Résultats :** La majorité des femmes enceintes utilisait les combustibles solides (94,1%) et était exposée à la fumée de la combustion des déchets et spirales anti-moustiques (75,3% et 69,4%). La concentration moyenne des particules fines dans l'air ambiant était de  $51,204 \pm 16,499 \mu\text{g}/\text{m}^3$  et celle du monoxyde de carbone de  $4,171 \pm 3,61561 \text{ ppm}$ . Une augmentation unitaire des PM<sub>2.5</sub> et CO était associée à une réduction significative du poids de naissance respectivement de -16,71 [-21,23 ; -10,49] g et de -8,19 [-14,53 ; -3,56] g. Une réduction significative du périmètre thoracique de -0,19 [-0,37 ; -0,01] cm était associée aux particules fines mais pas au CO. La taille et le périmètre crânien n'étaient pas significativement associées à l'exposition aux particules fines ni au CO.

**Conclusion :** L'exposition aux particules fines et au monoxyde de carbone au cours de la grossesse était associée à la réduction des mesures anthropométriques du nouveau-né.

**Mots clés :** Pollution de l'air, Nouveau-né, Poids de naissance

#### OH-CO-04

#### CONTAMINATION METALLIQUE DES PRODUITS HALIEUTIQUES ET MARAÎCHERS ET ANALYSE DE RISQUES TOXICOLOGIQUES A HOUIN LOGBO DANS LA COMMUNE DE LOKOSSA (BENIN)

Armelle Hounkpatin<sup>1,2\*</sup>, Patricia Mintole Hekpazo<sup>1</sup>, Roch Christian Johnson<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable (CIFRED)/ Université d'Abomey-Calavi/Bénin

<sup>2</sup>Laboratoire d'Hygiène, d'Assainissement, de Toxicologie et de Santé Environnementale (HECOTES), du Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable (CIFRED)/ Université d'Abomey-Calavi/Bénin, 01, PO Box 1463, Cotonou, Bénin.

Cette étude vise à évaluer la contamination métallique de l'eau, des produits halieutiques et maraîchers à Houin Logbo au Bénin et les risques toxicologiques qui y sont liés. Des prélèvements d'échantillon d'eau, de sédiments, de poissons (*Oreochromis niloticus*) et de produits maraîchers (*Solanum lycopersicum*) ont été fait sur le site d'étude. Tous les échantillons ont été minéralisés et concernant le dosage du plomb et du cadmium c'est la méthode dithizone et l'arsenic au diéthylthiocarbamate d'argent. Les figures ont été réalisées avec Excel et le logiciel SPSS version 17.0 est utilisé pour l'analyse descriptive des résultats. Les analyses effectuées sur les échantillons révèlent pour la plupart des teneurs en plomb (Pb), cadmium (Cd) et en arsenic (As) dépassant les limites admises. Ces valeurs sont exprimées en mg/Kg pour les poissons, sédiments et les produits maraîchers, et en mg/L pour l'eau. Ainsi on a : eau ( Pb : 0,1032, Cd : 0,046, As : 0), GESAMP : Pb (0,0004), Cd (0,00021), As (0,0001) ; sédiments (Pb : 14,79, Cd : 1,27, As : 0,800), GESAMP : Pb (19), Cd (0,11), As (17) ; *Oreochromis niloticus* (Pb : 0,143, Cd : 0,087, As : 0,466), OMS : Pb (0,2), Cd (0,05), As (0,1) ; *Solanum lycopersicum* (Pb : 0,098, Cd : 0,066, As : 0), OMS : Pb (0,1), Cd (0,05), As (0,1). Ces différents résultats montrent la pollution du lac Toho à Houin Logbo et par ricochet la contamination des produits halieutiques et maraîchers.

La consommation des poissons (*Oreochromis niloticus*) du lac et des produits maraîchers (*Solanum lycopersicum*) expose les populations, notamment les enfants à des risques d'intoxication à l'As et au Cd. Il urge donc de trouver des stratégies adéquates pour faire face à ce problème de santé publique.

**Mots clés** Plomb, Cadmium, Arsenic

**OH-CO-05****AMELIORATION DES CONDITIONS D'HYGIENE ET D'ASSAINISSEMENT DANS LA COMMUNE DE ZE AU BENIN**

Roch Christian Johnson<sup>1</sup>, Armelle Sabine Yelignan Hounkpatin<sup>1,2\*</sup>, Francine Inocentia Johnson<sup>1</sup>, Gratien Boni<sup>1</sup>, Beatriz Gomez<sup>3</sup>, Gabriel Diez<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Université d'Abomey-Calavi, Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable (CIFRED), Laboratoire d'Hygiène, d'Assainissement, de Toxicologie et de Santé Environnementale (HECOTES), 01 BP 1463, Cotonou, Bénin

<sup>2</sup> Université Nationale des Sciences, des Technologies, de l'Ingénierie et des Mathématiques (UNSTIM), Ecole Normale Supérieure de l'Enseignants Technique (ENSET), BP 133 Lokossa, Bénin

<sup>3</sup> Fondation Anesvad, Bilbao Espagne, General Concha, 28 - 1<sup>o</sup> Entrada calle Egaña. 48010 Bilbao

La présente étude vise à apprécier les effets des interventions mises en œuvre de 2017 à 2018 par rapport à la promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans la commune de Zè. Réalisée en septembre 2019, l'étude a mobilisé trois techniques de collecte de données à savoir : la recherche documentaire, l'observation, l'entretien. La collecte a été effectuée dans les localités bénéficiaires des interventions et de celles non bénéficiaires.

Les résultats après interventions ont montré que la proportion des personnes ayant de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement est passée de 31,01% à 73,08%. La proportion des groupements de femmes associés aux activités IEC/WASH est passée de 0% à 87%. Le taux de morbidité liée aux maladies hydro-fécales a régressé de 1,20% à 0,78%. La prévalence des géohelminthiases a diminué de 7,10% à 0,75%. Par ailleurs, l'observation a permis de constater la réduction de la défécation à l'air libre, la réduction de la distance séparant les ménages d'un point d'eau, la diminution de la corvée d'eau pour les femmes et les filles, la réduction de la prévalence des maladies courantes dans les localités bénéficiaires.

Malgré les résultats positifs obtenus, il reste des défis à relever pour pérenniser les acquis et passer à l'échelle supérieure notamment l'implication effective des autorités locales dans le suivi des ouvrages d'hygiène et d'assainissement.

**Mots clés** : Hygiène, assainissement, Zè.

**OH-CO-06****Contribution à l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement en milieu rural dans la commune de Lalo au Benin.**

Roch Christian Johnson<sup>1</sup>, Armelle Sabine Yelignan Hounkpatin<sup>1,2\*</sup>, Zoukifl Salou, Josee Akoko Agossou<sup>1</sup>, Beatriz Gomez<sup>3</sup>, Gabriel Diez<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Université d'Abomey-Calavi, Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable (CIFRED), Laboratoire d'Hygiène, d'Assainissement, de Toxicologie et de Santé Environnementale (HECOTES), 01 BP 1463, Cotonou, Bénin

<sup>2</sup> Université Nationale des Sciences, des Technologies, de l'Ingénierie et des Mathématiques (UNSTIM), Ecole Normale Supérieure de l'Enseignants Technique (ENSET), BP 133 Lokossa, Bénin

<sup>3</sup> Fondation Anesvad, Bilbao Espagne, General Concha, 28 - 1<sup>o</sup> Entrada calle Egaña. 48010

## Bilbao

L'étude vise à apprécier les effets des actions mises en œuvre de 2017 à 2018 par rapport à la promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans la Commune de Lalo. Cette étude s'est déroulée en septembre 2019. Les techniques de collectes de données utilisées sont essentiellement la recherche documentaire, l'observation, l'entretien, l'enquête par questionnaire. Les sites de collectes sont les localités « bénéficiaires » les localités « non bénéficiaires ».

Les résultats après interventions avaient montré que le taux de personnes ayant de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans la commune de Lalo est passé de 35,16% à 74%. Le taux de morbidité liée aux maladies hydro-fécales est passé de 2,5‰ à 1,31‰.

Par ailleurs, la proportion des groupements de femmes associées aux activités IEC/WASH quitte de 0% à 78%. Les principaux effets du projet HA sont entre autres, la réduction de la défécation à l'air libre, la réduction de la distance séparant les ménages à un point d'eau ; la diminution de la corvée d'eau pour les femmes et les filles, la réduction de la prévalence des maladies courantes dans les milieux et l'autonomisation des femmes de groupements dans la fabrication du savon. Malgré les résultats positifs obtenus sur le terrain, il reste des défis à relever pour pérenniser les acquis et passer à l'échelle supérieure notamment l'implication effective des autorités locales dans le suivi des ouvrages WASH.

**Mots clés :** Hygiène, assainissement, Lalo.

## OH-CO-07

### EVALUATION MICROBIOLOGIQUE DE TROIS TECHNIQUES D'HYGIENE DES MAINS EN MILIEU UNIVERSITAIRE AU BENIN EN 2020

Brifelle Tente<sup>1</sup>, Damien Toffa<sup>1</sup>, Rafiatou Ba<sup>1</sup>, Juliana Dahou<sup>1</sup>, Harvey Johnson<sup>1</sup>, Carine Zinsou<sup>1</sup>, Franck Mignanwande<sup>1</sup>, Parfait Djossou<sup>1</sup>, \*Roch Christian Johnson<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Laboratoire d'Hygiène-Assainissement, d'Ecotoxicologie et de Sante Environnementale HECOTES/CIFRED/UAC, 03BP1463Cotonou, Bénin.

**Introduction :** La transmission manu-portée d'agents infectieux est un véritable enjeu de santé publique. L'hygiène des mains est la mesure essentielle préconisée pour prévenir ces infections. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'efficacité de l'hygiène des mains en milieu universitaire au CIFRED en 2020. Pour ce faire, trois types de techniques ont été investiguées : le lavage simple, la friction avec solution hydroalcoolique et le lavage associé à la friction avec un gel hydroalcoolique.

**Méthodes :** Pour chacune des techniques évaluées, 10 échantillons de mains ont été prélevés par écouvillonnage suivant la Norme NF EN ISO 14698-1 (2004) avant et après l'intervention. Le nombre total de prélèvement analysés est de 60. Chaque écouvillon est imprégné dans 5ml de bouillons Mueller Hinton. Les bouillons sont incubés à l'étuve à 37°C pendant 8heures et ont été ensemencés dans la gélose PCA (37°C/24h). Les colonies trouvées après incubation ont fait l'objet d'un examen microscopique après la coloration de Gram. Pour leur identification les différentes colonies ont été soumises aux tests de catalase ou d'oxydase.

**Résultats :** On note la présence de germes sur tous les échantillons de mains avant les interventions. La moyenne de diminution des germes après lavage simple des mains est de 207,04 10<sup>5</sup> UFC/mL (51,03%). Celle après utilisation de la solution hydroalcoolique est de 207,32 10<sup>5</sup> UFC/mL (67,40%). La moyenne après lavage associé à la friction au gel hydroalcoolique est de 1866,70 10<sup>5</sup> UFC/mL (90,96%).

**Conclusion :** Le lavage associé à la friction au gel hydroalcoolique a donné la plus grande moyenne de diminution des germes. L'hygiène des mains reste incontestablement une mesure très efficace pour le contrôle des infections manu-portée.

**Mots clés :** hygiène des mains, gel hydro-alcoolique, infection manu-portée

## OH-CO-08

### SCREENING PHYTOCHIMIQUE, EVALUATION DES ACTIVITES ANTIPLASMODIALE *IN VITRO* ET ANTIRADICALAIRES DE LA TIGE FEUILLEE DE *SENNA ROTUNDIFOLIA* LINN (FABACEAE).

Esseh K.<sup>1,4\*</sup>, Koudouvo K.<sup>1,4</sup>, Bazie V.B.E.J.T<sup>6</sup>, Idoh K.<sup>1,4</sup>, Karou D.S.<sup>2</sup>, Lagnika L<sup>5</sup>. Agbonon A.<sup>1,4</sup>, Kokou K<sup>3</sup>. Simpore J<sup>6</sup>., Gbeassor M<sup>1,4</sup>.

- 1- Laboratoire de Physiologie et Pharmacologie des Substances Naturelles, Faculté des Sciences, Université de Lomé
- 2- École Supérieure des Techniques Biologiques Alimentaires Appliquées, Université de Lomé
- 3- Laboratoire de Botanique et d'Écologie Végétale, Faculté des Sciences, Université de Lomé
- 4- Centre de Recherche et de Formation sur les Plantes Médicinales (CERFOPLAM), Université de Lomé
- 5- Laboratoire de Biochimie et de Microbiologie Appliquée, Université d'Abomey Calavi, Bénin
- 6- Centre de Recherche Biomoléculaire Pietro Annigoni, Université de Ouagadougou.

De nos jours, le traitement du paludisme pose de nombreuses difficultés à cause des problèmes de résistances. Afin de trouver une solution efficace et durable, une évaluation des activités antiplasmodiales, antioxydantes et la composition phytochimique des extraits aqueux et hydro-éthanolique (v/v) de la tige feuillée de *Senna rotundifolia*, une plante antipaludique du Togo sélectionnée à base d'enquêtes ethnobotaniques, a été effectuée.

Le screening phytochimique a été réalisé par la Chromatographie sur Couche Mince. L'activité antiplasmodiale *in vitro* a été réalisée selon la technique le microtest optique de l'OMS sur culture du *Plasmodium falciparum* (souche sauvage) avec la quinine (témoin). Le potentiel antioxydant *in vitro* a été mesuré par le test de réduction du DPPH. La méthode colorimétrique a permis d'évaluer de la concentration en polyphénols des extraits. Les données ont été traitées par le logiciel Graph Pad Prism 5.0, Excel 2007 et Table Curve 2Dv5.

Les alcaloïdes, les tanins, les saponosides et les flavonoïdes sont les différents grands groupes chimiques retrouvés dans les extraits. Les tests antiplasmodiaux ont montré que l'extrait hydro-éthanolique de la tige feuillée de *Senna rotundifolia* a donné en µg/mL une  $CI_{50}=3,26 \pm 0,00$  et l'extrait aqueux a produit une  $CI_{50}=12,77 \pm 0,44$ . La  $CI_{50}$  du témoin est de  $0,45 \pm 0,01$ . Pour les tests antiradicalaires pour la concentration en polyphénols, l'extrait hydro-éthanolique a donné respectivement une  $CI_{50}= 162,62 \pm 0,77$  µg/ml et  $88,74 \pm 3,05$  mg EAG/g d'extrait tandis que l'extrait aqueux a une  $CI_{50}= 406,68 \pm 0,20$  µg/ml et  $66,42 \pm 10,30$  mg EAG/g d'extrait. Le témoin (le Quercétol) a une  $CI_{50}= 2,05 \pm 0,04$  µg/ml.

Il en ressort que, en plus de son activité antalgique connue, *Senna rotundifolia* possède des activités antiplasmodiales justifiant son utilisation en médecine traditionnelle togolaise. Des études approfondies sur ses activités sont projetées pour confirmer son utilisation en soins de santé primaire au Togo.

**Mots clés :** *Senna rotundifolia*, activité antiplasmodiale, *Plasmodium falciparum*, Togo.

**OH-CO-09****INNOCUITE DE L'EXTRAIT ETHANOLIQUE *CRATEVA ADANSONII* DC. (CAPPARIDACEAE)  
RECOLTE A DASSA-ZOUNME AU CENTRE DU BENIN**

Roch Christian Johnson<sup>1</sup>, Zinsou Franck Mignanwande<sup>1</sup>, Armelle Sabine Yelignan Hounkpatin<sup>1,2</sup>, Damien Toffa<sup>1</sup>, Parfait Djossou<sup>1</sup>, Eustache Houeto<sup>1</sup>, Gratien Boni<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Laboratoire d'Hygiène, d'Assainissement, de Toxicologie et de Santé Environnementale (HECOTES), Centre de Formation Interfacultaire et Recherche Environnementale pour le Développement Durable (CIFRED) de l'Université d'Abomey (UAC / Bénin), 01 PO Box 1463 Cotonou, Bénin.

<sup>2</sup> Ecole Normale Supérieure d'Enseignement Technique (ENSET), Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) d'Abomey BP: 133 Lokossa, BENIN

**Problématique :** L'étude des plantes devient, de plus en plus, une science méthodique utilisée par les industries dans divers domaines tels que la phytothérapie, la parfumerie, la cosmétique, l'aromatisation (Labiad et *al.*, 2018). Au nombre de ces plantes figure *Crateva adansonii* qui est utilisée par la population béninoise pour ses vertus thérapeutiques (Agbankpé et *al.*, 2015).

**Objectif :** Evaluer l'innocuité de l'extrait éthanolique de *C. adansonii* utilisée dans la pharmacopée béninoise.

**Méthode :** L'extrait éthanolique est obtenu par évaporation du filtrat sous vide au rotavapor. Les tests de toxicité ont pris en compte le dosage des métaux lourds (Pb, Cd, Hg et As) et les toxicités aiguë et subchronique réalisées selon les directives de l'OCDE respectivement selon les normes 423 et 407 sur des rats femelles de Souche Wistar. Les analyses hématologiques et biochimiques ont été réalisées. Enfin, les organes (foie et rein) ont été prélevés pour des examens histologiques.

**Résultats :** L'étude de la toxicité aiguë a révélé qu'à la dose unique de 5.000 mg/kg pc aucun décès n'a enregistré ni de signe de toxicité pendant les 14 jours. La DL<sub>50</sub> de l'extrait est supérieure à 5.000 mg.kg de pc. Quant à la toxicité subaiguë, elle a révélé que quel que soit la dose d'extrait administrée, aucun signe d'intoxication n'a été observé pendant les 28 jours. Hormis quelques rares dégénérescences vacuolaires tubules, les coupes présentent un aspect histologique hépatique et rénal dans les limites de la normale. Le dosage des ETM a révélé l'absence du Mercure et d'Arsenic mais la présence du Plomb (0.00789 ppm) et du Cadmium (0.00165 ppm).

**Conclusion :** L'étude a révélé que l'extrait de *Crateva adansonii* ne présente aucune toxicité pour la santé humaine mais son usage prolongé occasionne des lésions réversibles sur le foie et les reins.

**Mots clés :** Innocuité, *Crateva adansonii*

**OH-CO-10****ETAT DES LIEUX DES CONDITIONS DE PRODUCTION DES ALIMENTS D'ORIGINE ANIMALE  
VENDUS EN MILIEU SCOLAIRE DANS LE DEPARTEMENT DU MONO AU BENIN**

Eustache C. Hounkpe<sup>1,2\*</sup>, Nicolas Korsak<sup>2\*</sup>, Souaïbou Farougou<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Département de production et santé animale et Unité de recherche sur les maladies transmissibles, Ecole polytechnique d'Abomey-Calavi, Université d'Abomey-Calavi, 01BP2009 Cotonou, République du Bénin.

<sup>2</sup> *Département sciences des Denrées Alimentaires, Laboratoire d'Analyse des Denrées Alimentaires, Faculté de Médecine vétérinaire, FARAH-Veterinary Public Health, Université de Liège, bât. B43bis, 10 Avenue de Cureghem, Sart-Tilman, B-4000 Liège, Belgique.*

Les aliments d'origine animale constituent de véritables sources de protéines pour l'alimentation humaine. Ils sont aussi sujets à des contaminations microbiennes. Vu que les enfants sont des personnes à risque et dans le but d'évaluer la qualité microbiologique des aliments d'origine animale vendus aux écoliers des écoles publiques à cantine ou sans cantine du département de mono au sud de la république du Bénin, une enquête a été réalisée auprès des vendeuses ou productrices d'aliments de ces écoles. L'objectif visé par l'enquête est de faire l'état des lieux des aliments d'origine animale vendus aux écoliers, les sources d'approvisionnement et les conditions d'hygiène dans lesquelles ils sont produits. C'est dans cet ordre d'idées que des interviews ont été réalisés auprès de 137 écoles publiques comme privées à l'aide d'un questionnaire créé sur la plateforme de collecte en ligne appelée Epicollect5. Une tablette a été utilisée à cet effet. Il ressort de l'étude que la majorité des acteurs impliqués dans la production et la vente d'aliments aux écoliers sont des femmes (100 %). Les vendeuses sont non scolarisées (39,39 %), scolarisées avec un niveau primaire (57,58 %) ou de niveau secondaire (3,03 %). Pour ce qui est des aliments d'origine animale vendus nous avons noté trois types dont le poisson (100 %), l'œuf (65,23 %) et la saucisse (45,52 %). Les vendeuses ont déclaré qu'elles achètent les aliments aux marchés (100 %). De façon globale les productrices d'aliments ne respectent pas les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication dans les cuisines. Pour cela une formation doit être organisée à leur profit pour les sensibiliser sur les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication à respecter dans les cuisines afin de garantir un aliment sûr aux écoliers.

**Mots clés :** Aliments, Microbiologie, Ecole primaire, Toxi-infections alimentaires, Hygiène.

## OH-CO-11

### INFECTIONS DU SITE OPERATOIRE ET EMERGENCE DE CARBAPENEMASES

Carine Laurence Yehouenou<sup>1,2,3</sup>, Dissou Affolabi<sup>2,3,4</sup>, Olivia Dalleur<sup>5,6</sup>, And Anne Simon<sup>7,8</sup>.

<sup>1</sup>*Clinical Pharmacy Research Group (CLIP), Louvain Drug Research Institute (LDRI), Université catholique de Louvain UCLouvain, Brussels, Belgium.*

<sup>2</sup>*Laboratoire de Référence des Mycobactéries (LRM), Cotonou, Benin.*

<sup>3</sup>*Faculté des Sciences de la Santé (FSS), Université d'Abomey Calavi (UAC), Cotonou,.*

<sup>4</sup>*Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM)*

<sup>5</sup>*Clinical Pharmacy Research Group (CLIP), Louvain Drug Research Institute (LDRI), Université catholique de Louvain UCLouvain, Brussels, Belgium.*

<sup>6</sup>*Pharmacy, Clinique universitaire Saint-Luc, Université catholique de Louvain, UCLouvain, Brussels, Belgium.*

<sup>7</sup>*Microbiologie, Cliniques universitaires Saint-Luc, Université catholique de Louvain, UCLouvain, Brussels, Belgium.*

<sup>8</sup>*Pole de microbiologie, Institut de Recherche Expérimentale et Clinique (IREC), Université catholique de Louvain UCLouvain, Brussels, Belgium.*

**INTRODUCTION :** La résistance aux antibiotiques demeure un problème majeur de santé publique particulièrement dans les pays en voie de développement (PVD) où l'utilisation des antibiotiques est souvent abusive et très peu contrôlée. La présente étude a pour but de déterminer la fréquence des carbapénémases dans les infections post opératoires.

**Méthode :** Nous avons réalisé une étude prospective dans six hôpitaux publics et dans deux services distincts : la chirurgie viscérale et la maternité, entre Janvier 2019 et Janvier 2020. Pendant ce temps, les prélèvements de pus ont été réalisés chez tous les patients suspects et analysés dans le laboratoire de bactériologie du CNHU. L'état frais, la coloration de Gram et les milieux de culture adéquats ont été utilisés pour l'identification des souches. L'antibiogramme a été réalisé selon la méthode de Kirby-Bauer et lu selon les recommandations de l'EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing).

**Résultats :** Durant les 12 mois de collecte, nous avons recueilli 304 échantillons parmi lesquels 174 étaient positifs. Sur ces derniers, 229 souches bactériennes ont été isolées. Plus des 2/3 étaient constituées par des bactéries Gram négative (n=180, 78.6%) particulièrement les entérobactéries (n=119). Les bactéries Gram positive étaient constituées essentiellement de *Staphylococcus aureus* (n=49, 21.4%). Parmi les BGN nous avons isolé respectivement 5/62 (8.1%) *Escherichia coli*, 3/21 (14.3%) *Enterobacter cloacae*, 3/38 (7.9%) *Pseudomonas aeruginosa* and 1/20 (5%) *Acinetobacter baumannii* sécrétant des carbapénémases. Toutes ses souches étaient résistantes aux aminopénicillines et carbapénèmes avec une résistance associée aux quinolones, aminosides et au sulfaméthoxazole-triméthoprim. Seule l'amikacine était sensible. Malheureusement cet antibiotique existe une fois sur deux dans nos pharmacies.

**Conclusion :** L'émergence de carbapénémases complique grandement la prise en charge des patients hospitalisés.

**Mots-Clés :** Carbapénémases, chirurgie, Bénin.

## OH-CO-12

### INVENTAIRE DES TIQUES DURES PARASITANT LA FAUNE SAUVAGE AU SUD-BENIN : CAS DES COMMUNES DE KPOMASSE, DE TORI-BOSSITO, D'ABOMEY CALAVI, DE ZE ET D'ALLADA

Roland Eric Yessinou<sup>1</sup>, Camus Adoligbe<sup>1</sup>, Emeran Hounga<sup>1</sup>, Justin Adinci<sup>1</sup>, Souaïbou Farougou<sup>1</sup>  
Unité de recherche sur les maladies transmissibles (URMAT), Université d'Abomey-Calavi

**Introduction :** La conservation des animaux dans les parcs zoologiques se répandent dans différents lieux et constituent l'interface entre la faune-tique et l'homme. La faune joue le rôle de réservoir de certaines pathologies à importance économique et sanitaire dont celles transmises par les tiques. L'objectif de cette étude est d'inventorier les espèces de tiques qui parasitent la faune au Sud-Benin.

**Méthodes :** L'étude a été menée du 14 avril au 3 juillet 2020 dans le parc naturel communautaire de la vallée du vitatunga à zinvié et dans les points de rassemblement et de vente des animaux sauvages des communes de Kpomassè, de Tori-Bossito, de Zè et d'Allada. Les tiques ont été prélevées manuellement à l'aide d'une pince à tique et conservées dans des flacons contenant d'éthanol 70% puis l'identification a été faite avec élaborée par Walker

**Résultat :** Au total 353 tiques ont été collectées sur 67 animaux de différentes espèces : l'Aulacode, l'Ecureuil, le Hérisson, le Python royal, la Perdrix, la Couleuvre et le Rat de Gambie. Ainsi, cinq espèces de tiques ont été identifiées à savoir : *Ixodes aulacodi*, *Rhipicephalus simpsoni*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma variegatum* et *Amblyomma latum*. Les tiques *Ixodes aulacodi* sont en forte proportion chez l'aulacode (86,89%), l'écureuil (69,69%) et le rat de Gambie (43,75%). La tique *Amblyomma variegatum* a été identifiée uniquement chez le hérisson tandis que *Amblyomma latum* a été identifiée uniquement chez la couleuvre et le python royal.

**Conclusion :** La faune sauvage est donc un facteur de risque important qui ne doit pas être négligé dans les stratégies de surveillance épidémiologique et de lutte contre les tiques. Ainsi, il est important d'impliquer dans les programmes de protection des réserves faunistiques le contrôle des tiques en particulier et une gestion sanitaire de la faune en général.

**Mots clés :** Tiques, animaux sauvages, identification.

### OH-CO-13

#### **ESTIMATION DE L'EXPOSITION AU PLOMB DES CONSOMMATEURS DE WAGASHI GASSIRE DU SUD DU BENIN**

Dossou Alphonse<sup>1,2\*</sup>, Madode Yann<sup>1</sup>, Douny Caroline<sup>2</sup>, Scippo Marie Louise<sup>2</sup>, Azokpota Paulin<sup>1</sup>, Clinquart Antoine<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Laboratoire de Sciences des Aliments, Faculté des Sciences Agronomiques, Université d'Abomey-Calavi

<sup>2</sup>Laboratoire d'Analyse des Denrées Alimentaires, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Liège

La plupart des marchés béninois sont des espaces où les produits alimentaires, souvent non emballés, sont exposés à l'air ambiant. Dans de tels environnements, les gaz d'échappement ainsi que les poussières constituent des sources de contamination en plomb des denrées alimentaires. Ce travail vise à prédire le niveau d'exposition au Plomb des adultes béninois à travers la consommation du Wagashi Gassirè (WG) vendus au sud du Bénin. A cet effet, un échantillon de 9 Wagashi Gassirè rouges (WGR) et 6 Wagashi Gassirè blancs (WGB) ont été collectés sur trois marchés d'Abomey-Calavi. Le Plomb a été dosé par ICP-MS. Le modèle déterministe a été utilisé pour prédire le niveau d'exposition pour une consommation moyenne du WG. Les résultats ont révélé la présence de Plomb dans tous les échantillons avec des valeurs moyennes de 0,06 mg/kg et 0,129 mg/kg respectivement pour les WGR et les WGB. Pour un adulte de 60 kg de poids corporel, l'exposition est de 0,20 µg/kg.p.c/jour et 0,43 µg/kg.p.c/jour pour une consommation journalière de 200 g de WGR et WGB respectivement. Ainsi les marges d'exposition s'établissent à 7,5 (WGR) et 3,4 (WGB) pour les effets cardiovasculaires et 3,15 (WGR) et 1,46 (WGB) pour les effets néphrotoxiques du Plomb chez l'adulte. Ces données indiquent une absence de risque. Mais ils doivent être élargis à l'ensemble des sources alimentaires de Plomb afin que des mesures soient prises pour réduire sa présence dans la chaîne alimentaire.

**Mots clés :** Plomb, Wagashi Gassirè, évaluation de risque

### OH-CO-14

#### **FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET COMPORTEMENTS ASSOCIES A L'INFECTION A MYCOBACTERIUM ULCERANS DANS LA COMMUNE DE LALO AU BENIN : UNE ETUDE CAS-TEMOINS**

Anagonou Gimatal Esaï\*<sup>1,7</sup>, Biaou Chabi Alphonse<sup>1,5</sup>, Wadagni Anita Carolle<sup>1,5</sup>, Barogui Yves Thierry<sup>2,7</sup>, Gnimavo Setondji Ronald<sup>4,5</sup>, Ayelo Adjimon Gilbert<sup>3</sup>, Saka Kora Eric<sup>1</sup>, Houezo Jean Gabin<sup>1</sup>, Sopoh Ghislain Emmanuel<sup>5</sup>, Johnson Roch Christian<sup>6,7</sup>

<sup>1</sup> Programme National de Lutte contre la Lèpre et l'Ulcère de Buruli, Cotonou, Bénin

<sup>2</sup> Centre de Dépistage et de Traitement de l'Ulcère de Buruli de Lalo, Bénin

<sup>3</sup> Centre de Dépistage et de Traitement de l'Ulcère de Buruli d'Allada, Bénin

<sup>4</sup> Centre de Dépistage et de Traitement de la Lèpre et de l'Ulcère de Buruli « Raoul et Madeleine Follereau » de Pobè, Bénin

5 Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin

6 Fondation Raoul Follereau

7 Centre Inter-Facultaire de Recherche en Environnement pour le Développement Durable, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

**Introduction :** Le mode de transmission de l'ulcère de Buruli (UB) n'est pas encore connu, malgré la multiplicité des études réalisées à ce jour. Cette étude vise à déterminer les facteurs associés à la maladie dans la commune de Lalo au Bénin.

**Méthode :** Il s'agit d'une étude cas-témoins qui a pris en compte de façon exhaustive les cas confirmés d'UB dépistés de 2013 à 2018 et retrouvés dans la commune de Lalo. Les témoins sont définis comme des personnes du même âge (+/- 5 ans) et sexe ne présentant aucun signe ou symptôme d'UB. Les données sociodémographiques, environnementales et comportementales ont été collectées. Une régression logistique conditionnelle a été utilisée pour déterminer, sur la base des odds ratio ajustés (OR) et leur intervalle de confiance à 95% (IC95%), les facteurs de risque associés à la maladie.

**Résultats :** L'étude a inclus 59 cas d'UB et 118 témoins. Parmi les cas, 27 (45,76%) étaient des hommes. L'âge médian (Q1 ; Q3) des cas était de 12 ans (6 ; 28). Les facteurs associés à l'UB sont l'analphabétisme (OR = 18,19 ; IC95% = 1,50-219,45), la méconnaissance des facteurs de risque de l'UB (OR = 48,21 ; IC95 % = 4,67-497,15), la baignade dans les rivières ou étangs (OR = 23,66 ; IC95% = 2,82-198,52), la pratique d'activités champêtres dans le boue (OR = 60,58 ; IC95% = 7,44 – 493,09) et le non port de vêtements protecteurs pendant les activités champêtres (OR = 42,78 ; IC95% = 2,05 – 892,33).

**Conclusion :** Dans un contexte où le mode de transmission de l'UB n'est pas connu, il est important de concevoir les stratégies de prévention contextualisées pour une gestion efficiente des ressources.

**Mots clés :** Ulcère de Buruli, Facteur de risque, Lalo.

## OH-CO-15

### ETUDE DE LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DES EAUX DES GROUPEMENTS DE FEMMES DE OUINHI AU BENIN EN 2019

Solange Assogba<sup>1\*</sup>, Damien Toffa<sup>1</sup>, Carine Zinsou<sup>1</sup>, Gratien Boni<sup>1</sup>, Deodad Lissassi<sup>1</sup>, Wilfrid Donhouede<sup>1</sup>, Justine Wouinsou<sup>1</sup>, Roch Christian Johnson<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Laboratoire d'Hygiène, d'Assainissement, d'Ecotoxicologie et de Santé Environnementale HECOTES/ CIFRED/UAC

Le droit à l'eau potable est au cœur du droit de chaque individu d'accéder à la santé. C'est aussi une condition fondamentale à l'avènement d'une société plus sûre et plus saine [2]. L'objectif de ce travail, est d'étudier la qualité microbiologique des eaux de consommation des groupements de femmes de Ouinhi au Bénin en 2019. Pour ce faire, des prélèvements d'eau de rivière, forage, pluie et puits ont été faits à la source, au cours du transport et au stockage.

Pour cette étude, cent vingt-deux (122) échantillons d'eau ont été prélevés dans des flacons stériles de 500 ml par échantillonnage aléatoire. Les techniques de filtration sur membrane et d'ensemencement sur surface ont été utilisées. Cinq (05) germes ont été recherchés: les *coliformes totaux* identifiés sur le milieu de culture Chromogenic E-coli, incubés à 37°C pendant 24h. Les *coliformes fécaux* et *Escherichia-coli*, sur le milieu de culture Chromogenic E-coli, à 44°C pendant 24h. Les *Entérocoques fécaux* et *Staphylocoques* respectivement sur le

milieu de culture Slanetz, à 37° pendant 48h et sur le milieu de culture Chapman à 37° pendant 24h.

On note une forte contamination de l'eau quel que soit sa nature au cours du transport et au stockage qu'à la source. Parmi les cinq germes identifiés dans les 122 échantillons, seuls les *Escherichia-coli* représentent 0UFC/100 ml soit 0% de germe.

La qualité de ces eaux est affectée par les facteurs comportementaux même si à la source certaines sont déjà de nature polluée.

**Mots clés :** Qualité microbiologique de l'eau, commune de Ouinhi, Bénin.

## OH-CO-16

### OBSERVATION DES GESTES BARRIERES PREVENTIFS DE LA COVID-19 DANS LES ZONES SANITAIRES DE L'ATLANTIQUE AU BENIN : DE LA NECESSITE DE L'EVEIL PSYCHOLOGIQUE DUS A L'EMOUSSEMENT MOTIVATIONNEL MULTIFACTORIEL DE LA POPULATION

Avocè Codjo Jaures

*Doctorant à l'Ecole Doctorale Pluridisciplinaire « Espaces, Cultures et Développement » de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC)*

La définition de « Santé mentale » de l'OMS (2002) a été mélangée, rechignée depuis l'avènement de la nouvelle maladie à coronavirus 2019 (Covid-19). Il est évident que l'Afrique de l'Ouest ne fait pas partie des régions du globe, les mieux préparées pour lui faire face. D'ailleurs, les estimations de l'OMS au début de l'épidémie, n'étaient pas de bonnes augures pour le continent. Ainsi le Bénin, avec son système de santé primitif, peu équipé, fragilisé a également fait les frais.

A près de 1.000.000 de morts dans le monde entier et malgré les mesures prises par le gouvernement béninois avec ces 40 morts (14/09/2020), nombreux sont ces citoyens béninois qui baissent les bras dans l'observance effective de ces gestes barrières.

L'objectif général est d'identifier les facteurs favorisant cette baisse de garde de la population du département de l'atlantique dans cette crise sanitaire mondiale, qui n'a visiblement encore montré toutes ces faces.

La démarche méthodologique est mixte et portant sur 150 sujets enquêtés dans les communes identifiées. La technique d'échantillonnage est aléatoire et par commodité.

Les données de cette recherche nous amènent à identifier des facteurs personnels (52,67 %), médicaux (62,67 %), socioéconomiques (71,33 %), informationnels/technologiques (78,67 %), spirituels (58,67 %), organisationnels/infrastructuraux (54 %) et institutionnels/juridiques (45,33 %). S'appuyant sur tous ces facteurs, trois (03) phases ont été identifiées : la *phase de crise*, la *phase post-traumatique* et la *phase de réintégration sociale*.

Il est essentiel de conclure que pour une prise en charge efficace et globale de nos populations, la psychoéducation et l'éveil psychologique doivent être nécessairement intégrés au profit aussi bien du patient lui-même, de son environnement et de tout le milieu social. Ceci leur permettra de ne plus s'en tenir aux préjugés sur la maladie, mais d'encourager les actes importants à poser afin d'éloigner la dite pandémie.

**Mots-clés :** Gestes barrières – Covid-19 – Eveils psychologiques.

**OH-CO-17****STATUT HYDRIQUE DES JOUEURS DE HANDIBASKET APRES UN MATCH INTERNATIONAL EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE**

O. D. Aze<sup>1,2</sup>, K. Affoyon<sup>1</sup>, R. Sitou<sup>1</sup>, D. Ouedraogo<sup>1</sup>, J Ahounou Aikpe<sup>1</sup>, J. Teba<sup>1</sup>, B. Akplogan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Unité de Recherche : Déficiences, Activités Physiques Adaptées et Réhabilitation (DAPAR), Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique et du Sport/Université d'Abomey-Calavi (INJEPS/UAC)*

<sup>2</sup> *Université de Lyon, UJM-Saint-Etienne, LIBM, EA 7424, F-42023, SAINT-ETIENNE, France*

**Introduction :** Le handibasket est de plus en plus répandu dans le contexte africain et en Afrique subsaharienne en particulier. Il s'agissait d'évaluer le statut hydrique des joueurs de handibasket suite à un match international par la variation de la densité urinaire et la couleur de l'urine en climat subsaharien.

**Méthodes :** Cette étude transversale s'était déroulée au Bénin lors du Camp de Basketball "Enfants du Bénin Debout". 23 joueurs (32 ans  $\pm$  7,5 ; 22,3 kg/m<sup>2</sup>  $\pm$  4,1) des équipes nationales du Bénin et du Togo ont été inclus.

**Résultats :** Ils jouaient depuis 7,7 ans  $\pm$  4,6 et avaient des fauteuils qui pèsent 12,5 kg  $\pm$  1,8. Les urines recueillies ont été analysées grâce à des bandelettes urinaires (avant, à la fin et 24 heures après le match). La température ambiante était en moyenne de 29,1°C  $\pm$  0,1. Il a été observé une différence significative entre les valeurs de la densité urinaire avant et à la fin match (1,021  $\pm$  0,005 versus 1,025  $\pm$  0,003 p=0,002) et entre la fin du match et 24h après (1,025  $\pm$  0,003 versus 1,022  $\pm$  0,003 p=0,016). Les couleurs d'urine suite aux trois recueils d'urine étaient incolore (16,7% 0% et 8,3%), jaune claire (75%, 100% et 83,3%), jaune sombre (8,3% 0% et 8,3%).

**Conclusion :** Les joueurs étaient déshydratés avant, à la fin et 24h après le match. La quantité d'eau bue (0,5L  $\pm$  0,4) durant le match et après n'a pu compenser cette perte hydrique. L'adoption d'une hygiène de vie qui priorise la consommation régulière d'eau serait un atout en vue d'améliorer leurs performances.

**Mots clés :** Handibasket, hydratation, Afrique subsaharienne

**OH-CO-18****APPROCHE INTEGREE DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES NEGLIGÉES A MANIFESTATIONS CUTANÉES AU BENIN : RESULTATS ET IMPACT INDIRECT**

Yves T. Barogui<sup>1</sup>, Ghislain E. Sopoh<sup>2</sup>, Esai Anagonou<sup>3</sup>, Jean Gabin Houezo<sup>3</sup>, Gilbert Ayelo<sup>4</sup>, Ronald Gnimavo<sup>5</sup>, Gabriel Diez<sup>6</sup>, Beatriz Gomez<sup>6</sup>, Asiedu Kingsley<sup>7</sup>, Roch C. Johnson<sup>8</sup>

<sup>1</sup>*Centre de Dépistage et de Traitement de l'Ulcère de Buruli de Lalo, Ministère de la Santé, Bénin.* <sup>2</sup>*Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey Calavi, Ouidah, Bénin.*

<sup>3</sup>*Programme National de Lutte contre la Lèpre et l'Ulcère de Buruli, Ministère de la Santé, Bénin.* <sup>4</sup>*Centre de dépistage et de Traitement de l'Ulcère de Buruli d'Allada, Ministère de la Santé, Bénin* <sup>5</sup>*Centre de dépistage et de Traitement de l'Ulcère de Buruli de Pobè, Ministère de la Santé, Bénin* <sup>6</sup>*Projects Department, Fondation Anesvad, Bilbao, Espagne.*

<sup>7</sup>*Department of Neglected Tropical Diseases, World Health Organization, Geneva, Switzerland.*

<sup>8</sup>*Centre Inter Facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable, Université d'Abomey Calavi, Abomey Calavi, Bénin.*

**Introduction :** La co-endémicité des maladies tropicales négligées (MTN) et la nécessité d'optimiser les ressources ont nécessité la mise en œuvre au Bénin d'une approche de lutte intégrée dont nous partageons ici les résultats.

**Méthodes :** Il s'agit d'une étude transversale conduite entre Octobre 2017 et Août 2019 dans les communes au moins endémiques d'une MTN au Bénin. Les interventions portent sur les sensibilisations, les soins des plaies, l'eau, hygiène et assainissement, et les consultations foraines. Une équipe pluridisciplinaire (incluant Dermatologue, Médecin, Infirmier, Technicien de Labo, Kinésithérapeute et des animateurs communautaires) formée a visité les villages et les écoles des communes ciblées. Tout participant volontaire ayant une lésion cutanée a été examiné. Les cas suspects ont été confirmés au laboratoire au besoin. Les données sociodémographiques et cliniques ont été collectées à l'aide d'un formulaire. L'analyse a été faite avec le logiciel SPSS version 22.00.

**Résultats :** Au total, 14414 participants ont été examinés. L'âge médian (Q1 ; Q3) était de 15 (6; 36) ans. Ont été enregistrés, 274 (1,9%) cas suspects d'ulcère de Buruli dont 160 (1,1%) confirmés par PCR ; 7351 (51%) cas suspects de pian, dont 11 confirmés ; 94 cas (0,7%) confirmés de lèpre, 94 (0,7%) cas confirmés de schistosomiasis urinaires et 386 (2,7%) cas de gale. Les autres affections cutanées (13565) étaient majoritairement des infections fongiques, eczémas et lésions traumatiques.

Nous avons en outre constaté une réduction allant respectivement de 6,35% à 25% des cas de géohelminthiase et maladies diarrhéiques, ainsi qu'une amélioration des pratiques d'hygiène dans certaines localités.

**Conclusion :** Les impacts directs et indirects notés confirment l'efficacité de cette approche. Sa pérennisation nécessite la formation des agents de santé sur les MTN cutanées et la dermatologie élémentaire ainsi qu'un engagement de l'Etat.

**Mots Clés :** Lutte intégrée ; Maladies Tropicales Négligées ; Bénin

## OH-CO-19

### LONGITUDINAL PATTERNS OF LIFESTYLE BEHAVIOURS IN ADOLESCENCE: A LATENT TRANSITION ANALYSIS

Mohamed Dakin<sup>1</sup>; Florian Manneville<sup>1</sup>; Johanne Langlois<sup>2</sup>; Karine Legrand<sup>1,3</sup>; Edith Lecomte<sup>2</sup>; Serge Briançon<sup>1</sup>; Abdou Y. Omorou<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup> University of Lorraine, EA 4360 Apemac, Nancy, F-54000, France.

<sup>2</sup> National Conservatory of Arts and Crafts (CNAM), Nancy, France.

<sup>3</sup> Inserm, CHRU Nancy, University of Lorraine, CIC-1433 Clinical epidemiology, Nancy, F-54000, France.

**Introduction:** Interdependence between dietary behaviors (DB), physical activity (PA) and sedentary behaviors (SB), suggests simultaneous consideration to identify homogeneous profiles and describe their changes. This study aimed to 1) identify cross-sectional nutritional behaviors profiles and their 2-year longitudinal transition among French school-aged adolescents, 2) identify factors associated with these profiles and transitions.

**Methods:** Longitudinal data of adolescents who participated in the PRALIMAP (PRomotion de l'ALIMENTation et de l'Activité Physique) trial were used. PA and SB were assessed using the International Physical Activity Questionnaire and DB using a food frequency questionnaire. Profiles at baseline and their transitions were identified using Latent Transition Analysis. Multinomial logistic regression models were performed to identify factors associated to profiles and transitions.

**Results:** Among 2390 adolescents included (14-18 years), five baseline nutritional behaviors profiles were identified: “healthy (9.4%)”, “Binge eater (22.9%)”, “Inactive (29.8%)”, “Restrictive (21.2%)” and “Unhealthy (16.7%)”. Young adolescents particularly girls, overweight or obese and socially advantaged were more likely to be “Inactive”. Profiles were mainly stable (72.6%) over time, with some favorable (8.0%), unfavorable (4.8%), mixed (14.6%) transitions and boys were more likely to have “Unfavorable transitions” than “No transition”.

**Conclusion:** DB, PA, and SB were combined in five profiles. More research is needed to assess factors associated with nutritional behaviors profiles transitions among adolescents. This will allow for more targeted interventions of public health, to achieve long-lasting, favorable behavior change in adolescent populations.

**Keywords:** Dietary behavior, Physical activity, Sedentary behavior, Adolescents, Latent transition analysis.

## OH-CO-20

### LA TRISOMIE 21 : LOGIQUES ET PRATIQUES DE PRISE EN CHARGE D'UNE MALADIE CONGÉNITALE A COTONOU.

Sedami Lydie Edith Defodji, Roch A. Hounghinin  
*Laboratoire d'Anthropologie Médicale Appliquée*

**Introduction :** La trisomie 21 est une malformation congénitale qui affecte nombre de familles mais peu étudiée en sciences sociales. C'est ce qui nous amène à nous intéresser à la prise en charge de la trisomie 21 à Cotonou. Ce travail vise à analyser les modalités de la construction sociale de la trisomie 21 et de sa prise en charge à Cotonou.

**Méthodes :** La recherche s'est déroulée à Cotonou d'avril à novembre 2020. Par choix raisonné et par la technique d'itinéraire, 27 personnes de groupes socioculturels variés ont été interviewées au moyen d'entretiens semi-structurés.

**Résultats :** A Cotonou, la présence d'un enfant trisomique dans une famille suscite plusieurs interprétations. En effet, les personnes porteuses de trisomie 21 sont assimilées au « vodun » et sont appelées « Toxosu » qui signifie littéralement "roi des eaux". L'anomalie n'est pas en elle-même une maladie selon les acteurs et ne se rapporte à aucune nosologie populaire. Toutefois, le registre étiologique populaire l'inscrit dans une dimension surnaturelle. L'enfant trisomique dans une famille est une source de bénédiction aux conséquences présumées (procure le bien être à une famille modèle ou rétablit l'ordre social brisé par la transgression des règles sociales) ou source de malédiction faisant appel à une sanction spirituelle. Ainsi, la prise en charge de la trisomie 21 est multiforme et fait appels à plusieurs acteurs. Dans le domaine endogène, les rituels sont faits pour purifier ou favoriser l'essor de la famille. L'itinéraire thérapeutique est d'abord basé sur les savoirs endogènes. Toutefois, la suite des événements conduit souvent à une modification de l'itinéraire au profit de recours aux soins biomédicaux et aux prières de guérison.

**Conclusion :** Les logiques et les pratiques sociales de prise en charge de la trisomie 21 à Cotonou sont tributaires des perceptions sociales construites autour des sujets porteurs. On constate des attitudes d'abstinence thérapeutique, de résignation et de stigmatisation.

**Mots-clés :** trisomie 21, représentations sociales, Cotonou.

**OH-CO-21****DIAGNOSTIC MOLECULAIRE DE LA TUBERCULOSE BOVINE A L'INSPECTION POST MORTEM**

Camus. Adoligbe<sup>1</sup>, Ange R. Zocancounon<sup>1</sup>, Herbert Dedehouanou<sup>2</sup>, Souaibou Farougou<sup>1</sup>

*1-Unite recherche sur les maladies transmissibles, Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi  
Université d'Abomey-Calavi*

*2-Laboratoire de référence des Mycobactéries de Cotonou*

La tuberculose bovine est encore une zoonose majeure dans les pays en voie de développement et sa transmission des animaux à l'homme et vice et versa constitue un problème de santé publique.

Cette étude a pour objectif de détecter la tuberculose sur des carcasses de bovins inspectées aux abattoirs de Cotonou en utilisant une technique moléculaire récente et précise (GenXpert® MTB/RIF).

Un total de 40 lésions suspectées d'être tuberculeuses ont été prélevées sur des organes, des ganglions ou des tissus provenant de carcasses inspectées. 95% des lésions suspectées étaient nodulaires et provenaient des poumons (80%), des ganglions retropharyngiens(1%), du foie(0.75%), des ganglions pré scapulaires, de l'œsophage et des muscles masséters(0,025%). Au total 65% des lésions se sont révélées positives au test du GenXpert® avec un cas indéterminé de résistance à la rifampicine. 14 % des lésions négatives au GenXpert® se sont révélées positives à la microscopie et 86% des lésions négatives au GenXpert® le sont aussi à la Microscopie.

Il s'avère donc que le diagnostic lésionnel de la tuberculose bovine dans les abattoirs cibles est précis à plus de 50%. Cependant certaines lésions sont faussement attribuées à la tuberculose et relèveraient d'autres bactéries non tuberculeuses ou d'autres germes induisant des lésions similaires à celle de la tuberculose.

Pour une meilleure surveillance épidémiologique de la tuberculose zoonose il serait mieux d'associer au diagnostic lésionnel le diagnostic moléculaire.

**Mots clés :** One health, Tuberculose, Contrôle

**OH-CO-22****FACTEURS DE RISQUE ET CONNAISSANCES DE LA RAGE CANINE DANS LE DEPARTEMENT DE L'OUEME AU BENIN DE 2016 A 2019**

Allanonto Victor<sup>1</sup>, YANOGO Pauline<sup>2</sup>, AKPO Yao<sup>3</sup>, NOUDEKE Nestor<sup>4</sup>

*Médecin Vétérinaire, Chef Division Surveillance Epidémiologique, Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche du Bénin, étudiant du Programme de Formation en Epidémiologie d'Intervention du Burkina (BFELTP) cohorte 2018-2020*

- 1- Médecin épidémiologiste, Coordinatrice du Programme de Formation en Epidémiologie et Laboratoire du Terrain du Burkina Faso, Email : bfeltpcohorte4@bfeltp.com, Tel : 00226 70 70 93 79
- 2- , Médecin vétérinaire, Directeur de l'Elevage (Bénin), Email : yao.akpo@gmail.com , Tel : 00229 97 55 81 24
- 3- Médecin vétérinaire, épidémiologiste, chercheur associé à l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), Email : noudnest@yahoo.fr, Tel : 00229 97 88 90 30

**Introduction :** Au Bénin, les données épidémiologiques sur la rage dans nos grandes villes sont très peu disponibles. De plus, l'impact des campagnes de sensibilisation reste difficilement quantifiable. Ainsi, cette étude vise à apprécier le niveau de connaissances des propriétaires

d'animaux et les facteurs de risque de la rage canine dans l'Ouémé, sur la période de 2016 à 2019.

**Méthodes :** Une étude transversale rétrospective a été menée sur les données de surveillance de la rage canine de 2016 à 2019 dans le département de l'Ouémé, suivie d'une enquête transversale du 01 février au 30 mars 2020 pour apprécier le niveau de connaissances des propriétaires d'animaux. Egalement, dans les cabinets et cliniques vétérinaires, les fiches de mise en observation et les registres des cas de morsures d'animaux ont été consultées. Les proportions et mesures de tendance centrale ont été calculées à l'aide du logiciel Epi info 7. Le test de  $\chi^2$  a été utilisé pour comparer les proportions. Les facteurs associés à la rage ont été recherchés en calculant les Odds ratios.

**Résultats :** 370 animaux mordeurs dont 362 chiens ont été enregistrés. La proportion des animaux mordeurs vaccinés est de 33,2% avec une prévalence estimée de 8,4%. L'odds ratio ajusté chez les animaux non vaccinés a été de 3,91, IC<sub>95</sub>= [1,0577-9,48]. 94,4% des propriétaires d'animaux enquêtés avaient entendu parler de la rage et environ 60% avaient procédé à la vaccination. Les signes cliniques comme l'agressivité (58%) et l'aboïement (51,2%) étaient plus connus de la population. La morsure (83,2%) par les chiens et chats non vaccinés, a été le principal mécanisme de transmission de la rage.

**Conclusion :** Les propriétaires de chiens dans l'Ouémé connaissent la rage. Cependant, la non vaccination des chiens constitue le principal facteur de risque. Alors, un plan stratégique de vaccination des chiens est nécessaire pour le contrôle de cette zoonose.

**Mots clés :** Rage, Bénin, Epidémiologie

## OH-CO-23

### PREVALENCE DE LA BRUCELLOSE BOVINE DANS LA COMMUNE DE DJOUGOU, NORD-BENIN.

Soha S. Arnaud<sup>1</sup>, Akabassi Baudelaire<sup>1</sup>, Ohouko O. Frejus<sup>1</sup>, Adouko S. Jacques<sup>1</sup>, Guedegbe O. Ganiou<sup>1</sup>, Dougnon T. Jacques<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>*Unité de Recherche en Microbiologie Appliquée et Pharmacologie des Substances Naturelles, Laboratoire de Recherche en Biologie Appliquée, Université d'Abomey-Calavi*

La brucellose bovine est une maladie qui affecte dangereusement la production du bétail avec des impacts négatifs sur la santé de l'animal, la santé publique et le commerce international. La brucellose est une maladie zoonotique qui peut se transmettre rapidement des animaux aux humains. Cette étude a visé à déterminer la prévalence de la brucellose dans la commune de Djougou dans le Nord-Bénin suite aux nombreuses plaintes et alertes des éleveurs de bétail face à des cas récurrents d'avortements et d'apparition d'hygroma dans leurs troupeaux.

Afin d'établir la prévalence, quatre millilitres de sang ont été collectés dans des tubes sec chez 37 taureaux et 176 vaches provenant de 29 élevages répartis sur trois villages (Partago, Onclou, et Sérrou) dans la commune de Djougou. Les sérums obtenus après centrifugation ont été alors testés pour la détection des anticorps anti-*Brucella* en utilisant le Rose Bengale et le Test à l'Antigène Tamponné.

A l'issue des différents tests, la prévalence cumulée de la brucellose bovine dans les trois villages a été de 19,25% avec des prévalences de 8,11% et 21,59%, respectivement chez les mâles et les femelles. Ces résultats démontrent que les vaches sont beaucoup plus vulnérables que les taureaux face à la brucellose.

La forte prévalence de la brucellose bovine obtenue dans les élevages bovins requiert la prise de mesures urgentes et appropriées pour un meilleur contrôle de la maladie au Bénin et dans la sous-région.

**Mots-clés :** Prévalence, Brucellose, Nord-Bénin.

**OH-CO-24****EVALUATION DES PREVALENCES, DES FACTEURS DE RISQUES ET LA CARACTERISATION DES ENTEROBACTERIES MULTIRESISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES ISOLEES CHEZ L'HOMME, L'ANIMAL ET DE L'ENVIRONNEMENT AU BURKINA FASO**

Sore S.<sup>1,2,3</sup>, Beogo S.<sup>1</sup>, Bationo B.G.<sup>3</sup>, Ky H.<sup>3</sup>, Madingar D.P.<sup>3</sup>, Ilboudo K.S.<sup>1</sup>, Ouedraogo A.S.<sup>2</sup>, Sanou I.<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Centre hospitalier universitaire de Tengandogo, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>2</sup>Université Saint Thomas d'Aquin, Ecole doctorale des sciences, santé et Technologies

<sup>3</sup>Direction des laboratoires de biologie médicale, ministère de la santé, Burkina Faso

**Introduction :** Les entérobactéries multirésistantes aux antibiotiques posent de sérieux problèmes de prise en charge des infections chez l'homme et l'animal. Le but de notre étude était de déterminer les prévalences du portage des entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (E-BLSE) chez l'homme, l'animal et l'environnement, d'étudier les co-résistances et d'en analyser les facteurs de risques de portage.

**Matériel et méthodes :** Une étude transversale prospective a été menée auprès de patients et de volontaires sains. Après leur consentement éclairé, des écouvillonnages rectaux ont été réalisés. Ensuite des prélèvements cloacaux ont été effectués chez des volailles et enfin des prélèvements des eaux usées et de salades. Tous ces prélèvements ont permis d'isoler les entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 3<sup>e</sup> génération (C3G) sur (hektoen+4µg/L de céfotaxime). Les entérobactéries isolées ont été ensuite identifiées par la galerie API 20E puis confirmées par un test de synergie combinant trois disques de C3G et amoxicilline+acide clavulanique. Ensuite les co-résistances ont été détectées en testant la sensibilité des souches par la méthode de diffusion des disques selon EUCAST. Enfin une analyse multivariée a été réalisée pour détecter les facteurs de risques.

**Résultats :** Au total 906 échantillons ont été inclus (189 échantillons rectaux, 293 eaux usées et salades, 414 cloacaux) qui ont permis d'isoler 319 E-BLSE soit une prévalence de 54,49% chez l'homme, 53,92% dans l'environnement et 11,11% des volailles. Les E-BLSE isolées étaient majoritairement *Escherichia coli* suivi de *Klebsiella pneumoniae*. Elles avaient une résistance associée aux fluoroquinolones 84,21%, au cotrimoxazole 89,47%, aux aminosides et à la tétracycline. Le sexe, l'âge, la prise antérieure d'antibiotiques n'étaient pas associés au portage des E-BLSE chez l'homme (p=0,51).

**Conclusion :** Cette étude d'entérobactéries multirésistantes rapporte des prévalences élevées. Il y a une urgence à mettre en application l'approche one health pour une meilleure surveillance de la diffusion de ces souches multirésistantes.

**Mots-clés :** E-BLSE, homme, animal, environnement

**OH-CO-25****PORTAGE ASYMPTOMATIQUE DE PLUSIEURS BACTERIES MULTIRESISTANTES CHEZ DES VOLONTAIRES SAINS ET DES PATIENTS A OUAGADOUGOU, BURKINA FASO**

Sore S.<sup>1,2</sup>, Sanou S.<sup>3</sup>, Beogo S.<sup>1</sup>, Dakouo N.P.<sup>3</sup>, Djamalladine M.D.<sup>4</sup>, Ilboudo K.S.<sup>1</sup>, Zoungrana J.<sup>3</sup>, Poda A.<sup>3</sup>, Ouedraogo A.S.<sup>2</sup>, Sanou I.<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Centre hospitalier universitaire de Tengandogo, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>2</sup>Université Saint Thomas d'Aquin, Ecole doctorale des sciences, santé et Technologies

<sup>3</sup>Centre hospitalier universitaire Sourou Sanou, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

<sup>4</sup>Institut national supérieur des sciences et technique d'Abéché, Abéché, Tchad

**Introduction :** Les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu (E-BLSE) et *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline (SARM) posent des problèmes de prise en charge des infections. Le but de notre étude était de déterminer la prévalence du portage de plusieurs BMR, étudier les résistances associées et d'en analyser les facteurs associés.

**Matériel et méthodes :** Une étude transversale a été menée auprès des patients et des volontaires. Des écouvillonnages rectaux et nasaux ont été réalisés qui ont permis d'isoler et identifier les E-BLSE et des SARM. Les entérobactéries suspectées ont été confirmées par un test de synergie. Quant à la confirmation des SARM, elle a été faite en utilisant la céfoxitine (30µg). Enfin un antibiogramme a été réalisé en testant la sensibilité des souches par la méthode de diffusion des disques selon EUCAST.

**Résultats :** Au total 378 échantillons ont été inclus (189 échantillons rectaux et 189 nasaux). 115 E-BLSE ont été isolées chez 103 et 10 SARM. L'étude a révélé 10,05% de portages de plusieurs bactéries multi résistantes soit 15,91% chez les patients hospitalisés contre 4,95% chez les volontaires sains. Cette différence était statistiquement significative ( $p=0,02$ ). Le portage de deux entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (2 E-BLSE) était de 6,35%, tandis que celui d'une entérobactérie productrice de bêta-lactamases à spectre étendu et de *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline (E-BLSE +SARM) était de 3,17%, celle de 3 bactéries multirésistantes (2E-BLSE + SARM) était 1,14%.

**Conclusion :** Cette étude de portage des BMR rapporte des résultats d'E-BLSE et de SARM inquiétants. Il y a une urgence à surveiller la diffusion de ces souches multirésistantes.

**Mots-clés :** Portage, SARM, E-BLSE

## AXE 4 : COMMUNICATIONS LIBRES

### CL-CO-01

#### EFFETS COMBINES DU DECOCTE DE «*CYMBOPOGON CITRATUS*» ET DES EXERCICES PHYSIQUES SUR LES PARAMETRES ANTHROPOMETRIQUES ET HEMODYNAMIQUES DES FEMMES OBESES AU CAMEROUN

J. F. Ahounou Aïkpe<sup>2,3</sup>; A. Hamadou <sup>1,2</sup>; W. R Guessogo<sup>1</sup>l.; Bonoy<sup>1</sup>; B. Gnansounou<sup>2</sup>; J. D. Gbenou<sup>3</sup> Et H. P. Dansou<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Laboratory of Biology Physical Activity, National Institute of Youth and Sports (NIYS), Yaoundé, Cameroon

<sup>2</sup>Research Unit in Exercise Physiology (URPEF), University of Abomey Calavi, Porto-Novo, Bénin

<sup>3</sup>Laboratory of Pharmacognosy and Essential Oils (LAPHE), Faculty of Health Sciences, Faculty of Sciences and Techniques, University of Abomey Calavi, Cotonou, Benin

**Introduction :** L'obésité est un problème de santé publique, touchant une grande proportion d'individus dans le monde. La présente étude se propose d'évaluer les effets combinés de la pratique des exercices physiques et la consommation du décocté de *Cymbopogon citratus* sur quelques paramètres anthropométriques et hémodynamiques des femmes obèses.

**Méthode :** Quarante (40) femmes obèses randomisées en 04 groupes ont pris part à l'expérimentation. Le groupe G1 est soumis aux exercices physiques et à la consommation du décocté; le groupe G2 a consommé uniquement le décocté; le groupe G3 est soumis uniquement aux exercices physiques et le groupe G4 est le groupe témoin. Des paramètres anthropométriques et hémodynamiques ont été mesurés à J<sub>0</sub>, J<sub>30</sub> et J<sub>60</sub>.

**Résultats :** Dans G1, le poids, l'Indice de Masse Corporelle, l'indice de graisse et le tour de taille ont baissé de manière significative ( $p < 0,001$  et  $p < 0,01$ ). La masse grasse, le tour de

hanche, la pression artérielle et la fréquence cardiaque de repos ont connu aussi une diminution significative ( $p < 0,05$ ). Au niveau de G2 et G3, les modifications n'ont pas été significatives.

**Conclusion :** La combinaison du décocté de *Cymbopogon citratus* et la pratique des exercices physiques a été plus bénéfique dans le traitement de l'obésité.

**Mots clés:** Obésité, Exercices, *Cymbopogon citratus*

**CL-CO-02****EVALUATION DES ACTIVITES ANTI-INFLAMMATOIRE ET CICATRISANTE DES EXTRAITS AQUEUX DE *VIGNA COMOSA* BAKER ET DE *ZEa MAYS* L. CHEZ LES RATS WISTAR.**

Kotin Mahoutin Lucrèce<sup>1, 2</sup>, Ahounou Aïkpe Fifamin Judith<sup>1</sup>, Akakpo Baï Huguette<sup>1</sup>, Assogba Mahoudo Fidèle<sup>2</sup>, Godonou Jean-Benoît<sup>1</sup> Gbenou Djimon Joachim<sup>2</sup>, Dansou Houndjovi Pierre<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Unité de Recherche en Physiologie de l'Effort de l'Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique et du Sport (Université Abomey-Calavi). 01 BP 169 Porto-Novo Bénin.

<sup>2</sup>Laboratoire de Pharmacognosie et des Huiles Essentielles des Facultés des Sciences de la Santé et Sciences et Techniques (Université d'Abomey Calavi). 01 BP 188 Cotonou Bénin.

**Introduction** - *Vigna comosa* Baker (*V. comosa*) et *Zea mays* L. (*Z. mays*) sont des plantes utilisées traditionnellement pour traiter le diabète dans le département de l'Ouémé (Bénin). L'objectif de cette étude est d'évaluer les activités anti-inflammatoire et cicatrisante des extraits aqueux de ces plantes.

**Méthodes** - L'activité anti-inflammatoire a été réalisée par la méthode d'extraits à référence indométacine. L'œdème est induit par injection de 0, 1 mL de formol à 1% dans l'aponévrose plantaire 30 min après l'administration de l'extrait aqueux à 500 mg/kg de poids corporel des deux plantes aux rats Wistar. Le volume du pied est déterminé à chaque 30 min pendant 6h puis 24h après induction de l'œdème. L'activité cicatrisante a été réalisée dans la région dorsolombaire des rats après une anesthésie générale à l'éther. Les plaies d'excision sont traitées par les extraits aqueux de *V. comosa* et *Z. mays* de concentration 500 mg/mL et la bétadine (référence).

**Résultats** - Les résultats ont montré une diminution plus significative ( $p = 0,004$ ) avec le produit référence 6 h après induction de l'œdème. L'extrait aqueux de *V. comosa* et la bétadine ont révélé un fort pourcentage de cicatrisation ( $p = 0,000$ ) des plaies.

**Conclusion** - Ces plantes pourraient aider les patients dans l'inflammation chronique et les affections de peau inhérentes au diabète.

**Mots clés:** Extraits de *Vigna comosa* et de *Zea mays*, œdème, plaie

**CL-CO-03****Niveau et effet des conditions de vie sur les mariages d'adolescentes en Afrique de l'Ouest : une méta-analyse des données individuelles issues des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS)**

Acotcheou Pacôme Evènakpon<sup>1,4</sup>, Saizonou Zinsou Jacques<sup>1,4</sup>, Affo Mingnimon Alphonse<sup>2,4</sup>, Dansou Justin<sup>3,4</sup>

<sup>1</sup>Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRS/CAQ), Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin, <sup>2</sup>Centre de Formation et de Recherche en matière de Population (CEFOP), Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin, <sup>3</sup>Ecole Nationale de Statistique, de Planification et de Démographie (ENSPD), Université de Parakou, Bénin. <sup>4</sup>Groupe de Recherche en Population Santé et Développement (GRPSD), Université d'Abomey-Calavi, Bénin.

Personne de contact : ACOTCHEOU Pacôme Evènakpon 04 BP 109 Cotonou, Tél (229) 97329736, Email [pacomeacotcheou@yahoo.fr](mailto:pacomeacotcheou@yahoo.fr) ; [apacomeacotcheou@gmail.com](mailto:apacomeacotcheou@gmail.com)

**Contexte** : Au terme de plusieurs législations en Afrique, le mariage précoce est une violation des droits SSR des enfants touchés mais il persiste dans certains pays. Les facteurs socioculturels et économiques sont étiquetés comme les déterminants du phénomène. Cette communication vise

à faire un point sur le niveau du phénomène et à dégager la part de chaque facteur dans son explication.

**Méthodologie :** Quarante-trois (43) Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) réalisées en Afrique de l'Ouest entre 1995 et 2000 ont été utilisées. Une autorisation a été obtenue afin d'accéder à l'ensemble des données individuelles de 31370 personnes enquêtées. La méta analyse de régression est utilisée et l'hétérogénéité et le biais de publication ont été évalués à l'aide des statistiques I<sup>2</sup> et du test d' Egger. Le graphique en forêt a été utilisé pour présenter la prévalence et le rapport de cotes (OR) regroupés avec un intervalle de confiance (IC) à 95% en utilisant le modèle à effets aléatoires. Enfin, une régression logistique binaire pas à pas a permis de faire ressortir la contribution de chaque facteur à l'explication du phénomène.

**Résultats :** La prévalence globale du mariage des adolescentes est de 21,5%. Il est fortement influencé par la population analphabète. Les déterminants du phénomène sont par ordre d'importance : le niveau d'instruction, l'ethnie, le niveau de vie du ménage, la religion et le milieu de résidence avec respectivement (30,2%, 11,4%, 2,8%, 1,9% et 0,6%) de la part totale du phénomène expliquée.

**Conclusion :** Les interventions doivent viser l'autonomisation financière des ménages, l'accélération de l'éducation universelle et le renforcement des actions de sensibilisation et de plaidoyer auprès des leaders religieux et communautaires pour le recul du phénomène.

**Mots clés :** mariage, adolescentes, Afrique de l'Ouest, méta-analyse.

#### CL-CO-04

#### FACTEURS DE RISQUE COMPORTEMENTAUX MODIFIABLES ASSOCIES AUX FACTEURS DE RISQUE BIOLOGIQUES CHEZ LES SUJETS A RISQUE DE DIABETE DE TYPE 2 AU BENIN.

C. G. Metonnou-Adanhoume<sup>1 \*</sup>, C. S. Azandjeme<sup>1</sup>, C. J. Sossa<sup>1</sup>, G. E. Sopoh<sup>2</sup>, M. N. Paraïso<sup>1</sup>, I Bio Nigan<sup>3</sup>, V. Agueh<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Health Promotion Department, Regional Institute of Public Health, University of Abomey-Calavi, Benin.

<sup>2</sup> Environment and Health Department, Regional Institute of Public Health, University of Abomey-Calavi, Benin.

<sup>3</sup> Laboratory Sports Performance, Health and Evaluation, National Institute of Youth, Physical Education and Sport (INJEPS), University of Abomey-Calavi (UAC), Porto-Novo, Benin

**Introduction :** La présente étude vise à identifier les facteurs de risque comportementaux modifiables associés aux facteurs de risque biologiques des sujets à risque du diabète de type 2 au Nord-Est du Bénin en vue de la mise en place d'une intervention appropriée pour la prévention de cette maladie.

**Méthode :** 180 sujets à risque du diabète de type 2 (âgés de 15-60 ans) ont été sélectionnés parmi les sujets à risque du diabète de type 2 dans la commune de Tchaourou au Nord-Est de Bénin. Les sujets ont été soumis à un questionnaire ; des mesures anthropométriques ont été effectuées chez les sujets ; des échantillons de sang ont été prélevés et des examens biologiques sanguins ont été faits.

**Résultats :** Les données ont été disponibles pour 180 sujets à risque du diabète de type 2. La moyenne d'âge des sujets était de 42,76 ans ± 11, 30. Le score de consommation alimentaire inadéquat, le faible niveau d'activité physique et l'utilisation du tabac étaient les facteurs comportementaux significativement associés au tour de taille élevé, à la glycémie élevée, au taux d'HDL cholestérol bas, avec  $p < 5\%$ .

**Conclusion :** Cette étude a montré une association entre les facteurs de risque biologiques et les facteurs de risque comportementaux chez les sujets à risque du diabète de type 2.

**Mots clés :** Sujets à risque de diabète de type 2 ; Facteurs de risque comportementaux et biologiques ; Bénin.

#### CL-CO-05

##### **IMPACTS DE LA PANDEMIE DE COVID-19 SUR LES MOBILITES ET MIGRATIONS HUMAINES.**

Agbadjagan Yacinthe Vidéou, Yvette Onibon Doubogan

#### **Introduction**

La COVID-19 présente des enjeux cruciaux pour les êtres humains partout dans le monde. Les restrictions à la mobilité humaine exposent de nombreuses personnes en situation de déplacement à des risques importants, ont un impact sur leurs droits et leur bien-être.

#### **Méthode**

La méthode de recherche utilisée, est axée sur la revue documentaire pour faire l'état des connaissances des impacts de COVID-19 sur les mobilités et migrations humaines dans le monde, en Afrique et au Bénin. Il s'agit d'évaluer les effets positifs et négatifs de cette pandémie sur les mouvements migratoires. Cette étude concerne à la fois, les recherches quantitatives, qualitatives et mixtes d'une part puis les études scientifiques, évaluation et les recherches actions d'autre part. L'outil de collecte de données utilisé est la grille de lecture tandis que les logiciels Word et Excel ont été utilisés pour le traitement et analyse des données.

#### **Résultats**

Les résultats ont révélés que la pandémie de COVID-19, a eu beaucoup d'impacts sur les mouvements migratoires dans presque tous les domaines. A titre indicatif, la fermeture des frontières et les restrictions de mobilité ont enfermé les femmes, les hommes, les filles et les garçons dans des situations précaires. Les migrants sont renvoyés de force, bloqués en transit, privés d'assistance en raison d'un accès restreint aux territoires, et maintenus en détention au seul motif de leur statut migratoire - malgré les risques énormes pour leur santé.

#### **Conclusion**

Ces dérives et restrictions, augmentent le niveau de vulnérabilité, favorise la violation des droits humains fondamentaux des migrants et sapent les efforts collectifs visant à contenir et à faire reculer le virus.

**Mots :** COVID-19, Migration, pandémie

#### CL-CO-06

##### **EVALUATION DU POUVOIR METHANOGENE DE LA JACINTHE D'EAU SUR LE LAC NOKOUE A GANVIE AU BENIN**

Alfred D. DOHOU\*, KOTO N'GOBI Gabin, Clément A.KOUCHADE, Basile B. KOUNOUHEWA  
Laboratoire de Physique du Rayonnement (LPR), Département de Physique FAST / UAC

\* [dohou.alfred@gmail.com](mailto:dohou.alfred@gmail.com)

La jacinthe d'eau (*Eichornia crassipes*) est une plante aquatique invasive. Elle est devenue un véritable fléau dans les eaux du monde entier en générale et dans les eaux du lac Nokoué en particulier. Devant l'urgence de trouver d'autres sources d'énergie suite à la rareté des énergies fossiles, les énergies renouvelables obtenues à partir des biomasses lignocellulosiques constituent une voie prometteuse. L'objectif de cette étude était d'évaluer le pouvoir méthanogène de la jacinthe d'eau prélevée sur le lac Nokoué à Ganvié dans la

commune de So-Ava au Bénin. Ainsi, nous avons introduit dans un bidon de 5litre, 150g de la jacinthe d'eau hachée avec 1litre d'inoculum. Après 40 jours de fermentation, il a été produit 5169,025 ml de méthane ou 34,46 ml/g CH<sub>4</sub> soit 58% du volume total de biogaz produit. La jacinthe d'eau (*Eichornia crassipes*) est un meilleur substrat pour la fermentation pour la production du méthane.

**Mots clés :** Potentiel méthanogène, Ganvié, méthanisation.

### CL-CO-07

#### PROTOCOLE D'EXERCICE PHYSIQUE DE COURTE DUREE POUR LE TRAITEMENT DU DIABETE DE TYPE 2

<sup>1,3</sup>Bernadin GNANSOUNOU, <sup>1</sup>Judith F. AHOUNOU AÏKPE, <sup>3</sup>AZE Oscar, <sup>1</sup>Jean-Benoît M. GODONOU, <sup>2</sup>Joachim D. GBENOU, <sup>1</sup>Pierre H. DANSOU et <sup>3</sup>Barnabé AKPLOGAN

<sup>1</sup>Unité de Recherche en Physiologie de l'Effort, Institut National de la Jeunesse de l'Education Physique et du Sport, Université d'Abomey Calavi. 01 BP 169 Porto-Novo Bénin

<sup>2</sup>Laboratoire de Pharmacognosie et des Huiles Essentielles, Faculté des Sciences de la Santé, Faculté des Sciences et Techniques, Université d'Abomey Calavi 01 BP 188 Cotonou Bénin

<sup>3</sup>Unité de Recherche, Déficiences, activités Physiques Adaptées et Réhabilitation, Université d'Abomey Calavi. 01 BP 169 Porto-Novo Bénin

**Contacts : Tél:** 00229 97649532. **E-mail:** bernadingnansounou@yahoo.fr

La forte expansion mondiale des pathologies chroniques telles que le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, l'asthme fait que ces pathologies sont considérées comme de véritables problèmes de santé publique, particulièrement dans les pays en développement. La présente étude a eu pour objectif, d'évaluer les effets induits par un programme d'exercice physique de courte durée sur le profil glycémique des femmes obèses et pré-obèses de la ville de Parakou. Cette étude prospective, descriptive et analytique, a permis de renseigner les habitudes de vie, les antécédents individuels et familiaux sur l'obésité et l'importance de la pratique physique auprès des sujets. Un stepper de marque Domyos à double pédales sans oscillations latérales a été utilisé pour les sujets dont la masse corporelle atteint 100kg. Un prétest a permis d'établir la conformité d'effort entre le matériel utilisé et les montées d'escaliers. La glycémie est enregistrée au début et à la fin du programme, puis à la fin de chaque séance d'exercice physique de montée de 15mn de pédales de stepper. Les résultats obtenus révèlent que les sujets ont de bonnes connaissances sur l'importance de la pratique physique en rapport à leur état physiologique. Au niveau du Groupe Expérimental, une diminution significative de 4,94% de la glycémie est observée. Ces résultats indiquent qu'un programme d'exercice physique régulier de courte durée participe efficacement à la lutte contre le diabète et certaines Maladies Non Transmissibles (MNT). Ce programme d'exercice permet de soulager les populations de la contrainte liée au temps pour une prise en charge efficace des maladies chroniques et le traitement du diabète en particulier à partir d'un dispositif simple, transportable et exploitable en milieu de travail souvent sédentaire.

**Mots clés :** Maladies Non Transmissibles, diabète, exercice physique.

### CL-CO-08

#### TENDANCES DE L'ENROLEMENT DES ADOLESCENTES DANS DES UNIONS POLYGAMES AU BENIN

Acotcheou Pacôme Evènakpon<sup>1,4</sup>, Affo Mingnimon Alphonse<sup>2,4</sup>, Saizonou Zinsou Jacques<sup>1,4</sup>, Dansou Justin<sup>3,4</sup>

<sup>1</sup>Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRS/CAQ), Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

<sup>2</sup>Centre de Formation et de Recherche en matière de Population (CEFOP), Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

<sup>3</sup>Ecole Nationale de Statistique, de Planification et de Démographie (ENSPD), Université de Parakou, Bénin.

<sup>4</sup>Groupe de Recherche en Population Santé et Développement (GRPSD)

Personne de contact : ACOTCHEOU Pacôme Evènakpon 04 BP 109 Cotonou, Tél (229) 97329736, Email [pacomeacotcheou@yahoo.fr](mailto:pacomeacotcheou@yahoo.fr) ; [apacomeacotcheou@gmail.com](mailto:apacomeacotcheou@gmail.com)

**Contexte** : Au Bénin, l'enrôlement des adolescentes dans des unions polygames demeure une réalité qui les prive de leurs droits essentiels. Cette communication vise à apporter un éclairage sur les tendances de ce phénomène ainsi que les changements observés durant les dernières décennies.

**Méthodologie** : Les données des Enquêtes démographiques et de santé du Bénin (EDSB) de 1996 et 2017 ont été utilisées pour construire un indicateur du niveau d'enrôlement des adolescentes dans les unions polygames. Par la suite des analyses de profil, de décomposition et explicatives ont été réalisées sur un échantillon de 1047 adolescentes en 1996 et 3335 en 2017.

**Résultats** : La prévalence de polygamie parmi les adolescentes est passée de 10,6% à 3,7% entre 1996 et 2017. L'effet de composition contribue à 45% des changements intervenus alors que 55% est attribuable aux comportements. L'écart d'âge entre conjoints, la taille du ménage, le niveau de vie du ménage, le niveau d'instruction du conjoint et l'activité économique de la femme sont les déterminants temporels de l'enrôlement des adolescentes dans les unions polygames au Bénin.

**Conclusion**: accélérer l'éducation universelle et renforcer les actions susceptibles de permettre une prise de conscience plus grande à l'égard du soutien à l'éducation de tous les enfants.

**Mots clés** : tendance, polygamie, enfants.

## CL-CO-09

### Pollution microbiologique de l'air au niveau de deux carrefours à sens giratoire à intensité de trafic routier élevé à Cotonou, Bénin

Codjo-Seignon L. M. Karine <sup>1,2</sup>, Sopoh Ghislain E. <sup>1</sup>, Degbey Cyriaque <sup>1,2</sup>, Zinhota Raoul <sup>2</sup>, Aina Martin P. <sup>3</sup>

*1 Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey Calavi, Bénin.*

*2 Clinique Universitaire d'Hygiène Hospitalière de Centre National Hospitalier Universitaire Hubert KOUTOUKOU MAGA de Cotonou, Bénin.*

*3 Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Eau de l'Institut National de l'Eau, Université d'Abomey-Calavi, Bénin.*

**Introduction** : La pollution microbiologique de l'air est un domaine peu documenté en Afrique. Pourtant, il revêt un intérêt capital dans la connaissance de notre environnement et des risques sanitaires liés. Cette étude vise à évaluer la pollution bactérienne et fongique de l'air au niveau de deux carrefours à intensité de trafic routier élevé à Cotonou.

**Méthode** : Des prélèvements d'air ont été réalisés au niveau des carrefours Akpakpa PK3 et Vèdokô cica-toyota, à l'aide d'un biocollecteur d'air (FKC-1 Air Biological Sampler,

BAOSHISHAN), sur différents milieux de culture. Des colorations et tests microbiologiques ont permis l'identification des germes. L'intensité d'exposition a été estimée à partir de la quantité d'air inspirée et de la durée d'exposition.

**Résultats :** Les deux carrefours présentaient une quantité similaire de champignons (environ 400UFC/m<sup>3</sup>), avec une différence dans la composition : *Fusarium sp*, *Aspergillus Niger*, *Aspergillus flavus*, *Cladosporium sp.*, et *Penicillium sp* aux deux carrefours ; *Syncephalastrum sp* carrefour Akpakpa PK3, *Rhizopus sp.* et *Chrysosporium sp* carrefour Vèdokô cica-toyota. Des bactéries Gram positives (*Staphylococcus aureus* ; *Staphylococcus sp.* *Bacillus sp.*, *Lactobacillus sp.* et *Micrococcus sp*) ont été identifiés en quantité deux fois plus élevée au carrefour Akpakpa PK3 (163UFC/m<sup>3</sup>) par rapport à Vèdokô cica-toyota (76UFC/m<sup>3</sup>).

**Conclusions :** Cette étude montre la présence de bactéries et champignons pathogènes dans l'atmosphère des deux carrefours, constituant ainsi un risque sanitaire potentiel.

**Mots-clés :** Pollution microbiologique, air, trafic routier, Bénin

## CL-CO-10

### VARIATION TEMPORELLE DE LA POLLUTION DE L'AIR AU NIVEAU DE DEUX CARREFOURS A SENS GIRATOIRE DE LA VILLE DE COTONOU (BENIN)

L. M. Karine Codjo-Seignon<sup>1,3</sup>, Vincentia M. C. Houssou Quenum<sup>1</sup>, Philippe Kossolou<sup>1</sup>, Martin P. Aina<sup>1,2</sup>, E. Ghislain Sopoh<sup>3</sup>

1 Laboratoire d'Etudes et de Surveillance Environnementales du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, Cotonou, Bénin.

2 Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Eau et de l'Environnement de l'Institut National de l'Eau, Université d'Abomey-Calavi, Bénin.

3 Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey Calavi, Bénin.

**Introduction :** La pollution atmosphérique est à l'origine de nombreux problèmes sanitaires et environnementaux. Cette étude analyse l'évolution temporelle des principaux polluants électrochimiques selon les normes Béninoises et internationales (Organisation Mondiale de la Santé, OMS) à Cotonou.

**Méthode :** Des capteurs solaires de polluants atmosphériques électrochimiques (CO monoxyde de carbone, SO<sub>2</sub> dioxyde de soufre et O<sub>3</sub>/NO<sub>2</sub> ozone/dioxyde d'azote) ou photo-ionisateurs (COV NM Composés Organiques Volatils Non Méthaniques) ont permis de recueillir des données aux carrefours Akpakpa PK3 et Vèdokô Cica-toyota entre juin 2019 et mars 2020. Les statistiques descriptives, un test de Wilcoxon, une Anova, une comparaison normative et une corrélation, avec calcul des coefficients de corrélation (r) au seuil de 0,05 ont été réalisés.

**Résultats :** les heures et les jours ont été associés à la variation des concentrations des polluants aux deux carrefours. Ainsi, les concentrations en CO étaient significativement plus élevées en semaine qu'en weekend (3558 à 3748 µg/m<sup>3</sup> contre 3087 à 1921 µg/m<sup>3</sup>). Les concentrations en SO<sub>2</sub> étaient significativement différentes entre le dimanche et les autres jours de la semaine (699 µg/m<sup>3</sup> contre 1323 à 1479 µg/m<sup>3</sup>). Une corrélation linéaire positive a été identifiée entre CO et O<sub>3</sub>/NO<sub>2</sub> aux deux carrefours (r = 46,6% à Akpakpa PK3 et 52,9% à Vèdokô Cica-toyota) et entre CO et SO<sub>2</sub> ; O<sub>3</sub>/NO<sub>2</sub> et SO<sub>2</sub> au carrefour Vèdokô Cica-toyota (r = 89,2% et 47,3%) respectivement. Les normes de l'OMS sont excédées, en ce qui concerne le SO<sub>2</sub> (sur 10min), ainsi que celles du Bénin, pour le SO<sub>2</sub> (sur 24 h). Les normes du CO sont respectées.

**Conclusions :** à ces points, les polluants varient en fonction des jours de la semaine et des heures de la journée. Les normes de SO<sub>2</sub> ne sont pas toujours respectées.

**Mots-clés :** Polluants chimiques ; air ; Trafic routier, Bénin.

### CL-CO-11

#### **EFFET DE LA SAISON SUR LA CAPACITE DU SCORE DE DIVERSITE ALIMENTAIRE A PREDIRE LA QUALITE NUTRITIONNELLE DU REGIME ALIMENTAIRE DES ENFANTS DE 6 A 23 MOIS AU SUD-BENIN.**

Elie Koukou<sup>1</sup>, Waliou Amoussa Hounkpatin<sup>1</sup>, Mathilde Savy<sup>2</sup>, Céline Termote<sup>3</sup>, Gervais Ntandou-Bouzitou<sup>3</sup>

<sup>1</sup>*Ecole de nutrition et des sciences & technologies alimentaires/Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi ENSTA/FSA/UAC*, <sup>2</sup>*Institut de recherche pour le développement (IRD)*, <sup>3</sup>*Alliance Bioversity International and CIAT*

**Introduction:** Le score de diversité alimentaire (IYC-DDS-7), un outil simple, rentable et pratique s'avère utile pour évaluer l'adéquation en micronutriments du régime alimentaire des enfants. Peu d'études ont été réalisées sur les relations entre la densité nutritionnelle d'adéquation en micronutriments (MMDA) et les IYC-DDS-7 au cours des saisons. Cette étude vise à évaluer la capacité prédictive et la stabilité saisonnière du IYC-DDS-7 à indiquer le MMDA de l'alimentation des jeunes enfants au sud-Bénin.

**Méthode:** Un rappel alimentaire de 24 heures sur deux jours non consécutifs a été effectué sur un échantillon de 764 jeunes enfants de 6 à 23 mois pendant les périodes de relative abondance alimentaire (SFA) et de soudure alimentaire (SFS). Afin d'investiguer la relation entre le MMDA et le IYC-DDS-7, un modèle de régression beta à effets mixtes avec lien logarithme a été utilisé. L'analyse de spécificité et de sensibilité a été réalisée afin de détecter comment le seuil 4 de IYC-DDS-7 maximise l'évaluation de la qualité de l'alimentation.

**Résultats:** Le IYC-DDS-7 a un effet positif sur le MMDA indépendamment des saisons. Ainsi, pour une augmentation d'une unité du IYC-DDS-7, le MMDA augmentait d'en moyenne 10,7% (IC = 8,3%-13,1%) (P = 0,000). Le seuil minimal de 4 groupes d'aliments correspondait à une sensibilité de 76% et 61%, et une spécificité de 75% et 70% pour la prédiction d'une alimentation inadéquate (MMDA < 50%), respectivement en SFA et SFS.

**Conclusion :** Quel que soit la saison, le IYC-DDS-7 est un bon prédicteur de la qualité nutritionnelle de l'alimentation des jeunes enfants. Le seuil minimal de 4 groupes d'aliments prédit mieux l'inadéquation du régime alimentaire en micronutriments.

**Mots clés :** Qualité de l'alimentation de complément, saisonnalité, Bénin

### CL-CO-12

#### **PRATIQUE DES GESTES BARRIERES LIES A LA PREVENTION CONTRE LA COVID19 CHEZ LES ADULTES A BRAZZAVILLE**

Yvonne V. Y. Mavoungou<sup>1</sup>, Bazaba Nelly<sup>2</sup>, Levi Mankoussou<sup>3</sup>, Jean Claude Mobousse<sup>4</sup>

<sup>1</sup>*Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo ; BP :15405. Email : [yvoumbo@yahoo.fr](mailto:yvoumbo@yahoo.fr)* <sup>2</sup>*Direction générale de la population, Brazzaville, Congo.*

<sup>3</sup>*Institut National de la Statistique, Brazzaville, Congo.*

<sup>4</sup>*Direction Départementale de la Santé de Brazzaville, Brazzaville, Congo.*

**Introduction :** La pandémie de covid19 déclaré à travers le monde a atteint le Congo. L'OMS souligne la nécessité d'une application stricte des mesures barrières : distanciation physique, port du masque, lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou désinfection des mains au gel hydroalcoolique pour garantir la protection des individus. L'objectif de cette étude est d'évaluer le niveau de pratique des gestes barrières à Brazzaville.

**Méthodologie :** Il s'agit d'une étude transversale descriptive dont les données proviennent d'une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques sur la covid19, réalisée du 18 au 24 août 2020 à Brazzaville. Les réponses des personnes âgées de plus de 18 ans qui ont déclaré avoir entendu parler des gestes et qui pratique les gestes barrières ont été exploitées. Les variables considérées dans l'étude : sont les caractéristiques socio démographiques des enquêtés, la perception de la gravité de la covid19, le niveau des connaissances et de pratique des gestes barrières.

**Résultats :** Au total 498 interrogés ont déclaré que la covid19 existe seul 8,4 ont déclaré qu'elle peut être évitée. Il est constaté que 5,5% de personnes interrogées déclare pratiquer aucun geste barrière. La pratique des gestes barrières est en général médiocre, les femmes (76%) ont une pratique meilleure que les hommes ( $p=0,02$ ). Les personnes ayant le niveau du collège (86,5%) ont plus de pratique médiocre de geste barrière ( $p= 0,001$ ). La bonne pratique des gestes barrière est observée seulement chez 13,2% des personnes déclarant un bon niveau de perception de la gravité de la covid19 ( $p=0,002$ ).

**Conclusion :** Les personnes interrogées ont en général une pratique inappropriée des gestes barrière contre la covid19. Cette pratique est associée à des facteurs individuels tel que le sexe, le niveau d'instruction mais aussi au niveau de perception de la gravité de la covid19.

**Mots clés :** Adultes, gestes barrières, gravité de la covid19.

## CL-CO-13

### L'ACCEPTABILITE DU TEST DE DEPISTAGE DE LA COVID 19 CHEZ LES POPULATIONS DE BRAZZAVILLE

Yvonne V. Y. Mavoungou<sup>1</sup>, Bazaba Nelly<sup>2</sup>, Levi Mankoussou<sup>3</sup>, Jean Claude Mobousse<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo ; BP :15405. Email : [yvyoumbo@yahoo.fr](mailto:yvyoumbo@yahoo.fr) <sup>2</sup>Direction générale de la population, Brazzaville, Congo.

<sup>3</sup>Institut National de la Statistique, Brazzaville, Congo.

<sup>4</sup>Direction Départementale de la Santé de Brazzaville, Brazzaville, Congo.

**Contexte :** L'épidémie de covid 19 touche toutes les populations sans distinctions quelconques.

Les autorités sanitaires demandent aux populations d'effectuer un dépistage volontaire de covid 19 pour favoriser le diagnostic précoce et la prise en charge adaptée des personnes infectées. L'objectif de cette étude était d'identifier les facteurs associés à l'acceptabilité du dépistage volontaire de la covid19.

**Méthodologie :** Il s'agit d'une analyse secondaire des données d'une enquête sur les connaissances-attitudes-pratiques sur la covid19, chez les plus de 18 ans réalisée du 18 au 24 août 2020 à Brazzaville. Les données exploitées sont celles relative à l'acceptation ou au refus du test de dépistage volontaire de covid19. Les variables considérées sont les caractéristiques socio démographiques, les sources d'informations, la perception et la connaissance de la maladie

**Résultats :** Au total 328 (62,5 %) des enquêtés ont déclaré accepter le dépistage volontaire de la covid19. L'âge moyen est de 34 ans avec une prédominance masculine aussi bien dans le groupe des personnes qui déclarent refuser (sexe ratio =1,26) ou accepter (1,41) le dépistage volontaire sans différence significative. ( $p>0,05$ ). Les personnes qui acceptent le dépistage volontaire sont celles âgées de 30-50 ans ( $p=0,026$ ) ; celle ayant le niveau d'instruction supérieur 68,9% ( $p=0,04$ ) et celle de religion musulmane (79,6%  $p=0,019$ ). Le niveau de connaissance des symptômes et la source d'information n'ont pas de lien avec l'acceptation du dépistage volontaire ( $p>0,05$ ). Le déni, la peur des résultats sont évoqués comme motifs de refus du dépistage volontaire de la covid19.

**Conclusion :** L'acceptation du dépistage volontaire de la covid19 est liée aux facteurs individuels, la connaissance des symptômes et la source d'information n'ont aucune influence. La sensibilisation sur la covid19 est à renforcer.

**Mot clés :** Dépistage volontaire, covid19, adulte.

#### CL-CO-14

##### ACTIVITES ANTIBACTERIENNES DE DERIVES EN SERIE IMIDAZOPYRIDINYL-CHALCONE SUR LES SOUCHES DE *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* RESISTANT A LA METICILLINE

Nanga Z (1,2), Ouattara M (3,4), Kouassi-Agbessi BT (1,6) , Lathro J (1,2), Ouassa T A (1,5), Guina D (1), Cablan M (1,2), Loukou G (1,2).

1. Département de Bactériologie et Virologie, UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Abidjan
2. Laboratoire National de la santé Publique, Abidjan
3. Département de Chimie Organique et Thérapeutique, UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Abidjan
4. Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires, Abidjan
5. Centre de Diagnostic et de Recherche sur le Sida
6. Laboratoire de Microbiologie, Institut National d'Hygiène Publique, Abidjan

**Introduction :** Les chalcones sont connus pour leurs nombreuses propriétés biologiques. L'objectif de cette étude était d'évaluer l'activité antibactérienne et l'action inhibitrice sur la formation du biofilm chez *S. aureus*.

**Matériel et méthodes :** L'évaluation des activités antibactériennes a été réalisée par la méthode de dilution en milieu liquide et la lecture réalisée à la DO de 600 nm sur des souches de *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline (SARM). La mesure de l'inhibition de la production du biofilm bactérien a été réalisée par la méthode des microplaques.

**Résultats :** Les CMI des chalcones s'élevaient de 25 à 200 µg/ml. La moyenne des taux d'inhibition de la production de biofilm était de 36%. Le dérivé 3,4 diméthoxylé a donné une CMI de 25 µg/ml, un taux d'inhibition du biofilm de plus de 92%.

**Conclusion :** Les résultats obtenus ont montré que les dérivés en série d'imidazopyridinyl-chalcone ont présenté un pouvoir inhibiteur sur la croissance bactérienne et la production de biofilm chez les souches SAMR. Ces résultats ouvrent des voies vers l'identification et l'élaboration de nouveaux antistaphylococciques en série des imidazopyridinyl-chalcones.

**Mots-clés :** SARM, chalcones, biofilm.

**CL-CO-15****CONNAISSANCE DES MEDECINS GENERALISTES DE LA VILLE DE COTONOU SUR LE LUPUS ERYTHEMATEUX SYSTEMIQUE**

Azon-Kouanou A., Aboué N.C.A., Missiho M.S.G., Dansou E., Sokadjo Y.M., Agbodande K.A., Wanvoegbe A.F., Zannou D.M., Houngbé F.

Service de Médecine Interne du CNHU-HKM de Cotonou

**Auteur correspondant :** Azon-kouanou Angèle, email : angele.azonkouanou@gmail.com.

**Introduction :** Les patients atteints de Lupus Erythémateux Systémique (LES) sont vus tardivement en consultation spécialisée au Bénin. L'objectif de ce travail était d'évaluer la connaissance des médecins généralistes de Cotonou sur le LES.

**Cadre et méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale descriptive menée dans la ville de Cotonou du 1<sup>er</sup> Juillet au 30 Septembre 2017. La population d'étude était constituée des médecins généralistes exerçant dans la ville. La collecte des données a été faite par réponse à un auto-questionnaire.

**Résultats :** L'enquête a concerné 209 médecins généralistes. L'âge moyen était de 27,5 ans avec des extrêmes de 22 et 34 ans. La plupart exerçait dans des cliniques privées. 17 médecins (8,1%) ont déclaré ne jamais avoir entendu parler du lupus. Cent quatre-vingt-onze (92%) des médecins généralistes, avaient une connaissance insuffisante du lupus.

**Conclusion :** De cette étude, il ressort que le LES reste encore peu connu du médecin généraliste de la ville de Cotonou. Un renforcement de connaissance sur la question s'avère nécessaire sur la question afin d'améliorer le taux de dépistage de cette pathologie peu diagnostiquée.

**Mots-Clés :** Lupus érythémateux systémique, connaissance, médecin généraliste.

**CL-CO-16****IMPACTS FINANCIERS ET REPERCUSSIONS A COURT TERME DES TRAUMATISMES CRANIO-ENCEPHALIQUES AU SEIN DES FAMILLES DES VICTIMES A PARAKOU EN 2018**

Fatigba O.<sup>1,2</sup>, Quenum K <sup>1,2</sup>, Ouorou S<sup>1</sup>, Tamou Bio E <sup>2,3</sup>.

1. *Unité de neurochirurgie, Faculté de Médecine de l'Université de Parakou, Benin*
2. *Département de Chirurgie et spécialités chirurgicales, Faculté de Médecine de l'Université de Parakou, Benin*
3. *Service de chirurgie générale, Faculté de Médecine de l'Université de Parakou, Benin*

**Correspondance:** Dr Fatigba O. Holden ; Faculté de Médecine de l'Université de Parakou, Email: holfatigba@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9912-8028, Tel: +229.97 49 22 45

**Introduction :** Les traumatismes crânio-encéphaliques (TCE) constituent un problème de santé publique dans les pays à faible revenu. Ils engendrent des conséquences médicales et socio-économiques inquiétantes.

**Objectif :** Evaluer l'impact socio-économique et professionnel à court terme des TCE au sein des familles de victimes traitées au CHUD-BA.

**Méthode.** Il s'est agi d'une étude prospective et descriptive réalisée à l'unité de neurochirurgie du CHUD-B/A. Du 1<sup>er</sup> Mars au 31 Août 2018, tous les cas de TCE graves et modérés ont été enquêtés. Le coût direct de la prise en charge et les conséquences socio-professionnelles induites ont été évaluées.

**Résultats.** Durant la période d'étude, 43 (28,9%) patients ont été retenus parmi les 149 cas de TCE recensés. Il s'agissait de 23 TCE graves (53,5%) et 20 TCE modérés (46,5%). L'âge moyen des patients était de  $24,0 \pm 16,2$  ans. Ils étaient de sexe masculin dans 88,4% des cas. Parmi ces patients, 39,5% n'était pas instruits, 44,2% avaient un revenu mensuel inférieur à 40.000 FCFA. Parmi ces patients, 97,7% n'avaient aucune couverture sociale. Le coût moyen de leur traitement était de  $257.369 \pm 210.324$  FCFA ( $457,8 \pm 374,1$  USD). Le coût global des différentes prestations s'élevait 111.117.885 FCFA (19776 USD). Les dépenses ont été supportées par la famille dans 86,1% des cas. La dépendance financière (59,4%), la perte d'emploi (31,2%), l'échec ou abandon (37,5%), les perturbations des travaux champêtres (25%) et la dépendance physique (18,8%) étaient les impacts rapportés.

**Conclusion :** Les TCE ont des conséquences socio-économiques et professionnelles néfastes au sein des familles des victimes de TCE à Parakou. Ces constatations confortent la nécessité d'une couverture sanitaire pour les populations et l'obligation d'une stratégie efficace de prévention des TCE.

**Mots clés.** Couverture sanitaire, Traumatismes crânio-encéphaliques, Parakou.

## CL-CO-17

### MODELISATION MATHÉMATIQUE DE LA RÉSISTANCE DES SOUCHES DE *KLEBSIELLA PNEUMONIAE* UROPATHOGENES AUX FAMILLES D'ANTIBIOTIQUES CLASSIQUES

Jean-Pierre GNIMATIN\*, Victorien Dougnon, Phénix Assogba, Jerrold Agbankpé, Hornel Koudokpon, Esther Déguénon, Kafayath Fabiyi

Unité de Recherche en Microbiologie Appliquée et Pharmacologie des substances naturelles, Laboratoire de Recherche en Biologie Appliquée, Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi, Université d'Abomey-Calavi

jeanpierre.gnimatinpro@gmail.com (\*Corresponding author)

La problématique de la résistance des bactéries aux antibiotiques est un problème majeur de santé publique d'ampleur mondiale et plus particulièrement dans les pays en voie de développement comme le Bénin. L'objectif général de la présente étude était de Contribuer à la résolution du problème de l'antibiorésistance des souches de *Klebsiella pneumoniae*. Pour se faire, quarante-huit (48) souches de *Klebsiella pneumoniae* isolées dans quatre (4) laboratoires du sud Bénin ont été collectées durant la période du 13 Mai au 02 Août 2019. Les techniques classiques de manipulation en microbiologie ont été utilisées pour l'identification des souches de *Klebsiella pneumoniae*. Le profil de résistance des souches face aux antibiotiques a été déterminé selon la méthodologie recommandée par la Société Française de Microbiologie 2019. La modélisation mathématique de la résistance des souches a été faite en utilisant des modèles déterministes continus à compartiments. Les résultats obtenus pour le test de sensibilité aux antibiotiques ont montré une forte résistance aux pénicillines, une résistance moyenne aux céphalosporines et aux fluoroquinolones et une faible résistance aux carbapénèmes. La modélisation mathématique a permis de faire une projection de la résistance des souches de *Klebsiella pneumoniae* à l'horizon 2024. Il a ainsi été ressorti une fréquence élevée de résistance par rapport à presque tous les antibiotiques testés. Seul l'Imipénème qui, en 2019 a présenté un taux de résistance de 6,25% aura un taux de résistance moyennement faible (34,80%) en 2024. Ces résultats démontrent un besoin urgent de la surveillance et du contrôle de la résistance aux antibiotiques au Bénin et exhorte à explorer de nouvelles sources comme les plantes médicinales.

**Mots clés:** Antibiorésistance, *Klebsiella pneumoniae*, Modélisation mathématique.

**CL-CO-18****RESISTANCE AUX VIOLENCES CONJUGALES FAITES AUX FEMMES : UNE SOCIO-ANTHROPOLOGIE DES REPRESENTATIONS SOCIALES A KPOMASSE AU SUD DU BENIN**

\*Hervé AGBOMAHENAN Et Dodji AMOUZOUVI, Professeur Titulaire des Universités du CAMES, Directeur scientifique du Laboratoire d'Analyse et de Recherche, Religion, Espace et Développement, Directeur de thèse de doctorat en Sociologie-Anthropologie, UAC.

**Contacts : 97 54 85 90 Email : [gbehajunoior@gmail.com](mailto:gbehajunoior@gmail.com)**

Les violences conjugales faites aux femmes constituent l'un des fléaux les plus répandus au monde de par leur caractère universel et atemporel (E. Fayner, 2006). Au Bénin, malgré toutes les dispositions législatives, institutionnelles et les actions de lutte menées, des cas de violences conjugales faites aux femmes sont toujours enregistrés et ses victimes résistent. Dans cette dynamique, pourquoi cette résistance ? La réponse à cette interrogation fait l'objet de cette recherche intitulée : Résistance aux violences conjugales faites aux femmes : une socio-anthropologie des représentations sociales à Kpomassè au Sud-Benin

Elle est de nature qualitative, de type transversal, descriptif et analytique. La technique d'échantillonnage utilisée est celle non probabiliste avec l'usage du choix raisonné associé à la recherche itinérante (boule de neige). Les techniques et outils utilisés sont : la recherche documentaire au moyen de la fiche de lecture, l'entretien semi-directif et le récit de vie à base du guide d'entretien et l'observation directe par entremise de la grille d'observation. Ainsi, quarante-trois (43) personnes ont été interviewées réparties en trois catégories d'acteurs (primaires, secondaires et tertiaires). L'usage de l'analyse de contenu est fait avec la théorie interactionnisme symbolique de H. Blumer (1937).

D'après les résultats obtenus, plus de deux cents (200) femmes sont victimes de violences conjugales. Mais elles résistent et restent toujours dans le foyer. Ses violences conjugales sont perçues de diverses façons. Ainsi, à Kpomassè, tout n'est pas violences conjugales. Certains actes d'assujettissement (violences physique, abandon de foyer, refus sexuel, ...) à l'égard des femmes sont considérés comme normaux et ont des fonctions bien déterminées (punitives, éducationnelle etc.).

Aux termes de ce travail, cette pratique qui ne date pas d'aujourd'hui perdure à Kpomassè à cause du poids de la culture et de l'attachement des femmes à leurs enfants.

**Mots clés :** Résistance, violences conjugales, représentations sociales.

**CL-CO-19****HABITUDES ALIMENTAIRES ET TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX CHEZ DES PATIENTS HOSPITALISES AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUTOU MAGA DE COTONOU**

Soussia T.<sup>1\*</sup>, Ahamada A.<sup>1</sup>, Sossa Jerome C.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut National Médico-Sanitaire, Université d'Abomey-Calavi (Bénin)

<sup>2</sup> Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum, Université d'Abomey-Calavi (Bénin) Email: [\\*soussiatheodore@gmail.com](mailto:soussiatheodore@gmail.com)

**Introduction :** Les interactions aliments-médicaments sont une cause d'iatrogénie et il en résulte des problèmes complexes concernant ces interactions. Ces dernières peuvent être de nature pharmacocinétique ou pharmacodynamique. L'objectif principal de l'étude a été d'étudier les implications nutritionnelles des traitements médicamenteux ainsi que les

habitudes alimentaires des patients hospitalisés dans les services de rhumatologie et de néphrologie du CNHU de Cotonou.

**Méthodes :** Il s'agit d'une étude transversale et descriptive. La méthode d'échantillonnage était non probabiliste et la technique utilisée était celle par commodité. Les services de rhumatologie et de néphrologie du CNHU ont constitué le cadre d'étude. L'enquête par questionnaire s'est faite à l'aide d'une fiche d'enquête mais aussi un questionnaire de fréquence alimentaire nous ont permis de collecter les données.

**Résultats :** Au total 50 patients (25 hommes et 25 femmes) ont participé à l'étude. La moyenne d'âge de la population d'étude était 49 ans. 68% des patients étaient du service de néphrologie et 32% du service de rhumatologie. Plusieurs groupes de médicaments sont administrés à ces patients mais les plus prescrits sont les suivants : antalgiques, anti-inflammatoires et antihypertenseurs. 30% des patients de la néphrologie ont bénéficié de conseils nutritionnels par contre aucun patient de la rhumatologie n'a reçu de conseils. La majorité des patients hospitalisés n'ont pas d'habitudes alimentaires adéquates.

**Conclusion :** il existe bien des interactions entre les aliments et les traitements médicamenteux administrés aux patients hospitalisés. Très peu de patients sont informés et ont reçu de conseils nutritionnels appropriés.

**Mots clés :** interaction, aliment, médicament.

## CL-CO-20

### EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE PREVENTION PRIMAIRE DE LA MALNUTRITION DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS DANS L'ARRONDISSEMENT D'IKPINLE EN 2016

Adéyèmon O. F.<sup>1</sup>, Houlga N. F.<sup>1</sup>, Soussia T.<sup>1\*</sup>, Sossa Jerome C.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut National Médico-Sanitaire, Université d'Abomey-Calavi

<sup>2</sup> Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum

Email: \*[soussiatheodore@gmail.com](mailto:soussiatheodore@gmail.com)

La malnutrition contribue à près de 55% à la mortalité infantile dans le monde (OMS 2008). Pourtant, des actions sont menées pour lutter contre ce problème de santé publique. Au Bénin, les efforts pour lutter contre la malnutrition ne sont toujours pas satisfaisants.

Une étude transversale et descriptive qui s'est déroulée en août 2016 a permis d'enquêter huit prestataires de soins recensés au centre de santé d'Ikpilè et 53 mères d'enfants de 0 à 5 ans sélectionnées par commodité. Les données collectées ont été analysées avec le logiciel Excel pour le calcul des pourcentages et la réalisation des graphiques.

Aucun prestataire ne s'occupait du suivi de la courbe de croissance et des séances de démonstration culinaire. En outre, 2/8 des prestataires exécutaient de façon intermittente les consultations d'enfants sains. Un prestataire sur huit (1/8) planifiait et exécutait les séances d'IEC de groupe, mensuellement ; et 2/8 prestataires mettaient en œuvre des séances d'IEC individuelles sur la malnutrition à chaque contact avec les mères.

Les pratiques alimentaires des mères demeuraient inadéquates dans la majorité des cas. Ainsi, 20,75% des mères pratiquaient l'allaitement maternel exclusif, 52,83% ont débuté le sevrage avant l'âge de six mois et 15,10% des mères ont procédé à une introduction tardive d'aliments de compléments à partir de 9 mois.

Ces pratiques alimentaires des mères étaient probablement les conséquences des défaillances observées au niveau de la mise en œuvre des activités de prévention primaires.

**Mots clés :** Prévention, Primaire, Malnutrition

**CL-CO-21****REPRESENTATIONS SOCIALES DE L'ORIGINE DE LA MALADIE : UN DETOUR POUR COMPRENDRE LE SYNCRETISME ISLAMIQUE DANS LA COMMUNE DE LA KOZAH 1****1. Boussanlègue TCHABLE, 2. Nadiédjoh TCHELEGUE 2.Yarou GUERA CHABI YORO**

1. Laboratoire de Recherches et d'études en Linguistique, Psychologie et Sociétés (LaRELIPS), Université de Kara (UK). Cel : +22890159198, Email : [tchable10@gmail.com](mailto:tchable10@gmail.com)
2. Laboratoire d'Analyse et de Recherche : Religions, Espaces et Développement (LARRED), Université d'Abomey-Calavi (UAC). Cel : +22964159267 Email : [yaroug@yahoo.fr](mailto:yaroug@yahoo.fr)

Apparue premièrement en pays Tem, l'islam a, par la suite, touché d'autres parties du Togo avec pour objectif de pousser les croyances et pratiques religieuses locales à l'oubli. Mais aujourd'hui, on remarque que l'islam a fini par héberger au sein de lui-même des éléments de croyances de la tradition africaine. Dans une approche qualitative, le présent article a procédé à la collecte des données grâce à l'observation directe, la recherche documentaire et l'entretien individuel. Au total, 38 informateurs ont été interrogés. L'analyse des discours sur l'origine de la maladie révèle que les musulmans continuent de considérer les forces invisibles (sorcellerie, envoutement), mais aussi le péché et le refroidissement vis-à-vis de Dieu comme causes des diverses pathologies. Ainsi, la théorie de l'habitus de P. Bourdieu (2000) a permis de comprendre que les représentations sociales de l'origine de la maladie ont été maintenues en dépit de la conversion grâce à la socialisation. Ceci explique l'introduction des éléments de croyances locales (principalement les éléments qui servent en matière de thérapie) au sein de l'islam. Tout ce qui paraît fonctionnel pour guérir une pathologie se voit être conservé et reversé dans l'islam.

**Mots clés :** islam, maladie, Koza 1.

**CL-CO-22****DIAGNOSTIC ET IMPACTS PSYCHO-SOCIAUX DE LA DYSFONCTION ERECTILE AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSTITAIRE HUBERT KOUTOUKOU MAGA DE COTONOU**

Dodji Magloire I. Yeve, Fawaz Abiola Yessoufou, Fred Hodonou, Michel Michaël Agounkpe, Jean Sossa, Gilles Natchagande, Michel Michaël Agounkpe, Josué D.G. Avakoudjo

**Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou MAGA de Cotonou**

**Correspondant :** Dr YEVI Dodji Magloire Inès.

Email : [dryevi@gmail.com](mailto:dryevi@gmail.com), Cell : +229 97242160, 07BP07 Cotonou

**Introduction :** L'étude avait pour but de calculer la prévalence des dysfonctions érectiles, de décrire les aspects diagnostics de la DE et d'évaluer ses impacts psycho-sociaux.

**Méthode :** Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive et analytique qui s'était déroulée au CNHU-HKM de Cotonou. Elle s'était déroulée sur une période de 1 mois allant du 07 Aout au 06 Septembre 2019. 134 patients ont été interrogés pendant la période. Le score IIEF-5 avait été utilisé pour évaluer la DE et l'échelle de COHEN pour le stress.

**Résultats :** L'âge moyen était de 54,03 ans  $\pm$  11,94 avec des extrêmes de 20 à 80 ans. La prévalence de la DE était de 77,61%. Parmi eux, 44% ont présenté une DE légère, 20,1% une

DE sévère et 13,4% une DE modérée. 61% des patients avaient un stress chronique voire invalidant et 20,5% d'entre eux estimaient qu'il leur serait insupportable de vivre le restant de leurs jours avec la DE. 25% déclarait que la DE les empêchait de se concentrer dans leur travail. Les facteurs associés à la DE sont l'âge ( $p<0,001$ ), la profession ( $p=0,001$ ), le diabète ( $p=0,032$ ), l'alcool ( $p=0,023$ ) et le traitement contre l'hypertrophie de la prostate ( $p<0,001$ ).

**Conclusion :** La DE est donc une pathologie assez courante dans notre société qui demeure toujours mal dépistée à cause des tabous autour du sujet. Son diagnostic assez aisé doit souvent être accompagné d'un profil psycho-social pour permettre une bonne prise en charge.

**Mots clés :** dysfonction érectile, prévalence, IIEF, stress, facteurs associés

### CL-CO-23

#### LES NOUVELLES MUTATIONS SOCIALES ET LEUR RAPPORT A LA MATERNITE CHEZ L'ADOLESCENTE EN MILIEU *BAATONU* DE KANDI AU NORD BENIN

**ADAM NOUHOUN Loukoumanou**, Doctorant en Sociologie du Développement à l'Ecole Doctorale Pluridisciplinaire : « Espaces, Cultures et Développement » de l'Université d'Abomey Calavi au Bénin, E-mail : [loukmanadam@gmail.com](mailto:loukmanadam@gmail.com), (00229) 96 97 33 03 ; Laboratoire d'études et de recherches sur les dynamiques sociales et le développement local (LASDEL-Bénin)

**Professeur IMOROU Abou-Bakari**, Professeur Titulaire/CAMES, Chercheur au Lasdel – Bénin, Enseignant au Département de Sociologie-Anthropologie, FASH, UAC, Bénin E-mail : [aimorou@yahoo.fr](mailto:aimorou@yahoo.fr)

Alors que la fonction de maternité requiert une certaine maturité physique, psychique et mentale, on note de plus en plus une entrée relativement précoce à cette fonction en milieu traditionnel africain en général, et dans le groupe social *baatonu* en particulier. Nombre de jeunes filles deviennent mères sans s'être véritablement préparé à ce rôle. Toute chose que les organismes de protection de l'enfant, les agences de développement et le pouvoir public combattent vigoureusement au quotidien. Cette recherche vise à analyser les arguments sociaux en faveur de la maternité au jeune âge, en lien avec les nouvelles mutations sociales qui s'opèrent dans les sociétés traditionnelles africaines en général et le groupe socio-ethnique *baatonu* de Kandi au Nord Bénin particulièrement.

Elle est réalisée à partir d'une démarche socio-anthropologique classique basée sur l'enquête de terrain. De nature essentiellement qualitative, elle combine plusieurs outils de collecte de données dont les plus utilisés dans le cadre de cette recherche sont les entretiens individuels et/ou de groupe, le focus group et la recherche documentaire. Au total, 33 entretiens et 4 Focus Group ont été réalisés avec différentes catégories d'acteurs.

L'analyse des discours révèle que les nouveaux mécanismes de socialisation et de transmission des normes et valeurs à la jeune génération ont une influence négative sur le contrôle social des adolescentes. Les conséquences directes de cette faille des fonctions assignées aux différentes institutions que sont notamment la famille, l'école et l'Etat sont la non maîtrise de la vie sexuelle et reproductive des adolescentes. Cela aboutit inéluctablement à une maternité très précoce qui est contraire aux exigences du pouvoir public et des agences de développement qui œuvrent pour une maternité responsable chez ces dernières. La logique qui sous-tend les interventions des différents acteurs stipule que les adolescentes constituent une catégorie sociale fragile et vulnérable à tous égards.

**Mots clés** : Adolescente – maternité précoce – mutations sociales

## CL-CO-24

### ASPECT DE LA PREVENTION DE LA TRANSMISSION MERE A L'ENFANT (PTME) DU VIH EN PEDIATRIE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ZONE D'ABOMEY CALAVI (CHUZ/AC)/ BENIN

E.E. Agbe <sup>1</sup>, \* I. Dossou-Dagba <sup>2</sup>, F. Zinsou <sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites, les IST et les Epidémies - Abomey Calavi (Bénin), <sup>2</sup>Centre Hospitalier Universitaire de Zone d'Abomey Calavi - Abomey Calavi (Bénin), <sup>3</sup>Hopital d'Instruction des Armées - Parakou (Bénin)

**Introduction** : La PTME demeure une grande préoccupation dans le cadre de l'atteinte des objectifs de l'ONUSIDA à l'horizon 2035.

**Objectifs** : Décrire les aspects clinique, virologique, thérapeutique des enfants issus de mères séropositives au VIH (enfants exposés) suivis au CHUZ/AC.

**Méthode** : Etude prospective et descriptive réalisée sur 24 mois allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019. Etaient inclus dans l'étude, les enfants exposés suivis au CHUZ/AC. Les données étaient collectées à l'aide d'une fiche d'enquête, renseignée lors du suivi.

**Résultats** : Les enfants exposés suivis étaient de 155 dont 76,13% accouchés dans le centre; 20,65% référés et 3,22% lors du dépistage systématique. L'âge moyen était de  $10 \pm 6,47$  mois et la sex-ratio (H/F) à 1,07. Les pères géniteurs se connaissaient séropositifs dans 13,55% des cas. Le statut sérologique était partagé entre parents géniteurs dans 49,03% des cas. La fréquence des mères sous Anti-Rétroviral (ARV) avant l'accouchement était de 89,68%. Parmi les 155 mères, 76,13% avaient accouchées par voie basse et 23,87% par césarienne. L'allaitement maternel exclusif était choisi par 94,84% ; l'artificiel par 4,52% et le mixte par 0,64%. La prophylaxie ARV était faite de Névirapine seule et associée à la Zidovudine dans respectivement 74,19% et 18,71% des cas. Un pourcentage de 94,19% des enfants étaient sous Cotrimoxazole. La PCR (Polymerase Chain Reaction) 1 était faite chez 90,32% des enfants. Elle était positive à 0,64%, représentant également le taux de séropositivité à 12 et 18 mois. La PTME a donc réussi dans 99,36% des cas.

**Conclusion** : La PTME a présenté un résultat satisfaisant au CHUZ/AC. Cependant, des stratégies seront davantage menées pour éliminer complètement cette transmission du VIH.

**Mots clés** : Enfant exposé, PCR, Bénin.

## CL-CO-25

### ACCOMPAGNER POUR LA VIE ET ACCOMPAGNER VERS LA MORT. UNE REFLEXION AUTOUR DE LA GESTION DES MALADIES CHRONIQUES : CAS DU DIABETE ET SES COMPLICATIONS CHRONIQUES AU SUD TOGO.

Agbodjavou Komi Mena <sup>1&2</sup>, Kpatchavi Codjo Adolphe <sup>1&2</sup>

1. Université d'Abomey-Calavi ; 2. Laboratoire d'Anthropologie Médicale Appliquée

**Introduction** : A l'articulation de la socio-anthropologie et de la santé publique, la recherche interroge le rôle des professionnels de santé dans l'Education Thérapeutique du Patient (ETP)

en levant spécifiquement un coin de voile sur les enjeux techniques, professionnels et sociologiques des soins palliatifs en institution hospitalière.

**Méthodologie** : S'appuyant sur une recherche qualitative menée à Lomé (sud Togo), cette contribution a adopté une démarche qualitative incluant des entretiens semi-directifs, réalisés en mai 2018 et juillet 2019 auprès de 30 personnes âgées de 19 à 85 ans.

**Résultats** : L'accompagnement du diabétique dans le cadre de la prévention des complications chroniques est confronté à des obstacles techniques (exécution de l'ETP) et professionnels (rationalité médicale). La prise en charge des complications chroniques s'étend à la sphère culturelle du patient (spiritualité et religiosité de la composante familiale et affective), faisant du patient et son entourage des coproducteurs des savoirs de prise en charge de ces complications. Enfin, les plans thérapeutiques du diabète (type 1 ou 2) ne sont plus adaptés quand l'espérance de vie s'ajuste en terme de semaines ou mois, leurs objectifs à long terme étant d'éviter les complications chroniques.

**Conclusion** : Il ressort, la nécessité d'inclure une approche holistique de l'accompagnement (modèles socioculturels) dans le système de santé pour la prise en charge efficace du diabétique, car la prise en charge du diabète et la gestion de ses complications chroniques ouvre une fenêtre sur la mort dans l'imaginaire du patient et son entourage.

**Mots clés** : accompagnement, diabète, sud Togo

## CL-CO-26

### EFFET DE *ROUREA COCCINEA* ET DE *CASSYTHA FILIFORMIS* SUR LA FERTILITE DES RATS MALE WISTAR

Agbodjento<sup>1</sup> Eric, Klotoé<sup>\*1,2</sup> Jean Robert, Dougnon<sup>1</sup> Victorien, Sacramento<sup>3</sup> Isabelle, Amadou<sup>1</sup> Afoussatou, Déguénon<sup>1</sup> Esther, Atègbo<sup>4</sup> Jean Marc

<sup>1</sup> *Unité de Recherche en Microbiologie Appliquée et Pharmacologie des substances naturelles* (URMAPha), Université d'Abomey-Calavi, 01BP2009 Cotonou, Bénin

<sup>2</sup> *Ecole Normale Supérieure de Natitingou* ; Université Nationale des Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques ; BP72 Natitingou.

<sup>3</sup> *Ecole de Gestion et d'exploitation des Systèmes d'élevages/* Université Nationale d'Agriculture (EGESE/UNA) - Kétou

<sup>4</sup> *Laboratoire de Physiopathologie Moléculaire et Toxicologie* ; Université d'Abomey-Calavi, 01BP526 Cotonou, Bénin

Auteur correspondant (\*) : Dr Klotoe Jean Robert, [jrklotoe@yahoo.fr](mailto:jrklotoe@yahoo.fr)

**Introduction** : La fertilité masculine dépend essentiellement de la quantité et la qualité des gamètes mâles. Toute anomalie affectant ces facteurs peut conduire à une infertilité. Un nombre considérable de couple est confronté à ce problème de santé reproductive. Dans les pays en voie de développement comme le Bénin, l'usage des plantes médicinales constitue une alternative pour le traitement de l'infertilité masculine. Cette étude visait à évaluer l'effet de *Rourea coccinea* et de *Cassytha filiformis* sur la fertilité des rats mâle Wistar.

**Méthodes** : Les travaux ont porté sur l'extrait hydro-éthanolique des feuilles de *Rourea coccinea* et de la plante entière de *Cassytha filiformis*. Huit lots de rats Wistar mâle (six lots tests, un lot témoin référence et un lot témoin) ont été constitués et traités au quotidien par gavage œsophagienne pendant 28 jours. Les lots tests ont reçu trois différentes doses (200, 400, 800 mg/kg) d'extrait de chaque plante, le lot référence a été traité avec du Fertilo forte (500 mg/kg) et le lot témoin a reçu de l'eau distillée. Les paramètres tels que l'index

gonadosomatique, la numération, la mobilité, la vitalité et la morphologie spermatique ont été évalués.

**Résultats :** Les plantes étudiées ont eu un effet dose dépendante sur l'amélioration des différents paramètres spermatiques. A la dose de 800 mg/Kg, une amélioration significative de la motilité et de la numération spermatique a été notée respectivement pour *Rourea coccinea* et *Cassytha filiformis* ( $p < 0,05$ ). Cet effet est statistiquement identique à celui de Fertilo forte ( $p > 0,05$ ).

**Conclusion :** Cette étude a permis de révéler le potentiel spermatogénique de *Rourea coccinea* et de *Cassytha filiformis* justifiant ainsi leur usage en médecine traditionnelle béninoise dans le traitement des troubles de la fertilité masculine. Des tests pharmacologiques futures évalueront leur efficacité sur des modèles de toxicité reproductive.

**Mots clés :** Fertilité masculine, Plantes médicinales, Benin

## CL-CO-27

### BLOC DU NERF PUDENDAL SOUS NEUROSTIMULATION AU COURS D'UNE MISSION FORAINE DE CHIRURGIE UROLOGIQUE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MERE – ENFANT LAGUNE (CHU-MEL): TECHNIQUE ET EFFICACITE CHEZ L'ENFANT

Akodjenou J<sup>1</sup>, Ahounou E<sup>2</sup>, Zomahoun L<sup>1</sup>, Gbenou S<sup>1</sup>, Zoumenou E<sup>2</sup>

1. Centre Hospitalier et Universitaire - Mère-Enfant Lagune (Cotonou – Bénin)
2. Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cotonou – Bénin)

**Auteur correspond :** Akodjenou Joseph, mail : josephakodjenou@yahoo.fr

**Introduction :** Chez l'enfant, le bloc pudendal connaît récemment un essor important en garantissant une analgésie péri-opératoire de qualité pour la chirurgie périnéale. L'objectif de ce travail était de décrire la technique et l'efficacité du bloc pudendal réalisé sous la neurostimulation.

**Patients et Méthode :** Il s'agissait d'une étude prospective, menée dans le service de la chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire Mère – Enfant Lagune (CHU-MEL), du 17-22 Novembre 2019 et qui a inclus tous les enfants de 0 – 15ans, ayant bénéficié d'une programmation dans le cadre de la mission foraine pour la chirurgie de l'hypospadias et éligibles pour le bloc pudendal. Le bloc pudendal a été jugé efficace en absence de douleur à l'échelle des 6 visages modifiés toutes les 2 heures jusqu'à la 24<sup>ème</sup> heure. Les données ont été recueillies à partir d'une fiche conçue à cet effet. Elles ont été analysées à l'aide du logiciel Stata Version 14.

**Résultats :** Un total de 42 enfants avait bénéficié de la consultation chirurgicale mais 18 étaient éligibles (42,85 %) pour la présente étude. Ces derniers avaient une moyenne d'âge de 6,10 ans  $\pm$  2,23 ans avec des extrêmes de 10 mois de vie à 14 ans. L'hypospadias (antérieur et balanique) était l'indication chirurgicale la plus représentée (55,55%). Les enfants étaient classés ASA1 (92%) et ASA2 (8%). Le score d'évaluation de la douleur était compris entre 0 – 3 après 24h chez 100% des enfants expliquant l'efficacité du bloc pudendal. La durée moyenne d'hospitalisation était 1,12  $\pm$  0,36 jour et la morbi-mortalité péri-opératoire était nulle.

**Conclusion :** Le Bloc Pudendal paraît procurer une très bonne analgésie et un certain confort post-opératoire pour les enfants opérés. En tenant compte de la qualité des patients opérés, le coût, l'efficacité de la technique et le confort post-opératoire ; la réalisation du bloc pudendal constitue une alternative pour les soins forains.

**Mots clés :** Bloc Pudendal, neurostimulateur, mission foraine, enfant

**CL-CO-28****STRUCTURE FAMILIALE ET ROLES SOCIAUX ASSOCIES : POUR UNE COMPREHENSION DES COMPORTEMENTS SEXUELS DITS DEVIANTS DES JEUNES A COME (BENIN)**Alihonou Kouassiba Odette<sup>1</sup> et Hounghinih Roch Apollinaire<sup>2</sup>(229) 96 16 61 17 [alihonouode@gmail.com](mailto:alihonouode@gmail.com)

**Introduction :** De plus en plus, on assiste à l'émergence de nouveaux comportements sexuels perçus comme déviants chez les jeunes dans la ville de Comè. Ces comportements ne sauraient être expliqués qu'à travers les figures de la communauté, les normes sociales et culturelles, les institutions sociales et les différentes mutations familiales. C'est dans ce contexte que la présente recherche a été initiée pour appréhender de « l'intérieur », les facteurs associés auxdits comportements.

**Méthodes :** Réalisée au moyen d'une démarche qualitative, cette recherche a mobilisé plusieurs techniques pour le recueil des informations. Il s'agit notamment de l'entretien semi-structuré et de l'observation. Au total, vingt-sept acteurs de différents profils sélectionnés au moyen de la technique de choix raisonné et de boule de neige, ont servi d'informateurs clés.

**Résultats :** Les jeunes ont des comportements sexuels saisissables à travers la multiplicité des grossesses en milieu scolaire, les relations sexuelles avec plusieurs partenaires au cours d'un acte sexuel ou avec des personnes de générations différentes. Cet état de chose est induit par les mutations des structures familiales caractérisées par la « démission » des parents dans l'accompagnement des jeunes et l'apparition de nouveaux modèles familiaux (monoparentalité) avec de nombreuses femmes jouant le rôle de chefs de ménage. De ce point de vue, les structures familiales ont connu de changements significatifs à travers leur constitution, leur forme et leur rôle.

**Conclusion :** Les comportements dits déviants des jeunes trouvent leur source dans les profondeurs des transformations sociales, culturelles et économiques (croissance démographique, exode rural, urbanisation, acculturation et transformations culturelles). Ainsi, ces acteurs sont assujettis à une sexualité influencée par une recomposition des normes sociales et à une sorte d'actualisation des réalités sociales relatives leur sexualité.

**Mots clés :** comportements sexuels, structures familiales, jeunes, Comè.

**CL-CO-29****CONNAISSANCES ET PRATIQUES DE L'ALLAITEMENT MATERNEL EXCLUSIF (AME) CHEZ LES MÈRES D'ENFANTS DE 0 À 24 MOIS MALNUTRIS HOSPITALISÉS AU CENTRE DE RÉCUPÉRATION NUTRITIONNEL INTENSIF (CRENI) DE L'HÔPITAL NATIONAL LAMORDÉ (HNL), NIGER**Nouhou Ma<sup>1</sup>, Alkassoum Si<sup>2</sup>, Goni Alassan Mb<sup>3</sup>, Tiekoura Bd<sup>4</sup>, Aboubacar S<sup>4</sup><sup>1</sup>Faculté des Sciences de la Santé, Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger<sup>2</sup> Faculté des sciences de la Santé, Département de santé publique, Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger<sup>3</sup>Direction de la Surveillance et la Riposte aux Epidémies, MSP, Niamey, Niger<sup>4</sup>Hôpital National de Lamordé, Niamey, Niger\* **Auteur correspondant:** [ibrahim\\_alkassoum@yahoo.fr](mailto:ibrahim_alkassoum@yahoo.fr)<sup>1</sup> Doctorante en sociologie de développement à l'Université d'Abomey-Calavi (UAC-Bénin)<sup>2</sup> Professeur titulaire, Anthropologue de la santé, à l'UAC (Bénin)

**Introduction :** Malgré ses avantages sur la santé des enfants, l'allaitement maternel exclusif demeure une pratique peu courante au Niger. L'objectif de l'étude est d'étudier les connaissances et pratiques de l'allaitement maternel exclusif chez les mères d'enfants de 0 à 24 mois malnutris hospitalisés au CRENI de l'HNL.

**Méthode :** Il s'agit d'une étude transversale sur une période de 5 mois, du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Mai 2019. Était inclus tout couple mère-enfant malnutri âgé de 0 à 24 mois hospitalisé dans ce centre pendant la période de l'étude. Les données ont été recueillies à l'aide d'un guide d'entretien adressé aux mères et complété par les dossiers des enfants. L'analyse a été faite sur Epi info 3.5.4 et Stata 13. Le test de khi<sup>2</sup> a été utilisé pour mettre en évidence la relation entre les différentes variables. Le test est significative si  $p < 0,05$ .

**Résultats :** L'âge moyen des mères était de 24,80 ans ( $\pm 6,10$ ans) et la tranche d'âge de 20 à 29 ans était la plus représentée avec 59,60%. La résidence des mères était le milieu rural (60,80%) et 63,20% étaient non scolarisées. Les enfants d'âge de 6 à 24 mois représentaient 89,20% et ils étaient hospitalisés pour marasme dans 92,80%. L'allaitement maternel exclusif était pratiqué chez 2,40% et 70,96% des mères déclaraient avoir suivi le conseil d'un agent de santé pour le faire. La consultation prénatale (CPN)  $\geq 4$  ( $p = 0,0001$ ), le soutien du mari ( $p = 0,0001$ ) étaient statistiquement corrélés avec la connaissance de l'AME tandis qu'il n'existait pas de corrélation entre niveau d'instruction ( $p = 0,06$ ) et la connaissance de l'AME.

**Conclusion :** Une étude approfondie des facteurs socio-anthropologiques est indispensable en vue de réajuster les stratégies actuelles de la promotion de l'AME au Niger.

**Mots clés :** Allaitement maternel exclusif, malnutris, Niger

### CL-CO-30

#### DONNEES METABOLIQUES DES FOOTBALLEURS D'ELITES AU COURS D'UN MATCH EPROUVANT DANS UN ENVIRONNEMENT CHAUD ET HUMIDE

Jean-Michel BAZABA KAYILOU<sup>1,2</sup>, Judith Fifamin AHOUNOU AÏKPE<sup>1</sup>, Jean-Benoît GODONOU<sup>1</sup>  
Joachim Djimon GBENOU<sup>3</sup>, Pierre Houndjovi DANSOU<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Unité de Recherche en Physiologie de l'Effort (URPEF), Institut National de la Recherche de l'Education Physique et du Sport (INJEPS), Université d'Abomey Calavi, 01 BP 169, Bénin

<sup>2</sup>Laboratoire de Physiologie de l'Effort et Biomécanique (LAPEFB), Université Marien Nguabi. BP 69 Brazzaville, R. Congo

<sup>3</sup>Laboratoire de Pharmacognosie et des Huiles Essentiels (LAPHE), Faculté des Sciences de la Santé, Faculté des Sciences et Techniques, Université d'Abomey Calavi. 01BP 918 Cotonou, Bénin

**Introduction :** Le football est un sport de masse, pratiqué en plein air qui expose les joueurs à des conditions climatiques peu favorables à la réalisation des bonnes performances. Cette étude a eu pour objectif de déterminer le profil métabolique au cours d'un match éprouvant de football au championnat national d'élite Congolaise.

**Méthodes :** Des paramètres physiologiques et métaboliques ont été mesurés dans cette étude. Les paramètres physiologiques étaient constitués de la perte hydrique et de la fréquence cardiaque. Par contre les paramètres métaboliques étaient l'ionogramme sanguin, le taux de lactate sanguin, la créatinine et la glycémie.

**Résultats :** Les résultats obtenus indiquent une baisse de l'intensité de jeu pendant le match dans un environnement chaud et humide. Une perte hydrique, une augmentation du taux de lactate et une baisse de la glycémie ont été observées à la fin du match. En plus, la

détermination du débit de filtration glomérulaire estimé a permis de mettre en évidence une insuffisance rénale transitoire chez les footballeurs de l'élite Congolaise.

**Conclusion :** Ces résultats montrent l'importance du suivi physiologique et biologique des footballeurs exerçant dans un environnement chaud pour l'optimisation de leur performance et la préservation de leur santé.

**Mots clés :** Footballeurs, Match éprouvant

### CL-CO-31

#### VOULOIR, MAIS NE PAS POUVOIR: REALITES DES BESOINS NON SATISFAITS EN CONTRACEPTION CHEZ LES FEMMES EN POST-PARTUM DANS LE NORD DU BENIN

Fanny Hounkponou<sup>1</sup>, Chabi Olaniran Alphonse Biaou<sup>2</sup>, Yolaine Glèlè Ahanhanzo<sup>2</sup>, Candide Russel Dos-Santos<sup>1</sup>, Aurelle Ahouingnan<sup>1</sup>, Awadé Achille Obossou<sup>1</sup>, Rachidi Sidi Imorou<sup>1</sup>, Mahublo Vodouhe<sup>1</sup>, Hubert Laourou<sup>3</sup>, Kabibou Salifou<sup>1</sup>, René Xavier Perrin<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Faculté de médecine, Université de Parakou, Parakou, Bénin

<sup>2</sup>Department d'épidémiologie et de biostatistique, Institut Régional de Santé publique, Ouidah, Bénin

<sup>3</sup>Département de Santé publique, Université Claude Bernard Lyon 1, France

<sup>4</sup>Faculté des sciences de la santé, Université d'Abomey Calavi, Cotonou, Bénin

**Contexte :** Résoudre la problématique des besoins non satisfaits en contraception constitue un important défi à relever pour l'amélioration de l'état de santé des femmes, notamment, celles se trouvant dans le post-partum. La présente étude été menée pour déterminer l'ampleur des besoins non satisfaits durant le post-partum ainsi que les facteurs associés en population générale à Parakou, une ville au Nord du Bénin.

**Méthode :** Il s'est agi d'une enquête transversale réalisée en 2018 et qui a concerné les femmes en période post-partum dans la commune de Parakou. Elles étaient sélectionnées par la technique de sondage aléatoire à deux degrés. Les variables explicatives comprenaient les caractéristiques sociodémographiques et l'histoire reproductive. Un modèle de régression logistique a été utilisé pour identifier les facteurs associés aux besoins non satisfaits. Le seuil de significativité était de 5%.

**Résultats :** L'étude a inclus 453 femmes âgées de 27,1 ans  $\pm$  6 ans. Les BNS concernaient 340 femmes (75,06% ; IC95% : 71,1% – 79,0%). La prévalence des BNS diminuait significativement selon le niveau d'instruction du conjoint. Les autres facteurs associés comprenaient l'absence d'antécédent d'utilisation de méthode contraceptive (ORA=4,1 ; IC95% : 2,5 – 6,9), la non reprise des pratiques sexuelle (ORA=2,1 ; IC95% : 1,3 – 3,4) et la nécessité de l'autorisation du mari avant l'adoption d'une méthode contraceptive (ORA=2,2 ; IC95% : 1,3 – 3,6).

**Conclusion :** A Parakou, trois quarts des femmes dans le post-partum a des besoins non satisfaits en contraception. Des interventions contextualisées visant à inverser cette tendance doivent être pensées pour une réduction de la morbidité et la mortalité maternelle et périnatale à Parakou.

**Mots clés :** Besoins non satisfaits, contraception du Post partum, Bénin.

### CL-CO-32

#### PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES AU SEXTING CHEZ LES ETUDIANTS DES ECOLES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'UNIVERSITE DE PARAKOU (NORD BENIN) EN 2019.

Francis Tognon Tchegnonsi<sup>1</sup>, Chabi Olaniran Alphonse Biaou<sup>2</sup>, Elie Ataïgba<sup>1</sup>, Edmond Bodjrenou<sup>1</sup>, Anselme Djidonou<sup>1</sup>, Prosper Gandaho<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Faculté de Médecine, Université de Parakou ; Bénin

<sup>2</sup>Département d'Epidémiologie et de Biostatistiques, Institut Régional de Santé Publique ; Bénin

**Contexte** : Le sexting, pratique consistant en l'échange de contenus sexuellement explicites de soi ou d'autrui par le biais des nouvelles technologies de communication peut entraîner des conséquences psychosociales irréversibles et même dramatiques. Cette étude avait pour objectif de déterminer les facteurs associés à cette pratique en milieu universitaire à Parakou.

**Cadre et Méthodes** : Il s'est agi d'une étude transversale réalisée en 2019 et qui a concerné 525 étudiants sélectionnés par sondage en grappes. Les données étaient collectées au moyen d'un questionnaire auto administré comportant les informations sur les caractéristiques sociodémographiques, académiques, comportementales et celles liées à l'utilisation des Réseaux Sociaux. La définition du sexting utilisée est l'échange des contenus à connotation sexuelle durant les trois mois précédant l'enquête. L'analyse s'est basée sur une régression logistique multiple. Le seuil de significativité était de 5%.

**Résultats** : La prévalence du sexting était de 66,48% (IC95% : 64,20% ; 70,52%) ; et il faut noter que 29 (5,52%) des étudiants étaient des sextos actifs (Envoi uniquement), 86 (16,38%) étaient des sextos passifs (Réception uniquement) et 234 (67,05%) étaient des sextos mixtes. Les facteurs associés au sexting comprenaient la situation matrimoniale de l'étudiant (OR=3,33 ; p <000), la consommation d'alcool rarement/quelque fois (OR=1,73 ; p=, 013), la quête de nouveaux amis (OR=1,69 ; p=0,015), l'appartenance à un forum traitant de la sexualité (OR=3,59 ; p<0,001) et le niveau d'addiction élevé à WhatsApp (OR=2,04 ; p=0,008).

**Conclusion** : Face à l'ampleur du sexting en milieu universitaire, un plan de communication contextualisé doit être envisagé pour une prévention efficiente des dommages attribuables à une telle pratique.

**Mots clés** : Sexting, facteurs associés, Bénin

### CL-CO-33

#### FACTEURS ASSOCIES A LA RETICENCE AU DON BENEVOLE DE SANG DANS LA COMMUNE DE PARAKOU(BENIN) EN 2018

Fanny Hounkponou<sup>1</sup>, Delphin Aïdewou<sup>1</sup>, Aurelle Ahouingnan<sup>1</sup>, Raymonde Affokpa<sup>2</sup>, Chabi Olaniran Alphonse Biaou<sup>3</sup>, Thierry Adoukonou<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Faculté de médecine, Université de Parakou, Parakou, Bénin

<sup>2</sup>Ecole Nationale de formation des Techniciens Supérieurs en Santé publique et en surveillance épidémiologique, Université de Parakou, Parakou, Bénin

<sup>3</sup>Département d'épidémiologie et de biostatistique, Institut Régional de Santé publique, Ouidah, Bénin

**Introduction** : Cette étude avait pour objectif d'étudier les facteurs associés à la réticence au don bénévole de sang à Parakou (Bénin) en 2018.

**Méthode** : Il s'agissait d'une étude transversale et analytique ayant porté sur 588 sujets majeurs, résidant dans la commune de à Parakou et idem de toute contre-indication majeure déclarée à la transfusion sanguine (diabète ; drépanocytose ; tuberculose ; hépatites ; VIH/SIDA. Les sujets ont été sélectionnés selon un sondage en grappes. Les données ont été collectées par un entretien semi structuré face à face. Elles ont été saisies dans le logiciel Epi data 3.1. et analysées dans le logiciel Epi info version 7.1.3.3.

**Résultats** : La sex ratio était de 1,83. La moyenne d'âge des participants était de 27,16±7,38 ans avec les extrêmes allant de 19 ans à 61 ans. Dans notre étude, 446 sujets n'avaient jamais fait un don de sang ou l'avaient fait puis abandonné. La prévalence de la réticence au don de sang était estimée à 75,85%. La profession ( $p=0,0252$ ), le milieu de résidence ( $p=0,0001$ ), le niveau d'étude ( $p=0,0004$ ), le profil du receveur de sang ( $p=0,0001$ ), la source d'information ( $p=0,0230$ ), l'antécédent de transfusion ( $p=0,0011$ ) et l'existence d'inconvénients déclarés liés au don de sang ( $p=0,0000$ ) étaient associés à la réticence au don bénévole de sang.

**Conclusion** : La réticence au don de sang demeure un problème de santé à Parakou. Des mesures doivent donc être prises pour améliorer l'acceptabilité des populations.

**Mots clés** : Facteurs associés, réticence au don de sang, Bénin

#### CL-CO-34

### ÉTUDE DES FACTEURS ASSOCIES A L'UTILISATION DE LA MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES A LONGUE DUREE D'ACTION DANS LES ECOLES CORANIQUES DU DISTRICT SANITAIRE DE DAROU MOUSTY/ SENEGAL

DIOP Cheikh Tacko, Ka Ousseynou

Université Alioune DIOP de Bambey / Centre hospitalier Universitaire de Fann

L'utilisation de la MILDA pose encore problème au Sénégal en dépit des efforts consentis le PNLP et les partenaires pour en assurer la disponibilité. L'objectif général était d'étudier les déterminants liés à l'utilisation de la MILDA dans les écoles coraniques (dahras) de Darou Mousty.

Une étude transversale, descriptive et analytique sur les talibés et les marabouts, a été menée du 31 décembre 2015 au 4 janvier 2016. L'administration des questionnaires s'est faite par entretien individuel après un consentement. Les données ont porté sur les caractéristiques sociodémographiques, environnementales, les connaissances, utilité sur le paludisme et la MILDA et l'utilisation d'autres moyens de protection. Elles ont été saisies et analysées avec le logiciel EPI INFO version 3.5.3 avec un intervalle de confiance de 95%.

Au total, 400 talibés et 40 marabouts ont été enrôlés. L'âge moyen des talibés était de 10,7 ans  $\pm$  2,6 ; le sex-ratio H/F de 15,7. La disponibilité de la MILDA était de 36,8%, le taux d'utilisation de la MILDA de 33,9%. L'utilisation était statistiquement liée à : l'ancienneté des talibés dans le dahra ( $p= 0,03$ ), le sexe féminin (OR= 10 ; IC=[1,4- 25]), le lieu de couchage ( $p= 0,0029$ ), l'information reçue sur la MILDA par le talibé et le marabout avec respectivement (OR= 4,2 ; IC=[1,3 -17,9] ; OR= 3,6 ; IC=[2,1 - 6,3]), l'ordre reçu du marabout (OR= 1,8 ; IC=[1,1 - 3,3]), la connaissance des talibés de l'utilité de la MILDA comme moyen d'éviction du paludisme (OR= 2,7 ; IC=[1,5 - 4,6]), la connaissance des talibés du mode de transmission du paludisme (OR= 1,8 ; IC=[1,0 - 3,3]), l'utilisation d'insecticides .

L'utilisation nécessite le renforcement des connaissances, la distribution de masse et de routine et l'appui des partenaires.

**Mots clés** : Moustiquaires, École, Sénégal

#### CL-CO-35

### ÉTUDE DES DETERMINANTS DE L'ADHESION DES POPULATIONS AUX MUTUELLES DE SANTE EN 2015 DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE GUEDIAWAYE (SENEGAL)

Diop Cheikh Tacko, Ka Ousseynou

Université Alioune DIOP de Bambey / Centre hospitalier Universitaire de Fann

Le financement de la santé continue d'être un défi majeur dans les pays à revenu faible. L'objectif de notre étude est d'apprécier le niveau d'adhésion aux mutuelles de santé et d'en étudier les facteurs déterminants.

L'étude était transversale, descriptive et analytique. Elle a porté sur les chefs de ménage choisi par un échantillonnage en grappes du 21 au 31 décembre 2015. Les caractéristiques socioéconomiques, liées aux ménages, les facteurs liés à l'offre de soins et les ceux liés aux mutuelles de santé ont été collectés. Ces données ont été saisies et analysées sur Epi Info 2000 version 3.5.3. La valeur de significativité était  $p < 0,05$ . L'Odds ratio était utilisé pour mesurer la force du lien.

L'étude a porté sur 300 chefs de ménage dont 90% résidant en zone rurale. La moyenne d'âge était de 49,7 ans et 93% étaient de sexe masculin. Le taux d'adhésion globale était de 16,7%. L'analyse a montré que l'adhésion à l'UDAM était influencée par le sexe avec  $p = 0,033$  et  $OR = 2,74$  (IC à 95% : 1,04- 7,19). Il y avait également un lien significatif entre le niveau d'instruction et l'adhésion aux mutuelles de santé avec  $p = 0,001$  et  $OR = 3,71$  (IC à 95% : 1,97- 6,99). Dans l'offre de service, la qualité de la prescription médicale incité certaines personnes à adhérer aux mutuelles de santé avec  $p = 0,020$  et  $OR = 2,12$  (IC à 95% : 1,12- 4). Parmi les facteurs liés aux mutuelles de santé, l'accès à l'information sur l'existence de ces dernières a influencé l'adhésion avec  $p = 0,001$  et  $OR = 22,22$  (IC à 95% : 3,01- 163,84).

Cette étude a permis non seulement de constater le faible niveau d'adhésion et identifier les facteurs qui influencent l'adhésion aux mutuelles de santé.

**Mots clés :** Mutuelle, adhésion, Sénégal

### CL-CO-36

#### ENQUÊTE ETHNOBOTANIQUE PORTANT SUR LES PLANTES UTILISEES DANS LE TRAITEMENT DE L'INFERTILITE MASCULINE AU BENIN

Azonbakin S<sup>(1)</sup>, Dangbemey P<sup>(2)</sup>, Osseni R<sup>(1)</sup>, Kora F<sup>(1)</sup>, Yaude A<sup>(1)</sup>, Adovoekpe D<sup>(1)</sup>, Awede B<sup>(3)</sup>, Djego F<sup>(4)</sup>, Laleye A<sup>(1)</sup>.

- 1- Laboratoire d'Histologie, Biologie de la Reproduction, Cytogénétique et Génétique Médicale, Faculté des Sciences de la Santé-Université d'Abomey-Calavi
- 2- Service de Gynécologie-Obstétrique- Centre Hospitalier et Universitaire de la Mère et de l'Enfant ( CHU-MEL)
- 3- Unité de Physiologie Humaine, Faculté des Sciences de la Santé-Université d'Abomey-Calavi
- 4- Laboratoire d'Ecologie Appliquée, Faculté des Sciences Agronomiques, Université d'Abomey-Calavi

Auteur correspondant : Dr Simon AZONBAKIN, Médecin Biologiste, Maître Assistant en Histologie-Embryologie-Cytogénétique

Faculté des Sciences de la Santé-Université d'Abomey-Calavi-Bénin . Tel: 00229 97 13 00 61

e-mail: [azandeg@yahoo.fr](mailto:azandeg@yahoo.fr)

L'infertilité du couple concerne environ 15% de la population en Afrique subsaharienne et a une implication socioculturelle importante au Bénin, l'un des objectifs du mariage étant la procréation. Le but du présent travail est de contribuer à l'étude des principales plantes médicinales utilisées en médecine traditionnelle pour le traitement de l'infertilité masculine dans les départements de l'Atacora et de l'Atlantique au Bénin. Elle s'est déroulée auprès de 80 praticiens dont 60 tradithérapeutes, 11 personnes ressources et 9 vendeuses de plantes. L'étude a permis de recenser 109 espèces de plantes. Ces espèces appartiennent à 101 genres

et sont réparties en 54 familles. Les feuilles sont majoritairement utilisées (35,77%) suivies des racines (29,93%) tandis que les autres parties (fruit, écorce, graines, plante entière, tige feuillée...) sont moins utilisées dans la préparation des recettes. La décoction est le mode de préparation majoritairement utilisée soit 33,55% suivie de la macération 27,63 % et de la poudre 25,66%. La trituration et l'infusion sont moins employées à des fréquences respectives de 11,84% et 1,32%. Ces résultats ont permis de montrer la richesse de la flore béninoise en ressources pour la prise en charge de l'infertilité masculine.

**Mots clés** : infertilité masculine, plantes médicinales, Atlantique, Atacora

### CL-CO-37

#### PHYTOMEDICAMENT "MEDOLEME" UTILISE DANS LA PRISE EN CHARGE DES IST/VIH/SIDA EN AFRIQUE DE L'OUEST : CONNAISSANCES ENDOGENES DES TRADITHERAPEUTES DU TOGO SUR L'UTILISATION DES PLANTES CONSTITUTIVES EN RECETTES UNIQUES.

Koudouvo Koffi<sup>1,\*</sup>, Tougoma Atèhèzi<sup>1</sup>, Adzavon Yao Mawulikplimi<sup>2</sup>, Esseh Komlavi<sup>1</sup>, Agbonon Amegnona<sup>1</sup>, Gbéassor Messanvi<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Centre de Recherche et de Formation sur les Plantes médicinales (CERFOPLAM), Laboratoire de Physiologie et Pharmacologie des Substances Naturelles, Faculté des Sciences(FDS) Université de Lomé(UL), Lomé-TOGO.

<sup>2</sup>College of Biomedical Engineering, University Of Technology, Beijing (P.R. CHINE).

\* Correspondance: Koudouvo Koffi, Département de Physiologie Animale, FDS/UL, Lomé-TOGO, Mobile: +228 90 05 52 04/99 43 25 04; E-mail: [kkoudouvo@gmail.com](mailto:kkoudouvo@gmail.com)

**Introduction:** Le phytomédicament togolais "Mèdolémè", produit par un praticien de la médecine traditionnel (PMT) togolais depuis les années 2000 et utilisé dans la sous-région ouest-africaine dans la prise en charge des IST/VIH/SIDA, n'a pas été depuis là l'objet d'études précliniques sur son efficacité, sa qualité et son innocuité avant 2015. C'est dès lors, que le CERFOPLAM de l'UL, sollicité pour sa valorisation, a entrepris avant d'entamer des tests de laboratoire, des enquêtes ethnobotaniques auprès des PMT à travers tout le Togo pour s'enquérir des connaissances endogènes sur les espèces végétales qui composent le produit.

**Méthode:** Interview semi structurée et réunions en groupes focaux ont servi pour collecter les données ethnopharmacologiques sur l'utilisation en médecine traditionnelle togolaise, des espèces composant Mèdolémè, en recettes uniques. Les noms des plantes en langues locales, les parties utilisées, les modes de préparation, les voies d'administration et les maladies traitées, ont été les caractéristiques recherchées.

**Résultats:** Sur 75 PMT sélectionnés pour l'étude, les 67 qui y ont participé (63 hommes et 4 femmes) sont âgés entre 18 et 80 ans et d'expérience professionnelle entre 1 à 55 ans. Les 253 recettes en plantes uniques recensées sont préparées majoritairement en décoction et en macération puis administrées principalement par voie orale. Feuilles (33,67%) et racines (20,60%) ont été les organes les plus utilisés. Vers intestinaux, paludisme, hémorroïde, helminthiases, abcès et maladies infectieuses ont été les pathologies les plus citées sur les 64 recensées. Douze (12) de ces pathologies sont relatives aux IST et maladies opportunistes du VIH/SIDA parmi lesquelles hémorroïde, abcès, infections diverses, diarrhée, perte de mémoire et mycoses ont été les plus citées.

**Conclusion:** La diversité de recettes en plante unique par les espèces composant Mèdolémè prouve que les PMT togolais en ont bien connaissance. Des tests de laboratoire sur les maladies infectieuses en sont envisagés.

**Mots clés :** Phytomédicament "Mèdolémè", plantes constitutives, IST/VIH/SIDA.

### CL-CO-38

#### **RAIDEUR POST-TRAUMATIQUE DES MEMBRES PELVIENS AU CNHU-HKM DE COTONOU : RESULTATS REEDUCATIFS.**

Alagnide H Etienne, Setondji Kn Fabrice, Niama Natta D Didier, Kogo Daniel, Anani Yves, Olouka Jean, Kpadonou G Toussaint.

Clinique Universitaire de Médecine Physique et de Réadaptation/ CNHU-HKM (Cotonou-Bénin)

**Contexte :** La marche est la principale fonction motrice de l'espèce humaine. Elle peut être entravée par les raideurs articulaires des membres pelviens. Ces dernières sont de causes très variables, les traumatismes étant très fréquents. Objectif : Evaluer les raideurs post-traumatiques des membres pelviens en rééducation fonctionnelle au CNHU-HKM de Cotonou.

**Méthodologie :** Etude transversale de type descriptif et analytique, menée de Juin à Août 2019. Elle a fait inclure 366 dossiers renseignant de patients suivis en rééducation de 2009 à 2018 et qui ont présenté de raideur sur la hanche, le genou et/ou la cheville. Cette dernière a été définie tenant compte des amplitudes de ces articulations indispensables pour une montée et descente des escaliers. Le résultat de la rééducation a été évalué en comparant la sévérité de la raideur articulaire entre le début et la fin des séances de rééducation fonctionnelle.

**Résultats :** La prévalence des RPT/MP dans le service a été de 3,81% (761 cas). Des 366 cas rééduqués, l'âge moyen était de  $43,5 \pm 14,7$  ans et la sex-ratio de 1,3. Le principal traumatisme causal était les fractures (92,4%). Le délai moyen entre traumatisme a été de  $19,6 \pm 40,1$  semaines. Les raideurs des genoux, chevilles et hanches ont été respectivement de 59,6, 46,7 et 12,6%. La sévérité des raideurs a été plus marquée au niveau de la cheville. Ont été essentiellement associées aux RPT/MP, parésie (98,9%) et douleur (92,3%). Les patients ont eu  $21 \pm 9$  séances de kinésithérapie. Les résultats ont été au moins bons (69,4%). Ont été significativement associés aux résultats à la hanche et au genou, le type de traitement chirurgical ( $p=0,03$ ). Le délai du traitement rééducatif a conditionné le résultat du genou ( $p=0,00$ ).

**Conclusion :** La précocité des séances de rééducation fonctionnelle est déterminante pour limiter les conséquences des RPT/MP.

**Mots-clés :** Raideurs, membres pelviens, résultats, Cotonou.

### CL-CO-39

#### **ETUDE DES REPRESENTATIONS DE LA POPULATION SUR LA MALADIE A CORONAVIRUS ET DES MESURES DE LUTTE EN COTE D'IVOIRE EN 2020**

Aka Lbn, Ekra Kd, Sable S, Aka Da, Orsot Te, Ekou Fk, Kpebo Dod, Dagnan Ns

Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan Cocody, Côte d'Ivoire

**Introduction :** La pandémie du Covid-19 a amené la Côte d'Ivoire à prendre des mesures administratives couplées à des mesures sanitaires. La présente étude nous a permis d'étudier

les connaissances, attitudes et pratiques des ménages sur la Covid-19 en vue d'une bonne mise en œuvre des mesures barrières.

**Méthodes :** Nous avons réalisé une étude transversale analytique couplée à une enquête qualitative, stratifiée en zone ayant connu des cas de Covid-19 (région d'Abidjan) versus une zone non Covid (région du Bélier) en juin 2020.

**Résultats :** Au total 426 personnes ont été enquêtées soit 330 pour l'enquête quantitative et 196 pour l'enquête qualitative. Le niveau de connaissance des enquêtés était moyen marqué par une méconnaissance des moyens de prévention et était moins bonnes en zone non Covid versus la zone Covid. Les attitudes étaient bonnes dans l'ensemble sans différence entre les 2 zones. Vivre en urbain réduisait de 79% le risque d'avoir des attitudes non conformes en comparaison au milieu rural. Quant aux pratiques, elles étaient acceptables dans les 2 zones mais meilleure en zone Covid.

Les Obstacles à la mise en œuvre des mesures de riposte identifiées au cours de notre étude étaient : l'absence d'approche communautaire et la sensibilisation insuffisante, l'existence de canaux d'informations multiples et contradictoires, l'existence des rumeurs et des fausses informations et les sentiments de vulnérabilité face à l'absence de traitement

**Conclusion :** Des efforts restaient à faire pour améliorer la sensibilisation des populations en vue d'une meilleure connaissance de la Covid-19 et d'une mise en œuvre des mesures de lutte par une approche communautaire. Elle a permis d'identifier les obstacles à la mise en œuvre de la réponse au niveau communautaire et de cerner les attentes des populations.

**Mots clés :** Représentation, populations, Covid 19

#### CL-CO-40

#### ÉVALUATION DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ SUR LA COVID-19 DANS LES STRUCTURES SANITAIRES DE CÔTE D'IVOIRE EN 2020

Ekra KD, Aka LBN, Ekou FK, Ano MN, Orsot TE, Kpebo DOD, Okoubo G, Sable S, Aka DA, Dagnan NS.

Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan Cocody, Côte d'Ivoire

**Introduction :** La pandémie de la Covid-19 a entraîné l'élaboration de stratégies de riposte impliquant le personnel de santé. Cette étude avait pour objectif d'évaluer les connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de santé sur la Covid-19 et sur les mesures de lutte dans les structures sanitaires de Côte d'Ivoire en 2020.

**Méthodologie :** Il s'agissait d'une étude transversale à visée analytique dans les structures sanitaires, stratifiée en zone Covid-19 (Région d'Abidjan) et une zone non Covid-19 (Région du Bélier). La population d'étude était constituée des professionnels de santé stratifiés en médecins et paramédicaux. Les niveaux de connaissances et de pratiques ont été scorés. Une modélisation par régression logistique binaire a été effectuée pour identifier les facteurs associés aux bonnes pratiques.

**Résultats :** La connaissance sur la Covid-19 des professionnels de santé des centres de prélèvement était plus élevée que celle des autres agents centres quel que soit la profession considérée. Tous les professionnels de santé avaient reconnu être des personnes à haut risque de contamination et étaient animés par un sentiment de peur et d'inquiétude du fait d'un mauvais usage du matériel de protection pour ceux des centres de prélèvement (34,8%) et d'une insuffisance de ce matériel pour ceux des autres centres (31,5%). Les professionnels des centres de prélèvement avaient des scores de bonnes pratiques de protection individuelle et

collective supérieurs à ceux des autres centres (1,25 vs 0,25). Il en était de même pour les médecins comparés aux paramédicaux.

**Conclusion :** Cette étude a permis de déterminer le niveau de connaissances des professionnels de la santé et leurs pratiques face à la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire et de faire propositions afin d'améliorer leur implication dans la lutte contre cette maladie.

**Mots-clés :** Covid-19, Professionnels de santé, Côte d'Ivoire

## CL-CO-41

### CONNAISSANCES ATTITUDES ET PRATIQUES DES POPULATIONS RELATIVES A LA COVID-19 AU BENIN

Nonvignon Marius Kêdoté<sup>1,2</sup>, Claude-Gervais Assogba<sup>3</sup>, Roch Houngnihin<sup>4</sup>, Joaquin Darboux<sup>2</sup>, Luc Djogbénou<sup>1</sup>,

1. *Département Santé Environnement, Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum, Université d'Abomey-Calavi, Bénin, [mkedote@irsp-oudah.org](mailto:mkedote@irsp-oudah.org)*
2. *Chaire ECOSANTE, Université d'Abomey-Calavi, Bénin*
3. *Laboratoire de Recherche sur l'Innovation pour le Développement Agricole, Faculté d'Agronomie, Université de Parakou, Bénin*
4. *Laboratoire d'anthropologie médicale appliquée, Université d'Abomey-Calavi, Bénin*

**Introduction :** Parmi les mesures de riposte contre la COVID-19 au Bénin, on compte la diffusion de messages de sensibilisation par différents canaux invitant les populations à adopter des pratiques en vue de contenir la propagation de l'épidémie dans le pays.

L'objectif de cette communication est d'identifier les connaissances et pratiques liées à la COVID-19.

**Méthodes :** Deux enquêtes sur les connaissances, attitudes et pratiques ont été conduites. La première est de type qualitatif, à l'aide d'un guide d'entretien approfondi chez 60 personnes sélectionnées par commodité en population générale dans trois communes (Porto-Novo, Cotonou et Abomey-Calavi) situées dans le cordon sanitaire précédemment instauré au Sud du Bénin. Elle a permis d'identifier des tendances pour construire le questionnaire servant à la seconde de type quantitatif auprès des personnes aussi positives que négatives (cette collecte de données est toujours en cours). Les données collectées dans le cadre de l'étude qualitative ont fait l'objet d'une description et d'une analyse compréhensive des informations.

**Résultats :** La première étude révèle des connaissances sur la COVID-19 et les mesures de riposte en fonction des catégories socio-professionnelles. Au sujet des attitudes, il y a une méfiance des enquêtés quant aux sources d'informations. Et une catégorie de personnes ne se sentent nullement menacées par la COVID-19.

En termes de pratiques, il y a également une grande variation entre les classes socio-professionnelles. La désinfection des objets à la maison et au travail, l'évitement du transport en commun, le port de masque avant de se rendre à des manifestations, la prière, la prise d'un traitement préventif sont les différentes mesures prises par les enquêtés pour se prémunir de la maladie.

**Conclusion :** Dans le but d'assurer au mieux la lutte contre la propagation et par conséquent, l'éradication du nouveau coronavirus au Bénin, il faudra tenir compte de la disparité en termes de connaissances et de pratiques des populations au regard de la COVID-19 au Bénin.

**Mots clés :** COVID-19, CAP, Bénin.

**CL-CO-42****TINEA PEDIS ET ONYCHOLYSE A CYLINDROCARPON LICHENICOLA CONFIRME PAR SEQUENÇAGE CHEZ UNE JEUNE BENINOISE IMMUNOCOMPETENTE.**

Sissinto Savi De Tove Y<sup>1</sup>, Wakpo A<sup>13</sup>, Degboe B<sup>2</sup>, Affolabi D<sup>1</sup>, Atadopkede F<sup>2</sup>, Adegbedi H<sup>2</sup>, Ogouyemi Hounto A<sup>1</sup> Massougboji A<sup>1</sup>, Pihet M<sup>4</sup>, Bouchara Jp<sup>4</sup>, Denning W<sup>5</sup> D, Kinde-Gazard D<sup>1</sup>.

- 1- *Laboratoire de Parasitologie- Mycologie. Service de microbiologie du Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou. Cadjèhoun 01 BP 386. Cotonou, Bénin.*
- 2- *Service de dermatologie et de vénérologie du Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou. Cadjèhoun 01 BP 386. Cotonou, Bénin.*
- 3- *Centre Universitaire et Hospitalier de Liège Belgique*
- 4- *Université Cheik AntaDiop. BP5005 Dakar Sénégal.*
- 5- *The National Aspergillosis Centre, UK University Hospital of South Manchester M23 9LT UK and in association with LIFE (www.LIFE-Worldwide.org)*

**Objectif** : nous rapportons un premier cas de *Tinea pedis* associé à une onycholyse due à *Cylindrocarpon lichenicola* confirmé par un séquençage.

**Observation**: il s'est agi d'une patiente de 39 ans adressée par le service de dermatologie au service de parasitologie-mycologie du Centre National Hospitalier de Cotonou au Bénin pour un examen mycologique d'un prélèvement de pied d'athlète siégeant au niveau des quatrièmes espaces interorteils associés à une onycholyse des ongles des pieds et des mains évoluant depuis deux ans. L'examen mycologique direct a montré la présence de filaments hyalins septés dans les squames et dans les ongles. Après culture sur milieu de sabouraud gentamycine-chloramphenicol à 27°C, les colonies apparaissent après 48 h, roses cotonneuses avec un pigment marron au verso évoquant le genre *Fusarium*. L'examen microscopique des colonies a objectivé des chlamydospores et des macroconidies septés non arquées de 2 à plusieurs logettes faisant évoquer *Fusarium oxysporum* et *Cylindrocarpon lichenicola*. Les macroconidies de cette dernière espèce sont droites et possèdent une de leur extrémité arrondie et l'autre éfilée. Nous avons retenu le diagnostic de *Cylindrocarpon lichenicola* (macroconidies non arquées) confirmé par un séquençage. La patiente a été mise sous kétoconazole, puis terbinafine après l'identification mycologique, l'évolution a été favorable.

**Conclusion** : cette observation met en évidence la difficulté du diagnostic mycologique de l'espèce *Cylindrocarpon lichenicola*.

**Mots clés**: *Cylindrocarpon lichenicola*, *Tinea Pedis*, ongles, Bénin.

## COMMUNICATIONS AFFICHEES

### AXE 1 : SANTE PUBLIQUE

#### SS-CA-01

#### PERFORMANCE DE MARCHÉ DE PATIENTS HÉMIPLÉGIQUES CHRONIQUES D'ORIGINE VASCULAIRE : ETUDE COMPARATIVE A PARTIR DE PARCOURS DE SOINS.

Oscar D. Aze<sup>1, 2</sup>, Etienne Ojardias<sup>1,3</sup>, Thierry Adoukonou<sup>4,5</sup>, Diana Rimaud<sup>1</sup>, Hermès Gbaguidi<sup>2</sup>, Oyéné Kossi<sup>4,5</sup>, Barnabé Akplogan<sup>2</sup>, Paul Calmels<sup>1</sup>, Pascal Giraux<sup>1,5</sup>

<sup>1</sup> Unité de Recherche : Déficiences, Activités Physiques Adaptées et Réhabilitation du Laboratoire des Sciences de la Vie de la Santé. Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique et du Sport/Université d'Abomey-Calavi (INJEPS/UAC), 01 BP 169, Porto-Novo, Bénin

<sup>2</sup> Université de Lyon, UJM-Saint-Etienne, LIBM, EA 7424, F-42023, SAINT-ETIENNE, France

<sup>3</sup> CHU Saint-Etienne, Service Médecine Physique et Réadaptation, F-42055, SAINT-ETIENNE, France

<sup>4</sup> UER Neurologie, Faculté de Médecine Parakou 03BP : 10 Parakou, Bénin

<sup>5</sup> Unité de Neurologie Centre Hospitalier Universitaire Départemental du Borgou BP : 02, Parakou, Bénin Auteur correspondant : AZE Oscar, e-mail : [oscar.aze@yahoo.fr](mailto:oscar.aze@yahoo.fr)

**Introduction :** La rééducation/réadaptation est un moyen efficace pour contrer les impacts : sanitaire, économique et social, très lourds que subissent les survivants d'AVC et pour favoriser une bonne récupération. Il importe d'évaluer l'impact de cette récupération en prenant pour repère le contexte économique changeant selon les régions.

**Objectifs :** comparer les performances de marche de patients hémiplegiques chroniques provenant de deux contextes différents de prise en charge en utilisant le test de marche de 6 minutes (6MWT).

**Méthodes :** Cette étude transversale comparative a été réalisée entre les Centres Hospitaliers Universitaires de Saint Etienne (CHUSE) et Départemental du Borgou (CHUDB) respectivement en France et au Bénin. 126 hémiplegiques (99 du CHUB) âgés en moyenne de  $56,8 \pm 9,3$  ans avec un AVC datant de  $26,5 \pm 35,6$  mois ont pris part à cette étude. À part les échelles fonctionnelles, l'évaluation a porté sur la performance de marche en endurance au 6MWT.

**Résultats :** Une comparaison du 6MWT entre le groupe des patients du CHUSE versus CHUDB a révélé une différence non significative ( $p = 0,382$ ) entre les performances des 2 groupes de patients : G\_CHUDB ( $303 \pm 115,1m$ ) versus G\_CHUSE ( $275,4 \pm 148,8m$ ). Une comparaison avec le test de Chi2 des performances de marche de G\_CHUDB versus G\_CHUSE selon la catégorie

de la Performance de marche (Mauvais Marcheur, Bon Marcheur et Excellent Marcheur) a montré une différence significative entre les 3 sous-groupes de distribution,  $p = 0,032$ .

**Conclusion :** cette étude indique que les performances de marche sont plus limitées qualitativement dans les progrès réalisables par les patients selon le contexte socio-économique de prise en charge de la réadaptation.

**Mots Clefs :** Hémiplégiques, Performance, Marche.

## SS-CA-02

### URINARY TRACT INFECTIONS IN BENIN: EXPLORING THE VIRULENCE FACTORS AND ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES AND VIRULENCE GENES AMONG BACTERIA ISOLATES

Phénix ASSOGBA<sup>1</sup>, Victorien DOUGNON<sup>1</sup>, Jerrold AGBANKPE<sup>1</sup>, Esther DEGUENON<sup>1</sup>, Kafayath FABIYI<sup>1</sup>, Edna HOUNSA<sup>1</sup>, Alidah ANIAMBOSSOU<sup>1</sup>, Jacques DOUGNON<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Research Unit in Applied Microbiology and Pharmacology of natural substances, Research Laboratory in Applied Biology, Polytechnic School of Abomey-Calavi, University of Abomey-Calavi, Benin

Authors Correspondance: DOUGNON T. Victorien, Tel: 97736446, Email: [victorien.dougnon@gmail.com](mailto:victorien.dougnon@gmail.com)

**Aims:** Human infection is marked by the presence of a pathogenic microorganism in the body. Enterobacteria are the most incriminated in cases of urinary tract infection. These bacteria possess several virulence factors and mechanisms of antibiotic resistance, which determines their degree of pathogenicity. The aim of this study was to characterize the virulence and resistance genes of these Enterobacteriaceae responsible for urinary tract infections patients in Benin.

**Methods and Results:** To achieve this, the study was conducted on 230 strains of enterobacteria isolated from patients with urinary tract infections. These were *Escherichia coli* (75), *Klebsiella pneumonia* (60), *Enterobacter cloacae* (58), *Klebsiella oxytoca* (18), *Enterobacter aerogenes* (15), *Citrobacter diversus* (2) and *Morganella morganii* (2). The isolates were cultured onto Mueller Hinton agar and were subjected to various phenotypic and genotypic tests. The resistance to beta-lactamines and carbapenems was also characterized. The study shows that these bacteria possessed several types of virulence factors such as hemagglutination (28.26%), lipase production (23.92%) and hemolysin production (17.83%). Genotyping of virulence factors revealed the presence of FimH (74.79%), PapC (30.44%), Iss (11.34%) and Biofilm (3.92%) genes. The resistance genes such as Bla SHV (49.56%), BlaCTX-M15 and BlaCTX-M2 (33.92%), BlaCTX-M9 (19.13%) and blaCTX-M1 (11.74%) were also detected.

**Conclusions:** These results filled the national gap related to antimicrobial resistance. They can constitute some data for a better national health policy in Benin.

**Keywords:** Virulence factors, resistance gene, urinary tract infections.

**SS-CA-03****COVID-19 REVELATRICE D'UNE TUBERCULOSE PULMONAIRE :  
A PROPOS DE 2 CAS**

*Azon-Kouanou, A., Agbodande K.A., Wanvoegbe A.F., Missiho M.S.G, Dansou E., Sokadjo Y.M, Zannou D.M., Houngbé F.*

*Service de Médecine Interne du CNHU-HKM de Cotonou*

*Auteur correspondant : Azon-kouanou Angèle, email : angele.azonkouanou@gmail.com.*

Le SARS-cov-2 est l'agent pathogène responsable de la maladie Covid-19. Cette dernière peut provoquer des manifestations respiratoires allant de la forme modérée à la forme sévère avec risque de décès. La COVID-19 peut être révélatrice d'une tuberculose latente bien que les deux pathologies présentent des symptômes similaires. Le diagnostic dans ce cas n'est pas toujours aisé.

Nous rapportons ici deux cas de co-infection Covid-19-tuberculose pulmonaire diagnostiqués dans le service de médecine interne du CNHU-HKM de Cotonou. Les patients étaient infectés au SARS-cov-2 puis déclarés guéris après 2 tests PCR (sur le prélèvement nasopharyngé) revenus négatifs. Ils ont présenté quelques jours plus tard une fièvre associée à une toux grasse puis de dyspnée.

Le diagnostic d'une tuberculose pulmonaire a été posé suite à la présence de l'ADN du mycobacterium tuberculosis par la technique de GenXpert dans le liquide du tubage gastrique dans les 2 cas. L'imagerie thoracique faite (radiographie et angioscanner) avait montré de multiples foyers de condensations parenchymateux diffus, des plages de verres dépolis bilatéraux (spécifiques de lésions radiologiques post covid-19). L'évolution a été favorable avec disparition complète des signes respiratoires et de la fièvre au bout de 10 jours de traitement antituberculeux.

**Mots clés :** Tuberculose pulmonaire, Covid-19, dyspnée

**SS-CA-04****RISQUE D'ESCARRE CHEZ DES PATIENTS D'UN HOPITAL UNIVERSITAIRE DU BENIN : LE ROLE  
PROPRE INFIRMIER A L'EPREUVE**

*OTTI A., Infirmier, Ph.D.*

*Chef du Département des Sciences Infirmières*

*Institut National Médico-Sanitaire (INMeS)/Cotonou.*

*Université d'Abomey-Calavi, République du Bénin.*

*DHOSSOU K.G., Infirmier nutritionniste, Msc*

*Chef division IST-Groupe à Haut Risque  
Programme Santé de Lutte contre le SIDA  
Ministère de la santé  
République du Bénin.  
SANNY M. A. N., Infirmière généraliste, Bsc  
Hôpital de Zone de Natitingou  
République du Bénin.*

*AGUESSY VOGNON F. S., Infirmier généraliste, Bsc  
CIMBENIN  
République du Bénin.*

*L'identité et l'adresse de l'auteur correspondant  
OTTI André, Infirmier, Ph.D.  
Téléphones : + 229 64068282 ou 61989888  
E-mail : [androtti@ymail.com](mailto:androtti@ymail.com)*

**Introduction :** L'escarre, problème de santé publique, est souvent découverte à un stade avancé lors de la toilette du patient hospitalisé. Ceci ne devrait pas être le cas si à l'admission, l'évaluation des facteurs de risque est systématique.

**Méthodes :** A l'aide du jugement clinique infirmier basé sur la Démarche de Soins [1,2], des patients hospitalisés au Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert KOUTOUGOU MAGA de Cotonou ont été examinés afin d'identifier ceux à risque d'escarre et d'en évaluer la prévalence. L'instrument de mesure du risque d'escarre de Braden [3] et la grille descriptive des différents stades de développement de l'escarre du National Pressure Ulcer Advisory Panel [4] ont servi d'outils de collecte de données analysées selon la méthode de formulation des Diagnostics Infirmiers utilisant le système PES « Problème, Etiologie, Signes et Symptômes » [2].

**Résultats et discussion :** 37 des 104 patients examinés étaient à risque d'escarre (37,58%) (Diagnostics Infirmiers de risque). La prévalence de l'escarre était évaluée à 15,38% (16/104) (Diagnostics Infirmiers réels) avec une prédominance des escarres de stade II (11/16). Cette prévalence est plus élevée (43,24%) chez les patients à risque d'escarre identifiés (16/37), ce qui montre tout l'intérêt d'une évaluation systématique des facteurs de risque chez tout patient à l'admission.

**Conclusion :** Le développement du Rôle Propre Infirmier s'avère indispensable par l'évaluation initiale et périodique des besoins fondamentaux perturbés chez chaque patient au moyen de la Démarche de Soins.

**Mots clés :** Escarre ; Facteurs de risque ; Rôle propre infirmier

**SS-CA-05**

**REFERENCE OU ORIENTATION GUIDEE DES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC D'AUTRES HOMMES (HSH) SEROPOSITIFS AU VIH POUR L'INITIATION PRECOCE AU TRAITEMENT ANTI RETROVIRAL AU MALI.**

HESSOU Pépin Septime Hector<sup>1,2\*</sup>, DICKO Moussa<sup>2</sup>, KANOUTE Abdul Karim<sup>2</sup>, KEITA Fatoumata<sup>2</sup>; Abdoulaye Sanogo<sup>3</sup>, KEITA Yacouba<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Centre Inter-facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement (CIFRED), Université d'Abomey-Calavi (UAC), Calavi, Bénin,

<sup>2</sup>Plan International, Bamako, Mali  
AMPRODE Sahel, Bamako, Mali

\* Corresponding author: shessou@yahoo.fr

**Introduction :** Dans le cadre de l'élimination à l'horizon 2020 du VIH, l'ONUSIDA a préconisé pour les pays la stratégie atteindre les "90x90x90" : 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH ainsi dépistées reçoivent un traitement anti rétroviral durable, enfin 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée. Plan International Mali a mis en place cette stratégie au profit des HSH.

Force est de constater qu'après une année de mise en œuvre, seuls 25% des HSH ont été initiés au traitement anti rétroviral (TAR). D'où la référence ou orientation guidée pour l'initiation précoce des HSH séropositifs au TAR. Elle consiste à prendre en charge entre autres les couts directs de l'orientation guidée.

**Méthodes :** Etude transversale descriptive à visée analytique regroupant 334 HSH séronégatifs, Une analyse bi variée et multivariée a été réalisée avec des variables sociodémographiques et comportementales.

**Résultats :** Les HSH séropositif de l'étude sont jeunes 85%(n=334) moins de 30 ans, la médiane du délai de référence est de 12 jours (3-22), ils sont au moins du niveau secondaire 89% (n=334). 95%(n=334) des HSH séropositifs ont été initiés au TAR. Les HSH séropositifs de niveau au moins secondaire ont 20,51 fois de chance d'être initiés au TAR que les autres (OR=20,51, IC : 7,02 -59,97, p=0,000000), Les HSH séropositifs du milieu urbain ont 4,15 fois de chance d'être initiés au TAR que les ruraux (OR=4,15,51, IC : 1,42 -12,10, p=0,0054)

**Conclusion :** L'orientation guidée est une innovation pour l'atteinte du second 90 de l'ONUSIDA, mais elle n'est pas soutenable à long terme.

Mots clés: HSH, VIH, TAR

## SS-CA-06

### STROKE BURDEN IN BENIN 2008 TO 2018: SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE

Pervenche Fotso, BSc<sup>2</sup> ; Oyéné Kossi, PhD<sup>2</sup> ; Thierry Adoukonou, MD, MSc<sup>1,2,3,4</sup>

1- Department of Neurology, University of Parakou, 03BP 10, Parakou, Benin.

2- Clinic of Neurology, University Teaching Hospital of Parakou, Benin.

3- U-1094 INSERM, University of Limoges, CHU Limoges, U-1094, Tropical Neuroepidemiology, Institute of Epidemiology and Tropical Neurology, GEIST, 87000, Limoges, France.

4- Department of Neurology, CHU Limoges Dupuytren, 87000, Limoges, France.

**Introduction:** Stroke is a public health problem. The main objective was to provide an overview of the stroke burden in Benin from 2008 to 2018. The specific objectives were to identify the different aspects of the burden of stroke and to make proposals to reduce it.

**Methods:** A systematic literature review was conducted using the PRISMA methodology. The research equations were entered into PubMed, Science Direct, Reshergate. The selection of studies and the extraction of results were done on the basis of the acronym PICO. A systematic map in the form of an EXCEL spreadsheet file was prepared for data collection. EPI-INFO 7.1.4.0 software was used for data analysis.

**Results:** The selection allowed the inclusion of 36 references (30 articles and 6 theses). The cities involved were mainly Cotonou and Parakou. The studies presented data from disparate stroke populations and varied considerably in study design and data collection methods. Therefore, it was not appropriate to compare estimates between studies. The data synthesis confirmed the lack of studies addressing aspects of stroke burden over the past 10 years.

**Conclusion:** The overall burden was marked by high prevalence, poor knowledge of populations, high mortality, severe disability, high direct cost, and significant co-morbidities. Action is urgently needed to enable accurate stroke surveillance and reduce the burden of stroke in Benin.

**Keywords:** Burden, stroke, Benin.

## SS-CA-07

### ASSESSING THE EFFICACY OF NUTRITION EDUCATIONAL VIDEOS TO IMPROVE BREASTFEEDING PRACTICES IN RURAL BENIN.

*Bodjrènou Fifali Sam Ulrich<sup>1,2\*</sup>, Amoussa Hounkpatin Waliou<sup>1</sup>, Termote Céline<sup>3</sup>, Salako Valère<sup>1</sup>, Savy Mathilde<sup>4</sup>*

<sup>1</sup> *University of Abomey-Calavi, Faculty of Agronomic Sciences, 03 BP 2819 Jéricho Cotonou Benin. [www.fsa-uac.org](http://www.fsa-uac.org)*

<sup>2</sup> *Alliance of Bioversity International and CIAT / Benin, 08 BP 0932, Cotonou Benin. [bioversity@cqi.org](mailto:bioversity@cqi.org)*

<sup>3</sup> *Alliance of Bioversity International and CIAT / Kenya. PO Box 30677, 00100 Nairobi, Kenya. [bioversity-kenya@cqi.org](mailto:bioversity-kenya@cqi.org)*

<sup>5</sup> *Nutripass Research Unit, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), University of Montpellier, SupAgro, 911 Avenue d'Agropolis, Montpellier, France.*

\* Corresponding author. E-mail: [bodjrenousam@gmail.com](mailto:bodjrenousam@gmail.com); Tél: (229) 61 00 14 40

**Background/objective:** The present study evaluated the impact of using innovative educational videos to improve breastfeeding practices in rural Benin as compared to using classical posters.

**Methods:** A 6 months nutrition education intervention was implemented in two rural districts in Benin using videos in four villages and posters in four other villages. The study sample was n=257 pairs of mothers and children aged 0-23 months. Data related to *Breastfeeding on demand*, *Breastfeeding frequency during children illness* and *Positioning and attachment of children during breastfeeding* were collected through structured direct observations and KAP survey before the beginning (baseline) and at the end of the nutrition education program. Sociodemographic data among mothers and children were also collected. The intervention effect (videos compared to posters) was assessed by the *Difference-In-Differences* analysis under a *Generalized Estimating Equations* framework with consideration to sociodemographic variables.

**Results:** Breastfeeding practices were similar in the videos and posters groups at baseline. The proportion of breastfeeding on demand increased similarly in the two groups between baseline and endline, showing no significant advantages of using videos rather than posters (p-value=0.055). However, the proportion of mothers who increased breastfeeding frequency during children illness considerably increased in the video group compared to the poster group (p-value<0,001). On the opposite the proportion of mothers adopting adequate positioning during breastfeeding significantly decreased between the two rounds of surveys in the video group while remained stable in the poster group (p-value<0,001). The evolution of the breastfeeding practices were also influenced by living district, mother ethnicity and education and children age.

**Conclusion:** The efficacy of educational videos varied according to the practice considered, probably because of the nature of the message to be diffused. Depending on the target practices and the objective of the nutrition program, a communication material must be chosen adequately. Sociodemographic should also be considered.

**Key words:** Nutrition education, Video, Poster

## SS-CA-08

### PARCOURS ET RECONNAISSANCE DES PROFESSIONNELS DE SANTE COMMUNAUTAIRE

*Ousseynou Ka<sup>1</sup>, Ndeye Fatou Oumar Sy<sup>1</sup>, Mountaga Elimane Dia<sup>1</sup>, Abdoul Aziz Ndiaye<sup>1</sup> Cheikh Tacko Diop<sup>1</sup>, Boubacar Gueye<sup>1</sup>, Lamine Gueye<sup>2</sup>*

*<sup>1</sup>UFR Santé et Développement Durable de l'Université Alioune Dio de Bambey*

*<sup>2</sup>Université Cheikh Anta Diop Dakar, service ORK*

*Téléphone : 00 221 616 49 98*

*Email : [ousseynou.ka@uadb.edu.sn](mailto:ousseynou.ka@uadb.edu.sn)*

*Auteur principal : Ousseynou Ka*

**Introduction :** Constituant un nouveau corps devant contribuer à l'amélioration de la santé des populations, les professionnels de santé communautaire formés à l'Université Alioune Diop de Bambey (Sénégal) doivent s'intégrer dans un système de santé médicalisé ou le curatif occupe une place prépondérante.

**Objectifs :** Triple objectif : appréhender la compréhension du concept « santé communautaire », cerner les difficultés rencontrées lors du parcours professionnel et apprécier la mise en œuvre de la politique de santé communautaire.

**Méthodes :** Il s'agit d'une étude qualitative menée du 1<sup>er</sup> Février au 15 avril 2020, ciblant les professionnels en santé communautaire et les employeurs.

**Résultats :** Le concept de santé communautaire n'est pas bien compris par les professionnels de soins. D'ailleurs, les professionnels de santé communautaire sont en général assimilés par les professionnels de soins et par les patients à des agents de santé communautaire donc sans qualification. La démarche utilisée par les employeurs s'apparente plus à la santé publique qu'à la santé communautaire. Les participants ont signalé l'existence de conflits de compétence entre les trois points focaux (soins de santé primaire, éducation pour la santé, santé communautaire) qui pouvaient être fusionnés. Globalement, si les participants ont bien apprécié la mise en place du programme de santé communautaire ; ils ont souligné que ce programme est plus orienté vers les postes, cases de santé, et populations rurales. De plus, ils

souhaiteraient leur recrutement par le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale pour renforcer les ressources humaines du système de santé.

**Conclusion :** Des recommandations ont été formulées pour une appropriation de ce concept par les professionnels de soins et des décideurs

**Mots clés :** santé communautaire, santé publique, professionnels de santé communautaire, agents de santé communautaire,

## SS-CA-09

### MOTIVATION PROFESSIONNELLE ET RISQUES PSYCHOPATHOLOGIQUES DES AGENTS DE GARDIENNAGE EN AFRIQUE

Georges M. KUESSI\*, Magloire GANSOU \*\*, Mardochée YELOME\*\*\*, Thierry KOUGBEAGBEDE\*\*\*\*

Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS)/UAC.

Ecole doctorale pluridisciplinaire

E-mail : [kuessigeorges@gmail.com](mailto:kuessigeorges@gmail.com)

\* Doctorant en Psychologie

\*\* Agrégé de Psychiatrie

\*\*\* Doctorant en Psychologie

\*\*\*\* Docteur en Psychologie

Les aspects psychologiques de la sécurité sont souvent moins perçus que les aspects physiques de la sécurité. La présente étude vise à analyser la motivation des gardiens et les risques psychopathologiques auxquels ils sont soumis dans l'exercice de leur métier. Elle porte sur un échantillon à choix raisonné de 160 agents dans la ville de Cotonou et Abomey-Calavi dans une approche hypothéticodéductive. L'analyse des exigences du travail et du comportement des professionnels de la sécurité privée, montre que les agents mêmes sont victimes de cette perception tant dans la gestion qui est faite d'eux que dans les comportements qu'eux-mêmes adoptent dans l'exercice de leur métier. Certains agents (61% d'avis favorables de consommation) se livrent à la consommation des stimulants afin de mieux faire face aux exigences de leur travail surtout pour les gardes de nuit. C'est une conséquence d'une démotivation professionnelle dans laquelle les gardiens ne sont pas impliqués dans les prises de décision de leur organisation d'appartenance. Les gardiens sont ainsi exposés à des risques psychopathologiques (addictions, toxicomanie, risque de suicides liés au travail, pathologies de surcharge). En effet, les déterminants de motivation sont peu efficaces (63,33% en moyenne d'insatisfaction). La recherche, on note que les agents ne sont moins motivés et considérablement exposés à des comportements à risque sur les lieux de travail.

**Mots clés :** motivation – risques psychopathologiques- toxicomanie-Assistance-surcharge professionnelle

## AXE 2: EPIDEMIOLOGIE

### EP-CA-01

#### INVESTIGATION AUTOUR D'UN CAS DE COVID 19 AU CENTRE NATIONAL DE CARDIOLOGIE DE NOUAKCHOTT, MAURITANIE, DISTRICT DE KSAR, REGION DE NOUAKCHOTT OUEST, MAI 2020

H.M. Mohamedou (Résident MPH-BFELTP)

**Introduction :** L'infection à Covid19 continue ses ravages dans le monde. Le 13 mars 2020, la Mauritanie enregistrait son premier cas de COVID-19, venu de l'étranger. Le 13 Mai 2020 le Centre National de Cardiologie de Nouakchott, Mauritanie, district de Ksar, Région de Nouakchott Ouest a signalé un cas de COVID-19. Une investigation a été conduite autour du cas afin de décrire l'épidémie et identifier les contacts.

**Méthodes :** Une étude transversale descriptive à visée analytique a été conduite du 13 Mai à 14 Juin. Un cas suspect était défini comme Un patient atteint d'une maladie respiratoire aiguë avec fièvre ET n'ayant aucune autre étiologie qui explique pleinement la présentation clinique ET ayant été en contact avec le cas confirmé de COVID-19 au cours des 14 derniers jours avant l'apparition des symptômes. Un cas confirmé était un cas suspect avec une PCR positive. Un contact était défini comme étant toute personne qui a été exposée à un cas confirmé, sans protection appropriée. Un questionnaire a été administré. Avec Epi Info La fréquence des observations a été calculée et les proportions ont été comparées pour une précision lorsque l'IC est à 95%.

**Résultats :** A total le cas investigué a généré 28 contacts dont 06 cas positifs (21,43%) et 22 cas négatifs (78,57%). L'âge médian des contacts est 32,5 (11-56). La fréquence des cas contacts asymptomatiques est 71,43% et 28,57% sont symptomatiques. Le sexe ratio parmi les 06 cas positifs est deux hommes contre une femme.

**Conclusion :** L'épidémie de Covid 19 dans le DS de Ksar a touché plus de jeune. Les contacts positifs étaient des contacts proches du cas investigué. Nous recommandons de bien observer les mesures de base et de prévention pour notre propre protection et bien-être car ces mesures vont conduire à un ralentissement de la propagation de l'épidémie.

**Mots-clefs :** Investigation, Covid 19, Mauritanie

### EP-CA-02

#### FACTEURS ASSOCIES A L'INFECTION A VIH CHEZ LES POPULATIONS CLES A PARAKOU AU BENIN EN 2019 : CAS DES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LES HOMMES (HSH) / TRANSGENRES (TG)

O.M.C. Ouattara ,\*E.E. Agbe 2, F. Tchegnonsi Tognon 1.

*1Centre Hospitalier Universitaire Départemental Borgou/Alibori - Parakou (Bénin), 2Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites, les IST et les Epidémies - Abomey Calavi (Bénin)*

**Introduction :** Les HSH et TG font partir des populations clés parlant de l'infection à VIH.

**Objectifs :** Etudier la prévalence et les facteurs associés à l'infection à VIH chez les HSH et TG à Parakou en 2019.

**Méthodes :** Etude transversale descriptive, non aléatoire, analytique ayant pris en compte la période de 01 mars au 30 juin 2019. L'enrôlement de la population d'étude a été faite sur la

base de volontariat à travers leurs réseaux et facilité par ses leaders (pairs éducateurs). La technique d'échantillonnage utilisée était la méthode du Respondent-Driven Sampling. Les données collectées étaient sociodémographiques, comportementales et biologiques. La variable dépendante était l'infection au VIH.

**Résultats :** Au total, 512 sujets de populations clés ont été enquêtées parmi lesquelles 425 (83,01%) étaient des HSH et 87 (16,99%) s'identifiaient comme des TG. L'âge moyen était de  $24,40 \pm 5,73$  ans et l'âge médian du premier rapport sexuel était de 16 ans. Ils étaient majoritairement célibataires à 90,04% et les élèves/étudiants représentaient 47,46%. La prévalence du VIH chez les HSH/TG était de 7,43% et se décline en 13,24% pour les versatiles, 8,47% pour les réceptifs et 1,77% pour les insertifs. Les facteurs associés étaient la pénétration anale passive ( $p < 0,00$ ), la non utilisation du gel lubrifiant ( $p = 0,001$ ) et l'existence d'antécédent d'Infections Sexuellement Transmissibles ( $p < 0,001$ ).

### EP-CA-03

#### INVESTIGATION D'UN CLUSTER DE COVID-19 A ADJENGRE DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE SOTOUBOUA, TOGO, 2020.

*Hilim P. M\*1., N'DJAO A1., TCHALLA A. E.2, BASSOTI S4., DJISSENOU K. E.5 , BADADOKO P. E.5 , NAPO P.6 , N'TAPI K.6 , KINDE R.3 , TAMEKLOE T. A.4*

*1 Master 1 BFELTP Cohorte 6, Université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou (Résident du Togo)*

*2 District sanitaire de Haho (Togo)*

*3 Coordination nationale FELTP (Togo)*

*4 Direction de Lutte contre la Maladie, Ministère de la Santé (Togo)*

*5 District Sanitaire de Sotouboua (Togo)*

*6 Direction Régionale de la Santé (Togo)*

*\*Email : hilimalain@yahoo.fr, Cel: 0022891607996*

**Introduction :** Le 4 août 2020, la direction du district sanitaire de Tchaoudjo a notifié un nouveau cas confirmé de COVID-19 ayant séjourné en famille dans la ville de Adjengré du district sanitaire de Sotouboua. Nous avons mené une investigation pour décrire l'ampleur de la maladie et mettre en place des mesures de contrôle.

**Méthode :** Nous avons conduit une étude descriptive transversale sur la période du 04 juillet au 16 septembre 2020 dans la ville de Adjengré. Nous avons défini le cas suspect de COVID-19 comme toute personne de Adjengré, présentant une fièvre ( $> 38^{\circ}\text{C}$ ) ou antécédent de fièvre accompagnée d'un des signes suivants : toux, difficultés respiratoires, écoulement nasal, mal de gorge, douleurs musculaires entre le 4 juillet et 16 septembre. Le Cas confirmé a été défini comme tout cas suspect dont le résultat de laboratoire est positif au SRAS-CoV2 par analyse PCR sur un échantillon de prélèvement nasopharyngé.

**Résultats :** Nous avons enregistré 220 contacts avec 16 cas confirmés de COVID-19, soit un taux de positivité de 7,3%. Le taux d'attaque globale était de 89 pour 100.000 habitants. Parmi les cas confirmés 10 (62,5%) sont des contacts issus des ménages de cas confirmés. L'âge médian était de 25,5 ans avec des extrêmes de 2 et 80 ans. Le Sex Ratio H/F était de 1. Le cas index un homme 66 ans, enseignant à la retraite. Tous les cas confirmés étaient asymptomatiques. Un traitement à base d'hydroxychloroquine et de Azithromycine a été administré à l'ensemble des cas confirmés. Aucun décès n'a été enregistré.

**Conclusion :** L'investigation a permis d'identifier 16 confirmés au COVID-19 en lien avec le cluster. La plupart des cas confirmés ont été exposés dans les ménages. Les mesures

d'isolement des cas confirmés a permis de circonscrire la propagation du COVID-19. Nous recommandons la mise en œuvre de la surveillance à base communautaire.

**Mots clé :** COVID-19, Cluster, Adjengré

#### EP-CA-04

##### **PREVALENCE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE CHEZ LES MILITAIRES DE LA GARNISON DE PARAKOU AU BENIN EN 2019**

*Houehanou Yessito Corine Nadège (1), Codjo Léopold (2), Nassouhouede Florentin (1), Dohou Hugues (2), Sonou Arnaud (3)*

*(1) Ecole nationale de formation des techniciens supérieurs en santé publique et surveillance épidémiologique (ENATSE), Université de Parakou, Parakou, Bénin*

*(2) Service de cardiologie, Centre Hospitalier Universitaire Départemental Borgou, Parakou, Bénin*

*(3) Clinique Universitaire de Cardiologie, CNHU-HKM, Cotonou, Bénin*

**Introduction :** L'hypertension artérielle (HTA) constitue un problème de santé publique au plan mondial et au Bénin en particulier. L'objectif de ce travail était d'étudier la prévalence et les facteurs associés à l'HTA chez les militaires de la garnison de Parakou en 2019.

**Méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale, qui s'est déroulée à la garnison de Parakou en 2019. Elle a inclus tous les militaires présents durant la période ciblée et ayant donné leur consentement. Les données démographiques, comportementales, les antécédents médicaux, les mesures anthropométriques et de pression artérielle ont été enregistrées sur une fiche standardisée basée sur l'instrument steps de l'OMS.

**Résultats :** L'étude a porté sur 266 militaires avec un âge moyen de  $34,1 \pm 5,5$  ans et un sex-ratio de 7,06. La prévalence de l'HTA était de 26,3%. La présence de l'HTA était associée au grade ( $p < 0,001$ ), à la consommation nocive d'alcool ( $p = 0,002$ ), à la consommation de tabac ( $p = 0,01$ ), au stress ( $p = 0,03$ ), à l'obésité globale ( $p = 0,005$ ) et à l'obésité abdominale ( $p = 0,03$ ).

**Conclusion :** L'HTA est fréquente chez les militaires étudiés. Ses facteurs associés sont en majorité modifiables. Ces données devraient inciter à accentuer les mesures préventives de l'HTA au sein de cette cible.

**Mots clés :** Hypertension artérielle, militaires, Parakou

#### EP-CA-05

##### **PREVALENCE DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE AU COURS DE LA GROSSESSE AU BENIN : ANALYSE DES DONNEES DE L'ENQUETE STEPS 2015**

*Houehanou Yessito Corine Nadège (1,2,3), Amidou Salimanou (2,3), Sonou Arnaud (4), Tchiboza Maria-Conchéta (3), Houinato Dismand (3)*

- (1) *Ecole nationale de formation des techniciens supérieurs en santé publique et surveillance épidémiologique (ENATSE), Université de Parakou, Parakou, Bénin*
- (2) *Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, Ministère de la santé, Cotonou, Bénin*
- (3) *Laboratoire d'épidémiologie des maladies chroniques et neurologiques (LEMACEN), Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin*
- (4) *Clinique Universitaire de Cardiologie, CNHU-HKM, Cotonou, Bénin*

**Introduction :** L'hypertension artérielle (HTA) pendant la grossesse représente la deuxième cause de décès maternels au Bénin. L'objectif de ce travail était d'étudier la prévalence de l'HTA chez les femmes enceintes au Bénin en 2015.

**Méthodes :** Il s'est agi d'une analyse de base de données. L'enquête STEPS est une étude transversale conduite en 2015. Elle a inclus les adultes âgés de 18 à 69 ans, résidant au Bénin et ayant donné leur consentement écrit pour y participer. La base de sondage était constituée par la liste des zones de dénombrements. Un échantillonnage aléatoire à trois degrés a été fait pour sélectionner les participants. Les données ont été collectées dans les ménages, par étapes, grâce à l'instrument STEPS. Les pressions artérielles ont été mesurées selon les recommandations de l'OMS. Les données des femmes enceintes ont été extraites dans une base restreinte et analysées. L'HTA a été définie selon les normes de l'OMS.

**Résultats :** Ce travail a porté sur 240 femmes enceintes d'âge moyen de 28,9 ans  $\pm$  6,8 ans. La prévalence de l'HTA au cours de la grossesse était de 13,3% (intervalle de confiance 95% [9,3-18,3]). Elle était significativement associée à la consommation de fruits et légumes ( $p=0,042$ ).

**Conclusion :** Ce travail révèle une prévalence élevée de l'HTA chez les femmes enceintes au Bénin. Il souligne la nécessité de renforcer les interventions pour la prévention de l'HTA et de ces complications pendant la grossesse.

**Mots clés :** HTA ; grossesse ; Bénin

## EP-CA-06

### INFECTION PAR PAPILLOMAVIRUS ET VIH CHEZ LES FEMMES CONSULTANT A L'HOPITAL MILITAIRE D'ABIDJAN, COTE D'IVOIRE

*Zinzendorf NY1, Cablan MA, Tahou-Apete S1, Dotia A1, Lathro JS, Agbessi-Kouassi BT, Brou K2†, Krizo A1, Djatchi RA1, Zaba FS1.*

*1Université Felix Houphouët Boigny, UFRSB, 2Hôpital Militaire d'Abidjan.*

**Introduction :** Nous avons cherché à documenter l'association entre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et l'immunodéficience et l'infection oncogène par le virus du papillome humain (VPH) chez les femmes ne présentant pas de lésions néoplasiques du col de l'utérus à Abidjan, Côte d'Ivoire

**Méthodes :** Cette étude descriptive transversale s'est déroulée d'avril 2015 à mars 2016, chez des patientes consultant au service de gynécologie de l'Hôpital Militaire d'Abidjan. Après consentement éclairé, un dépistage de l'infection à papillomavirus par la méthode de l'inspection visuelle à l'acide acétique et une sérologie VIH sont réalisés. Le diagnostic de l'infection par le VPH et l'identification du génotype ont reposé sur le Kit Linnear Array de Roche Diagnostics.

**Résultats :** Au total, 73 femmes (45 séropositives et 28 séronégatives) ont été incluses. La prévalence globale de l'infection par le VPH était de 43,8%. Selon le statut VIH, 51,1 % (23) des femmes étaient co-infectées contre 32,1% (9) de mono-infectés par VPH. Les infections par plusieurs types de HPV étaient plus fréquentes chez les femmes séropositives (34,8 %) /8 que chez les femmes séronégatives (22,2 %),

**Conclusion :** La prévalence de VPH est élevée chez les femmes ne présentant pas de lésions néoplasiques du col de l'utérus, en particulier chez les femmes séropositives pour le VIH. Une évaluation de l'impact du VIH sur l'apparition et la persistance de l'infection par VPH est nécessaire afin de concevoir des programmes de dépistage adaptés à l'infection par VPH en Côte d'Ivoire.

**Mots clés :** Papillomavirus humain, cancer du col de l'utérus, VIH, Côte d'Ivoire

#### EP-CA-07

### INVESTIGATION D'UN CLUSTER DE COVID-19 AU CHR SOKODE, DISTRICT SANITAIRE DE TCHAOUDJO, TOGO, 2020.

*BASSOTI S., N'DJAO A., TCHALLA-A E., HILIM P.M., NABA M.A., ABDOULAYE A., AHONSOU D., KINDE R., TAMEKLOE S.A.*

**Introduction :** Un cas COVID-19 a été diagnostiqué en hospitalisation au CHR Sokodé le 20 juillet 2020. Nous avons mené cette investigation pour décrire l'évènement et mettre en place des mesures de riposte.

**Méthodes :** Nous avons conduit une étude descriptive du 4 juillet au 20 septembre 2020 dans la ville de Sokodé. Un cas suspect de COVID-19 était toute personne résidant à Sokodé, présentant un syndrome d'infection respiratoire aiguë de cause inexpliquée, ou toute personne ayant séjourné hors du pays dans les 14 derniers jours à partir du 4 juillet 2020. Le cas confirmé était toute personne ayant un test PCR positif au SRAS-CoV2. Nous avons identifié les contacts du cas index. Nous avons collecté les données avec des fiches d'investigation de cas confirmé et des contacts. Nous avons calculé les fréquences, les proportions, les moyennes et les ratios.

**Résultats :** Le cas index est un homme 71 ans, enseignant retraité, résidant à Bassar, sans antécédent connu, qui a été testé positif au SRAS-CoV2 en hospitalisation au CHR Sokodé. Il y avait 49 contacts directs avec 17 cas confirmés soit un taux d'attaque secondaire de 34,7% en 20 jours. Le cas index avait eu 9 contacts à Bassar dont 7 testés positifs et à Sokodé 40 contacts étaient identifiés avec 10 cas confirmés. Les 10 cas confirmés de Sokodé ont engendré 57 contacts dont 12 cas confirmés. Deux contacts étaient des commerçants venus du Bénin. L'âge moyen était de 33 ans. Des 35 soignants contacts du cas index, 3 ont été testés positifs soit 8,57%. Le personnel soignant infecté globalement représentait 24,1%. Le cas index n'a pas survécu. Sous une bithérapie associant Hydroxychloroquine + Azithromycine, l'évolution a été favorable pour les contacts positifs.

**Conclusion :** Le cluster de COVID-19 du CHR Sokodé était de trois origines probables que sont le cas index et les deux voyageurs. Un renforcement de capacité du personnel a permis de contrôler la propagation.

**Mots clés :** Cluster, Investigation, Sokodé

## EP-CA-08

**CONTAMINATION METALLIQUE DES EAUX USEES DES COLLECTEURS D'AKPAKPA, DEVERSEES DANS LE LAC NOKOUE AU BENIN.**

*BOKOSSA Hervé Kouessivi Janvier<sup>1,2</sup>, TOFFA Damien<sup>1</sup>, BONI Gratien<sup>1</sup>, JOHNSON Roch Christian<sup>1</sup>, KANHOUNNON Gbèdodé Wilfried<sup>3</sup>, FIOGBE Emile Didier<sup>2</sup>.*

*1-Laboratoire d'Hygiène –Assainissement Ecotoxicologie Environnement Santé (HECOTES) du Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable (CIFRED), Université d'Abomey-Calavi, 03 BP : 1463 Cotonou, Bénin.*

*2-Laboratoire de Recherche sur les Zones Humides (LRZH), Université d'Abomey-Calavi, 01 BP : 526 Cotonou, Bénin.*

*3-Laboratoire de Chimie Théorique et de Spectroscopie Moléculaire (LACTHESMO) Université d'Abomey- Calavi, 03 BP 3409 Cotonou, Bénin.*

BOKOSSA Hervé Kouessivi Janvier ([bokossakouessiv@yahoo.fr](mailto:bokossakouessiv@yahoo.fr), +229 97 79 90 29) ; TOFFA Dagbédji Damien ([toffadani@gmail.com](mailto:toffadani@gmail.com), +229 67 65 46 62) ; BONI Gratien ([bonigras2014@gmail.com](mailto:bonigras2014@gmail.com), +229 96 91 12 77) ; JOHNSON Christian Roch ([rochjohnson@yahoo.fr](mailto:rochjohnson@yahoo.fr), +229 96 22 11 32) ; KANHOUNNON Gbèdodé Wilfried ([wilkan007@yahoo.fr](mailto:wilkan007@yahoo.fr), + 229 95 87 57 54) ; FIOGBE Emile Didier ([edioqbe@yahoo.fr](mailto:edioqbe@yahoo.fr), + 229 95 26 82 62)

**Introduction :** Les eaux usées des collecteurs d'Akpakpa, zone industrielle de Cotonou sont déversées sans aucun traitement dans le lac Nokoué. La présente étude a pour but d'évaluer la contamination métallique de ces eaux qui, une fois dans le lac peuvent contaminer les ressources halieutiques et par conséquent affecter la santé de l'homme.

**Méthodes :** Les collectes d'échantillons d'eau ont été effectuées en triplicat en amont, au milieu et en aval de chaque collecteur de manière ponctuelle et analysées au spectrophotomètre à absorption moléculaire, DR2800 pour leur teneur en métaux (Pb, Cd, Cu et Al).

**Résultats :** Les mesures de pH, d'oxygène dissous, de conductivité électrique et des solides totaux dissous effectuées in situ grâce à des multimètres, oscillent respectivement en moyenne autour de  $6,97 \pm 0,34$ ,  $(5,16 \pm 0,29)$  mg/L,  $(2280,58 \pm 263,97)$   $\mu$ S/cm et  $(1076,04 \pm 51,01)$  mg/L révélant des eaux fortement minéralisées à cause de la proximité avec le milieu marin et faiblement oxygénées compte tenu de leur teneur en matière organique. En outre, en dehors des teneurs en  $\text{Cd}^{2+}$  et  $\text{Pb}^{2+}$  relativement faibles, celles de l' $\text{Al}^{3+}$  ( $2,65 \pm 0,03$ ) mg/L et

surtout du  $\text{Cu}^{2+}$  ( $10,20 \pm 0,14$ )mg/L sont élevées avec une concentration en cations  $\text{Cu}^{2+}$  4 fois supérieures aux normes des eaux résiduaires au Bénin (2,5mg/L) pour les collecteurs les plus fortement chargés, provenant essentiellement des rejets industriels de la zone d'étude.

**Conclusion :** Ces résultats montrant un apport d'une charge excessive en ces métaux dans le lac qui peut par effet cumulatif dans nos ressources halieutiques, entraîner chez le consommateur final, l'homme, la maladie d'Alzheimer et des troubles gastro-entériques posent avec acuité la nécessité d'une filière de traitement des eaux usées dans les unités industrielles béninoises.

**Mots clés :** Eaux usées, teneur en métaux, santé.

## EP-CA-09

### PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A L'HEPATITE B CHEZ LES TRAVAILLEUSES DU SEXE VIH NEGATIVES, COTONOU-BENIN, 2014-2015

Rosette KOUFEDE<sup>1</sup>, F. A. GUEDOU<sup>2</sup>, S. SALIFOU<sup>3</sup>, M. B. LAURENT<sup>1</sup>, O.J.B. OTSHUDIANDJEKA<sup>1,5</sup>, Y FR. DIALLO<sup>1</sup>, PK YANOGO<sup>1,4</sup>, N MEDA<sup>1,4</sup>

1. Burkina Field Epidemiology Training Program en Afrique de l'Ouest, Université Joseph KI ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

2. Laboratoire de recherche en IST, Centre Communal de Santé de Cotonou-1, Bénin.

3. Direction Nationale de la Santé Publique, Bénin

4. Faculté de Médecine, Université Joseph KI ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

E-mails: koufederosette@gmail.com, guedaf@yahoo.fr, sourakatou01@yahoo.fr, marianne@clapnoir.org, otshujose@yahoo.fr, MI.RAINA@hotmail.com, yanogo.pauline@yahoo.fr, nicolas.meda@gmail.com.

**Introduction :** Au Bénin, l'hépatite B est de loin la plus redoutable pour plusieurs raisons. Bien que les travailleuses du sexe (TS) soient un groupe à haut risque pour les infections sexuellement transmissibles dont le virus de l'hépatite B, les études portant sur l'épidémiologie du VHB chez les travailleuses du sexe sont rares en Afrique. L'objectif principal était d'étudier la prévalence et les facteurs associés à l'hépatite B chez les travailleuses du sexe VIH négatives à Cotonou-Bénin septembre 2014 à décembre 2015.

**Méthodes :** Nous avons analysé les données collectées, d'une étude menée chez les travailleuses du sexe VIH négatives à Cotonou-Bénin septembre 2014 à décembre 2015. Les 311 TS VIH négatives enrôlées ont été incluses, le test de khi 2 avait été utilisé pour comparer les prévalences et une régression logistique a permis d'estimer les Odds ratio brutes (ORb) d'association entre les différents facteurs et le statut d'hépatite B.

**Résultats :** Parmi les 311 travailleuses du sexe incluses dans notre étude, 13 étaient positives à l'hépatite B (hépatite B courante) soit une prévalence brute de 4,2 %. Le seul facteur associé à l'infection par le VHB chez les travailleuses du sexe VIH négatives était l'antécédent de transfusion sanguine (OR= 4,89 ; IC95% = [1,40-17,08] p=0,01).

**Conclusion :** La prévalence de l'hépatite B chez les travailleuses du sexe VIH négatives étant élevée, nous recommandons que les actions de santé publique soient entreprises tenant compte du facteur de risque identifié pour améliorer la prévention de l'hépatite B chez ces dernières.

**Mots clés :** Hépatite B, Travailleuse du sexe, Bénin.

#### EP-CA-10

### EPIDEMIOLOGIE DES TUMEURS DU SEINS DE LA FEMME DE MOINS DE 40 ANS A COTONOU (R.BENIN)

*Dangbemey DP<sup>\*1</sup>, Gnanngnon F, Tognifode V<sup>1</sup>, Aboubakar M<sup>2</sup>, Lokossou S<sup>2</sup>, Ogoudjobi M<sup>1</sup>, Palmada U<sup>1</sup>, Tshabu-Aguemon C<sup>2</sup>, Hounkpatin BIB<sup>1</sup>, Tonato-Bagnan<sup>1</sup> JA, Denakpo JL<sup>2</sup>.*

*1 Service de Gynécologie Obstétrique - CHU MEL de Cotonou*

*2 Clinique Universitaire de Gynécologie Obstétrique - CNHU HKM de Cotonou*

*\*Dr DANGBEMEY Djima Patrice, Assistant de gynécologie obstétrique à l'UAC/FSS Cotonou. ddpatus78@yahoo.fr +229 66 25 75 24/ 65475858*

**Introduction :** Etudier les caractéristiques épidémiologiques des tumeurs du sein de la femme de moins de 40 ans à Cotonou.

**Méthodes :** Etude rétrospective et prospective portant sur tous les dossiers complets des patientes âgées de moins de 40 ans et traitées entre 2015 et 2019 au Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant Lagune (CHU-MEL) de Cotonou et à l'hôpital de zone de Menontin, pour tumeurs du sein. Les paramètres analysés étaient cliniques, radiologiques et histologiques. La réponse thérapeutique et le pronostic ont été appréciés à travers un contrôle organisé dans le cadre de la présente étude. Les tests de khi 2 et de Yates avaient permis de comparer et d'étudier l'association.

**Résultats :** Sur 4562 consultations gynécologiques, 344(7,5%) femmes de moins de 40 ans présentaient une tumeur du sein. Sur 230 patientes explorées, 12(5,2%) cas de cancer du sein étaient confirmés par l'histologie. L'âge moyen était de 25,7 ans. Les élèves/étudiants étaient les plus nombreux (44 % ; n=151). La ménarche était précoce (<12 ans) chez 4,5% ; n=15). Le surpoids et/ou l'obésité était observé chez 44,2%. Le diabète et la mastopathie étaient les antécédents les plus rencontrés chez respectivement 5 % (n=16) et 9 % (n=31). Les antécédents familiaux de cancer du sein étaient retrouvés chez 6,9% des patientes (n=17). L'autoexamen représentait 81% (n= 279) des circonstances de découverte. Le délai moyen de consultation était de 6,4 mois avec des extrêmes de 06 jours et 05 ans. Le sein droit et le cadran supéro externe étaient les plus touchés dans respectivement 53% et 31,1%. Les facteurs associés au cancer du sein était l'obésité (RR= 14 ; IC : 1,32 -14,3 ; p =0,02) l'antécédent familial de cancer du sein (p=0,05). Le risque relatif de cancer du sein était pratiquement nul pour les patientes de moins de 30 ans. La régression spontanée de la tumeur était plus statistiquement significative (p=0,02) chez les patientes de moins de 20 ans.

**Conclusion :** La connaissance de l'épidémiologie des cancers des femmes jeunes permet d'asseoir des mesures préventives et thérapeutiques plus efficaces.

**Mots clés :** épidémiologie, tumeurs, sein

#### EP-CA-11

### FACTEURS ASSOCIES A LA PRATIQUE DE L'EDUCATION NUTRITIONNELLE A LA MATERNITE DU CHU-MEL DE COTONOU EN REPUBLIQUE DU BENIN EN 2019.

*Dangbemey DP<sup>1</sup>, Sossa JC<sup>3</sup>, Tognifode V<sup>1</sup>, Aboubakar M<sup>2</sup>, Koumagbeafide V<sup>4</sup>, Hounkpatin BIB<sup>1</sup>, Tonato-Bagnan<sup>1</sup> JA, Denakpo JL<sup>2</sup>.*

*1 Service de Gynécologie Obstétrique - CHU MEL de Cotonou*

*2 Clinique Universitaire de Gynécologie Obstétrique - CNHU HKM de Cotonou*

*3 Institut Régional de Santé Publique, Alfred QUENUM*

*4 Institut National Médico-Sanitaire*

*Dr DANGBEMEY Djima Patrice, Assistant de gynécologie obstétrique à l'UAC/FSS Cotonou. ddpatous78@yahoo.fr +229 66 25 75 24/ 65475858*

**Introduction :** Etudier les facteurs favorisant la pratique de l'éducation nutritionnelle (EN) à la maternité du CHU-MEL de Cotonou.

**Méthodes :** Etude transversale descriptive à visée analytique qui s'est déroulée sur 45 jours (8 avril au 21 mai 2019) en consultation prénatale. Etaient inclus les sages-femmes et gynécologues consultants, observés dans leur pratique puis interrogés sur leur connaissance sur l'EN après avoir obtenu leur accord de participation.

Une connaissance ou pratique était supposée « bonne » lorsque le prestataire avait répondu ou exécuté correctement au moins 80% des questions ou gestes nécessaires et « à améliorer » dans le cas contraire.

Les tests de chi<sup>2</sup> et de Fisher ont été utilisés pour la comparaison des variables. La différence était significative pour une valeur de  $p \leq 0,05$ .

**Résultats :** Sur 50 professionnels enquêtés pour 70 attendus, 43 étaient sages-femmes d'Etat et 7 gynécologues obstétriciens. En ce qui concerne l'ancienneté, 68% avaient de plus de 15 ans. Sur 9 réalisations d'EN, 6 ont montré une bonne pratique pour : l'identification et l'analyse du problème, la maîtrise du sujet et la proposition des solutions. Aucune pratique n'a été jugée bonne en ce qui concerne : la mise en œuvre, le suivi et la discussion pour l'amélioration des pratiques. La pratique du conseil nutritionnel était jugée bonne chez 4 sages-femmes sur 43 (9,3%) et chez 1 médecin sur 7 (14%). La catégorie professionnelle était significativement associée à la connaissance des professionnels de santé sur l'éducation nutritionnelle ( $p = 0,001$ ). Il n'y avait pas d'association significative entre la catégorie professionnelle et la pratique en éducation nutritionnelle ( $p = 0,7$ ). L'ancienneté dans la profession était associée à la qualité de la pratique de l'éducation nutritionnelle ( $p=0,38$ ).

**Conclusion :** La connaissance des facteurs favorisant la pratique de l'EN permettra d'augmenter la performance.

**Mot clés :** facteurs, éducation, nutrition

### AXE 3: ONE HEALTH

#### OH-CA-01

**MODELISATION DE LA DISTRIBUTION SPATIALE ET DE LA NICHE ECOLOGIQUE DE QUELQUES VECTEURS POTENTIELS INCRIMINES DANS LA TRANSMISSION DE L'ULCERE DE BURULI : ELABORATION DE LA CARTE DE RISQUE DE PROPAGATION DE LA MALADIE AU BENIN**

*Pérugine AKOTON1\*, Kourouma KOURA1 et Jean Cossi GANGLO1*

*Affiliations : 1Laboratoire des Sciences Forestières / Faculté des Sciences Agronomiques Université d'Abomey-Calavi, 01 BP 526 Cotonou, Bénin*

*\*Auteur correspondant : E-mail : peruginea@gmail.com ; Tél : 0022966503957*

**Introduction :** L'Ulcère de Buruli (l'UB) est une maladie infectieuse provoquée par un agent pathogène, *Mycobacterium ulcerans*. Cette mycobactérie est responsable des nécroses sévères des tissus sous-cutanés conduisant aux ulcères et plaies chroniques. Cependant, la distribution des réservoirs potentiels de cette mycobactérie, nécessaire pour une dynamique efficace de lutte, reste très peu connue au Bénin. L'étude vise à modéliser la propagation du risque d'infection à l'UB au Bénin.

**Méthodes :** La méthodologie est axée sur deux sources de données utilisées dans le logiciel MaxEnt (Maximum Entropy) pour modéliser la distribution spatiale de quelques vecteurs de *Mycobacterium ulcerans*. Il s'agit des données bioclimatiques du présent et du futur téléchargées sur <http://webfiles.york.ac.uk/KITE/AfriClim/> et de 234 occurrences de la maladie. Des enquêtes sur les impacts de la maladie ont été effectuées sur la base d'un questionnaire auprès de 100 personnes (guéries, malades et rechutées) recensées à l'aide du registre des relais communautaires. Un inventaire des vecteurs potentiels a été réalisé auprès de ces personnes sur la base d'une planche d'illustration des potentiels vecteurs.

**Résultats :** Des impacts socio-économiques et physiques de la maladie ont été principalement rapportés par les enquêtés. Les vecteurs potentiels inventoriés sur le terrain sont les punaises aquatiques de la famille des Belostomatidae et des Naucoridae et des vers dont les taxons n'ont pas été précisés. Les zones à risque de cette maladie, dans le présent et dans le futur, incluent globalement le Sud jusqu'au Centre du Bénin et une partie du Nord-Ouest et Nord-Est du pays.

**Conclusion :** Cette étude a permis de générer les cartes de risque de propagation de la maladie. Il est important que les autorités en charge de la santé tiennent compte des présents résultats pour une meilleure prise en charge des populations vulnérables.

**Mots clés :** Modélisation, Ulcère de Buruli, Bénin.

## OH-CA-02

### MODELISATION DE LA NICHE ECOLOGIQUE DU RAT MASTOMYS NATALENSIS, VECTEUR DE LA FIEVRE LASSA AU BENIN ET EN AFRIQUE

*Nandjib SANOUSI1\*, Kourouma KOURA1 et Jean Cossi GANGL01*

*Affiliations : 1Laboratoire des Sciences Forestières / Faculté des Sciences Agronomiques / Université d'Abomey-Calavi, 01 BP 526 Cotonou, Bénin*

*\*Auteur correspondant : E-mail : sanoussinandjib@gmail.com ; Tél : 0022996875776*

**Introduction :** La présente étude a porté sur la modélisation de la distribution spatiale et de la niche écologique du rat *Mastomys natalensis*, vecteur de la fièvre Lassa au Bénin et en Afrique. L'objectif de cette étude était de contribuer à la protection sanitaire des populations de l'Afrique contre les maladies infectieuses à transmission vectorielle en vue de faciliter leur prise en charge.

**Méthodes :** Quatre cent soixante-neuf (469) occurrences du terrain, de la littérature et du site du GBIF «<https://doi.org/10.15468/dl.0hms5r>» ont été utilisées en combinaison avec cinq (05) variables bioclimatiques, obtenues du site AfriClim (<http://webfiles.york.ac.uk/KITE/AfriClim/>),

pour tourner le modèle avec le logiciel Maxent. Soixante-quinze (75 %) des occurrences ont été utilisées pour tourner le modèle cinq (05) fois et le reste pour la validation. Un ensemble de modèles climatiques de Africlim a été utilisé à cet effet avec deux scénarios climatiques du GIEC à savoir : rcp 4.5 et rcp 8.5 à l'horizon 2055.

**Résultats** : L'AUC obtenu du modèle est 0,826 indiquant un modèle de bonne performance. Des zones où l'espèce est présente actuellement ainsi que les aires dans le futur qui seront favorables à la présence de l'espèce vectrice de la fièvre Lassa ont été identifiées en Afrique et au Bénin. Le Bénin est dans le présent et serait dans le futur exposé à la fièvre Lassa. Les zones à très grand risque de la maladie sont toutes les communes du Sud-Bénin et une partie des départements du Plateau, des Collines, du Borgou, de la Donga et de l'Alibori. Tous les pays de l'Afrique exceptés quelque pays du Centre et de l'Est de l'Afrique sont des zones à risque.

**Conclusion** : Ces zones identifiées doivent être considérées comme des aires prioritaires d'intervention où les moyens humains et matériels de lutte seront concentrés.

**Mots clés** : Modélisation, *Mastomys natalensis*, fièvre Lassa

### OH-CA-03

#### HYPERTENSION ARTERIELLE CHEZ LES TRAVAILLEURS DE LA SBEE DE BOHICON

*1,2Adjobimey M, 1Hinson Vikkey, 1 Mikponhoué R, 1 Loko E, 1Ayélo P.*

*1Unité de Recherche et d'Enseignement en Santé au Travail et Environnement FSS Cotonou,*

*2Centre National Hospitalier Universitaire de Pneumo-Phthysologie de Cotonou*

**Introduction** : La problématique de l'hypertension artérielle (HTA) en milieu professionnel est peu abordée au Bénin malgré les conséquences de la maladie. L'objectif de l'étude est de déterminer la prévalence et les facteurs associés à l'HTA chez les travailleurs de la SBEE de Bohicon.

**Méthodes** : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive et analytique qui s'est déroulée dans la période de mai 2018 à janvier 2019. Les variables étudiées étaient d'ordres sociodémographiques, anthropométriques, professionnels, comportementaux et médicaux. Le rapport de prévalence a été utilisé comme mesure d'association.

**Résultats** : Au total, 66 travailleurs dont 59 (89,39%) de sexe masculin ont participé à l'étude. L'âge moyen était de  $42,65 \pm 9,93$  ans avec des extrêmes de 22 et 60 ans. La prévalence de l'HTA était de 45,45%, IC = [33,14 – 58,19] à 95 %. Les facteurs associés étaient : obésité, consommation d'alcool, travail posté, poste administratif, forte demande psychologique au travail.

**Conclusion** : Une politique de prévention de l'HTA chez ces travailleurs prenant en compte les particularités du milieu de travail est nécessaire.

**Mots clés** : Hypertension artérielle, Travail, Bénin

### OH-CA-04

#### ASSESSING THE EFFICACY OF TWO DUAL ACTIVE INGREDIENTS LONG-LASTING INSECTICIDAL NETS FOR CONTROL OF MALARIA TRANSMITTED BY PYRETHROIDS-RESISTANT VECTORS IN BENIN: STUDY PROTOCOL FOR A THREE ARMED, SINGLE BLINDED, CLUSTER RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.

*Manfred Accrombessi,<sup>1</sup> Jackie Cook,<sup>2</sup> Corine Ngufor,<sup>1</sup> Arthur Sovi,<sup>1</sup> Edouard Dangbenon,<sup>3</sup> Boulais Yovogan,<sup>3</sup> Hilaire Akpovi,<sup>3</sup> Aurore Hounto,<sup>4</sup> Charles Thickstun,<sup>5</sup> Gil G. Padonou,<sup>3</sup> Filemon Tokponnon,<sup>3</sup> Louisa Messenger,<sup>1</sup> Immo Kleinshmidt,<sup>2</sup> Mark Rowland,<sup>1</sup> Martin Akogbeto,<sup>3</sup> Natacha Protopopoff.<sup>1</sup>*

#### *Affiliations*

*1 Faculty of Infectious and Tropical Diseases, Disease Control Department, London School of Hygiene and Tropical Medicine, WC1E 7HT, London, UK*

*2 Medical Research Council (MRC) Tropical Epidemiology Group, London School of Hygiene and Tropical Medicine, WC1E 7HT, London, UK*

*3 Centre de Recherche Entomologique de Cotonou (CREC), Cotonou, Benin*

*4 National Malaria Control Program, Ministry of Health, Cotonou, Benin*

*5 School of Epidemiology and Public Health, Faculty of Medicine, University of Ottawa, Ottawa, Canada*

**Background:** Long-lasting insecticidal nets (LLINs) are currently the primary method of malaria control in sub-Saharan Africa and have contributed to a significant reduction in malaria burden over the past 15 years. However, this progress is threatened by the wide-scale selection of insecticide-resistant malaria vectors. It is, therefore, important to accelerate the generation of evidence for new classes of LLINs.

**Methods:** The study design is a three-armed superiority, single-blinded, cluster randomized controlled trial assessing the impact of 2 novel dual active ingredient LLINs on epidemiological and entomological outcomes in Benin, a malaria-endemic area with a highly pyrethroid-resistant vector population. The study arms consist of (i) Royal Guard®, a net combining a pyrethroid (alpha-cypermethrin) plus an insect growth regulator (pyriproxyfen), which is known to disrupt female reproduction and egg fertility; (ii) Interceptor G2®, a mixture incorporating two adulticides (alpha-cypermethrin and chlorfenapyr) with different modes of action; and (iii) the control arm, Interceptor®, a pyrethroid (alpha-cypermethrin) only LLIN. In all arms, one net for every 2 people will be distributed to each household. Sixty clusters were identified and randomised 1:1:1 to each study arm. The primary outcome is malaria case incidence measured over 24 months through active case detection in a cohort of 30 children aged 6 months to 10 years, randomly selected from each cluster.

**Conclusion:** This study is the second cluster randomised controlled trial to evaluate the efficacy of two next generation LLINs to control malaria transmitted by insecticide resistant mosquitoes. The results of this study will form part of the WHO evidence-based review to support potential public health recommendation of these nets and shape malaria control strategies of sub-Saharan Africa for the next decade.

**Keywords :** Dual active ingredient long-lasting insecticidal nets; Cluster randomized controlled trial; Benin.

#### **OH-CA-05**

### **AGROFORESTERIE, ETHNOMÉDECINE HUMAINE, PHYTOMÉDECINE VÉTÉRINAIRE ET CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ : QUEL LIEN ?**

*Ohouko Okri Fréjus Hans<sup>1,2</sup>, Esseh Komlavi<sup>2</sup>, Koudouvo Koffi<sup>2</sup>, Soha Arnaud<sup>1</sup>, Adouko Jacques<sup>1</sup>, Guedegbe Ganiou<sup>1</sup>, Dougnon Tossou Jacques<sup>1</sup>, Gbeassor Messanvi<sup>2</sup>*

*1Unité de Recherche en Microbiologie et Pharmacologie des substances naturelles/Université d'Abomey-Calavi, 01BP2009 Cotonou*

2Centre de Recherche et de Formation sur les plantes Médicinales/Université de Lomé,  
01BP1515 Lomé

**Introduction:** La richesse des ressources naturelles en espèce végétale constitue un atout immense qui contribue au développement de plusieurs domaines tels que la santé humaine et animale, la nutrition et la biodiversité. La présente synthèse a pour objectif de montrer le lien existant entre les principaux domaines faisant appel aux ressources végétales.

**Méthodes:** Ainsi une analyse guidée a porté sur 8 articles issus du BENIN, NIGER et TOGO mettant en exergue les plantes médicinales utilisées en médecine animale et humaine, celles menacées puis la conservation de la biodiversité. Il ressort de cette étude restreinte que 24 plantes sont utilisées aussi bien en santé humaine et animales. Elles sont constituées de *Acacia nilotica*, *Adansonia digitata*, *Ageratum conyzoides*, *Bridelia ferruginea*, *Cassia sieberiana*, *Citrus aurantiifolia*, *Combretum micranthum*, *Detarium microcarpum*, *Elaeis guineensis*, *Entada africana*, *Guiera senegalensis*, *Khaya senegalensis*, *Kigelia africana*, *Mitragyna inermis*, *Momordica charantia*, *Ocimum americanum*, *Ocimum gratissimum*, *Parkia biglobosa*, *Pericopsis laxiflora*, *Prosopis africana*, *Pteleopsis suberosa*, *Pterocarpus erinaceus*, *Securidaca longepedunculata*, *Vernonia amigdalina*, *Vitellaria paradoxa*.

**Resultats :** Parmi ces espèces végétales, *Parkia biglobosa* et *Pteleopsis suberosa* sont identifiés comme étant utilisées en santé humaine qu'animale mais menacée de disparition. Dans le même temps, *Uvaria chamae*, *Tamarindus indica*, *Sansevieria liberica*, *Dodonaea viscosa*, *Alstonia boonei*, *Opilia amantacea* et *Pavetta corymbosa*, des plantes fortement utilisées dans le traitement des maladies humaines ont été rapportées comme étant menacées. De plus, nous avons remarqué que deux genres sont représentés chacun par deux espèces (*Khaya senegalensis* et *Khaya gradifoliola*; *Lannea acida* et *Lannea kerstingii*) toutes utilisées dans la gestion de la santé humaine et animale.

**Conclusion :** Il est évident de prendre en compte les nombreuses pratiques utilisées en médecine traditionnelle pour préserver la biodiversité. Nous suggérons qu'une sensibilisation soit faite aux guérisseurs traditionnels sur la culture des plantes, initiative importante pour augmenter la présence des espèces végétales en fonction de leurs usages.

**Mots clés :** Pharmacologie, pays tropicaux, pratiques agroforestières

## OH-CA-06

### ETUDE DES ACTIVITES ANTIPLASMODIALE, ANTIOXYDANTE ET DE LA PHYTOCHIMIE DE LA TIGE FEUILLEE DE *MORINDA LUCIDA LINN* (RUBIACEAE)

Esseh K.<sup>1,4\*</sup>, Koudouvo K.<sup>1,4</sup>, Ahama-Eseh K.Y.S.<sup>5</sup>, Karou D.S.<sup>2</sup>, Agbonon A.<sup>1,4</sup>, Kokou K<sup>3</sup>, Gbéassor M<sup>1,4</sup>.

- 1- Laboratoire de Physiologie et Pharmacologie des Substances Naturelles, Faculté des Sciences, Université de Lomé (UL)
- 2- École Supérieure des Techniques Biologiques Alimentaires Appliquées, Université de Lomé
- 3- Laboratoire de Botanique et d'Écologie Végétale, Faculté des Sciences, Université de Lomé
- 4- Centre de Recherche et de Formation sur les Plantes Médicinales (CERFOPLAM), Université de Lomé

5- *Laboratoire de Physiologie et Biotechnologie Végétale, Faculté des Sciences, Université de Lomé.*

Auteur correspondant : Esseh Komlavi, Ph.D. BP : 1515 Lomé, Togo. Email : [komlavi@yahoo.fr](mailto:komlavi@yahoo.fr)  
Phone : (+228) 93100778

**Introduction :** Face à la résistance de *Plasmodium falciparum* (Pf) aux antipaludéens conventionnels et au coût de plus en plus élevé de ces derniers pour les populations des pays de l'Asie et de l'Afrique au sud du Sahara, la recherche d'une alternative fiable basée sur les molécules bioactives, est devenue une impérative mondiale. Pour contribuer à relever ce défi le CERFOPLAM/UL a réalisées des enquêtes ethnobotaniques qui ont abouti au listing des plantes antipaludiques du Togo dont *Morinda lucida*. Les présents travaux ont été entrepris pour vérifier les activités pharmacologiques antiplasmodiales et antioxydantes puis la phytochimie de cette espèce.

**Méthodes :** Le microtest optique *in vitro* sur culture de souche sauvage de Pf, a été utilisé pour l'évaluation de l'activité antiplasmodiale. Le test de réduction de la DPPH par la méthode colorimétrique a servi pour déterminer *in vitro*, le potentiel antioxydant et le taux des polyphénols. En outre, pour le screening phytochimique la Chromatographie sur Couche Mince a été réalisée. Les données ont été traitées par des logiciels appropriés.

**Resultats :** L'évaluation de l'activité antiplasmodiale a révélé que *Morinda lucida* est très actif sur le Pf *in vitro* (Cl<sub>50</sub> de 3,94 ± 0,17 µg/ml pour l'extrait hydro-éthanolique et 3,26 ± 0,00 µg/ml pour l'extrait aqueux) ; la quinine (drogue de référence) ayant une Cl<sub>50</sub> de 0,45±0,01 µg/ml. Pour les tests antiradicalaires, l'extrait hydro-éthanolique a donné respectivement pour le DPPH et la concentration en polyphénols, une Cl<sub>50</sub>= 159,84 ± 0,27 µg/ml et 69,51 ± 6,22 mg EAG/g d'extrait tandis que l'extrait aqueux a une Cl<sub>50</sub>= 20,07 ± 0,51 µg/ml et 58,15 ± 8,41 mg EAG/g. Le témoin (Quercétol) a une Cl<sub>50</sub>= 2,05±0,04 µg/ml. Les alcaloïdes, les tanins, les saponosides et les flavonoïdes sont retrouvés dans les extraits.

**Conclusion :** Ces résultats prouvent que *Morinda lucida* peut être utilisée dans le traitement du paludisme. Toutefois des tests toxicologiques sont recommandés.

**Mots clés :** *Morinda lucida*, activité antiplasmodiale, *Plasmodium falciparum*, Togo.

## OH-CA-07

### TOXICITE DES POLLUANTS ISSUS DE LA BIOMASSE SUR QUELQUES PARAMETRES PHYSIOLOGIQUES DES RATS WISTAR

Jean-Benoît M. GODONOU, Judith F. AHOUNOU AÏKPE, Credo R. KOUKPOLIYI, Armel HOUNKONNOU, Huguette B AKAKPO, Lucrèce KOTIN, Joachim D. GBENOU, Pierre H. DANSOU.

<sup>1</sup>Unité de Recherche en Physiologie de l'Effort, Institut National de la Jeunesse de l'Education Physique et du Sport, Université d'Abomey Calavi. 01 BP 169 Porto-Novo Bénin

<sup>2</sup>Laboratoire de Pharmacognosie et des Huiles Essentielles, Faculté des Sciences de la Santé, Faculté des Sciences et Techniques, Université d'Abomey Calavi 01 BP 188 Cotonou Bénin

Université d'Abomey-Calavi, Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique et du Sport (INJEPS)

Tél: 00229 96-10-95-36 / 97-05-61-60. E-mail: [jbgodonou@yahoo.fr](mailto:jbgodonou@yahoo.fr)

**Introduction :** Dans les pays en voies en développement tels que le Bénin, le coût élevé du gaz domestique ainsi que la précarité en électricité font que de nombreux ménages tant urbains que ruraux font recours au bois pour la cuisson ou la conservation des aliments. La fumée dégagée lors de la combustion du bois contient différents gaz nocifs pour la santé. La médecine clinique et la recherche biomédicale ont soulevé des inquiétudes sérieuses concernant l'impact des polluants de l'air sur la santé humaine. Ces polluants environnementaux sont identifiés comme des facteurs de risques importants et indépendants pour plusieurs maladies telles que les affections respiratoires, le cancer du poumon, l'athérosclérose, les maladies cardio-vasculaires et les perturbations des paramètres sanguins. Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à l'action nocive des polluants issus de la combustion de la biomasse sur le fonctionnement physiologique du rat Wistar.

**Méthodes :** Une exposition aiguë et sub-chronique de ces animaux à la fumée issue du fumage de poissons est réalisée. La concentration de certains polluants est détectée dans la fumée issue de la biomasse. Le toxidrome est déterminé et des échantillons de sang ont été prélevés le 7<sup>ème</sup>, le 14<sup>ème</sup> et 3 mois après exposition pour le dosage de certains paramètres chimiques.

**Resultats :** Les résultats montrent une diminution de l'hématocrite, une évolution perturbée des lymphocytes et des leucocytes, une augmentation de la CRP et une perturbation de l'activité motrice des animaux.

**Mots clés :** Toxicité, biomasse, exposition, paramètres

**OH-CA-08**

## **TEACHING ONE HEALTH: ANIMAL HUSBANDRY IN A POST-GRADUATE INTERDISCIPLINARY CURRICULUM**

*Djibo Idrissa Sidikou<sup>1</sup>, Yannick Caron<sup>2</sup>, Catherine Delguste<sup>3</sup>, Abdoukarim Issa Ibrahim<sup>4</sup>, Maman Laminou Ibrahim<sup>5</sup>, Hassane Adakal<sup>1</sup>, Jean-Luc Hornick<sup>3</sup> and Nicolas Antoine-Moussiaux<sup>3</sup>*

*1. Department of Animal Sciences and Techniques, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, University Dan Dicko Dankoulodo of Maradi, Maradi, Niger;*

*2. Unit of Veterinary Diagnostic, Qualys Tulle, France;*

*3. Fundamental and Applied Research for Animals and Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Liège, Liège, Belgium;*

*4. Department of Animal Productions, University Boubakar Bâ of Tillabéri, Niger;*

*5. Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (Medical and Health Research Center), CERMES, Niamey, Niger.*

*Corresponding author: Djibo Idrissa Sidikou, e-mail: dsidikou@yahoo.com*

**Background and Aim:** This work presents the implementation of a course on animal husbandry in an interdisciplinary curriculum based on the One Health concept. The study describes learners' viewpoints about the course and its insertion in the curriculum. The study aimed at identifying avenues for improvement.

**Materials and Methods:** Fourteen learners (health professionals) participated to individual semi-structured interviews lasting for 25-35 min each. Learners' opinions were extracted from the transcribed interviews and analysis themes were identified from recurrent narratives.

**Results:** The learners perceived animal husbandry as relevant for One Health and potentially useful for their future practice. More precisely, learners were considering a future use of the

newly acquired knowledge and skills in the advising of communities facing malnutrition and for the strategic planning at wider levels. Teaching methods were appreciated thanks to the active learning style. Unmet expectations concerned the coverage of impacts and relationships to other disciplines, the inclusion of viewpoints from other disciplines into the teaching, and the degree of contextualization of contents, e.g. through case studies. Accordingly, the main avenues for improvement, as identified by learners, were to give a prior focus on impacts (especially on human health) for all contents and to increase the number of case studies, but also to better address the questions of the usefulness of animal products in the management of malnutrition.

**Conclusion:** The analysis of learners' expectations (met and unmet) and their recommendations regarding the future of the course helped identifying both successes and important challenges for teachers. Two main challenges are highlighted. First, increased interdisciplinarity is needed within the course to better cover the notion of impact of animal husbandry on health, society and environment. Second, the complexity of the domain under consideration will call for important efforts of clarification of the course structure and objectives in terms of skills acquisition.

**Keywords:** animal husbandry, interdisciplinary curriculum, one health

OH-CA-09

## SOINS INFIRMIERS EN CONTEXTE D'ÉPIDÉMIE À MORTALITÉ RAPIDE : CAS DE LA FIÈVRE HÉMORRAGIQUE À VIRUS LASSA AU BÉNIN

*Dr AHOSSI Eusèbe Coovi, Inf, PhD.*

*Institut National Médico-Sanitaire/Cotonou*

*Université d'Abomey-Calavi/Bénin*

*Tel : +229 64215291 . Courriel : [ahossi\\_eusebe@yahoo.fr](mailto:ahossi_eusebe@yahoo.fr)*

*Dr OTTI André, Inf, PhD.*

*Institut National Médico-Sanitaire/Cotonou*

*Université d'Abomey-Calavi/Bénin*

*Tel : +229 64068282 / 61989888. Courriel : [androtti@ymail.com](mailto:androtti@ymail.com)*

*M. ADOUNVO Olivier, Inf, Msc, Directeur honoraire des soins infirmiers et obstétricaux*

*Tel : +229 94 01 88 05 (mobile); 95 05 91 98 (WhatsApp). Courriel : [olivieradounvo2017@gmail.com](mailto:olivieradounvo2017@gmail.com)*

*M. TOKPANOU K. Hubert Charbel, Inf, Bsc, Spécialiste en Biohygiène et Sécurité Sanitaire  
Infirmier clinicien de site de confinement et de prise en charge des cas de coronavirus*

*Tel : +229 97 62 39 87 / 95 25 98 82 (WhatsApp). Courriel : [charbel.tokpanou@yahoo.fr](mailto:charbel.tokpanou@yahoo.fr)*

**Introduction :** Le virus Ébola et le virus de Lassa sévissent en Afrique. La République du Bénin a connu entre 2014 et 2018 quatre épidémies confirmées de FHV Lassa. Au total 43 décès, dont 5 agents de santé (un médecin et 4 prestataires de soins) sur 93 personnes infectées ont été enregistrés. Chaque flambée épidémique déclenche une crise de panique dans la population et au sein des agents de santé. Cette étude qualitative vise à explorer la pratique infirmière en contexte d'épidémie mortelle de FHV Lassa au Bénin afin de mieux comprendre les raisons qui expliquent les fortes létalités enregistrées dans la population et dans le rang des agents de santé.

**Méthodes** : Dans le cadre de cette recherche, un devis qualitatif de type d'étude de cas multiple est utilisé avec une approche exploratoire, descriptive et explicative.

**Résultats** : Les cinq thèmes issus du cadre de référence ayant servi de thématiques pour la collecte des données ont servi de base pour l'analyse grâce à la méthode d'analyse de Ritchie, Lewis, Nicholls et Ormston (2013). Les résultats ont mis en relief les facteurs qui expliquent les forts taux de létalité enregistrés durant les épidémies, les contraintes auxquelles les infirmières sont confrontées pendant l'offre des soins et le rôle autonome qu'elles jouent dans cet environnement de soin à haut risque.

**Conclusion** : Les résultats empiriques ont fourni des informations pertinentes pouvant servir de guides pour la préparation et l'amélioration de la prise en charge infirmière des cas de FHV Lassa. À cet effet, un modèle de prise en charge centré sur le patient atteint de fièvre Lassa a été proposé pour servir d'outil de travail aux infirmières béninoises et d'Afrique.

**Mots clés** : Soins infirmiers - FHV Lassa –Bénin

## OH-CA-10

### PORTAGE NASAL DE *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* RESISTANT A LA METICILLINE CHEZ DES VOLONTAIRES SAINS ET DES MALADES HOSPITALISE A OUAGADOUGOU, BURKINA FASO

Soré S.<sup>1,2</sup>, Sanou S.<sup>3</sup>, Béogo S.<sup>1</sup>, Dakouo S.N.P.<sup>3</sup>, Djamalladine M.D.<sup>4</sup>, Ilboudo K.S.<sup>1</sup>, Zoungrana J.<sup>3</sup>, Poda A.<sup>3</sup>, Ouédraogo A.S.<sup>2</sup>, Sanou I.<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Centre hospitalier universitaire de Tengandogo, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>2</sup>Université Saint Thomas d'Aquin, Ecole doctorale des sciences, santé et Technologies

<sup>3</sup>Centre hospitalier universitaire Sourou Sanou, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

<sup>4</sup>Institut national supérieur des sciences et technique d'Abéché, Abéché, Tchad

**Introduction:** *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline (SARM) pose des problèmes de prise en charge des infections. Le but de notre étude était de déterminer la prévalence du portage de *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline, d'identifier les résistances associées et d'en analyser les facteurs associés.

**Matériel et méthodes:** Une étude transversale a été menée auprès des patients et des volontaires. Après leur consentement éclairé, des écouvillonnages nasaux ont été réalisés, qui ont permis d'isoler et d'identifier *S. aureus* à travers ces caractères culturels et biochimiques. Ensuite la résistance à la méticilline et les résistances associées ont été faite en testant la sensibilité des souches par la méthode de diffusion des disques selon EUCAST.

**Résultats:** Au total 189 échantillons ont été inclus, qui ont permis d'isoler 10 SARM soit une prévalence globale de 5,29% (7,95% chez les patients et 2,97% parmi les volontaires) ( $p=0,24$ ). La fréquence de SARM parmi les *Staphylococcus aureus* a été de 27,77% dont 31,81% chez les patients et 21,42 % chez les volontaires. Les SARM ont été résistants à 100% et 66,67% à la norfloxacine et à 57,14% et 33,33% à l'érythromycine respectivement chez les patients et chez les volontaires. Cependant la gentamicine a enregistré une sensibilité de 100%. Le sexe, l'âge, la prise antérieure d'antibiotiques n'étaient pas associés au portage de SARM.

**Conclusion** : Cette étude sur la prévalence de SARM rapporte des résultats inquiétants. Il y a une urgence à développer les mesures de surveillance de la diffusion de ces souches multirésistantes.

**Mots clé** : SARM, Patients, Volontaires sains

## AXE 4 : COMMUNICATIONS LIBRES

### CL-CA-01

#### INFLUENCE DE L'INFECTION BACTERIENNE DU SPERME SUR LA FECONDITE MASCULINE

*Schama I. F. ZANNOU<sup>1</sup>, V. Brice Armand FANOUE<sup>1</sup>, Sylvain HOUNSOUNNOU<sup>2</sup>, Eustache ACLINOUE<sup>3</sup>, Angèle Th. AHOYO<sup>1</sup>*

*Affiliations :*

*1 : Laboratoire Génie de Biologie Humaine (EPAC), Université d'Abomey-Calavi*

*2 : Toxi-Labo, Cotonou*

*3 : Laboratoire de l'hôpital de Zone de Mènontin*

**Introduction :** L'infertilité du couple constitue un problème majeur de santé publique. De nombreuses recherches ont montré que dans 20% des cas, les hommes sont responsables de l'infertilité du couple et où, dans de nombreux cas, les infections dues aux bactéries constituent des causes. Cette étude a été réalisée dans le but d'évaluer l'influence des infections bactériennes sur la qualité du sperme, sur une période de deux (02) mois (06/2019 – 09/2019).

**Méthodes :** Il a été réalisé sur chaque échantillon un spermogramme puis une spermoculture selon les normes de l'OMS.

**Resultats :** L'étude a porté sur 180 spermes, provenant de clients d'âge moyen égal à 36 ans  $\pm$  7,66. Les tranches d'âge de 30 à 40 ans et 20 à 30 ans sont celles majoritairement représentées. L'étude biologique des spermes avait révélé que plus de la moitié (53,89%) souffrait des anomalies liées à la numération telles que : l'azoospermie, l'oligospermie et la polyzoospermie. La vitesse de progression des spermatozoïdes a été le paramètre du spermogramme le plus affecté soit 76,05% de clients. 57,78% des clients étaient infectés. Cette étude a montré qu'il existe un lien étroit entre l'âge et la survenue d'infection d'une part, et qu'inversement, l'infection influence significativement le volume d'éjaculat d'autre part.

**Conclusion :** En somme, même si certains aspects du point de vue épidémiologique et biologique à l'instar du spermocytogramme (morphologie des spermatozoïdes) n'ont pu être abordés dans cette étude, il paraît clair que la présence de bactéries influence la qualité du sperme.

**Mots clés :** Infertilité – Infection spermatique – Spermoculture

#### CL-CA-02

### ETUDE COMPAREE DE LA TOLERANCE AU D-GLUCOSE DE *ANNONA SENEGALENSIS* PERS ANNONACEAE ET DE *TRICHILIA PRIEUREANA* A. JUSS MELIACEAE CHEZ LE RAT WISTAR : POTENTIEL ANTIDIABETIQUE.

Roland B. Kangbeto<sup>1</sup>, Eugène Sèlidji Attakpa<sup>1</sup>, Latifou Lagnika<sup>2</sup>, Mounirou Tchachedre, Raphatou Orou piame.

<sup>1</sup>Laboratoire de Physiopathologie Moléculaire et Toxicologie FAST/UAC 01BP4521 cotonou Rép du Bénin.

<sup>2</sup>Laboratoire de Biochimie et Substances Naturelles Bioactives FAST/UAC

<sup>3</sup>Laboratoire de Biologie et de Typage Moléculaire en Microbiologie FAST/UAC

En Afrique et particulièrement au Bénin la population est de plus en plus confrontée à plusieurs pathologies telles que le diabète. Cette population pour le traitement de ces pathologies fait recours à la médecine traditionnelle. L'usage fréquent de ces plantes et les résultats satisfaisants qui s'en suivent dans certains cas, nous ont conduit à mener une réflexion plus poussée sur *Annona senegalensis* et *Trichilia prieureana*. Le présent travail a été conduit dans le but d'évaluer la bioactivité de ces extraits chez le rat Wistar. Les rendements des extraits éthanolique ont donné respectivement 5,16% et 7,51%. Après un screening phytochimique des extraits par la méthode de CCM complétée par la méthode en tube, nous avons révélé la présence des métabolites secondaires. Les phénols totaux, les flavonoides totaux et les tanins condensés ont été dosés par la méthode du FCR, au chlorure d'aluminium et à l'acide chlorhydrique. Les résultats révèlent une forte concentration de ces métabolites dans *Annona s.* que dans *Trichilia p.* Les activités anti oxydantes menées dans les milieux réactionnels (extrait + DPPH) par la méthode du DPPH et par la méthode FRAP puis comparés au contrôle positif (Acide ascorbique + DPPH) montrent que *Annona s.* présente une forte activité anti oxydante proche de l'acide ascorbique que *Trichilia p.* Les textes de toxicité réalisés à 5000mg/kg de poids montrent que ces extraits ne sont pas toxiques et ne causent aucun dommage aux tissus tels que le foie et les reins. L'étude de la tolérance au D-glucose montre que ces plantes empêchent la montée de la glycémie.

**Mots clés :** *Annona senegalensis*, *Trichilia prieureana*, Activité antioxydante.

#### CL-CA-03

### ACTIVITE DIURETIQUE ET SALIDIURETIQUE D'EXTRAITS DE *JATROPHA CURCAS* DANS LE TRAITEMENT TRADITIONNEL DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE AU BENIN

Aldo L. F. Rigis GNONLONFOUN<sup>1</sup>, Judith F. AHOUNOU AÏKPE<sup>1</sup>, Wilfrid K. AGBODJOGBE<sup>1</sup>, Régis ANANI<sup>1</sup>, Falcao PADONOU<sup>1</sup>, Jean-Benoît M. GODONOU<sup>1</sup>, Huguette B AKAKPO<sup>1</sup>, Lucrèce KOTIN<sup>1</sup>, Joachim D. GBENOU<sup>2</sup>, Pierre H. DANSOU<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Unité de Recherche en Physiologie de l'Effort, Institut National de la Jeunesse de l'Education Physique et du Sport, Université d'Abomey Calavi. 01 BP 169 Porto-Novo Bénin

<sup>2</sup>Laboratoire de Pharmacognosie et des Huiles Essentielles, Faculté des Sciences de la Santé, Faculté des Sciences et Techniques, Université d'Abomey Calavi 01 BP 188 Cotonou Bénin  
Université d'Abomey-Calavi, Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique et du Sport (INJEPS)

Tél: +229 660 624 84 / 970 561 60. E-mail: [ri\\_gis@yahoo.fr](mailto:ri_gis@yahoo.fr)

*Jatropha curcas* est une plante médicinale utilisée de façon empirique par la médecine traditionnelle béninoise dans le traitement de plusieurs maladies dont l'hypertension artérielle. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'activité diurétique et salidiurétique d'extraits flavonoïdique et hydroéthanolique de *Jatropha curcas*, plante utilisée dans le traitement traditionnel de l'hypertension artérielle au Bénin. Pour évaluer l'activité diurétique de la plante, sept lots de rats sont constitués. Le groupe contrôle reçoit 20mL/kg d'eau distillée, le groupe référence reçoit 20mg/kg de furosémide et les groupes test reçoivent différentes doses (200 et

500mg/kg) d'extraits (flavonoïdique / hydroéthanolique) et 25 mL/kg de décocté extemporané par voie orale. L'activité et l'action diurétique ont été déterminées sur la base de l'urine excrétée. La concentration urinaire de sodium, de potassium et de chlorure est évaluée. Le rapport Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup> a été également déterminé. Les résultats révèlent que les deux extraits sont diurétiques (actions diurétiques > 1 et activité diurétique <1) à toutes les doses. Les rapports Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup> sont supérieurs à 1 ce qui indique une action salidiurétique satisfaisante sans une perte excessive de potassium.

**Mots clés :** *Jatropha curcas*, diurétique, salidiurétique, rats, HTA.

CL-CA-04

## CONSOMMATION D'ALCOOL ET OBESITE ABDOMINALE PARMIS LA POPULATION ADULTE AU BURKINA FASO: ANALYSE A PARTIR D'ETUDE TRANSVERSALE

Kadari CISSE<sup>1,2</sup>, Henri Gautier OUEDRAOGO<sup>1</sup>, Séni KOUANDA<sup>1,3</sup>

**Affiliations :**

1. Institut de Recherche en Science de la Santé
2. Université Libre de Bruxelles
3. Institut Africain de Santé Publique

**Introduction:** l'obésité abdominale est un facteur de risque important de nombreuses maladies cardiovasculaires et troubles métaboliques. Le rôle de l'alimentation et de l'inactivité physique dans l'émergence de l'obésité abdominale est clairement établi. Cependant le lien entre la consommation d'alcool et l'obésité abdominale n'est pas clair. Les études observationnelles ont produit des résultats contradictoires. Notre travail a pour but d'étudier l'association entre la consommation d'alcool et l'obésité abdominale au Burkina Faso.

**Méthodes:** nous avons réalisé une analyse secondaire de la première enquête STEP réalisée au Burkina Faso en 2013. L'obésité abdominale a été définie, selon les critères de la Fédération internationale du diabète (FID) 2009, par un tour de taille ≥ 94 pour les hommes et ≥ 80 pour les femmes. La consommation courante d'alcool a été utilisée comme variable indépendante

principale. Les consommateurs ont été appariés au non consommateurs d'alcool par score de propension. Les résultats ont été ajustés sur l'âge, le niveau d'instruction, la profession, la consommation de graisse, l'inactivité physique et stratifiée en fonction du sexe et du milieu de résidence.

**Résultats:** Au total, 4482 adultes ont été inclus dans l'étude. Les femmes ont représenté 50,2%. La prévalence de l'obésité abdominale était de 21,3%. Après appariement par le score de propension, on ne note pas d'association significative entre la consommation d'alcool et l'obésité abdominale en milieu urbain ce quel que soit le sexe. Par contre en milieu rural, on note une association négative aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Ainsi le risque d'obésité abdominale est réduit de 1,9% [95%IC : 0,1%-3,7%] :  $p=0.039$ ) chez les hommes et 9,1% [95%IC : 3,1%-15,1%] :  $p=0.003$ ) chez les femmes.

**Conclusion :** En milieu rural au Burkina Faso la consommation d'alcool est souvent accompagnée de pratique alimentaire qui ne favorise pas le développement de l'obésité abdominale. Néanmoins, la consommation d'alcool est en elle-même un facteur de risque de maladie cardiovasculaire contre lequel il faut des mesures de santé publique efficace.

**Mots clés :** Obésité abdominale, Alcool, Burkina Faso

## CL-CA-05

### EFFET DE LA STIMULATION ELECTRIQUE TRANSCUTANEE DANS LA PRISE EN CHARGE DES DOULEURS INDUITES PAR LE HANDIBASKET AU BURKINA FASO

D. OUEDRAOGO<sup>1</sup>, O. D. AZE<sup>1</sup>, J. AHOUNOU<sup>2</sup>, B. AKPLOGAN<sup>1</sup>, R. SITOU<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Unité de Recherche : Déficiences, Activités Physiques Adaptées et Réhabilitation du Laboratoire des Sciences de la Vie de la Santé. Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique et du Sport/Université d'Abomey-Calavi (INJEPS/UAC), Bénin

<sup>2</sup>Laboratoire de physiologie de l'Effort (LAPEF) de INJEPS/UAC

**Introduction :** Le basketball en fauteuil roulant est l'un des para-sports le plus pratiqué au Burkina Faso. 66,7% des pratiquants présentent des douleurs induites par la pratique du handibasket. L'objectif de cette étude était de rechercher l'effet de la stimulation électrique transcutanée sur la récupération de ces douleurs.

**Méthodes :** Cette étude d'intervention a porté sur 12 joueurs ( $33 \pm 7$  ans) de sexe masculin atteints de poliomyélite (95%) et souffrants de douleurs consécutives à la pratique du handibasket. Les cas de douleurs étaient localisés majoritairement à l'épaule (52.2%), dans le bas de dos (21,7%). L'intervention a consisté à exécuter un programme de stimulation électrique transcutanée antalgique sur 4 semaines avec une évaluation initiale et finale avec l'EVA. L'échantillon est réparti en 2 groupes : d'intervention (GI)=6 et de contrôle (GC)=6.

**Résultats :** L'évaluation hebdomadaire de l'intervention a permis d'enregistrer une baisse des douleurs dans GE comparée à GC avec une récupération moyenne de 2,5 cm de l'EVA correspondant respectivement à 71,2% en 4 semaines. De plus, GE récupérait complètement de la douleur plus tôt que GC (24h versus 48h,  $p=0,013$ ).

**Conclusion :** La stimulation électrique transcutanée est un moyen idéal pour accélérer la récupération non médicamenteuse de la douleur suite au handibasket. Il serait bien de mener des études pour comprendre le mécanisme de survenue de ces douleurs.

**Mots clés :** Handibasket, Douleur, électrostimulation.

## CL-CA-06

### ACTIVITES ANTIBACTERIENNES DE L'EXTRAIT ETHANOLIQUE DE *CRATEVA ADANSONII* DC. (CAPPARIDACEAE) RECOLTEE A DASSA-ZOUME AU CENTRE DU BENIN

Zinsou Franck Mignanwandé<sup>1</sup>, Roch Christian Johnson<sup>1</sup>, Armelle Sabine Yélignan Hounkpatin<sup>1,2</sup>, Damien Toffa<sup>1</sup>, Gratien Boni<sup>1</sup>, Eustache Enock Houéto<sup>1</sup>, Parfait Djossou, Madjid Olatoundé Amoussa<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Laboratoire d'Hygiène, d'Assainissement, de Toxicologie et de Santé Environnementale (HECOTES), Centre de Formation Interfacultaire et Recherche Environnementale pour le Développement Durable (CIFRED) de l'Université d'Abomey (UAC / Bénin), 01 PO Box 1463 Cotonou, Bénin.

<sup>2</sup> Ecole Normale Supérieure d'Enseignement Technique (ENSET), Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) d'Abomey BP: 133 Lokossa, BENIN

<sup>3</sup> Laboratoire de Biochimie et de Substances Naturelles Bioactives (LBSNB) de la Faculté des Sciences et Technologies (FAST), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

**Introduction :** Les sociétés humaines à travers les civilisations sont très attachées à l'utilisation des plantes médicinales (Muhammad *et al*, 2017). A titre illustratif, 80% de la population des pays en développement font recours à la médecine traditionnelle en première intention pour les soins de santé primaire (OMS, 2002/ Olou *et al*, 2018). *Crateva adansonii* de la famille des capparidaceae est une plante médicinale utilisée au Bénin pour ses multiples vertus thérapeutique notamment ses propriétés antibactériennes

**Objectif :** La présente étude est initiée pour étudier les propriétés antibactériennes de l'extrait *C. adansonii* sur les germes couramment identifiés dans les infections cutanées et digestives au Bénin ainsi que la réversion de la résistance à ces germes sus cités.

**Méthode :** La sensibilité des germes à l'extrait a été réalisée par la méthode de microdilution en milieu liquide ainsi que la détermination de la concentration minimale inhibitrice et la réversion de la résistance bactérienne. Pour la détermination de la concentration minimale bactéricide, cette technique est utilisée couplée à l'étalement sur milieu gélosé.

**Résultats :** Sur les huit germes testés, sept ont été sensibles à l'extrait avec des CMI comprises entre 0,625 - 5 mg / ml. Le CMB d'*Enterococcus faecalis* ATCC 29212 est de 2,5 mg / ml tandis que celle de *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline et de *Staphylococcus epidermidis* CIP 8039 est de 5 mg / ml. La réversion de la résistance bactérienne a montré une synergie d'action entre l'extrait et les antibiotiques conventionnels.

**Conclusion :** Cette étude a révélé que *Crateva adansonii* possède une activité antibactérienne sur les germes responsables de troubles cutanés et digestifs. De plus, son extrait associé aux antibiotiques conventionnels a révélé une inversion de la résistance bactérienne des germes.

**Mots clés :** Antibactériennes, *Crateva adansonii*, réversion

## CL-CA-07

## ANALYSE DES RESIDUS D'ANTIBIOTIQUES DANS LES PRODUITS LAITIERS ET DERIVES DE CONSOMMATION DANS LES COMMUNES AGRO-PASTORALES AU NORD DU BENIN.

Azanmanvo M. Yedjenou<sup>1,2</sup>, Murielle F. Soglo<sup>2</sup>, Antoine V. Hinson<sup>3</sup>, Haziz Sina<sup>1</sup>, Razack Adeoti<sup>2</sup>, Rousseau Djouaka<sup>2</sup>

1 : Laboratoire de Biologie et de Typage Moléculaire en Microbiologie, Faculté des Sciences et Techniques, (Université d'Abomey-Calavi Bénin)

2 : Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA)

3 : Unité d'Enseignement et de Recherche en Santé au Travail et Environnement, Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou (Université d'Abomey-Calavi Bénin).

**Introduction :** La résistance aux antimicrobiens est une menace mondiale majeure avec un taux de mortalité humaine de 10 millions prévus par an à partir de 2050. L'incidence croissante de la résistance aux antimicrobiens est souvent attribuée à l'utilisation intensive d'antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire. En élevage, cette utilisation intensive engendre des résidus qui contaminent les aliments dont le lait et ses dérivés.

**Objectif :** Evaluer le niveau de contamination en résidus de deux antibiotiques très utilisés en élevage (Pénicilline G et Sulfadimidine) dans le lait frais de vache, et ses produits dérivés issus de trois communes du Nord Bénin.

**Méthodes :** Cette étude transversale et analytique a porté sur 45 échantillons de lait frais de vache, lait caillé et fromage. Des entretiens/focus group discussion avec des médecins vétérinaires et des éleveurs ont été effectués pour recenser la liste des antibiotiques les plus utilisés. Les échantillons par éleveur et par commune de lait frais (6 échantillons de 500ml), de lait caillé (6 échantillons de 500ml) et de fromage (3 échantillons de 500g) ont été collectés de façon aseptique. La quantification des résidus d'antibiotiques a été effectuée par chromatographie liquide à haute performance (CLHP) après une extraction des résidus par la méthode QuEChERS.

**Résultats :** 5 familles d'antibiotiques sont fréquemment utilisées : tétracyclines, pénicillines, sulfamides, macrolides et aminosides. La limite de détection (LOD) était respectivement 0,06621 µg/mL pour la Pénicilline G et 0,02012 µg/mL pour la sulfadimidine. La limite de quantification (LOQ) était 0,22072 µg/mL pour la Pénicilline G et 0,06705 µg/mL pour la sulfadimidine. Aucun résidu de Pénicilline G ni de Sulfadimidine n'a été détecté ni quantifié dans les échantillons. Ces résidus sont inférieurs à la LOQ et donc inférieurs à la LMR du *Codex Alimentarius* et de l'Union Européenne.

**Conclusion :** Cette étude a permis de mettre en évidence que le lait et ses dérivés issus des trois communes d'étude ne sont pas contaminés en résidus de sulfadimidine et de pénicilline G. Toutefois, la recherche d'autres antibiotiques utilisés tels que les tétracyclines, macrolides et aminosides dans les échantillons permettrait de comprendre l'implication de l'utilisation intensive des antibiotiques dans la résistance aux antibiotiques en médecine vétérinaire et humaine.

**Mots clés :** résidus, antibiotiques, fromage.

## ANALYSE DES RESIDUS D'INSECTICIDES DE SYNTHESE DANS LES PRODUITS LAITIERS ET DERIVES DE CONSOMMATION DANS LES COMMUNES DE BANI KOARA, KANDI ET GOGOUNOU.

Azanmanvo M. Yedjenou<sup>1,2</sup>, Murielle F. Soglo<sup>2</sup>, Antoine V. Hinson<sup>3</sup>, Haziz Sina<sup>1</sup>, Razack Adeoti<sup>2</sup>, Rousseau Djouaka<sup>2</sup>

1 : Laboratoire de Biologie et de Typage Moléculaire en Microbiologie, Faculté des Sciences et Techniques, (Université d'Abomey-Calavi Bénin)

2 : Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA)

3 : Unité d'Enseignement et de Recherche en Santé au Travail et Environnement, Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou (Université d'Abomey-Calavi Bénin).

**Introduction** : La consommation d'aliments contaminés est la cause de plus de 200 maladies, allant des maladies diarrhéiques, qui tuent le plus, au cancer. En agriculture, la mauvaise utilisation des pesticides engendre des résidus qui contaminent les aliments dont le lait et les produits laitiers. Ces résidus sont responsables chez l'homme des effets dermatologiques, mutagènes, tératogènes, cancérigènes, hormonales et neurologiques.

**Objectif** : Evaluer le niveau de contamination en résidus de six insecticides de synthèse (profénofos, chlorpyrifos, lambda-cyhalothrine, cyperméthrine, acétamipride et DDT) dans le lait frais de vache, et ses produits dérivés.

**Méthodes** : Cette étude transversale et analytique a porté sur 45 échantillons de lait de vache, lait caillé et fromage. Les échantillons par producteur et par commune de lait frais (6 échantillons de 500ml), de lait caillé (6 échantillons de 500ml) et de fromage (3 échantillons de 500g) ont été collectés de façon aseptique. La quantification des résidus d'insecticides a été effectuée par chromatographie liquide à haute performance HPLC après une extraction des résidus par la méthode QuEChERS. Les résultats des analyses ont été comparés à la limite maximale de résidu (LMR) du *Codex Alimentarius* et de l'Union Européenne puis comparés en fonction des matrices et des localités.

**Résultats** : Les principaux principes actifs des insecticides autorisés au Bénin sont l'acétamipride (19%), la cyperméthrine (9%), la lambda-cyhalothrine (8%), le chlorpyrifos (9%) et le profénofos (7%). Tous les échantillons analysés étaient exempts de chlorpyrifos, profénofos, lambda-cyhalothrine et de DDT. La cyperméthrine a été quantifiée dans tous les échantillons à des teneurs variant de 0,3 à 1,0 mg/kg qui sont tous supérieures à la LMR (0,05mg/kg). L'acétamipride a été quantifié dans 41 échantillons sur 45 à des teneurs variant de 0,3 à 1,4 mg/kg qui sont supérieures à la LMR (0,2mg/kg).

**Conclusion** : Cette étude a permis de mettre en évidence une contamination du lait et de ses dérivés en résidus d'acétamipride et de cyperméthrine. Il existe donc un risque sanitaire lié à la consommation de ces produits.

**Mots-clés** : Insecticides, résidus, lait.

## PERCEPTIONS ET PRATIQUES SOCIALES LIEES A LA MALNUTRITION DES ENFANTS DANS LES COMMUNES DE BOUKOMBE, COBLY, MATERI ET TANGUIETA.

*Florentine B. MERE, Roch A. HOUNGNIHIN (laboratoire d'anthropologie médicale appliquée, Université d'Abomey-Calavi)*

**Introduction :** La malnutrition reste un véritable fléau. En dépit des multiples programmes de lutte contre la malnutrition dans le département de l'Atacora, on note sa persistance. L'objectif de cette recherche était d'analyser les perceptions et les pratiques sociales associées à la malnutrition des enfants dans les communes de Boukombe, Cobly, Matéri et Tanguiéta.

**Méthodes :** Essentiellement qualitative, l'étude s'est basée sur les techniques de recherche documentaire relative aux perceptions et pratiques sociales, d'entretiens (individuel et focus group) avec les parents d'enfants, les acteurs administratifs et religieux et l'observation de l'état des enfants et des pratiques alimentaires. 102 personnes sont interviewées après saturation de seuil.

**Résultats :** La majorité des interlocuteurs ne sont pas conscients de la malnutrition comme une maladie ou un problème de santé. Celle-ci est perçue plutôt comme un message d'un ancêtre, un sort jeté sur l'enfant ou encore la manifestation d'un génie/esprit. Le registre étiologique de la malnutrition en rapport avec les relations sexuelles précoces stipulant le « viol » du nourrisson semble relativement probable. Cependant, dans la conception populaire, la « *sortie sociale* » permet de prédire le « destin » du nouveau-né et d'identifier « l'esprit ancestral » incarné. A cet effet, des rituels sont faits pour prévenir les maladies ou annuler le sort jeté à l'enfant. Les itinéraires thérapeutiques semblent dissimuler les pathologies chez les enfants malnutris, ce qui sans doute explique la prévalence de la malnutrition.

**Conclusion :** A la lumière des résultats, il est indispensable de tenir compte des cadres étiologiques populaires pour une meilleure prise en charge de la malnutrition dans les projets et programmes.

**Mots clés :** perception sociale, divination, Atacora.

### CL-CA-10

## PROJET D'ENQUETE SUR LES CONNAISSANCES, PERCEPTIONS ET PRATIQUES ALIMENTAIRES DES FOOTBALLEURS DU BENIN AU COURS DE LA SAISON SPORTIVE 2020

*\*Raïssa AKPLOGAN*

*Unité de Recherche, Sport Santé et Evaluation. Institut National de la Jeunesse de L'Education, Physique et du Sport*

*Contacts : 00229 64492809 / [raissaakplogan@yahoo.com](mailto:raissaakplogan@yahoo.com)*

*Issiako BIO NIGAN*

*Unité de Recherche, Sport Santé et Evaluation. Institut National de la Jeunesse de L'Education, Physique et du Sport*

*Contacts : 00229 97692293 / [yonyari810@gmail.com](mailto:yonyari810@gmail.com)*

*Moussiliou PARAÏSO*

*Institut Régional de Santé Publique*

*Contacts : 00229 96757440 / [moussparaiso@gmail.com](mailto:moussparaiso@gmail.com)*

*Jean-Paul KOUASSI*

*Unité de Recherche, Sport Santé et Evaluation. Institut National de la Jeunesse de L'Education, Physique et du Sport*

*Contacts : 00229 97692293 / [kouassiip1@yahoo.fr](mailto:kouassiip1@yahoo.fr)*

*Léonce LINTA*

*Unité de Recherche, Sport Santé et Evaluation. Institut National de la Jeunesse de L'Education, Physique et du Sport*

*Contacts : 00229 97692293 / [lintalonce@yahoo.fr](mailto:lintalonce@yahoo.fr)*

*Gilchrist GOUTHON*

*Unité de Recherche, Sport Santé et Evaluation. Institut National de la Jeunesse de L'Education, Physique et du Sport*

*Contacts : 00229 66730277 / [gilchristgouthon@yahoo.fr](mailto:gilchristgouthon@yahoo.fr)*

Un apport nutritionnel adapté permet à l'athlète d'avoir les nutriments nécessaires et suffisants pour la réalisation d'une bonne performance. Dans ce sens, il est nécessaire pour l'athlète d'avoir une bonne préparation physique, technico-tactique, psychologique et surtout un bon état nutritionnel, aspect souvent négligé chez les footballeurs au Bénin. Ce projet d'enquête sur l'alimentation chez les footballeurs d'élite béninois a pour objectif d'apprécier chez eux le niveau de connaissances, de pratiques et de perceptions alimentaires. Les données ont été collectées de Juillet à Septembre 2020, auprès de 502 footballeurs des clubs de division 1 et 2, à l'aide d'un questionnaire administré. Ce questionnaire est relatif aux connaissances et pratiques alimentaires des footballeurs. Les perceptions des footballeurs ont été recueillies à l'aide d'un guide d'entretien. Le postulat de cette recherche est que les footballeurs ont de mauvais niveaux de connaissance, de perception et de pratique en alimentation puis que le niveau de connaissance influence la perception et la pratique des footballeurs.

**Mots clés** : connaissances, pratiques, perception, footballeurs.

## **CL-CA-11**

### **FACTEURS ASSOCIES A LA PRATIQUE DE L'EDUCATION NUTRITIONNELLE A LA MATERNITE DU CHU-MEL DE COTONOU EN REPUBLIQUE DU BENIN EN 2019.**

*Dangbemey DP<sup>1</sup>, Sossa JC<sup>3</sup>, Tognifode V<sup>1</sup>, Aboubakar M<sup>2</sup>, Koumagbeafide V<sup>4</sup>, Hounkpatin BIB<sup>1</sup>, Tonato-Bagnan<sup>1</sup> JA, Denakpo JL<sup>2</sup>.*

*1 Service de Gynécologie Obstétrique - CHU MEL de Cotonou*

*2 Clinique Universitaire de Gynécologie Obstétrique - CNHU HKM de Cotonou*

*3 Institut Régional de Santé Publique, Alfred QUENUM*

*4 Institut National Médico-Sanitaire*

*Dr DANGBEMEY Djima Patrice, Assistant de gynécologie obstétrique à l'UAC/FSS Cotonou. [ddpatous78@yahoo.fr](mailto:ddpatous78@yahoo.fr) +229 66 25 75 24/ 65475858*

**Introduction :** Etudier les facteurs favorisant la pratique de l'éducation nutritionnelle (EN) à la maternité du CHU-MEL de Cotonou.

**Méthodes :** Etude transversale descriptive à visée analytique qui s'est déroulée sur 45 jours (8 avril au 21 mai 2019) en consultation prénatale. Etaient inclus les sages-femmes et gynécologues consultants, observés dans leur pratique puis interrogés sur leur connaissance sur l'EN après avoir obtenu leur accord de participation.

Une connaissance ou pratique était supposée « bonne » lorsque le prestataire avait répondu ou exécuté correctement au moins 80% des questions ou gestes nécessaires et « à améliorer » dans le cas contraire.

Les tests de chi2 et de Fisher ont été utilisés pour la comparaison des variables. La différence était significative pour une valeur de  $p \leq 0,05$ .

**Résultats :** Sur 50 professionnels enquêtés pour 70 attendus, 43 étaient sages-femmes d'Etat et 7 gynécologues obstétriciens. En ce qui concerne l'ancienneté, 68% avaient de plus de 15 ans. Sur 9 réalisations d'EN, 6 ont montré une bonne pratique pour : l'identification et l'analyse du problème, la maîtrise du sujet et la proposition des solutions. Aucune pratique n'a été jugée bonne en ce qui concerne : la mise en œuvre, le suivi et la discussion pour l'amélioration des pratiques. La pratique du conseil nutritionnel était jugée bonne chez 4 sages-femmes sur 43 (9,3%) et chez 1 médecin sur 7 (14%).

La catégorie professionnelle était significativement associée à la connaissance des professionnels de santé sur l'éducation nutritionnelle ( $p = 0,001$ ).

Il n'y avait pas d'association significative entre la catégorie professionnelle et la pratique en éducation nutritionnelle ( $p = 0,7$ ). L'ancienneté dans la profession était associée à la qualité de la pratique de l'éducation nutritionnelle ( $p=0,38$ ).

**Conclusion :** La connaissance des facteurs favorisant la pratique de l'EN permettra d'augmenter la performance.

**Mot clés :** facteurs, éducation, nutrition

## CL-CA-12

### CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES ADOLESCENTS DE LA VILLE DE BRAZZAVILLE EN MATIERE DE LA PREVENTION DU COVID-19

MOUSSOUAMI Simplicie Innocent<sup>1</sup>, BOUSSANA Alain<sup>2</sup>, NSOMPI Florent<sup>2</sup>, ALONGO Yvon Rock Ghislain<sup>2</sup>, MBEMBA François<sup>2</sup>, GOUTHON Polycarpe<sup>1</sup>

1- Unité de Recherche Sport, Santé et Evaluation (UR/SSE). Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique et du Sport (INJEPS), Université d'Abomey-Calavi (UAC). 01 BP : 169. Porto-Novo (Bénin).

2- Laboratoire de Physiologie de l'Effort et de Biomécanique (LPB). Institut Supérieur d'Education Physique et Sportive (ISEPS), Université Marien Ngouabi (Congo). BP : 69

Auteur correspondant : Moussouami Simplicie Innocent

Email : [simplicemoussouami@gmail.com](mailto:simplicemoussouami@gmail.com), Tel : 00242 06 636 66 97 / 00229 90 23 67 60

**Introduction :** Les nombres de cas confirmés de COVID-19 et de décès dus à cette pandémie ne cessent d'augmenter. En République du Congo, Brazzaville est le plus grand foyer de contamination. L'objectif de cette étude est de déterminer les connaissances, attitudes et pratiques de la population jeune face à cette épidémie de COVID-19.

**Méthodes :** Une étude transversale, descriptive et analytique a été menée auprès de 323 adolescents de 14-18 ans. Les données ont été recueillies par un questionnaire en ligne.

**Résultats :** Parmi les 323 participants à l'étude, plus de la moitié déclaraient avoir reçu des informations sur le COVID-19. La majorité des participants avaient répondu que les principaux symptômes de la COVID-19 étaient la fièvre, la toux sèche, le mal de gorge, la fatigue, les difficultés respiratoires, et le nez qui coule. Les modes de transmission de la COVID-19 étaient connus : le contact direct avec une personne atteinte, les gouttelettes respiratoires d'un sujet infecté et les objets contaminés. Quant aux attitudes et pratiques, la plupart des participants se lavaient les mains régulièrement au savon. Peu d'entre eux respectaient la distanciation sociale d'au moins 1 m dans les milieux publics, toussaient dans le creux du coude et dans un mouchoir jetable. Les sujets portaient régulièrement les masques de protection artisanaux.

**Conclusion :** Brazzaville est le plus grand foyer de contamination en République du Congo. Les résidents adolescents adoptent des attitudes et pratiques parfois défavorables malgré leur niveau bon de connaissance sur la COVID-19. Une intervention à l'éducation pour la santé plus efficace à cette population paraît nécessaire et urgente afin de réduire le risque de contamination de cette pandémie.

**Mots clés :** COVID-19, Connaissances, attitudes.

#### CL-CA-13

### PRESCRIPTIONS POLITIQUES ET MEDICALES VERSUS PRATIQUES QUOTIDIENNES FACE AU COVID 19 : ESSAI POUR LA COMPREHENSION DES DIFFICULTES D'APPROPRIATION DES MESURES RESTRICTIVES, AU SUD-BENIN

*Philippine SONON, chercheure associée au Lasdel, email : [sononphilippine45@gmail.com](mailto:sononphilippine45@gmail.com)*

Le présent travail part d'une controverse autour des prescriptions politiques et médicales en ce qui concerne les mesures restrictives, pour comprendre les difficultés d'appropriation de ces mesures. Elle propose une analyse de l'approche « paternaliste » des praticiens de la santé publique et des autorités étatiques qui imposent des règles à suivre et l'attitude des agents mandatés pour le suivi des mesures restrictives, qui comportent les germes de la faible efficacité de la mise en œuvre de ces mesures.

Au Bénin, le nombre de cas confirmé est passé de 01 à 2478 cas et le nombre de décès de 01 à 41 à la date du 12-10-2020 selon les statistiques du l'Etat béninois.

Les données sont produites à partir des observations continues et de l'étude documentaire. Celles-ci sont alternées avec des entretiens, notamment des récits sémiologiques et de vie auprès des usagers des taxis-bus, des marchés, des espaces universitaires, espaces de soins de santé et religieux. Les entretiens sont aussi effectués auprès des praticiens et des acteurs de la chaîne de sécurité publique, chargés de la mise en œuvre des mesures restrictives.

Il ressort de l'analyse des informations que la faible appropriation des mesures restrictives s'explique par une série de facteurs parmi lesquels : l'approche des praticiens et l'attitude répressive qui structure le suivi de ces mesures, les perceptions et pratiques des acteurs.

**Mots clés :** Mesures restrictives, Covid 19, Sud-Bénin.

#### CL-CA-14

## **SITUATION PSYCHO-SOCIALE ET RESULTATS SCOLAIRES DES ORPHELINS ET ENFANTS VIVANT AVEC LE VIH/SIDA (ETUDE REALISEE A L'HOPITAL BETHESDA ET AU CENTRE SOCIAL DE LA ZONE SANITAIRE V DE LA VILLE DE COTONOU)**

*YELOME D. Mardochée, Doctorant, Université d'Abomey-Calavi, Ecole Doctorale Pluridisciplinaire/ Psychologie et Sciences de l'Education, Tél. +229 95206304 ; BP 1832 Abomey-Calavi, Email : [yelomem@yahoo.fr](mailto:yelomem@yahoo.fr)*

*FIOSSI-KPADONOU Emilie, Professeur Titulaire de Pédopsychiatrie, Faculté des Sciences de Santé, Université d'Abomey-Calavi, Tél +229 97588927*

*BOKO C. Gabriel, Professeur Titulaire de Psychopédagogie, Ecole Doctorale Pluridisciplinaire/ Psychologie et Sciences de l'Education, Université d'Abomey-Calavi, Tél 95535887*

*HOUSSOU D.Y. Patrick, Professeur Titulaire des Sciences de l'éducation, Université d'Abomey-Calavi, Ecole Doctorale Pluridisciplinaire/ Psychologie et Sciences de l'Education, Tél +229 96 605806*

L'intrusion du VIH/sida dans les familles crée un précédent qui entrave la vie sociale et psychologique, tant des parents que des enfants. Le déclenchement de la maladie chez l'un des parents crée un problème de capacité productive et compromet dangereusement le suivi socioéconomique du patient parent et des enfants. Cette étude est transversale et descriptive, quantitative et qualitative et porte sur les orphelins et enfants porteurs du VIH/sida pris en charge à l'hôpital Bethesda et au centre social de la zone sanitaire V. Cette enquête a duré Quatre mois et avait pour objectif de décrire la situation psychosociale des enfants de notre population d'étude. Les outils utilisés sont le questionnaire et un guide d'entretien. Les résultats révèlent que Ces résultats permettent de constater que 62,5% des orphelins doubles et 35,7% des orphelins de père travaillent pour satisfaire leurs propres besoins. Aussi, 62,5% des orphelins doubles et 20% des orphelins de mère travaillent-ils pour satisfaire les besoins de leur ménage. Une fréquence de 66,6% de ceux dont les résultats scolaires sont médiocres (ne travaillent pas du tout) sont tous des orphelins avec 73% de ceux qui ont un rendement insuffisant sont des non orphelins. Des non infectés, 86,7% se sentent découragés contre 59,1% de ceux infectés n'ayant aucun problème particulier de santé. Dans cette dernière catégorie d'enfants, 84,2% ont signalé un complexe d'infériorité et une humeur dépressive. Ces résultats permettent donc de réfléchir à la mise en place d'un mécanisme de prise en charge afin d'aider à offrir à ces enfants des conditions de vie propice à une réalisation de soi pour atteindre les idéaux partagés dans notre système scolaire.

**Mots clés :** Enfants-orphelins-sida-psycho sociale-Cotonou

### **CL-CA-15**

## **SYNTHESE DES TRAITEMENTS ENDOSCOPIQUES UROLOGIQUES AU CNHU-HKM DE COTONOU**

*Dodji Magloire I. YEVI, Andilath LASSISSI, Fred HODONOU, Michel Michaël AGOUNKPE, Jean SOSSA, Gilles NATCHAGANDE, Michel Michaël AGOUNKPE, Josué D.G. AVAKOUDJO*

*Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou MAGA de Cotonou  
Correspondant : Dr YEVI Dodji Magloire Inès.*

Email : [dryevi@gmail.com](mailto:dryevi@gmail.com), Cell : +229 97242160, 07BP07 Cotonou

**Introduction:** Les traitements endoscopiques sont devenus depuis quelques années le gold standard de la prise en charge de la plupart des affections en Urologie. Ce travail a pour objectif de faire une synthèse des activités thérapeutiques endoscopiques menées de Janvier 2018 à Juillet 2020 au CNHU-HKM de Cotonou.

**Patients et méthodes:** Il s'agissait d'une étude rétrospective à visée descriptive ayant porté sur les traitements endoscopiques urologiques avec une évaluation prospective des aspects évolutifs qui s'est déroulée dans le service d'Urologie du CNHU-HKM de Cotonou, de Janvier 2018 à juillet 2020.

**Résultats:** 205 interventions endoscopiques ont été réalisées sur 188 patients recensés sur une période de 31 mois, soit une moyenne mensuelle de 6,06cas. L'âge moyen des patients était de 55,24ans avec des extrêmes de 3ans et 100ans. Le sex-ratio était de 4,22. La plupart des patients étaient des fonctionnaires (44,68%). 84% des patients étaient instruits. Les motifs de consultation les plus fréquentes étaient: les lombalgies (38,83%) la pollakiurie (22,87%), la dysurie (20,21%), les retentions vésicales d'urines (18,02%), les brûlures mictionnelles (11,17%) et l'hématurie (7,98%). Le mode début était brutal dans 31,38% des cas et progressif dans 68,62%. Les indications thérapeutiques étaient dominées par les lithiases rénales (22,87%), l'HBP(21,81%), les lithiases urétérales (17,02%), le cancer prostatique (13,30%), la sténose urétrale (11,17%), les hydronéphroses d'origine tumorale (10,11%) et les tumeurs de vessie (8,51%). La rachianesthésie étant préférée (69,15%) et les techniques endoscopiques les plus fréquentes sont la RTUP (30,32%), les montées de sondes urétérales JJ (25,53%), la NLPC (16,49%), l'UIE(13,30%), la RTUV(10,64%) et l'ICP(5,32%). Les complications post-opératoires étaient marquées par une infection (7,44%) et l'hémorragie (4,78%). Sur 113patients joints il a la satisfaction était bonne (65,49%), moyenne (24,78%) et mauvaise (8,85%). 86,61% des patients étaient prêts à recommander la technique.

**Conclusion :** Les techniques endoscopiques urologiques actuellement disponibles au Bénin ont permis d'obtenir des résultats satisfaisants.

**Mots clés:** endoscopie, urologie, Bénin.

## CL-CA-16

### PRATIQUES DU SEXTING EN MILIEU UNIVERSITAIRE: ETUDE DESCRIPTIVE A L'UNIVERSITE DE PARAKOU (NORD BENIN) EN 2019.

Francis TOGNON TCHEGNONS<sup>1</sup>, Chabi Alphonse BIAOU<sup>2</sup>, Elie ATAÏGBA<sup>1</sup>, Edmond BODJRENOU<sup>1</sup>, Anselme DJIDONOU<sup>1</sup>, Prosper GANDAHOU<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Faculté de Médecine, Université de Parakou ; Bénin

<sup>2</sup>Département d'Epidémiologie et de Biostatistiques, Institut Régional de Santé Publique ; Bénin

**Introduction :** Les avancées technologiques ont fait naître le sexting ; une pratique consistant en l'échange de contenus sexuellement explicites de soi ou d'autrui par le biais des nouvelles

technologies de communication. La présente étude vise à faire un état des lieux de cette pratique dans les écoles de formation professionnelle de l'Université de Parakou

**Cadre et Méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale réalisée en 2019 et qui a concerné 525 étudiants sélectionnés par sondage en grappes. Les données étaient collectées au moyen d'un questionnaire auto administré comportant les informations sur les caractéristiques sociodémographiques, académiques, comportementaux et celles liées à l'utilisation des Réseaux Sociaux. La définition du sexting utilisée est l'échange des contenus à connotation sexuelle durant les trois mois précédant l'enquête.

**Résultats :** Parmi les 525 répondants, 349 ont échangé des contenus à connotation sexuelle durant les trois mois précédant l'enquête. La prévalence du sexting était de 66,48% (IC95% : 64,20% ; 70,52%) ; et il faut noter que 29 (5,52%) étudiants étaient des sextos actifs (Envoi uniquement), 86 (16,38%) étaient des sextos passifs (Réception uniquement) et 234 (67,05%) étaient des sextos mixtes. Les copins(es) étaient les émetteurs (49,13%) et les récepteurs (53,33%) les plus cités. Ces échanges se faisaient le plus souvent par le biais des réseaux sociaux WhatsApp (68,77%) et Facebook (27,51%). Au nombre des raisons motivant cette pratique figurent principalement le désir de maintenir une relation à distance (37,79%), et d'attirer l'attention (17,44%).

**Conclusion :** Les résultats ont montré que le sexting est une réalité en milieu universitaire à Parakou. Il est nécessaire de mener des études complémentaires afin d'aboutir à l'élaboration d'interventions adaptées de communication pour un changement de comportement.

**Mots clés :** Sexting, état des lieux, Bénin

## CL-CA-17

### TRANSLOCATION 46, XY,t(2,5)(q37.3;q35.3) DANS UN CAS D'INFERTILITE MASCULINE

AZONBAKIN S, AWEH B, ADOVOEKPE D, GBEDO G M, ADJAGBA M, LALEYE A.

*Laboratoire d'Histologie-Biologie de la Reproduction Cytogénétique et Génétique Médicale / Unité de Biologie Humaine / Faculté des Sciences de la Santé / Université Abomey-Calavi*

*Auteur correspondant : Dr Simon AZONBAKIN, Maître Assistant en Histologie Embryologie-Cytogénétique, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, e-mail : azandeg@yahoo.fr*

L'infertilité du couple est un important problème de Santé publique de nos jours. Les étiologies génétiques sont rarement abordées dans notre pays compte tenu du poids important des causes infectieuses. Nous rapportons un cas de translocation t(2;5) (q37.3 q35.3) expliquant une infertilité chez un homme de 50 ans dont le spermogramme a objectivé une asthénotératospermie. L'examen physique était dans les limites de la normale.

**Mots clés :** infertilité, asthénotératospermie, caryotype, t(2;5).