



Organisation
mondiale de la Santé



Université
d'Abomey-Calavi

6^{èmes} JOURNÉES SCIENTIFIQUES

DE L'INSTITUT RÉGIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE (IRSP-CAQ)



Thème

**La santé publique, de la pratique
clinique à la santé communautaire :
état des lieux, défis et perspectives
à l'horizon 2030**



Sous-Thème

1. Pratique de la santé publique en milieu hospitalier
2. Médecine familiale et soins de santé primaires
3. Soins promotionnels en milieu de soins et en communauté
4. Mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
5. Communications Libres

**Du 22 au
26 avril
2025**



Institut Régional de
Santé Publique, Ouidah



PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET RESUMES DES COMMUNICATIONS

Sommaire

Préface.....	2
Légende des codes.....	3
Programme général.....	5
Conférences plénières.....	11
Programmation détaillée des communications.....	14
Communications orales	16
Sous-thématique : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique.....	17
Sous-thématique : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier.....	24
Sous-thématique : La médecine familiale et les soins de santé primaires.....	30
Sous-thématique : Communication libre.....	36
Communications affichés.....	43
Résumés des communications.....	50

Préface

L'Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRSP-CAQ), pionnier depuis sa création en 1977 par l'initiative conjointe du Gouvernement du Bénin et de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), poursuit sa mission fondamentale : être un carrefour d'excellence en recherche scientifique et en formation de pointe dans le domaine de la santé publique.

Les 6èmes Journées Scientifiques de l'IRSP-CAQ, qui se déroulent du 22 au 26 avril 2025 sur notre campus historique à Ouidah, marquent un tournant stratégique en proposant le thème novateur « La santé publique, de la pratique clinique à la santé communautaire : état des lieux, défis et perspectives à l'horizon 2030 ». Ce thème reflète la nécessité pressante d'intégrer davantage la pratique clinique quotidienne aux dynamiques communautaires pour atteindre une couverture sanitaire universelle et inclusive.

Dans un environnement mondial caractérisé par des défis complexes et multidimensionnels tels que les pandémies récurrentes, la transition épidémiologique rapide, les changements environnementaux drastiques et les inégalités persistantes en matière d'accès aux soins, la réflexion scientifique rigoureuse et l'innovation s'imposent plus que jamais. Ce livre des résumés constitue une véritable plateforme scientifique offrant des analyses critiques et des résultats novateurs sur ces problématiques fondamentales.

À travers cette compilation scientifique, nous souhaitons stimuler la réflexion collective, favoriser la synergie entre chercheurs, praticiens et décideurs politiques et ouvrir des perspectives nouvelles pour construire ensemble des systèmes de santé résilients et adaptés aux réalités socio-économiques et culturelles africaines.

Que ces travaux inspirent de nouvelles collaborations scientifiques fructueuses et posent les bases d'un dialogue interdisciplinaire durable et constructif.

Excellentes journées scientifiques à toutes et à tous.

La science au service d'une santé publique transformative !

Vive l'IRSP-CAQ !

La Présidente du comité d'organisation



MCA AZANDJEME Colette

Légende des codes

Programme scientifique JSIRSP/6



CO	Communication orale
CA	Communication affichée
COMF	Communication orale dans la sous-thématique « La médecine familiale et les soins de santé primaire »
CAMF	Communication Affichée dans la sous-thématique « La médecine familiale et les soins de santé primaire »s
COSC	Communication orale dans la sous-thématique « La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique »
CASC	Communication Affichée dans la sous-thématique « La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique »
COPH	Communication orale dans la sous-thématique « La pratique de la santé publique en milieu hospitalier »
CAPH	Communication Affichée dans la sous-thématique « La pratique de la santé publique en milieu hospitalier »
COCL	Communication orale dans la sous-thématique « Communication libre »
CACL	Communication affichée dans la sous-thématique « Communication libre »
Salle 1	BAP...019
Salle 2	BAP...033
Salle 3	BAP...107
Salle 4	BAP...123
Amphithéâtre	Salle Plénière
Hall de l'amphithéâtre	Communication affichée



PROGRAMME GÉNÉRAL

ACTIVITES PRE-CONGRES

DATE	HORAIRE	ACTIVITE
22/04/2025	07H00-17H00	Activités communautaires : Dépistage Hypertension artérielle et diabète dans les communes de Ouidah, Kpomassè et Tori-Bossito
	09H00-15H00	Formation : Séminaire en R
	09H00-18H00	Exposition
23/04/2025	07H00-17H00	Activités communautaires : Dépistage Hypertension artérielle et diabète dans les communes de Ouidah, Kpomassè et Tori-Bossito
	09H00-15H00	Formation : Elaboration d'un document de projet d'intervention
	09H00-15H00	Formation : Les approches en évaluation
	09H00-18H00	Exposition

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

JOUR 1 : 24 AVRIL 2025

HORAIRE	ACTIVITE
08H30-09H30	Cérémonie d'ouverture
09H30-10H20	Conférence inaugurale
	Titre : La santé publique en milieu hospitalier : place, défis et perspectives
	<i>Conférenciers : Professeurs Ouendo Edgard Marius, Sopoh Ghislain Emmanuel, MCA Damien B. Georgia</i>
	<i>Modérateurs : MC PARAISO Moussiliou, MA SALAMI Lamidhi</i>
	Discussion
10H20-10H40	Pause-café - Visite des Posters
10H40-12H30	Sessions parallèles de communications orales
12H30-13H00	Visite des Posters (communications affichées) Hall de l'Amphithéâtre
13H00-14H00	Déjeuner

Conférence plénière 1

Titre : ***Partenariats intersectoriels dans le domaine de la santé***

*Conférenciers : Professeur EKOUEVI
Koumavi Didier*

**14H00-
15H50**

et MC MAKOUTODE Patrick

*Modérateurs : Pr SOPOH Ghislain,
Dr METONNOU Clémence*

Discussion

**15H50-
17H00**

Sessions parallèles de communications orales

**17H00-
17H30**

Visite des Posters (communications affichées)
Hall de l'Amphithéâtre

17H30

Fin de journée

JOUR 2 : 25 AVRIL 2025

HORAIRE	ACTIVITE
	Conférence plénière 2
	Titre : <i>Droits des patients et enjeux éthiques en santé communautaire</i>
	Discussion
09H00-09H50	Conférenciers : Professeur GUEDEGBE Igor et MC KEDOTE Marius
	Modérateurs : Pr GLELE AHANHANZO Yolaine, MA BEDIE Vignon
	Discussion
09H50-10H10	Pause-café
10H10-12H30	Sessions parallèles de communications orales
12H30-13H00	Visite des Posters (communications affichées) Hall Amphithéâtre
13H00-14H00	Déjeuner
	Conférence plénière 3
	Titre : <i>Les politiques de santé communautaire dans la perspective du développement durable en Afrique</i>
14H00-15H50	Conférencier : Professeur SOSSA JEROME Charles et Dr SALAMI Lamidhi
	Modérateurs : Pr GLELE AHANHANZO Yolaine, MA BEDIE Vignon
	Discussion
	Conférence plénière 4
	Titre : <i>Santé communautaire : regards anthropologiques</i>
15H50-16H10	Conférencier : AGUIA DAHO Jacques
	Modérateurs : MCA AZANDJEME Colette/AGONNOUDE Boris, Dr SANTOS Reynald
	Discussion

HORAIRE	ACTIVITE
16H10-17H00	Sessions parallèles de communications orales
17H00-17H30	Visite des Posters (communications affichées) Hall Amphithéâtre
17H30	Fin de journée

JOUR 3 : 26 AVRIL 2025

HORAIRE	ACTIVITE
09h00-09H45	Sessions parallèles de communications orales
09h45-10h00	Pause-café Visite des Posters (communications affichées) Hall Amphithéâtre
10h00-11h00	Sessions parallèles de communications orales
11h10-12h00	Cérémonie de clôture
13h00-14h00	Déjeuner



CONFÉRENCE INAUGURALE

Titre : La santé publique en milieu hospitalier : Place, défis et perspectives

Auteurs : *Prof. OUENDO Edgard Marius, Prof. SOPOH Ghislain Emmanuel, MCA DAMIEN B. Georgia*

L'hôpital est une institution sanitaire offrant des soins complets aux patients, de la prévention des maladies au traitement et à la réhabilitation. Il s'agit d'un centre de traitement avancé, de formation médicale, et de recherche, une structure de référence, de divers niveaux au sein de la pyramide sanitaire, une structure de formation, de recherche, pouvant être spécifique ou spécialisée. L'hôpital est sensé disposer d'un plateau technique de pointe en termes de ressources humaines ou d'équipements pour réaliser des examens complexes, assurer des interventions chirurgicales, gérer des soins intensifs et des cas graves. Au sein du système de santé, il assure la mise en œuvre du pilier « prestation de soins et services de santé », à travers l'implémentation des soins curatifs, préventifs, palliatifs, ré adaptatifs, ainsi que des services de diagnostic. Il assure la continuité des soins au sein du réseau de formation sanitaire, les formations de base et continue des professionnels de santé, la recherche

La santé publique est l'ensemble des efforts fournis par des institutions publiques dans une société pour améliorer, promouvoir, protéger et restaurer la santé de la population grâce à une action collective. Il s'agit d'une discipline centrée sur la prévention, la promotion de la santé, la planification des soins et l'amélioration globale de la santé des populations., mais, aussi, et surtout, d'une discipline synthétisant les autres sciences (de gestion, exactes, humaines, biologiques ..) pour assurer ses fonctions. Elle comporte plusieurs spécialités ou options, telles que : la gestion des systèmes de santé, l'épidémiologie et les biostatistiques, l'informatique médicale et sciences des données, la médecine préventive, l'économie de la santé, les sciences de l'environnement.

Les stratégies mises en œuvre par la santé publique dans un hôpital consistent de façon générale à utiliser les données de santé pour orienter les décisions et ceci, à travers l'analyse des déterminants de la santé, la conception de politiques et stratégies de contrôle, la gestion des risques sanitaires, la mise en œuvre d'activités de prévention et de soins promotionnels, la conduite d'activités de recherche, l'évaluation des interventions etc. Chacune de ses spécialités ou option développe des stratégies spécifiques pour l'amélioration des pratiques et interventions en milieu hospitalier. Ainsi, le médecin de santé publique au sein d'un hôpital pourrait être considéré comme un chef d'orchestre, s'assurant que chaque instrument c'est à dire chaque service de santé - joue en harmonie. Un service de santé publique, dans un hôpital, doit donc occuper une place centrale entre les services administratifs et gestionnaires, cliniques, promotionnels et de soutien.

Malheureusement, la santé publique peu connue en général et en particulier en milieu hospitalier. Cependant, on observe une tendance de plus en plus marquée des cliniciens à s'intéresser à la santé publique, mais, pour des raisons fondées sur des perceptions erronées du spécialiste en santé publique, au risque de déséquilibrer le système de prestation de soins et services dans le système de santé.

Il conviendrait, par conséquent, de resituer la place du spécialiste en santé publique au sein du système de santé, aussi bien celui des soins de santé primaire, que du système hospitalier, revaloriser les spécialités cliniques et promouvoir la formation en santé publique en tant que spécialité de base et non pas spécialité complémentaire ou optionnelle

En somme : la santé publique, discipline transversale, doit jouer un rôle primordial en milieu hospitalier. Les spécialités cliniques sont invitées à collaborer avec les spécialistes en santé publique, pour une meilleure performance du système.

**CONFÉRENCES
PLÉNIÈRES**

Titre : Le partenariat intersectoriel en santé

Auteurs : Prof. EKOUEVI Didier Koumavi, *Département de Santé Publique et Centre de Formation et de Recherche en Santé Publique, Université de Lomé ; Lomé, Togo*

MC MAKOUTODE Patrick, *Département Politiques et Systèmes de Santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin*

Le partenariat intersectoriel en santé désigne un effort concerté entre le secteur de la santé et d'autres secteurs (éducation, agriculture, environnement, transport, économie etc.) avec la participation active de la société civile pour répondre à, des problèmes complexes. Il implique le partage des ressources, des responsabilités, des informations et de prise de décision, dans une logique de complémentarité et d'efficacité collective. Il repose sur la conviction que la santé est influencée par de nombreux facteurs, et aucun secteur ne peut, à lui seul, garantir le bien-être des populations. Cette approche trouve tout son sens dans trois exemples : i), la lutte contre la pandémie de COVID-19, ii) la prévention de l'obésité et iii) l'approche One Health.

Pendant la pandémie de COVID-19, le ministère de la santé a collaboré avec divers autres ministères à savoir l'éducation, de l'intérieur, des transports et de la communication, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales, les collectivités locales, les organisations internationales, et le secteur privé (production de vaccins, équipements, etc.). Ce partenariat a permis une réponse multisectorielle rapide et coordonnée.

Dans la lutte contre l'obésité, maladie chronique multifactorielle, l'intersectorialité est également indispensable. Le ministère de la santé assure la coordination, le ministère de l'éducation promeut le sport et l'éducation nutritionnelle, le ministère de l'agriculture soutient une alimentation saine, et le ministère du commerce régule les publicités alimentaires.

L'approche One Health s'intègre pleinement dans cette logique intersectorielle. Elle reconnaît l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnementale. Cette approche est essentielle en Afrique, où les épidémies zoonotiques (Maladie à virus Ebola, la fièvre de Lassa, la fièvre jaune...) sont fréquentes, et où les systèmes de santé humaine, vétérinaire et environnementale sont souvent cloisonnés. Elle nécessite une coordination entre les ministères de la santé

humaine, de la santé animale, de l'environnement, ainsi que les institutions de recherche.

Cependant, des défis importants freinent encore cette dynamique : des capacités institutionnelles limitées, un manque de financement, une coordination structurelle insuffisante, et une faible culture de collaboration interdisciplinaire. Face à ces défis, le partenariat se présente comme une réponse stratégique permettant de renforcer la résilience des systèmes de santé et d'anticiper les crises sanitaires futures, en particulier en Afrique.

Titre : Droits des ménages et enjeux éthiques en santé communautaire

Auteurs : *Prof. GUEDEGBE S. Igor, MC KEDOTE N. Marius*

En santé communautaire, reconnaître les ménages comme unités fondamentales d'action sanitaire - et non seulement comme réceptacles passifs d'interventions standardisées - ouvre la voie à des stratégies plus efficaces et durables, particulièrement dans des pays africains où la famille élargie et la communauté demeure le premier filet de sécurité sociale et sanitaire.

Cependant, cette reconnaissance théorique se heurte quotidiennement à des tensions multiples sur le terrain. Les principes universels des droits humains entrent parfois en collision avec les normes communautaires qui structurent la vie sociale dans nos contextes. L'affirmation formelle des droits individuels peut sembler abstraite face à des réalités où les décisions sanitaires sont traditionnellement collectives. Ces droits sont parfois sinon souvent aux prises avec l'une des valeurs capitales de la politique de santé communautaire, à savoir l'éthique. Notre réflexion éthique se situe précisément à cette intersection entre idéaux et réalités, entre individu et communauté.

Le défi pour la santé communautaire au Bénin et plus généralement en Afrique subsaharienne n'est pas d'imposer un modèle uniforme, mais de favoriser l'émergence de pratiques qui honorent simultanément les droits fondamentaux des personnes et la richesse des solidarités communautaires qui caractérisent notre société

Titre : Les politiques de santé communautaires dans la perspective de développement durable en Afrique

Auteurs : Prof. SOSSA JERÔME Charles, MA SALAMI Lamidhi

La santé communautaire constitue de plus en plus un maillon essentiel du système de santé en Afrique où elle apparaît comme la réponse adaptée aux besoins sanitaire croissants dans un contexte contraint. Fondée sur une approche participative, décentralisée et intégrée, elle vise à rapprocher les soins des populations tout en s'alignant sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier l'ODD 3.

Elle tire son origine de la Déclaration d'Alma-Ata (1978), qui a reconnu la santé comme un droit humain fondamental, puis posé les fondements des soins de santé primaires, en mettant l'accent sur la promotion et la protection sanitaire, l'équité et la participation communautaire. Cette vision et ces principes ont été réaffirmés dans la Déclaration d'Astana (2018) qui considère les soins de santé primaires comme la pierre angulaire des systèmes de santé en marche vers la Couverture Santé Universelle (CSU). Plusieurs résolutions de rencontres régionales, notamment à Harare (1987) et Bamako (1987) ont conforté les services communautaires au sein des systèmes de santé via l'institutionnalisation de la participation communautaire.

Le cadre de référence des politiques nationales de santé communautaire est de plus en plus renforcé grâce aux initiatives régionales telles la Déclaration d'Addis-Abeba (2006), la Stratégie africaine de santé 2016-2030 et l'Agenda 2063 qui visent principalement l'amélioration de l'équité d'accès aux soins, le renforcement des ressources humaines communautaires et l'implication des populations locales dans la gouvernance sanitaire.

Dans plusieurs pays (Rwanda, Sénégal, Éthiopie, Bénin, Togo, Mali, Burkina Faso, Zambie), les principaux axes suivis pour l'opérationnalisation de ces politiques le recrutement/ formation/ déploiement d'agents de santé communautaires (ASC), le renforcement de la participation communautaire (via les comités de gestion) et de l'offre de prestation de soins en communauté notamment l'éducation sanitaire, le renforcement des systèmes d'information sanitaire, la promotion d'un financement durable et d'une approche multisectorielle intégrée (santé, éducation, environnement, agriculture). Ces axes favorisent une réponse adaptée et cohérente aux enjeux de santé

tout en intégrant les dimensions du développement durable. Les expériences suscitées montrent la volonté croissante et les niveaux variés d'intégration de ces dimensions dans les politiques. Les dimensions de développement durable concernées sont les dimensions sociales (équité, autonomisation des femmes, éducation), économiques (prévention, création d'emplois locaux, maîtrise des coûts) et environnementales (hygiène, assainissement, sensibilisation aux risques et résilience climatiques).

Toutefois, ces politiques sont confrontées à des défis récurrents tel un financement insuffisant et encore dépendant des bailleurs, le statut précaire des ASC, une coordination multisectorielle limitée, faible intersectorialité, l'inégalité territoriale d'accès aux soins. Les futurs chantiers prioritaires pour renforcer la durabilité devront consister à la professionnalisation des ASC, digitalisation, intégration des indicateurs ODD et gouvernance locale renforcée.

En conclusion, l'orientation des politiques de santé communautaire en Afrique vers le développement durable devra se renforcer au regard la transversalité de la santé, de son apport global à la satisfaction des besoins et au bien-être des masses. Pour réaliser cette attente, ces politiques nécessiteront de solides mécanismes de financement, plus de multisectorialité, plus d'appropriation locale, le renforcement de l'institutionnalisation, une gouvernance locale inclusive et l'intégration aux politiques nationales de développement.

**PROGRAMMATION
DÉTAILLÉE DE
COMMUNICATIONS**

REPARTITION DES COMMUNICATIONS

COMMUNICATIONS ORALES

DATES	HORAIRE	SALLE 1	SALLE 2	SALLE 3	SALLE 4
24/04/2025	10H40-12H30	COSC01- COSC05	COPH01-COPH05	COPH25-COPH29	COCL06- COCL12
	15H50-17H00	COSC07- COSC11	COPH06-COPH11	COMF01-COMF06	COCL13- COCL18
25/04/2025	10H10-12H30	COSC12- COSC20	COPH12-COPH17	COMF07-COMF14	COCL19- COCL27
	16H10-17H00	COSC21- COSC22	COPH19-COPH20	COMF15-COMF16	COCL28- COCL32
26/04/2025	09H00-10H00	COSC25- COSC28	COPH21-COPH22	COCL01- COCL05	COCL34- COCL36

COMMUNICATIONS AFFICHEES (HALL AMPHITHEATRE)

25/04/2025	09H00-17H00	CAMF01- CAMF03 CASC01 CAPH01- CAPH04
25/04/2025	09H00-17H00	CACL01- CACL08



**COMMUNICATIONS
ORALES**



**Sous-thématique : La mise en
œuvre de la santé
communautaire en Afrique**

JOUR 1 : 24 AVRIL 2025

MATINEE : 10h40-12h30

Modérateur : MC MAKOUTODE Charles Patrick ; **Secrétaire :** Dr SOSSOU Ericie

CODEABST	Auteurs	Titres
COSC01	AGBEKO Foli Yvon, YOLOU Edi, N'DJAO Akawulu, HEMOU Manani, PAKOUDJARE Mazama, DJADOU Koffi Edem	Activités communautaires pédiatriques dans la région centrale au Togo
COSC03	SOSSA Pamela, SOSSOU Ericie, SOPOH Ghislain	Efficacité du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance sur les habitudes alimentaires des enfants de 6 à 59 mois dans la commune de Lalo au Bénin
COSC04	ZINSOU Fidèle, TODEDI Judicaël, AKAKPO Jocelyn, BOFE Sylvestre, FATONDI Christelle	Evaluation des effets des activités de sensibilisation contre les maladies non transmissibles sur les connaissances et pratiques en matière d'alimentation des populations de la commune de Savè au Bénin en 2023
COSC05	KIKI DJIVOH Sidonie Mahougnon, OUEDRAOGO Brahima, TONON Affidéhomé GOUTHON Gilchrist, BIO NIGAN Issiako	Alimentation des bodybuilders de la ville de Cotonou en période pré-compétitive nationale



JOUR 1 : 24 AVRIL 2025

APRES-MIDI : 15h50-17h00

Modérateur MC DEGBEY Cyriaque ; **Secrétaire** : Dr DADAAH Donatien

CODEABST	Auteurs	Titres
COSC07	CAMARA Soriba, KOUROUMA Mory, MILIMONO Tamba Mina, SOW Abdoulaye, SIDIBE Sidikiba, TOURE Aly Badara, NABE Aly Badara, DELAMOU Alexandre	Facilitateurs et obstacles au dépistage communautaire du VIH en Guinée : Leçons d'une analyse de mise en œuvre basée sur le cadre conceptuel Consolidated Framework for Implementation Research
COSC08	AGONNOUDE T. Maurice, OROU BODEDJIO Goudi, HOUETO S. David	Évaluation de la politique nationale de santé communautaire dans la zone sanitaire Bembèrèkè-Sinendé en 2023
COSC09	PADONOU Sètonджи Géraud Roméo, KOHOUN Rodrigue, GUEZO MEVO Blaise, DEGUENON Conrad, HOUDE Paternelle, AGUEMON Badirou	Indicateurs de performance initiale pour la mise en œuvre de la phase pilote de la politique nationale de santé communautaire au Bénin
COSC10	ZONGO Aloys, Bintou DIAKHABY, Marcel SABITI, Thérèse-Marie Moklosea Cyprien, KITANINA FUOTO, Pacifique	Contribution des « conversations transformatrices » à l'amélioration de la santé des jeunes/adolescents dans la province de la Tshopo (RDC)
COSC11	HOUNDJO André	Facteurs explicatifs de la faible utilisation des méthodes contraceptives modernes chez les femmes en âge de procréer dans le département du Couffo

JOUR 2 : 25 AVRIL 2025

MATINEE : 10h10-12h30

Modérateur : MC DEGBEY Cyriaque ; **Secrétaire :** Dr Do SANTOS Bella

CODEABST	Auteurs	Titres
COSC12	HOUSSOU Gbèmahon Roger, AZANDJEME Colette Sylvie, AKPO- DJENONTIN Opportune, FANOU Nadia, METONNOU Clémence Germaine, SOSSA JEROME Charles, COMPAORE Ella, MONGBO Roch	Effets d'une intervention de soutien alimentaire aux gestantes pour la prévention du faible poids à la naissance
COSC13	TODEDJI Judicaël, ZINSOU Fidèle, KPOBLI Joël, Christelle Fatondji	Facteurs associés aux connaissances et pratiques des gestantes sur l'alimentation au cours de la grossesse dans la zone sanitaire Savè-Ouèssè au bénin en 2023
COSC14	TOGAN Roméo M., WENKOURAMA Damega, GELLE Thibaut, ASSIH Mandjaréou, NUBUKPO Philippe, HOUINATO Dismand, DASSA Valentin, GNONLONFOUN Dieudonné et EKOUEVI Didier	Troubles mentaux et maladies cardiovasculaires en Afrique de Ouest : une étude communautaire dans le district de Yoto, Togo
COSC15	KOLA Edinam, KOMBATE Matiéyendou, DOGO Mohammed Fall	Les représentations de la tuberculose dans la région maritime au Togo
COSC16	WOUEKPE Parfait, DEGBEY Cyriaque D, KPOZEHOUE Alphonse	Connaissance des relais communautaires sur leurs rôles et responsabilités dans la qualité de l'eau, l'hygiène et l'assainissement



CODEABST	Auteurs	Titres
COSC17	TRAORE Tiandiogo Isidore, COULIBALY Bintou, SANOU Soufiane, TRAORE Aïda Marietou, TAOFIKI Ajani Ousmane, OUATTARA Cheick Ahmed, MILLOGO Adjara, DRABO Seydou, CAMARA Aissatou, ZOUNDI Ivette, SALISSOU Ahmed Mohamed Abdou, HIEN Hervé, MEDA Clément Ziemlé, SAVADOGO Léon G.B	Connaissances, attitudes et pratiques des personnels de ménage sur les risques sanitaires liés à la manipulation de la viande crue
COSC18	DOTSU Yawo Mawufe	Vivre avec la plaie incurable en milieux communautaires au Togo : résilience entre médecine traditionnelle et soins hospitaliers
COSC19	TRAORE Mamadi, MELESS GUANGA David, DATTE ATTA Sebastien, SANGARE Abou Dramane, GUINAN Jean-Claude, SAMBA Mamadou, SACKOU-KOUAKOU Julie, OGA Agbaya Serge, KOUADIO Luc.	Mise en œuvre de la santé bucco-dentaire : revue de la littérature pour une approche intégrée
COSC20	TRAORE Mamadi, MELESS GUANGA David, DATTE ATTA Sebastien, SANGARE Abou Dramane, GUINAN Jean-Claude, SAMBA Mamadou, SACKOU-KOUAKOU Julie, OGA Agbaya Serge, KOUADIO Luc	Projet santé engagement communautaire en Côte d'Ivoire : santé bucco-dentaire dans un cadre de consultation pluridisciplinaire



JOUR 2 : 25 AVRIL 2025

APRES-MIDI : 16h10-17h00

Modérateur : MCA MAKOUTODE Patrick ; **Secrétaire :** Dr SANTOS Reynald

CODEABST	Auteurs	Titres
COSC21	MAKOUTODE Charles P., BEDIE Vignon D., SEKLOKA Murielle P.T. et TOGNON-TCHEGNONSI Francis	Évaluation de l'effet des applications mobiles de santé sexuelle et reproductive sur le comportement sexuel à risque des étudiants de 15 à 24 ans à l'Université de Parakou en 2023.
COSC22	ADEGBITE Bayodé Roméo, MBAÏDIGUIM Fabrice, OBELE NDONG Andréa Rosine Oméra, EDOA Jean Ronald, ACHIMI Pacome, DEJON-AGOBÉ Jean Claude, ZINSOU Jeannot Fréjus, HONKPEHEDJ Yabo Josiane, LAPUE Christian Chassem, GROBUSH Martin M, ADEGNIKA Ayola Akim	Mobilisation des acteurs communautaires et adolescents pour encourager la participation aux essais cliniques sur la tuberculose : Expérience du Gabon

JOUR 3 : 26 AVRIL 2025

MATINEE : 09h00-10H00

Modérateur : MCA MAKOUTODE Patrick ; **Secrétaire :** Dr SOSSOU Ericie

CODEABST	Auteurs	Titres
COSC25	AIKPON Rock Yves	Evaluation de la contribution de la distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée (MIILD) par le canal scolaire pour le maintien d'un meilleur accès au Bénin
COSC26	ARBAHIM Moussa, BA Mouhamadou F, DIALLO Amadou I, ADOU Ali Abdoulkader, MOHAMED Madina Ali, FAYE Adama	Connaissances, attitudes et pratiques des femmes enceintes vis-à-vis du paludisme
COSC27	METONNOU Clémence Germaine, AZANDJÈMÈ Colette Sylvie, SOUSSIA Théodore, AFFO Hilary, SOSSA Charles, AGUEH Victoire	Evaluation de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de 6 à 59 mois
COSC28	KIKI DJIVOH SIDONIE Mahougnon, TONON Brigitte Affidéhomé, AZANDJEME Colette, BIO NIGAN Issiako, HOUNHOUIGAN Djidjoho Joseph.	Alimentation des élèves adolescents des classes sportives de la commune de Gogounou en 2023





SALLE 2

**Sous-thématique : La pratique
de la santé publique en milieu
hospitalier**

JOUR 1 : 24 AVRIL 2025

MATINEE : 10h40-12h30

Modérateur : Pr SOPOH Ghislain ; Secrétaire : Dr SANTOS Reynald

CODEABST	Auteurs	Titres
COPH01	DIOP Cheikh Tacko, FALL Bineta, GUEYE Boubacar, BOP Martial Coly	Etude des aspects cliniques et économiques des patients suivis au Sénégal
COPH02	DAMIEN Barikissou Georgia, AHOLOU G. Prudencia, MEDEDJI Damien	Satisfaction des « privilégiés de l'état » vis-à-vis de l'assurance maladie : cas de la commune d'Abomey-Calavi, Bénin, 2024
COPH03	TRAORE Isidore Tiandiogo, CAMARA Aissatou, TRAORE Marietou Aïda, DRABO Seydou, TASSEMBEDO Souleymane, TAOFIKI Ajani Ousmane, SALISSOU Ahmed Mohamed Abdou, COULIBALY Bintou, ZOUNDI Ivette, OUATTARA Cheick, MEDA Ziemlé Clément, SAVADOGO Blaise G	Analyse des capacités des formations sanitaires du premier échelon pour la prise en charge du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans dans les districts sanitaires
COPH04	EKPINSOU Cica Isabelle	L'application de l'éthique du <i>care</i> pour des soins de qualité en milieu hospitalier
COPH05	TAPHA Ounoussa, DEGBEY Cyriaque Comlan, YACOUBA Abdourahamane, HAMIDOU SALEY Balkissa, SABO Ramatou, NIANDOU Mahamadou, ALI ADA Mahamoud Omid, SALIFOU IBRAHIM Alkassoum, BRAH Souleymane, DOUCTHI Mahamadou, HARISSOU Adamou, MAMADOU Saidou, HINSON Antoine Vikkey	Pratiques d'antibioprophylaxie chirurgicale : Etude observationnelle prospective dans un hôpital tertiaire au Niger



JOUR 1 : 24 AVRIL 2025

APRES-MIDI : 15h50-17h00

Modérateur : MCA DAMIEN Georgia ; **Secrétaire :** Dr TODEDI Judicael

CODEABST	Auteurs	Titres
COPH06	YAMADJAKO Chiskaren Deneuve Sènam, AGBADEBO Mouhamed, TAWO Estelle, Sènou Olga, HOUSSOUVO Marcel, KOUSSEMOU Anselme, BOHOUNTON François, DEGAN Charlemagne, DOSSOU Mathieu, TOKPANOUE Ignace, BIAOU Chabi Alphonse	Surveillance des infections du site opératoire à l'hôpital de zone de Dassa en 2024
COPH07	LOKOSSOU Antoine Salomon, AIKPON Rock, DOSSOU Murielle, TODO Emmanuel, ADJOTTIN Bruno	Evaluation de la résistance phénotypique et moléculaire aux insecticides chez des moustiques vecteurs dans le port de Cotonou
COPH08	BELLO Chakir Ishola, DEGBEY Cyriaque Comlan	Profil épidémiologique du portage asymptomatique des bactéries pathogènes d'infections méningées chez le personnel soignant en pédiatrie et néonatalogie au Bénin
COPH09	DEGBEY Cyriaque Comlan, Ahoussinou Senami Blandine, CODJO Léopold	Étude de l'observance de l'hygiène des mains par les prestataires de soins à la clinique universitaire de la cardiologie du CNHU-HKM de Cotonou en 2024
COPH10	HOUHANOU Yèssito Corine Nadège, HOUNSOU Francis, DANSOU SONOU Mahunan Aude Tanguy, ADOUKONOU Thierry	Pratiques en matière d'hygiène hospitalière des étudiants en médecine de l'université de Parakou au Bénin en 2024
COPH11	DAMIEN Barikissou Georgia, MONLANDJO Marie-Eurielle Whéfa, AGUEMON Badirou	Facteurs associés au recours au dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes âgées de 25 à 65 ans dans le 1er arrondissement de Cotonou

JOUR 2 : 25 AVRIL 2025

MATINEE : 10h10-12h30

Modérateur : MCA DAMIEN Georgia ; **Secrétaire :** Dr METONNOU Clémence

CODEABST	Auteurs	Titres
COPH12	SALAMI Lamidhi, HOUNTCHEME Arnaud, KPOZEHOUEN Alphonse	Évaluation de la gestion de stock des produits traceurs à l'agence régionale de Cotonou de la société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé en 2024
COPH13	SOCLO DANSI Sènamy Evelyne, DEGBEY Comlan Cyriaque, AGBOKOU Diane	Profil de résistance des bactéries Gram négatif émergentes de l'environnement hospitalier des CHU du Bénin en 2024
COPH17	ADJOBIMEY Mènonli, ADJONOU Christine, DJOHOUN Frimège, HOUNTOHOTEGBE Esdras, WANVOEGBE Finangnon Armand	Syndrome métabolique chez le personnel d'un centre hospitalier à Cotonou en 2024

JOUR 2 : 25 AVRIL 2025

APRES-MIDI : 16h10-17h00

Modérateur : MCA MAKOUTODE Patrick ; **Secrétaire :** Dr SANTOS Reynald

CODEABST	Auteurs	Titres
COPH19	Charles P. MAKOUTODE ; Nadine ODA ; Vignon BEDIE ; Virginie MONGBO ; Lamidhi SALAMI ; Joel SEIGNON ; Kabirou SALIFOU	Facteurs associés aux comportements sexuels à risques chez les adolescents et jeunes de l'université de Parakou (Bénin) en 2023.
COPH20	HINSON Antoine Vikkey, ADJOBIMEY Mènonli, MIKPONHOUE Rose, GBONDJIN Elysée, ZOHOUN Noriace, MOULERO Alice, AYELO Paul	Prévalence et facteurs associés aux hépatites virales B et C chez les travailleurs d'un centre hospitalier universitaire à Cotonou en 2022

JOUR 3 : 26 AVRIL 2025

MATINEE : 09h00-10h00

Modérateur : MCA MAKOUTODE Patrick ; **Secrétaire :** Dr SOSSOU Ericie

CODEABST	Auteurs	Titres
COPH21	AGBODJAVOU Komi Mena, BEDIE Vignon, MÊLIHO Codjo Pierre, KPATCHAVI Codjo Adolphe	Contrastes et synergies entre modèles hospitalier et communautaire de soins palliatifs et de fin de vie en Afrique de l'Ouest francophone : une analyse qualitative comparative des modèles au Bénin et au Togo
COPH22	ADJOBIMEY Mênonli, DOVOEDO Nelly, CHOKI Blaise, SACCA Hélène, AYELO Paul, GNONLONFOUN Dieudonné, HOUINATO Dismand.	Tension artérielle élevée chez le personnel du CNHU-HKM en 2024



**Sous-thématique : La médecine
familiale et les soins de santé
primaires**

JOUR 1 : 24 AVRIL 2025

MATINEE :10h40-12h30

Modérateur : MCA AZANDJEME Colette/AGONNOUDE Boris ; **Secrétaire :** MCA ADJOGBIME Mènoli

CODEABST	Auteurs	Titres
COPH25	TOGAN Mèdèssè Roméo, AGNEGUE Essy Sakya Gracia, PADONOU Gil Germain, COULIBALY Cheick, EKOUEVI Koumavi Didier, Badirou AGUEMON	Évaluation de performance de la surveillance épidémiologique de la Dengue dans le district de Golfe au Togo en 2025
COPH26	SALIFOU-ISSAKA Sanni, HOUEMENOU Modeste, NOUDEKE Nestor, HOUSSOU Mathilde	Facteurs associés à la létalité du paludisme grave chez les enfants dans les hôpitaux de la Donga, Bénin en 2022
COPH28	NADAKOU N’Kpkingou Théodore, PARAÏSO Moussiliou Noel; YOBO Jean Blaise; MAKOUTODE Charles Patrick, SODJINOUE Joel, TAPHA Ounoussa, ADEHOSSI Éric Omar.	Perception et acceptabilité sociale de l’extension de la chimioprévention du paludisme saisonnier dans les districts sanitaires de Damagaram Takaya et Takeita au Niger.
COPH29	HINSON Antoine Vikkey, ADJOBIMEY Mènoli, MIKPONHOUE Rose, HOUNZANDJI Yannel, ZOHOUN Noriace, MOULERO Alice	Prévalence et facteurs associés aux troubles musculosquelettiques chez les travailleurs dans un centre hospitalier universitaire à Cotonou en 2024



JOUR 1 : 24 AVRIL 2025

APRES-MIDI : 15h50-17h00

Modérateur : MC DEGBEY Cyriaque ; **Secrétaire :** Dr DADAAH Donatien

CODEABST	Auteurs	Titres
COMF01	GBENAHOU Hervé Bonaventure Mêtonmassé	Production de la guérison à partir des bains rituels chez les fon du Sud-Bénin : Quand des pratiques locales ralentissent l'implémentation des stratégies de soins de santé primaires
COMF02	AKPONIKPE Thierry, TCHOGOU Pascal, SENON Aimé, HOUNGNIHIN Roch	Itinéraire thérapeutique de la maladie de « Gbagbla » au sud du Bénin
COMF03	DJAGBA Koffi Anselme Roland, AFFO Mingnimon Alphonse, ACOTCHEOU Pacôme Evènakpon, ASSOGBA Sènan Eve	Education sanitaire traditionnelle à l'épreuve de la communication vaccinale de routine des enfants à Grand Popo au Bénin
COMF05	ADJOBIMEY Mênouli, MIKPONHOUÉ Rose , HOUNTOHOTÈGBÉ Esdras, AYÉLO Paul, HINSON Antoine	Stress professionnel chez les travailleurs d'un chantier de construction au Bénin en 2023
COMF06	LARE MONKOUNA Sadibiè Bani, AFFO M.	Enjeux et défis de l'utilisation des substances et des pilules de lendemain sur la reproduction sexuelle de la jeune fille : cas des étudiantes de Lomé



JOUR 2 : 25 AVRIL 2025

MATINEE : 10h10-12h30

Modérateur : MC KPOZEHOUEN Alphonse/AGONNOUDE Boris ; **Secrétaire :** Dr SOSSOU Ericie

CODEABST	Auteurs	Titres
COMF07	Alphonse Kpozèhouen, Elvyre Klikpo, Yolaine Glèlè Ahanhanzo, Cyriaque Degbey, Moussiliou Noël Paraïso, Francine Burrus, Roger Salamon	Comportements suicidaires chez les adolescents en milieu scolaire au Bénin : Enquête Mondiale sur la Santé en Milieu Scolaire, 2015. Prévalence et Facteurs associés
COMF08	MADINDE Jeanne Avest, TOKPLO Hilaire, BEDIE Vignon, NASSI Karl	Dopage et santé des travailleurs des carrières de sable à Bonou : enjeux pour la santé publique des communautés riveraines
COMF09	AGBAHOUNGBA Joseph Giovanni, KLIKPO Elvyre, SALAMI Lamidhi	Étude de la dépression du post-partum chez les accouchées des centres de santé de la commune d'Abomey en 2024
COMF10	ATOUN Rogatien Comlan, TOGAN Roméo Mèdèssè, YOUA Frédéric Yacoubou, ADABA Vanessa Yawa, MOUROUTARI Djeri, LAWANI Ibrahim, KONU Yao Rodion, EKOUEVI Didier Koumavi	Faible taux de dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH au Togo en 2023 : une étude transversale
COMF12	AGONNOUDÉ T. Maurice, BOFE A. Sylvestre	Influence des activités de sensibilisation contre les maladies non transmissibles sur les connaissances et pratiques alimentaires dans la commune de Savè en 2023
COMF13	AGONNOUDÉ T. Maurice, HOUNNOU Madjè Mical	Évaluation de l'accessibilité des ménages de la commune d'Athiémé aux soins et services de santé en 2024



CODEABST	Auteurs	Titres
COMF14	SALAMI Lamidhi, AMAHOUMI Flora, KPOZEHOUEN Alphonse	Évaluation de la qualité de la mise en œuvre de l’audit des décès néonataux dans le département du littoral au Bénin en 2024l

JOUR 2 : 25 AVRIL 2025

APRES-MIDI : 16h10-17h00

Modérateur : MCA MIKPONHOUE Rose ; **Secrétaire :** Dr METONNOU Clémence

CODEABST	Auteurs	Titres
COMF15	MONGBO Virginie, SODOGANDJI Ronel, KPOZEHOUEN Alphonse, GLELE- AHANHANZO Yolaine, SOPOH Ghislain, OUENDO Edgard-Marius	Facteurs associés à l’anémie chez les enfants de 6 à 59 mois dans le département du Couffo, 2024
COMF16	SALAMI Lamidhi, MEHOUEYOU Sènanckpon Lucia, BEDIE Vignon, GLELE AHANHANZO Yolaine, SOSSA JEROME Charles	Etude des infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de 5 ans au Sud du Bénin en 2023



JOUR 3 : 26 AVRIL 2025

MATINEE : 09h00-10h00

Modérateur : MC DEGBEY Cyriaque ; **Secrétaire :** Dr DADAAH Donatien

CODEABST	Auteurs	Titres
COCL01	AVAHOUNDJE Elias Martinien, BOYI Hounsou Christelle, BELLO Kéfilath, VIGAN Armelle Akouavi, AGOSSOU Christian Mahugnon, AGBODJAVOU Mena Komi, GAYE Ibrahima, BA Mouhamadou Faly, FAYE Adama, RIDDE Valéry, DOSSOU Jean-Paul.	Facteurs prédictifs de la réception de la première dose du vaccin contre la COVID -19 au Bénin
COCL02	GANDJI Pierre, AKOUTA Merveille, AFFO Alphonse M., ACOTCHEOU Pacôme, DANSOU Justin, SAIZONOU Jacques	Effets des mesures de riposte contre la Covid-19 sur l'économie des femmes du secteur non formel au Sud-Bénin
COCL03	PADONOU Sètonджи Géraud Roméo, ADEGBITE Bayode Roméo, ACCROMBESSI Manfred , AGUEMON Badirou	Facteurs associés à l'immunité naturelle contre la covid-19 au Bénin après 3 ans
COCL04	SALAMI Lamidhi, MAKOUTODE Charles Patrick, MONGBO Virginie, BEDIE Vignon, SOSSA JEROME Charles, OUENDO Edgard-Marius, FAYOMI Benjamin	Qualité de mise en œuvre des modèles de Financement Basé sur les Résultats au Bénin
COCL05	BEHANZIN Luc, NDUWIMANA Oscar, GUEDOU Fernand Aimé, GOMA-MATSETSE Ella, OLODO Marius, DOSSOUVO Alban, GANGBO Flore, ZANNOU Djimon Marcel, ALARY Michel, DIABATE Souleymane	Prévalence et facteurs associés aux infections sexuellement transmissibles chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes initiant la prophylaxie préexposition au VIH, 2020-2021

SALLE
4

**Sous-thématique : Communication
libre**

JOUR 1 : 24 AVRIL 2025

MATINEE : 10h40-12h30

Modérateur : MC KPOZEHOUEN Alphonse ; Secrétaire : MCA MIKPONHOUE Rose

CODEABST	Auteurs	Titres
COCL06	GNANVI Sédowoui Copéric Hubert, BEDIE D. Vignon	Discrimination et étiquetage comme source de discontinuité d'observance thérapeutique chez les PVVIH de l'hôpital de zone de Ouidah
COCL07	GBENOU Erick Comlan, Vignon Dègbédji BEDIE, BENON MONRA Abdoulaye	Le « Timanti-bo » : Perceptions, Pratiques Thérapeutiques et Itinéraires chez les Tofin d'Ahomey-Lokpo de Sô-Ava
COCL08	AMOUSSOU Audrey Sémévo Eunice, AFFO M. Alphonse, BOTH Jonna, OUEDRAOGO Ramatou	Perceptions des acteurs sur la loi améliorant l'accès au service d'avortement sécurisé dans la commune de Bohicon au Bénin
COCL10	SALIFOU-ISSAKA Sanni, HOUEMENOU Modeste, NOUDEKE Nestor, HOUSSOU Mathilde	Evaluation du système de surveillance épidémiologique de la rougeole en 2023 dans le département de la Donga au Bénin
COCL11	MIKPONHOUE Rose, GNONLONFOUN Elvire, ADJOBIMEY Mênonli, HINSON A. Vickey, AYELO Paul	Prévalence et facteurs associés aux accidents d'exposition au sang (AES) chez le personnel de santé d'un CHU de zone au Bénin
COCL12	DJOSSOU Parfait, MIGNANWANDE Zinsou Franck Maurille, ANAGONOU Sèdjro Gimatal Esaï, CERDA Irene, TOUSSAINT Alice, HOUZO Jean Gabin, SOPOH Ghislain Emmanuel, GINE MARCH Anna, JOHNSON Roch Christian	Acceptabilité et faisabilité de la chimioprophylaxie par une dose unique de rifampicine dans quatre districts du Bénin endémiques à la lèpre



JOUR 1 : 24 AVRIL 2025

APRES-MIDI : 15h50-17h00

Modérateur : MC KEDOTE Marius ; **Secrétaire :** Dr SOSSOU Ericie

CODEABST	Auteurs	Titres
COCL13	MESSAN Folly, DONOUVI Jérôme, LAWANI Mansourou	L'augmentation du taux de progestérone induite par l'exercice ne modifie pas les valeurs de la CVF et du VEMS chez les femmes non asthmatiques
COCL14	DEGBEY Ornella Farida Merveille	Performance du système de gestion de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et des vaccins dans le secteur public au sud du Bénin : défis, enjeux et solutions innovantes
COCL16	AKOHA Félicité, AHISSOU Ursule, OGOUDJOBI Mathieu, TSHABU AGUEMON Christiane	Education à la Santé Sexuelle au Collège Catholique Père Aupiais de Cotonou : effets de la mise en œuvre
COCL17	AKOHA Félicité, SODAGBODJI Peace, AFLE Cyril, ATANHLOUETO Inès, EZIN Siméone, TSHABU AGUEMON Christiane.	Connaissances, attitudes et pratiques des adolescentes et jeunes filles du Collège d'Enseignement Général d'Adjohoun en matière d'hygiène menstruelle
COCL18	AKOHA Félicité	Elève adolescente enceinte au Bénin : Honneur pour certains parents



JOUR 2 : 25 AVRIL 2025

MATINEE : 10h10-12h30

Modérateur : MCA MONGBO Virginie ; **Secrétaire :** Dr DADAAH Donatien

CODEABST	Auteurs	Titres
COCL19	MIKPONHOUE OLOU Rose, TIMOUSTAPHA F, ADJOBIMEY VISSOH M, MAMA CISSE Ibrahim, GOUNONGBE Fabien, MOUSSAVOU F, HINSON A Vickey, AYELO Paul.	Evaluation du risque sonore et sante auditive des agents dans une société de production au Gabon
COCL20	BIAOU Chabi Olaniran Alphonse, SALAMI Lamidhi, GLELE AHANHANZO Yolaine, PARAÏSO Moussiliou, Emmanuel SAMBIENI, OUEDRAOGO Smaïla, CHOKI Blaise A., ATAKPA Géoffroy S., GOUNNOU Paul, KIKISSAGBE Rolande, HOUNGNOVI Akpovi, AIFA Joaquin.	Pratique des jeux de hasard et d'argent en salle : prévalence des troubles liés à l'usage et facteurs associés au Bénin en 2024
COCL21	KLIKPO Elvyre, ZANNOU Benjamin, KPOZEHOUEN Alphonse, GLELE AHANHANZO Yolaine	Jeu pathologique chez les étudiants de la FSS en 2024 : prévalence et facteurs associés
COCL22	BIAOU Chabi Olaniran Alphonse, SALAMI Lamidhi, GLELE AHANHANZO Yolaine, PARAÏSO Moussiliou, SAMBIENI Emmanuel, OUEDRAOGO Smaïla, CHOKI Blaise A., DANSOU SONOU Tanguy A. M., GOUNNOU Paul, KIKISSAGBE Rolande, HOUNGNOVI Akpovi, AIFA Joaquin.	Les habitudes et conséquences des jeux de hasard et d'argent chez les jeunes : une analyse sexospécifique à partir des données scolaires au Bénin
COCL23	JOHNSON Roch Christian, SAEZ-LOPEZ Emma, CATRAYE Perrin, HABIB Akimath, HOTEJNI Lotus, ALAYE Marlène, KPOTON Godwin Gérard, ELEGBEDE Nadège, GANLONON Line-Marlène, ANAGONOU Esäi Sèdjro, DACAL Elena ?	Régime contenant des beta lactamines pour le raccourcissement du traitement de l'ulcère de Buruli en Afrique de l'Ouest : point d'étape de l'essai clinique



CODEABST	Auteurs	Titres
	HERRADOR Zaida, KOFFI Aboa Paul, KALOGA Mamadou, LABIYA Toure, GADAH Denis, GNOSSIKE Piham, BAKOUBAYI Akila, PHILLIPS Richard Odame, GINE-MARCH Anna, CRUZ Isra et RAMON-GARCIA Santiago	
COCL24	KADJA Mireille Catherine, OUEDRAOGO Daouda, DAHOUROU Laibané Dieudonné, ONIDJE Edmond, SABI Souhaibou Sourokou, DUCATEZ Mariette F., EMIKPE Benjamin Obukowho, ALAMBEDJI Rianatou Bada.	Séroprévalence et facteurs de risque associés à l'infection par le virus influenza D chez les bovins en zones périurbaines de Dakar et Thiès, Sénégal
COCL25	TOSSOU Yévèdo Borel, BIAKA Paule Héléna, GBAGUIDI Fifamin Noël Christelle, BEDIE Vignon, AGBO Sonagnon Inès Elvire, GUEDOU Fernand Aimé, KOUADIO Kouakou Jérôme, ANAGONOU Sèdjro Gimatal Esai, MIGNANWANDE Franck Zinsou, DJOSSOU Parfait, YEMADJE Brunelle Vanessa, HOUNDJREBO Flora Sylvie, ARRAWO Jeanne d'Arc Natacha Lessanh, FAIHOUN Yvette, JOHNSON Harvey, SOPOH Ghislain Emmanuel, HOUEZO Jean Gabin, KALOGA Mamadou, DIZOE Agui Sylvestre, NICTER Mark, GINE-MARCH Anna, JOHNSON Roch Christian.	Ampleur et facteurs associés à la restriction de la participation sociale des personnes handicapées dans les zones endémiques des maladies tropicales négligées (MTN) au Bénin et en Côte d'Ivoire
COCL26	MONGBO Virginie, NATONNAGNON Géraud, TOKOUDAGBA Jean-Marie, AZANDJEME Colette, SOSSA-JEROME Charles	Dispensation des médicaments et erreurs médicamenteuses dans les officines de pharmacie privées à Cotonou
COCL27	KLIKPO Elvyre, KPOZEHOUEN Alphonse, GLELE AHANHANZO Yolaine, DEGBEY Cyriaque, PARAÏSO Moussiliou Noël, BURRUS Francine, SALAMON Roger	Troubles du sommeil induits par l'anxiété chez les adolescents scolarisés au Bénin : Prévalence et facteurs associés



JOUR 2 : 25 AVRIL 2025

APRES-MIDI : 16h10-17h00

Modérateur : MCA MIZEHOUN Carmelle ; **Secrétaire :** Dr TODEDI Judicael

CODEABST	Auteurs	Titres
COCL28	TOSSOU Yévèdo Borel, GBAGUIDI Fifamin Noël Christelle, AGBO Sonagnon Inès Elvire, ZANVO Sètondji Diane Edwige, CODJO-SEGNON Karine Lucrèce Marie, BIAKA Paule Hélène, GUEDOU Fernand Aimé, Kouakou KOUADIO Jérôme, NAGONOU Sèdjro Gimatal Esäi A, MIGNANWANDE Franck Zinsou, DJOSSOU Parfait, YEMADJE Brunelle Vanessa, HOUNDJREBO Flora Sylvie, ARRAWO Jeanne d'Arc Natacha Lessanh, FAIHOUN Yvette, JOHNSON Harvey, SOPOH Ghislain Emmanuel, HOUEZO Jean Gabin, KALOGA Mamadou, DIZOE Agui Sylvestre, NICHTER Mark, JIMENEZ Cristina Juan, GINE-MARCH Anna, JOHNSON Roch Christian.	Facteurs associés à la prise en charge des personnes handicapées liées aux maladies tropicales négligées à manifestation cutanée au Bénin et en Côte d'Ivoire
COCL29	BEHANZIN Luc, DIABATE Souleymane, GUEDOU Fernand Aimé, GOMA-MATSETSE Ella, OLODO Marius, AZA-GNANDJI Marlène, DOSSOUVO Alban, AKPAKA Axel, CHAGAS Elyote, GANGBO Flore Armande, ZANNOU Djimon Marcel, ALARY Michel	Adhésions auto-déclarée et biologique chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, participants de l'étude de démonstration à base communautaire de la prophylaxie préexposition au VIH

CODEABST	Auteurs	Titres
COCL30	SOSSA Pamela, SOSSOU Ericie, SOPOH Ghislain	Niveau de développement global des enfants de 6 à 59 mois dans la commune de Toviklin au Bénin en 2024
COCL31	Ginette Victoire Senami GANDIGBE; ZINSOU Franck Mignanwande; Yévèdo Borel TOSSOU; Karine Lucrèce Marie CODJO-SEIGNON; Sonagnon Inès Elvire AGBO; Fifamin Noël Christelle GBAGUIDI; Sèdjro Gimatal Esäi ANAGONOU; Fernand Aimé GUEDOU; Jean Mark NICTER; Cristina Juan JIMENEZ; Roch Christian JOHNSON, Anna GINE-MARCH;	Inégalités et facteurs associés aux femmes et au handicap dans les communautés endémiques aux maladies tropicales négligées (MTN) : une approche intersectionnelle des interventions
COCL32	YOBO IYALA Jean Blaise, DEGBEY Comlan Cyriaque, MAKALA Jean Paul, YOGOLELO Riziki	Dynamique temporelle et spatiale de poliovirus dérivé de la souche vaccinale (PVDV) en République Démocratique du Congo (RDC), 2018-2023.



JOUR 3 : 26 AVRIL 2025

MATINEE : 09h00-10h00

Modérateur : MCA MONGBO Virginie; **Secrétaire :** Dr TODEDI Judicael

CODEABST	Auteurs	Titres
COCL34	TAPHA Ounoussa, DEGBEY Cyriaque Comlan, YACOUBA Abdourahamane, CHAIBOU DAN INNA Saadatou, MAMADOU Saidou, HINSON Antoine Vikkey	Connaissances, attitudes et pratiques des étudiants en fin d'études de Médecine et de Pharmacie de l'Université Abdou Moumouni vis-à-vis des prescriptions des antibiotiques et de la résistance bactérienne
COCL35	N'GUESSAN Danh Annick, BADOU SAVI Agnès Oladoun, BABADJIDE Charles Lambert	Les réseaux sociaux numériques informels de santé : une nouvelle dynamique d'interactions sociales en santé
COCL36	MAKOUTODE Charles P, SALAMI Lamidhi, GBAGO Sandrine J-K, BÉDIÉ Vignon D, SALIFOU Kabirou	Facteurs associés à l'utilisation abusive de la pilule du lendemain chez les étudiantes âgées de 15 à 24 ans de l'Université de Parakou en 2023



COMMUNICATIONS AFFICHÉES

JOUR 1

24 avril 2025 : 09h00-17h00

SOUS-THEMATIQUE : LA MEDECINE FAMILIALE ET LES SOINS DE SANTE PRIMAIRE

Modérateur : MCA MONGBO Virginie ; **Secrétaire :** MA SALAMI Lamidhi

CODEABST	Auteurs	Titres
CAMF01	PHYCIEN Nehemie, DANSOU Boris Pleck , AHODEGNON Rodrigue.Z	Analyse de l'offre de soins en consultation prénatale dans les zones à faible couverture sanitaire au Bénin
CAMF02	NADAKOU N'Kpkingou Théodore, PARAÏSO Moussiliou Noel ; YOBO Jean Blaise, MAKOUTODE Charles Patrick, SODJINOÛ Joel, TAPHA Ounoussa, ADEHOSSI Éric Omar.	Facteurs de risque associés à l'infection palustre chez les enfants de 6 à 59 mois au Niger. Une étude transversale
CAMF03	BEDIE Vignon Dègbédji	Faire la première consultation prénatale au Bénin : enjeux socioculturels de la déclaration de grossesse en milieu communautaire de Djougou

SOUS-THEMATIQUE : LA MISE EN ŒUVRE DE LA SANTE COMMUNAUTAIRE EN AFRIQUE

CODEABST	Auteurs	Titres
CASC01	AGBEKO Foli Yvon, SALAMI – Odjo Farouk, AGBETIAFA Koffi Vovolité, HEMOU Manani, PAKOUDJARE Mazama, DJADOU Koffi Edem,	Activités de riposte à l'épidémie de choléra dans le district du golfe, Lomé, Togo.



SOUS-THEMATIQUE : LA PRATIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE EN MILIEU HOSPITALIER

CODEABST	Auteurs	Titres
CAPH01	AZANDJEME Colette Sylvie, MEDENOU Christelle Nina, MIZEHOUN Carmelle Gbèdécon, HOUSSOU Gbemahon Roger, METONNOU, Clemence, SOSSA Charles	Qualité du conseil diététique dans les officines de Cotonou
CAPH02	AZANDJEME Colette Sylvie, BOUKARI MAMA Yassarath, MIZEHOUN Carmelle, HOUSSOU Gbemahon Roger, METONNOU Clemence, SOSSA Charles	Qualité du gain pondéral suite à la récupération nutritionnelle chez les enfants malnutris de 06 à 59 mois au CHU-MEL de Cotonou en 2023
CAPH03	MISSIKPODE Sègbégnon Rigobert, MAKOUTODE Charles-Patrick	Evaluation de la chaîne du froid
CAPH04	TRAORE Tiandiogo Isidore, SALISSOU Abdou Ahmed Mohamed, TRAORE Aïda Marietou, DRABO Seydou, TAOFIKI Ajani Ousmane, DRAMANE Kania, TARNAGDA Zekiba, CISSE Bakary, ILBOUDO Abdoul Kader, REKENEIRE de Nathalie, KAGONE Thérèse, OUATTARA Seydou, BICABA Brice, OUEDRAOGO Boukary, SAWADOGO Charles, Zingue Dezemon, BONKOUNGOU Isidore, OUEDRAOGO Abdoul Salam, PODA Armel, SAVADOGO Leon G.B, MILLOGO Athanase, KISSOU Aimée, MAHAMADOU Abdoul Jalile, DIENDIERE Eric, BA Absetou , SEREME Moustapha, OUEDRAOGO Solange, HIEN Herve, DIALLO Mamadou Saliou Kalifa, COTTRELL Gilles, POUBLAN Julien, DUBOIS Natasha, PRADA Nicole, D'ORTENZIO Eric, ALTANN Mathias	Dynamique spatio-temporelle et facteurs associés à l'incidence de la COVID-19



JOUR 2

25 avril 2025 : 09h00-17h00

SOUS-THEMATIQUE : COMMUNICATION LIBRE

Modérateur : MCA MAKOUTODE Patrick ; Secrétaire : MC KEDOTE Marius


CODEABST	Auteurs	Titres
CACL01	MONGBO Virginie, Gildas Yélian WEKE, Jean-Marie TOKOUDAGBA, Colette AZANDJEME, Charles SOSSA-JEROME	Analyse des prescriptions médicamenteuses reçues dans des officines de pharmacie privées de la commune d'Abomey-Calavi au Bénin
CACL02	KOUGBLENOU Odile, MELIHO Pierre, AKPI Eric, ADOUNKPE Ferdinand, KPATCHAVI Adolphe; HOUINATO Dismand	Consommation de substances psychoactives en milieu scolaire au Bénin : contextes d'approvisionnement et d'usage
CACL03	SOUGOU Ndeye Mareme	Facteurs associés au dépistage du Diabète en milieu rural dans le district de Salémata au Sénégal
CACL04	AKOHA Félicité, AKA Joseph, SOUSSIA Théodore, TIEMBRE Issaka, OUENDO Edgard-Marius D., DAGNAN Simplicie N'cho	Perception négative des élèves adolescentes et jeunes filles sur l'utilisation des méthodes contraceptives modernes au Bénin
CACL05	KLIKPO Elvyre, NDI Hervé, AZA-GNANDJI Guy-Gérard, KPOZEHOUEN Alphonse et GLELE AHANHANZO Yolaine	Psychiatrie de liaison au CNHU-HKM à Cotonou en 2023 : aspects épidémiologiques et cliniques

CODEABST	Auteurs	Titres
CACL06	AVAHOUNDJE Elias Martinien, AGBODJAVOU Mena, AGOSSOU Christian, BOYI Christelle, DOSSOU Jean-Paul	Cartographie du système national de recherche en santé au Bénin : Analyse de la production scientifique (2013-2023)
CACL07	DIONGUE Fatoumata Binetou, BASSOUM Oumar, TINE Jean Augustin Diégane, DIALLO Amadou Ibra, SOUGOU Ndeye Marème, NDIAYE Ibrahima, NDIAYE Mbayang, DIONGUE Mayacine, DIAGNE Maty, FAYE Adama, SECK Ibrahima	Etude des facteurs associés à l'accès de la planification familiale chez les adolescentes jeunes de 15-24 ans au niveau du district sanitaire de Diouloulou en 2021 (Sénégal)
CACL08	Roméo Mèdèssè TOGAN, Alassane OURO-MEDEL, Rogatien ATOUN, Frédéric YOUNA, Komlan ALI-EDJE, Messanh DOUFAN, Laetitia SORRANO, Christelle BUTEL, Martine PETEERS, Didier K. EKOUEVI, Claver Anoumou DAGNRA	Résistance primaire et efficacité du dolutégravir chez les PVVIH initiant leur premier traitement antirétroviral au Togo en 2023 : une étude nationale





RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS





COMMUNICATIONS ORALES

**Sous-thématique:
La mise en œuvre
de la santé
communautaire
en Afrique**

COSC01	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Activités communautaires pédiatriques dans la région centrale au Togo.

Agbeko Foli Yvon¹, Yolou Edi², N'djao Akawulu², Hemou Manani¹, Pakoudjare Mazama¹, Djadou Koffi Edem³,

Affiliation : 1= Service de Pédiatrie, CHU Campus, Lomé, Togo ; 2= Direction Régionale Centrale, Sokodé, Togo, 3= Service de Pédiatrie, CHR Tsévié, Tsévié, Togo

Introduction : Le taux de mortalité des enfants < 5 ans était de 73 ‰ au Togo en 2017 (UNICEF). Seuls 65,8% de la population avait accès à une structure de santé, dont 56,8% en milieu rural. Le but de ce travail est d'évaluer le niveau de réalisation des activités pédiatriques des agents de santé communautaire (ASC) dans la région centrale au Togo.

Méthodes : La région centrale comptait 733 784 habitants en 2024. Elle comprend 5 districts et son chef-lieu est la ville de Sokodé. La mise en place des interventions à base communautaire (IBC) en 2015 fait suite à l'élaboration des modules de formation, la sélection des communautés d'intervention et des ASC à former et l'organisation des formations. Il s'agit d'une formation sur un paquet intégré de soins infantiles (0-5 ans), la PCIMNE communautaire. Les ASC sont officiellement installés après leur formation dans leurs communautés, dotés en matériels et sous la supervision du responsable de l'USP. Les données des activités (nombre d'ASC, nombre de cas dépistés pour les maladies cibles, nombre de cas positifs, nombre de cas traités, nombre de visites) sont collectées à l'aide du logiciel DISH2.

Résultats : Au total, 1 021 ASC ont été déployés dans la région centrale depuis leurs formations en 2016-2017. En 2024, 121 090 cas toutes causes confondues ont été pris en charge par les ASC pour 142 000 ménages. L'ASC est appelé en premier recours dans 16,5% des cas. Les ASC ont pris contact avec 34 891 cas dont 6 172 référés. Pour le paludisme, 31 887 cas suspects ont été identifiés, 31 665 testés par TDR dont 26 804 positifs et traités. Soixante-seize cas graves ont été référés. Pour la pneumonie, 2 379 enfants ont été visités dont 1 741 ont reçu de l'Amoxicilline. La diarrhée a été soignée chez 1 075 enfants par SRO.

Conclusion : Les interventions de PCIMNE communautaire contribuent à améliorer l'accès aux soins de santé infantile en vue de l'atteinte des ODD.

Mots-clés : Agent; Santé Communautaire; Enfant; Togo

COSC03	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Efficacité du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance sur les habitudes alimentaires des enfants de 6 à 59 mois dans la commune de Lalo au Bénin

Sossa Pamela, Sossou Ericie, Sopoh Ghislain

Affiliation : Institut Régional de Santé publique de Ouidah, Université d' Abomey Calavi, Bénin

Introduction : L'alimentation des enfants de 6 à 59 mois influence leur état nutritionnel et leur développement. Le Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) vise à améliorer ces aspects dans la commune de Lalo. Cette étude évalue son efficacité sur les habitudes alimentaires des enfants de 6 à 59 mois.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale évaluative, quasi-expérimentale, type ici-ailleurs, menée dans les communes de Lalo (zone d'action) et Toviklin (zone témoin). Un total de 1142 enfants (571 par commune) ont été sélectionnés par échantillonnage en grappes. Les données socioéconomiques et alimentaires ont été collectées via des questionnaires administrés aux mères. Le PNDPE était jugé efficace si la proportion d'enfants ayant de bonnes habitudes alimentaires dans le groupe d'action était significativement supérieure à celle du groupe témoin. Une bonne habitude alimentaire correspondait à l'alimentation minimale et à un score de consommation alimentaire acceptable. Le test du Chi-deux a comparé les proportions.

Résultats : Parmi les enfants enquêtés, 53,15 % étaient de sexe masculin, avec une médiane d'âge de 26 mois et une prédominance dans la tranche [12-24]mois. La majorité des mères avaient entre 20 et 30 ans et étaient en union libre. Les enfants vivaient dans des ménages à faible niveau socioéconomique. Parmi les enfants, 43,58% du groupe action ont une alimentation minimale acceptable contre 25,42% du groupe témoin ($p < 0,01$) et 45,04% du groupe d'action avaient un score de consommation alimentaire acceptable contre 46,01% dans le groupe témoin ($p = 0,03$). La proportion d'enfants du groupe action ayant de bonnes habitudes alimentaires (39,23%) était supérieure à celle du groupe témoin (30,12%) ($p = 0,01$).

Conclusion : Le PNDPE a significativement amélioré les habitudes alimentaires des enfants de Lalo. Il mérite d'être étendu dans toutes les communes où les habitudes alimentaires des enfants sont sous-optimales.

Mots-clés : Projet; Efficacité; Habitudes Alimentaires; Enfants de 6 A 59 Mois; Bénin

COSC04	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Evaluation des effets des activités de sensibilisation contre les maladies non transmissibles sur les connaissances et pratiques en matière d'alimentation des populations de la commune de Savè au Bénin en 2023

Zinsou Fidèle, Todedji Judicaël, Akakpo Jocelyn, Bofe Sylvestre, Fatondji Christelle

Affiliation : Ministère de la Santé, Direction Départementale de la Santé des Collines, Bureau de Zone Savè-Ouessè, Savè, Bénin

Introduction : Des campagnes de sensibilisation de proximité sur des comportements favorables à la santé ont été organisées de 2021-2023 dans plus de 10.000 ménages de la commune de Savè à travers les animateurs de l'ONG Racines. L'objectif de cette étude était d'évaluer les effets de la campagne de sensibilisation des ménages sur une alimentation saine et équilibrée dans la commune de Savè en 2023.

Méthodes : Nous avons mené une étude transversale descriptive et analytique en 2023 sur une population de 271 bénéficiaires et 271 non bénéficiaires de l'intervention. Les variables dépendantes étaient les connaissances et pratiques en matière d'alimentation. Pour identifier les facteurs explicatifs des connaissances et pratiques, des tests de Chi-deux ont été utilisés pour identifier les facteurs associés avec un seuil de significativité fixé à 5%.

Résultats : 51,3% des sujets étaient de sexe masculin. Le niveau de connaissance des populations en matière d'alimentation dans la prévention des maladies non transmissibles (MNT) était mauvais dans 57,6% des cas et le niveau de pratique était mauvais dans 58,7% des cas. Les niveaux de connaissance ($p < 0,0001$) et de pratique ($p = 0,0008$) des bénéficiaires étaient statistiquement plus élevés que ceux des non bénéficiaires. Les facteurs associés au faible niveau de connaissance étaient : l'âge de moins de 30 ans, la situation matrimoniale mariée ou en couple, la profession étudiante ou apprentie, le niveau d'instruction analphabète et le revenu mensuel inférieur à 30 000 FCFA ($p < 0,05$). En ce qui concerne le faible niveau de pratique, les facteurs associés étaient l'âge de moins de 30 ans, le sexe masculin, le niveau d'instruction analphabète et le revenu mensuel inférieur à 30 000 CFA ($p < 0,05$).

Conclusion : Il est donc indispensable dans la lutte contre les MNT d'organiser des campagnes de sensibilisation sur des comportements favorables à la santé.

Mots-clés : Evaluation; Connaissances; Pratiques; Maladies Non Transmissibles; Zone Sanitaire Savè-Ouessè

COSC05	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Alimentation des bodybuilders de la ville de Cotonou en période pré-compétitive nationale

Kiki Djivoh Sidonie Mahougnon, Ouedraogo Brahim, Tonon Affidéhomé, Gouthon Gilchrist, Bio Nigan Issiako

Affiliation : Institut National de la Jeunesse de l'Education Physique et du Sport (INJEPS)

Introduction : Les bodybuilders béninois qui participent à des compétitions consomment de grandes quantités de protéines, mais l'équilibre de leur alimentation, notamment en termes de diversité alimentaire, reste incertain. Cela pose un problème pour leur santé globale et leur performance optimale dans le temps. Objectif : L'objectif de cette étude est d'évaluer l'équilibre alimentaire des bodybuilders de Cotonou pendant la période de pré-compétition nationale.

Méthodes : L'étude a été transversale, basée sur la méthode d'échantillonnage exhaustif. Un questionnaire auto-administré auprès des neuf bodybuilders inscrits aux compétitions nationales à Cotonou en 2024 a été utilisé pour la collecte des données. Les données ont été traitées à l'aide du logiciel SPSS (version 26).

Résultats : Les résultats révèlent une consommation excessive de protéines (pendant et entre les repas principaux), avec un déficit marqué dans l'alimentation quotidienne de ces bodybuilders de légumes, de fruits, de lait et de produits laitiers.

Conclusion : Les bodybuilders de Cotonou en phase précompétitive nationale de l'année 2024 ont une alimentation déséquilibrée avec des apports protéiques très élevés. Une éducation nutritionnelle, basée sur des recommandations scientifiquement fondées, est urgente pour améliorer leurs habitudes alimentaires.

Mots-clés : Habitudes alimentaires; Culturisme; Pré-Compétition; Bénin

COSC07	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Facilitateurs et obstacles au dépistage communautaire du VIH en Guinée : Leçons d’une analyse de mise en œuvre basée sur le cadre conceptuel Consolidated Framework for Implementation Research

Camara Soriba, Kourouma Mory¹, Millimouno Tamba Mina , Sow Abdoulaye, Sidibe Sidikiba , Touré Aly Badara , Nabé Aly Badara , Delamou Alexandre

Affiliation : Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Chaire de Santé Publique, Faculté des Sciences et Technique de la Santé, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Centre de Recherche de Formation en infectiologie, Centre d’Excellence Africain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles.

Introduction : En Guinée, 36 % des personnes vivant avec le VIH ignorent leur statut sérologique, soulignant la nécessité de stratégies de dépistage innovantes pour atteindre les objectifs 95-95-95 de l’ONUSIDA. Le dépistage communautaire du VIH, recommandé par l’OMS, vise à améliorer le diagnostic précoce en mobilisant des acteurs et ressources locaux. Cette étude applique le cadre conceptuel Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) pour évaluer les facilitateurs et les obstacles à la mise en œuvre du dépistage communautaire du VIH dans dix sites pilotes, afin d’optimiser cette approche en Guinée.

Méthodes : Une étude qualitative descriptive a été menée en utilisant le CFIR pour explorer les facteurs influençant la mise en œuvre. Vingt-huit entretiens approfondis ont été réalisés auprès des principales parties prenantes, notamment des personnes vivant avec le VIH, des prestataires de soins, des organisations communautaires et des représentants de la coordination nationale. Les données ont été analysées selon une approche thématique avec le logiciel NVivo, garantissant la rigueur analytique grâce à un double codage et un accord intercodeurs.

Résultats : L’étude a identifié plusieurs facilitateurs, notamment la commodité du dépistage à domicile, qui réduit les barrières logistiques et financières, ainsi que le rôle des organisations communautaires dans le renforcement de la confiance et le soutien psychosocial. Cependant, plusieurs obstacles ont limité l’efficacité de l’intervention, parmi lesquels des ruptures fréquentes de stocks, des préoccupations relatives à la confidentialité et à la stigmatisation, un manque de formation continue et d’incitations financières pour les agents communautaires, ainsi que l’absence de protocoles clairs définissant les rôles des différents acteurs. De plus, la résistance de certaines autorités sanitaires a freiné l’intégration complète du dépistage communautaire dans le système national de santé.

Conclusion : Les résultats soulignent la nécessité d’améliorer la durabilité et l’acceptabilité du dépistage communautaire du VIH. Assurer un approvisionnement régulier en intrants, renforcer la coordination entre les parties prenantes et améliorer les incitations financières et non financières pour les agents communautaires sont des mesures essentielles. L’intégration de cette stratégie dans les politiques nationales de santé pourrait renforcer son efficacité et garantir une réponse durable à l’épidémie de VIH.

Mots-clés : Dépistage communautaire; Facilitateurs; Obstacles; VIH; CFIR; Cas index; Guinée.

COSC08	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Évaluation de la politique nationale de santé communautaire dans la zone sanitaire Bembèrèkè-Sinendé en 2023

Agonnoude Togbédji Maurice, Orou Bodedjo Goudi, Houeto Sègbegnon David

Affiliation : École Nationale de formation des Techniciens supérieurs en santé publique et en Surveillance Epidémiologique, Université de Parakou, Bénin

Introduction : Dans un contexte marqué par les Objectifs de Développement Durable (ODD), la politique nationale de santé communautaire (PNSC) représente un pilier essentiel pour les atteindre en réorientant les systèmes de santé vers les soins de santé primaires (SSP). Objectif : évaluer la mise en œuvre des activités de la PNSC dans la zone sanitaire Bembèrèkè-Sinendé en 2023.

Méthodes : Il s'est agi d'une étude d'observation transversale évaluative à visée analytique concernant toutes les formations sanitaires en activité dans les deux communes de la zone sanitaire. La collecte des données s'est faite d'un entretien individuel structuré par questionnaire auto-administré en ligne via KoboToolbox puis par vérification des rapports des différentes activités réalisées. La variable dépendante était la qualité des activités et les variables indépendantes étaient contextuelles et individuelles.

Résultats : Au total 28 formations sanitaires dont les chefs postes étaient principalement jeunes et ayant une expérience variée ont été incluses. Les taux de couverture des activités variaient d'élévée pour les visites à domicile (46,9%), à faibles pour les 'autres activités'. Les sensibilisations (89,3%) et les causeries éducatives (100%) sont bien réalisées, tandis que les démonstrations pratiques et les visites à domicile rencontrent des défis. Une association significative a été trouvée entre l'ancienneté des chefs-postes et la qualité des activités de mise en œuvre.

Conclusion : Il apparaît nécessaire de renforcer la formation des chefs de poste nouvellement venus afin de ne négliger aucune activité dans la prestation des soins de santé communautaire.

Mots-clés : Politique De Santé; Politique Nationale De Santé Communautaire; Evaluation Mise En Œuvre; Bembêrêkê Sinendé; Bénin

COSC09	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Indicateurs de performance initiale pour la mise en œuvre de la phase pilote de la politique nationale de santé communautaire au Bénin

Padonou Sètonджи Géraud Roméo, Kohoun Rodrigue, Guezo Mevo Blaise , Deguenon Conrad, Houde Paternne, Aguemon Badirou

Affiliation : Département de Santé Publique. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi

Introduction : Le Bénin a adopté en 2023 une réforme ambitieuse de politique nationale de santé primaire afin d'adresser au plus près des populations les enjeux de santé. Une phase pilote a d'abord été mise en œuvre dans 6 communes. Cette étude avait pour objectifs d'en faire une évaluation initiale.

Méthodes : Une étude évaluative selon le modèle structure-processus qui s'est déroulée en octobre et novembre 2023 dans les 6 communes de la phase pilote : Banikoara, Malanville, Bembérékè, Kalalé, Nikki, Sinendé. La cible primaire était les agents de Santé Communautaire Qualifiés et les relais Communautaires, la cible secondaire était l'ensemble des structures et personnes du ministère de la santé, du ministère de la décentralisation, et la cible tertiaire les ménages. Le niveau d'implication dans des campagnes sanitaires et la satisfaction des bénéficiaires ont également été mesurés. Les scores de performance ont été calculés pour chaque commune et globalement.

Résultats : Au total 33 agents de Santé Communautaire Qualifiés, 1082 relais Communautaires et 5176 sujets issus de la population bénéficiaire ont été enquêtés. La performance de la composante structure était de 80%, celle du processus, 66,22%. L'implication dans les activités de routine était de 91%, et dans les campagnes de santé 65%. Le niveau de satisfaction des bénéficiaires était de 79%. La performance globale de 71%. La commune de Kalalé a eu la performance la plus élevée à l'inverse de Sinendé. La mise à disposition des produits de santé et la digitalisation étaient les principaux challenges.

Conclusion : C'est une politique d'envergure avec une large variété d'activité à impact sanitaire. Cette évaluation initiale réalisée après 3 mois de mise en œuvre a permis d'identifier les difficultés à résoudre et les points d'amélioration et de consolidation.

Mots-clés : Politique et Système de Santé – Santé Communautaire - Bénin

COSC10	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Contribution des « conversations transformatrices » à l'amélioration de la santé des jeunes/adolescents dans la province de la Tshopo (RDC)

Aloys Zongo, Bintou Diakhaby, Marcel Sabiti Poyo, Marie Mokaria Lisono, Kitanina Fuoto, Pacifique, Losea Cyprien,

Affiliation: Enabel (Belgian Development Agency) – bilateral cooperation

Introduction : Pour répondre aux défis liés aux droits-santé sexuelle et reproductive (DSSR) des jeunes/adolescents, Enabel à la Tshopo appuie la division provinciale de la santé pour l'implémentation d'une stratégie novatrice appelée « Conversations Transformatrices ». Les conversations transformatrices sont des espaces de dialogue « sécurisés » où les participants ont l'occasion de briser le silence sans pour autant se sentir jugé. Elles apportent de la connaissance/compétence à travers l'information sur les DSSR et une thérapie psycho sociale communautaire respectueuse de la culture/valeur locale sur des cas de traumatismes/violences vécus par les participants.

Méthodes : 2 cohortes de 59 personnes (29 filles et 30 garçons) issues de 2 structures vulnérables ont été mises en place et seront suivies pendant au moins 6 mois à raison de 2 séances par mois. La séance de conversations transformatrice comprend 3 étapes (i) une étape d'informations/éducation sur les DSSR et (ii) une étape d'écoute des histoires douloureuses vécues et (iii) une étape de prise en charge des cas. Le contenu des connaissances des DSSR comprend les domaines suivants : Adolescence et Puberté, Droits SSR et égalité sexes, Planification familiale, Prévention des grossesses non désirées, Prévention et transmission du VIH/SIDA, Gestion du cycle menstruel, VBG, Santé mentale/dangers des consommations de substances psycho actives. La psychothérapie de soutien communautaire est adaptée à chaque cas dont le diagnostic est fait après un témoignage des participants à la cohorte.

Résultats : L'enquête de base réalisée a montré une faible connaissance des 8 thèmes identifiés allant de 0% pour le VIH/SIDA, droits en SR à 31% pour le VBG avec une moyenne de 12,55%. Au total 24 séances de conversations transformatrices ont été réalisées. Elles ont permis de diagnostiquer 32 cas de traumatismes/violences psychologiques ; et de réaliser 8 séances d'éducation en lien avec les 8 thèmes identifiés. Parmi les cas diagnostiqués, 9 ont été correctement pris en charge, 2 nécessitent une médiation familiale. Une évaluation à mi-parcours et finale sont prévues pour mesurer la progression du niveau de connaissance acquise en rapport avec les 8 thèmes identifiés.

Conclusion : Les résultats préliminaires obtenus de la mise en œuvre des conversations transformatrices montrent un réel besoin des groupes vulnérables pour la prévention et la prise en charge des traumatismes/violences psychologiques dont ils sont victimes.

Mots-clés : Conversations transformatrices, adolescents/jeunes, Tshopo (RDC)

COSC11	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Facteurs explicatifs de la faible utilisation des méthodes contraceptives modernes chez les femmes en âge de procréer dans le département du couffo

Houndjo André

Affiliation : Laboratoire de Recherche sur les Performances et Développement des Organisations de l'Université d'Abomey-Calavi (LARPEDO/UAC) – Bénin

Résumé : Bien qu'il soit établi un lien positif entre la Planification Familiale (PF) et la réduction des cas de décès maternel et infantile, la faible utilisation de la contraception moderne demeure toujours assez préoccupante au Bénin et dans le Couffo en particulier (EDSB 2017-2018). Avec un taux estimé à 5%, le Couffo enregistre non seulement la plus faible prévalence contraceptive moderne mais aussi reste largement en dessous du taux national (12%) (INStAD, EDSB-V). L'objectif de cette étude est donc d'identifier les facteurs explicatifs de la faible utilisation des méthodes contraceptives modernes chez les femmes en âge de procréer dans le département du Couffo. Pour y parvenir, nous avons eu recours aux données de l'Enquête Démographique et de Santé (EDS) réalisée au Bénin entre 2017 et 2018 par l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStAD) /ex (INSAE) sur 14 435 ménages. Après avoir procédé à une analyse descriptive, nous avons effectué une analyse économétrique. Il ressort des résultats obtenus que les femmes qui n'utilisent pas la contraception moderne sont les femmes de la communauté adja et apparentés, celles de religion chrétienne ou traditionnelle, qui ne sont ni actives sexuellement ni exposées aux médias et qui vivent en milieu rural avec un niveau de vie bas et un niveau d'instruction primaire au plus. Les facteurs qui influencent significativement la non-utilisation de la contraception moderne sont : l'ethnie ($p < 0,005$), le statut matrimonial ($p < 0,005$), l'activité sexuelle de la femme ($p < 0,001$), le niveau d'instruction ($0,01$) et le nombre d'enfants vivants de la femme ($p < 0,01$). Les actions axées sur la promotion de la scolarisation des filles et l'organisation régulière de campagnes de sensibilisation impliquant les leaders communautaires et religieux sont suggérées en vue d'augmenter l'utilisation de la contraception moderne.

Mots-clés : Facteurs explicatifs, faible utilisation, méthodes contraceptives modernes, Couffo, femmes

COSC12	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Effets d'une intervention de soutien alimentaire aux gestantes pour la prévention du faible poids à la naissance

Gbèmahon Roger Houssou¹, Colette Sylvie Azandjeme¹, Opportune Akpo-djenontin², Nadia Fanou², Clémence Germaine Metonnou¹, Charles Jérôme Sossa¹, Ella Compaore³, Roch Mongbo²

Affiliation : 1= Département de la promotion de santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi (UAC), Ouidah, Bénin 2= Faculté des Sciences Agronomiques, Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin 3= Centre de Recherche en Sciences Biologiques, Alimentaires et Nutritionnelles (CRSBAN), Université Ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

Introduction : le poids à la naissance d'un bébé est un indicateur important de sa santé. Un faible poids peut être lié à de nombreux facteurs, mais l'alimentation de la mère pendant la grossesse joue un rôle déterminant. Cette étude vise à évaluer l'efficacité d'une intervention nutritionnelle ciblant les femmes enceintes à risque d'accoucher d'un enfant de faible poids de naissance.

Méthodes : nous avons mené une étude quasi-expérimentale de type avant-après et ici-ailleurs, comparant un groupe d'intervention à un groupe témoin, tous deux composés de femmes enceintes identifiées comme étant à risque. L'étude s'est déroulée sur une période de six mois. Le groupe d'intervention a bénéficié de kits alimentaires, élaborés à partir d'aliments locaux, ainsi que de séances d'éducation nutritionnelle, de visites à domicile et d'un suivi individualisé. Le groupe témoin a reçu les mêmes interventions, à l'exception des kits alimentaires. Les données ont été analysées à l'aide du test de Student pour comparer les moyennes et du test du chi-deux pour comparer les proportions.

Résultats : Les résultats montrent une amélioration significative des apports en macronutriments, de la diversité alimentaire et de la consommation globale chez les femmes ayant bénéficié des kits alimentaires. Ces femmes ont également gagné en moyenne 1,47 kg de plus pendant leur grossesse, et leurs nouveau-nés présentaient un poids de naissance supérieur et une taille plus grande par rapport au groupe témoin. De plus, nous avons observé une diminution de 10% du nombre de bébés de faible poids de naissance chez les femmes ayant utilisé les kits alimentaires.

Conclusion : Les résultats de cette étude soulignent l'importance de renforcer les programmes de santé maternelle en facilitant l'accès à des aliments nutritifs et variés aux gestantes vulnérables.

Mots-clés : Intervention Nutritionnelle; Soutien Alimentaire; Femmes Enceintes; Bénin; Zone Lacustre

COSC13	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Facteurs associés aux connaissances et pratiques des gestantes sur l'alimentation au cours de la grossesse dans la zone sanitaire Savè-Ouèssè au Bénin en 2023

Todedji Judicaël, Zinsou Fidèle, kpobli Joël , Christelle Fatondji

Affiliation : Ministère de la Santé, Direction Départementale de la Santé des Collines, Bureau de Zone Savè-Ouèssè, Savè, Bénin

Introduction : La grossesse est une période de vulnérabilité nutritionnelle en raison de l'interdépendance de l'état nutritionnel du fœtus et de la mère. La dénutrition maternelle constitue un problème majeur, particulièrement dans les pays en développement où elle contribue également à la mortalité maternelle. L'objectif était d'étudier les facteurs associés aux connaissances et pratiques en matière d'alimentation au cours de la grossesse chez les gestantes de la zone sanitaire Savè-Ouèssè en 2023.

Méthodes : Nous avons mené une étude transversale descriptive et analytique sur 267 gestantes venues en consultation dans les centres de santé de la zone sanitaire Savè-Ouèssè en 2023. La variable dépendante était les connaissances et pratiques des gestantes sur l'alimentation au cours de la grossesse et les variables indépendantes étaient les variables sociodémographiques, socioculturelles et environnementales. Pour identifier les facteurs explicatifs des connaissances et pratiques, des tests de Chi-deux ont été utilisés pour identifier les facteurs associés avec un seuil de significativité fixé à 5%.

Résultats : La moyenne d'âge des gestantes était de 26,39 ans $\pm$ 5,79 ans. La catégorie socioprofessionnelle la plus représentée étaient les artisanes (30%) suivie par les commerçantes (28,1%). Le niveau de connaissance et de pratique des gestantes sur l'alimentation au cours de la grossesse était respectivement satisfaisant à 21,7% et 21,4%. Les facteurs associés à la connaissance des gestantes sur l'alimentation étaient le revenu mensuel du conjoint et la réception de conseils sur la nutrition ($p < 0,001$). Quant aux facteurs associés à la pratique, ils s'agissaient du niveau d'instruction, du revenu mensuel de la gestante, de la réception de conseils sur la nutrition et la sécurité alimentaire ($p < 0,0001$).

Conclusion : Il est indispensable de sensibiliser les gestantes sur l'importance de la qualité de l'alimentation au cours de la grossesse.

Mots-clés : Connaissances; Pratiques; Alimentation; Grossesse; Zone Sanitaire Savè-Ouèssè

COSC14	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Troubles mentaux et maladies cardiovasculaires en Afrique de Ouest : une étude communautaire dans le district de Yoto, Togo

Roméo Mèdèssè Togan^{1,2}, Damega Wenkourama³, Thibaut Gelle⁴, Mandjaréou Assih^{1,2}, Dismand Houinato⁵, Valentin Dassa⁶, Philippe Nubukpo⁷, Dieudonné Gnonlonfoun⁵, Didier Ekouevi^{1,2}

Affiliation : 1= Département de santé publique, Faculté des sciences de la santé, Université de Lomé , 2= Centre de Formation et de Recherche en Santé Publique (CFRSP), 3 = Département de Psychiatrie, Faculté des Sciences de la Santé, CHU Kara, Université de Kara, Kara, Togo , 4= Inserm U1094, IRD UMR270, Université de Limoges, CHU de Limoges, EpiMaCT - Épidémiologie des Maladies Chroniques en Milieu Tropical, Institut d'Épidémiologie et de Neurologie Tropicale, OmegaHealth, Limoges, France, 5= Laboratoire d'Épidémiologie des Maladies Chroniques et Neurologiques (LEMACEN), Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey Calavi, Bénin, 6= Clinique de Psychiatrie et de Psychologie Médicale du CHU Campus de Lomé, Université de Lomé, Togo , 7= Pôle de Psychiatrie Adulte, Psychiatrie Gériatrique et Addictologie, Centre Hospitalier Esquirol, Limoges, France

Introduction : En Afrique de l'Ouest, la charge croissante des troubles mentaux et des maladies cardiovasculaires (MCV) représente un défi majeur, surtout dans les zones rurales à faible couverture sanitaire. L'objectif de cette étude était d'estimer la prévalence conjointe des troubles mentaux et des MCV dans une communauté rurale du Togo, et d'explorer les implications pour la mise en œuvre de la santé communautaire.

Méthodes : Une étude transversale descriptive et analytique a été conduite d'avril à mai 2022 dans le district sanitaire de Yoto. Un échantillonnage probabiliste à plusieurs niveaux a permis de recruter 445 adultes, âgés d'au moins 18 ans, à raison d'un par ménage. Les troubles mentaux ont été évalués à l'aide du Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) basé sur le DSM-5. L'HTA, le diabète et l'obésité ont été mesurés selon l'approche STEP de l'OMS. L'association entre troubles mentaux et MCV a été explorée par régression logistique.

Résultats : L'âge moyen des participants était de $42,6 \pm 12,3$ ans, avec un sexe-ratio H/F de 0,72. La prévalence des troubles mentaux était de 35,7% (IC95%: 31,3 - 40,4), celle de l'HTA de 14,1%, du diabète de 9,4%, et de l'obésité de 14,8%. Les personnes présentant un trouble mental avaient un risque significativement accru de MCV, notamment d'HTA (OR = 2,34 ; IC95%: 1,22 - 4,50) et d'obésité (OR = 1,87 ; IC95%: 1,11 - 3,16). L'offre de soins communautaires était limitée, avec peu d'intégration entre les volets mental et cardiovasculaire.

Conclusion : Les résultats révèlent l'urgence de développer une prise en charge intégrée en santé communautaire, combinant dépistage précoce, prévention des MCV, et soins psychosociaux de proximité. Un renforcement des services, des compétences locales et de la coordination entre acteurs est indispensable pour réduire la morbi-mortalité liée aux comorbidités mentales et cardiovasculaires en milieu rural.

Mots-clés : Santé Communautaire; Troubles Mentaux; Maladies Cardiovasculaires; District de Yoto; Togo

COSC15	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Les représentations de la tuberculose au sud du Togo

Ate Safiou, Kombate Matiényendou, Kola Edinam, Dogo Mohammed Fall

Affiliation : Institut Régional d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel (IRES-RDEC), spécialité : Culture, Tourisme et Développement, Programme National de Lutte contre l'infection à VIH/Sida, les Hépatites Virales et les Infections Sexuellement Transmissibles (PNLS-HV-IST), Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique. 05BP :424, Lomé-Togo ; Département de Géographie, Faculté des Sciences de l'Homme et de la Société, Université de Lomé, 01BP 1515 Lomé 01, Lomé-Togo ; Consultant National de L'UNION pour la Tuberculose.

Résumé : La tuberculose est une maladie bactérienne très ancienne, teintée de représentations selon l'espace géographique et selon les cultures. L'objectif de cette étude est d'analyser les représentations de cette pathologie au sein de la population multiculturelle au sud du Togo. Il s'agit d'une étude qualitative basée sur un entretien individuel avec des tradithérapeutes, des patients tuberculeux et les acteurs chargés de la prise en charge des patients dans la région maritime. Il ressort de cette investigation que la tuberculose est appelée « Yomekpe » au sud du Togo. Littéralement cette appellation signifie la maladie qui conduit à la tombe. C'est aussi une maladie résultant d'un acte adultérin « Afodegbe ». Ces différentes représentations demeurent fortement ancrées dans les croyances collectives des populations profanes. Ces schèmes de perception influencent considérablement l'itinéraire thérapeutique des patients atteints de cette pathologie guérissable.

Mots-clés : Représentation; Construction Sociale; Tuberculose.

COSC16	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Connaissance des relais communautaires sur leurs rôles et responsabilités dans la qualité de l'eau, l'hygiène et l'assainissement

Parfait Wouékpé¹, Cyriaque Dégbey², Alphonse Kpozéhouen³

Affiliation : Ecole Doctorale des Sciences de la Santé, Faculté des Sciences de la Santé, Université, d'Abomey-Calavi

Introduction : L'accès à une eau potable de qualité, une bonne hygiène et un assainissement adéquat constitue un enjeu majeur de santé publique, particulièrement dans les pays en développement. Les relais communautaires (RC) jouent un rôle clé dans la promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Cette étude vise à étudier le niveau de connaissance des RC sur la qualité de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans la zone sanitaire Comè-Bopa-Grand Popo-Houéyogbé au Bénin.

Méthodes : Une étude transversale et analytique a été menée auprès de 160 relais communautaires sélectionnés par tirage aléatoire. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire structuré et analysées via SPSS 21.0. L'analyse a porté sur les caractéristiques sociodémographiques et professionnelles des RC, leur niveau de connaissance et les facteurs influençant ces connaissances.

Résultats : Les résultats indiquaient que 68,8 % des RC avaient une connaissance insuffisante de leurs rôles et responsabilités en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Les facteurs associés à un niveau de connaissance plus élevé incluaient l'ethnie ($p=0,029$), la situation matrimoniale ($p=0,030$), la formation sur le paquet d'activités ($p=0,002$), le suivi par un agent de santé communautaire qualifié ($p<0,001$) et la participation aux séances de suivi groupé ($p<0,001$). L'analyse multivariée montrait que les RC ayant participé à au moins deux séances de suivi groupé ont jusqu'à 23,9 fois plus de chances d'avoir une bonne connaissance.

Conclusion : Malgré leur rôle clé, une majorité de RC présente des lacunes importantes en matière de connaissances sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Le renforcement des formations, un suivi régulier et des incitations adaptées sont essentiels pour améliorer leur efficacité et garantir un meilleur impact des interventions de santé publique.

Mots-clés : Relais Communautaires; Qualité Eau; Hygiène; Assainissement

COSC17	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Connaissances, attitudes et pratiques des personnels de ménage sur les risques sanitaires liés à la manipulation de la viande crue

Traore Isidore Tiandiogo, Coulibaly Bintou, Sanou Soufiane, Traore Aïda Marietou , Taofiki Ajani Ousmane, Ouattara Cheick Ahmed, Millogo Adjara, Drabo Seydou, Camara Aissatou, Zoundi Ivette, Salissou Ahmed Mohamed Abdou, Hien Hervé , Meda Clément Ziemlé , Savadogo Léon Gueswende Blaise

Affiliation : Centre MURAZ, Université Nazi Boni

Introduction : La manipulation de la viande crue présente un risque significatif pour la santé, principalement en raison de la contamination bactérienne et des infections alimentaires. Cette étude visait à évaluer les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) des personnels de ménage sur les risques sanitaires liés à la manipulation de la viande crue ainsi que les facteurs associés aux mauvaises pratiques.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude mixte (quantitative et qualitative) menée dans les ménages de la ville de Bobo-Dioulasso en 2024. Pour le volet quantitatif, un questionnaire standardisé et une grille d'observation ont été utilisés. Une régression logistique a été utilisée pour identifier les facteurs associés aux mauvaises pratiques de manipulation de la viande crue. Pour le volet qualitatif, un guide d'entretien a été utilisé et une analyse thématique du contenu a été faite.

Résultats : Au total, 800 personnels de ménage ont participé à l'étude, 94,1% étaient des femmes. La médiane de l'âge était de 30 ans (IIQ [25-40]). La bonne connaissance de manipulation de la viande crue était de 50,5% et la bonne attitude était de 82,0%. Cependant 86,5% avaient de mauvaises pratiques de manipulation. Les facteurs associés aux mauvaises pratiques étaient le niveau d'éducation supérieur (ORa= 0,11 ; IC 95 % [0,05-0,25]), la mauvaise connaissance (ORa = 4,84 ; IC 95 % [2,65-9,48]) et la mauvaise attitude (ORa = 8,52 ; IC 95 % [2,53-53,3]).

Conclusion : Malgré un pourcentage élevé de bonne attitude, les mauvaises pratiques de manipulation de la viande crue restent très fréquentes dans les ménages de la ville de Bobo-Dioulasso. Un renforcement des connaissances à travers des campagnes de sensibilisation pourra aider à prévenir des maladies d'origine alimentaire.

Mots-clés : Manipulation; Viande; Hygiène; Ménage

COSC18	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Vivre avec la plaie incurable en milieux communautaires au Togo : résilience entre médecine traditionnelle et soins hospitaliers

Dotsu Yawo Mawufe

Affiliation : Université de Lomé / Département d'Anthropologie

Résumé : Si plusieurs désordres inhérents au corps physique de l'être humain relèvent des savoirs populaires ou mystiques et mobilisent des pratiques endogènes de réparation ou de prise en charge, d'autres, par contre, demeurent des réalités à multiples imaginations échappant à tout contrôle humain. Au sein des communautés togolaises, il existe des blessures corporelles qui, malgré les efforts de la société, finissent par dépasser les limites de ce que celle-ci peut contrôler. Etiquetées plaies incurables, ces blessures suscitent des interrogations et constituent un sujet de préoccupation majeur pour les communautés. Elles représentent un défi majeur pour les patients et les systèmes de santé, qu'il s'agisse de la médecine traditionnelle ou des pratiques sanitaires modernes et constituent le sujet de réflexion à l'origine de cet article. Cet article explore la manière dont les communautés togolaises font face aux plaies incurables, en mettant en lumière l'interaction entre la médecine traditionnelle et les soins hospitaliers. Il s'agit d'une recherche à caractère anthropologique menée au sein de trois communautés togolaises, à partir d'entretiens et d'observations. Les résultats de la recherche montrent que les connaissances locales sur les plaies incurables s'inscrivent dans plusieurs registres dont la sorcellerie, les interprétations socio-culturelles et les systèmes de prise en charge mythico-religieuse d'une part et moderne d'autre part. Bref, il s'agit d'un ensemble de pratiques qui exposent une conduite de résilience sociale. La recherche souligne donc l'importance de comprendre les dynamiques culturelles et sociales pour améliorer la prise en charge de ces plaies en milieu communautaire. Elle plaide également en faveur d'une approche intégrée qui combine les avantages de la médecine traditionnelle et des soins hospitaliers, tout en respectant les croyances et les pratiques locales, et en assurant des soins de qualité.

Mots-clés : Plaies Incurables; Communautés; Résilience; Médecine Traditionnelle; Soins Hospitaliers

COSC19	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Mise en œuvre de la santé bucco-dentaire : revue de la littérature pour une approche intégrée

Traore Mamadi¹, Meless Guanga David¹, Datte Atta Sebastien¹, Sangare Abou Dramane¹, Guinan Jean-claude¹, Samba Mamadou¹, Sackou-kouakou Julie², Oga Agbaya Serge², Kouadio Luc²

Affiliation : 1= Université F2lix Houphouët Boigny Abidjan Côte d'Ivoire, Département de Croissance, Développement, Santé Publique, 2= UFROS Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire. Département de Sciences Analytiques et Santé Publique, UFRSPB Université Félix Houphouët Boigny, ABIDJAN, Côte d'Ivoire.

Introduction : La pratique des soins de santé bucco-dentaire dans le parcours de santé des populations, dans une approche intégrée, est utilisable pour améliorer l'accès aux soins des patients. Cependant, les informations relatives à cette intégration et les modèles utilisés sont peu connues. L'objectif de cette étude était de recenser des points clés de la littérature sur l'intégration des soins de santé bucco-dentaire dans les systèmes de soins de santé.

Méthodes : Avec la méthode PRISMA, une revue bibliographique de la littérature a été faite dans les bases de données et les moteurs de recherche. Une exploitation des données a été faite avec le tri dans un premier temps, puis la synthèse des différents thèmes a permis de ressortir les points clés suivants sur l'intégration.

Résultats : 95 documents recensés pour 47 retenus après lecture du texte intégral. L'intégration d'une prise en charge bucco-dentaires dans les soins généraux est abordée dans 25,3% des documents concernant les PVD dont 11,4% pour l'Afrique subsaharienne. Quatre points clés sur l'intégration identifiés (amélioration de l'accès et de la coordination, modèles de soins intégrés, formation et littératie en santé bucco-dentaire, défis et solutions) et reliés à six thématiques des soins de santé primaires bucco-dentaires (Type de personnel de santé, Systèmes de santé, Programme d'enseignement dentaire, Services de soins de santé générale, Déterminants des SBD et gestion des besoins, Communautés rurales, éloignées, desservies, ou vulnérables). La santé bucco-dentaire pour tous objectif essentiel implique une approche intégrée prenant en compte les différents aspects de l'intégration disponibles afin d'en évaluer les contenus. Bien que peu abordés en Afrique subsaharienne, l'objectif pour tout système de santé serait d'adopter une démarche de recherche et d'intégration.

Conclusion : Une telle approche intégrée des soins de santé surtout bucco-dentaire fait référence au soins de santé primaire.

Mots-clés : Santé bucco-dentaire; Approche intégrée; Revue de la littérature; Soins de santé primaire.

COSC20	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Projet santé engagement communautaire en Côte d'Ivoire : santé bucco-dentaire dans un cadre de consultation pluridisciplinaire

Traore Mamadi¹, Meless Guanga David¹, Datte Atta Sebastien¹, Sangare Abou Dramane¹, Guinan Jean-claude¹, Samba Mamadou¹, Sackou-kouakou Julie², Oga Agbaya Serge², Kouadio Luc²

Affiliation : 1= Université Felix Houphouet Boigny Abidjan Cote D'ivoire, Département de Croissance, Développement, Santé Publique, 2= UFROS Université Félix Houphouët Boigny, ABIDJAN, Côte d'Ivoire. Département de Sciences Analytiques et Santé Publique, UFRSPB Université Félix Houphouët Boigny, ABIDJAN, Côte d'Ivoire.

Introduction : La prise en charge bucco-dentaire en milieu rural met en relief de nombreux défis pouvant nécessiter la combinaisons de plusieurs initiatives. Parmi lesquelles, le projet Santé Engagement Communautaire (SEC) inscrit dans le cadre d'une recherche action suscite mobilisation et participation communautaire pour resoudre les problèmes socio-sanitaire. L'objectif était de montrer l'intégration des activités médicales dans l'évaluation de l'état bucco-dentaire des populations lors de consultation médicale foraine.

Méthodes : Une étude observationnelle de type transversal, à visée descriptive en milieu rural dans le district sanitaire de Tiapoum (Sud-Est Côte d'Ivoire) dans deux villages fut réalisée. L'exploitation des données a permis d'estimer des paramètres statistiques (pourcentage, moyenne, médiane) pour les variables analysées (caractéristiques socio-démographiques, hygiène bucco-dentaire, examen bucco-dentaire, maladie générale, examens biologiques) afin de résumer les différentes observations.

Résultats : Un cadre pluridisciplinaire de consultations (Médecine, Pharmacie, Odonto-Stomatologie) utilisé pour atteindre des objectifs communs. Le volet bucco-dentaire offrait une opportunité pour les communautés de connaître leur état de santé (90,91 % consultants) avec la carie pathologie la plus importante (56,9%). Les cas de fièvre simple/paludisme ont été notifiés et des examens biologiques réalisés tel la goutte épaisse + frottis sanguin (88,9%). Une équipe pluridisciplinaire pour la prise en charge des communautés. En Côte d'Ivoire, les campagnes bucco-dentaires, rarement associées aux consultations médicales foraines, ont été pour la plupart réalisées en milieu urbain. Pourtant, la carie en milieu rural représente un défi majeur en raison de l'accès limité aux soins dentaires et de la sensibilisation insuffisante à l'hygiène bucco-dentaire.

Conclusion : La démarche utilisé par le projet SEC amène les professionnels de la santé à travailler ensemble de manière collaborative. En intégrant la santé bucco-dentaire dans le cadre général de la santé, l'on améliore la coordination des soins et assure une prise en charge plus complète des personnes.

Mots-clés : Soins Promotionnels; Santé Bucco-Dentaire; Santé Communautaire; Consultation Pluridisciplinaire

COSC21	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Évaluation de l'effet des applications mobiles de santé sexuelle et reproductive sur le comportement sexuel à risque des étudiants de 15 à 24 ans à l'Université de Parakou en 2023

Charles P. Makoutode, Vignon D. Bedie, Murielle P.t. Sekloka ; Francis Tognon-tchegnonsi

Affiliation : Institut Régional de Santé Publique

Introduction : Malgré l'émergence de services de e-santé, les comportements et attitudes sexuelles à risque demeurent un défi majeur de santé publique pour une grande partie de la jeunesse béninoise. La présente étude s'est intéressée à évaluer le réel effet des applications mobiles de SSR sur les comportements sexuels et reproductifs des étudiants de l'Université de Parakou.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale avec une approche analytique déployée durant la période d'Août à Octobre 2023. L'échantillon est constitué de 384 adolescent-es et des jeunes de 15 à 24ans de l'Université de Parakou, sélectionnés selon un sondage aléatoire stratifié à deux degrés, et permet d'assurer une représentativité de toutes les entités de formation. La réalisation de tests statistiques et l'utilisation de la régression logistique multinomiale a permis de déterminer les facteurs associés à l'utilisation des applications mobiles de SSR à l'Université de Parakou.

Résultats : La population d'étude est constituée d'un échantillon représentatif de 190 étudiants (49,48%) et 194 étudiantes (50,52%), tous âgés de 18 à 24 ans. Le sex-ratio H/F était de 0,98 et l'âge moyen était de 20,52ans $\pm$ 2,06. En matière de santé sexuelle et reproductive, d'une part, 38,95% des étudiants et 54,12% des étudiantes avait une bonne connaissance ; et d'autre part, 4,74% des hommes et 6,19% des femmes ont de bonnes pratiques. Quant aux applications mobiles de SSR, la prévalence d'utilisation était de 53,61% chez les femmes, soit 2,83 fois (IC95%=[3.12 ; 7.83]) plus que les hommes dont la prévalence d'utilisation est de 18,95%. L'accès à ces applications numériques était corrélé à l'évolution de la connaissance des jeunes sur la sexualité car elles augmentent de 2,05 (IC95%=[1.69 ; 4.21]) fois les chances des jeunes d'acquérir une meilleure connaissance sur la santé sexuelle et la reproduction.

Conclusion : Cette étude met en évidence le réel impact de l'utilisation des applications mobiles de e-santé sur les niveaux de connaissance des étudiants en matière de santé sexuelle et reproductive au Bénin. La durabilité de cet impact tient au renforcement des interfaces d'interaction entre les utilisateurs et les professionnels ou coachs de SSR ; et à la mise en place des contenus qui amènent vraiment les utilisateurs à adopter des comportements sains.

Mots-clés : : Applications Mobiles De E-Santé, Ssr, Adolescents, Jeunes, Parakou

COSC22	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Mobilisation des acteurs communautaires et adolescents pour encourager la participation aux essais cliniques sur la tuberculose : Expérience du Gabon

Bayodé Roméo Adegbite^{1,2,3}, Fabrice Mbaïdiguim¹, Andréa Rosine Oméra Obele Ndong¹, Jean Ronald Edoa¹, Pacome Achimi¹, Jean Claude Dejon-Agobe^{1,2}, Jeannot Fréjus Zinsou^{1,2}, Yabo Josiane Honkpehedji^{1,4}, Christian Chassem Lapue¹, Martin M Grobusch^{1,2,3}, Ayola Akim Adegnika^{1,3,4,5}

Affiliation : 1= Centre de Recherches Médicales de Lambaréné (CERMEL), Lambaréné, Gabon; 2= Institut für Tropenmedizin, Eberhad Karls Universität Tübingen, partner site Tübingen, Germany 3= Center of Tropical Medicine and Travel Medicine, Department of Infectious Diseases, Division of Internal Medicine, Amsterdam University Medical Centers, location AMC, University of Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands. 4= Department of Parasitology, Leiden University Medical Center, Leiden, the Netherlands 5= German Center for Infection Research (DZIF), Tübingen, Germany

Introduction : L'engagement communautaire est essentiel au succès des essais cliniques. Pour remédier à cela, nous avons mené une étude visant à évaluer les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) liées aux essais cliniques parmi les dirigeants locaux et les adolescents.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale mixte quantitative et qualitative réalisé en Novembre 2024 . Cette étude a été conduite en deux phases. La phase enquête et la phase interventionnelle. Les participants ont été sélectionnés de façon ciblée parmi les leaders locaux et les collégiens à Lambaréné, (Gabon). L'enquête a évalué la connaissance, les perceptions et les obstacles à la participation aux essais cliniques sur la tuberculose(enquête). Sur la base des résultats un programme de sensibilisation communautaire a été conçu pour lutter contre les idées fausses et promouvoir les avantages de la participation à la recherche clinique (phase interventionnelle).

Résultats : Parmi les 80 participants, seuls 31,3 % avaient une connaissance préalable des essais cliniques et 60% et 75 % ont exprimé des inquiétudes concernant la sécurité et les considérations éthiques. Plus de la moitié (58%) ont une connaissance moyenne des symptômes de la tuberculose ;80% et 75% ont une bonne attitude et pratique vis-à-vis de la tuberculose (prévention et traitement). Le renforcement de la confiance, la communication transparente et l'implication de la communauté comme ont été identifié comme facteurs essentiels pour encourager la participation.

Conclusion : L'implication des dirigeants locaux et des étudiants en tant que parties prenantes clés est une stratégie puissante pour favoriser la confiance et encourager la participation aux essais cliniques. Les résultats soulignent l'importance de combler les lacunes en matière de connaissances et les préoccupations éthiques par le biais d'approches culturellement sensibles et axées sur la communauté.

Mots-clés : Tuberculose-Essai Clinique- Engagement Communautaire

COSC25	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Evaluation de la contribution de la distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée (MIILD) par le canal scolaire pour le maintien d'un meilleur accès au Bénin

Aikpon Rock, Dandonougbo Codjo, Dossou Murielle, Gnanguenon Virgile, Oloukoi Raoul, Aissan Julien, Lokossou Antoine, Fassinou Hector, Aimihoue Odile, Satondji Joseph, Padonou Gil, Akogbeto Martin

Affiliation : 1= Université des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM); 2= Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)

Introduction : La distribution continue de moustiquaires imprégnées d'insecticide dans les écoles a été reconnue comme une approche efficace pour atteindre et maintenir une couverture universelle en moustiquaires après les campagnes de masse. En 2024, la distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide et l'éducation à la prévention du paludisme dans les écoles ont été pilotées avec succès dans trois zones de santé à forte endémie palustre au Bénin, un an après la campagne de masse. L'objectif de cette étude était d'évaluer la contribution de la distribution de moustiquaires en milieu scolaire au maintien de la couverture universelle.

Méthodes : Les moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action et l'éducation sanitaire sur les avantages des moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action ont été fournies aux enfants inscrits en 1ère et 6ème année (n=67650) dans 780 écoles primaires publiques dans les zones de santé de Djougou-Copargo-Ouaké (DCO), Kandi-Gogounou-Ségbana (KGS) et Malanville-Karimama (MK). La disponibilité des moustiquaires a été évaluée avant et après la distribution par le biais d'une enquête auprès de 900 ménages à raison de 300 par zone de santé.

Résultats : Le nombre de ménages disposant d'au moins une moustiquaire pour deux personnes est passé de 40% avant la distribution à 70% après la distribution. 601 bénéficiaires (66,77%) utilisent les moustiquaires reçues à l'école. Malgré la distribution à l'école, environ 9% des membres des ménages dormaient encore sans moustiquaire.

Conclusion : La distribution de moustiquaire à travers le canal scolaire s'est avérée être une approche efficace pour maintenir une couverture élevée au Bénin et a augmenté la disponibilité de moustiquaire dans les ménages des zones de santé d'intervention. Cette stratégie devrait être intégrée dans les stratégies nationales de contrôle du paludisme.

Mots-clés : Distribution Scolaire ; MIILD

COSC26	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Connaissances, attitudes et pratiques des femmes enceintes vis-à-vis du paludisme

Mr Mohamed Arbahim¹, Dr Mouhamadou Faly Ba², Dr Amadou I Diallo³, Dr Ali Abdoukader Adou⁴, Dr Madina Ali Mohamed⁵, Pr Adama Faye⁶

Affiliation : 1= CHU de DJIBOUTI, 2= Université Cheikh Anta-Diop, 3= Université Cheikh Anta-Diop, 4= OMS DJIBOUTI, 5= CHU de DJIBOUTI, 6= Université Cheikh Anta-Diop

Introduction : Le paludisme est un problème majeur de santé publique dans de nombreux pays en développement et en particulier en Afrique. Les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables à cette maladie. Par conséquent, il est important de comprendre leurs connaissances, attitudes et pratiques vis-à-vis du paludisme pour mieux orienter les programmes de prévention et de contrôle de la maladie. L'objectif général était d'évaluer les connaissances, les attitudes et les pratiques en matière du paludisme chez les femmes enceintes se rendant en consultation prénatale dans six polycliniques de Djibouti-ville en février 2023. En outre, l'étude visait à identifier les facteurs associés aux CAP des femmes enceintes.

Méthodes: Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive et analytique menée dans plusieurs polycliniques de Djibouti. Les données étaient collectées du 1er Février au 14 Février 2023. Un recrutement exhaustif a été fait et la taille d'échantillon finale était de 405 femmes enceintes. Pour l'analyse des données, nous avons utilisé le logiciel R, permettant de réaliser des analyses descriptives, bivariées et multivariées.

Résultats : Les femmes enceintes avaient une bonne connaissance, une attitude positive et une bonne pratique concernant le paludisme respectivement dans 38,5%, 53,3% et 54,8% de l'étude. Les résultats de l'analyse multivariée ont montré que les femmes enceintes âgées de plus de 26 ans étaient plus susceptibles d'avoir une bonne connaissance (OR ajusté = 5,64 ; IC 95 % [2,55-13,0]) et une bonne pratique (OR ajusté = 1,68 ; IC 95 % [1,07-2,65] ; P = 0,026) concernant le paludisme. Les femmes enceintes habitant au centre-ville (OR ajusté = 2,23 IC95% [1,37-3,66], P=0.001) et instruites (OR ajusté = 1,81 IC [1,05-3,16], P=0.034) étaient plus susceptibles d'avoir une bonne connaissance. Les femmes ayant un emploi étaient 2,80 fois plus susceptibles d'adopter une attitude positive (OR ajusté = 2,80 ; IC 95 % [1,68-4,75] ; P < 0,001). Une attitude positive envers les mesures préventives (OR ajusté = 1,74 ; IC 95 % [1,11-2,66] ; P = 0,016) et un revenu mensuel supérieur à 40 000 FD (OR ajusté = 1,76 ; IC 95 % [1,12-2,71] ; P = 0,014) étaient associés à une plus grande probabilité d'avoir une bonne pratique de prévention. Enfin, les antécédents de paludisme augmentaient également la probabilité d'avoir une bonne pratique (OR ajusté = 1,90 ; IC 95 % [1,12-3,29] ; P = 0,019).

Conclusion : Les résultats de cette étude montrent que les femmes enceintes ont un niveau de connaissance relativement faible, mais une attitude et pratique moyennement positive en matière de paludisme. Cependant, des efforts supplémentaires de sensibilisation sont nécessaires pour améliorer les connaissances et les pratiques des femmes enceintes, en particulier chez les femmes plus jeunes, moins instruites et celles vivant en dehors du centre-ville. Une étude qualitative complémentaire permettrait d'approfondir ces résultats.

Mots-clés : Paludisme ; Femme Enceinte ; CAP ; Djibouti.

COSC27	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	---

Evaluation de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de 6 à 59 mois

Metonnou Clémence Germaine¹, Azandjè Colette Sylvie¹, Soussia Théodore², Affo Hilary, Sossa Charles¹, AGUEH Victoire¹

Affiliation : 1-Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred QUENUM, département de Promotion de la Santé, Université d'Abomey Calavi 2- Institut National Médico-Sanitaire (INMeS), Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

Introduction : La malnutrition aiguë sévère contribue de manière significative à l'accroissement de la mortalité chez les enfants de 6-59 mois. L'objectif de l'étude était d'évaluer la mise en œuvre du dépistage et de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de 6 à 59 mois dans le Centre Hospitalier Universitaire Abomey-Calavi So-Ava (CHU-AS) en 2024.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale évaluative, ayant porté sur quatre agents de santé dont deux (02) infirmiers diplômés d'état/nutritionnistes, une (01) nutritionniste et une (01) aide-soignante et sur 33 mères d'enfants malnutris. L'appréciation de la mise en œuvre du dépistage et de prise en charge des enfants sévèrement malnutris dans le CHUZ/AS s'est faite avec les composantes "intrants" "processus" et "résultats" conformément à l'échelle de Varkevisser.

Résultats : Au total 33 mères d'enfants ont été enquêtées avec un âge médian de 27 ans et un intervalle interquartile égal à 5 et quatre (04) agents de santé. La composante « intrants » a obtenu un score de 29/43 soit 67.44% et a donc été jugée moyenne. De même, la composante « processus » a obtenu un score de 21/30 soit 70% et a été jugée moyenne. La mise en œuvre du dépistage et de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans CHUZ-AS a obtenu un score 83/110 soit 75,45% et a donc été jugée « Moyenne ».

Conclusion : Le dépistage et la prise en charge de la malnutrition sont extrêmement importants pour éviter la morbidité due à la malnutrition. Il a été relevé un fort taux d'abandon des mères d'enfants au cours de la prise en charge. Des interventions sont nécessaires pour réduire ce taux et permettre un bon suivi des enfants.

Mots-clés : Malnutrition aiguë sévère, enfants de 6 à 59 mois, CHUZ-AS

COSC28

Type de communication : Communication orale

Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique

Alimentation des élèves adolescents des classes sportives de la commune de Gogounou en 2023

Kiki Djivoh Sidonie Mahougnon, Tonon Brigitte Affidéhomé, Azandjeme Colette, Bio Nigan Issiako, Hounhouigan Djidjoho Joseph.

Introduction : Les élèves des classes sportives représentent le vivier du sport béninois. En tant qu'adolescents, leurs besoins nutritionnels sont élevés, nécessitant une alimentation équilibrée adaptée à leurs exigences physiques accrues, notamment en raison des quatre heures hebdomadaires de pratique intensive en dehors de l'EPS. Cependant, aucune stratégie nutritionnelle n'est mise en place pour répondre à ces besoins spécifiques. Cette étude vise à évaluer l'équilibre alimentaire des élèves des classes sportives de la commune de Gogounou

Méthodes : Les données ont été collectées par la méthode du rappel de 72 heures et la technique du choix exhaustif. L'analyse statistique a été réalisée avec le logiciel IBM SPSS (version 21.0).

Résultats : Les résultats ont révélé un déséquilibre alimentaire significatif parmi les élèves, avec l'absence quasi totale de produits laitiers (98,9 %) et de fruits (92,7 %). De plus, une majorité d'entre eux ne consomme pas trois repas principaux par jour. Ce profil alimentaire est similaire à celui des élèves ne pratiquant que l'EPS

Conclusion : Ces résultats soulignent l'importance d'un accompagnement nutritionnel pour optimiser la croissance et les performances sportives des élèves des classes sportives. Le ministère des Sports devrait envisager des mesures appropriées.

Mots clés : nutrition, adolescents, classes sportives, Bénin.

**Sous-thématique:
La pratique de la
santé publique
en milieu
hospitalier**

COPH01	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
---------------	--

Etude des aspects cliniques et économiques des patients suivis au Sénégal

Diop Cheikh Tacko, Fall Bineta, Gueye Boubacar, Bop Martial Coly

Affiliation : Université Alioune Diop Bambey

Résumé : Le diabète sucré est une hyperglycémie chronique au coût humain et social énorme. L'objectif général était d'évaluer les aspects cliniques et économiques des patients suivis au Centre Hospitalier National Matlaboul Fawzayni de Touba (CHNMFT). Il s'agissait d'une étude transversale, prospective, descriptive et analytique. Elle a concerné l'ensemble des patients consentants hospitalisés à l'hôpital de Touba du 01 Janvier au 31 Décembre 2022. Un questionnaire a été administré directement aux patients. Les données ont été saisies sur Excel et analysées sur le logiciel SPSS Parmi les 653 patients diabétiques vus en consultation, 84 ont été hospitalisés et inclus. Il y avait une prédominance féminine avec un sex-ratio de 0,91. La moyenne d'âge était de $53,2 \pm 17,83$ ans. Le diabète de type 2 représentait 94% des cas. Le syndrome polyurie-polydipsique et la découverte fortuite représentaient les principaux modes de découverte avec respectivement 38,10% et 35,71%. La majorité des patients était sous MHD + ADO + Insuline soit 66,67%. L'acidocétose était la complication aigue la plus fréquente (89,16%). Les complications chroniques les plus fréquentes étaient celles cardiovasculaires et rénales avec respectivement 30,95 % et 21,43%. Parmi les patients qui travaillaient 33,33% faisaient des absences répétées au travail pour cause de maladie ou de visite médicale. On retrouvait des dépenses de santé catastrophiques chez les patients à revenus faibles et moyens. Le coût moyen de l'hospitalisation pour le diabète de type 1 était de 19.088 frs CFA contre 23.681 frs CFA pour le diabète de type 2. Cette différence de moyenne était statistiquement significative avec une p-value à 0,04 (<0,05). Le diabète reste un lourd fardeau économique. Le renforcement des mesures de prévention de cette maladie et la promotion de la couverture sanitaire universelle contribueront à réduire les dépenses supportées par les ménages.

Mots-clés : Coût; Prise En Charge; Diabète; Sénégal

COPH02	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
---------------	--

Satisfaction des « privilégiés de l'état » vis-à-vis de l'assurance maladie : cas de la commune d'Abomey-Calavi, Bénin, 2024

Damien B. Georgia, Aholou G. Prudencia, Mededji Damien

Affiliation : CEFORP / UAC

Introduction : l'évaluation d'une intervention en santé et son amélioration au fil du temps nécessite la mesure régulière de l'état de satisfaction des bénéficiaires. Cette étude avait pour objectif d'évaluer le niveau de satisfaction des « privilégiés de l'état » vis-à-vis de l'Assurance Maladie (AM).

Méthodes : Il s'agissait d'une enquête transversale. La collecte de données a eu lieu entre juin et septembre 2024 dans cinq centres de santé de la commune d'Abomey-Calavi. La population cible était 162 « privilégiés de l'état » résidant dans les arrondissements choisis et bénéficiant de l'assurance maladie. Un échantillonnage aléatoire simple a été utilisé. Les données ont été collectées via des questionnaires administrés en face-à-face puis analysés à l'aide des logiciels Kobotoolbox, StataMP 16, Excel et ArcGIS 10.8.

Résultats : Sur les 158 participants inclus, 65,19 % étaient des femmes. L'âge moyen était de 44,94 ans et 50,63 % souffraient d'une maladie chronique. Le taux de satisfaction globale vis-à-vis de l'AM était de 36,78 %. L'accueil était « bon ou très bon » chez 27,57 %. Le délai d'attente était perçu comme long ou peu long chez 27,85 % des enquêtés. La qualité des soins était perçue comme « bonne ou très bonne » par 39,24 % des enquêtés. Le traitement reçu était perçu comme « efficace ou très efficace » par 14,80% des enquêtés. La satisfaction concernant la disponibilité des médicaments « souvent ou toujours » était de 64,56 % et celle concernant les prestataires était de 46,70%.

Conclusion : la satisfaction des privilégiés de l'état par l'assurance maladie développée par le projet ARCH reste faible. L'accueil, le délai d'attente, la qualité des soins et l'efficacité des soins prodigués restent à améliorer.

Mots-clés : Assurance maladie, satisfaction, privilégiés de l'état, commune d'Abomey-Calavi, ARCH, Bénin

COPH03	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
---------------	--

Analyse des capacités des formations sanitaires du premier échelon pour la prise en charge du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans dans les districts sanitaires

Traore Isidore Tiandiogo, Camara Aissatou , Traore Marietou Aïda , Drabo Seydou , Tassembedo Souleymane , Taofiki Ajani Ousmane, Salissou Ahmed Mohamed Abdou, Coulibaly Bintou, Zoundi Ivette , Ouattara Cheick Ahmed, Meda Ziemlé Clément, Savadogo Léon Blaise Gueswende

Affiliation : Centre MURAZ ; Université Nazi Boni,

Introduction : Au Burkina Faso, la létalité du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans reste élevée. Une évaluation de la capacité opérationnelle des services de santé et de la qualité des soins pourrait être utiles dans la prise de décision pour la réduction de ce fardeau du paludisme.

Méthodes : De juin à septembre 2024, une enquête transversale a été réalisée dans 60 formations Sanitaires du premier échelon à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Les données ont été recueillies sur les caractéristiques de ces formations sanitaires, la disponibilité des services, la capacité opérationnelle et la qualité des soins. Le formulaire de l'évaluation harmonisée des établissements de santé (HHFA) de l'Organisation Mondiale de la Santé a été adapté au contexte du Burkina Faso et utilisé pour la collecte des données. Des critères d'appréciation des scores ont été utilisés (score < 50% = faible ; score entre 50 et 80% = modéré ; et score > 80% = bon).

Résultats : Sur les 60 formations sanitaires du premier échelon, 58 offraient des services de prise en charge du paludisme aux enfants de moins de 5 ans. Parmi elles 31 étaient publiques et 27 privées. Les équipements de base avaient un score faible (49,70%, IC 95% [32,90-70,11]). L'existence des mesures standards de prévention des infections et celle des médicaments essentiels avaient des scores modérés, respectivement 58,91% (IC 95% [28,59-83,50]) et 59,05% (IC 95% [25,89-89,76]). Le score des capacités diagnostiques était modéré (50,86 %, IC95 % [37,99 - 63,73]) et 8,62% des formations sanitaires ne disposaient d'aucune capacité diagnostique. L'indice de qualité était de 69,83% (IC 95 % [49,94-92,99]).

Conclusion : l'enquête a révélé de nombreuses insuffisances en matière de capacité opérationnelle des services et de la qualité des soins qui doivent être corrigées pour réduire le fardeau du paludisme

Mots-clés : Capacité, Qualité, Soins, Paludisme, Enfants

COPH04	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

L'application de l'éthique du care pour des soins de qualité en milieu hospitalier

Ekpinsou Cica Isabelle

Affiliation : Université d'Abomey-Calavi (UAC/ FASHS) ; Département de Philosophie

Introduction : Selon l'OMS, le meilleur état de santé qu'un être humain puisse atteindre constitue l'un de ses droits fondamentaux. Ceci implique l'existence de services de santé, avec des conditions de travail sûres et saines et des professionnels de santé compétents et compatissants.

Question de recherche : Pourquoi et comment faire pour améliorer la pratique médicale en vue des soins de qualité au Bénin? Notre question de recherche porte sur des constats faits dans les formations sanitaires et qui remettent en cause le bon fonctionnement du système et surtout la qualité des soins qui y sont donnés.

Objectif : Cette étude voudrait montrer que la plupart des problèmes liés à la pratique de la santé publique en milieu hospitalier sont en partie dus à l'absence de la déontologie et de l'éthique dans l'exercice de la profession médicale.

Méthodes : Pour endiguer ce phénomène dans certaines formations médicales, notre approche est constructive et empirique. Elle combine (triangulation) plusieurs approches scientifiques particulières : sociologique, anthropologique et épidémiologique avec une enquête (quantitative) de terrain. Cette étude comporte deux moments : (1) L'État des lieux de l'éthique médicale déontologique au Bénin ; (2) L'Éthique du care entre l'éthique médicale et l'éthique déontologique.

Résultats : L'évaluation de la qualité des soins au Bénin et l'examen des fondamentaux de l'éthique médicale et du care confirment nos hypothèses sur : (1) le Déficit des principes fondamentaux de la pratique médicale ; (2) l'Absence de qualité dans la grande majorité des centres de santé au Bénin ; (3) les Réponses au pourquoi et au comment d'une éthique médicale nouvelle, concrète et pratique.

Conclusion : Il y a une nécessité impérieuse d'application de l'éthique du care et de la déontologie dans la pratique médicale.

Mots-clés : éthique du care; déontologie; qualité des soins; pratiques médicales; principes éthiques

COPH05	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Pratiques d'antibioprophylaxie chirurgicale : Etude observationnelle prospective dans un hôpital tertiaire au Niger

Tapha Ounoussa^{1,2}, Degbey Cyriaque Comlan^{1,3}, Yacouba Abdourahamane^{2,4}, Hamidou Saley Balkissa², Sabo Ramatou⁵, Niandou Mahamadou⁵, Ali Ada Mahamoud Omid^{4,6}, Alkassoum Salifou Ibrahim⁴, Brah Souleymane⁴, Doutchi Mahamadou^{7,8}, Harissou Adamou^{7,9}, Mamadou Saidou^{2,4}, Hinson Antoine Vikkey¹⁰

Affiliation : 1= Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRSP), Ouidah, Benin. 2= Laboratoire National de Référence sur la Résistance aux Anti-Microbiens, Niamey, Niger. 3= Clinique Universitaire d'Hygiène Hospitalière – CNHU Hubert Koutoukou Maga, Cotonou, Benin. 4= Faculté des Sciences de la Santé - Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger. 5= Service d'Anesthésie et de Réanimation - Hôpital National Amirou Boubacar Diallo, Niamey, Niger. 6= Service de Chirurgie Pédiatrique - Hôpital National Amirou Boubacar Diallo, Niamey, Niger. 7= Faculté des Sciences de la Santé - Université André Salifou, Zinder, Niger. 8= Service des Maladies Infectieuses - Hôpital National de Zinder, Zinder, Niger. 9= Service de Chirurgie - Hôpital National de Zinder, Zinder, Niger. 10= Unité de Recherches et d'Enseignement en Santé au Travail et Environnement – UAC, Cotonou, Benin.

Introduction : L'antibioprophylaxie chirurgicale (ATBP) joue un rôle majeur dans la prévention et la réduction du risque d'infection du site opératoire. Pour garantir la qualité de l'antibioprophylaxie chirurgicale, les pratiques de prescription doivent être évaluées. Cette étude visait à déterminer la conformité des pratiques d'ATBP dans un hôpital de niveau tertiaire au Niger et à identifier les facteurs associés à la non-conformité.

Méthodes : Une étude observationnelle prospective en milieu hospitalier a été réalisée. Un formulaire de collecte de données a été conçu pour recueillir des informations clés, notamment l'âge et le sexe des patients, le type et la durée de l'intervention chirurgicale, le choix et la durée de l'ATBP. La conformité de l'ATBP a été évaluée sur la base des lignes directrices de la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation (SFAR) pour le choix de la molécule, le moment de l'administration, la dose et la durée de l'ATBP. L'ATBP a été définie comme appropriée lorsque tous les éléments étaient conformes.

Résultats : Au total, 307 patients étaient inclus. Les interventions chirurgicales les plus fréquentes étaient gastro-intestinales et urologiques. La conformité globale de l'ATBP était nulle. L'indication de l'ATBP (57,3 %), choix du bon médicament (3,4 %), bon moment (78,8 %), bonne dose (93,6 %) et bonne durée (0,0 %). L'antibiotique le plus prescrit était la ceftriaxone (n=272/307, 88,6%), suivi de ceftriaxone/métronidazole (n=18/307, 5,9%). La durée moyenne des interventions était de 67,7 minutes $\pm$ 45,2. La durée d'hospitalisation préopératoire supérieure à 48 heures (p=0,008) était un facteur prédictif d'ATBP non conforme.

Conclusion : Cette étude révèle un faible taux d'observance de l'ATBP dans notre hôpital principalement en raison d'une prescription plus longue. Ces résultats démontrent la nécessité de mettre en place des mesures d'amélioration de la qualité, telles que la formation du personnel sur le respect des directives, associée à un audit clinique et à des mises à jour régulières pour lutter contre la prescription inappropriée et l'augmentation des taux de résistance.

Mots-clés : Chirurgie ; Antibiotiques ; Prophylaxie ; Conformité ; Niger

COPH06	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
---------------	--

Surveillance des infections du site opératoire à l'hôpital de zone de Dassa en 2024

Yamadjako Chiskaren Deneuve Sènam¹, Agbadebo Mouhamed¹, Tawo Estelle¹, Sènou Olga¹, Houessouvo Marcel¹, Kousseu Anselme¹, Bohounton François¹, Degan Charlemagne², Dossou Mathieu³, Tokpanoude Ignace³, Biaou Chabi Alphonse⁴

Affiliation : 1= Hôpital de Zone Dassa-Glazoué, Zone Sanitaire Dassa-Glazoué, Dassa, Bénin ; 2=Cabinet Hygiène Hospitalière et Communautaire Prestations (H2CP), Bénin ; 3= Medecin sans vacances, Région Afrique de l'Ouest, Parakou, Bénin ; 4= Service de santé publique et de la riposte, Direction départementale de la santé des collines, Dassa, Bénin

Introduction : Les infections du site opératoire (ISO) représentent une complication majeure dans le domaine chirurgical peut documenter au Bénin. Leur surveillance est essentielle pour identifier les tendances, évaluer les pratiques de prévention et de contrôle des infections, et mettre en place des interventions appropriées pour réduire leur incidence. L'objectif de l'étude est d'étudier les facteurs associés aux infections du site opératoire à l'hôpital de zone de Dassa en 2024.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive et analytique réalisé sur la période du 1er Mars au 30 Juin 2024 à partir de la base de données du sous-système de surveillance des ISO de la maternité de l'hôpital de zone de Dassa-Glazoué. Les fiches de collecte des infections du site opératoire conçue par le Réseau PIAS/mai 2022-fiche version 2 ont été adressé à chaque patient ayant donné son consentement pour l'intervention chirurgicale. Ce système fait le suivi des ISO pendant 30 jours après l'intervention.

Résultats : La base de données au 30 Juin 2024 comportait 283 femmes opérés d'un âge moyen de 26ans avec un écart type de 6,71ans. 98% des interventions étaient des césariennes et 2% des GEU/hystérectomie. L'incidence de l'infection du site opératoire de notre étude était de 3,96% (9 sites suppurés). Sur les 9 sites opératoires suppurés, 1 avait une infection en profondeur de l'incision et 8 une infection de l'organe. Également, six (06) avaient un score de NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance) entre 0 et 1 et trois (03) avaient un score de NNIS = 2. Le risque d'SIO évoluait significativement selon la durée de l'intervention ($p = 0,04$).

Conclusion : La prévention de ses infections obtenues à l'issu de l'étude, repose sur une surveillance épidémiologique rigoureuse et sur le respect des bonnes pratiques d'hygiène pré, per et post chirurgicale.

Mots-clés : ISO ; Surveillance ; Facteurs associés ; HZ Dassa

COPH07	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Evaluation de la résistance phénotypique et moléculaire aux insecticides chez des moustiques vecteurs dans le port de Cotonou

Lokossou Antoine Salomon, Aikpon Rock, Dossou Murielle, Todo Emmanuel, Adjottin Bruno

Introduction: La résistance des moustiques aux insecticides est un enjeu majeur de santé publique, notamment dans le port de Cotonou. Cette étude vise à évaluer la sensibilité d'*Aedes aegypti*, *Culex quinquefasciatus* et *Anopheles gambiae* aux insecticides couramment utilisés et à identifier les mutations génétiques associées à la résistance

Méthodes: Des tests de sensibilité en tube selon le protocole OMS ont été réalisés sur *Aedes*, *Culex* et *Anopheles* exposés à différents insecticides. Parallèlement, une identification moléculaire par PCR SINE a permis de différencier *Anopheles gambiae* et *Anopheles coluzzi*, suivie d'une PCR diagnostique pour détecter les mutations kdr V1016I, S989P et F1534C chez *Aedes aegypti*, ainsi que L1014F et L1014S chez *Anopheles gambiae* toutes impliquées dans la résistance aux pyréthrinoides.

Résultats: Les tests de sensibilité OMS ont été réalisés sur 592 *Aedes*, 596 *Culex* et 587 *Anopheles*. Une résistance à la deltaméthrine, au perméthrine et à l'alphacyperméthrine a été observée chez *Aedes*, *Culex* et *Anopheles*. L'association alphacyperméthrine + PBO a permis de restaurer la sensibilité chez *Aedes* (100 %) et *Anopheles* mais légèrement chez *Culex* (93 %). Une résistance suspectée au bendiocarb chez *Anopheles* et *Aedes* a été confirmée. Enfin, pirimiphos méthyl a montré une efficacité totale (100 %) sur les trois vecteurs. La mutation L1014F a été mise en évidence chez *Anopheles gambiae* et *Anopheles coluzzi* : $f(f) = 0,84$ pour *Anopheles gambiae* et $f(f) = 0,9$ pour *Anopheles coluzzi* tandis que la mutation L1014S a été détectée uniquement chez *Anopheles gambiae* avec une fréquence allélique faible $f(s) = 0,039$ et uniquement chez des individus hétérozygotes. Quant à *Aedes aegypti* les trois mutations V1016I, S989P et F1534C ont été mise en évidence avec les fréquences alléliques respectives : $f(i) = 0,19$; $f(p) = 0,63$ et $f(c) = 0,72$.

Conclusion: Cette étude mettant en évidence une forte résistance aux pyréthrinoides et une sensibilité préservée aux organophosphorés ainsi que les mécanismes moléculaires de résistance souligne la nécessité d'adapter les stratégies de lutte antivectorielle pour une lutte plus rationnelle.

Mots-clés : Mutation, résistance, pyréthrinoides, insecticides

COPH08	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Profil épidémiologique du portage asymptomatique des bactéries pathogènes d'infections méningées chez le personnel soignant en pédiatrie et néonatalogie au Bénin

Bello Chakir Ishola, Degbey Cyriaque Comlan

Affiliation : Laboratoire de Biologie et de Typage Moléculaire en Microbiologie, Faculté des Sciences et Techniques/Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Introduction: La colonisation nasopharyngée et oropharyngée par les bactéries responsables de méningite représente un risque épidémiologique majeur, car elle précède la maladie et constitue une source de transmission. Les nouveau-nés et enfants hospitalisés en pédiatrie étant particulièrement vulnérables, nous avons évalué si le personnel soignant pouvait constituer un réservoir potentiel de bactéries à transmission nosocomiale, en caractérisant les souches portées, leur profil de résistance aux antibiotiques, ainsi que les facteurs associés au portage.

Méthodes: Il s'est agi d'une étude transversale réalisée du 1 Septembre 2023 au 30 Septembre 2024. Le matériel est constitué d'un questionnaire auto-administré et de prélèvements oropharyngés et nasopharyngés effectués sur consentement éclairé. L'isolement et l'identification des bactéries majeures d'infections méningées ainsi que le test de sensibilité aux antibiotiques ont été effectués.

Résultats: La colonisation oropharyngée et nasopharyngée par *Streptococcus pneumoniae* a été respectivement observée chez 49,4 % et 4,9 % des sujets. Pour *Haemophilus influenzae*, les taux de portage étaient de 3,8 % pour l'oropharynx et 0,4 % pour le nasopharynx. *Neisseria meningitidis* n'a pas été isolé. Le profil de résistance des isolats de *S. pneumoniae* a révélé une multirésistance. Une association significative a été trouvée entre la colonisation pneumococcique et des facteurs tels que les infections respiratoires récentes, la résidence en zone à risque, l'âge de 18 à 35 ans et le métier de médecin en pédiatrie ($p < 0,05$). Egalement, 51% du personnel ignore les principales bactéries responsables de méningite et 67% ne portent pas de masque quotidiennement. Les précautions complémentaires ne sont pas systématiquement mises en œuvre, en particulier l'isolement, souvent impossible faute de place.

Conclusion: Cette première étude sur le portage de *S. pneumoniae* et ses facteurs de risque chez le personnel de santé asymptomatique en pédiatrie au Bénin souligne un risque de transmission bactérienne, aggravé par une couverture vaccinale insuffisante.

Mots-clés : Oropharynx; Nasopharynx; Professionnel De Santé; Colonisation; Services Pédiatriques

COPH09	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Étude de l'observance de l'hygiène des mains par les prestataires de soins à la clinique universitaire de la cardiologie du CNHU-HKM de cotonou en 2024

Degbey Cyriaque Comlan, Ahoussinou Senami Blandine , Codjo Léopold

Affiliation : Institut Régional de Santé Publique , Université d'Abomey-Calavi

Introduction : La prévention des infections nosocomiales représente un enjeu majeur de santé publique à l'échelle mondiale. L'objectif de ce travail était d'étudier l'observance de l'hygiène des mains chez les prestataires de soins de la clinique universitaire de la cardiologie du CNHU-HKM de Cotonou en 2024.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale et analytique. Elle a inclus des prestataires de soins éligibles de la clinique universitaire de la cardiologie du CNHU-HKM de Cotonou sélectionnés par un échantillonnage non probabiliste par choix exhaustif. Les données ont été analysées avec le logiciel SPSS version 25. Les comparaisons des proportions ont été faites à l'aide du test de Chi2 au seuil de significativité de 5%.

Résultats : Au terme de l'étude, 52 prestataires de soins ont été inclus avec une répartition égale des sexes. 5,8% des prestataires de soins avaient une bonne observance de l'hygiène des mains, 65,4% avaient une observance modérée et 28,8% avaient une mauvaise observance. Une observance inégale des recommandations d'hygiène des mains a été observée, particulièrement faible avant le contact avec le patient (25%) et après contact avec l'environnement du patient (21,2%). Par contre, les prestataires de soins semblent plus attentifs aux gestes aseptiques (93,3%) et après exposition à des liquides biologiques (100%). Les facteurs associés sont la formation sur l'hygiène des mains ($p=0,045$) et l'accès peu pratique aux produits d'hygiène des mains ($p=0,025$).

Conclusion : Ces résultats mettent en évidence l'urgence de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie globale et structurée pour renforcer l'observance de l'hygiène des mains.

Mots-clés : Hygiène Des Mains; Infections Nosocomiales; Observance; Prestataires De Soins

COPH10	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Pratiques en matière d'hygiène hospitalière des étudiants de l'université de Parakou au Bénin en 2024

Houehanou Yèssito Corine Nadège, Hounsou Francis, Dansou Sonou Mahunan Aude Tanguy, Adoukonou Thierry

Affiliation : Ecole Nationale de Formation des Techniciens supérieurs en Santé publique et Surveillance Epidémiologique (ENATSE), Université de Parakou, Parakou, Bénin

Introduction : L'hygiène hospitalière constitue la principale composante de la prévention des infections nosocomiales et un aspect essentiel de la qualité des soins. L'objectif était d'étudier les pratiques en matière d'hygiène hospitalière des étudiants en médecine de l'université de Parakou en 2024.

Méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale, descriptive et à visée analytique portant sur des étudiants en médecine en stage au Centre Hospitalier Universitaire Départemental Borgou-Alibori à Parakou en 2024 et ayant donné leur consentement pour participer. Un échantillonnage de convenance a été fait. Tous les étudiants en médecine présents en stage du 29 avril au 28 mai 2024 et éligibles ont été inclus. Les données ont été collectées lors d'une entrevue individuelle à l'aide d'un questionnaire électronique Kobocollect. Les pratiques ont été évaluées grâce aux réponses à 10 questions permettant de calculer un score. Elles ont été classées en trois catégories : « bonnes », « moyennes » ou « mauvaises ».

Résultats : Un total de 197 étudiants ont été enquêtés. L'âge moyen était de $21,7 \pm 2,1$ ans et le sex-ratio de 1,6. Parmi ces étudiants, 63,4% avaient de bonnes pratiques en matière d'hygiène hospitalière, 32,0% des pratiques moyennes et 4,6% de mauvaises pratiques. Les facteurs statistiquement associés aux mauvaises pratiques étaient l'âge ($p=0,001$), le manque de formation sur les précautions standard et complémentaires ($p<0,001$), le manque d'expérience de stage hospitalier ($p=0,007$) et les mauvaises perceptions en matière d'hygiène hospitalière ($p<0,001$).

Conclusion : Les résultats montrent une proportion d'environ 5% de mauvaises pratiques. Ils soulignent la nécessité de former et de superviser les étudiants en médecine ciblés pour de bonnes pratiques en matière d'hygiène hospitalière.

Mots-clés : Pratiques, Hygiène Hospitalière, Etudiants En Médecine, Parakou

COPH11	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Facteurs associés au recours au dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes âgées de 25 à 65 ans dans le 1er arrondissement de Cotonou

Damien Barikissou Georgia, Monlandjo Marie-Eurielle Whéfa, Aguemon Badirou

Affiliation : CEFORP / UAC, FSS / UAC

Introduction : Le cancer du col de l'utérus représente le quatrième cancer le plus courant chez la femme dans le monde, avec environ 660 000 nouveaux cas et 350 000 décès en 2022. Il peut être prévenu par le dépistage et le traitement précoce. Cependant la pratique du dépistage est faible. L'étude vise à analyser les facteurs associés au recours au dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes âgées de 25 à 65 ans.

Méthodes : il s'agissait d'une étude transversale descriptive et analytique réalisée dans le 1er arrondissement de Cotonou. Les données ont été collectées dans quatre quartiers de villes : Suru-Léré, Yagbé, Avotrou Houezékomè et Tchanhounpkamè. Un modèle de régression logistique a permis d'identifier les facteurs associés au dépistage du cancer du col de l'utérus. L'analyse statistique a été réalisée à l'aide du logiciel Epi Info version 7.2.

Résultats : Parmi les femmes enquêtées, 53,6% avait entendu parler au moins une fois du dépistage du cancer du col de l'utérus. Leurs sources d'information prédominantes étaient la télévision (45%) et les agents de santé (30%). Seulement 17% ont eu recours au moins une fois au dépistage du cancer du col de l'utérus. Les facteurs qui ont favorisé le recours au dépistage étaient le niveau d'étude (niveau supérieur vs autres, RP = 4,40 IC95% 2,56 – 7,58) et la connaissance de l'utérus (Oui vs Non, RP = 4,30 IC95% 2,44 – 7,60).

Conclusion : Le recours au dépistage du cancer du col de l'utérus demeure faible dans le 1er arrondissement de Cotonou. L'amélioration de la communication sur l'organe reproducteur de la femme (l'utérus) chez les femmes n'ayant pas un niveau d'étude supérieur pourrait améliorer cet indicateur.

Mots-clés : Dépistage; Cancer du col de l'utérus; Facteurs Associés

COPH12	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Évaluation de la gestion de stock des produits traceurs à l'agence régionale de Cotonou de la société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé en 2024

Salami Lamidhi, Hountcheme Arnaud, Kpozehouen Alphonse

Affiliation : Institut Régionale de Santé Publique – Comlan Alfred QUENUM, Université d'Abomey-Calavi

Introduction : L'accès aux médicaments est un enjeu crucial pour la santé publique mondiale. Au Bénin, des ruptures de stocks des produits de santé, notamment les produits traceurs, sont enregistrées au niveau de l'Agence Régionale de Cotonou de la Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS). Cette étude avait pour objectif d'évaluer la gestion des stocks de produits traceurs à l'Agence Régionale Cotonou de la SoBAPS en 2024.

Méthodes : L'étude, transversale à visée évaluative, a été menée de janvier à juillet 2024. Un échantillon de 15 personnes, 2 entrepôts, 89 fiches de stock et les documents de la SoBAPS ont été sélectionnés à l'aide d'un échantillonnage non probabiliste. L'étude a évalué la gestion de stock des produits traceurs à travers trois composantes "Structure", "Processus" et "Résultats" qui ont été appréciées en utilisant l'échelle de Varkevisser adaptée.

Résultats : La gestion de stocks des produits traceurs est globalement mauvaise avec un score de 322 du score attendu (377), soit une proportion de 85,41%. Les composantes "Structures", et "Résultats" ont été jugées mauvaises avec respectivement 86,79% et 86,99% du score attendu. Seule la composante processus a été jugée bonne avec 91,30% du score attendu et quelques insuffisances au niveau de sa sous-composante "Stockage". La sous-composante "Ressources humaines" de la composante structure a été jugée mauvaise. La mauvaise appréciation la composante "Résultats" pourrait être due à la non disponibilité de quelques produits traceurs le jour de la collecte et la non satisfaction des magasiniers.

Conclusion : Une réponse diligente et adaptée aux gaps relevés dans la gestion des stocks de produits traceurs au niveau de l'Agence Régionale Cotonou de la SoBAPS permettra de garantir une disponibilité permanente desdits produits.

Mots-clés : Évaluation, Gestion De Stock, Produits Traceurs, ARC Sobaps, Bénin

COPH13	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Profil de résistance des bactéries Gram négatif émergentes de l'environnement hospitalier des CHU du Bénin en 2024

Soclo Dansi Sènam Evelyne, Degbey Comlan Cyriaque, Agbokou Diane

Affiliation : Institut Régionale de Santé Publique – Comlan Alfred QUENUM, Université d'Abomey-Calavi

Introduction : L'émergence et la dissémination des bactéries multirésistantes en milieu hospitalier constituent un enjeu majeur de santé publique, compromettant l'efficacité des antibiothérapies et augmentant la morbidité et la mortalité des infections soins. Les bactéries Gram négatif suscitent une inquiétude croissante en raison de leur capacité à acquérir et transmettre des mécanismes de résistance aux antibiotiques. L'Objectif de ce travail était d'identifier les principales bactéries Gram négatif émergentes dans l'environnement hospitalier des CHU du Bénin et d'analyser leur profil de résistance aux antibiotiques.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale et descriptive réalisée dans les services à haut risques infectieux des CHU du Bénin. Les prélèvements ont été effectués à l'aide d'écouvillons stériles et de bio-collecteur d'air. La mise en culture a été réalisée sur le milieu gélosé Eosine-Bleu de méthylène (EMB). L'identification des germes a été effectuée à l'aide de la galerie API 20E. Le profil de résistance aux antibiotiques a été déterminé par l'antibiogramme en milieu gélosé de Mueller Hinton selon les recommandations de la Société Française de Microbiologie.

Résultats : Sur 438 échantillons prélevés, 238 (54,32 %) étaient positifs avec identification de 310 Bacilles Gram négatifs. La répartition de ces bacilles montre une prédominance des *Klebsiella pneumoniae* à 25,80 % ; 20,64 % de *Pseudomonas aeruginosa* ; 14,83 % d'*Escherichia. Coli* et 13,54 % *Acinetobacter baumannii*. L'analyse du profil de résistance a révélé que 68,87% des Entérobactéries sont productrices de β -lactamases à spectre élargi ; 94,83 % des souches isolées sont des bactéries multirésistantes.

Conclusion : L'environnement hospitalier constitue un réservoir de bactéries multirésistantes aux antibactériens. Les résultats de cette recherche contribueront à l'élaboration de recommandations adaptées pour renforcer la lutte contre l'antibiorésistance et améliorer la qualité des soins hospitaliers.

Mots-clés : Profil; Résistance; Bactéries; Environnement; Hospitalier

COPH17	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Syndrome métabolique chez le personnel d'un centre hospitalier à Cotonou en 2024

Adjobimey Mênouli, Adjonou Christine, Djohoun Frimège, Hountohotegbe Esdras, Wanvoegbe Finangnon Armand

Affiliation : Centre National Hospitalier Universitaire de Pneumo-Phtisiologie de Cotonou (CNHU-PPC), Faculté des Sciences de la Santé

Introduction : Le syndrome métabolique est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète. Certaines conditions de travail peuvent faciliter sa survenue. L'objectif était de déterminer les facteurs associés au syndrome métabolique chez les travailleurs du Centre National Hospitalier Universitaire de Pneumo-Phtisiologie de Cotonou.

Méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale. Un recrutement exhaustif du personnel ayant participé à la visite médicale et ayant satisfait aux conditions de l'étude a été effectué. La variable dépendante, syndrome métabolique a été définie selon les critères harmonisés de la Fédération Internationale du Diabète. Les variables explicatives étaient relatives aux caractéristiques sociodémographiques, professionnelles et comportementales. Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire standardisé du 23 août au 06 septembre 2024. Il a été réalisé des calculs de proportions, une analyse bivariée suivie d'une analyse multivariable avec le logiciel R 4.3.2. Le seuil de significativité était de $p < 0,05$.

Résultats : Au total 92 sur 105 travailleurs ont été inclus dont 56,52% de sexe féminin. L'âge moyen était de $41,10 \pm 9,50$ ans avec des extrêmes de 22 et 59 ans. La prévalence du syndrome métabolique était de 50% et les facteurs associés étaient : surcharge pondérale ($ORa = 17,0$ [5,73, 59,2] ; $p < 0,001$), consommation excessive de sel ($ORa = 6,19$ [1,45-31,80] ; $p = 0,013$) et antécédents familiaux de diabète ($ORa = 4,11$ [1,16-16,80] ; $p = 0,028$). Les facteurs professionnels comme le travail posté et le stress au travail n'étaient pas associés.

Conclusion : Le syndrome métabolique chez les travailleurs du CNHU-PPC est associé en partie à des facteurs modifiables devant faire objet d'une campagne de sensibilisation

Mots-clés : Syndrome métabolique; Travailleurs; Hôpital; Bénin

COPH19	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Facteurs associés aux comportements sexuels à risques chez les adolescents et jeunes de l'université de Parakou (Bénin) en 2023

Charles P. Makoutode ; Nadine Oda ; Vignon Bedie ; Virginie Mongbo ; Lamidhi Salami ; Joel Segnon ; Kabirou Salifou

Affiliation : Institut Régionale de Santé Publique – Comlan Alfred QUENUM, Université d'Abomey-Calavi

Introduction : L'entrée dans la vie sexuelle active des adolescents et jeunes représente une étape importante qui se révèle aussi très difficile pour certains des jeunes et adolescents. Les comportements sexuels à risques tels que la précocité du premier rapport sexuel et la faible utilisation des préservatifs et autres moyens contraceptifs efficaces sont les principales causes de la forte fécondité des adolescentes de la région Ouest Africaine.

Résultats : Au total, 765 adolescents et jeunes ont été inclus, avec une moyenne d'âge de 20,66 ans $\pm$ 2,25, majoritairement de sexe féminin (64,71%). Leur connaissance des comportements sexuels à risques et des IST/VIH était en moyenne de 65,88%. Une fréquence de 15,3% de pratique de comportements sexuels à risques a été observée. Ces comportements étaient influencés par des facteurs tels que l'âge, le sexe, le statut matrimonial, la consommation d'alcool, la fréquentation de boîtes de nuit et le faible niveau de connaissance.

Conclusion: Les initiatives de santé publique devraient se concentrer sur la réduction des comportements sexuels à risque et encourager une prise de décision éclairée en matière de santé sexuelle en faveur des adolescents et les jeunes adultes.

Mots-clés : Sexualité – Risque – Facteurs – Université de Parakou

COPH20	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Prévalence et facteurs associés aux hépatites virales B et C chez les travailleurs d'un Centre Hospitalier Universitaire à Cotonou en 2022

Hinson Antoine Vikkey, Adjobimey Mènonli, Mikponhoue Rose, Gbondjin Elysée, Zohoun Noriace, Moulero Alice, Ayelo Paul

Affiliation : Université d'Abomey-Calavi

Introduction : Les hépatites virales B et C constituent un problème de santé publique dont la prévention est possible. Les agents de santé ont un risque professionnel supplémentaire comparé à la population. L'objectif de cette étude était de déterminer la prévalence et les facteurs associés aux hépatites virales B et C chez les travailleurs du CHU-MEL de Cotonou en 2022.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive à visée analytique déroulée du 13 avril au 12 juin 2022 au Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et l'Enfant-Lagune de Cotonou. Nous avons réalisé un échantillon de commodité dans le cadre de la campagne de dépistage des hépatites B et C et de vaccination contre l'hépatite B organisée par ledit centre. Les données ont été collectées directement sur Kobocollect et l'analyse a été effectuée par le logiciel R 4.1.1. Grâce à une régression logistique simple nous avons déterminé les associations entre la variable dépendante et les différentes variables explicatives.

Résultats : Au total, 427 travailleurs étaient inclus dans l'étude. La prévalence des hépatites B et C était respectivement de 6,6% et 0%. La couverture vaccinale de l'hépatite B était de 10,3%. Plus de la moitié des enquêtés (57,1%) ont indiqué que faire saigner constitue une conduite à tenir devant un AES. Le statut matrimonial (être veuf) (OR = 17,0 ; p = 0,041), la manipulation des déchets biomédicaux (OR = 2,64 ; p = 0,027) et le statut vaccinal (être complètement vacciné) contre l'hépatite B (OR=0,01 ; p=0,012) étaient significativement associés à la survenue de l'hépatite virale B.

Conclusion : L'hépatite virale B était présente chez les travailleurs du CHU-MEL. Plusieurs facteurs étaient significativement associés à la survenue. Aucun travailleur n'a été dépisté avec l'hépatite C.

Mots-clés : Prévalence ; Hépatite B et C ; Agents de santé ; CHU-MEL, Bénin.

COPH21	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Contrastes et synergies entre modèles hospitalier et communautaire de soins palliatifs et de fin de vie en Afrique de l'Ouest francophone : une analyse qualitative comparative des modèles au Bénin et au Togo

Agbodjavou Komi Mena, Bedie Vignon, Mèliho Codjo Pierre, Kpatchavi Codjo Adolphe

Affiliation : 1= École Doctorale Pluridisciplinaire Espaces, Cultures et Développement, Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin ; 2= Institut Régional de Santé Publique – Comlan Alfred Quenum, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin; 3= Département de Gestion et d'Exploitation des Systèmes d'Élevage, École Nationale d'Agriculture, Kétou, Bénin

Introduction : En Afrique de l'Ouest francophone, l'accès aux soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) demeure limité. Cette étude vise à comparer deux modèles émergents de SPFV au Bénin et au Togo pour l'identification de stratégies adaptées aux contextes locaux.

Méthodes : Une étude qualitative comparative a été menée entre 2021 et 2022 au sein de : l'Organisation Jeunesse pour le Développement Communautaire (Orjedec) au Togo et l'Unité de soins palliatifs (USP) du CNHU-HKM au Bénin. Ces structures ont été sélectionnées selon un échantillonnage raisonné basé sur leur représentativité des approches communautaire et hospitalière. La collecte de données a combiné : (i) 24 observations directes structurées (12 par site) documentées par une grille standardisée, (ii) 40 entretiens semi-directifs avec le personnel soignant (n=16), les patients (n=14) et leurs proches (n=10), et (iii) l'analyse de documents institutionnels. L'analyse s'est appuyée sur une approche interactionniste adaptée aux contextes contemporains de soins, intégrant les spécificités socioculturelles ouest-africaines.

Résultats : Les modèles présentent des approches socio-anthropologiques distinctes et complémentaires. En termes de spécificités de l'offre : le modèle d'Orjedec privilégie une démarche de santé communautaire qui intègre les valeurs traditionnelles africaines. Il mobilise un réseau de 34 bénévoles formés aux soins palliatifs et aux médiations culturelles. Les professionnels de soins y adoptent une posture de facilitateurs entre les soins biomédicaux et les conceptions traditionnelles de la maladie et de la mort. Cette approche se caractérise par la co-construction des soins avec la communauté et l'adaptation des protocoles aux réalités socioculturelles locales. Quant à l'USP, elle développe une approche biomédicale spécialisée où l'expertise technique est primordiale, tout en incluant des visites à domicile (47% des prises en charge). L'équipe pluridisciplinaire maintien des standards cliniques tout en adaptant progressivement ses pratiques aux besoins culturels exprimés par les patients. En termes de logiques de recours aux soins, les avis diffèrent : les patients choisissent Orjedec principalement pour la proximité communautaire, la reconnaissance de leurs croyances et une approche moins médicalisée. L'accessibilité financière, bien qu'importante, reste secondaire à la résonance culturelle du dispositif. Le recours à l'USP s'explique par la recherche d'expertise technique et la confiance dans l'institution médicale.

Conclusion : Cette étude met en évidence deux trajectoires complémentaires d'intégration des principes de santé communautaire dans les SPFV en Afrique de l'Ouest francophone. L'approche d'Orjedec démontre l'efficacité d'une démarche ascendante privilégiant l'empowerment communautaire, tandis que l'USP illustre la possibilité d'une évolution institutionnelle intégrant graduellement des dimensions participatives. Ces expériences suggèrent l'élaboration de modèles hybrides conjuguant expertise médicale et ancrage communautaire pour développer des SPFV culturellement adaptés aux contextes ouest-africains.

Mots-clés : Soins Palliatifs et de Fin De Vie; Offre de Soins; Recours aux Soins; Bénin; Togo

COPH22	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Tension artérielle élevée chez le personnel du CNHU-HKM en 2024

Adjobimey Mênouli^{1,2}, Dovoedo Nelly², Choki Blaise^{2,3}, Sacca Hélène, Ayelo Paul^{1,3}, Gnonlonfoun Dieudonné^{2,3}, Houinato Dismand²

Affiliation : 1= Unité de Recherche et d'Enseignement en Santé au Travail et Environnement (URESTE), 2= Laboratoire d'Epidémiologie des maladies chroniques et neurologiques (LEMACEN) 3= Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM)

Introduction : La tension artérielle élevée (TAE) fait partie des facteurs de risque les plus courants des maladies cardiovasculaires. Certaines conditions de travail peuvent faciliter sa survenue. L'objectif de l'étude était de déterminer la prévalence et les facteurs associés à la tension artérielle élevée chez les travailleurs du CNHU-HKM.

Méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale. Les données ont été collectées du 07 Octobre 2024 au 25 Octobre 2024. Un recrutement du personnel a été effectué. La variable dépendante était la TAE en tenant compte de la prise d'antihypertenseur (pression artérielle systolique ≥ 140 et/ou diastolique ≥ 90 mmHg ou actuellement sous traitement médical pour tension artérielle élevée). Les variables explicatives étaient relatives aux caractéristiques sociodémographiques, professionnelles et comportementales. Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire standardisé. Il a été procédé à des calculs de proportions, une analyse bivariée suivie d'une analyse multivariable avec le logiciel R 4.3.2. Le seuil de significativité était de $p < 0,05$.

Résultats : Au total, 1093 travailleurs sur les 1238 du CNHU-HKM ont été inclus dans l'étude soit un taux de participation de 88,3%. Il y avait 533 hommes versus 560 femmes. L'âge médian était de 46 ans avec un intervalle interquartile de 40 ans et 51 ans. Parmi les travailleurs 459 cas de TAE ont été identifiés soit une prévalence de 42,0%. Les facteurs associés étaient : âge ≥ 46 ans, (ORa=1,6 ; IC95% = [1,1-2,2] ; $p=0,008$), ancienneté au poste >20 ans (ORa=2,1 IC95%= [1,0-4,3] ; $p=0,040$), antécédent d'hypercholestérolémie (ORa=1,7 ; IC95% = [1,1-2,4] ; $p=0,005$), surcharge pondérale (ORa=1,6 ; IC95% = [1,1-2,5] ; $p=0,017$).

Conclusion : La fréquence de la TAE chez les travailleurs de l'hôpital est élevée et une campagne de sensibilisation ainsi que la création d'un espace de fitness dans cet hôpital pourraient contribuer à la réduire.

Mots-clés : Hypertension Artérielle; Travailleurs; Hôpital; Bénin

COPH25	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Évaluation de performance de la surveillance épidémiologique de la Dengue dans le district de Golfe au Togo en 2025

Togan Mèdèssè Roméo^{1,2}, Agnègue Essy Sakya Gracia^{2,4}, Padonou Gil Germain³, Coulibaly Cheick⁴, Ouendo Marius Edgar⁵, Ekouevi Koumavi Didier², Badirou Aguemou⁵

Affiliation : 1= Ecole Doctorale des Sciences de la Santé de l'Université d'Abomey Calavi, 2= Département de Santé Publique, Université de Lomé, 3= Centre de Recherche en Entomologie de Cotonou, Ministère de la Santé, 4= Faculté de Médecine et d'Odonto-Stomatologie Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako, 5= Faculté des Sciences de la Santé, Département de Santé Publique Université d'Abomey Calavi,

Introduction: La dengue constitue un problème croissant de santé publique, avec une surveillance encore sous-optimale en Afrique de l'Ouest. Au Togo, le district du Golfe, a été l'épicentre de l'épidémie qu'a connu le pays en 2024. Cette étude évalue la performance de la Surveillance Intégrée des Maladies et de la Riposte (SIMR) appliquée à la dengue.

Méthodes : Une étude transversale mixte a été menée en 2024 dans toutes les 27 formations sanitaires du district du Golfe. La performance du système a été évaluée selon le cadre de Donabedian (structure, processus, résultats) : Avec un questionnaire standardisé. Des données quantitatives ont été recueillies à partir des rapports de surveillance et analysées avec un score de performance dont la moyenne donne un score global apprécié avec l'échelle de Varkevisser au seuil de 60%. En parallèle, des entretiens semi-dirigés ont été réalisés avec les acteurs clés du système de surveillance.

Résultats : La performance de la surveillance épidémiologique de la dengue était faible avec des scores de structure (42,6%), processus (52,8%), résultats (19,9%) et un score global de performance à 38,5%, marqué par un déficit de ressources (42,6%), une défaillance des processus de surveillance (52,8%) et des résultats limités (19,9%). Les principaux défis incluent l'absence de formation continue (7,4% des agents formés), l'absence de financement dédié et une faible intégration de la surveillance. La surcharge de travail, la confusion diagnostique avec le paludisme et le déficit de rétro-information compliquent la riposte.

Conclusion L'amélioration de la surveillance nécessite une formation renforcée, l'intégration des laboratoires privés, la digitalisation des déclarations et un financement dédié. Une approche multisectorielle est essentielle pour optimiser la réponse aux épidémies futures.

Mots-clés : Evaluation de performance; Dengue; surveillance épidémiologique; Lomé; Togo

COPH26	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Facteurs associés à la létalité du paludisme grave chez les enfants dans les hôpitaux de la Donga, Bénin en 2022

Salifou-Issaka Sanni¹, Houemenou Modeste¹, Noudeke Nestor², Houssou Mathilde¹

Affiliation : 1 = Ministère de la Santé du Bénin ; 2= Bureau AFENET Bénin.

Introduction : Le paludisme, maladie parasitaire fébrile causée par la pique de moustique, constitue un problème de santé publique surtout en Afrique. En 2021, l'incidence générale du paludisme était de 21,20% au Bénin contre 37,80% dans la Donga. La forme grave est la première cause d'hospitalisation (40,20%) et de décès (19,80%) des enfants de 0-59 mois au Bénin en 2021. Les facteurs associés à la létalité ne sont pas connus. Cette étude vise à évaluer la référence et les facteurs associés à la létalité des cas grave chez les enfants.

Méthodes : Une étude transversale analytique a porté sur 387 enfants de 0-59 mois admis dans les hôpitaux de la Donga. La taille de l'échantillon est calculée avec la formule de Schwartz. L'échantillonnage aléatoire simple est fait avec Open Epi. Les données collectées par dépouillement des dossiers médicaux avec KoboCollect ont été analysées avec Epi info7.2.

Résultats : Sur 387 dossiers étudiés, les enfants de 12-36 mois étaient plus touchés soit 66,41% ; 53,49% de sexe masculin et 52,29% provenaient du milieu rural. Parmi ces enfants, 26,36% était référé vers les hôpitaux. Parmi les référés, 62,26% ont bénéficié d'au moins un traitement de pré-référence avec 69,70% pour la prise d'abord veineux et 84,85% de la première dose d'artésunate. L'ambulance était utilisée à 15,38%. La létalité était de 10,32%. Les signes de gravité les plus fréquents étaient l'anémie (60,72%), les vomissements incoercibles (43,15%), les convulsions (38,50%) et l'incapacité de se nourrir (25,32%). Les facteurs associés à la létalité étaient l'incapacité de se nourrir (OR=5,11 ; IC95% [3,21-17,65]) et les troubles de conscience (OR=2,51 ; IC95% [1,33-4,66]).

Conclusion : Une proportion importante de prescriptions étudiées présente des lacunes susceptibles de compromettre la sécurité des patients. Il est essentiel d'améliorer les pratiques de prescription et de dispensation à travers une réglementation stricte et une meilleure sensibilisation des acteurs concernés.

Mots-clés : Paludisme grave ; Artésunate ; Etude transversale ; Bénin

COPH28	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Perception et acceptabilité sociale de l'extension de la chimioprévention du paludisme saisonnier dans les districts sanitaires de Damagaram Takaya et Takeita au Niger

N'kpingou Théodore Nadakou¹, Moussiliou Noel Paraïso; Jean Blaise Yobo; Charles Patrick Makoutode, Joel Sodjinou, Ounoussa Tapha, Eric Omar Adehossi.

Affiliation : Institut Régionale de Santé Publique

Introduction: Évaluer la perception de l'extension de la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) et son acceptabilité sociale.

Méthodes : Les données utilisées dans cette étude proviennent d'une enquête qualitative commandée par la London School of Hygiene & Tropical Medicine et réalisée en octobre 2022 dans les districts sanitaires de Damagaram Takaya et Takeita, région de Zinder. Quatre groupes de discussion ont été menés par district sanitaire avec des membres du Comité de Gestion de la Santé (COGES), des distributeurs, des pères de famille bénéficiant de l'extension de la CPS et des mères (nourrices). En complément des groupes de discussion, des entretiens individuels ont été réalisés avec le personnel de santé, les autorités et d'autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre le paludisme. Les données collectées ont été transcrites puis résumées dans une matrice servant de base à cette analyse.

Résultats : La population était informée de l'extension de la CPS et était favorable à son renouvellement. Son acceptation est acquise, mais les effets secondaires liés à la prise des médicaments constituent le principal obstacle à la réussite de l'opération. En pratique, les 2^e et 3^e doses ne sont pas toujours administrées comme prévu, soit par oubli, soit parce qu'elles sont mises de côté pour un usage ultérieur. Concernant le système de communication, les crieurs publics et les agents de santé sont les moyens les plus efficaces pour atteindre la population.

Conclusion : L'extension de la CPS est bien accueillie par la communauté. Toutefois, pour atteindre ses objectifs, il est nécessaire de mettre en place des moyens permettant de surveiller l'administration des 2^e et 3^e doses aux enfants. De même, son succès dépend du nombre d'équipes et des jours de distribution, étant donné que la population cible a presque doublé.

Mots-clés : Paludisme; Prévalence; Facteurs; Risque; Niger

COPH29	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La pratique de la santé publique en milieu hospitalier
--------	--

Prévalence et facteurs associés aux troubles musculosquelettiques chez les travailleurs dans un Centre Hospitalier Universitaire à Cotonou en 2024

Hinson Antoine Vikkey, Adjobimey Mènonli, Mikponhoue Rose, Hounzandji Yannel, Zohoun Noriace, Moulero Alice

Affiliation : Université d'Abomey-Calavi Bénin

Introduction : Les Troubles musculosquelettiques (TMS) sont des affections liées à une hypersollicitation musculosquelettique, qui du fait de leurs répercussions sur le travailleur et son rendement professionnel représentent un problème majeur de santé publique. Objectif : Etudier la prévalence et les facteurs associés aux Troubles musculosquelettiques chez les travailleurs du Centre hospitalier universitaire à Cotonou en 2024. Méthode : Il s'est agi d'une étude transversale descriptive à visée analytique basée sur une collecte de données qui s'est déroulée du 1er au 30 Septembre 2024 auprès des travailleurs du Centre hospitalier universitaire à Cotonou. L'échantillonnage a été non probabiliste par quota. Les données recueillies ont été analysées à l'aide du logiciel R. En analyse multivariée une régression logistique a été conduite pour rechercher les facteurs associés. Un Odds Ratio (OR) avec un intervalle de confiance à 95% a été calculé. Un $p \leq 0,05$ a été considéré comme statistiquement significatif.

Résultats : A la suite de notre étude, 80,21% des travailleurs interrogés souffraient de Troubles musculosquelettiques liés au travail. En ce qui concerne les régions touchées, le rachis dorso-lombaire occupait la première place avec une prévalence de 70,76% suivi respectivement du rachis cervical avec 38,01% ; des épaules avec 31,58% ; du genou avec 26,90% ; de la cheville avec 25,73% ; du coude avec 16,96% ; et enfin du poignet et de la main avec 12,28%. Les principaux facteurs de risque associés aux TMS chez les travailleurs enquêtés au cours de l'étude étaient : l'ancienneté de travail au Centre hospitalier universitaire à Cotonou ($p=0,012$; $OR=2,43$) et le stress professionnel ($p=0,033$; $OR=2,19$).

Conclusion : La prévalence élevée des TMS retrouvée dans notre population d'étude montre qu'il s'avère nécessaire de renforcer les mesures de prévention et d'améliorer les conditions de travail au sein des travailleurs hospitaliers.

Mots-clés : Troubles Musculosquelettiques; Prévalence; Travailleur; Rachis Dorso-Lombaire; Cotonou.



Sous-thématique

La médecine familiale et les soins de santé primaires

COMF01	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	---

Production de la guérison à partir des bains rituels chez les fon du Sud-Bénin : Quand des pratiques locales ralentissent l'implémentation des stratégies de soins de santé primaires

Gbenahou Herve Bonaventure Mètonmasse

Affiliation : DS-A/ FASHS/UAC

Introduction : L'émergence et la promotion de la biomédecine ont contribué à l'éclipsement des pratiques locales de soins. Cette "mise sous veilleuse" s'est accentuée ces dernières décennies à cause des investissements consentis par l'Etat béninois dans la formation et le recrutement des agents de santé, de la construction et du réaménagement des infrastructures sanitaires, de l'amélioration du plateau technique, de la faible organisation et la faible capacité lobbyiste des garants de la médecine locale et de l'échec des tentatives d'association des deux systèmes de soins. Cependant, dépendamment de leurs représentations sociales, les populations continuent, à bas bruit, à mobiliser les pratiques locales de soins. L'une des pratiques mobilisées en milieu fon béninois est le bain rituel. Elle est autant mobilisée en milieu de soins local qu'en milieu religieux pour gérer des problèmes de maladie. L'objectif de cette communication est de comprendre cette pratique en mettant le focus sur ses différentes variables, ses temporalités, ses espaces d'expression, ses composantes, son rôle et son importance dans la santé locale.

Méthodes : Les données ont été collectées à partir d'une approche qualitative qui a permis d'associer entretiens individuels approfondis, observations directes et revue de littérature. Une trentaine d'acteurs ont été choisis de façon raisonnée et interviewés.

Résultats : Il ressort que le recours aux bains rituels est lié à la conception de la maladie. Trois types de bains rituels sont identifiés : profanes, religieux et magico-thérapeutiques. Ils sont surtout réalisés après le coucher du soleil. Les espaces d'expression sont : la cour privée, la rue, le bord de rivière, les tas d'ordures et les carrefours. Acte de purification, de régénérescence et de guérison, ces bains impliquent le "Gbé" et l'utilisation d'éléments choisis en fonction du diagnostic initial et puisés de la flore, de la faune et des minéraux.

Conclusion : Le recours à ce procédé de guérison est souvent "diabolisé" par les agents de santé ce qui crée des tensions et fait qu'un pan des réalités locales leur échappe.

Mots-clés : Bains Rituels; Production de la guérison; Tensions; Stratégies de soins de santé primaires; Milieu Fon/Sud-Bénin

COMF02	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	---

Itinéraire thérapeutique de la maladie de « gbagbla » au sud du Bénin

Thierry Akponikpe, Pascal Tchogou, Lyndha Bernice Gbebioho, Roch Houngnihin

Affiliation : Ecole Doctorale Pluridisciplinaire, Espaces, Cultures et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi, Unité de Biologie Expérimentale et Clinique (UBEC), Laboratoire de Recherche en Biotechnologie Médicale et Pharmaceutique (LaRBiMeP), Ecole Nationale Supérieure de Biosciences Appliquées et de Biotechnologie de Dassa-Zoumé (ENSBBA), Université Nationale des Sciences, des Technologies, de l'Ingénierie et des Mathématiques d'Abomey (UNSTIM) Bénin, Laboratoire d'Anthropologie Médicale Appliquée (LAMA) U.A.C, Ecole Doctorale Pluridisciplinaire, Espaces, Cultures et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi

Introduction : « Gbagbla », une maladie infantile qui augmente le taux de mortalité des enfants de moins de dix ans en milieu ayizo. Cette maladie devient un problème de santé publique aux vues de ses conséquences dans les foyers. L'objectif général de cette recherche vise à analyser les discours populaires et l'itinéraire thérapeutique de cette maladie.

Méthodes : Les données proviennent des observations et d'une enquête exploratoire réalisée de décembre 2024 à janvier 2025. Conduite par une approche qualitative, l'enquête exploratoire nous a permis d'interroger 12 parents d'enfants malades, 12 guérisseurs traditionnels, 12 vendeurs/vendeuses de produits traditionnels et 12 agents de Santé avec des entretiens semi-directifs et structurés grâce aux techniques d'échantillonnage de choix raisonné et de boule de neige. Les investigations sur le terrain ont été possibles grâce à l'utilisation d'un guide d'entretien et d'une grille d'observation.

Résultats : Au cours de cette recherche, il nous a été rapporté que c'est uniquement dans la médecine traditionnelle que Gbagbla se guéri. Pour les professionnels de la médecine traditionnelle, Gbagbla est une mal inné, mystique, relevant du monde invisible. Quant aux agents de santé, «Gbagbla» est une splénomégalie ou hépatomégalie causée par le paludisme grave ou certaines infections, donc traitable à l'hôpital. S'agissant du diagnostic clinique et des signes de cette maladie, les deux médecines se complètent mais s'opposent sur l'origine et le traitement.

Conclusion : La médecine traditionnelle pourrait être la meilleure médecine pour sauver les enfants de cette maladie de « Gbagbla ». La médecine moderne ne sert que de calmant si Gbagbla n'est pas égale à splénomégalie ou hépatomégalie. La cohabitation des deux médecines s'impose pour apporter un traitement satisfaisant de Gbagbla et par conséquent sa prise en charge.

Mots-clés : Discours populaires ; Itinéraire thérapeutique ; Maladie ; Gbagbla

COMF03	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	---

Education sanitaire traditionnelle à l'épreuve de la communication vaccinale de routine des enfants à Grand-Popo au Bénin

Djagba Koffi Anselme, Roland Affo, M. Alphonse Senan Eve Assogba , Dr Acotcheou Pacôme Evènakpon

Affiliation : Doctorant en Sociologie-Anthropologie, Laboratoire de Recherches SDémographe, santé publique, Groupe de recherche en Population Santé et Développement (GRPSD), ocio-Anthropologue, Chercheur au Laboratoire d'Anthropologie et de Sociologie Appliquée pour le Développement Durable (LASADD)/LASDEERG/UAC, Université d'Abomey-Calavi/BENIN Maître de conférences en Sociologie-Anthropologie de la santé/CAMES/ Enseignant-Chercheur/ CEFORP/ Laboratoire de Recherches Socio-Anthropologiques sur les Systèmes Organisés et les Mobilités (LASMO), Université d'Abomey- Calavi / Bénin Socio-Anthropologiques sur les Systèmes Organisés et les Mobilités (LASMO), Université d'Abomey-Calavi / Bénin

Résumé : L'éducation sanitaire traditionnelle à Grand-Popo repose sur des prescriptions culturelles bien précises susceptibles d'influencer les pratiques de communication autour de la vaccination de routine des enfants. Cette recherche vise à analyser l'effet de l'éducation sanitaire endogène sur la communication vaccinale à Grand-Popo. L'approche méthodologique utilisée est qualitative combinant les techniques de revue documentaire, d'entretien individuel et d'observation. Les groupes cibles étaient constitués, des parents ou tuteurs d'enfants, des personnes ressources, des leaders religieux ou d'opinion, des relais communautaires, des professionnels de santé et des responsables du programme élargi de la vaccination. Au total, 25 répondants des deux sexes ont été interrogés et soumis à des entretiens semi-directifs grâce à la technique d'échantillonnage par choix raisonné. Les données collectées sur supports magnétiques ont fait l'objet d'une analyse de contenu. Les résultats indiquent que l'éducation sanitaire endogène contribue à l'hésitation vaccinale. En effet les savoirs endogènes limitent la promotion de la vaccination de routine à Grand-Popo. Aux yeux des répondants réticents, la vaccination est un instrument pour baisser la fécondité ou tuer la population. Au regard de ce qui précède nous recommandons la prise en compte des savoirs endogènes dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans de communication pour une transformation positive des perceptions et pratiques en faveur de la vaccination de routine.

Mots-clés : Education traditionnelle; Communication vaccinale; Santé; Grand- Popo

COMF05	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	---

Stress professionnel chez les travailleurs d'un chantier de construction au Bénin en 2023

Adjobimey Mênouli, Degbey Cyriaque, Mikponhoue Rose, Ayelo Paul, Hinson Antoine

Affiliation : Unité de Recherche et d'Enseignement en Santé au Travail et Environnement, Faculté des Sciences de la Santé (URESTE/ FSS), Institut Régional de Santé Publique (IRSP)

Introduction : Des conditions de travail difficiles dans le secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) peuvent être source de stress professionnel (SP). L'objectif de cette étude était de déterminer la fréquence et les facteurs associés au stress professionnel sur le chantier de construction d'un hôpital au Bénin.

Méthodes : Une étude transversale a été réalisée. La taille de l'échantillon calculée à l'aide de la formule de Schwartz ajustée sur le nombre de travailleurs du chantier était de 129. Un échantillonnage aléatoire a été utilisé. La variable dépendante était le SP défini par le job strain selon Karasek. Les autres variables étaient relatives aux caractéristiques sociodémographiques et professionnelles. Une enquête par questionnaire a été réalisée. Les médianes et les proportions ont été calculées. Une association a été recherchée à l'aide de tests du chi carré et de Fisher au seuil de $p < 0,05$ au cours d'une analyse bivariable.

Résultats : Au total, 132 travailleurs ont été inclus. Leurs caractéristiques sociodémographiques se résument comme suit : sexe masculin 126 (95,45%) ; âge médian 30 ans (27-38) ; niveau d'instruction au moins secondaire 101 (76,525%). Les caractéristiques professionnelles étaient : travailleur permanent 85 (64,39%) ; ancienneté ≥ 5 ans 92 (69,7%) ; heures supplémentaires 57 (43,18%). En termes de contraintes psychosociales, 82,58% avaient une demande psychologique élevée ; 79,53% une faible latitude décisionnelle ; 50,76% un faible soutien social. La fréquence du SP était 85 (64,39%) IC 95% [55,54-72,40] dont 49 (37,12%) en iso-strain. Les facteurs associés au SP étaient : âge ($p=0,013$), ancienneté dans le BTP ($p=0,024$), type de travailleur ($p=0,013$).

Conclusion : Le stress professionnel sur les chantiers de construction doit être atténué par tous les moyens en raison du risque d'accident élevé sur de tel chantier.

Mots-clés : Job-strain ; BTP ; construction ; environnement

COMF06	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	---

Enjeux et défis de l'utilisation des substances et des pilules de lendemain sur la reproduction sexuelle de la jeune fille : Cas des étudiants de Lomé

Lare Monkouna Sadibiè Bani, Affo M. Alphonse

Affiliation : Université d'Abomey-Calavi

Introduction : L'utilisation des pilules en Afrique en général et surtout au Togo fait l'objet de plusieurs études. Les pilules du lendemain sont une méthode contraceptive hormonale utilisée par les femmes pour éviter une grossesse. Plus de 500 étudiantes de l'université de Lomé veulent éviter la grossesse mais n'emploient pas les moyens contraceptifs modernes par manque d'information. Notons tous de même qu'il y a des substances que les étudiantes utilisent comme moyen pour empêcher une grossesse. Les pilules contraceptives, elles sont utilisées pour la première fois sur le marché dans les années 1960. Elles servent à empêcher l'ovulation en régulant les niveaux d'hormones, réduisant ainsi les risques de grossesse. Le recours à la pilule moderne est très variable dans les pays en développement.

Méthodes : Pour comprendre et analyser la perception des étudiantes à l'égard de l'utilisation des pilules contraceptives, une approche qualitative de recherche a été adoptée. Cette démarche nous a permis la confidentialité des informations obtenues. Pour collecter les informations nécessaires, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès des étudiantes qui ont eu recours à des pilules au moins deux fois par semaine. Un guide d'entretien a été élaboré au début de l'étude et enrichi au fur et à mesure de l'avancement de la recherche. Nous avons pu recueillir une variété d'informations en établissant des liens avec nos d'informateurs et groupes d'informateurs. Pour certains aspects des données, nous avons utilisé la triangulation en combinant différentes méthodes. Le guide d'entretien comprenait des questions qui exploraient les effets négatifs de l'utilisation des pilules ou substances. Les entretiens ont été réalisés entre mars et juillet 2024 à l'Université de Lomé. Par ailleurs, nous avons enregistré sur un magnétophone, retranscrits littéralement et analysés.

Résultats : Les pilules contraceptives bloquent l'ovulation en fonction de la régulation hormonale et réduisent ainsi le risque de grossesse - L'utilisation à long terme de pilules peut avoir des effets sur les problèmes tels que la santé des os et le risque de cancer. - Les pilules ne conviennent pas à toutes les femmes et présentent des risques plus graves pour la santé chez certaines femmes. -L'utilisation correcte et régulière des pilules est importante pour maximiser leur efficacité.

Conclusion : Les pilules contraceptives ou substances sont une méthode efficace et largement utilisée pour prévenir la grossesse. Comme toute méthode contraceptive, la pilule présente des avantages et des inconvénients.

Mots-clés : Enjeux; Utilisation; Pilule; Reproduction Sexuelle; Substances

COMF07	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	---

Comportements suicidaires chez les adolescents en milieu scolaire au Bénin : Enquête Mondiale sur la Santé en Milieu Scolaire, 2015 : Prévalence et Facteurs associés

Alphonse Kpozèhouen¹, Elvyre Klikpo², Yolaine Glèlè Ahanhanzo¹, Cyriaque Degbey¹, Moussiliou Noël Paraïso¹, Francine Burrus³, Roger Salamon⁴

Affiliation : 1= Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Bénin, 2= Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin, 3= Centre Hospitalier Spécialisé de Lorquin, Lorquin, France, 4= Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et de Développement, Université Victor Segalen, Bordeaux, France *Email: Alphonse Kpozèhouen – Alphonse.Kpozehouen@gmail.com

Introduction : Malgré les interventions dans les pays à revenu faible et intermédiaire en vue de la réalisation de l'objectif mondial de développement durable (ODD), relatif à la promotion de la santé mentale et du bien-être de leur population d'ici 2030, les comportements suicidaires continuent d'être des causes majeures de mortalité prématurée, en particulier chez les jeunes. Cette étude avait pour but d'estimer la prévalence et les facteurs associés aux comportements suicidaires chez les adolescents scolarisés au Bénin.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale chez les adolescents scolarisés en utilisant l'enquête mondiale sur la santé en milieu scolaire au Bénin. La variable dépendante était le comportement suicidaire chez l'adolescent. Des analyses bivariées et multivariées ont été réalisées en utilisant respectivement le test d'indépendance du chi-deux et la régression logistique binaire à l'aide du logiciel Stata14. Toutes les analyses statistiques ont été pondérées et menées au seuil de 5%.

Résultats : Nous avons travaillé sur 2 490 élèves; un élève sur quatre était de sexe féminin. La prévalence des comportements suicidaires, 12 mois avant l'enquête était de 25,14% IC95%=[23,28 - 27,11]. Les filles étaient plus à risque d'avoir des comportements suicidaires que les garçons [OR = 1,41, IC95%= 1,14 – 1,74]. Les adolescents qui se disaient anxieux ([OR = 1,67, IC95% = 1,28 – 2,17]), souffrir de la solitude ([OR = 1,49, IC95% = 1,12 – 1,99]) étaient plus susceptibles d'avoir des comportements suicidaires que les autres. Les élèves qui fumaient ([OR = 1,65, IC95% = 1,08 – 2,52]), ceux qui consommaient de la marijuana ([OR = 2,77, IC95% = 1,20 - 6,39]) étaient plus à risque d'avoir des comportements suicidaires que les autres.

Conclusion : Les comportements suicidaires constituent des défis majeurs de santé publique chez les adolescents scolarisés au Bénin.

Mots-clés : Mots Clés : Comportements Suicidaires; Adolescents Scolarisés; GSHS; Bénin

COMF08	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	---

Dopage et santé des travailleurs des carrières de sable à Bonou : enjeux pour la santé publique des communautés riveraines

Madinde Jeanne Avest, Tokplo Hilaire, Bedie Vignon, Nassi Karl

Affiliation : Université d'Abomey-Calavi, , Institut Régional de Santé Publique, Université Nationale d'Agriculture

Introduction : Dans la commune de Bonou, au sud du Bénin, le changement climatique a transformé l'exploitation du sable fluvial en une activité principale pour les communautés riveraines du fleuve l'Ouémé. Pour répondre aux exigences physiques de cette activité, les travailleurs consomment régulièrement des médicaments psychotropes. Cette étude vise à analyser les types de médicaments psychotropes consommés par les travailleurs et leurs impacts sur leur santé physique et mentale.

Méthodes : La méthodologie adoptée comprend des entretiens individuels et de groupe, ainsi que des observations, afin de collecter des informations qualitatives auprès de 143 personnes.

Résultats : Les résultats montrent que l'extraction et le ramassage de sable fluvial, une activité physiquement exigeante, nécessitant la consommation de médicaments psychotropes pour améliorer l'endurance des travailleurs payés à la tâche. Les travailleurs utilisent divers médicaments dont les principaux sont : Dolonol, socomol, ronfit forte, méfinnac, passion énergy drinnk, basés sur des connaissances subjectives et objectives, et les consomment presque quotidiennement. Cette régularité dans la consommation est justifiée par la composition des médicaments, qui procurent une sensation de bien-être et de force physique nécessaire pour affronter une journée de travail difficile. La plupart de ces médicaments proviennent du commerce illicite de produits pharmaceutiques et sont consommés sans avis médical.

Conclusion et implications Pour améliorer la santé des travailleurs de Bonou, il est essentiel de réduire la consommation de médicaments psychotropes par des campagnes de sensibilisation et des programmes de soutien. Ces initiatives peuvent prévenir les risques pour la santé et améliorer le bien-être général des travailleurs.

Mots-clés : Changement climatique ; Médicaments psychotropes ; Carrière de sable ; Endurance ; santé publique ; Bonou

COMF09	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	---

Étude de la dépression du post-partum chez les accouchées des centres de santé de la commune d'Abomey en 2024

Agbahoungba Joseph Giovanni, Klikpo Elvyre, Salami Lamidhi

Affiliation : Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l'Ouémé (CHUD-O), Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou (FSS), Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRSP-CAQ)

Introduction : La dépression du post-partum perturbe la fonction maternelle et compromet le bien-être du nourrisson. Nous avons étudié ce phénomène chez les accouchées fréquentant les centres de santé de la commune d'Abomey.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale analytique, à la fois quantitative et qualitative, réalisée entre le 20 mars et le 5 avril 2024. Elle a porté sur 440 accouchées de trois mois ou moins fréquentant les centres de santé d'Abomey, ainsi que sur 6 agents de santé. Après une sélection aléatoire des centres de santé, toutes les accouchées éligibles ont été enquêtées à l'aide d'un questionnaire. L'échelle de dépression postnatale d'Édimbourg, à un seuil de 13, a été utilisée pour dépister la dépression du post-partum. Les agents de santé ont été interviewés au moyen d'un guide d'entretien semi-structuré. Les données ont été analysées avec STATA 15.

Résultats : Parmi les 440 accouchées interrogées, 75 (17,05 %) ont été classées comme déprimées. Les facteurs influençant cette prévalence étaient la situation matrimoniale (aOR=37,14 ; IC=[3,34-412,62] ; p=0,003), le pouvoir de décision dans le ménage (aOR=2,21 ; IC=[1,26-3,84] ; p=0,006), la violence physique du partenaire (aOR=2,83 ; IC=[1,41-5,58] ; p=0,003), la grossesse non désirée (aOR=4,60 ; IC=[2,64-8,00] ; p=0,000), la stigmatisation ou discrimination lors de l'accouchement (aOR=1,97 ; IC=[1,11-3,49] ; p=0,021) et l'absence de prestations de soins relatifs à la dépression du post-partum.

Conclusion : Des facteurs socio-démographiques, gynéco-obstétricaux, liés aux expériences de l'accouchement et au système de santé influencent la survenue et la persistance de la dépression du post-partum chez les accouchées des centres de santé d'Abomey. Il est urgent que les autorités de notre système de santé intègrent les soins relatifs à la dépression du post-partum dans la routine.

Mots-clés : Dépression du Post-Partum ; Facteurs Associés ; Accouchées ; Abomey ; Bénin

COMF10	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	---

Faible taux de dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH au Togo en 2023 : une étude transversale

Rogatien Comlan Atoun, Roméo Mèdèssè Togan, Frédéric Yacoubou Youa, Vanessa Yawa Adaba, Djeri Mouroutari, Ibrahim Lawani, Arnold Junior Sadio, Yao Rodion Konu, Didier Koumavi Ekouevi

Affiliation : Département de Santé Publique de l'Université de Lomé

Introduction : Les femmes séropositives sont plus à risque de lésions précancéreuses et de cancer invasif du col de l'utérus. Estimer la fréquence du dépistage du cancer du col de l'utérus et décrire les facteurs associés chez les femmes séropositives au Togo.

Méthodes : Une étude transversale a été menée de mai à août 2023 auprès de femmes séropositives dans les centres de prise en charge VIH au Togo. Un questionnaire standardisé a été élaboré. Les données collectées portaient sur les caractéristiques sociodémographiques, les comportements sexuels à risques, le dépistage antérieur du cancer du col de l'utérus, et les caractéristiques gynéco-obstétriques. Un modèle de régression logistique binaire a été réalisé. Les analyses ont été faites avec le logiciel R au seuil de significativité de 5%.

Résultats : Au total, 965 femmes séropositives (83,9% vivant en zone urbaine) ont été incluses. L'âge médian des participantes était de 45 ans (IQR : 40 – 52). La plupart (80,6%) n'avaient pas consulté un gynécologue dans les 6 derniers mois et 21,0% utilisaient une méthode contraceptive. Environ 40,3% avaient souffert d'une IST et 38,7% étaient ménopausées. Enfin, 71,0% avaient une charge virale indétectable. La fréquence de dépistage du cancer du col était de 6,4%, IC 95% = [5,0 – 8,2]. Les facteurs associés au dépistage étaient la résidence urbaine (OR = 2,28 ; p = 0,018), une consultation gynécologique de plus de 6 mois (OR = 0,22 ; p < 0,001).

Conclusion : Le dépistage du cancer du col de l'utérus doit être intégré aux soins de routine des femmes PVVIH.

Mots-clés : Femmes; Dépistage; Cancer Du Col De L'utérus; VIH; Togo.

COMF12	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	---

Influence des activités de sensibilisation contre les maladies non transmissibles sur les connaissances et pratiques alimentaires dans la commune de Savè en 2023

Agonnoudé Togbédji Maurice, Bofe Adomou Sylvestre

Affiliation : École Nationale de formation des Techniciens supérieurs en santé publique et en Surveillance Epidémiologique, Université de Parakou, Bénin,

Introduction : L'alimentation joue un rôle déterminant dans la prévention des maladies non transmissibles. Objectif : évaluer les effets de la campagne de sensibilisation des ménages sur les connaissances et les pratiques d'une alimentation saine et équilibrée dans la commune de Savè en 2023.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude d'observation transversale à visée analytique réalisée dans la commune de Savè auprès des populations bénéficiant ou non de la campagne de sensibilisation sélectionnées selon un sondage aléatoire à trois degrés. Les variables dépendantes étaient les connaissances et les pratiques alimentaires. La principale variable indépendante était la participation aux campagnes de sensibilisation et les autres étaient les caractéristiques sociodémographiques et économiques. Les données ont été collectées par entretien individuel semi-structuré direct à l'aide d'un questionnaire numérique conçu sur KoboCollect. Les associations ont été interprétées par le rapport de prévalence (RP) avec son intervalle de confiance. Le seuil de signification était de 0,05.

Résultats : Un total de 542 personnes ont été incluses dans l'étude et 42,4% d'entre elles avaient un bon niveau de connaissances et 41,3% avaient un bon niveau de pratique. La participation à la sensibilisation protège contre les faibles niveaux de connaissances (RP=0,26 ; $p < 0,0001$) et de pratique (RP=0,54 ; $p = 0,0023$) de manière statistiquement significative. L'âge de 30 à 60 ans était l'autre facteur protégeant à la fois des faibles niveaux de connaissance (RP=0,48 ; $p = 0,0122$) et de pratique (RP=0,55 ; $p = [0,0364]$) tandis que le niveau d'éducation primaire augmente le risque de faibles connaissances (RP = 1,83; $p = 0,0132$) et pratiques (RP = 1,96 ; $p = 0,0045$).

Conclusion : Les campagnes de sensibilisation sont bénéfiques. Il est utile de les organiser et de les améliorer tout en les adaptant à la susceptibilité de chaque type de cible

Mots-clés : Alimentation; Connaissances; Pratiques; Campagne De Sensibilisation; MNT; Savè

COMF13	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	---

Évaluation de l'accessibilité des ménages de la commune d'Athiémé aux soins et services de santé en 2024

Agonnoudé Togbédji Maurice, Hounnou Madjè Mical

Affiliation : École Nationale de formation des Techniciens supérieurs en santé publique et en Surveillance Epidémiologique, Université de Parakou, Bénin, auteur correspondant : Tél : (00229) : 01 61 32 06 90 / 01 95 96 15 42 ; amaurite@yahoo.fr

Introduction : Pour être efficace, un système de santé doit être d'abord accessible. Or, l'accessibilité est un concept multidimensionnelle. Objectif : analyser l'accessibilité des ménages de la commune d'Athiémé aux soins et services de santé (SSS) ses dimensions et facteurs explicatifs en 2024.

Méthodes : l'étude s'est déroulée dans la commune d'Athiémé en République du Bénin. Observationnelle et transversale, elle a été menée auprès des chefs de ménage sélectionnés par sondage en grappes à trois degrés. L'accessibilité aux SSS était la variable dépendante, tandis que des facteurs individuels, familiaux, socioculturels et organisationnels constituaient les variables indépendantes. Les données ont été d'abord collectées par des entretiens individuels semi-structurés de 20 minutes environ avec les chefs de ménage, puis analysées avec le logiciel Epi Info. Le rapport de prévalence (RP) assorti de son intervalle de confiance à 95% a été la mesure d'association entre la variable dépendante et les variables indépendantes. Les différences ont été jugées significatives au seuil de p inférieur à 0,05.

Résultats : La prévalence de l'inaccessibilité globale aux SSS était de 23,8%. Les dimensions d'inaccessibilité étaient géographiques (22,7%), informationnelles (12,1%), organisationnelles (9,7%), financières (4,4%) et culturelles (4,3%). Les facteurs associés à l'inaccessibilité globale aux SSS incluaient des facteurs comme l'âge ($p < 0,001$), la satisfaction de la prestation de soins ($p = 0,049$), le pouvoir de décision au sein du ménage ($p = 0,019$), les disponibilités et motivation du personnel soignant ($p < 0,001$), le coût ($p < 0,001$) des soins et services et les modalités organisationnelles ($p = 0,002$).

Conclusion : Environ un quart de la population d'Athiémé rencontrait des obstacles, principalement géographiques à accéder aux SSS. L'amélioration de l'accessibilité nécessite une prise en compte des caractéristiques personnelles et des conditions organisationnelles au risque d'une augmentation de la morbidité dont celle par les MNT.

Mots-clés : Soins et Services de Santé - Accessibilité – Dimensions - Chefs de Ménage – Athiémé

COMF14	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	---

Évaluation de la qualité de la mise en œuvre de l’audit des décès néonataux dans le département du littoral au Bénin en 2024

Salami Lamidhi, Amahoumi Flora, Kpozehouen Alphonse

Affiliation : Institut Régional de Santé Publique de Ouidah

Introduction : L’audit clinique des décès est considéré comme un outil essentiel pour prévenir la mortalité néonatale. Au Bénin sa pratique reste peu fréquente dans les formations sanitaires du pays, notamment celles du département du Littoral. L’objectif de cette étude était d’évaluer la qualité de la mise en œuvre de l’audit des décès néonataux dans le département du Littoral au Bénin en 2024.

Méthodes : L’étude, transversale évaluative, a été menée de de janvier à juillet 2024 dans quatre hôpitaux du département. La cible était constituée des membres des comités d’audit des décès néonataux des hôpitaux concernés. Dans chaque hôpital, ils étaient sélectionnés à l’aide d’un échantillonnage non probabiliste. Deux guides d’entretien approfondi ont été utilisés pour recueillir des données sur les composantes structure, processus et résultats de ces audits. L’appréciation de ces composantes selon le score obtenu sur l’échelle adaptée de Varkevisser a été suivie d’une analyse FFOM de la mise en œuvre de l’audit des décès néonataux.

Résultats : La qualité de la mise en œuvre de l’audit des décès néonataux dans le département du Littoral était « mauvaise ». Les composantes « structure » et « processus » avaient une appréciation « acceptable » par rapport aux normes (soit respectivement 63% et 73% du score attendu). La composante « résultats » était jugée « mauvaise » (42% du score attendu). Les points nécessitant le plus d’amélioration concernaient la gestion des ressources humaines et financières, l’analyse des cas et la mise en œuvre des solutions issus des audits.

Conclusion : Un plaidoyer devra être fait auprès des autorités sanitaires afin de renforcer le soutien institutionnel et d’allouer les ressources nécessaires pour garantir la continuité et l’efficacité des audits, ainsi que l’amélioration de la qualité des soins néonataux.

Mots-clés : Evaluation; Qualité; Audit; Décès néonataux; Bénin

COMF15	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	---

Facteurs associés à l'anémie chez les enfants de 6 à 59 mois dans le département du Couffo, 2024

Mongbo Virginie, Sogodandji Ronel, Kpozehouen Alphonse, Glele-Ahanhanzo Yolaine, Sopoh Ghislain, Ouendo Edgard-Marius

Affiliation : Institut Régionale de Santé Publique – Comlan Alfred QUENUM, Université d'Abomey-Calavi

Introduction : L'anémie chez les enfants de 6 à 59 mois est une cause majeure de morbidité et de mortalité. Sa prévalence est passée de 10,2% en 2020 à 24,2% en 2022 dans le département du Couffo, d'où la présente étude qui visait à y étudier les facteurs associés à l'anémie des enfants de 6 à 59 mois en 2024.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale analytique, réalisée dans trois centres de santé communaux sélectionnés par choix aléatoire simple parmi les six du département et dans ses trois hôpitaux. Elle a porté sur les enfants de 6 à 59 mois ans venus en consultation ou hospitalisés dans le service de pédiatrie des hôpitaux, retenus par commodité ainsi que leurs mères. La variable dépendante, anémie chez les enfants de 6 à 59 mois était définie par un taux d'hémoglobine inférieur à 11 grammes par litre. Les données ont été collectées par enquête par questionnaire et exploitation documentaire, puis analysées par le logiciel STATA 11. Les facteurs associés ont été identifiés par régression logistique multiple, au seuil de significativité de 5%.

Résultats : Au total 275 enfants de 6 à 59 mois et leurs mères avaient été enquêtés. L'anémie était d'une prévalence de 57,45%, avec pour facteurs associés : le déparasitage de la mère pendant la grossesse : OR = 4,88, IC95% [2,31-10,20], le faible niveau de revenu, OR = 2,42, IC95% [1,39-4,19], la non supplémentation en fer, OR = 1,87, IC95% [1,09 -3,20], la consultation d'enfants sains, OR = 4,35, IC95% [2,38-7,93], l'antécédent de fièvre OR = 2,58 IC95% [1,39-4,71].

Conclusion : L'ampleur de l'anémie est préoccupante dans le département du Couffo. Il est crucial de renforcer et les initiatives de promotion de la santé des enfants dont la semaine de survie des enfants.

Mots-clés : Anémie; facteurs associés; enfants; Couffo-Bénin

COMF16	Type de communication : Communication orale Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	---

Etude des infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de 5 ans au Sud du Bénin en 2023

Salami Lamidhi, Mehoudenou Sènanckpon Lucia, Bedie Vignon, Glele Ahanhanzo Yolaine, Sossa Jérôme Charles

Affiliation : Département Politique et Système de Santé de l'Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey Calavi

Introduction : Les infections respiratoires aiguës (IRA) restent l'une des principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Au centre de santé de Sado en Mai 2023, nous avons relevé une incidence de 31,25 %. Notre objectif était d'étudier ampleur et caractéristiques liées à la survenue des infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de 5 ans au CS de Sado en 2023.

Méthodes : L'étude transversale et rétrospective à visée descriptive a été réalisée de mars à juin 2023 dans l'arrondissement de Sado, au sud du Bénin. La taille de l'échantillon était de 131 enfants de moins de 5 ans ayant fréquenté le centre de santé de Sado pendant les deux semaines précédant l'étude. Les données individuelles, sociodémographiques, comportementales et environnementales ont été collectées par questionnaire digitalisé administré aux mères des enfants puis analysées à l'aide du logiciel épi info 7.5.2.0.

Résultats : L'âge médian des enfants était de 22,06 mois (6-24mois). La prévalence des infections respiratoires aiguës était de 64,89%. Les caractéristiques présentes chez les enfants souffrant d'infection respiratoire aiguës sont l'âge de la mère compris entre 18 et 28 ans, la source d'énergie utilisée pour la cuisson notamment le bois, la mauvaise hygiène corporelle de l'enfant, et la cohabitation avec les animaux domestiques.

Conclusion : Ces résultats montrent que les infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de 5 ans constituent un problème de santé publique dont la réponse plus dans les comportements et les pratiques des mères et des communautés.

Mots-clés : Infections Respiratoires Aiguës; Enfants De Moins De 5ans; Caractéristiques; Bénin

**Sous-thématique
Communication
libre**

COCL01	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Facteurs prédictifs de la réception de la première dose du vaccin contre la COVID-19 au Bénin

Avahoundje Elias Martinien, Boyi Hounsou Christelle, Bello Kéfilath, Vigan Armelle Akouavi, Agossou Christian, M Agbodjavou Mena K, Gaye Ibrahima, Ba Mouhamadou Faly, Faye Adama, Ridde Valéry, Dossou Jean-Paul

Affiliation : Centre de Recherche en Reproduction Humaine et en Démographie (CERRHUD), Cotonou, Benin. Institute of Health and Development (ISED), Cheikh Anta Diop University, Dakar, Senegal. Faculty of Medicine, Pharmacy and Odontology Cheikh Anta Diop University, Dakar, Senegal. Université Paris Cité, IRD, Inserm, Ceped, F-75006 Paris, France.

Introduction: La vaccination contre la COVID-19 est un outil essentiel dans la lutte contre la pandémie, mais l'adhésion aux programmes de vaccination est un défi majeur, en particulier dans les pays africains. Cette étude visait à identifier les déterminants de l'adoption de la première dose du vaccin contre la COVID-19 en utilisant des données à grande échelle collectées auprès de la population béninoise.

Méthodes: Nous avons mené une étude transversale et analytique à l'aide d'une enquête téléphonique entre décembre 2021 et janvier 2022. L'étude a couvert les Béninois âgés de 18 ans et plus. Un échantillonnage par quotas marginaux ($n = 858$) a été utilisé, avec l'âge, le sexe et le département comme variables de quota. Le questionnaire s'est inspiré de la théorie du comportement planifié et du modèle des croyances relatives à la santé. Une régression logistique binaire a été utilisée au seuil de signification de 5 %.

Résultats: Selon cette étude, 56,9 % des personnes avaient reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19. La probabilité de recevoir la première dose est accrue par la confiance dans le vaccin (ORa = 2,009 ; IC = 1,414-2,853), le fait de trouver la durée d'attente dans les centres de vaccination acceptable (ORa = 1,601 ; IC = 1,128-2,273), le fait de vivre au centre du Bénin (ORa = 2,398 ; IC = 1,461-3,935), le fait de n'avoir rien entendu ou vu de négatif concernant le vaccin (ORa = 1,586 ; IC = 1,444-2,200) et le fait d'avoir un bénéfice perçu élevé (ORa = 1,57 ; IC = 1,003-2,458). Cependant, les principaux obstacles à la vaccination étaient le fait de n'avoir jamais été vacciné à l'âge adulte (ORa = 0,463 ; IC = 0,333-0,643), le fait d'avoir plus de 60 ans (ORa = 0,428 ; IC = 0,220-0,832) et le fait de percevoir le risque de vaccination comme élevé (ORa = 0,669 ; IC = 0,481-0,931). Conclusions: Cette étude a fourni des résultats qui peuvent guider les décideurs dans les programmes de réponse aux épidémies contre la COVID-19 et d'autres pandémies similaires. La couverture vaccinale n'est pas négligeable, mais des efforts sont encore nécessaires, en particulier dans le sud, chez les personnes âgées et les personnes sans expérience vaccinale antérieure. Il est également important d'améliorer la confiance dans le vaccin et de lutter contre la désinformation.

Mots-clés : COVID-19 ; Adoption Vaccinale ; Bénin ; Déterminants ; Santé Publique ; Enquête Nationale.

COCL02	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Effets des mesures de riposte contre la COVID-19 sur l'économie des femmes du secteur non formel au Sud-Bénin

Pierre Gandji, Merveille Akouta, Alphonse M. Affo, Pacôme Acotcheou, Justin Dansou, Jacques Saizonou

Affiliation : Ecole Doctorale Pluridisciplinaire, Espaces, Cultures et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi

Résumé : La Covid-19 est une crise sanitaire qui est venue paralyser l'économie mondiale. Les mesures de riposte mises en place par le gouvernement béninois ont affecté de diverses manières les AGR des femmes du secteur non formel. Les présentes réflexions visent à expliquer les effets des mesures de riposte imposées par le gouvernement sur l'économie des femmes du secteur non formel au Sud-Bénin. Les données proviennent d'une enquête qualitative complémentaire réalisée dans le cadre du projet RISE Bénin. L'enquête a couvert la zone du Cordon Sanitaire (COSAN), celle témoin et au-delà précisément dans 16 communes du Sud-Bénin (Adjarra, Akpro-Misserete, Avrankou, Porto-Novo, Ouidah, Grand-Popo, Comè, Houeyogbé, Dogbo, Abomey-Calavi, Allada, Toffo, Dassa-Zoumé, Savalou, Glazoué et Savè). Au total 158 entretiens individuels approfondis ont été réalisés auprès des artisans, des revendeuses, des responsables des marchés et des hommes chefs ménage. Le choix des répondants a été raisonné et les entretiens ont été enregistrés sur supports magnétiques après leur consentement volontaire. Les résultats montrent qu'au Bénin, ce n'est la maladie elle-même qui est à l'origine de la baisse des revenus des AGR des femmes mais ce sont les mesures de riposte imposées telles que le cordon sanitaire, la distanciation sociale, les restrictions de déplacement, etc. qui ont affecté négativement l'économie des femmes du secteur non formel au Sud-Bénin. La Covid-19 et les mesures de riposte se sont manifestés à plusieurs niveaux, touchant aussi bien la santé publique que les économies, les relations sociales et les modes de vie des groupes vulnérables notamment les femmes, qui tirent leurs moyens de subsistance des activités informelles.

Mots-clés : Effets; Mesures de Riposte; Economie des Femmes; Secteur non Formel; Sud-Bénin

COCL03	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Facteurs associés à l'immunité naturelle contre la COVID-19 au Bénin après 3 ans

Padonou Sètonou Géraud Roméo, Adegbite Bayode Roméo, Accrombessi Manfred , Aguemon Badirou

Affiliation : Département de Santé Publique. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi

Introduction : Ce travail avait pour objectifs d'identifier les facteurs associés à l'immunité naturelle contre la covid-19 au Bénin après 3 ans d'évolution de la maladie.

Méthodes : Une étude transversale descriptive et analytique a été réalisée en milieu hospitalier dans les 12 départements pays et a inclus 3802 sujets. Les données sociodémographiques et cliniques, les antécédents médicaux, les antécédents liés à la covid-19 pour l'enquête et son entourage immédiat, le statut vaccinal et les informations liées au vaccin, ont été recueillies. Des analyses sanguines ont porté sur le statut sérologique avec la détection des différents anticorps anti NCP IgG, anti Spike IgG et le titrage des anticorps totaux. L'immunité naturelle a retenue pour les sujets chez qui on n'a pas détecté l'anticorps anti Spike. Un modèle de régression logistique a été fait pour recherche les facteurs associés à l'immunité naturelle.

Résultats : La séroprévalence de l'immunité naturelle contre la covid-19 était de 38,58% représentant 1467 individus. Les sujets les plus immunisés étaient de la classe d'âge [20 – 40 ans]. La séroprévalence intra cordon sanitaire était de 20,91%. L'immunité naturelle était plus élevée dans le département de l'Atlantique avec 12,37%. Elle était de 21,30% en milieu rural ou semi-rural. Les facteurs associés à une probabilité plus élevée d'avoir une immunité naturelle contre la covid-19 étaient l'âge (OR=1,28 [1,51-2,46]), le sexe féminin (OR=3,57 [1,80-5,84]) et la résidence intra cordon sanitaire (OR=2,41 [1,20-4,17]).

Conclusion : Plus du tiers de la population a développé une immunité naturelle traduisant une grande circulation du virus, surtout chez les sujets jeunes asymptomatiques ou pauci symptomatiques. L'instauration du cordon sanitaire semble aussi avoir favorisé l'immunisation naturelle.

Mots-clés : SarsCov2 – Immunité naturelle – Bénin – Afrique subsaharienne

COCL04	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Qualité de mise en œuvre des modèles de Financement Basé sur les résultats au Bénin

Salami Lamidhi, Makoutode Charles Patrick, Mongbo Virginie, Bedie Vignon, Sossa Jérôme Charles, Ouendo Edgard-Marius, Fayomi Benjamin

Affiliation : Département Politique et Système de Santé de l'Institute Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum

Introduction : Le financement basé sur les résultats (FBR) est décrit comme une intervention générant d'importants résultats dans les services de santé. L'absence de résultats probants y relatifs au Bénin depuis son adoption a suscité cette étude en vue d'analyser, via les fonctions portées par le cadre institutionnel, la qualité de mise en œuvre et les caractéristiques de durabilité des deux modèles de FBR appliqués dans le pays.

Méthodes : L'étude a été conduite en 2015 dans deux zones couvertes par le modèle FBR_PRPS développé par le Projet de Renforcement de la Performance du Système de Santé (PRPS) et deux autres exposées au modèle FBR_PASS exécuté par le Projet d'Appui au Système de Santé (PASS). Les données recueillies par revue documentaire et entretien ont permis de déterminer l'indice de qualité de la mise en œuvre du FBR.

Résultats : Les cinq fonctions clé étaient présentes dans les modèles de FBR dès le démarrage où la fonctionnalité des formations sanitaires était faible, la régulation était irrégulière et de qualité faible. Après trois années, la qualité de mise en œuvre du FBR était en-dessous de la moyenne dans le FBR_PRPS (indice = $52,5 \pm 5\%$) et dans le FBR_PASS (indice = $45,5 \pm 5\%$). Avec des contrats inexistantes ou non évalués, l'insuffisance de ressources, des audits et des contre-vérifications, les fonctions « régulation », « prestation » et « vérification » étaient les plus faibles dans les deux modèles. En somme, la réactivité et l'efficacité étaient faibles dans le FBR_PRPS tandis que la réactivité et l'indépendance étaient faibles dans le FBR_PASS.

Conclusion : La faible qualité de mise en œuvre des deux modèles FBR et les incertitudes du financement, concomitantes au retard de résultats probants, hypothèquent leur pérennité et incitent à doter le pays d'un modèle adapté harmonisé.

Mots-clés : Financement Basé Sur Les Résultats, Qualité, Structure, Bénin, Pérennité

COCL05	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Prévalence et facteurs associés aux infections sexuellement transmissibles chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, initiant la prophylaxie préexposition contre le VIH au Bénin, 2020-2021

Behanzin Luc, Nduwimana Oscar, Guedou Fernand Aimé, Goma-Matsetse Ella, Olodo Marius, Dossouvo Alban, Gangbo Flore, Zannou Djimon Marcel, Alary Michel, Diabate Souleymane

Affiliation : École nationale de formation des techniciens supérieurs en santé publique et en surveillance épidémiologique, Université de Parakou, Parakou, Bénin ; Organisation pour la Promotion de la Santé et le Développement communautaire, Cotonou, Bénin ; Dispensaire IST, Centre de santé communal de Cotonou 1, Cotonou, Bénin ; Département de médecine sociale et préventive, Université Laval, Québec, Québec, Canada ; Centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval, Québec, Québec, Canada ; Département de microbiologie-Infectiologie et d'immunologie, Université Laval, Québec, Québec, Canada ; Programme Santé de Lutte contre le Sida, Cotonou, Bénin ; Faculté des sciences de la santé, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin ; Centre national hospitalier universitaire HMK, Cotonou, Bénin ; Institut national de santé publique du Québec, Québec, Québec, Canada

Introduction : Les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) sont à haut risque d'infections sexuellement transmissibles (IST). Cette étude avait pour objectifs d'estimer les prévalences des IST au sein des HSH séronégatifs pour le VIH, et d'identifier les facteurs associés respectivement à ces infections.

Méthodes : Dans cette étude transversale à visée analytique, les données ont été collectées par un questionnaire semi-structuré. Des échantillons de sang, d'urine, d'écouvillon anal, d'écouvillon de pharynx ont été prélevés. La régression de Poisson a été utilisée pour identifier les facteurs associés.

Résultats : Les prévalences étaient de 18,6 % (IC95%= [13,3 % - 24,0 %]), 15,2 % (IC95%= [10,3 % - 20,1 %]), 9,8 % (IC 95%= [5,7 % - 13,9 %]), respectivement pour l'infection urétrale à *Chlamydia trachomatis* (CT), l'infection multifocale (urétral-anorectal-pharyngé) au *Neisseria gonorrhoeae* (NG), et l'infection anorectale au NG. Les IST étaient généralement asymptomatiques (84,2%). Un seul cas de syphilis a été dépisté. Le fait d'être plus jeune, de ne pas être célibataire, et d'avoir plus de quatre partenaires sexuelles étaient associés aux infections aux CT et NG. L'âge relativement jeune, le rapport sexuel anal réceptif et le sexe transactionnel étaient associés au NG. Seul le sexe anal réceptif était associé au NG anorectal.

Conclusion : Les infections aux NG et CT étaient fréquentes chez les HSH séronégatifs au VIH. De leurs natures extra-génitale et asymptomatique, une stratégie de dépistage systématique des IST devrait être intégrée à tout programme de PrEP au sein des HSH. Les interventions de contrôle et de prévention des IST devraient davantage cibler les jeunes HSH et leurs partenaires sexuelles.

Mots-clés : Gonorrhée ; Chlamydia ; Infections Sexuellement Transmissibles ; Hommes ayant des Rapports Sexuels avec d'autres Hommes ; Béni

COCL06	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Discrimination et étiquetage comme source de discontinuité d'observance thérapeutique chez les PVVIH de l'hôpital de zone de Ouidah

Gnanvi Sèdowoui Copéric Hubert, Bedie Vignon

Affiliation : LASMO/ UAC et IRSP/UAC

Introduction : La prise en charge des PVVIH demeure complexe à cause de discriminations observées non seulement dans le système de prise en charge mais aussi dans les associations et le cercle familial. L'objectif de cette recherche est de montrer l'influence de la discrimination et l'étiquetage sur la qualité de l'observance thérapeutique chez les PVVIH.

Méthodes : Pour expliquer le phénomène de discontinuité d'observance en lien avec les formes de discrimination, une méthodologie basée sur la recherche qualitative a permis d'aborder les acteurs comme : les agents de santé, les leaders des associations de PVVIH, les PVVIH et leur entourage immédiat. Les lectures, les entretiens et les observations permettent de recueillir des données qui sont traitées par l'analyse du contenu. Le modèle d'analyse approprié est la théorie de l'étiquetage modifiée ou l'«analyse stigmatique» revisitée.

Résultats : Les résultats montrent que : la diffusion du statut de séropositivité du PVVIH provoque l'étiquetage dans la sphère sociale, de plus cette dernière est diversement appréciée selon les fonctions sociales du porteur de VIH. Les effets conjugués de l'étiquetage et de la discrimination provoque une cessation temporaire du respect de la prescription médicale des PVVIH.

Conclusion : Il est capital de penser à un accompagnement des PVVIH via leur accompagnateur pour réduire le taux de discontinuité. Ceci reste tributaire des pouvoirs publics à motiver les accompagnateurs de diverses manière dans leur prise en charge. Ainsi les effets d'étiquetage et de discrimination influenceront légèrement la prise en charge des PVVIH.

Mots-clés : Discrimination; Etiquetage; Observance Thérapeutique; Discontinuité; Ouidah

COCL07	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Le « Timanti-bo » : perceptions, pratiques thérapeutiques et itinéraires chez les Tofin d'Ahomey-Lokpo de Sô-Ava

Erick Comlan Gbenou, Vignon Dègbédji Bedie & Abdoulaye Benon Monra

Affiliation : 1= Département de Sociologie-Anthropologie, Université d'Abomey-Calavi, 2= Institut Régional de Santé Publique/Université d'Abomey-Calavi, 3=Université d'Abomey-Calavi

Introduction : L'érysipèle, une dermo-hypodermite aiguë causée par le streptocoque β hémolytique du groupe A, est localement appelée le « Timanti-bo ». Cette maladie affecte la santé physique ainsi que les pratiques culturelles et sociales des individus. Cette étude se concentre sur les itinéraires thérapeutiques des malades du « Timanti-bo » chez les Tofin d'Ahomey-Lokpo centre, en examinant les interactions entre croyances populaires, pratiques médicales traditionnelles et modernes, et dynamiques socio-économiques.

Méthodes : Une approche qualitative a été adoptée, incluant recherche documentaire, des entretiens individuels (avec guide structuré) et une observation directe. Les données ont été analysées selon une méthode thématique, permettant d'identifier les axes d'interprétation des pratiques thérapeutiques.

Résultats : La maladie du « timanti-bo » est perçue comme dangereuse et potentiellement mortelle, se manifestant par des boutons rouges douloureux et des abcès. Les habitants associent ses causes à un environnement humide ou à des actes de méchanceté. Les traitements combinent soins traditionnels et modernes, incluant antibiotiques et remèdes à base de plantes. Les décisions thérapeutiques sont souvent influencées par les proches, qui peuvent imposer des traitements traditionnels ou des sacrifices. Les choix de traitement sont déterminés par des facteurs culturels, économiques et sociaux. La culture locale favorise les traitements traditionnels, tandis que les coûts élevés des soins modernes poussent certains à privilégier les remèdes traditionnels, perçus comme plus accessibles. Les relations familiales et le cadre de vie jouent également un rôle crucial dans les décisions thérapeutiques, avec des aides financières provenant parfois de proches ou par l'hypothèque de biens.

Conclusion : Une approche intégrée combinant éducation, sensibilisation culturelle et soutien économique est essentielle pour améliorer la prise en charge des maladies comme le « Timanti-bo ».

Mots-clés : Érysipèle; perceptions; pratiques thérapeutiques; itinéraire thérapeutique; Sô-Ava

COCL08	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Perceptions des acteurs sur la loi améliorant l'accès au service d'avortement sécurisé dans la commune de Bohicon au Bénin

Audrey Sémévo Eunice Amoussou¹, Affo M. Alphonse², Jonna Both³, Ramatou Ouedraogo⁴

Affiliation : 1= LAMA/UAC; 2= CEFORP/UAC; 3= Rutgers, Pays-Bas; 4= APRHC/Kenya

Résumé : Pour réduire le poids des avortements clandestins sur les décès maternels, les autorités béninoises ont entrepris une réforme allégeant des conditions d'accès à un avortement sécurisé. Cette modification législative élargit désormais les conditions d'accès à un avortement sécurisé en prenant en compte les motifs socio-économiques. Portée par la théorie des représentations sociales, cet article vise à analyser les perspectives des acteurs communautaires sur cette loi dans la commune de Bohicon. Cette étude repose essentiellement sur une approche qualitative à l'aide des entretiens individuels (14) et collectifs (5) en communauté. La collecte de données a été effectuée dans quatre arrondissements, dont les deux arrondissements urbains (Bohicon 1 et 2) et deux autres ruraux (Sodohomé et Saclo). Les catégories d'acteurs interrogées sont : des parents, des jeunes garçons et filles, les leaders communautaires et religieux, les acteurs d'ONG et assistante sociale. Ces données ont été transcrits et traités à travers un tri-thématique et une analyse de contenu. Ce travail relève un manque de communication autour de la loi, qui induit une faible connaissance de la loi sur l'avortement et une émergence des rumeurs dans un contexte où la bouche à oreille est la principale source d'information des acteurs. Les dynamiques socioculturelles influencent l'accès des femmes à l'information formelle et limitent leurs autonomies en matière de santé reproductive. La désinformation renforce les perceptions négatives de loi dans une arène où l'avortement est perçu comme une transgression. Cependant, certains acteurs sont favorables à la loi en valorisant les bénéfices de l'accès à l'avortement sécurisé, minimisant l'influence des normes sociales. Quant aux opposants, ils affichent des craintes éducatives et religieuses liées à la sexualité des jeunes et leur avenir. Selon les parents, cette loi fragilise le pouvoir et l'effort des parents en matière d'éducation de leurs enfants. Elle contribuerait davantage à l'irresponsabilité chez les jeunes en matière de sexualité. Pour les leaders religieux, la promotion de l'avortement sécurisé expose à de graves conséquences spirituelles qui entravent l'épanouissement et le développement d'un individu, et de la Nation. A cet effet, il est nécessaire d'intensifier des efforts de sensibilisation et d'éducation sur loi, répondant aux besoins du contexte local pour une meilleure compréhension et une transformation des perceptions.

Mots-clés : Avortement Sécurisé; Loi; Perceptions Sociales; Acteurs; Bénin

COCL10	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Evaluation du système de surveillance épidémiologique de la rougeole en 2023 dans le département de la Donga au Bénin

Salifou-Issaka Sanni¹, Houemenou Modeste¹, Noudeke Nestor², Houssou Mathilde¹

Affiliation : 1= Ministère de la Santé du Bénin ; 2= Bureau AFENET Bénin.

Introduction : La rougeole est une maladie virale hautement contagieuse causée par un Morbillivirus qui touche, selon l'OMS, plus de 30 millions d'enfants dans le monde et provoque près de 777 000 décès chaque année, dont plus de la moitié en Afrique. Au Bénin, cette maladie est endémique. L'objectif de cette étude est d'évaluer le système de surveillance de la rougeole dans le département de la Donga au Bénin de 2019 à 2023.

Méthodes : Notre étude est transversale descriptive. Les directives actualisées du guide « CDC-Atlanta 2001 » ont été utilisées pour évaluer le fonctionnement et les attributs. Des interviews ont été réalisées auprès de 56 agents de la surveillance. Les données ont été analysées avec Epi-info 7.2 au seuil de 80% comme objectif à atteindre pour chaque attribut. Des fréquences relative et absolue ont été calculées.

Résultats : La définition de cas était simple et facile à utiliser pour 98,65% des enquêtés. Le circuit de notification était simple selon 55% des enquêtés. La promptitude des notifications était de 99% avec une complétude des rapports de 100%. Les données reflètent les caractéristiques des cas en termes de temps, lieu et personne d'où une bonne représentativité. Les cas provenaient des 4 communes. Le système a permis la détection de l'épidémie en 2019 et en 2021. Les investigations et la riposte vaccinale ont été réalisées.

Conclusion : Le système de surveillance de la rougeole dans la Donga était utile, simple, acceptable, représentatif. La sensibilisation des agents sur le circuit de notification et le bon remplissage des fiches de notification rendra le système plus performant.

Mots-clés : Evaluation ; Surveillance ; Rougeole ; Donga ; Bénin

COCL11	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Prévalence et facteurs associés aux accidents d'exposition au sang (AES) chez le personnel de santé d'un CHU de zone au Bénin

Mikponhoué R, Gnonlonfoun E, Adjobimey M, Hinson AV, Ayélo P

Affiliation : Unité de recherche et d'enseignement en santé au travail et environnement de la faculté des sciences de la santé de Cotonou

Introduction : Les accidents d'exposition au sang (AES) constituent l'accident du travail (AT) le plus fréquent en milieu de soins. Objectif : Déterminer la prévalence et les facteurs associés aux AES chez le personnel de santé d'un CHU de zone au Bénin

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive à visée analytique. La collecte des données a été réalisée de mai à octobre 2024. Elle a inclu tout personnel soignant et agent d'entretien exerçant les services de médecine interne, chirurgie, des urgences, maternité/gynécologie, pédiatrie, service d'hygiène, laboratoire, et bloc opératoire du CHUZ. Les données relatives aux AES, aux conduites tenues après leur survenue ont été collectées. Elles ont été analysées avec le logiciel Epi info7.2.4.0. Une régression logistique binaire a permis d'identifier les facteurs associés. Le seuil de significativité était de 5%.

Résultats : Au total, 304 agents dont 219 femmes soit un sexe ratio H/F de 0,38. L'âge moyen était de 35 ans (29 ; 43). Sur les 304, 173 agents (57%) étaient formés sur les AES. La prévalence des AES était de 34,5 %. La moitié (54 %) des agents ont déclaré leurs AES au service de gestion des AES de l'hôpital ; aucun n'a été déclaré à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La longue durée des interventions chirurgicales (OR= 1,94 ; p=0,012), l'absence de formation sur l'AES (OR= 2,79 ; p=0,000) et le non port d'équipement de protection (OR= 2,46 ; p=0,002) étaient les facteurs associés.

Conclusion : l'étude souligne l'importance de mettre en place des actions d'information et de formations continues sur les AES et la nécessité de déclaration à la CNSS.

Mots-clés : Prévalence, Facteurs associés, Accident d'exposition au sang, personnel de santé.

COCL12	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Acceptabilité et faisabilité de la chimioprophylaxie par une dose unique de rifampicine dans quatre districts du Bénin endémiques à la lèpre

Mignanwande Zinsou Franck Maurille

Affiliation : Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Introduction : La chimioprophylaxie par la rifampicine en dose unique (RDU) est une mesure préventive recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé pour limiter la transmission de la lèpre. Cette étude a été réalisée pour évaluer l'acceptabilité et la faisabilité de cette mesure au Bénin.

Méthodes : Cette étude axée sur l'intervention, menée de septembre 2019 à août 2020 a inclus les contacts des personnes touchées par la lèpre (PAL). Elle a évalué les connaissances des contacts sur la lèpre et les perceptions de la RDU, et identifié les raisons de refus. Des entretiens ont ensuite été menés avec les contacts des PAL qui ont donné leur consentement éclairé. Leurs perceptions de la chimioprophylaxie par le RDU ont été évaluées. Enfin, les contacts ont été sensibilisés sur l'importance du RDU, qui a ensuite été administré. Après les entretiens et la sensibilisation, tous les contacts éligibles ont été examinés cliniquement et les nouveaux PAL ont été traités avec une polychimiothérapie.

Résultats : 9 941 contacts ont été enregistrés autour de 197 PAL. Après avoir interrogé 394 contacts, 88,8% avait des connaissances insuffisantes sur la lèpre. Parmi ces contacts, 58,6 % ont accepté de recevoir une chimioprophylaxie. Ils étaient prêts à prendre le temps nécessaire pour le traitement (74,5%), à parcourir de longues distances (83,1%) et à prendre le médicament aussi souvent que possible (90,0%). L'état civil ($p=0,008$), le niveau d'éducation ($p=0,000$) et les connaissances sur la lèpre ($p=0,000$) sont statistiquement liés à l'acceptation de la chimioprophylaxie. Parmi les 9 941 contacts sensibilisés, 6 798 ont fait l'objet d'un examen clinique et 6 416 ont reçu une RDU. Huit nouveaux patients de la lèpre ont été identifiés et traités par polychimiothérapie.

Conclusion : Il est important d'accroître la sensibilisation pour améliorer les connaissances sur la lèpre afin de contribuer à l'acceptation de la chimioprophylaxie.

Mots-clés : Lèpre; Chimioprophylaxie; Rifampicine; Communautés Endémiques; Bénin.

COCL13	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

L'augmentation du taux de progestérone induite par l'exercice ne modifie pas les valeurs de la CVF et du VEMS chez les femmes non asthmatiques

Messan Folly, Donouvi Jérôme, Lawani Mohamed Mansourou

Affiliation : Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique et du Sport (INJEPS)

Introduction : Les niveaux de progestérone augmentent à la suite de différentes modalités d'exercice chez les femmes sportives non ménopausées. La progestérone est également impliquée dans la dilatation des voies respiratoires en cas de bronchospasme induit par l'exercice (BIE) chez les femmes sensibles. Objectif : Déterminer l'effet d'un test d'effort maximal sur la progestérone, la CVF et le VEMS à la phase lutéale du cycle menstruel chez des femmes non entraînées et non sensibles au bronchospasme.

Méthodes : Onze jeunes filles pré-ménopausées ont été recrutées. Pendant la phase lutéale de leur cycle menstruel, des explorations sanguines et respiratoires ont été effectuées avant et après un test d'effort complet sur bicyclette ergométrique. La progestérone a été dosée et la CVF et le VEMS ont été déterminés.

Résultats : La valeur moyenne de la progestérone sérique observée après l'exercice ($74,866 \pm 24,68$ Nmol / L) était significativement ($p < 0,05$) plus élevée que celle enregistrée ($66,072 \pm 24,33$ Nmol / L) avant l'exercice. Les valeurs moyennes de la CVF ($2,20 \pm 0,5$ L) et du VEMS ($1,90 \pm 0,4$ L) observées avant l'exercice et celles enregistrées après l'exercice ($2,10 \pm 0,6$ et $2,10 \pm 0,8$, respectivement), n'étaient pas significativement différentes ($p > 0,5$).

Conclusion: La progestérone, hormone bronchodilatatrice, n'influence pas les voies respiratoires chez les sujets peu sensibles au bronchospasme, alors que l'exercice physique induit un niveau élevé de cette hormone.

Mots-clés : Progestérone; VEMS; CVF; Bronchospasme; Effort

COCL14	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Performance du système de gestion de la chaîne d’approvisionnement des médicaments et des vaccins dans le secteur public au sud du Bénin : défis, enjeux et solutions innovantes

Degbey Ornella Farida Merveille

Introduction : Les médicaments et les vaccins (MV) sont des produits de santé essentiels, contribuant à l’amélioration et au maintien d’un état de santé optimal chez les populations. Leur disponibilité et accessibilité à tous les niveaux du système sanitaire sont des facteurs déterminants pour la fiabilité et la durabilité de la chaîne d’approvisionnement, conformément à la politique pharmaceutique nationale. Le système de gestion de cette chaîne d’approvisionnement repose sur une organisation coordonnée et intégrée, visant à garantir la disponibilité de produits de qualité pour répondre aux besoins de santé. Cependant, diverses études menées au Bénin ont révélé des dysfonctionnements, notamment liés aux transports, entraînant des ruptures de stocks de MV. Cette recherche se propose donc d’étudier le fonctionnement et la performance de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur public au sud du Bénin.

Méthodes : La thèse s’articulera autour de quatre études. La première sera une étude transversale, descriptive et évaluative, axée sur l’analyse de la performance actuelle du système de gestion de la chaîne d’approvisionnement des MV dans cette région. Les données recueillies serviront ensuite à identifier les facteurs associés à cette performance, grâce à une analyse par composantes principales (ACP). Sur cette base, nous élaborerons des stratégies de renforcement et un plan opérationnel de mise en œuvre. Enfin, nous évaluerons l’impact de ces stratégies sur la performance du système, en nous concentrant sur le département du Littoral. Cette étude couvrira les six départements du sud du Bénin : Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Ouémé et Plateau.

Résultats : À ce jour, les résultats ne sont pas disponibles, en raison de la collecte des données qui est toujours en cours.

Conclusion : Cette recherche vise à proposer des solutions pour optimiser la gestion de la chaîne d’approvisionnement en MV, en identifiant les leviers d’amélioration et les facteurs déterminants de performance dans le secteur public béninois.

Mots-clés : Mots-clés : Performance; Médicaments; Vaccins; Chaîne d’approvisionnement; Système.

COCL16	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Education à la Santé Sexuelle au Collège Catholique Père Aupiais de Cotonou : Effets de la mise en œuvre

Akoha Félicité , Ahissou Ursule , Ogoudjobi Mathieu , Tshabu Aguemon Christiane.

Affiliation : Institut National Médico-Sanitaire / Université d'Abomey-Calavi, Bénin ; Faculté des Sciences de la Santé / Université d'Abomey-Calavi

Introduction : La santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes est un domaine très sensible en Afrique subsaharienne. Néanmoins, une éducation sexuelle complète depuis l'école rendrait les adolescents plus responsables de leur sexualité. L'Etat béninois a compris ce besoin des adolescents et a adhéré aux conventions internationales en faisant sienne cette réalité dans son programme de formation. L'objectif de cette étude est d'évaluer les effets de la mise en œuvre de l'Education à la Santé Sexuelle (ESS) sur les comportements des apprenants du Collège Catholique Père Aupiais (CCPA) de Cotonou.

Méthodes : Une étude transversale évaluative s'était déroulée en 2023 dans ce collège. Une méthode probabiliste avec une technique d'échantillonnage stratifié a été utilisée. Elle a ciblé les élèves adolescents de 14 à 19 ans inscrits au Collège, ayant suivi les cours au moins un an ; des enseignants d'Education Affective répondant aux critères d'inclusion et du Père-Censeur. Le pourcentage obtenu par variable et sous composante a été apprécié selon une échelle adaptée à celle de mesure de VARKEVISSER.

Résultats : Tous les enseignants d'Education Affective du collège ont été formés, il existe un comité de pilotage du projet. Le climat est favorable aux cours mais les difficultés liées au tabou ne permettent pas aux élèves de poser toutes les questions. Sur les 254 élèves enquêtés, 51,96% ont pu donner une réponse correcte de la santé, 28,34% ont déjà eu des rapports sexuels et 16,1% de ceux-ci ont essayé des rapports sexuels à plus de 2 personnes. Les composantes de structure et de processus ont été jugées moyennes tandis que celles des résultats ont été mauvaises. D'où la mauvaise qualité de la mise en œuvre de l'ESS au CCPA de Cotonou en 2023.

Conclusion : Elargir les axes d'orientation du cours d'affectivité au-delà du développement d'attitudes des apprenants serait une option considérable.

Mots-clés : Education ; Santé Sexuelle ; Collège Catholique Père Aupiais Cotonou ; Effet

COCL17	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Connaissances, attitudes et pratiques des adolescentes et jeunes filles du Collège d'Enseignement Général d'Adjohoun en matière d'hygiène menstruelle

Akoha Félicité , Sodagbodji Peace , Afle F. Cyr Doscoph , Atanhloueto Inès , Ezin Siméone , Tshabu Aguemon Christiane

Affiliation : Institut National Médico-Sanitaire / Université d'Abomey-Calavi, Bénin ; Laboratoire Contrôle Qualité des Eaux / Agence Nationale de Contrôle de Qualité des produits de santé et de l'eau, Ministère de la Santé ; Zone sanitaire Cotonou 6 ; Faculté des Sciences de la Santé / Université d'Abomey-Calavi

Introduction: La gestion de l'hygiène menstruelle est l'ensemble des stratégies mises en œuvre par les femmes lors des périodes de menstruation pour maintenir une bonne santé et avoir un bon épanouissement aussi bien personnel que professionnel. L'objectif de cette étude était d'évaluer les connaissances, attitudes et pratiques des jeunes filles d'Adjohoun en matière d'hygiène menstruelle.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive effectuée en 2023 au Collège d'Enseignement Général d'Adjohoun. Une méthode non probabiliste avec une technique de choix raisonné des filles menstruées de plus de 10 ans a été utilisée.

Résultats : Sur 103 adolescentes et jeunes filles enquêtées, 59,22% affirme que le nombre de temps que dure normalement les règles est de 5 jours. Il est nécessaire de mettre des protections pendant les règles (88,35%) car cela sert de protection contre les infections (47,25%) et pour l'hygiène du corps (46,15%). La majorité des filles enquêtées ne dispose pas d'une bonne connaissance de la définition d'un cycle menstruel ; 15,53% des filles affirment avoir déjà manqué les cours à cause de la douleur qu'engendrent les menstruations ; 63,11% des filles affirment utiliser des garnitures traditionnelles lavables et réutilisables comme protection ; 46,60% affirment que le nombre de fois qu'elles changent de serviettes pendant la journée est d'au moins 2 fois et pour 45,63% c'est 4 à 5 fois la journée. Des filles (68,93%) arrivent à changer leur protection dans leur école contre 31,07% qui n'y arrivent pour des raisons de confort des infrastructures et d'indisponibilité d'eau.

Conclusion : Cette étude a permis de mieux appréhender les défis auxquels sont soumis les adolescentes et jeunes filles en matière d'hygiène menstruelle dans nos collèges. Les

Résultats montrent que les élèves n'ont pas une bonne connaissance ni une bonne pratique en matière d'hygiène menstruelle. Une action éducative à l'endroit de cette cible s'avère indispensable.

Mots-clés : Connaissances ; Attitudes ; Pratiques ; Hygiène Menstruelle ; Collège d'Enseignement Général d'Adjohoun

COCL18	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Elève adolescente enceinte au Bénin : Honneur pour certains parents

Akoha Félicité , Aka Joseph , Tiembre Issaka , Ouendo Edgard-Marius D.

Affiliation : Institut National Médico-Sanitaire / Université d'Abomey-Calavi, Bénin ; Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire ; Institut Régional de Santé Publique, Bénin

Introduction : Les grossesses chez les élèves de 10 à 15 ans, soulèvent de nombreuses questions, notamment associé à une perception de fierté chez certains parents. Ce paradoxe mérite une analyse approfondie, car il révèle des enjeux sociaux, culturels et psychologiques complexes. Cette publication rappelle aux parents que la grossesse précoce en milieu scolaire ne devrait pas être considérée comme un honneur, mais plutôt une violation des droits de l'enfant, notamment le droit à l'éducation et à la santé.

Méthodes : L'enquête transversale qualitative réalisée en 2021 dans 42 établissements d'Enseignement Secondaire Technique et de la Formation Professionnelle du Bénin, a concerné les éducateurs en santé sexuelle et les élèves adolescentes de ces établissements. La sélection des élèves était par la méthode probabiliste ; les éducateurs, non probabiliste avec un choix par commodité.

Résultats : Trois propos recueillis de trois éducateurs présentés dans des Encadrés 1, 2 et 3 ont motivé la tenue de cette présentation. Plusieurs facteurs peuvent expliquer les réactions des acteurs de l'Education à la Santé Sexuelle présentées dans les Encadrés : les normes sociales et culturelles ; la pression sociale et familiale ; une insuffisance d'éducation et d'information puis les difficultés personnelles. Néanmoins, cette perception de la grossesse précoce comme un honneur entraîne de nombreuses conséquences négatives sur la fille-mère, sa famille et la communauté, comme l'interruption des études, les problèmes de santé, l'exclusion sociale, le cycle de la pauvreté entretenu sur des générations. Il est important de dissuader ces genres de pensées dans les communautés aux fins d'un développement durable.

Conclusion : Des actions concrètes sur les facteurs indiqués méritent d'être menées, nécessitant une approche multidimensionnelle. Il est essentiel de travailler sur les normes sociales, de renforcer les systèmes éducatifs, de lutter contre les inégalités et de proposer des services adaptés aux jeunes mères.

Mots-clés : Elève adolescente enceinte ; Honneur ; Parents ; Bénin

COCL19	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Evaluation du risque sonore et sante auditive des agents dans une societe de production alimentaire Au Gabon

Mikponhoue Olou Rose, Tidjani Moustapha Faissolath Adjobimey Vissoh Mênonli, Mama Cisse Ibrahim, Gounongbe Fabien, Moussavou Félicien, Hinson Antoine Vikkey, Ayelo Paul

Affiliation : 1= Unité d'enseignement et de recherche en santé au travail et environnement de la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou , 2= Faculté de Médecine de l'Université de Parakou , 3= Service de santé au travail de la société de production d'eau au Gabon

Introduction : L'exposition au bruit sur le lieu de travail est susceptible d'affecter la santé des travailleurs. Au Gabon, une étude réalisée dans l'usine de production d'eau avait pour objectifs de mesurer les niveaux sonores et d'apprécier l'état auditif des salariés exposés.

Méthodes : il s'est agi d'une étude transversale descriptive qui s'est déroulée sur un mois dans l'usine. Elle a porté sur les agents techniques exerçant dans l'usine, au contact des machines bruyantes. Les niveaux sonores ont été mesurés grâce à un sonomètre et chaque agent exposé a bénéficié d'une otoscopie et d'un audiogramme. Les données ont été analysées avec le logiciel EPI DATA3.1

Résultats : Un total de 54 agents dont deux de sexe féminin ont été inclus. L'âge moyen était de 42,3 + 4,2ans [24-59 ans]. La durée moyenne du travail journalier était de 8heures et l'ancienneté moyenne au poste de travail était de 13,23 ans. La cartographie du bruit dans les salles de machine avait montré des niveaux sonores variant entre 85,7 et 107 dBA ; la salle de supervision avait un niveau de bruit de 68 dB A. Le port d'EPI n'était pas systématique. Parmi les symptômes présentés, les acouphènes (40,7%) et les troubles du sommeil (24,1%) prédominaient. Aucune otoscopie n'était pathologique. L'incidence du déficit auditif était de 11,1%. Aucune surdité professionnelle n'avait été identifiée.

Conclusion : Les niveaux sonores dans les salles techniques étaient élevés, nécessitant des actions correctives et l'insistance sur le port effectif des EPI.

Mots-clés : Risque Sonore ; Santé Auditive ; Société de Production ; Gabon

COCL20	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Pratique des jeux de hasard et d'argent en salle : prévalence des troubles liés à l'usage et facteurs associés au Bénin en 2024

Chabi Olaniran Alphonse Biaou^{1,2}, Lamidhi Salami³, Yolaine Glèlè Ahanhanzo³, Moussiliou Paraïso³, Emmanuel Sambieni⁴, Smaïla Ouedraogo⁵, Blaise A. Choki², Géoffroy S. Atakpa⁶, Paul Gounnou⁶, Rolande Kikissagbé⁶, Akpovi Houngnovi², Joaquin Aifa²

Affiliation : 1= Université d'Abomey-Calavi, Ecole Doctorale des Sciences de la Santé, Cotonou, Bénin, 2= Ministère de la Santé du Bénin, Direction Départementale de la santé des collines, Dassa-Zoumé, Bénin 3= Université d'Abomey-Calavi, Institut Régional de Santé publique, Ouidah, Bénin 4= Université de Parakou, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Parakou, Bénin 5= Université Joseph Ki-Zerbo, Unité de formation et de recherche en sciences de la santé, Ouagadougou, Burkina Faso

Introduction : L'essor rapide des jeux de hasard et d'argent (JHA) en Afrique subsaharienne soulève des préoccupations croissantes en matière de santé publique, en raison de leurs conséquences. Cette étude vise à estimer la prévalence des troubles liés à l'usage des JHA et à identifier les facteurs qui leur sont associés dans une population de joueurs en salle au Bénin.

Méthodes : Une étude transversale a été menée auprès de 1025 clients des salles de jeux de la Loterie Nationale du Bénin, recrutés de manière consécutive dans les établissements les plus fréquentés de Cotonou, Dassa-Zoumé et Parakou. Les données ont été recueillies par entretien direct à l'aide d'un questionnaire structuré intégrant les critères diagnostic du DSM-V. Une régression logistique multivariée a permis d'identifier les facteurs associés, au seuil de 5 %.

Résultats : La prévalence globale des troubles liés aux JHA était de 85,76 %, dont 24,39 % de formes légères, 28,68 % modérées et 32,68 % sévères. Les facteurs associés étaient : l'absence d'instruction (ORa = 2,31 ; p = 0,004), le niveau primaire (ORa = 1,53 ; p = 0,043), vivre en famille nucléaire (ORa = 1,54 ; p = 0,011), la consommation problématique d'alcool (ORa = 1,64 ; p < 0,001) et de tabac (ORa = 2,26 ; p < 0,001), une forte estime de soi (ORa = 0,64 ; p = 0,021), l'exposition aux publicités sur les JHA (ORa = 1,55 ; p = 0,005), l'appartenance à un groupe d'échange d'astuces de jeu (ORa = 1,49 ; p = 0,006), l'influence des amis ou proches (ORa = 1,70 ; p < 0,001), jouer 1 à 3 fois par semaine (ORa = 2,18 ; p < 0,001) ou tous les jours (ORa = 3,21 ; p < 0,001), et la pratique des paris sportifs (ORa = 1,75 ; p = 0,001).

Conclusion : Ces résultats révèlent une situation préoccupante qui appelle à un renforcement de la régulation des JHA, à la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et à la création de dispositifs d'accompagnement pour les joueurs à risque.

Mots-clés : Jeux De Hasard Et D'argent ; Troubles Liés A L'usage ; Facteurs Associés ; Santé Publique ; Bénin

COCL21	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Jeu pathologique chez les étudiants de la FSS en 2024 : Prévalence et facteurs associés

Elvyre Klikpo¹, Benjamin Zannou¹, Alphonse Kpozehouen², Yolaine Glele Ahanhanzo²

Affiliation : 1= Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin , 2= Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Introduction : Le jeu est une forme de divertissement courante qui a longtemps été considérée comme une activité récréative inoffensive sans conséquences néfastes. Bien que la plupart des gens jouent de manière responsable, certains joueurs développent un comportement problématique dénommé "jeu pathologique". Les effets néfastes et répandus du jeu pathologique en ont fait un problème de santé publique croissant dans le monde entier. L'objectif de cette étude était d'évaluer la prévalence et les facteurs associés au jeu pathologique chez les étudiants de la faculté de sciences de la santé (FSS) de Cotonou.

Méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale descriptive et analytique. Elle a porté sur les étudiants régulièrement inscrits à la FSS en 2024, sélectionnés selon un échantillonnage aléatoire stratifié. La collecte des données s'était déroulée du 13 août au 30 août 2024 auprès des étudiants de la FSS de Cotonou. Un questionnaire en ligne comportant les renseignements sociodémographiques, scolaires et le test SOGS (South Oaks Gambling Scale) a été utilisé.

Résultats : Sur 313 étudiants ayant accepté participer à l'étude et ayant fourni des informations exploitables. La prévalence du jeu pathologique était de 7,01%. Les joueurs pathologiques étaient principalement de sexe masculin ; l'âge moyen était de 21 ans +/- 2,11 et avaient au moins un proche joueur. Les facteurs associés au jeu pathologique chez les étudiants étaient : assurer soi-même sa subsistance (p-value = 0,009 ; OR :50 ; 20 ; IC : [2,69-936,91]), initier autrui au jeu d'argent (p-value = 0,023 ; OR : 6,81 ; IC : [1,30-35,78]) et jouer avec de gros montant (p-value = 0,006 ; OR :18,70 ; IC : [2,28-153,19]).

Conclusion : La prévalence du jeu pathologique chez les étudiants de la Faculté des sciences de la santé est non négligeable. Des actions de prévention se doivent d'être menées afin de fléchir la tendance de ce problème de santé public.

Mots-clés : Jeu Pathologique; Prévalence; Facteurs Associés; Etudiants; FSS

COCL22	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Les habitudes et conséquences des jeux de hasard et d'argent chez les jeunes : Une analyse sexospécifique à partir des données scolaires au Bénin

Chabi Olaniran Alphonse Biaou^{1,2}, Lamidhi Salami³, Yolaine Glele Ahanhanzo³, Moussiliou Paraïso³, Emmanuel Sambieni⁴, Smaïla Ouedraogo⁵, Blaise A. Choki², Tanguy A. M. Dansou Sonou⁶, Paul Gounnou⁶, Rolande Kikissagbe⁶, Akpovi Houngnovi², Joaquin Aifa²

Affiliation : 1= Université d'Abomey-Calavi, Ecole Doctorale des Sciences de la Santé, Cotonou, Bénin , 2= Ministère de la Santé du Bénin, Direction Départementale de la santé des collines, Dassa-Zoumé, Bénin, 3= Université d'Abomey-Calavi, Institut Régional de Santé publique, Ouidah, Bénin, 4= Université de Parakou, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Parakou, Bénin , 5= Université Joseph Ki-Zerbo, Unité de formation et de recherche en sciences de la santé, Ouagadougou, Burkina Faso, 6= Université de Parakou, Ecole Nationale des Techniciens Supérieurs en Santé Publique et en Surveillance Epidémiologique, Parakou, Bénin

Introduction : Cette étude vise à analyser la pratique des jeux de hasard et d'argent (JHA) à travers une approche sensible au genre, en vue de mieux comprendre les différences entre garçons et filles en matière de motivations, de comportements et d'exposition aux risques.

Méthodes : Il s'agit d'une étude transversale menée auprès de 1831 collégiens des établissements scolaires de trois villes du Bénin et sélectionnés par échantillonnage aléatoire en grappe. Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire auto-administré, intégrant l'indice canadien du jeu excessif et les critères diagnostiques du DSM-5 pour les troubles liés à l'usage de jeu et l'échelle HAD pour l'évaluation de l'anxiété et la dépression. Une analyse comparative selon le sexe a été réalisée afin d'identifier les spécificités comportementales et psychologiques liées aux JHA chez les garçons et les filles.

Résultats : La prévalence des JHA est de 18,62 % et est plus élevée chez les garçons (32,03 %) que chez les filles (6,46 %, $p < 0,001$). Le jeu excessif (22,58 % vs. 11,29 %, $p = 0,046$) et les troubles liés au jeu (45,51 % vs. 30,64 %, $p = 0,039$) touchent davantage les garçons, qui privilégient les paris sportifs ($p < 0,001$), investissent plus d'argent ($p = 0,003$) et subissent plus de pertes ($p = 0,001$). Les filles, plus attirées par la loterie. L'anxiété est plus fréquente chez les filles (80,65 % vs. 63,80 %, $p = 0,021$), tandis que la dépression ne varie pas selon le sexe. L'âge d'initiation ($p = 0,352$) et la fréquence du jeu ($p = 0,055$) sont similaires, mais les motivations diffèrent ($p < 0,001$) : l'appât du gain et la volonté de récupérer les pertes dominant chez les garçons, tandis que les filles jouent par ennui, curiosité ou pour socialiser.

Conclusion : L'intégration d'approches différenciées selon le sexe pourrait permettre une meilleure prise en charge et prévenir les conséquences négatives de la pratique des JHA sur la santé mentale et le bien-être des jeunes.

Mots-clés : Jeux De Hasard Et D'argent; Genre; Adolescents et Jeunes; Conséquences Psychosociales; Bénin

COCL23	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Régime contenant des beta lactamines pour le raccourcissement du traitement de l'ulcère de Buruli en Afrique de l'Ouest : point d'étape de l'essai clinique

Anagonou Sèdjro Gimatal Esaï

Affiliation : Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable, Université d' Abomey-Calavi, Bénin ;

Introduction : L'organisation Mondiale de Santé (OMS) recommande pour l'Ulcère de Buruli (UB) l'administration de rifampicine (R) et clarithromycine (C) pendant 8 semaines (RC8). Des études précliniques ont démontré que l'association amoxicilline/clavulanate (A) et RC présente une grande efficacité in vitro contre Mycobacterium ulcerans. L'objectif est d'évaluer la non-infériorité d'un régime de 4 semaines de A combiné à la RC (RCA4) par rapport au traitement standard sur 12 mois.

Méthodes : L'essai comprend des études de phase II et III randomisées, ouvertes, de non-infériorité et multicentriques. Les patients ont été recrutés activement et passivement et inclus après un diagnostic clinique (score d'UB très probable ou probable de l'OMS), confirmé par qPCR IS2404, stratifié en fonction de la catégorie de lésion de l'UB et suivi pendant 12 mois avec une prise en charge standardisée. Le critère principal d'efficacité est la proportion de patients présentant une guérison complète des lésions sans récurrence et sans excision chirurgicale majeure 12 mois après le traitement.

Résultats : L'essai de phase II au Bénin a recruté 123 participants. La répartition femme-homme est de 1,36 ; environ 50% des participants ont un âge < 15ans. Plus de 90% des participants présentent une seule lésion (membres inférieurs). Les lésions de catégorie III sont plus fréquentes (46 %). L'allocation du traitement est équilibrée entre les deux bras. 97 ont terminé le suivi à 12 mois et aucun d'entre eux n'a eu besoin d'une chirurgie d'excision majeure. Seuls des événements indésirables ou des effets secondaires légers et transitoires ont été enregistrés. Avec plus de 85% de la cible recrutée (80% de puissance requise), le traitement expérimental RCA4 démontre son innocuité. Une évaluation de non-infériorité de l'efficacité sera réalisée à la fin de l'étude. L'essai de phase III est actuellement en cours et a recruté 62 participants au Togo et en Côte d'Ivoire.

Conclusion : Ce traitement plus court, entièrement oral et largement adapté, pourrait établir un nouveau paradigme pour la prise en charge de l'UB.

Mots-clés : Mots-clés : Essai Clinique; Ulcère De Buruli; Afrique De L'ouest

COCL24	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Séroprévalence et facteurs de risque associés à l'infection par le virus influenza D chez les bovins en zones périurbaines de Dakar et Thiès, Sénégal

Mireille Catherine Kadja, Daouda Ouedraogo, Laibané Dieudonné Dahourou, Edmond Onidje, Souhaibou Sourokou Sabi, Mariette F. Ducatez, Benjamin Obukowho Emikpe, Rianatou Bada Alambédji

Affiliation : École Inter-États des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar

Résumé : Les infections dues au virus de l'influenza D provoquent généralement une maladie bénigne chez les bovins, mais peuvent aussi toucher diverses espèces comme les ovins, caprins, porcins, camélidés, volailles y compris l'homme. Depuis sa découverte, le virus de l'influenza D circule dans plusieurs régions du monde et est de plus en plus reconnu pour son rôle pathogène dans les maladies respiratoires des bovins surtout en Europe et aux USA. En Afrique, très peu d'études ont été effectuées sur le virus et les prévalences observées sont relativement faibles par rapport aux autres continents. L'absence d'étude sur le virus au Sénégal corrélée au fort pouvoir de mutation des virus influenza ont motivé la présente étude. Ainsi, 168 sérums de bovins ont été prélevés dans 18 exploitations de la zone péri-urbaine de Dakar et Thiès selon un échantillonnage aléatoire simple. Le test de l'inhibition de l'héماغglutination a été utilisé pour les analyses de laboratoire avec comme antigène la souche virale D/bovine/France/59

Mots-clés : Séroprévalence; Virus Influenza D; Maladie Respiratoire Bovine; Elevage Périurbain; Sénégal

COCL25	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Barrières a la participation sociale des personnes handicapées en zones d'endémie MTN au Bénin et en Côte d'Ivoire

Yévèdo Borel Tossou¹; Paule Hélène Biaka²; Fifamin Noël Christelle Gbaguidi¹; Vignon Bedie³; Sonagnon Inès Elvire Agbo¹; Fernand Aimé Guedou¹; Kouakou Jérôme Kouadio²; Sèdjro Gimatal Esai Anagonou¹; Franck Zinsou Mignanwande¹; Parfait Djossou¹; Brunelle Vanessa Yemadje¹; Flora Sylvie Houndjrebo¹; Jeanne D'arc Natacha Lessanh Arrawo¹; Yvette Faihou¹; Harvey Johnson¹; Ghislain Emmanuel Sopoh³; Jean Gabin Houezo⁴; Mamadou Kaloga⁵; Agui Sylvestre Dizoe⁶; Mark Nichter⁷; Anna Gine-March⁸; Roch Christian Johnson^{1,9}

Affiliation : 1= Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le développement Durable, Université d'Abomey-Calavi, Benin ; 2= Institut des Sciences Anthropologiques de Développement, Université Félix Houphouet Boigny de Cocody, Côte d'Ivoire ; 3= Institut Régional de Santé Publique de Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Benin ; 4= Programme National de Lutte contre la Lèpre et l'Ulcère de Buruli, Benin ; 5= Programme National de lutte contre l'Ulcère de Buruli, Côte d'Ivoire ; 6= Programme National d'Elimination de la Lèpre, Côte d'Ivoire ; 7= School of Anthropology University of Arizona, Arizona, United States of America ; 8= Anesvad Foundation, Bilbao, Spain ; 9= Fondation Raoul Follereau, Paris, France

Introduction : Dans les zones endémiques aux maladies tropicales négligées (MTN), les personnes handicapées (PH) font souvent face à des restrictions dans leur participation sociale (RPS), limitant leur inclusion. Cette étude vise à mesurer l'ampleur de ces restrictions et à identifier les facteurs qui y sont associés.

Méthodes : Une étude transversale mixte (quantitative et qualitative) a été menée entre 2021 et 2022 auprès de 841 PH et 90 membres de la communauté. Les RPS ont été évaluées à l'aide de l'échelle P de l'OMS, adaptée au contexte local. Les données quantitatives ont été analysées par régression logistique multivariée (SPSS v25). Les données qualitatives ont été analysées thématiquement.

Résultats : 65,9 % des PH présentaient des RPS. La majorité était âgée de 30 à 74 ans, non instruite (64,4 %), sans revenu stable (89,2 %) et sans profession. Les RPS étaient significativement associées à l'âge (30-74 ans), à un faible niveau d'instruction, à l'absence de profession stable et à l'absence d'activités génératrices de revenu. Les données qualitatives ont révélé un écart entre les besoins réels des PH et les perceptions ou pratiques communautaires, notamment sur la scolarisation, le travail et la participation aux décisions collectives.

Conclusion : Les RPS sont fréquentes chez les PH dans les zones endémiques aux MTN. Une meilleure prise en compte des facteurs socioéconomiques et des perceptions sociales est essentielle pour favoriser leur inclusion.

Mots-clés : Mots-clés : Handicap, participation sociale, maladies tropicales négligées, inclusion, Afrique de l'Ouest.

COCL26	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Dispensation des médicaments et erreurs médicamenteuses dans les officines de pharmacie privées à Cotonou

Mongbo Virginie¹, Natonnagnon Géraud², Tokoudagba Jean-Marie², Colette Azandjeme¹, Charles Sossa-Jerome¹

Affiliation : 1 = Institut Régional de santé publique de Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Bénin, 2 = Faculté des Science de la Santé de Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Introduction : L'erreur médicamenteuse constitue un problème pour la sécurité des patients. L'objectif général était d'étudier les connaissances, attitudes et pratiques du personnel des officines de pharmacie privées de Cotonou vis-à-vis des erreurs médicamenteuses.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive, réalisée de novembre 2022 à janvier 2023 dans 50 officines de pharmacies privées sélectionnées par choix aléatoire simple parmi les 107 de Cotonou. Les données sur les connaissances, attitudes et pratiques vis-à-vis des erreurs médicamenteuses ont été collectées par administration d'un questionnaire aux pharmaciens titulaires, assistants ou stagiaires étudiants de chaque officine sélectionnée. Elles ont été traitées et analysées par le logiciel Epi Info 7.

Résultats : Parmi les 100 participants, il y avait 54% de femmes, 16% de titulaires, 40% d'assistants et 44% de stagiaires. Tous les enquêtés comprenaient le sens d'une erreur médicamenteuse et 83% d'entre eux ont reconnu avoir commis au moins une fois une erreur médicamenteuse. Les erreurs les plus fréquentes étaient liées à la dispensation (52,82%). Les méthodes d'identification des erreurs médicamenteuses connues des pharmaciens étaient l'analyse des prescriptions (45,45%) et le suivi de la dispensation (35,23%). Les causes évoquées étaient l'état de santé (26,53%), le rythme de travail (20,41%) et la charge de travail (20,07%). Les actions mises en place à la suite d'erreurs médicamenteuses étaient les excuses auprès du client accompagnées d'actions correctives (23,66%), la formation et la sensibilisation du personnel (17,56%). Selon les enquêtés, la prévention des erreurs médicamenteuses passait par l'amélioration de la relation médecin-pharmacien (18,20%) et la formation pharmaceutique continue (17,26%).

Conclusion : Les erreurs médicamenteuses constituaient encore des expériences fréquentes des pharmaciens. Il est utile d'améliorer les connaissances attitudes et les pratiques du personnel des officines vis-à-vis des erreurs médicamenteuses.

Mots-clés : Erreur Médicamenteuse; Connaissance Attitude; Pratique

COCL27	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Troubles du sommeil induits par l'anxiété chez les adolescents scolarisés au Bénin : Prévalence et facteurs associés

Elvyre Klikpo², Alphonse Kpozèhouen^{1*}, Yolaine Glèlè Ahanhanzo¹, Cyriaque Degbey¹, Moussiliou Noël Paraïso¹, Francine Burrus³, Roger Salamon⁴

Affiliation : 1= Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Bénin , 2= Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin , 3= Centre Hospitalier Spécialisé de Lorquin, Lorquin, France, 4= Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et de Développement, Université Victor Segalen, Bordeaux, France *Email: Alphonse Kpozèhouen – Alphonse.Kpозehouen@gmail.com

Introduction : L'anxiété est l'une des principales causes de troubles du sommeil chez les adolescents. Ces troubles affectent non seulement leur bien-être mental, mais aussi leurs performances scolaires et leur santé physique. L'objectif de notre étude était de déterminer la prévalence et les facteurs associés aux troubles du sommeil induits par l'anxiété chez les adolescents scolarisés au Bénin.

Méthodes : Nous avons effectué une analyse secondaire des données de l'Enquête Mondiale sur la Santé des élèves en milieu scolaire au Bénin. Les participants étaient des élèves. La variable dépendante était l'existence des "troubles du sommeil induits par l'anxiété" (TSIA) chez ces élèves. Des analyses descriptive, bivariée et une régression logistique multivariée ont été réalisées, pour déterminer la prévalence et les potentiels facteurs associés aux TSIA chez ces élèves. Toutes les analyses statistiques étaient pondérées et faites au seuil de 5%.

Résultats : Nous avons au total travaillé sur 3701 élèves. La prévalence des "troubles du sommeil induits par l'anxiété" chez les adolescents scolarisés était de 21,06% IC95% = [19,28 – 22,95]. Plus les adolescents étaient âgés et moins ils étaient susceptibles d'avoir des TSIA (OR= 0,90; IC95% [0,84 – 0,97]). Les filles étaient moins susceptibles d'avoir des TSIA que les garçons (OR= 0,62; IC95% [0,50 – 0,77]). Les élèves qui avaient déclaré se sentir seul, ou avoir des idées suicidaires étaient plus susceptibles d'avoir des TSIA que les autres (respectivement OR= 2,96; IC95% [2,20 – 3,98] et OR= 1,88; IC95% [1,39 – 2,56]).

Conclusion : L'étude a révélé que plus d'un élève sur cinq déclarait souffrir de TSIA au Bénin. Les prestataires de soins de santé pourraient aider les adolescents scolarisés en s'attaquant à ces problèmes afin de réduire et de prévenir les TSAI dans cette population d'adolescents au Bénin.

Mots-clés : Troubles Du Sommeil; Anxiété; Adolescents Scolarisés ; GSHS ; Bénin

COCL28	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Facteurs associés à la prise en charge des personnes handicapées liées aux maladies tropicales négligées à manifestation cutanée au Bénin et en Côte d'Ivoire

Tossou Yévèdo Borel, Gbaguidi Fifamin Noël Christelle, Agbo Sonagnon Inès Elvire, Zanzo Sètonji Diane Edwige, Codjo-Segnon Karine Lucrèce Marie, Biaka Paule Héléna, Guedou Fernand Aimé, Kouakou Kouadio Jérôme, Nagonou Sèdjro Gimatal Esäi A, Mignanwande Franck Zinsou, Djossou Parfait, Yemadje Brunelle Vanessa, Houndjrebo Flora Sylvie, Arrawo Jeanne D'arc Natacha Lessanh, Faihoun Yvette, Johnson Harvey, Sopoh Ghislain Emmanuel, Houezo Jean Gabin, Kaloga Mamadou, Dizoe Agui Sylvestre, Nichter Mark, Jimenez Cristina Juan, Gine-March Anna, Johnson Roch Christian.

Affiliation : Ecole Doctorale des Sciences de la Santé de Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Introduction : Dans les pays en développement, les insuffisances du système de santé compromettent l'accès aux soins pour les personnes handicapées. Cette étude vise à identifier les facteurs associés à une prise en charge insuffisante dans les zones endémiques aux maladies tropicales négligées (MTN) à manifestation cutanée.

Méthodes : Une étude transversale exploratoire a été réalisée en 2022 au Bénin et en Côte d'Ivoire, auprès de 841 personnes handicapées, 29 soignants et 51 membres de familles. Une échelle de notation de 0 à 5 a permis d'évaluer la qualité de la prise en charge, classée en trois niveaux : bonne (4–5), insuffisante (1–3), ou aucune (0). Les données quantitatives ont été analysées sous SPSS v25.5, avec une valeur de $p < 0,05$ considérée comme significative. Des entretiens qualitatifs ont complété l'analyse.

Résultats : Sur les 841 personnes handicapées, 98 (11,6 %) avaient un handicap lié aux MTN cutanées. Au total, 158 (18,8 %) ont reçu une bonne prise en charge, 532 (63,3 %) une prise en charge insuffisante, et 151 (18,0 %) aucune. L'âge médian était de 38 ans (22–52) et le sex-ratio de 1,45. Une meilleure prise en charge était significativement associée à l'âge de 30–44 ans ($OR = 0,29 [0,16–0,54]$), au statut de vendeuse/femme au foyer ($OR = 0,32 [0,12–0,81]$), d'agriculteur ($OR = 0,30 [0,16–0,59]$), d'autres professions ($OR = 0,42 [0,18–0,96]$) et à un revenu > 76 € ($OR = 0,41 [0,23–0,74]$). Le fait d'avoir un handicap lié aux MTN cutanées augmentait significativement les chances de recevoir une meilleure prise en charge ($OR = 2,15 [1,13–4,09]$).

Conclusion : La majorité des personnes handicapées n'accède pas à une prise en charge satisfaisante. Des interventions intégrées et durables sont nécessaires pour renforcer leur accès aux soins, notamment dans le cadre des programmes de lutte contre les MTN cutanées

Mots-clés : Mots clés : Handicap ; MTN cutanées ; Accès aux soins ; Prise en charge ; Bénin ; Côte d'Ivoire.

COCL29	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Adhésions auto-déclarée et biologique à la Prophylaxie Préexposition au VIH chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes au Bénin

Behanzin Luc, Diabate Souleymane, Guedou Fernand Aimé, Goma-Matsétsé Ella, Olodo Marius, Aza-Gnandji Marlène, Dossouvo Alban, Akpaka Axel, Chagas Elyote, Gangbo Flore Armande, Zannou Djimon Marcel, Alary Michel

Affiliation : École nationale de formation des techniciens supérieurs en santé publique et en surveillance épidémiologique ; Université de Parakou, Parakou, Bénin ; Organisation pour la Promotion de la Santé et le Développement Communautaire, Cotonou, Bénin ; Dispensaire IST, Centre de santé communal de Cotonou 1, Cotonou, Bénin ; Centre de recherche du CHU de Québec ; Université Laval, Québec, Canada ; Département de médecine sociale et préventive, Université Laval, Québec, Canada ; Benin Synergies Plus, Cotonou, Bénin ; Réseau Sida Bénin, Cotonou, Bénin ; Programme Santé de Lutte contre le Sida, Cotonou, Bénin ; Faculté des sciences de la santé, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin ; Centre national hospitalier universitaire HMK, Cotonou, Bénin ; Institut national de santé publique, Québec, Canada

Introduction : Les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) constituent l'une des populations clés majeures du VIH. L'efficacité de la prophylaxie préexposition (PrEP) par voie orale pour la prévention du VIH repose sur l'adhésion prophylactique. L'objectif de cette étude était de comparer pour la PrEP, l'adhésion auto-déclarée à celle biologiquement confirmée chez les HSH au Bénin.

Méthodes : La présente étude est une phase du projet de démonstration de la prophylaxie préexposition par voie orale pour la prévention du VIH auprès des HSH, mené d'août 2020 à décembre 2021. Le test de Mc Nemar a été réalisé pour comparer les méthodes de mesures d'adhésion prophylactique.

Résultats : Seulement 46 % et 24,3 % des hommes chez qui de gouttes de sang capillaire sur papier buvard ont été collectées avaient de niveau détectable de médicaments PrEP dans le sang, respectivement aux sixième et douzième mois de suivi. Au sixième mois, l'adhésion parfaite pour la PrEP quotidienne était de 92 % (auto-déclaration) et 10 % (confirmation biologique ; $p < 0,0001$), et pour PrEP à la demande, de 49 % (auto-déclaration) et 31 % (confirmation biologique ; $p = 0,008$). Au douzième mois, les valeurs correspondantes étaient respectivement de 94 % et 5 % ($p < 0,0001$), et de 40 % et 27 % ($p = 0,005$).

Conclusion : L'adhésion prophylactique biologiquement confirmée était généralement faible, et l'adhésion auto-déclarée surestimait la réalité. Des stratégies combinées, incluant l'éducation thérapeutique et la PrEP injectable, sont essentielles pour améliorer l'adhésion

Mots-clés : Prévention Du VIH ; Prophylaxie Préexposition ; Hommes Ayant Des Rapports Sexuels Avec D'autres Hommes ; Adhésion ; Bénin

COCL30	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Niveau de développement global des enfants de 6 à 59 mois dans la commune de Toviklin au Bénin en 2024

Sossa Pamela, Sossou Ericie, Sopoh Ghislain

Affiliation : Institut Régional de Santé publique de Ouidah, Université d' Abomey Calavi, Bénin

Introduction : Le développement global de l'enfant inclut les dimensions sensorielle, motrice, langagière, cognitive, affective, sociale, ainsi que des habiletés d'habillement, d'alimentation et d'hygiène, et est essentiel pour leur bien-être. À Toviklin, les conditions socio-économiques défavorables et les défis liés à la malnutrition freinent ce développement. Cette étude vise à décrire le niveau de développement global des enfants âgés de 6 à 59 mois à Toviklin en 2024.

Méthodes : Il s'agit d'une étude transversale descriptive réalisée en 2024 à Toviklin. La population d'étude comprenait les enfants de 6 à 59 mois et leurs mères, sélectionnés par échantillonnage en grappe. Le développement global des enfants a été évalué à l'aide d'un score composite basé sur sept indicateurs (sensoriel, moteur, langagier, cognitif, affectif, social et habiletés d'habillement, d'alimentation et d'hygiène). Les données ont été collectées via un questionnaire administré aux mères, complété par des observations et des mesures anthropométriques, puis analysées par statistiques descriptives.

Résultats : Sur 571 enfants enquêtés, 53,1 % étaient des garçons, avec une moyenne d'âge de $28,30 \pm 15,32$ mois. La majorité des enfants (65,15 %) avait un développement global moyen, 18,21 % un développement faible et 16,64 % un développement élevé. Les caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques des ménages, ainsi que l'environnement immédiat (insalubrité et accès limité aux jeux), influencent le développement. Les résultats indiquent que, dans un contexte marqué par la précarité, la majorité des enfants de Toviklin atteignent un développement global intermédiaire, soulignant les progrès et la nécessité d'interventions renforcées en petite enfance.

Conclusion : Ces résultats soulignent l'importance de mettre en place des politiques de santé publique pour améliorer les conditions environnementales et nutritionnelles, favorisant un développement optimal des enfants dans des contextes défavorisés.

Mots-clés : Développement Global; Enfants de 6 A 59 Mois; Bénin

COCL31	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Inégalités et facteurs associés aux femmes et au handicap dans les communautés endémiques aux maladies tropicales négligées (MTN) : une approche intersectionnelle des interventions

Ginette Victoire Senami Gandigbe; Zinsou Franck Mignanwande; Yévèdo Borel Tossou; Karine Lucrèce Marie Codjo-Seignon; Sonagnon Inès Elvire Agbo; Fifamin Noël Christelle Gbaguidi; Sèdjro Gimatal Esaï Anagonou; Fernand Aimé Guedou; Jean Mark Nichter; Cristina Juan Jimenez; Roch Christian Johnson, Anna Gine-March;

Affiliation : Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le développement Durable, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Introduction : L'inégalité entre les sexes parmi les personnes handicapées est une question complexe influencée par une combinaison de facteurs. Cette étude avait pour but d'explorer les facteurs associés aux inégalités de genre parmi les personnes en situation de handicap (PSH) au Bénin et en Côte d'Ivoire, et de concevoir et mettre en œuvre des interventions adaptées pour remédier à ces inégalités

Méthodes : Cette recherche opérationnelle axée sur les interventions et utilisant une approche mixte a ciblé 841 PSH et 90 membres de la communauté. Les registres des centres de prise en charge des MTN dans les zones ciblées ont été examinés et les personnes handicapées inscrites dans ces registres, résidant dans ces zones, ainsi que des membres de la communauté, ont été inclus. Des données sur les facteurs sociodémographiques, socioéconomiques et cliniques ont été recueillies (guide d'entretien et grille d'observation). Les données quantitatives ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS V.25 (alpha = 5 %) et les données qualitatives ont été traitées par triangulation, catégorisées, croisées et synthétisées par thème, hypothèse et indicateur. Un sous-ensemble de PSH confrontées à des obstacles particuliers a été sélectionné pour une intervention

Résultats : L'âge médian était de 38 ans. Parmi les 841 PSH, 497 étaient des hommes et 344 des femmes (sex-ratio = 1,45). L'analyse univariée a révélé des associations significatives ($p = 0,000$) entre le sexe et l'état-civil, le revenu mensuel, le niveau d'éducation et le type de profession. L'analyse multivariée a permis d'identifier des facteurs fortement associés aux disparités entre les sexes ($p = 0,000$) : l'état-civil, le revenu mensuel et la profession.

Conclusion : Cette étude met en évidence la nécessité d'adopter des approches intersectionnelles dans les politiques et les pratiques afin de lutter efficacement contre les multiples formes de discrimination auxquelles sont confrontées les personnes handicapées

Mots-clés : Genre, handicap, inégalités et disparités en matière de santé, maladies tropicales négligées

COCL32	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Dynamique temporo-spatiale de poliovirus dérivé de la souche vaccinale (PVDV) en République Démocratique du Congo (RDC), 2018-2023.

Yobo Iyala Jean Blaise^{1, 2, 4, *}, Degbey Comlan Cyriaque¹, Jean Paul Makala^{2, 3}, Yogolelo Riziki⁵.

Affiliation : 1=Institut Régional de Santé Publique de Ouidah/Université Abomey Calavi (UAC) – Bénin ; 2=Programme élargi de Vaccination (PEV) /RDC ; 3=Comité des Opérations d'Urgence POLIO (COUP)/RDC ; 4=Université de Kinshasa/Institut One Health pour l'Afrique(INOHA)- RDC. ; 5=Institut National des Recherches Biomédicales. (INRB). - RDC.

Introduction La RDC fait face à des épidémies de PVDV depuis 2017. Ces variants de poliovirus sauvages s responsables de la poliomyélite en éradication. Le dernier cas sauvage notifié date de novembre 2011. Le pays est certifié exempt de circulation de polio sauvage depuis 2015. Nous avons voulu connaitre l'évolution spatiotemporelle de PVDV afin de comprendre leur chronologie et influence saisonnière.

Méthodes : Nous avons réalisé une étude transversale descriptive sur les cas confirmés de PVDV. Les cartes de la dynamique spatiale des cas de PVDV ont été réalisées à partir des taux d'attaques à l'aide de QGIS® (3.22.8) en utilisant des fichiers au format Shape file sur fonds de carte extraits du logiciel Healthmapper® de l'OMS. Les décompositions des séries temporelles sont présentées sous forme de graphiques permettant de comprendre l'évolution chronologique des cas de PVDV et leur tendance saisonnière à l'aide du Prologiciel R.4.0.

Résultats : Au total 1196 cas de PVDV de type 1,2 et 3 ont été enregistrés dans les bases de INRB et du PEV. Ces cas ont été notifiés dans 25 sur les 26 provinces de la RDC, les Zones de santé de la partie Est du pays ont notifié plus des cas, notamment celle de Tanganyika, Haut Katanga, Lomami, Haut Lomami soit et Maniema. La tendance générale est haussière avec un pic en 2022 avec 527 cas alors qu'en 2021 on avait constaté une baisse notoire des cas soit 31 cas. La décomposition temporelle suggère une saisonnalité avec des pics entre les mois de septembre et décembre considérés comme les périodes des précipitations dans certaines provinces.

Conclusion : Durant les 6 années, la quasi-totalité des ZS ont été frappées par les épidémies de PVDV. Quoique toutes les parties du pays aient été touchées, la partie orientale a été la plus impactée. La composante saisonnière est bien marquée suggérant une montée de détection en saison des pluies et pendant les périodes charnières de changement des climats.

Mots-clés : dynamique, temporelle, spatiale, Poliovirus, vaccination, RDC.

COCL34	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Connaissances, attitudes et pratiques des étudiants en fin d'études de Médecine et de Pharmacie de l'Université Abdou Moumouni vis-à-vis des prescriptions des antibiotiques et de la résistance bactérienne

Tapha Ounoussa^{1,2}, Degbey Cyriaque Comlan^{1,3}, Yacouba Abdourahamane^{2,4}, Chaibou Dan Inna Saadatou², Brah Souleymane⁴, Mamadou Saidou^{2,4}, Hinson Antoine Vikkey⁵

Affiliation : 1. Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRSP), Ouidah, Benin. 2. Laboratoire National de Référence sur la Résistance aux Anti-Microbiens, Niamey, Niger. 3. Clinique Universitaire d'Hygiène Hospitalière – CNHU Hubert Koutoukou Maga, Cotonou, Benin. 4. Faculté des Sciences de la Santé - Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger. 5. Unité de Recherches et d'Enseignement en Santé au Travail et Environnement – UAC, Cotonou, Benin.

Introduction : La résistance aux antimicrobiens (RAM) constitue un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Malgré ses conséquences, peu d'études au Niger ont porté sur les connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de santé sur la résistance aux antibiotiques. L'objectif de cette étude était d'évaluer les connaissances, attitudes et pratiques des étudiants en fin de cycle sur l'utilisation des antibiotiques et l'antibiorésistance.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive et analytique qui s'est effectuée d'Octobre à Décembre 2024. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire semi-structuré auto-administré par les étudiants. Les connaissances étaient évaluées avec une échelle de Likert à cinq niveaux tandis que des questions fermées étaient utilisées pour déterminer les pratiques. Les analyses descriptives ont été réalisées à l'aide de SPSS version 27.0. Le seuil de signification a été fixé à 0,05.

Résultats : Sur les 400 étudiants éligibles, 326 étudiants avaient répondu au questionnaire, soit un taux de participation de 81,5%. La consommation d'antibiotique en automédication a été reconnue par 71,69% des étudiants. Quatre-vingt-huit pour cent sont d'accord pour dire que la RAM est un problème important au Niger et 85 % un problème mondial. Le risque pour la santé humaine lié à l'usage d'antibiotiques en agriculture et en élevage n'était connu que par 32,82% des participants. Une méconnaissance du lavage des mains et de la vaccination comme moyens de prévention contre la RAM a été observé chez respectivement 64,22% et 68,50% d'étudiants. Dans l'ensemble, 61,5 % des étudiants étaient très conscients, 38,34% des étudiants avaient des bonnes connaissances et 27,0% avaient de pratiques adéquates concernant l'utilisation des antibiotiques et la RAM.

Conclusion : Cette étude a révélé un faible niveau de connaissances et de pratiques des étudiants en matière de prescription d'antibiotiques et la RAM. Il urge de renforcer la sensibilisation des étudiants et de leur entourage sur les bonnes pratiques d'utilisation des antibiotiques.

Mots-clés : Antimicrobiens ; Antibiorésistance ; CAP ; Etudiants en Fin D'études ; Niger

COCL35	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Les réseaux sociaux numériques informels de santé (ReSNIS) : une nouvelle dynamique d'interactions sociales en santé

N'guessan Danh Annick, Badou Savi Agnès Oladoun, Babadjide Charles Lambert

Affiliation : Laboratoire d'Anthropologie et de Sociologie de la Dynamique Environnementale Educationnelle, Rurale et du Genre (LASDEERG), Université d'Abomey-Calavi, Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local (LASDEL), Université d'Abomey-Calavi Maître de Conférence des Universités/ CAMES, Laboratoire d'Anthropologie et de Sociologie de la Dynamique Environnementale Educationnelle, Rurale et du Genre (LASDEERG), Université d'Abomey-Calavi Professeur Titulaire/ CAMES.

Résumé : L'essor des réseaux sociaux numériques informels de santé (ReSNIS) marque un renouveau dans les pratiques de santé. L'objectif général est d'analyser les dynamiques de recours des populations de Cotonou et Abomey-Calavi aux réseaux sociaux numériques informels de santé (ReSNIS) dans la gestion des maladies chroniques. Les techniques de collecte de données mobilisées sont la recherche documentaire, l'observation et l'entretien semi-directif. Les observations ont porté sur une dizaine de ReSNIS intégrés sur WhatsApp par choix raisonné. La fiche de lecture, la fiche d'observation et un formulaire Excel ont été utilisés comme outils de collecte et d'organisation des données empiriques au stade actuel de la recherche. Mille cent trente et une (1131) observations ont été faites sur la période d'un an. Les modèles d'analyse convoqués dans cette recherche sont l'interactionnisme symbolique de H. Blumer (1969) appliqué à un espace numérique, associée à la théorie de l'espace public de J. Habermas (1997). Les premiers résultats révèlent l'existence de plusieurs catégories de ReSNIS, un aperçu des principales pathologies abordées dont la majorité sont chroniques (l'hypertension artérielle, le diabète etc.). Par ailleurs, une analyse des interactions sociales à l'intérieur des ReSNIS révèle que ces réseaux constituent des espaces d'échanges de savoirs médicaux et locaux, de partage d'expériences et de stratégies d'entraide. Sur WhatsApp, les ReSNIS les plus répandus sont hybrides, à but lucratif, et semi-ouverts, axés sur la production ou la demande de remèdes. Ces résultats traduisent, le besoin d'accompagnement durable dans la gestion des maladies au long cours dans un contexte de fragilité du système formel. Au-delà de la fonction d'information, ces ReSNIS, à travers la solidarité qui y règne, valorise l'empowerment collectif des individus vis à vis de leur santé. En outre, ces caractéristiques des ReSNIS sur WhatsApp invitent à réfléchir à une réappropriation communautaire de la santé.

Mots-clés : Santé; Réseaux Sociaux; Numériques; Informel; Abomey-Calavi; Cotonou

COCL36	Type de communication : Communication orale Sous-thème : Communications Libres
--------	---

Facteurs associés à l'utilisation abusive de la pilule du lendemain chez les étudiantes âgées de 15 à 24 ans de l'Université de Parakou en 2023

Charles P. Makoutode , Lamidhi Salami , Sandrine J-K. Gbago , Vignon D. Bedie , Kabirou Salifou

Affiliation : Institut Régional de Santé Publique

Introduction : La contraception d'urgence constitue un élément essentiel de l'accès aux services en matière de soins de santé reproductive, selon l'OMS. En limitant les grossesses non-désirées et la transmission des MST, la contraception jouent un rôle primordial dans la qualité de vie des adolescents et jeunes. Cependant, le déficit informationnel sur l'usage de la pilule du lendemain fait courir d'importants risques aux utilisatrices. La présente étude s'intéresse aux facteurs associés à l'utilisation abusive de la PCU chez les étudiantes à l'université de Parakou en 2023.

Méthodes : L'étude est transversale avec une approche analytique. Elle a été déployée durant la période d'Octobre à Novembre 2023. L'étude s'est basée sur un échantillon représentatif de 250 étudiantes de 15 à 24ans de l'Université de Parakou sélectionnés selon un sondage aléatoire stratifié à deux degrés. Une régression logistique multinomiale a permis de déterminer les facteurs associés à l'utilisation abusive de la PCU chez les étudiantes à l'université de Parakou en 2023.

Résultats : L'âge moyen des étudiantes était de 19.56 ans $\pm$ 2.25 avec une médiane de 19 ans et des extrêmes de 17 ans et 24 ans. Soulignons que 41,60% des étudiantes avaient entre 18 et 20 ans. Dans l'ensemble, 70,45% des étudiantes utilisaient la PCU et la prévalence de l'utilisation abusive de la pilule du lendemain était de 61,36%. Seulement 4,40% des étudiantes avaient une bonne connaissance globale de la contraception, ce qui limitait significativement leurs capacités à bien utiliser la PCU ($p=0,000$). De plus, l'âge, le niveau d'instruction du père et de la mère, les discussions familiales sur la sexualité, les causeries entre amies à l'université ou à l'école, le multi-partenariat sexuel et la fréquence des rapports sexuels étaient significativement associés à l'utilisation de la pilule du lendemain par les étudiantes.

Conclusion : La contraception d'urgence reste un moyen de rattrapage formidable et efficace mais son utilisation doit rester exceptionnelle. Au vu des résultats de l'étude, de réels progrès permettrait de limiter l'usage abusive notamment à travers des campagnes d'information et de communication par les structures de SSR sur les moyens de contraception.

Mots-clés : Contraception D'urgence; Facteurs Associés; Etudiantes; Université de Parakou; Bénin.

**COMMUNICATIONS
AFFICHÉES**



Sous-thématique

La médecine familiale et les soins de santé primaires

CAMF01	Type de communication : Communication affichée Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	--

Analyse de l'offre de soins en consultation prénatale dans les zones à faible couverture sanitaire au Bénin

Phycien Nehemie, Ahodegnon Rodrigue.Z, Dansou Boris Pleck

Affiliation : Université Senghor, CNLS-TP

Introduction : Alors que la grossesse devrait être un immense moment d'espoir et une expérience positive, elle demeure malheureusement très dangereuse pour des millions de femmes dans le monde qui n'ont pas accès à des soins respectueux et de qualité. Au Bénin le ratio de la mortalité maternelle est de 391 décès pour 100 000 naissances vivantes sur les sept dernières années, encore très loin de l'objectif du développement durable 3 qui préconise moins de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. L'objectif de ce travail était de faire une analyse de l'offre de soins en consultation prénatale dans les zones à faible couverture sanitaire au Bénin, en étudiant l'accessibilité et l'adéquation des soins prénatals.

Méthodes : Une étude qualitative a été menée dans la zone sanitaire Ouidah-Kpomassè-Tori Bossito (OKT) du département de l'Atlantique au Bénin. Des discussions de groupes et des entretiens semi directifs ont été réalisés avec des femmes enceintes et allaitantes, et des prestataires de soins en consultation prénatale. Les logiciels de traitement de texte Word et de calcul Excel ont été utilisés pour traiter et analyser les données.

Résultats : Les soins prénatals dans les zones concernées étaient inadéquats et inaccessibles. Certaines femmes devaient marcher environ 2h pour y accéder. Pour les services non disponibles (labo-échographie) dans certains centres, les femmes se rendaient à la structure la plus proche (souvent en ville). Les femmes ont déclaré leur insatisfaction qui serait liée surtout au temps d'attente, au coût des services et à l'accueil dans certaines institutions.

Conclusion : Des investissements soutenus dans l'amélioration du système de santé et des initiatives de santé publique sont nécessaires pour marquer des progrès significatifs en matière de soins prénatals dans les zones à faible couverture sanitaire au Bénin.

Mots-clés : Grossesse; CPN; OKT; Mortalité Maternelle; Bénin

CAMF02	Type de communication : Communication affichée Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	--

Perception et acceptabilité sociale de l'extension de la chimioprévention du paludisme saisonnier dans les districts sanitaires de Damagaram Takaya et Takeita au Niger

Nadakou N'kpingou Théodore¹, Paraïso Moussiliou Noel¹, Yobo Jean Blaise¹, Ounoussa Tapha¹, Tossou Fidél², Adehossi Eric Omar³ And Roch Hounghinihin⁴

Affiliation : 1=Département d'épidémiologie et de biostatistique, Institut régional de santé publique, Ouidah (Bénin). 2= Institut pratique de santé publique de Niamey, Niger. 3=Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger. 4=Université d'Abomey-Calavi, Benin.

Introduction : Le paludisme est endémique dans le monde entier. L'Afrique est le continent où se produisent presque tous les cas de paludisme. Selon, le rapport de l'OMS sur le paludisme en 2022, 95 % des cas de paludisme dans le monde se produiront en Afrique, contre 2,5 % dans la Méditerranée orientale, 2 % en Asie du Sud-Est, 0,6 % dans le Pacifique occidental et 0,2 % dans les Amériques.

Méthodes : Les données utilisées dans cette étude proviennent d'une enquête qualitative commanditée par la London School of Hygiène & Tropical Medicine et réalisée en octobre 2022 dans les districts sanitaires de Damagaram Takaya et Takeita, région de Zinder. Quatre focus groups ont été réalisés par district sanitaire avec des membres du Comité de Gestion Sanitaire (COGES), des distributeurs, des pères de familles bénéficiant de l'extension du CMS et des mères (baby-sitters). Sur , en plus des focus groups, des entretiens individuels ont été menés avec le personnel de santé, les autorités et d'autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre le paludisme. Les données recueillies ont été transcrites puis résumées dans une matrice pour servir de base à ce travail.

Résultats : La population était au courant de l'extension du SMC et était favorable à le recevoir à nouveau. La prolongation de la SMC est acceptée, mais les effets secondaires de la prise des médicaments sont le principal obstacle à la réussite de l'opération. Dans la pratique, les 2èmes et 3èmes doses ne sont pas toujours administrées comme prévu, soit parce qu'elles sont oubliées, soit parce que elles sont gardées en réserve pour un traitement ultérieur. En ce qui concerne le système de communication, les crieurs publics et les agents de santé sont les moyens les plus efficaces pour atteindre la population.

Conclusion : L'extension du SMC est bien accueillie par la communauté. Cependant, pour atteindre ses objectifs, il faut trouver des moyens pour suivre l'administration des 2èmes et 3èmes doses aux enfants. De même, son succès dépend du nombre d'équipes et de jours de distribution maintenant que la cible est presque doublée.

Mots-clés : Vulgarisation ; Chimioprévention du paludisme saisonnier ; Perception ; Acceptabilité ; Niger

CAMF03	Type de communication : Communication affichée Sous-thème : La médecine familiale et les soins de santé primaires
--------	--

Déclaration de grossesse et consultation prénatale au Bénin : enjeux socioculturels en milieu communautaire de Djougou

Bedie Vignon Dègbédji

Affiliation : Institut Régional de Santé Publique

Introduction : La déclaration de grossesse en milieu communautaire béninois est cruciale pour la santé publique et le bien-être des femmes enceintes, car elle permet un suivi médical adéquat et la prévention des complications liées à la grossesse. Cependant, plusieurs facteurs sociaux et culturels rendent difficile cette déclaration, surtout pour les femmes vivant en milieu rural. Cette étude explore les enjeux socioculturels liés à la déclaration de grossesse en milieu communautaire de Djougou, au nord-ouest du Bénin.

Méthodes : L'étude a adopté une approche qualitative, combinant des entretiens individuels, des groupes de discussion, des observations participantes et des analyses documentaires pour recueillir des données auprès des femmes enceintes, des leaders communautaires et des professionnels de la santé. Cette recherche a été menée de juillet à août 2022 dans les communautés de Barei, Bariénou, Bougou, Bèlléfoungou et Kolokondé. L'analyse du contenu a été privilégiée pour les données qualitatives.

Résultats : Les croyances populaires, telles que la crainte du "mauvais œil" et la peur de l'envoutement, dissuadent de nombreuses femmes de déclarer leur grossesse tôt, surtout dans les ménages polygamiques où la méfiance entre coépouses est courante. Le recours aux guérisseurs traditionnels pour la "préparation spirituelle de la grossesse" et l'automédication retardent également la déclaration de grossesse. Les tabous entourant la planification familiale et la stigmatisation des consultations prénatales précoces influencent négativement la déclaration de grossesse, poussant certaines femmes à attendre que la grossesse soit visible avant de consulter un professionnel de santé. Ces résultats s'inscrivent dans les études sur les déterminants sociaux de la santé, soulignant l'importance des influences culturelles et sociales sur les comportements de santé.

Conclusion : La mise en place d'un programme d'éducation communautaire et l'implication des leaders traditionnels et religieux sont essentielles pour surmonter les obstacles socioculturels et améliorer la santé maternelle et infantile à Djougou.

Mots-clés : Déclaration De Grossesse ; Enjeux Socioculturels ; Consultations Prénatales ; Education Communautaire ; Djougou

**Sous-thématique :
La mise en œuvre
de la santé
communautaire
en Afrique**

CASC01	Type de communication : Communication affichée Sous-thème : La mise en œuvre de la santé communautaire en Afrique
--------	--

Activités de riposte à l'épidémie de choléra dans le district du golfe, Lomé, Togo.

Agbeko Foli Yvon¹, Salami – Odjo Farouk², Agbetiafa Koffi Vovolit², Hemou Manani¹, Pakoudjare Mazama¹, Djadou Koffi Edem³

Affiliation : 1= Service de Pédiatrie, CHU Campus, Lomé, Togo, 2= Direction Préfectorale de la Santé (DPS) Golfe, Lomé, Togo, 3= Service de Pédiatrie, CHR Tsévié, Tsévié,

Introduction : Une épidémie de choléra secoue plusieurs districts de Lomé depuis août 2024. Elle affecte adultes et enfants. Après l'enregistrement de 03 décès d'enfants au CHU-Campus, nous nous sommes rapprochés des autorités sanitaires du district pour une synergie d'actions. Le but de ce travail est de présenter les activités de riposte entreprises.

Méthodes : La direction préfectorale de santé Golfe a enregistré son premier cas de choléra le 13 août 2024. Les quartiers côtiers et portuaires de Lomé sont les plus affectés. Plusieurs activités de riposte sont amorcées sous le leadership de la DPS Golfe avec l'appui OMS notamment. Ces activités sont : investigation des cas, sensibilisation, prise en charge médicale des cas, recherche active et surveillance des cas et PCI/WASH communautaire.

Résultats : L'investigation a révélé 62 cas suspects de choléra dont 16 confirmés avec 8 décès. Le taux de positivité a été de 22,9% chez les enfants. Les facteurs associés au cholera chez les enfants ont été la non - utilisation d'eau conditionnée en sachet « pure – water » ($p=0,002$). Des messages-clés de CCC ont été diffusés lors des réunions communautaires, du porte à porte par les ASC, par radios de proximité et à la foire. L'inspection sanitaire a permis la distribution de 1 289 plaquettes de comprimés de chlore. Soixante-dix-huit écoles ont fait l'objet de sensibilisations avec 8 890 élèves et 1 515 parents, de même que 06 marchés publics et le nouveau port de pêche. Les ASC ont réalisé une campagne de recherche active identifiant 22 cas suspects dont 02 confirmés. Les activités PCI/WASH ont consisté en des désinfections/désinsectisations de 32 dépotoirs, 19 latrines scolaires, 06 latrines publiques et 17 puits. Les enterrements des corps cholériques ont été dignes et sécurisés.

Conclusion : Il est impérieux de poursuivre les activités de riposte malgré l'accalmie.

Mots-clés : Choléra, Enfant, Togo.

**Sous-thématique:
La pratique de la
santé publique
en milieu
hospitalier**

CAPH01	Type de communication : Communication affichée Sous-thème : La pratique de la sante publique en milieu hospitalier
--------	---

Qualité du conseil diététique dans les officines de Cotonou

Colette Sylvie Azandjeme, Christelle Nina Medenou, Carmelle Gbèdécon Mizehoun, Gbemahon Roger Houssou, Clemence Metonnou, Charles Sossa

Affiliation : Département de la promotion de santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi (UAC), Ouidah, Bénin

Introduction : L'intervention diététique constitue une stratégie potentiellement efficace dans la gestion des maladies chroniques. Cependant, la dispensation de conseils diététiques pertinents et l'accompagnement nutritionnel adéquat représentent des défis majeurs pour les professionnels de santé exerçant en officine. La présente étude visait à évaluer la qualité des conseils diététiques prodigués au sein des officines.

Méthodes : Cette étude évaluative a porté sur les praticiens des officines et leurs patients ayant bénéficié de conseils diététiques. Le recrutement des pharmaciens et des patients a été réalisé par échantillonnage de commodité, tandis que la sélection des auxiliaires a été effectuée par choix raisonné. La qualité des conseils diététiques a été évaluée à l'aide de l'échelle de Varkevisser et du cadre conceptuel de Donabédian à travers le niveau de connaissance des praticiens, démarche diététique, technique de counseling, qualité du conseiller, adéquation des conseils et satisfaction des praticiens.

Résultats : L'étude a inclus 83 professionnels de santé, dont 55 pharmaciens, ainsi que 160 clients. Les résultats ont révélé une bonne maîtrise des connaissances théoriques en diététique par les professionnels (100%), ainsi qu'une connaissance adéquate des principes de l'alimentation du nourrisson avant l'âge de 6 mois (83,33%) et des recommandations relatives à la fréquence de l'activité physique régulière (100%). Cependant, la pertinence des conseils prodigués et l'application des protocoles de conseil ont été jugées insuffisantes, avec des scores respectifs de 11,25% et 18,63%. En revanche, la satisfaction des professionnels et des patients a été évaluée comme satisfaisante. Néanmoins, l'évaluation globale de la qualité des conseils diététiques a révélé une insuffisance (24,10%).

Conclusion : Les résultats de cette étude mettent en évidence la nécessité d'une intervention ciblée auprès des responsables d'officines et des autorités sanitaires béninoises, afin de mettre en œuvre des stratégies d'amélioration de la qualité des prestations de conseils diététiques en officine.

Mots-clés : Conseil diététique ; Qualité ; Pharmacien ; Officine ; Cotonou

CAPH02	Type de communication : Communication affichée Sous-thème : La pratique de la sante publique en milieu hospitalier
--------	---

Qualité du gain pondéral suite à la récupération nutritionnelle chez les enfants malnutris de 06 à 59 mois au CHU-MEL de Cotonou en 2023

Colette Sylvie Azandjeme, Yassarath Boukari Mama, Carmelle Mizehoun, Gbemahon Roger Houssou, Clemence Metonnou, Charles Sossa

Affiliation : Département de la promotion de santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi (UAC), Ouidah, Bénin

Introduction : La malnutrition infantile constitue un enjeu majeur de santé publique à l'échelle mondiale, particulièrement dans les pays à revenus faibles. La présente étude vise à évaluer la qualité des soins nutritionnels dispensés aux enfants atteints de malnutrition aiguë au sein du service de nutrition du CHU-MEL de Cotonou.

Méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective, incluant les dossiers des enfants âgés de 6 à 59 mois, diagnostiqués avec une malnutrition aiguë lors d'un dépistage passif et ayant bénéficié d'au moins un suivi au cours de l'année 2023 au CHU-MEL. Les données anthropométriques, démographiques et les paramètres de récupération nutritionnelle ont été extraites à l'aide d'une fiche de dépouillement digitalisée.

Résultats : Au total 37 enfants malnutris aiguë, avec un âge moyen de $11,49 \pm 7,91$ mois et une prédominance du sexe féminin (59,5%), a été inclus. Le poids médian des enfants à l'admission était de 6 570 g, contre 7 477,5 g à la sortie. Plus de 64% des enfants ont présenté une récupération nutritionnelle satisfaisante dès le premier suivi. Il a été observé que plus de la moitié des enfants (62,2%) ont atteint un état nutritionnel satisfaisant au cours des deux premières semaines de suivi, avec un gain de poids médian de 727 g. Les données post-hospitalisation ont révélé des taux de malnutrition aiguë modérée de 5,3%, 15,4% et 14,28% respectivement lors des premier, deuxième et troisième suivi, indiquant une dégradation continue de l'état nutritionnel chez certains enfants.

Conclusion : Les résultats obtenus mettent en évidence l'efficacité de la prise en charge de la malnutrition au sein du service de nutrition du CHU-MEL. Toutefois, ces résultats soulignent des lacunes dans le suivi post-hospitalisation, nécessitant l'élaboration de stratégies réfléchies pour soutenir les parents et réduire les cas de rechute.

Mots-clés : Mots-clés : Qualité, Gain Pondéral, Malnutrition aiguë, Soins nutritionnels, Récupération nutritionnelle, CHU-MEL, Cotonou.

CAPH03	Type de communication : Communication affichée Sous-thème : La pratique de la sante publique en milieu hospitalier
--------	---

Evaluation de la chaîne du froid des produits de santé dans les formations sanitaires du sud bénin

Missikpode Sègbégnon Rigobert ; Makoutode Charles- Patrick

Affiliation : Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin ; Faculté des Sciences de la Santé ; Université d'Abomey-Calavi (UAC),

Introduction : La conservation des produits de santé est cruciale, car ils sont sensibles aux conditions environnementales telles que la température, la lumière et le gel. Ainsi, leur stockage et leur transport exigent des contrôles stricts de température. Cette étude se propose d'analyser la performance des systèmes de conservation à froid des produits médicaux tout en identifiant les facteurs d'influence, afin de proposer in fine un plan d'amélioration opérationnel.

Méthodes : La recherche se fera dans les formations sanitaires des sept départements de la région méridionale du Bénin. L'étude comprend quatre objectifs spécifiques, chacun avec une méthodologie adaptée, incluant des études transversales et analytiques, ainsi qu'une évaluation d'impact. Les données seront collectées par observation directe, entretiens semi-structurés et enquêtes auprès des structures de santé et du personnel de la chaîne de froid. A cet effet, un échantillon de 162 formations sanitaires publiques sera constitué sur la base d'un échantillonnage par grappes. L'analyse des données utilisera des statistiques descriptives, comparatives et des modèles économétriques comme l'analyse de frontière stochastique (SFA) spécifiquement pour l'estimation de l'efficacité et la performance.

Résultats : Un plan opérationnel sera proposé et son implémentation évaluée par la méthode de la double différence.

Conclusion : Cette recherche vise à apprécier l'état de la chaîne du froid des produits de santé dans les formations sanitaires en explorant chacune de ses composantes, identifier les facteurs associés à l'état de la chaîne du froid et à proposer et suivre la mise en œuvre d'un plan d'amélioration.

Mots-clés : Chaîne du froid, produits de santé, évaluation

CAPH04	Type de communication : Communication affichée Sous-thème : La pratique de la sante publique en milieu hospitalier
--------	---

Dynamique spatio-temporelle et facteurs associés à l'incidence de la COVID-19

Traore Isidore Tiandiogo , Salissou Abdou Ahmed Mohamed, Traore Aïda Marietou , Drabo Seydou, Taofiki Ajani Ousmane, Dramane Kania, Tarnagda Zekiba, Cisse Bakary, Ilboudo Abdoul Kader, Nathalie De Rekeneire, Kagone Thérèse, Ouattara Seydou, Bicaba Brice, Ouedraogo Boukary, Sawadogo Charles, Zingue Dezemon, Bonkougou Isidore, Ouedraogo Abdoul Salam, Poda Arme, Savadogo Leon G.B, Millogo Athanase, Kissou Aimée, Mahamadou Abdoul Jalile, Diendiere Eric, Ba Absetou, Sereme Moustapha, Ouedraogo Solange, Hien Herve, Diallo Mamadou Saliou Kalifa, Cottrell Gilles, Pouban Julien, Dubois Natasha, Prada Nicole, D'ortenzio Eric, Altmann Mathias

Affiliation : Centre MURAZ Universite Nazi Boni Laboratoire National de référence Grippe/IRSS Institut Pasteur du Cambodge Direction de la Protection de la Santé de la Population Centre des Opérations de Réponse aux Urgences Sanitaires Direction des Laboratoires de Biologie Médicales Laboratoire Central de référence Universite Joseph Ki-Zerbo Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou, Clinique St Leopold Centre Hospitalier Universitaire Bogodogo Institut National de Santé Publique Institut de Recherche pour le Développement Universite de Bordeaux ANRS | Maladies infectieuses émergentes.

Introduction : La COVID-19 demeure un problème de santé publique au Burkina Faso. L'objectif de cette étude était d'analyser la dynamique spatio-temporelle de l'incidence de la COVID-19 au Burkina Faso, et d'identifier les facteurs sociodémographiques et météorologiques associés à l'échelle provinciale et au niveau individuel.

Méthodes : Il s'agissait d'une analyse secondaire des données de surveillance nationale de la COVID-19 collectées entre mars 2020 et mars 2024. Les données ont été extraites de la base des données DHIS2 du Ministère de la Santé. Les données météorologiques ont été téléchargées à partir du site de l'Administration Nationale de l'Aéronautique et de l'Espace (NASA). Un modèle Bayésien hiérarchique spatio-temporelle a été utilisé pour identifier les facteurs de risque associés à l'incidence de la COVID-19 au niveau des provinces.

Résultats : De mars 2020 à mars 2024, 71175 cas suspects ont été enregistrés, Le taux de positivité était de 5,69 % (IC 95% [5,52 ; 5,87]). L'âge médian des cas était de 36 ans (IIQ [26-49]), le sexe ratio hommes femmes était de 1,77. Le pic de l'incidence a été observé en janvier 2021. La densité de la population était associée au nombre de cas (RR= 1,398 (IC 95% : [1,100 ; 1,865])). Une augmentation de la température moyenne entraînait une réduction du nombre de cas (RR = 0,939 (IC 95% [0,894 ; 0,988])). Au niveau individuel, les facteurs de risque étaient le diabète OR = 3,45 (IC 95% [2,62 ; 4,55]), et les maladies cardio-vasculaires OR = 1,93 (IC 95% [1,39 ; 2,70]).

Conclusion : L'étude a mis en évidence des facteurs démographiques météorologiques et individuels associés à la dynamique de la COVID-19 au Burkina Faso. Elle souligne la place importante des facteurs de risque cardiovasculaire dans l'incidence de la COVID-19.

Mots-clés : COVID-19 ; Dynamique Spatio-Temporelle ; Surveillance ; Burkina Faso

CACL01	Type de communication : Communication affichée Sous-thème : La pratique de la sante publique en milieu hospitalier
--------	---

Analyse des prescriptions médicamenteuses reçues dans des officines de pharmacie privées de la commune d'Abomey-Calavi au Bénin

Mongbo Virginie¹, Gildas Yelian Weke², Jean-Marie Tokoudagba², Colette Azandjeme¹, Charles Sossa-Jerome¹

Affiliation : 1=Institut Régional de santé publique de Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Bénin 2=Faculté des Science de la Santé de Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Introduction : Les prescriptions médicamenteuses représentent le moyen de communication entre le patient, le pharmacien et le prescripteur. Elles peuvent être cause d'erreurs de dispensation ou d'administration. La présente étude visait à analyser les prescriptions médicamenteuses reçues dans les officines de pharmacies privées de la Commune d'Abomey-Calavi au Bénin.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale réalisée dans 11 officines de pharmacies privées sélectionnées par choix aléatoire simple parmi le 55 la commune d'Abomey-Calavi (soit 20%). Les données sur les patients, les prescripteurs, les médicaments prescrits ainsi que le support de prescription ont été collectées à l'aide d'une fiche de dépouillement digitalisée sur smartphone via KoboCollect, puis analysées dans stata 14.

Résultats : Au total, 850 prescriptions médicamenteuses ont été exploitées, toutes les soumises à dispensation. Les noms et prénoms, l'âge, le sexe et le poids du patient étaient respectivement présents sur 83,88% ;26,94% ;15,41% et 48,21% sur 19,76% de prescriptions pédiatriques. Quant aux prescripteurs, leurs noms et prénoms, cachet, numéro d'ordre, qualification, et structure sanitaire d'appartenance étaient présents respectivement sur 71,53% ;82% ;63,06% ;74% ;80,59%. Parmi les prescripteurs, 74,00% étaient qualifiés. Concernant les médicaments prescrits, le dosage, la forme, la quantité et la posologie avaient été renseignés respectivement dans 78,18% ;94,79% ;97,28% et 85,53%. Sur les 850 prescriptions médicamenteuses, 7,00% n'étaient pas datées et seulement 5,18% avaient tous les critères de bonne prescription présents.

Conclusion : Une proportion importante de prescriptions étudiées présente des lacunes susceptibles de compromettre la sécurité des patients. Il est essentiel d'améliorer les pratiques de prescription et de dispensation à travers une réglementation stricte et une meilleure sensibilisation des acteurs concernés.

Mots-clés : Prescriptions médicamenteuses ; Qualité ; Bénin

CACL02	Type de communication : Communication affichée Sous-thème : La pratique de la sante publique en milieu hospitalier
--------	---

Consommation de substances psychoactives en milieu scolaire au Bénin : Contextes d'approvisionnement et d'usage

Odile Kougblenou ; Pierre Meliho ; Eric Akpi, Ferdinand Adounkpe ; Adolphe Kpatchavi; Dismand Houinato

Affiliation : Laboratoire de Sociologie Anthropologie Appliqué

Résumé : La santé et le bien-être des adolescents constituent un maillon important du changement vers des sociétés plus durables et en meilleure santé. Mais force est de constater que malgré les multiples politiques de protection de ces derniers, ils s'adonnent à des comportements déviants dont l'usage de substances psychoactives (SPA). Cette situation pose un véritable problème de santé publique. Cette étude analyse les contextes d'approvisionnements et d'usages des SPA chez les adolescents et jeunes des lycées et collèges au Bénin. De type transversal, l'enquête s'est déroulée de Mars à Juin 2020 dans 20 lycées et collèges de Cotonou et Parakou. Elle a porté sur 617 adolescents et jeunes âgés de 10 à 24 ans, sélectionnés par la technique de sondage en grappe à deux degrés. Soixante-cinq (65) de cette cible ont été sélectionnés par la technique de choix raisonné et de boule de neige pour des entretiens qualitatifs approfondis. Le traitement des données a été fait avec le logiciel SPSS pour les données quantitatives et l'analyse de contenu pour celles qualitatives. Les résultats obtenus rendent compte que la consommation des SPA intervient dans un contexte communautaire en milieu scolaire. L'alcool (78,28%) était la substance la plus consommée, elle était suivie des stimulants de type amphétamine (62,07%) et du tabac (45,06%). Ces différents produits étaient accessibles sur le marché parallèle (42,9%), auprès des pairs (24 ;67%), à la pharmacie (31, 74%) et via internet (1,13%). L'usage des SPA chez les adolescents et jeunes est un comportement qui nécessite une action conjuguée des responsables scolaires, gouvernement et toute la communauté pour une lutte efficace.

Mots-clés : Substances Psychoactives ; Milieu Scolaire ; Bénin

CACL03	Type de communication : Communication affichée Sous-thème : La pratique de la sante publique en milieu hospitalier
--------	---

Facteurs associés au dépistage du Diabète en milieu rural dans le district de Salémata au Sénégal

Ndeye Mareme Sougou

Affiliation : Service Médecine Préventive et Santé Publique , Université Cheikh Anta Diop Dakar

Introduction : Selon l'enquête Steps effectuée en 2015, 3,4% de la population sénégalaise souffre de diabète. Dans les régions éloignées, les diabétiques éprouvent des difficultés d'accès à des soins de qualité. L'objectif de cette étude est d'évaluer les connaissances, attitudes et pratiques des populations concernant le diabète et son dépistage.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive. Entre Juin et Juillet 2024, 387 personnes habitantes du district sanitaire de Salemata avait été incluses . Des analyses univariées, bivariées et multivariées avaient été faites avec R.3.1.4.

Résultats : Le niveau de connaissance du diabète était faible dans la population d'étude. en effet, 69% pensent que c'est une maladie qui se guérit définitivement ,70% que le diabète affecte seulement les personnes âgées. Dans notre population d'étude, plus de la moitié des participants (60%) connaissaient les signes cliniques du diabète, les signes les plus distingués étaient l'augmentation de la fréquence des urines (68%) et la perte de poids (67%). La majorité de notre population d'étude connaissait les complications du diabète sucré. Les complications les plus citées étaient l'amputation du membre qui représentent (73 ,3%) suivi de l'insuffisance rénale (61%) et des problèmes oculaires (59%). 60% de la population d'étude n'avait pas de problèmes pour que les gens soient au courant de leur statut de diabétique, le reste avait peur de la stigmatisation 197 participants (51%) disaient avoir fait déjà fait un test de glycémie pour un dépistage. Les facteurs associés au dépistage du diabète était le niveau socio-économique assez- Bon 2,66[1,71 – 4,19], bon : 3,05 [1,23 – 8,13].

Conclusion : Cette étude a permis de montrer que les autorités sanitaires doivent d'avantage insister sur la sensibilisation concernant la diabète permettant ainsi une meilleure connaissance de la maladie par les communautés.

Mots-clés : Diabète ; Connaissance; Facteurs Associés ; Dépistage; Sénégal

CACL04	Type de communication : Communication affichée Sous-thème : La pratique de la sante publique en milieu hospitalier
--------	---

Perception négative des élèves adolescentes et jeunes filles sur l'utilisation des méthodes contraceptives modernes au Bénin

Akoha Félicité, Aka Joseph, Soussia Théodore, Tiembre Issaka, Ouendo Edgard-Marius D., Dagnan Simplicie N'cho

Affiliation : Institut National Médico-Sanitaire / Université d'Abomey-Calavi, Bénin ; Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Institut Régional de Santé Publique, Bénin

Introduction : L'utilisation des méthodes contraceptives modernes devient complexe chez certaines élèves. Les perceptions peuvent varier d'une élève à une autre et d'un contexte à un autre. L'objectif de cette publication est de présenter les avis recueillis sur le phénomène au Bénin en vue d'une sexualité responsable des élèves

Méthodes : Une enquête transversale réalisée en 2021 dans 42 établissements d'Enseignement Secondaire Technique et de la Formation Professionnelle du Bénin, a questionnée les élèves adolescentes et jeunes de ces établissements. Elles ont été sélectionnées par la méthode probabiliste avec une technique de choix par commodité.

Résultats : Elles étaient 2 130 filles à répondre qu'elles utilisaient une méthode contraceptive sans précision. Parmi elles, 1282 avaient indiqué qu'elles étaient sexuellement actives et utilisaient une méthode contraceptive, dont principalement, l'abstinence pendant la période de fécondité. Les autres méthodes modernes étaient en très faibles proportions. Plus de la moitié des élèves exprimait l'engagement de recourir à une méthode de contraception pertinente ou appropriée. Laquelle méthode n'est pas forcément moderne. Une, traditionnelle, « Gninsikin », serait plus efficace selon une élève dans l'Atacora. Toutes celles qui utilisaient l'abstinence étaient unanimes sur leur choix. Une éducation sexuelle complète et objective s'impose. Elle doit aborder les questions de contraception de manière ouverte et honnête, l'accès à des informations fiables et adaptées à l'âge sur les différentes méthodes contraceptives. L'implication des parents et des communautés dans les programmes d'éducation sexuelle favoriserait un environnement plus ouvert à la discussion sur ces questions

Conclusion : Les perceptions des élèves concernant l'utilisation des méthodes contraceptives modernes sont complexes et multifactorielles. Il est essentiel de mettre en place des programmes d'éducation sexuelle adaptés afin de permettre aux jeunes de prendre des décisions éclairées et responsables concernant leur santé sexuelle. Cependant, des études sur les méthodes contraceptives traditionnelles s'imposent afin d'appréhender la véracité des propos des élèves.

Mots-clés : Perception négative ; élève ; méthodes contraceptives modernes ; Bénin

CACL05	Type de communication : Communication affichée Sous-thème : La pratique de la sante publique en milieu hospitalier
--------	---

Psychiatrie de liaison au CNHU-HKM à Cotonou en 2023 : Aspects épidémiologiques et cliniques

Elvyre Klikpo¹, Hervé Ndi¹, Guy-Gérard Aza-Gnandji¹, Alphonse Kpozehouen², Yolaine Glele Ahanhanzo²

Affiliation : 1=Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin
 2=Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Introduction : La psychiatrie de liaison, est une branche de la psychiatrie qui se situe à l'interface entre la médecine générale et la psychiatrie. C'est une pratique généralement hospitalière. L'objectif de ce travail était d'évaluer l'activité de la psychiatrie de liaison au CNHU-HKM de Cotonou.

Méthodes : il s'agissait d'une étude transversale descriptive qui s'est déroulée sur 7 mois, allant du 1er mars 2023 au 30 septembre 2023. L'échantillonnage était non probabiliste, de exhaustif. Les patients vus dans les services médico-chirurgicaux ont été inclus dans l'étude. Les données ont été collectées à l'aide d'une fiche d'enquête, saisie avec le logiciel Excel et analysée avec le logiciel Excel et Python.

Résultats : Au terme de l'enquête, 96 patients ont été recrutés. L'âge moyen était de 47 ans avec des extrêmes de 15 et 85 ans. Les tranches d'âges]15-34 ans] et]65-74 ans] étaient les plus représentées, la majorité était mariée (64,44 %) et non salariée (63,53%). Les femmes prédominaient (55,21%) avec une sex-ratio à 1,26. Les services les plus demandeurs d'avis psychiatrique étaient la neurologie (20,83%), les urgences (16,67%) et la gynéco-obstétrique (12,50%). Les motifs les plus fréquents étaient l'agitation (37.89%), les symptômes anxio-dépressifs (25.26%). Les symptômes dépressifs (27,66%) et psychotiques (19,15%) étaient plus présents à l'évaluation psychiatriques. La prise en charge était fonction du cas et la psychothérapie et la psychoéducation étaient systématiquement utilisées, associées ou non à un traitement psychotrope.

Conclusion : La liaison psychiatrique demeure une nécessité dans un hôpital général comme le CNHU-HKM. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Les patients doivent être soignés de façon holistique.

Mots-clés : Psychiatrie De Liaison ; Avis Psychiatrique ; Service ; CNHU-HKM

CACL06	Type de communication : Communication affichée Sous-thème : La pratique de la sante publique en milieu hospitalier
--------	---

Cartographie du système national de recherche en santé au Bénin : Analyse de la production scientifique (2013-2023)

Avahoundje Elias Martinien; Agbodjavou Mena; Agossou Christian ; Boyi Hounsou Christelle; Dossou Jean-Paul

Affiliation : Centre de recherche en reproduction humaine et en Démographie (CERRHUD)

Introduction : La recherche en santé constitue un levier essentiel pour améliorer les systèmes de santé et réduire les inégalités. Dans ce contexte, cette étude a pour objectif de dresser une cartographie de la littérature scientifique en santé au Bénin au cours des dix dernières années, en analysant les travaux de recherche réalisés. Cette analyse permettra d'une part, d'évaluer les progrès réalisés, et d'autre part, d'aligner la production scientifique sur les priorités du pays et d'orienter les décisions en matière de santé.

Méthodes : Nous avons réalisé une cartographie systématique de la littérature suivant les recommandations PRISMA. Nous avons procédé à une extraction rigoureuse des données par une équipe de dix agents, en nous appuyant sur un formulaire standardisé et un système de gestion des données via Kobocollect. Les données ont été analysées sous STATA.

Résultats : Une revue de littérature, couvrant la période 2013-2023, a permis d'extraire et d'analyser 1 673 publications scientifiques, issues principalement de PubMed, Google Scholar ainsi que des revues locales telles que le Journal de la Société de Biologie Clinique du Bénin et le Journal Africain de Pédiatrie et de Génétique Médicale. Les résultats mettent en évidence une fluctuation du volume de publications, avec une baisse initiale entre 2013 et 2016, suivie d'une augmentation notable jusqu'en 2021, puis d'une légère diminution par la suite. La majorité des travaux (89,8 %) est en accès libre et a été rédigée en anglais (64,6 %). Les axes de recherche prédominants se concentrent dans le domaine épidémiologique (51,9 %) et biomédical (28,6 %), tandis que les études portant sur le système de santé (8,8 %), l'environnement et la santé (4,8 %), les sciences sociales appliquées à la santé (1,7 %) et la recherche sur la médecine traditionnelle (1,9 %) sont moins nombreuses. L'analyse des sujets de publication révèle une prédominance des études sur les causes des maladies (infectieuses et non infectieuses) et les effets sur les patients (environ 22 % chacune). Le paludisme et le VIH constituent les deux maladies les plus fréquemment abordées. Par ailleurs, l'analyse des méthodologies révèle une prédominance des études non interventionnelles (90,2 %) et un financement majoritairement extérieur, notamment par les États-Unis (29,2 %) et la France (26,5 %). De plus, une proportion élevée des publications (70,2 % pour les premiers auteurs) affiche une affiliation des auteurs béninois.

Conclusion: La présente étude offre une vue d'ensemble de la quantité et de la qualité des recherches menées au Bénin. Les résultats soulignent la nécessité pour les autorités de renforcer les financements nationaux et de promouvoir les recherches dans les domaines insuffisamment explorés. Il faudra également promouvoir des approches plus interventionnelles.

Mots-clés : Recherche; Santé; Cartographie; Publications; Bénin

CACL07	Type de communication : Communication affichée Sous-thème : La pratique de la sante publique en milieu hospitalier
--------	---

Etude des facteurs associés à l'accès de la planification familiale chez les adolescentes jeunes de 15-24 ans au niveau du district sanitaire de Diouloulou en 2021 (Sénégal)

Diongue Fatoumata Binetou, Bassoum Oumar, Tine Jean Augustin Diégane, Diallo Amadou Ibra, Sougou Ndeye Marème, Ndiaye Ibrahima, Ndiaye Mbayang, Diongue Mayacine, Diagne Maty, Faye Adama, Seck Ibrahima

Affiliation : Institut de Santé et Développement, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

Introduction : La santé des adolescentes jeunes reste un défi pour tous les décideurs. En effet les adolescent(e)s jeunes ont besoin d'un accompagnement, d'un soutien pour rester en bonne santé et passer à l'âge adulte. Pour ce faire l'accès à l'information et aux services de planification est important afin d'améliorer la qualité de leur vie. L'objectif était d'étudier les facteurs associés à l'accès de la planification familiale chez les adolescentes jeunes de 15-24 ans au niveau du district sanitaire de Diouloulou en 2021

Méthodes : L'étude était de type transversal descriptif et analytique chez des adolescentes jeunes ayant consulté au niveau des services de planification familiale entre le mois d'Octobre 2021 et d'Octobre 2022. Un échantillonnage proportionnel à la taille a été faite. La taille de l'échantillon calculée avec la formule de Shwartz en respectant le poids démographique de chaque zone de responsabilité du district

Résultats : Au total, 186 adolescentes jeunes ont été enquêtées et il était ressorti que les adolescentes jeunes 62,3% avaient consulté au niveau des services de PF. Cependant 34% avait émis un besoin additionnel de structures et 50% autre structures non précisé. La principale source d'information des adolescentes jeunes sur la santé de la reproduction des adolescentes jeunes (SRAJ) était un membre de la famille 42%, un camarade (23%). Les facteurs associés à l'accès étaient l'âge ($p=0,0002$; OR 3,07) et le statut matrimonial ($p=0,0006$; OR 2,97).

Conclusion: L'accès au service de la planification familiale des adolescentes jeunes doit être facile. Malgré l'absence de centre de conseil adapté aux jeunes, le cadre scolaire demeure une source d'information et d'orientation ainsi qu'une opportunité pour des stratégies de communication.

Mots-clés : services de planification familiale ; adolescentes jeunes ; santé reproductive

CACL08	Type de communication : Communication affichée Sous-thème : La pratique de la sante publique en milieu hospitalier
--------	---

Etude des facteurs associés à l'accès de la planification familiale chez les adolescentes jeunes de 15-24 ans au niveau du district sanitaire de Diouloulou en 2021 (Sénégal)

Roméo Mèdèssè Togan, Alassane Ouro-Medeli, Rogatien Atoun, Frédéric Youa, Komlan Ali-Edje, Messanh Doufan, Laetitia Sorrano, Christelle Butel, Martine Peteers, Didier K. Ekouevi, Claver Anoumou Dagnra

Affiliation : Ecole Doctorale des Sciences de la Santé, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi

Introduction : La surveillance de la résistance primaire est indispensable pour évaluer l'émergence de la résistance du VIH aux antirétroviraux. L'objectif de cette étude était d'estimer la prévalence des mutations de résistance aux antirétroviraux (ARV) chez les patients naïfs au Togo

Méthodes : Une étude transversale a été menée dans 30 centres de prise en charge des personnes vivant avec le VIH au Togo entre mars et août 2023. Les patients âgés de 18 ans et plus, nouvellement infectés par le VIH-1 et naïfs de tout traitement ARV avec une charge virale $\geq 6\,500$ copies/ml ont été inclus. Les mutations ont été analysées à l'aide des algorithmes de Stanford HIVDB et ANRS mis à jour après les tests génotypiques de résistance à la protéase, à la transcriptase inverse et à l'intégrase

Résultats : Au total, 376 patients ont été inclus et les analyses de résistance ont été effectuées sur 321 échantillons. L'âge médian était de 39 ans, IIQ [30 - 47] avec 64,9% de femmes. La prévalence des mutations de résistance à l'inhibiteur d'intégrase était de 17,2 % (55/320), avec E157Q/E157EQ (n=41/55) et T97A/T97TA (n=14/55) comme mutations, mais ces mutations ne confèrent pas de résistance au dolutégravir. La prévalence des mutations de résistance dans la classe des INRT était de 0,6 % (2/316), avec T215TS et K70KE comme mutations. Pour les INNRT, la prévalence était de 6,3 % (n=20/316). Aucune mutation majeure n'a été observée dans le gène de la protéase. Les sous-types génétiques du VIH prédominants étaient CRF02_AG (64,8%) et CRF06_cpx (12,8%).

Conclusion: Ces résultats confirment l'efficacité du traitement ARV de première ligne à base de Dolutégravir au Togo. Cependant, il est nécessaire de mettre en place un programme régulier de surveillance de la résistance primaire et secondaire aux ARV chez les patients infectés par le VIH.

Mots-clés : Résistance primaire, VIH-1, Dolutégravir, Patients naïfs, Togo