



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERÍA

61.09 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA B

Método Monte Carlo

Ezequiel Pérez Dittler

19 de abril de 2016

1. Enunciado

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y no negativa. Sea $M > 0$ el valor máximo de la función f sobre el intervalo $[a, b]$.

(a) Se elige al azar un punto de coordenadas (X, Y) dentro del rectángulo de vértices $(a, 0)$, $(b, 0)$, (b, M) , (a, M) . Relacionar la probabilidad del evento $A = \{Y \leq f(X)\}$ con el valor de la integral $\int_a^b f(x)dx$.

(b) Si se conoce el valor de la probabilidad, $P(A)$, del evento $A = \{Y \leq f(X)\}$, ¿cómo se calcula la integral $\int_a^b f(x)dx$?

(c) Obtener un método que permita estimar el valor de la integral $\int_a^b f(x)dx$ en base a los resultados de n simulaciones del experimento descrito en Inciso (a).

(d) Estimar el valor de la integral $\int_0^2 e^{-x^2} dx$ utilizando el método obtenido en Inciso (c) basándose en los resultados de 10000 simulaciones.

2. Resolución

2.1. Inciso (a)




Figura 1: Rectángulo de vértices $(a, 0)$, $(b, 0)$, (b, M) , (a, M)

$$P(A) = P(Y \leq f(X)) = \frac{\text{area}(A)}{\text{area}(\Omega)} = \frac{\int_a^b f(x)dx}{(b-a) \cdot M}$$

2.2. Inciso (b)

Siendo $P(A)$ conocido, se puede estimar el valor de la integral $\int_a^b f(x)dx$ del siguiente modo

$$\int_a^b f(x)dx = P(A).(b-a).M$$

2.3. Inciso (c)

Siendo dato los valores a , b , M y conocida la función $f(x)$, se puede estimar el valor de la integral $\int_a^b f(x)dx$ obteniendo un valor estimado de $P(A)$, A el evento $A = \{Y \leq f(X)\}$.

Para ello, se debe generar un vector aleatorio (X, Y) y verificar si forma parte del evento A , es decir, si $Y \leq f(X)$. Repitiendo varias veces la simulación se puede obtener un mejor valor de $P(A)$.

2.4. Inciso (d)

Se desea el valor de $\int_0^2 e^{-x^2} dx$ utilizando el método, basándose en resultados de 10000 simulaciones. De la integral se pueden extraer los siguientes datos:

- $a = 0$
- $b = 2$
- $M = 1$
- $f(x) = e^{-x^2}$

Se diseñó el siguiente algoritmo en Octave:

Listing 1: Algoritmo Monte Carlo en Octave

```
1 % Entrada
2 a = 0;
3 b = 2;
4 M = 1;
5 cant_simulaciones = 10000;
6
7 % Genero los valores de X y de Y
8 longitud_uniforme_x = b - a;
9 X = rand(1, cant_simulaciones) * longitud_uniforme_x;
10 Y = rand(1, cant_simulaciones) * M;
11
12 % Aplico la funcion e ^ (- x ^2) y comparo con Y
13 f_X = exp(-(X.^ 2));
14 A = Y < f_X;
15
16 % Calculo la probabilidad y finalmente el valor de la integral
17 probabilidad = sum(A) / cant_simulaciones;
18 integral = probabilidad * longitud_uniforme_x * M
```

Corriendo el algoritmo, se obtuvo el valor 0.88460. Siendo el valor analítico de la integral 0.88208, se puede concluir que el método Monte Carlo aproxima bastante al valor.